

LAMPIRAN

Lampiran 1.







PRODI FARMASI
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK



**LEMBAR BIMBINGAN PKL
DOSEN PEMBIMBING PKL (DPP)***

TAHUN AKADEMIK : 2023/2024

Nama Mahasiswa : Sholahatul Fajril utami
NIM : 211105032
Nama instansi PKL : Apotek kimia farma Kartini
Nama Dosen Pembimbing PKL : Diah Kalnasari, S Farm : Apt., M.T

No.	Tanggal	Bimbingan dan Saran	Paraf Pembimbing
1.	19 feb 2024	logbook 1 dan 2	<i>DF</i>
2.	26 feb 2024	logbook 3	<i>DF</i>
3.	27 Mei 2024	logbook 4 dan 5	<i>DF</i>
4.	29 Mei 2024	Tugas khusus	<i>DF</i>
5.	30 Mei 2024	laporan	<i>DF</i>
6.	6 Juni 2024	laporan dan tugas khusus	<i>DF</i>

***)MINIMAL BIMBINGAN 6 KALI**



The Power of Islamic Entrepreneurship
Jl. Sumatera 101 Gresik Kota Baru (GKB) Gresik, 61121 Telp: (031) 3951414, Fax: (031) 3952585 Website: <http://www.umg.ac.id>, Email: info@umg.ac.id



PRODI FARMASI
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK



Lembar ke :

LEMBAR BIMBINGAN PKL*
PEMBIMBING PKL (PL)

TAHUN AKADEMIK : 2023/2024

Nama Mahasiswa : Cholihatul Fajri Utami
 NIM : 21105032
 Nama instansi PKL : Apotek Kimia Farma Kartoni
 Nama Pembimbing Lapangan : apt. Pama Manjaya, S. Farm.

No.	Tanggal	Bimbingan dan Saran	Paraf Pembimbing
1.	7 Februari 2024	Bimbingan Awal PKL	
2.	5 Maret 2024	Bimbingan Log book dan tugas khusus	
3.	8 Maret 2024	Bimbingan logbook	
4.	20 Maret 2024	Bimbingan log book dan tugas khusus	
5.	27 Maret 2024	Bimbingan tugas khusus	
6.	6 Juni 2024	Bimbingan tugas khusus & laporan	

*MINIMAL BIMBINGAN 6 KALI



The Power of Islamic Entrepreneurship

Jl. Sumatera 101 Gresik Kota Baru (GKB) Gresik, 61121 Telp. (031) 3951414, Fax: (031) 3952585 Website: <http://www.umg.ac.id>, Email: info@umg.ac.id

**PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
DI APOTEK KIMIA FARMA KARTINI**



**SHOLAHATUL FAJRIL UTAMI
211105032**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III FARMASI
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK**


2024

A. TUGAS KHUSUS RESEP

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (3), resep polifarmasi (3), resep obat mata/telinga (1), resep obat kulit (1), resep mengandung sediaan inhaler (1), resep obat KB (1), Resep mengandung insulin (1), resep kudis/kurap (1), Resep obat saluran cerna (1), Resep saluran nafas (1), resep racikan anak (3), Resep racikan dewasa (3), resep pasien DM (1), Resep pasien HT (1), Resep pasien syaraf (1), resep yang ada pengulangan /iter (3), dan resep lainnya (4)

Total : 30 Resep

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep		
1.	Jenis Resep : Salinan/ Resep asli Resep obat : Racikan/ non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>)/Tidak Pengulangan resep : Iter 2x+5kali/ Neiter Tempel Resep/salin resep disini!	A. Skrinning Administrasi		
		Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	M. Bahasuan
		Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-
		Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-
		Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	<ul style="list-style-type: none"> • Narfoz • Clobazam • Amitriptylin • Lancid • Dumin
		Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	<ul style="list-style-type: none"> • Narfoz 4mg • Clobazam 0,5mg • Amitriptylin 0,5mg • Lancid 21mg • Dumin 300mg
		Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Mf pulv da in caps (kapsul)
		Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	No X (Sepuluh)
		Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-
		Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	S 1.1.1 30 hac



		(3 kali sehari 30 menit sebelum makan)
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	2-11-2018
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Pangestu adi
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

- Narfoz : $3/10 \times 10 = 3$
- Clobazam : $0,5/10 \times 10 = 5$
- Amitriptylin ; $0,5/10 \times 10 = 5$
- Lancid : $21/30 \times 10 = 7$
- Dumin : $300/ 500 \times 10 = 6$

C. Perhitungan biaya resep

Racikan 1
 Cap kosong : $95 \times 10 = 950$
 Narfoz : $19.317 \times 3 = 57.951$
 Clobazam : $384 \times 5 = 1.920$
 Amitriptylin : $8500 \times 5 = 41.000$
 Lancid : $27.000 \times 7 = 189.000$
 Dumin : $800 \times 6 = 4.800$
 Embalase : 15.000
 Total : Rp.305.821

D. ETIKET

 APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	
No. : TGL : 5 Maret 2021	
NAMA PASIEN : Tn. M. bahasuan	
..... 3X sehari 1 Tablet / Kapsul / Bungkus Sebelum / Sesudah / Bersama makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)	Pagi Siang Sore Malam
Nama / Jumlah Obat	racikan 10 kapsul
Tgl. Kadaluarsa	(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)

E. *Product knowledge*


Nama Obat : narfoz Kandungan : ondansentron HCl Dosis lazim : 2 x sehari 4 mg Kegunaan :	Nama Obat : clobazam Kandungan : Clobazam 10 mg Dosis lazim :	
---	---	--

		<p>menangani mual dan muntah yang diinduksi oleh kemoterapi dan radioterapi sitotoksik.</p> <p>ESO potensial : sakit kepala, sensasi kemerahan atau hangat pada kepala.</p> <p>KI : :</p> <p>Hipersensitif</p> <p>PERHATIAN : hipersensitif terhadap ondansetron</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari</p>	<p>Kegunaan : mengatasi kejang pada penderita epilepsi dan gangguan kecemasan.</p> <p>ESO potensial : Mengantuk,demam,batuk,gelisah</p> <p>KI : Gangguan hati berat, kehamilan</p> <p>PERHATIAN : Penyalahgunaan clobazam dapat menyebabkan kecanduan, overdosis, atau kematian</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari</p>	
		<p>Nama Obat : amitriptylin Kandungan : amitriptyline 10mg</p> <p>Dosis lazim : Dosis awal Amitriptyline 25mg diminum dua kali sehari dengan durasi pengobatan 2 minggu hingga 6 bulan. Dosis dapat disesuaikan hingga dosis maksimal 150 mg dalam dosis terbagi per hari.</p> <p>Kegunaan : <ul style="list-style-type: none"> • Depresi • <i>Nocturnal enuresis</i> pada anak • Nyeri Saraf • Migrain </p> <p>ESO potensial :</p>	<p>Nama Obat : lacid Kandungan : lansoprazole</p> <p>Dosis lazim : 30mg satu kali sehari</p> <p>Kegunaan : menangani keluhan terkait kelebihan asam lambung, termasuk komplikasi yang disebabkan. Obat ini umumnya digunakan pada penyakit asam lambung</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> • sedasi atau efek mengantuk • pandangan kabur • Konstipasi • Mual dan muntah • Sulit buang air kecil • Gangguan pada jantung (aritmia, hipotensi postural, takikardia), terutama pemberian pada dosis tinggi • Berkeringat banyak • Tremor • Ruam <p>KI :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infark miokard • Aritmia • Gejala mania (gangguan bipolar) • Gangguan hati berat • Anak usia <6 tahun <p>PERHATIAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gangguan hati berat • Gangguan tiroid • Glaukoma sudut sempit • Retensi urin <p>Cara penyimpanan : Simpan obat Amitriptyline pada suhu di bawah 25 derajat Celcius, pada tempat</p>	<p>(GERD), tukak lambung, ulkus duodenum, serta refluks esofagitis.</p> <p>ESO potensial :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sakit kepala atau pusing • Sakit perut • Mual • Konstipasi atau malah diare <p>KI : Hipersensitif</p> <p>PERHATIAN : pasien keganasan lambung, kehamilan</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari</p>	
--	--	---	--	--

		<p>yang sejuk dan kering, serta terlindungi dari cahaya matahari langsung</p>		
		<p>Nama Obat : dumin Kandungan : Paracetamol 500mg</p> <p>Dosis lazim : Dewasa : 3-4 x sehari 1-2 tablet, Anak 7-12 tahun : 3-4 x sehari 1/2 tablet.</p> <p>Kegunaan : Meredakan nyeri pd sakit kepala, sakit gigi, dismenore, nyeri otot & sendi, selesma, flu, & menurunkan demam.</p> <p>ESO potensial : Jarang, reaksi hipersensitivitas</p> <p>KI : -</p> <p>PERHATIAN : Penggunaan bersama obat lain yg mempengaruhi hati. Gagal hati & ginjal.</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari</p>		
		<p>F. Tahap pembuatan</p>		

		<p>Racikan 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siapkan obat yang akan diracik 2. Obat yang sudah di siapkan dibuka dan obat tersebut dimasukan kedalam belender 3. Kemudian obat diayak dan dimasukan kedalam kapsul <p>Lalu kapsul di tutup dan dimasukan ke dalam pot kapsul dan di beri etiket</p> <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Atas nama m. bahasuan . ada 1 racikan diminum 3 kali sehari 30 menit sebelum makan. ini. . Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu</p> <p>H. Salinan resep</p>												
No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep												
2.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : 4 Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>tn fathoni</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Decolsin Codein Ambroxol</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	tn fathoni	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Decolsin Codein Ambroxol
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	tn fathoni												
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-												
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-												
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Decolsin Codein Ambroxol												



		Metilprednisolon
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Decolsin 2/3 tab Codein 10mg Ambroxol 20mg Metilprednisolon 8mg
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	M f. la caps (kapsul)
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	No.IX (Sembilan)
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	S 3 dd 1 (tiga kali sehari)
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	7-03-2024
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. tresnaningsih
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	446/1866/437.52/2023
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Decolsin $2/3 \times 9 = 6$
Codein $10/10 \times 9 = 9$
Ambroxol $20/30 \times 9 = 6$
Metilprednisolon $8/8 \times 9 = 9$

C. Perhitungan biaya resep

Racikan 1
Capsul : $95 \times 9 = 885$
Decolsin: $319 \times 6 = 1.914$
Codein : $2500 \times 9 = 22.500$
Ambroxol: $500 \times 6 = 3.000$
Metilprednisolon: $860 \times 9 = 7.740$
Embalase = 15.000
Total = 49.539

D. ETIKET

Nama Obat/Warna etiket:


			<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1155 188 1464 357">  APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597 </td> <td data-bbox="1464 188 1995 357"> Bapil radang </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1155 357 1995 389"> No. : TGL : 7 maret 2024 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1155 389 1995 421"> NAMA PASIEN : Tn. fathoni </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1155 421 1464 564"> 3.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus Sebelum / Sesudah / Bersama makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak) </td> <td data-bbox="1464 421 1995 564"> <u>Pagi</u> <u>Siang</u> <u>Sore</u> <u>Malam</u> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1155 564 1995 596"> Nama / Jumlah Obat racikan 9 kapsul </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1155 596 1995 628"> Tgl. Kadaluarsa </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1155 628 1995 660"> (hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat) </td> </tr> </table>	 APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	Bapil radang	No. : TGL : 7 maret 2024		NAMA PASIEN : Tn. fathoni	 3.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus Sebelum / Sesudah / Bersama makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)	<u>Pagi</u> <u>Siang</u> <u>Sore</u> <u>Malam</u>	Nama / Jumlah Obat racikan 9 kapsul		Tgl. Kadaluarsa		(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)	
 APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	Bapil radang																
No. : TGL : 7 maret 2024																	
NAMA PASIEN : Tn. fathoni																	
..... 3.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus Sebelum / Sesudah / Bersama makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)	<u>Pagi</u> <u>Siang</u> <u>Sore</u> <u>Malam</u>																
Nama / Jumlah Obat racikan 9 kapsul																	
Tgl. Kadaluarsa																	
(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)																	
E. Product knowledge																	
Nama Obat : decolsin Kandungan : parasetamol 400 mg, pseudoefedrin 30 mg, ctm 1 mg, dextromethorphan 10 mg, guafenesin 50 mg Dosis lazim :		Nama Obat : codein Kandungan : Codein 10mg Dosis lazim : 30-60 mg/hari Kegunaan : nyeri sedang hingga parah															

		<p>3 x sehari 1 tablet</p> <p>Kegunaan :</p> <p>meredakan batuk menyertai flu</p> <p>ESO potensial : mengantuk, gangguan pencernaan, gangguan psikomotor, takikardi, aritmia</p> <p>KI :</p> <p>-</p> <p>PERHATIAN : hipersensitivitas komponen, hati-hati pada pasien hipertensi, gangguan fungsi hati berat, gangguan jantung</p> <p>Cara penyimpanan : simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>	<p>ESO potensial : sakit kepala, mual, lemas kantuk, susah buang air kecil, halusinasi, haid tidak teratur</p> <p>KI :</p> <p>-</p> <p>PERHATIAN : -</p> <p>Cara penyimpanan : simpan ditempat yang sejuk dan kering, terlindung dari sinar matahari</p>	
		<p>Nama Obat : ambroxol Kandungan : ambroxol 30mg Dosis lazim : Dewasa dan anak > 12 tahun : 2-3 kali sehari 1 tablet</p>	<p>Nama Obat : metilprednisolon Kandungan : metilprednisolon 8mg Dosis lazim : Dosis awal 4 - 48 mg/hari dalam 1 - 4 dosis terbagi.</p>	

		<p>Kegunaan : Penyakit saluran napas akut & kronik yang disertai dengan sekresi bronkus yang abnormal, terutama pada eksaserbasi bronkus kronik, bronkitis asmatikus, asma bronkial, terapi pra & pasca operasi untuk pasien yang dirawat secara intensif guna mencegah terjadinya komplikasi pada paru</p> <p>ESO potensial : Gangguan GI ringan, reaksi alergi</p> <p>KI : -</p> <p>PERHATIAN : Penggunaan jangka lama. Insufisiensi ginjal, Hamil, Laktasi</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>	<p>Kegunaan : Gangguan endokrin, reumatik dan hematologi. • Kondisi alergi. • antiinflamasi (anti peradangan) pada berbagai kondisi seperti pada penyakit reumatik, terapi insufisiensi adrenal, terapi pendamping untuk asma.</p> <p>ESO potensial : • Gangguan saluran cerna. • Edema. • Diabetes mellitus laten. • Hipertensi. • Supresi sistem imun.</p> <p>KI : -</p> <p>PERHATIAN : • Wanita hamil dan menyusui. • Anak-anak. • Lansia.</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.</p>	
--	--	---	--	--

F. Tahap pembuatan

		<p>Racikan 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siapkan obat yang akan diracik 2. Obat yang sudah di siapkan dibuka dan obat tersebut dimasukan kedalam belender 3. Kemudian obat diayak dan dimasukan kedalam kapsul <p>Lalu kapsul di tutup dan dimasukan ke dalam pot kapsul dan di beri etiket</p> <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Atas nama tn fathoni . ini ada 1 racikan untuk batuk pilek, radang diminum 3 kali sehari sesudah makan. Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.</p> <p>H. Salinan resep</p>												
No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep												
3.	Jenis Resep : Salinan /Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : 5 Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ananda As</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>R/ Amoxsan R/ Sanmol R/ lapifed</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ananda As	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	R/ Amoxsan R/ Sanmol R/ lapifed
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ananda As												
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-												
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-												
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	R/ Amoxsan R/ Sanmol R/ lapifed												



		Epexol MP
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	R/ Amoxsan 250 mg R/ Sanmol 250mg R/ lapifed ¼ tab Epexol ½ tab MP 4mg
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	R/ Amoxsan 250 mg R/ Sanmol 250mg R/ lapifed ¼ tab Epexol ½ tab MP 4mg (10 puyer)
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	R/ Amoxsan 250 mg (5) R/ Sanmol 250mg R/ lapifed ¼ tab Epexol ½ tab MP 4mg
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	R/ Amoxsan 250 mg (3 kali sehari) R/ Sanmol 250mg (3 kali sehari) R/ lapifed ¼ tab (3) Epexol ½ tab (5) MP 4mg (10)
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	05 Maret 2024
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	HN
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Racikan 1
lapifed $\frac{1}{4}$ tab x 10 = 3
Epexol $\frac{1}{2}$ tab x 10 = 5
MP 4mg x 10 = 10

Amoxan 250/500 x 10 = 5
sanmol 250/500 x 10 = 5

C. Perhitungan biaya resep

R/ Amoxsan 500 mg	x 5	Rp. 43.590
R/ Sanmol 500 mg	x 5	Rp. 3.000
Racikan 1		
lapifed	x 3	Rp. 11.760
Epexol 30mg	x 5	Rp. 6.100
Metilprednisolon 4mg	x 10	Rp. 5.500
Kertas puyer berlogo KF	x 10	Rp. 620
Embalase		Rp. 15.000
Paperbag		Rp. 5.000

		TOTAL	Rp. 90.570
		D. ETIKET Nama Obat/Warna etiket: Amoxsan/ putih	



Antibiotik habiskan

APOTEK KIMIA FARMA

Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm
SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

No. : TGL. : 05 Maret 2024

NAMA PASIEN : Ananda

..... 3.....X sehari 1/2..... Tablet / ~~Kapsul~~ / ~~Bungkus~~
~~Sebelum~~ / Sesudah / ~~Bersama~~ makan
(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)

[Pagi](#)
[Siang](#)
[Sore](#)
[Malam](#)

Nama / Jumlah Obat Amoxan / 5

Tgl. Kadaluarsa

(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)

Nama Obat/Warna etiket: Sanmol/ putih



Demam/ panas

APOTEK KIMIA FARMA

Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm
SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

No. : TGL. : 05 Maret 2024

NAMA PASIEN : Ananda

..... 3.....X sehari 1/2..... Tablet / ~~Kapsul~~ / ~~Bungkus~~
~~Sebelum~~ / Sesudah / ~~Bersama~~ makan
(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)

[Pagi](#)
[Siang](#)
[Sore](#)
[Malam](#)

Nama / Jumlah Obat Amoxan / 5

Tgl. Kadaluarsa

(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)

Nama Obat /warna etiket : Racikan 1/ putih


 kimia farma	BAPIL
APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	
No. : TGL : 05 Maret 2024	
NAMA PASIEN : Ananda	
..... 3.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus Sebelum / Sesudah / Bersama makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)	Pagi Siang Sore Malam
Nama / Jumlah Obat Tgl. Kadaluarsa	Racikan 1 / 10 bungkus
(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)	

E. *Product knowledge*

Nama Obat : Amoxan Kandungan : Amoxicillin 500mg Dosis lazim : Dewasa & anak-anak dengan berat badan 20 kg atau lebih : 250-500 mg tiap 8 jam. Anak-anak dengan berat badan lebih dari 8 kg : 125-250 mg tiap 8 jam. Kegunaan : untuk terapi infeksi gram positif dan negatif, seperti pada saluran nafas atas dan bawah, saluran kemih dan kelamin. Kulit & jaringan lunak, infeksi tulang, GO, abses gigi (terapi tambahan thd penanganan bedah/operasi) ESO potensial : hipersensitivitas dan gangguan GI	Nama Obat : Sanmol Kandungan : Paracetamol 500mg Dosis lazim : 3-4 kali sehari 1 tab Kegunaan : meringankan rasa sakit kepala, sakit gigi, menurunkan demam ESO potensial : mengantuk, gangguan pencernaan, gangguan psikomotorik, takikardia. KI : gangguan fungsi hati, hipersensitivitas PERHATIAN : hati-hati pada penggunaan obat ini pada penderita penyakit ginjal Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung
--	--

		<p>KI : hipersensitif atau riwayat alergi, PERHATIAN : Hipersensitif Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	
		<p>Nama Obat :Lapifed Kandungan : triprolidine hcl 2,5 mg, pseudoephedrine hcl 60 mg Dosis lazim : 3 kali sehari 1 tablet Kegunaan : meringankan gejala peradangan saluran pernafasan bagian atas, rinitis alergi, rinitis vasomotor ESO potensial : mengantuk, depresi, tremor, denyut jantung cepat, hidung dan tenggorokan kering KI : hipertensi berat PERHATIAN : hipersensitif Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>Nama Obat : epexol 30 Kandungan : Ambroxol 30 Dosis lazim : 30 mg, 2-3 kali sehari Kegunaan : saluran pernafasan akut dan kronis ESO potensial : mual, muntah, diare, sakit perut KI : hipersensitif PERHATIAN : tukak lambung atau dodenum, gangguan ginjal dan hati, anak-anak Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>
		<p>Nama Obat : metil prednisolon Kandungan : metil prednisolon 4 mg Dosis lazim : 4-8 mg/hari Kegunaan : alergi dan mengurangi peradangan atau supresi inflamasi ESO potensial : gangguan kejiwaan, insomnia, penekanan ardenal, reaksi anafilaksis KI : infeksi jamur sistemik PERHATIAN :- Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	

		<p>F. Tahap pembuatan -</p> <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Atas nama Ananda. Ini obatnya ada 3 macam. Ini Amoxan antibiotik dihabiskan, diminum 3 kali sehari ½ tab, setelah makan. ini sanmol untuk demam, diminum 3 kali sehari ½ tab setelah makan. kemudian ini racikan nya untuk babil, diminum 3 kali sehari 1 bungkus, setelah makan. Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu</p> </div> <p>H. Salinan resep</p>																		
No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																		
4.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="958 932 2107 1422"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ny.siswantini</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>R/ glucoryl R/ Glucophage xr R/ cinolon n Sugestam</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>R/ glucoryl 3mg R/ Glucophage xr 500mg R/ cinolon n 10gr Sugestam 10gr</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ny.siswantini	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	R/ glucoryl R/ Glucophage xr R/ cinolon n Sugestam	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	R/ glucoryl 3mg R/ Glucophage xr 500mg R/ cinolon n 10gr Sugestam 10gr	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	-
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ny.siswantini																		
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-																		
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-																		
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	R/ glucoryl R/ Glucophage xr R/ cinolon n Sugestam																		
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	R/ glucoryl 3mg R/ Glucophage xr 500mg R/ cinolon n 10gr Sugestam 10gr																		
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	-																		



Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	R/ glucoryl 3mg no.xxx (30) R/ Glucophage xr 500mg no.xxx (30) R/ cinolon n 10gr Sugestam 10gr
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	R/ glucoryl 3mg no.xxx (2 kali sehari pagi dan malam) R/ Glucophage xr 500mg no.xxx (2 kali sehari siang dan malam) R/ cinolon n 10gr Sugestam 10gr (untuk pemakaian luar)
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	02-03-24
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Zulvia untari
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

-

C. Perhitungan biaya resep

R/ glucoryl 3mg 5.928 x 30 = 177.840
R/ Glucophage xr 500mg 3.718 x 30 = 95.340
Racikan 1
cinolon n 10gr 17.500x 1 = 17.500
Sugestam 10gr 21.500 x1 = 21.500
Pot salep = 3.000
Embalase = 15.000
TOTAL = 270.180

D. ETIKET

Nama Obat/Warna etiket: Glucoryl 3/ putih

	Diabetes
APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	
No. : TGL. : 09 Maret 2024	
NAMA PASIEN : Ny. Siswanti	
..... 2.X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus	Pagi
Sebelum / Sesudah / Bersama makan	Siang Sore

(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)

[Malam](#)

Nama / Jumlah Obat **Glucoryl 3 / 12 Caps**

Tgl. Kadaluaarsa

(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)

Nama Obat /warna etiket :Glucopage XR 500/ putih



Diabetes

APOTEK KIMIA FARMA

Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK

APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm

SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

No. : TGL : 09 Maret 2024

NAMA PASIEN : Ny. Siswanti

[Pagi](#)

..... 2.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus

[Siang](#)

Sebelum / Sesudah / Bersama makan

[Sore](#)

(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)

[Malam](#)

Nama / Jumlah Obat **Glucopage XR / 12 Caps**

Tgl. Kadaluaarsa

(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)

Nama Obat /warna etiket : Racikan 1/ biru



APOTEK KIMIA FARMA

Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK

APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm

SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597


09 Maret 2024

**Ny.Siswati
Oles tipis-tipis**

OBAT LUAR

		<p>E. <i>Product knowledge</i></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="974 264 1518 679"> <p>Nama Obat : Glucoryl 3 Kandungan : Glimepiride 3 Metformin HCl 500mg Dosis lazim : 1 kali sehari 1 tab Kegunaan : diabetes melitus tipe 2 ESO potensial : hipoglikemia, gangguan pengelihatn sementara, mual, muntah KI : hipersensitif PERHATIAN : Risiko hipoglikomia Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p> </td> <td data-bbox="1518 264 2063 679"> <p>Nama Obat : Glucopage XR 500 Kandungan :Metformin Hidroclorid 500 mg Dosis lazim : 1 kali sehari 1 tab Kegunaan : diabetes ESO potensial : ruam kulit, Anoreksia, mual, muntah, diare KI :hipersensitifitas PERHATIAN :hipersensitivitas Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="974 679 1518 1166"> <p>Nama Obat : Cinolon N Kandungan : Flucinolane Acetonide 0,025% Dosis lazim : oleskan 2-4 kali sehari Kegunaan : dermatitis yang disertai infeksi ESO potensial : iritasi, rasa terbakar, gatal, kekeringan kulit KI : hipersensitivitas PERHATIAN : hindari menggunakan lama pada bayi dan anak- wanita hamil Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p> </td> <td data-bbox="1518 679 2063 1166"> <p>Nama Obat : Sagestam Kandungan : Gentamisin 0,1% Dosis lazim : oleskan 3-4 kali sehari Kegunaan : infeksi kulit primer seperti folikulitis superfisal ESO potensial : iritasi kulit, fotosensitisasi KI : hipersensitivitas PERHATIAN : jika terjadi infeksi harus dihentikan. Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p> </td> </tr> </table>	<p>Nama Obat : Glucoryl 3 Kandungan : Glimepiride 3 Metformin HCl 500mg Dosis lazim : 1 kali sehari 1 tab Kegunaan : diabetes melitus tipe 2 ESO potensial : hipoglikemia, gangguan pengelihatn sementara, mual, muntah KI : hipersensitif PERHATIAN : Risiko hipoglikomia Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>Nama Obat : Glucopage XR 500 Kandungan :Metformin Hidroclorid 500 mg Dosis lazim : 1 kali sehari 1 tab Kegunaan : diabetes ESO potensial : ruam kulit, Anoreksia, mual, muntah, diare KI :hipersensitifitas PERHATIAN :hipersensitivitas Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>Nama Obat : Cinolon N Kandungan : Flucinolane Acetonide 0,025% Dosis lazim : oleskan 2-4 kali sehari Kegunaan : dermatitis yang disertai infeksi ESO potensial : iritasi, rasa terbakar, gatal, kekeringan kulit KI : hipersensitivitas PERHATIAN : hindari menggunakan lama pada bayi dan anak- wanita hamil Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>Nama Obat : Sagestam Kandungan : Gentamisin 0,1% Dosis lazim : oleskan 3-4 kali sehari Kegunaan : infeksi kulit primer seperti folikulitis superfisal ESO potensial : iritasi kulit, fotosensitisasi KI : hipersensitivitas PERHATIAN : jika terjadi infeksi harus dihentikan. Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	
<p>Nama Obat : Glucoryl 3 Kandungan : Glimepiride 3 Metformin HCl 500mg Dosis lazim : 1 kali sehari 1 tab Kegunaan : diabetes melitus tipe 2 ESO potensial : hipoglikemia, gangguan pengelihatn sementara, mual, muntah KI : hipersensitif PERHATIAN : Risiko hipoglikomia Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>Nama Obat : Glucopage XR 500 Kandungan :Metformin Hidroclorid 500 mg Dosis lazim : 1 kali sehari 1 tab Kegunaan : diabetes ESO potensial : ruam kulit, Anoreksia, mual, muntah, diare KI :hipersensitifitas PERHATIAN :hipersensitivitas Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>						
<p>Nama Obat : Cinolon N Kandungan : Flucinolane Acetonide 0,025% Dosis lazim : oleskan 2-4 kali sehari Kegunaan : dermatitis yang disertai infeksi ESO potensial : iritasi, rasa terbakar, gatal, kekeringan kulit KI : hipersensitivitas PERHATIAN : hindari menggunakan lama pada bayi dan anak- wanita hamil Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>Nama Obat : Sagestam Kandungan : Gentamisin 0,1% Dosis lazim : oleskan 3-4 kali sehari Kegunaan : infeksi kulit primer seperti folikulitis superfisal ESO potensial : iritasi kulit, fotosensitisasi KI : hipersensitivitas PERHATIAN : jika terjadi infeksi harus dihentikan. Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>						
		<p>F. Tahap pembuatan</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="974 1238 1518 1423"> <p>Racikan 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siapkan obat yang diperlukan 2. Masukkan obat ke dalam mortir kemudian gerus ad homogen <p>Masukan ke dalam pot salep dan beri etiket</p> </td> <td data-bbox="1518 1238 2063 1423"></td> <td data-bbox="2063 1238 2145 1423"></td> </tr> </table>	<p>Racikan 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siapkan obat yang diperlukan 2. Masukkan obat ke dalam mortir kemudian gerus ad homogen <p>Masukan ke dalam pot salep dan beri etiket</p>				
<p>Racikan 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siapkan obat yang diperlukan 2. Masukkan obat ke dalam mortir kemudian gerus ad homogen <p>Masukan ke dalam pot salep dan beri etiket</p>							

		<p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Atas nama Ny Siswanti. Ini ada 3 macam obat. Yang ini racikan salem untuk iritasi kulit, dioles tipis-tipis dibagian yang sakit. Ini glucoryl 3 untuk diabetes. Diminum 2 kali sehari pagi dan malam, sebelum makan. kemudian ini glugopage Xr untuk diabetes diminum 2 kali, setelah makan. . Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.</p> </div> <p>H. Salinan resep</p>																																	
No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																	
5.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : 1 Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama Pasien :</td> <td style="width: 30%;">Ada/Tidak Ada</td> <td style="width: 40%;">tn. sulistyto</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>R/histrine</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>R/histrine xv (15)</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>R/histrine xv (2 kali sehari)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	tn. sulistyto	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	R/histrine	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	-	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	R/histrine xv (15)	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	R/histrine xv (2 kali sehari)	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	-	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	tn. sulistyto																																	
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-																																	
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-																																	
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	R/histrine																																	
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-																																	
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	-																																	
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	R/histrine xv (15)																																	
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																	
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	R/histrine xv (2 kali sehari)																																	
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	-																																	
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-																																	



Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

-

C. Perhitungan biaya resep

R / histrine	5.800	x 15 = 87.000
TOTAL	= 87.000	

D. ETIKET

Nama Obat/Warna etiket: histrine / putih

		gatal	
APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597			
No. :		TGL. : 09 Maret 2024	
NAMA PASIEN : tn. sulistyio			
..... 2.....X sehari		1..... Tablet / Kapsul / Bungkus	
Sebelum / Sesudah / Bersama makan			
(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)			
		Pagi Siang Sore Malam	

Nama / Jumlah Obat histrine / 15

Tgl. Kadaluarsa

(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)

E. Product knowledge

Nama Obat : histrine

Kandungan : cetirizine hcl 10 mg

Dosis lazim :

> 12 th: 10 mg (1 tablet per hari), anak 6-11 th: 5-10 mg (1/2-1 tablet per hari), anak 2-5 th: 2,5-5 mg (1/4-1/2 tablet per hari)

Kegunaan :

rinitis alergi musiman dan tahunan, urtikaria kronik

ESO potensial :

sakit kepala, pusing, mengantuk, perangsangan emosi, marah, mulut kering, dan rasa tidak enak pada pencernaan (ringan dan sementara).

KI :

-

PERHATIAN :

hipersensitif terhadap cetirizine, hidoksizin atau salah satu komponen, laktasi, hamil trimester 1, penyakit ginjal berat

Cara penyimpanan :

Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung

F. Tahap pembuatan

-

G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

Atas nama tn. Sulistyono, ini obatnya ada 1 macam yakni histrine untuk gatalnya diminum 2 kali sehari. Ada yang ditanyakan kembali?apakah sudah paham? Terimakasih semoga sehat selalu.

		H. Salinan resep																					
No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																					
6.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep :7 Polifarmasi (>)/Tidak Pengulangan resep : Iter/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Raji</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>54 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>R/codikaf Fluimucil Simdrol Telfast R/ Degirol R/ Claneksi tab R/ Benovit C</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>R/codikaf 15mg Fluimucil 1 Simdrol 4mg Telfast 40mg R/ Degirol 0,25mg R/ Claneksi tab R/ Benovit C</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>R/codikaf 15mg Fluimucil 1 Simdrol 4mg Telfast 40mg (12 kapsul) R/ Degirol 0,25mg R/ Claneksi tab R/ Benovit C</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>R/codikaf 15mg (12) Fluimucil 1 (12) Simdrol 4mg (12) Telfast 40mg (8) R/ Degirol 0,25mg (10) R/ Claneksi tab (10)</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Raji	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	54 tahun	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	R/codikaf Fluimucil Simdrol Telfast R/ Degirol R/ Claneksi tab R/ Benovit C	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	R/codikaf 15mg Fluimucil 1 Simdrol 4mg Telfast 40mg R/ Degirol 0,25mg R/ Claneksi tab R/ Benovit C	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	R/codikaf 15mg Fluimucil 1 Simdrol 4mg Telfast 40mg (12 kapsul) R/ Degirol 0,25mg R/ Claneksi tab R/ Benovit C	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	R/codikaf 15mg (12) Fluimucil 1 (12) Simdrol 4mg (12) Telfast 40mg (8) R/ Degirol 0,25mg (10) R/ Claneksi tab (10)
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Raji																					
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	54 tahun																					
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-																					
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	R/codikaf Fluimucil Simdrol Telfast R/ Degirol R/ Claneksi tab R/ Benovit C																					
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	R/codikaf 15mg Fluimucil 1 Simdrol 4mg Telfast 40mg R/ Degirol 0,25mg R/ Claneksi tab R/ Benovit C																					
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	R/codikaf 15mg Fluimucil 1 Simdrol 4mg Telfast 40mg (12 kapsul) R/ Degirol 0,25mg R/ Claneksi tab R/ Benovit C																					
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	R/codikaf 15mg (12) Fluimucil 1 (12) Simdrol 4mg (12) Telfast 40mg (8) R/ Degirol 0,25mg (10) R/ Claneksi tab (10)																					

			R/ Benovit C (10)
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada		R/codikaf 15mg Fluimucil 1 Simdrol 4mg Telfast 40mg (3 kali sehari) R/ Degirol 0,25mg (3 kali sehari) R/ Claneksi tab (3 kali sehari setelah makan dikunyah) R/ Benovit C (1 kali sehari)
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	11 march 2024	
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr.tassya firdausi	
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	446/2076/437.52/2019	
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Klinik PT PLN NP UP Gresik	

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Codikaf 15/15 x 12 = 12
Fluimucil 15/15 x 12 = 12
Simdrol 4/4 x 12 = 12
Telfast 40 / 60 x 12 = 8

C. Perhitungan biaya resep

Racikan 1
codikaf 15mg 7.388 x 12 = 88.656
Fluimucil 1 8.963 x 12 = 107.556
Simdrol 4mg 4.801 x 12 = 57.612
Telfast 40mg 14.970 x 12 = 179.640
Capsul 95 x 12 = 1.140

Degirol 0,25mg 1.570 x 10 = 15.700
Claneksi tab 18.000 x 10 = 180.000
Benovit C 22.306 x 10 = 223.060
TOTAL = Rp. 853.364

D. ETIKET

Nama Obat/Warna etiket: Racikan / putih

 kimia farma APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	Batuk radang
No. : TGL. : 11 Maret 2024	
NAMA PASIEN : Raji	
..... 3.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus Sebelum / Sesudah / Bersama makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)	Pagi Siang Sore Malam
Nama / Jumlah Obat racikan 12 kapsul Tgl. Kadaluarsa	
(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)	

Nama Obat/Warna etiket: degirol 0,25 / putih

 kimia farma APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	dikunyah
No. : TGL. : 11 Maret 2024	
NAMA PASIEN : Raji	
..... 3.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus Sebelum / Sesudah / Bersama makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)	Pagi Siang Sore Malam
Nama / Jumlah Obat degirol 0,25 / 10 Tgl. Kadaluarsa	
(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)	

Nama Obat/Warna etiket: Claneksi tab/ putih

 habiskan
APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597
No. : TGL. : 11 Maret 2024
NAMA PASIEN : Raji
..... 3.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus Sebelum / Sesudah / Bersama makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)
Pagi Siang Sore Malam
Nama / Jumlah Obat claneksi tab / 10 Tgl. Kadaluarsa (hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)

Nama Obat/Warna etiket: benovit c / putih



Vitamin

APOTEK KIMIA FARMA

Jl. Kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK

APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm

SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

No. : TGL. : 11 Maret 2024

NAMA PASIEN : Raji

..... 1.X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus

Sebelum / Sesudah / Bersama makan

(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)

[Pagi](#)[Siang](#)[Sore](#)[Malam](#)Nama / Jumlah Obat **Benovit C / 10**

Tgl. Kadaluarsa

[\(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat\)](#)

E. Product knowledge

Nama Obat : Codikaf

Kandungan : codein 15mg

Dosis lazim :

30-60 mg/hari

Kegunaan :
nyeri sedang hingga parahESO potensial :
sakit kepala, mual, lemas kantuk, susah buang
air kecil, halusinasi, haid tidak teratur

KI :

Nama Obat : fluimucil

Kandungan : n-acetylsistein 200 mg

Dosis lazim :

> 14 th: 2-3x sehari 1 kapsul, 6-14 thn : 2x sehari
1 kapsulKegunaan :
terapi pengencer dahak pada penyakit bronkial
dan paru akut dan kronik dengan dahak yang
tebal, seperti bronkhitis akut, bronkhitis kronik
dan akut berulang, emfisema paruESO potensial :
mual, muntah, diare, radang tenggorokan, pusing,
telinga berdengung, reaksi alergi seperti gatal,

		<p>- PERHATIAN : - Cara penyimpanan : simpan ditempat yang sejuk dan kering, terlindung dari sinar matahari</p>	<p>urtikaria, ruam, sulit bernapas, denyut jantung cepat dan tekanan darah turun KI : - PERHATIAN : hipersensitif terhadap n-acetyl sistein. Pasien dengan diabetes atau diet rendah kalori. Cara penyimpanan : simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>
		<p>Nama Obat : simdrol Kandungan : Methylprednisolone 4 mg. Dosis lazim : Dosis awal 4 - 48 mg/hari dalam 1 - 4 dosis terbagi. Kegunaan : <ul style="list-style-type: none"> • Gangguan endokrin, reumatik dan hematologi. • Kondisi alergi. • Antiinflamasi (anti peradangan) pada berbagai kondisi seperti pada penyakit reumatik, terapi insufisiensi adrenal, terapi pendamping untuk asma. ESO potensial : <ul style="list-style-type: none"> • Gangguan saluran cerna. • Edema. • Diabetes mellitus laten. • Hipertensi. • Supresi sistem imun. KI : - PERHATIAN : <ul style="list-style-type: none"> • Wanita hamil dan menyusui. • Anak-anak. • Lansia. </p>	<p>Nama Obat : telfast Kandungan : fexofenadine HCl Dosis lazim : Dewasa dan anak > 12 thn : 1 x sehari 1 tablet Kegunaan : Menghilangkan gejala alergi seperti rinitis alergi dan urtikaria idiopatik kronik ESO potensial : Menghilangkan gejala alergi seperti rinitis alergi dan urtikaria idiopatik kronik KI : - PERHATIAN : Gangguan ginjal atau hati, lanjut usia, anak < dari 6 tahun, wanita hamil dan menyusui Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.</p>

		<p>Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.</p>	
		<p>Nama Obat : degirol Kandungan : dequalinium chloride Dosis lazim : Obat Degirol dikonsumsi dengan dosis: 1 tablet tiap 3-4 jam, maksimum 8 tablet sehari Kegunaan : sakit tenggorokan, peradangan pada rongga mulut dan tenggorokan, infeksi selaput lendir mulut ESO potensial : - KI : - PERHATIAN : hipersensitivitas komponen Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.</p>	<p>Nama Obat : claneksi tab Kandungan : amoxicilin 500 mg dan asam klavulanat 125 mg Dosis lazim : dewasa : 3 x sehari 1 tablet, anak-anak : 25 mg/kg BB sehari dalam dosis terbagi tiap 8 jam Kegunaan : untuk menyembuhkan infeksi ESO potensial : diare, mual, ruam kulit, muntah, kembung, kandidiasis KI : - PERHATIAN : hipersensitif terhadap penisilin, gangguan fungsi hati Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.</p>
		<p>Nama Obat : benovit c Kandungan : Vitamin B1 50 mg, vitamin B2 25 mg, vitamin B6 10 mg, vitamin B12 5 mcg, vitamin C 500 mg, niacinamide 50 mg, Ca pantothenate 20 mg Dosis lazim : 1 kali sehari 1 tablet Kegunaan : Peningkatan kebutuhan vitamin B kompleks dan vitamin C misalnya pada masa hamil, laktasi, pertumbuhan dan perkembangan, infeksi, ketegangan fisik dan mental ESO potensial : - KI : - PERHATIAN :-</p>	

		<p>Cara penyimpanan : simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>													
		<p>F. Tahap pembuatan</p> <p>Racikan 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siapkan obat yang akan diracik 2. Obat yang sudah di siapkan dibuka dan obat tersebut dimasukan kedalam belender 3. Kemudian obat diayak dan dimasukan kedalam kapsul <p>Lalu kapsul di tutup dan dimasukan ke dalam pot kapsul dan di beri etiket</p> <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Atas nama tn. raji, ini obatnya ada 4 macam, ini 1 racikan untuk batuk radangnya diminum 3 kali sehari., ini degirol diminum3 kali sehari setelah makan dikunya, claneksi tab diminum 3 kali sehari habiskan, ini benovit c untuk vitaminnya diminum 1 kali sehari.Ada yang ditayakan kembali?apakah sudah paham? Terimakasih semoga sehat selalu.</p> <p>H. Salinan resep</p>													
No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep													
7.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="958 1166 1227 1201">Nama Pasien :</td> <td data-bbox="1227 1166 1451 1201">Ada</td> <td data-bbox="1451 1166 1827 1201">Rania</td> </tr> <tr> <td data-bbox="958 1201 1227 1236">Umur pasien :</td> <td data-bbox="1227 1201 1451 1236">Tidak Ada</td> <td data-bbox="1451 1201 1827 1236"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="958 1236 1227 1272">Berat Badan :</td> <td data-bbox="1227 1236 1451 1272">Tidak Ada</td> <td data-bbox="1451 1236 1827 1272"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="958 1272 1227 1414">Nama Obat :</td> <td data-bbox="1227 1272 1451 1414">Ada</td> <td data-bbox="1451 1272 1827 1414">Metronidazole Operma Vometa</td> </tr> </table>		Nama Pasien :	Ada	Rania	Umur pasien :	Tidak Ada		Berat Badan :	Tidak Ada		Nama Obat :	Ada	Metronidazole Operma Vometa
Nama Pasien :	Ada	Rania													
Umur pasien :	Tidak Ada														
Berat Badan :	Tidak Ada														
Nama Obat :	Ada	Metronidazole Operma Vometa													

dr. ALI FAISAL, Sp.A
 SPESIALIS ANAK / PEDIATRICIAN
 SIPD : 446/4268/437.52/2022
 Jl. Panglima Sudirman 22 - 24 GRESIK
 Telp. 031 3983088

11 MAR 2024
 Gresik,

Ri
 Uteri dagh 0.200
 Operma 1/2 tab
 Vometa 3mg
 1300.
 2 Sach 1/2 sach

Panilo.
Pan. Pars Aca

Pro :

Umur :

Alamat :

Obat tsb. tidak boleh diganti tanpa persetujuan dokter

Kekuatan :	Ada	Lacto-B Metronidazole 200mg Operma 1/2 tab Vometa 3mg
Bentuk sed. :	Tidak Ada	Lacto-b
Jumlah obat :	Ada	Metronidazole 200mg Operma 1/2 tab Vometa 3mg Lacto-b 7
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	
Aturan pakai :	Ada	3 x sehari 1bungkus 1 x sehari 1 sach
Tanggal penulisan resep :	Ada	11 Maret 2024
Nama dokter :	Ada	Ali Faisal., Sp.A
Surat ijin :	Ada	SIPD: 446/4268/437.52/2022
Alamat dr. :	Ada	JL. Panglima Sudirman 22- 24 Gresik

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ Metronidazole 200mg/500mg x 15 = 6 tab
Operma 1/2 x 15 = 8 tab
Vometa 3mg/10mg x 15 = 5 tab

R/ Lacto-B = 7 sach

C. Perhitungan biaya resep

Racikan 1
Metronidazole 500mg 6 tab = 3.030
Operma 8 tab = 2.600
Vometa 5 tab = 30.550
Kertas puyer 15 bks = 930
Embalase = 15.000

Lacto-B 7 sach = 58.947
TOTAL = Rp.111.057

D. ETIKET

Nama Obat/Warna etiket: Racikan 1/ putih

 kimia farma	lambung
APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	
No. : TGL. : 11 maret 2024	
NAMA PASIEN : rania	
..... 3X sehari 1 Tablet / Kapsul / Bungkus Sebelum / Sesudah / Bersama makan	Pagi Siang Sore Malam
<small>(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)</small>	
Nama / Jumlah Obat	racikan 15 puyer
Tgl. Kadaluarsa	
<small>(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)</small>	

Nama Obat/Warna etiket: lacto b/ putih

 kimia farma	
APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	
No. : TGL. : 11 maret 2024	
NAMA PASIEN : rania	
..... 1X sehari 1 Tablet / Kapsul / Bungkus Sebelum / Sesudah / Bersama makan	Pagi Siang Sore Malam
<small>(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)</small>	
Nama / Jumlah Obat	lacto b / 7
Tgl. Kadaluarsa	
<small>(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)</small>	

E. *Product knowledge*


Nama Obat : Metronidazole 500mg Kandungan : Metronidazole 500mg Dosis lazim : anak-anak >2 bulan 20-30mg/kg BB Kegunaan : pencegahan infeksi ESO potensial : - KI : hipersensitif metronidazole PERHATIAN : harus dengan resep dokter Cara penyimpanan : suhu ruang	Nama Obat : Operma tab Kandungan : cyproheptadin 4mg Dosis lazim : 2-5 th 1mg 3-4x sehari Kegunaan : alergi ESO potensial : mengantuk KI : - PERHATIAN : mengantuk Cara penyimpanan : suhu ruang
Nama Obat : vometa tab Kandungan : domperidone 10mg Dosis lazim : anak <12 th 0,25mg/kg BB 3x sehari Kegunaan : mual, muntah ESO potensial : - KI : - PERHATIAN : - Cara penyimpanan : suhu ruang	Nama Obat : lacto b Kandungan : bakteri Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, dan Streptococcus thermophilus Dosis lazim : 3 sach/ hari Kegunaan : probiotik ESO potensial : - KI : - PERHATIAN : - Cara penyimpanan : simpan di tempat sejuk

F. Tahap pembuatan

1. Metronidazole, operma, vometa digerus menggunakan blender obat ad halus dan homogen
2. Bagi serbuk menjadi 15 bungkus
3. Masukkan kedalam plastik klip
4. Beri etiket putih

		<p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Atas nama anak rania. Mohon maaf ibu dengannya siapanya pasien. Baik dengan ibunya ya. Saya jelaskan mengenai obatnya ibu 1 obat racikan ini untuk obat mual muntah'nya diminum 3x sehari sesudah makan ya ibu minta tolong dihabiskan karena ini ada antibakterinya. Yg ini lacto-b untuk memperbaiki sistem pencernaannya diminum sehari 1x saja boleh dicampur dengan susu tapi susunya air biasa saja ya ibu tidak boleh panas, dingin atau hangat juga tidak boleh. Ada yang ditanyakan lagi ibu ?. baik terimakasih semoga sehat selalu</p> <p>H. Salinan resep</p>																											
No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																											
8.	Jenis Resep : Salinan/ Resep asli Resep obat : Racikan /non racikan Jumlah obat dalam resep : 1 Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Lusia maria</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>R/ boraginol s oint</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>R/ boraginol s oint (salep)</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>R/ boraginol s oint (1)</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>R/ boraginol s oint (2 kali sehari sesuai kebutuhan)</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Lusia maria	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	R/ boraginol s oint	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	R/ boraginol s oint (salep)	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	R/ boraginol s oint (1)	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	R/ boraginol s oint (2 kali sehari sesuai kebutuhan)
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Lusia maria																											
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-																											
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-																											
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	R/ boraginol s oint																											
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-																											
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	R/ boraginol s oint (salep)																											
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	R/ boraginol s oint (1)																											
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																											
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	R/ boraginol s oint (2 kali sehari sesuai kebutuhan)																											

Tempel Resep/salin resep disini!



Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	03-02- 2024
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. dono m,sp.b
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

-

C. Perhitungan biaya resep

R/ boraginol s oint 1 = 142.300
 TOTAL Rp. 142.300

D. ETIKET

Nama Obat/Warna etiket: boraginol s oint/ biru

kimia farma
 APOTEK KIMIA FARMA
 Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
 APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm
 SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

03 feb 2024

Ny.lusia maria
Oles sesuai kebutuhan

OBAT LUAR

E. *Product knowledge*

Nama Obat : boraginol s oint
Kandungan : lithospermi radix ekstrak,
prednisolonum, lidocainum, aethylis
aminobenzoas, cetrimide
Dosis lazim : oleskan kira-kira 2-5 gram
salep pada kasa dan ditutupkan pada tempat
radang, ganti 2-3 kali sehari
Kegunaan : wasir bagian luar dan dalam,
disertai pendarahan, anal prolapse, anal
fistula, periproctitis, luka terbuka pada dubur,
perineal serta rasa gatal pada dubur
ESO potensial : -
KI : -
PERHATIAN : -
Cara penyimpanan : suhu ruang

F. Tahap pembuatan


G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

Atas nama lusia maria. Ini obatnya ada 1 salep untuk wasir dioleskan 2 kali sehari sesuai kebutuhan. Apa ada yang ditanyakan lagi? Terimakasih semoga sehat selalu.

H. Salinan resep

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep					
9.	Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="958 1378 2107 1414"> <tr> <td data-bbox="958 1378 1227 1414">Nama Pasien :</td> <td data-bbox="1227 1378 1451 1414">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1451 1378 2107 1414">Sumaryati</td> </tr> </table>			Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Sumaryati
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Sumaryati					

Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak
 Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter
 Tempel Resep/salin resep disini!



Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	48 tahun
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	R/ cendo cenfresh eye drop
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	R/ cendo cenfresh eye drop (tetes mata)
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	R/ cendo cenfresh eye drop (1)
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	R/ cendo cenfresh eye drop (3 kali sehari 1 tetes pada mata kanan dan kiri)
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	03-02-2024
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. bambang tuharijanto
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	-


B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

C. Perhitungan biaya resep

R/ cendo cenfresh eye drop 1x 50.875
 TOTAL = Rp. 50.875

D. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : cendo cenfresh eye drop/ biru




E. *Product knowledge*

Nama Obat : cendo cenfresh eye drop
Kandungan : Carmellose sodium 5mg
Dosis lazim : 1-2 tetes pada mata yang sakit
3-4 kali sehari atau sesuai kebutuhan
Kegunaan : mengurangi iritasi pada mata kering. Melindungi mata terhadap iritasi lebih lanjut, mengurangi rasa tidak nyaman karena iritasi ringan, terkena angin dan sinar matahari
ESO potensial : -
KI : -
PERHATIAN : -
Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung

F. Tahap pembuatan

-	
---	--

		<p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Atas nama Ny.sumaryati. ini ada obat tetes mata. Diteteskan 3 kali sehari di mata kanan dan kiri ya bu. Sudah bisa dipahami?, ada yang ditanyakan?, terimakasih semoga sehat selalu</p> <p>H. Salinan resep</p>																											
No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																											
10.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : 1 Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ny. Leny wahyuni</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>R/episan suspensi syr R/ comtusi syr R/ Becom zet tab</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>R/episan suspensi syr (sirup) R/ comtusi syr (sirup) R/ Becom zet tab (tablet)</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>R/episan suspensi syr (1) R/ comtusi syr (1) R/ Becom zet tab(10)</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>R/episan suspensi syr (sehari 2 kali 2sendok teh) R/ comtusi syr(3 kali sehari) R/ Becom zet tab (1 kali sehari)</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ny. Leny wahyuni	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	R/episan suspensi syr R/ comtusi syr R/ Becom zet tab	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	R/episan suspensi syr (sirup) R/ comtusi syr (sirup) R/ Becom zet tab (tablet)	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	R/episan suspensi syr (1) R/ comtusi syr (1) R/ Becom zet tab(10)	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	R/episan suspensi syr (sehari 2 kali 2sendok teh) R/ comtusi syr(3 kali sehari) R/ Becom zet tab (1 kali sehari)
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ny. Leny wahyuni																											
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-																											
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-																											
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	R/episan suspensi syr R/ comtusi syr R/ Becom zet tab																											
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-																											
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	R/episan suspensi syr (sirup) R/ comtusi syr (sirup) R/ Becom zet tab (tablet)																											
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	R/episan suspensi syr (1) R/ comtusi syr (1) R/ Becom zet tab(10)																											
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																											
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	R/episan suspensi syr (sehari 2 kali 2sendok teh) R/ comtusi syr(3 kali sehari) R/ Becom zet tab (1 kali sehari)																											



Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	08-03-24
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

-

C. Perhitungan biaya resep

R / episan suspensi syr 1x 58.900 = 58.900
R/ comtusi syr 1x 54.100 = 54.100
R/ Becom zet tab 10x 3000 = 30.000
TOTAL = Rp.143.000

D. ETIKET

Nama Obat/Warna etiket: episan suspense syr / putih

 LAMBUNG APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	Tgl.08-03-2024 No. R/ Ny.leni wahyuni 2.th
--	---

SEHARI :2..... X2..... SENDOK
 Sebelum / *Sesudah makan*

[TEH](#)
[BUBUR](#)
[MAKAN](#)

KOCOK DULU

Nama Obat/Warna etiket: comtusi syr / putih

kimia farma APOTEK KIMIA FARMA
 Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
 APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm
 SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

Tgl.08-03-2024 No. R/
 Ny.leni wahyuni
 2.th

SEHARI :3..... X1..... SENDOK
 Sebelum / *Sesudah makan*

[TEH](#)
[BUBUR](#)
[MAKAN](#)

KOCOK DULU

kimia farma **Vitamin**
 APOTEK KIMIA FARMA
 Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
 APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm
 SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

No. : TGL. : 8 Maret 2024
 NAMA PASIEN : ny. Leni wahyuni

..... 1.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus
 Sebelum / *Sesudah / Bersama makan*

[Pagi](#)
[Siang](#)
[Sore](#)
[Malam](#)


Nama / Jumlah Obat Becom zet / 10
 Tgl. Kadaluaarsa
 (hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)

Nama Obat/Warna etiket:
 becom zet / putih

E. *Product knowledge*

<p>Nama Obat : episan suspense syr Kandungan : sucralfate 500mg/5ml Dosis lazim : 4 kali sehari 2 sendok takar (10ml) Kegunaan : terapi jangka pendek tukak duodenum (hingga 8 minggu). ESO potensial : konstipasi, mulut kering, diare, pruritus (gatal ruam), ruam kulit, mengantuk, vertigo, nyeri punggung, sakit kepala. KI : - PERHATIAN : pasien dengan gangguan ginjal dan menjalani dialisis. berikan selang waktu 1/2 jam dengan pemberian antasida. ibu hamil dan menyusui, anak. Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>Nama Obat : comtusi syr Kandungan : oxomemazine 1,65 mg dan guaafenesin 33,3 mg Dosis lazim : berat badan > 40 kg (>12 thn) : 4 x sehari 10 ml Kegunaan : untuk meringankan gejala batuk karena alergi, batuk berdahak ESO potensial : mengantuk, pusing, sakit kepala, mual, muntah, diare KI : PERHATIAN : hipersensitivitas komponen Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>
<p>Nama Obat : becom zet Kandungan : Vitamin E 30 IU, Vitamin B1 15mg, Vit B2 15mg, Vit B6 20 mg, Vit B12 mcg, Asam Pantotenate 20mg, Niasin 100 mg, Vit C 750 mg, Zinc 22,5mg. Dosis lazim : 1 x sehari 1 kaplet Kegunaan : Becom Zet untuk apa? defisiensi vitamin B kompleks, Vitamin C, Vitamin E, Zinc. ESO potensial : - KI : - PERHATIAN : - Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	

			<p>F. Tahap pembuatan</p> <p>-</p> <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Atas nama ny. Lani ini ada 3 macam obat. Ini episan sirup untuk lambung diminum 2 kali 2 sendok teh sebelum makan. Comtusi sirup 3 kali sehari sebelum makan dan becom zet untuk vitamin 1 kali sehari ya. Ada yang ditanyakan ?. terimakasih semoga sehat selalu.</p> <p>H. Salinan resep</p>																																							
No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																								
11.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli</p> <p>Resep obat : Racikan/non racikan</p> <p>Jumlah obat dalam resep :1</p> <p>Polifarmasi (>/Tidak</p> <p>Pengulangan resep : Iter/Neiter</p> <p>Tempel Resep/salin resep disini!</p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tn. Agus</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>R/ lipitor</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>R/ lipitor 20mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>R/ lipitor 20mg (15)</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>R/ lipitor 20mg (1 kali sehari malam)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>28 -02- 2024</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Dr. Zulvia untari</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> </table>		Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Tn. Agus	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada		Berat Badan :	Ada/Tidak Ada		Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	R/ lipitor	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	R/ lipitor 20mg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada		Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	R/ lipitor 20mg (15)	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	R/ lipitor 20mg (1 kali sehari malam)	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	28 -02- 2024	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Zulvia untari	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	-
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Tn. Agus																																								
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada																																									
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada																																									
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	R/ lipitor																																								
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	R/ lipitor 20mg																																								
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada																																									
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	R/ lipitor 20mg (15)																																								
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																								
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	R/ lipitor 20mg (1 kali sehari malam)																																								
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	28 -02- 2024																																								
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Zulvia untari																																								
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																								
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	-																																								



B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

-

C. Perhitungan biaya resep

R/ lipitor 20mg x 15 Rp. 667.625
 TOTAL Rp. 667.625

D. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Lipitor 20mg/ putih


		(kolesterol)
APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597		
No. :		TGL : 28 Februari 2024
NAMA PASIEN : Tn. Agus		
..... 1.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus		Pagi
Sebelum / Sesudah / Bersama makan		Siang
(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)		Sore
Nama / Jumlah Obat lipitor / 15		Malam
Tgl. Kadaluarsa		
<small>(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)</small>		

E. Product knowledge

Nama Obat : Lipitor 20mg Kandungan : Actovastatin Calium Trihydrate 20 mg	
--	--

		<p>Dosis lazim : 1 kali sehari Kegunaan : menurunkan kolestrol total, kolestrol LDL ESO potensial : konstipasi, sakit kepala, mual, diare, sakit perut, dispepsia, perut kembung, hepatitis KI : hipersensitif, Penyakit hati aktif atau peningkatan serum transaminase PERHATIAN : wanita hamil dan kemungkinan hamil Cara penyimpanan : simpan ditempat yang sejuk dan kering, terlindung dari sinar matahari</p>							
		<p>F. Tahap pembuatan</p> <p>-</p>							
		<p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Atas nama Tn. Agus. Ini obatnya lipitor 20mg untuk kolestrol diminum 1 kali sehari malam, setelah makan Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.</p>							
		<p>H. Salinan resep</p>							
No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep							
12.	Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : 1	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="958 1350 2107 1422"> <tr> <td data-bbox="958 1350 1227 1386">Nama Pasien :</td> <td data-bbox="1227 1350 1451 1386">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1451 1350 2107 1386">tn tomi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="958 1386 1227 1422">Umur pasien :</td> <td data-bbox="1227 1386 1451 1422">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1451 1386 2107 1422">-</td> </tr> </table>		Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	tn tomi	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	tn tomi							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-							

Polifarmasi (>/Tidak
 Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter
 Tempel Resep/salin resep disini!



Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	R/mucosta
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	-
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	R/mucosta No.xx(20)
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	R/mucosta No.xx S 2 dd 1 (2 kali sehari)
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	13-03-2024
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. nuri susanti
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

C. Perhitungan biaya resep

Mucosta 20 tablet = 129.820
TOTAL 129.820

D. ETIKET

Nama Obat/Warna etiket: mucosta / putih

 APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597
No. : TGL : 13 maret 2024
NAMA PASIEN : Tn. tomi
..... 2.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus <u>Sebelum / Sesudah / Bersama makan</u> <small>(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)</small>
Pagi Siang Sore Malam
Nama / Jumlah Obat mucosta /20 Tgl. Kadaluarsa
<small>(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)</small>


E. *Product knowledge*

Nama Obat : Mucosta tablet
Kandungan : Rebamipide 100mg
Dosis lazim : 3 x sehari 1 tablet
Kegunaan : maag, tukak lambung
ESO potensial : reaksi hipersensitivitas
KI : Hipersensitivitas, hamil,
menyusui
PERHATIAN : harus dengan resep dokter
(hamil, menyusui, lanjut usia)
Cara penyimpanan : suhu ruang

F. Tahap pembuatan

-

		<p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>atas nama Tomi. Obatnya 1 macam saja ya bapak. Obat lambung minumnya 2 x sehari 1 tablet (tiap 12 jam sekali), bisa dikonsumsi sesudah atau sebelum makan bapak tidak ada masalah. Apa sudah paham ?. ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu</p> </div> <p>H. Salinan resep</p>																																							
No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
13.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : 2 Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="958 584 2110 1327"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Nn . Brilianti Qori</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>R/ mefinal R/ Cataflam</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>R/mefinal 500mg R/ Cataflam 50 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>R/ mefinal 500mg (10) R/ Cataflam 50 (10)</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>R/ mefinal 500mg (3 kali sehari) R/ Cataflam 50 (2 kali sehari)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>26 Februari 2024</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Dr. zulvia untari</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Nn . Brilianti Qori	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	R/ mefinal R/ Cataflam	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	R/mefinal 500mg R/ Cataflam 50 mg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	-	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	R/ mefinal 500mg (10) R/ Cataflam 50 (10)	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	R/ mefinal 500mg (3 kali sehari) R/ Cataflam 50 (2 kali sehari)	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	26 Februari 2024	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. zulvia untari	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	-
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Nn . Brilianti Qori																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	R/ mefinal R/ Cataflam																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	R/mefinal 500mg R/ Cataflam 50 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	R/ mefinal 500mg (10) R/ Cataflam 50 (10)																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	R/ mefinal 500mg (3 kali sehari) R/ Cataflam 50 (2 kali sehari)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	26 Februari 2024																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. zulvia untari																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	-																																							



B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

-

C. Perhitungan biaya resep

R/ mefinal 500mg	x 10	Rp. 86.480
R/ Cataflam 50 mg	x 10	Rp. 84.290
TOTAL		Rp. 170.770

D. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : mefinal 500/putih

kimia farma

APOTEK KIMIA FARMA
 Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
 APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm
 SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

No. : TGL. : 26 Februari 2024

NAMA PASIEN : Nn. Brilianti

..... 3X sehari 1 Tablet / ~~Kapsul~~ / ~~Bungkus~~ Pagi
~~Sebelum~~ / ~~Sesudah~~ / ~~Bersama~~ makan Siang
(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak) Sore
Malam

Nama / Jumlah Obat **Mefinal 500 /10**

Tgl. Kadaluarasa

(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)

Nama Obat/ waran etiket : Cataflam 50mg



APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	
No. : TGL : 26 Februari 2024	
NAMA PASIEN : Nn. Brilianti	
..... 2X sehari 1 Tablet / Kapsul / Bungkus Sebelum / Sesudah / Bersama makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)	Pagi Siang Sore Malam
Nama / Jumlah Obat Tgl. Kadaluarsa	Cataflam 50 /10
(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)	


E. *Product knowledge*

Nama Obat : Mefinal 500 mg Kandungan : Asam mefenamat 500 mg Dosis lazim : 3x500 mg Kegunaan : mengatasi nyeri ESO potensial : mual, muntah KI : hipersensitivitas PERHATIAN : tukak GI atau penyakit inflamasi pada saluran cerna atas atau bawah Cara penyimpanan : Suhu di bawah 30 °C	Nama Obat : Cataflam 50 mg Kandungan : kalium diklofenak 50 Dosis lazim : 3 kali sehari 1 tab Kegunaan : mengurangi rasa sakit dan pembekakann(inflamasi), OA (osteoarthritis) dan spondilitis ankilosa ESO potensial : sakit kepala pusing, vertigo, mual, muntah, riare, sakit perut, ruam KI : hipersensitivitas, pasien yang pernah mengalami asma PERHATIAN : penyakit hipertensi, rentasi cairan atau gagal jantung dapat mengganggu saat mengemudi kendaraan Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung
--	--

F. Tahap pembuatan

-

		<p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Atas nama Nn. Berlianti Qori. Ini ada 2 macam obat. Ini mefinal untuk nyeri, diminum 3 kali sehari setelah makan. ini cataflan untuk mengurangi rasa sakit, diminum 2 kali sehari, setelah makan. Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.</p> <p>H. Salinan resep</p>																																							
No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
14.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ghani naufal</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>R/ cefila</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>R/ cefila 100mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>R/ cefila 100mg (12 puyer)</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>R/ cefila 100mg (2 kali sehari)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>12-02-24</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Drg . adella limanjaya</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td></td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ghani naufal	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	R/ cefila	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	R/ cefila 100mg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	R/ cefila 100mg (12 puyer)	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	-	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	R/ cefila 100mg (2 kali sehari)	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	12-02-24	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Drg . adella limanjaya	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada		Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ghani naufal																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	R/ cefila																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	R/ cefila 100mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	R/ cefila 100mg (12 puyer)																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	R/ cefila 100mg (2 kali sehari)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	12-02-24																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Drg . adella limanjaya																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada																																								
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada																																								



B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ cefila 100mg/100 x 12= 12 tab

C. Perhitungan biaya resep

Racikan 1
 R/ cefila 100mg x 12 = 346.080
 Kertas puyer x 12 = 744
 Embalase 15.000
TOTAL Rp. 361.824

D. ETIKET

Nama Obat/Warna etiket: racikan / putih

 APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	
No. : TGL. : 12 feb 2024	
NAMA PASIEN : ghani naufal	
..... 2 X sehari 1 Tablet / Kapsul / Bungkus Sebelum / Sesudah / Bersama makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)	Pagi Siang Sore Malam
Nama / Jumlah Obat racikan 12 puyer Tgl. Kadaluarsa	
(hubung apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)	

E. *Product knowledge*

Nama Obat : cefila

Kandungan : Cefixime Trihydrate 100 mg.

Dosis lazim : Dewasa dan anak dengan BB lebih dari 30kg : 50-100 mg, oral dua kali sehari. Bisa ditingkatkan hingga 200mg 2x/hari untuk kondisi parah atau infeksi yang sulit disembuhkan. - Anak : 10-15 mg/kg bb/hari selama 2 pekan

Kegunaan : Cefila 100 MG bisa mengobati infeksi saluran kencing tak terkomplikasi, otitis media, faringitis, tonsilitis, bronkitis akut, dan eksaserbasi akut dari bronkitis kronik.

ESO potensial : Hipersensitivitas, gangguan Gastrointestinal & pernapasan, syok, gangguan fungsi ginjal, granulositopenia atau eosinofilia, stomatitis, kandidiasis, defisiensi vit K.


KI : -

PERHATIAN :

- Wanita hamil dan menyusui.
- Anak-anak.
- Bayi baru lahir.

Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung

		<p>F. Tahap pembuatan</p> <table border="1" data-bbox="958 229 2132 419"> <tr> <td data-bbox="958 229 1946 419"> <p>Racikan 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. cefila digerus menggunakan blender obat ad halus dan homogen 2. Bagi serbuk menjadi 12 bungkus 3. Masukkan kedalam plastik klip 4. Beri etiket putih </td> <td data-bbox="1946 229 2132 419"></td> </tr> </table> <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <table border="1" data-bbox="958 523 2132 596"> <tr> <td data-bbox="958 523 2132 596"> <p>Atas nama ghani ini ada 1 racikan 12 puyer diminum 2 kali sehari setelah makan. Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.</p> </td> </tr> </table> <p>H. Salinan resep</p>	<p>Racikan 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. cefila digerus menggunakan blender obat ad halus dan homogen 2. Bagi serbuk menjadi 12 bungkus 3. Masukkan kedalam plastik klip 4. Beri etiket putih 		<p>Atas nama ghani ini ada 1 racikan 12 puyer diminum 2 kali sehari setelah makan. Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.</p>																		
<p>Racikan 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. cefila digerus menggunakan blender obat ad halus dan homogen 2. Bagi serbuk menjadi 12 bungkus 3. Masukkan kedalam plastik klip 4. Beri etiket putih 																							
<p>Atas nama ghani ini ada 1 racikan 12 puyer diminum 2 kali sehari setelah makan. Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.</p>																							
No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																					
15.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : 4 Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="958 911 1827 1406"> <tr> <td data-bbox="958 911 1227 951">Nama Pasien :</td> <td data-bbox="1227 911 1451 951">Ada / tidak ada</td> <td data-bbox="1451 911 1827 951">Tn. Didik P</td> </tr> <tr> <td data-bbox="958 951 1227 991">Umur pasien :</td> <td data-bbox="1227 951 1451 991">Ada / Tidak Ada</td> <td data-bbox="1451 951 1827 991">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="958 991 1227 1031">Berat Badan :</td> <td data-bbox="1227 991 1451 1031">Ada / Tidak Ada</td> <td data-bbox="1451 991 1827 1031">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="958 1031 1227 1158">Nama Obat :</td> <td data-bbox="1227 1031 1451 1158">Ada / tidak ada</td> <td data-bbox="1451 1031 1827 1158">Ezetrol Cardio Aspirin Uperio Clopidogrel</td> </tr> <tr> <td data-bbox="958 1158 1227 1302">Kekuatan :</td> <td data-bbox="1227 1158 1451 1302">Ada / tidak ada</td> <td data-bbox="1451 1158 1827 1302">Ezetrol 10mg Cardio Aspirin 100mg Uperio 50mg Clopidogrel 75mg</td> </tr> <tr> <td data-bbox="958 1302 1227 1342">Bentuk sed. :</td> <td data-bbox="1227 1302 1451 1342">Tidak Ada</td> <td data-bbox="1451 1302 1827 1342">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="958 1342 1227 1406">Jumlah obat :</td> <td data-bbox="1227 1342 1451 1406">Ada / tidak ada</td> <td data-bbox="1451 1342 1827 1406">Ezetrol 10mg (30) Cardio Aspirin 100mg (30)</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada / tidak ada	Tn. Didik P	Umur pasien :	Ada / Tidak Ada	-	Berat Badan :	Ada / Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada / tidak ada	Ezetrol Cardio Aspirin Uperio Clopidogrel	Kekuatan :	Ada / tidak ada	Ezetrol 10mg Cardio Aspirin 100mg Uperio 50mg Clopidogrel 75mg	Bentuk sed. :	Tidak Ada	-	Jumlah obat :	Ada / tidak ada	Ezetrol 10mg (30) Cardio Aspirin 100mg (30)
Nama Pasien :	Ada / tidak ada	Tn. Didik P																					
Umur pasien :	Ada / Tidak Ada	-																					
Berat Badan :	Ada / Tidak Ada	-																					
Nama Obat :	Ada / tidak ada	Ezetrol Cardio Aspirin Uperio Clopidogrel																					
Kekuatan :	Ada / tidak ada	Ezetrol 10mg Cardio Aspirin 100mg Uperio 50mg Clopidogrel 75mg																					
Bentuk sed. :	Tidak Ada	-																					
Jumlah obat :	Ada / tidak ada	Ezetrol 10mg (30) Cardio Aspirin 100mg (30)																					



		Uperio 50mg (30) Clopidogrel 75mg (30)
Duplikasi terapi :	Ada / Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada / Tidak Ada	Ezetrol 10mg (1x1 malam) Cardio Aspirin 100mg (1x1 malam) Uperio 50mg (1x1 pagi) Clopidogrel 75mg (1x1 pagi)
Tanggal penulisan resep :	Ada / tidak ada	8/1/2024
Nama dokter :	Ada / tidak ada	Dr. Iswanto P
Surat ijin :	Ada / Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Ada / Tidak Ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Ezetrol 10mg 30 tab
 Cardio Aspirin 100mg 30 tab
 Uperio 50mg 30 tab
 Clopidogrel 75mg 30 tab

C. Perhitungan biaya resep

Ezetrol 10mg 30 tab = 801.270
 Cardio Aspirin 100mg 30 tab = 82.470
 Uperio 50mg 30 tab = 665.640
 Clopidogrel 75mg 30 tab = 27.570
 TOTAL

D. ETIKET



APOTEK KIMIA FARMA

Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm
SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

No. : TGL. : 08 jan 2024

NAMA PASIEN : tn. Didik

..... 1.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus
Sebelum / Sesudah / Bersama makan
(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)

[Pagi](#)
[Siang](#)
[Sore](#)
[Malam](#)

Nama / Jumlah Obat ezetrol /30
Tgl. Kadaluarsa

(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)



APOTEK KIMIA FARMA

Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm
SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

No. : TGL. : 08 jan 2024

NAMA PASIEN : tn. Didik

..... 1.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus
Sebelum / Sesudah / Bersama makan
(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)

[Pagi](#)
[Siang](#)
[Sore](#)
[Malam](#)

Nama / Jumlah Obat cardio aspirin/30
Tgl. Kadaluarsa

(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)



APOTEK KIMIA FARMA

Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm
SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597


No. : TGL. : 08 jan 2024

NAMA PASIEN : tn. Didik

		<p>..... 1.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus Sebelum / Sesudah / Bersama makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)</p>	<p>Pagi Siang Sore Malam</p>	
		<p>Nama / Jumlah Obat uperio /30 Tgl. Kadaluarsa</p>		
		<p>(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)</p>		
		<p>kimia farma APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597</p>		
		<p>No. : TGL. : 08 jan 2024</p>		
		<p>NAMA PASIEN : tn. Didik</p>		
		<p>..... 1.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus Sebelum / Sesudah / Bersama makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)</p>	<p>Pagi Siang Sore Malam</p>	
		<p>Nama / Jumlah Obat clopidogrel /30 Tgl. Kadaluarsa</p>		
		<p>(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)</p>		
		E. Product knowledge		
		<p>Nama Obat : Ezetrol 10mg Kandungan : Ezetimibe 10mg Dosis lazim : 10mg/hari Kegunaan : Hiperkolesterolemia ESO potensial : nyeri oto, mual KI : hipersensitif ezetimide PERHATIAN : -</p>	<p>Nama Obat : Cardio Aspirin 100mg Kandungan : Acetylsalicylic Acid 100mg Dosis lazim : 300mg/hari Kegunaan : Mencegah pembekuan darah ESO potensial : pendarahan saluran cerna, mual muntah</p>	

		<p>Cara penyimpanan : suhu ruang</p> <p>Nama Obat : Uperio 50mg Kandungan : Sacubitril 24.3 mg, valsartan 25.7 mg Dosis lazim : 1x sehari Kegunaan : Melebarkan pembuluh darah ESO potensial : hiperkalemia, hipotensi, KI : PERHATIAN : - Cara penyimpanan : suhu ruang</p>	<p>KI : hipersensitif aspirin PERHATIAN : Cara penyimpanan : suhu ruang</p> <p>Nama Obat : Clopidogrel 75mg Kandungan : Clopidogrel 75mg Dosis lazim : 1 x sehari Kegunaan : Mencegah trombosit ESO potensial : pusing, sembelit, muntah KI : hipersensitif clopidogrel PERHATIAN : - Cara penyimpanan : suhu ruang</p>	
<p>F. Tahap pembuatan</p> <div style="border: 1px solid black; width: 300px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto;"> <p>Atas nama bapak Didik. Dapat 4 obat ya bapak untuk kolesterol semua. Yang pertama ada Ezetrol 10mg diminum 1x sehari malam hari, yang kedua Cardio Aspirin 100mg diminum 1x sehari malam hari, yang ketiga Uperio 50mg 1x sehari pagi hari, yang keempat clopidogrel 75mg 1x sehari pagi hari. Semuanya dapat 30 tablet ya pak (untuk 1 bulan). Dusahakan minum dijam yang sama misal obat yang diminum pagi jam 7 berarti seterusnya juga harus sama jam 7 pagi juga, yang obat malam misal diminum jam 9 malam berarti seterusnya juga harus jam 9 malam ya bapak agar kerja obatnya efektif. Apa sudah paham bapak ? Ada yang ditanyakan lagi ?. Terimakasih semoga sehat selalu.</p> </div> <p>H. Salinan resep</p>				
No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep		
16.	Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan	A. Skrinning Administrasi		

Jumlah obat dalam resep : 2
 Polifarmasi (>/Tidak
 Pengulangan resep : Iter/Neiter
 Tempel Resep/salin resep disini!



Nama Pasien :	Ada / Tidak ada	Ferry R
Umur pasien :	Ada / Tidak ada	-
Berat Badan :	Ada / Tidak ada	-
Nama Obat :	Ada / Tidak ada	R/ Antasida doen R/ alpara
Bentuk sed. :	Ada / Tidak ada	-
Jumlah obat :	Ada / Tidak ada	R/ Antasida doen (10) R/ alpara (10)
Duplikasi terapi :	Ada / Tidak ada	-
Aturan pakai :	Ada / Tidak ada	R/ Antasida doen (3 kali sehari) R/ alpara (3 kali sehari)
Tanggal penulisan resep :	Ada / Tidak ada	22 Februari 2024
Nama dokter :	Ada / Tidak ada	HN
Surat ijin :	Ada / Tidak ada	-
Alamat dr. :	Ada / Tidak ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

--	--

C. Perhitungan biaya resep

Antasida doen	x 10	Rp. 2.500
alpara	x 10	Rp. 10.900
TOTAL		Rp. 13.400

D. ETIKET

Nama Obat/Warna etiket: antasida doen / putih



APOTEK KIMIA FARMA

Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK

APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm

SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

No. : TGL : 22 Februari 2024

NAMA PASIEN : Tn. Ferry R

..... 3.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus

Sebelum / Sesudah / Bersama makan

(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)

[Pagi](#)

[Siang](#)

[Sore](#)

[Malam](#)

Nama / Jumlah Obat antasida doen / 10 (MAAG)

Tgl. Kadaluarsa

(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)

Nama Obat/Warna etiket: alpara / putih



APOTEK KIMIA FARMA

Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK

APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm

SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

No. : TGL : 22 Februari 2024

NAMA PASIEN : Tn. Ferry R

..... 3.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus

Sebelum / Sesudah / Bersama makan

(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)

[Pagi](#)

[Siang](#)

[Sore](#)

[Malam](#)

Nama / Jumlah Obat Alpara / 10 (BAPILNAS)

Tgl. Kadaluarsa

(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)

E. *Product knowledge*

Nama Obat : Antasida Doen
Kandungan : Aluminium Hydrozide 200mg, Magnesium Hydroxide 200mg
Dosis lazim : 3-4 kali sehari 1-2 tab
Kegunaan : sakit maag
ESO potensial : Nyeri perut, konstipasi, diare, mual, muntah
KI : disfungsi ginjal berat, hipersensitif.
PERHATIAN : hamil dan laktasi
Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung

Nama Obat : Alpara
Kandungan : paracetamol 500mg, phenypropanolamine HCl 12,5mg, chloropinamine meleate 2mg, dextromethorphan HBr 15mg
Dosis lazim : 3 kali sehari 1 tab
Kegunaan : meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat dan bersin-bersin yang disertai batuk
ESO potensial : mengantuk, gangguan pencernaan, gangguan psikomotorik, takikardia.
KI : gangguan jantung dan diabetes
PERHATIAN : tidak boleh saat mengendarai kendaraan, gangguan fungsi hati dan ginjal
Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung

F. Tahap pembuatan


-

G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

Atas nama Ferry. Ini ada 2 macam obatnya. Ini Antasida doen untuk sakit maag, diminum 3 kali sehari sebelum makan. ini alpara untuk bapilnas, diminum 3 kali sehari sesudah makan. Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.

H. Salinan resep

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																				
17.	Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : 3 Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!	<p style="text-align: center;">A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="958 403 2022 1121"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada / Tidak ada</td> <td>Tn. Rofiul amin</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada / Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada / Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada / Tidak ada</td> <td>R/ simprazole R/ inpepsa susp</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada / Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada / Tidak ada</td> <td>R/ simprazole (10) R/ inpepsa susp (1)</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada / Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada / Tidak ada</td> <td>R/ simprazole (2 kali sehari, pagi dan malam sebelum makan) R/ inpepsa susp (3 kali 1 sendok takar sebelum makan)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada / Tidak ada</td> <td>28-02-24</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada / Tidak ada</td> <td>Dr. tresnaningsih</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada / Tidak ada</td> <td>446/1866/437.52/2023</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada / Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; width: 460px; height: 20px; margin: 0 auto; text-align: center;">-</div> <p style="text-align: center;">C. Perhitungan biaya resep</p>	Nama Pasien :	Ada / Tidak ada	Tn. Rofiul amin	Umur pasien :	Ada / Tidak ada	-	Berat Badan :	Ada / Tidak ada	-	Nama Obat :	Ada / Tidak ada	R/ simprazole R/ inpepsa susp	Bentuk sed. :	Ada / Tidak ada	-	Jumlah obat :	Ada / Tidak ada	R/ simprazole (10) R/ inpepsa susp (1)	Duplikasi terapi :	Ada / Tidak ada	-	Aturan pakai :	Ada / Tidak ada	R/ simprazole (2 kali sehari, pagi dan malam sebelum makan) R/ inpepsa susp (3 kali 1 sendok takar sebelum makan)	Tanggal penulisan resep :	Ada / Tidak ada	28-02-24	Nama dokter :	Ada / Tidak ada	Dr. tresnaningsih	Surat ijin :	Ada / Tidak ada	446/1866/437.52/2023	Alamat dr. :	Ada / Tidak ada	-
Nama Pasien :	Ada / Tidak ada	Tn. Rofiul amin																																				
Umur pasien :	Ada / Tidak ada	-																																				
Berat Badan :	Ada / Tidak ada	-																																				
Nama Obat :	Ada / Tidak ada	R/ simprazole R/ inpepsa susp																																				
Bentuk sed. :	Ada / Tidak ada	-																																				
Jumlah obat :	Ada / Tidak ada	R/ simprazole (10) R/ inpepsa susp (1)																																				
Duplikasi terapi :	Ada / Tidak ada	-																																				
Aturan pakai :	Ada / Tidak ada	R/ simprazole (2 kali sehari, pagi dan malam sebelum makan) R/ inpepsa susp (3 kali 1 sendok takar sebelum makan)																																				
Tanggal penulisan resep :	Ada / Tidak ada	28-02-24																																				
Nama dokter :	Ada / Tidak ada	Dr. tresnaningsih																																				
Surat ijin :	Ada / Tidak ada	446/1866/437.52/2023																																				
Alamat dr. :	Ada / Tidak ada	-																																				



Simprazole x 10 = 50.000
 inpepsa susp x 1 = 142.000
 TOTAL = Rp.192.000

D. ETIKET

Nama Obat/Warna etiket: simprazole/ putih

		lambung	
APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597			
No. :		TGL. : 28-02- 2024	
NAMA PASIEN : tn. Rafiul amin			
..... 2.....X sehari		1.....Tablet / Kapsul / Bungkus	
Sebelum / Sesudah / Bersama makan		Pagi Siang Sore Malam	
(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)			
Nama / Jumlah Obat		simprazole /10	
Tgl. Kadaluarsa			
(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)			

Nama Obat/Warna etiket: inpepsa syr/ putih

		Inpepsa	
APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597			
Tgl.28-02-2024		No. R/ tn.rofiul amin	
		2.th	
SEHARI :3..... X1..... SENDOK		TEH BUBUK	

Sebelum / Sesudah makan

MAKAN

KOCOK DULU

E. *Product knowledge*

Nama Obat : simprazole
Kandungan : Esomeprazol 40mg
Dosis lazim : 1 kali sehari 40 mg atau sesuai petunjuk dokter.
Kegunaan : Penyakit refluks gastroesofageal kombinasi dengan anti bakteri yang cocok untuk eradikasi helicobacter pylori dan penyembuhan yang berhubungan dengan tukak duodenum.
ESO potensial : Sakit kepala, nyeri perut, diare, kembung, mual, muntah, konstipasi.
KI : -
PERHATIAN : Hipersensitif terhadap substansi aktif esomeprazol, jangan diberikan bersama atazanavir. Cara penyimpanan : suhu ruang

Nama Obat : inpepsa syr
Kandungan : sukralfat 500mg
Dosis lazim : 4 x sehari 2 sendok takar (10 ml)
Kegunaan : tukak duodenum dan lambung, gastritis kronik
ESO potensial : susah buang air besar, mulut kering
KI : -
PERHATIAN : -
Cara penyimpanan : suhu ruang

F. Tahap pembuatan

G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

		<p>Atas nama rofiul amin, ini obatnya ada 2 macam simprazole diminum 2 kali sehari sebelum makan pagi dan malam sedangkan ini inepesa syr diminum 3 kali sehari sebelum makan. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Terimakasih semoga sehat selalu</p> <p>H. Salinan resep</p>																																							
No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
18.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : 2 Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Mira Rosita sari</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>29 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>R/ lantafit R/ vasedon</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>R/ laktafit (30) R/ vasedon (30)</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>R/ laktafit (3 kali sehari 1 tablet) R/ vasedon (3 kali sehari 2 tablet)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>15-02- 2024</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Nur lailatul fadhilah,dr.sp.og</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <p>-</p>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Mira Rosita sari	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	29 tahun	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	R/ lantafit R/ vasedon	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	-	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	R/ laktafit (30) R/ vasedon (30)	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	R/ laktafit (3 kali sehari 1 tablet) R/ vasedon (3 kali sehari 2 tablet)	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	15-02- 2024	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Nur lailatul fadhilah,dr.sp.og	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	-
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Mira Rosita sari																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	29 tahun																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	R/ lantafit R/ vasedon																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	R/ laktafit (30) R/ vasedon (30)																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	R/ laktafit (3 kali sehari 1 tablet) R/ vasedon (3 kali sehari 2 tablet)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	15-02- 2024																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Nur lailatul fadhilah,dr.sp.og																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	-																																							



C. Perhitungan biaya resep

Laktafit	x 30	= 135.000
Vasodon	x 30	= 105.000
TOTAL		Rp. 240.000

D. ETIKET

Nama Obat/Warna etiket: laktafit/ putih

kimia farma
APOTEK KIMIA FARMA
 Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
 APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm
 SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

No. : TGL. : 15-02- 2024
NAMA PASIEN : mira rosita

..... 3X sehari 1**Tablet / Kapsul / Bungkus**
 Sebelum / Sesudah / Bersama makan
 (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)

[Pagi](#)
[Siang](#)
[Sore](#)
[Malam](#)

Nama / Jumlah Obat **laktafit / 30**
 Tgl. Kadaluarsa

(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)

kimia farma
APOTEK KIMIA FARMA
 Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
 APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm
 SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

No. : TGL. : 15-02- 2024
NAMA PASIEN : mira rosita

..... 3 ..X sehari 2**Tablet / Kapsul / Bungkus**
 Sebelum / Sesudah / Bersama makan
 (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)


[Pagi](#)
[Siang](#)
[Sore](#)
[Malam](#)

Nama / Jumlah Obat	vasedon /30
Tgl. Kadaluarsa	
(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)	

E. *Product knowledge*

<p>Nama Obat : laktafit Kandungan : Placenta extr 15 mg, vitamin B12 20mcg, Ca phosphate dibasic 12mg Dosis lazim : 3 x sehari 1 tablet selama masa menyusui Kegunaan : Hipogalaktia (air susu sedikit) ESO potensial : - KI : - PERHATIAN : - Cara penyimpanan : suhu ruang</p>	<p>Nama Obat : vasedon Kandungan Domperidone Dosis lazim : Dispepsia fungsional Dewasa 10 mg 3x/hari. Mual dan muntah Dewasa 10-20 mg 3-4 x/hari. Anak 0.25 mg/kgBB 3 x/hari. Kegunaan : mengurangi gejala mual dan muntah pada keadaan akut yang disebabkan pemberian obat levodopa atau bromokriptin, pada anak setelah kemoterapi kanker atau iradiasi dan juga pengobatan gejala dispepsia fungsional. ESO potensial : Muka merah dan reaksi alergi lain, reaksi distonik akut. KI : - PERHATIAN : Dosis dikurangi pada pasien gagal ginjal. Timbul efek</p>
--	--

		<p>ekstrapiramidal bila diberikan bersama obat lain. Jangan diberikan pada bayi, wanita hamil & laktasi. Tidak direkomendasikan untuk penggunaan lama. Gangguan hati. Cara penyimpanan : suhu ruang</p> <p>F. Tahap pembuatan -</p> <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Atas nama mira Rosita , ini ada 2 macam obat . laktafit dan vasedon. Untuk laktafit 3 kali sehari 1 tablet sedangkan vasedon 3 kali sehari 1 tablet. Ada yang ditanyakan ? terimakasih semoga sehat selalu</p> <p>H. Salinan resep</p>																									
No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																									
19.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : 3 Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="958 898 1827 1358"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Ny. Endang</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Lapiva 20/5 Vesicare Celebrax 100</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>Lapiva 80/5 (30) Vesicare (30) Celebrax 100 (20)</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>Lapiva 80/5 (1 kali sehari, setelah makan)</td> </tr> </table>		Nama Pasien :	Ada	Ny. Endang	Umur pasien :	Tidak ada	-	Berat Badan :	Tidak ada	-	Nama Obat :	Ada	Lapiva 20/5 Vesicare Celebrax 100	Bentuk sed. :	Tidak ada	-	Jumlah obat :	Ada	Lapiva 80/5 (30) Vesicare (30) Celebrax 100 (20)	Duplikasi terapi :	Tidak ada	-	Aturan pakai :	Ada	Lapiva 80/5 (1 kali sehari, setelah makan)
Nama Pasien :	Ada	Ny. Endang																									
Umur pasien :	Tidak ada	-																									
Berat Badan :	Tidak ada	-																									
Nama Obat :	Ada	Lapiva 20/5 Vesicare Celebrax 100																									
Bentuk sed. :	Tidak ada	-																									
Jumlah obat :	Ada	Lapiva 80/5 (30) Vesicare (30) Celebrax 100 (20)																									
Duplikasi terapi :	Tidak ada	-																									
Aturan pakai :	Ada	Lapiva 80/5 (1 kali sehari, setelah makan)																									



		Vesicare (2 kali sehari, setelah makan) Celebrax 100 (2 kali sehari setelah makan)
Tanggal penulisan resep :	Ada	04 Maret 2024
Nama dokter :	Ada	-
Surat ijin :	Ada	-
Alamat dr. :	Tidak ada	

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

-

C. Perhitungan biaya resep

Lapiva 80/5	x 30	Rp. 510.000
Vesicare	x 30	Rp. 898.200
Celebrax 100	x 20	Rp. 312.280
TOTAL TRANSAKSI		Rp. 1.720.480

D. ETIKET

kimia farma
APOTEK KIMIA FARMA
 Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
 APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm
 SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

No. : TGL : 04 Maret 2024

NAMA PASIEN : Ny. Endang

..... 1.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus
 Sebelum / Sesudah / Bersama makan

(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)

Pagi
Siang
Sore
Malam

Nama / Jumlah Obat Lapiva/30 (hipertensi)

Tgl. Kadaluaarsa

(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)



APOTEK KIMIA FARMA

Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK

APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm

SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

No. : TGL : 04 Maret 2024

NAMA PASIEN : Ny. Endang

..... 2.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus
Sebelum / Sesudah / Bersama makan

(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)

[Pagi](#)

[Siang](#)

[Sore](#)

[Malam](#)

Nama / Jumlah Obat Vesicare/ 30 (pipis- pipis)

Tgl. Kadaluaarsa

(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)



APOTEK KIMIA FARMA

Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK

APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm

SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

No. : TGL : 04 Maret 2024

NAMA PASIEN : Ny. Endang

..... 2.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus
Sebelum / Sesudah / Bersama makan

(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)

[Pagi](#)

[Siang](#)

[Sore](#)

[Malam](#)

Nama / Jumlah Obat celebrex/ 20 (pipis- pipis)


Tgl. Kadaluaarsa

(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)

E. Product knowledge

		<p>Nama Obat : Lapiva 80/5 Kandungan : Amplodipin 5mg, valsartan 80mg Dosis lazim : 1 kali 1 tab Kegunaan : hipertensi atau tekanan darah ESO potensial : pusing, mual, sakit kepala, batuk KI : diabetes melitus tipe II, gangguan hati berat, ibu hamil PERHATIAN : gangguan ginjal, gangguan hati, wanita hamil, dan ibu menyusui. Cara penyimpanan : simpan ditempat yang sejuk dan kering, terlindung dari sinar matahari</p>	<p>Nama Obat : Vesicare Kandungan : Solivenaxcin Succinate 5mg Dosis lazim : 1kali sehari 2 tablet Kegunaan : trapi sistemik inkontinensia urin (BAK/ buang air kecil tidak terkontrol) ESO potensial : mulut kering, konstipasi, mual, dispepsia, nyeri perut KI : retensi urin, gangguan gastrointestinal (saluran cerna) berat, gangguan ginjal berat, gangguan hati sedang atau berat PERHATIAN : obstruksi aliran keluar kandung kemih yang signifikan, wanita hamil dan menyusui. Cara penyimpanan : simpan ditempat yang sejuk dan kering, terlindung dari sinar matahari</p>
		<p>Nama Obat : celebrex 100 Kandungan : celecosib 100mg Dosis lazim : 2 kali sehari Kegunaan : osteoarthritis, nyeri aku, nyeri haid,, membantu mengurangi rasa sakit dan pembengkakan ESO potensial : nyeri abdomen, diare, dispepsia, kembung, mual, nyeri pungung, memperburuk hipertensi KI : hipersensitivitas, penyakit inflamasi usus, kehamilan, menyusui PERHATIAN : pasien dengan riwayat komplikasi gastointestinal (misalnya ulserasi dan peradangan), hipertensi, diabetes.</p>	

		<p>Cara penyimpanan : simpan ditempat yang sejuk dan kering, terlindung dari sinar matahari</p> <p>F. Tahap pembuatan</p> <p>-</p> <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Atas nama Ny. Endang. Ini ada 3 obat. Ini Lapiva untuk hipertensi, diminum 1 kali sehari setelah makan, ini Vesicare untuk pipis-pipis, diminum 2 kali sehari setelah makan, kemudian yang ini celebrex untuk nyeri lutut, diminum 2 kali sehari setelah makan. Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu</p> <p>H. Salinan resep</p>																																	
No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																	
20.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : 2 Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Tn.M. Syafi'i</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada</td> <td>52 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Bisoprolol 5mg Amlodipipin 5 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>Bisoprolol 5mg (30) Amlodipipin 5 mg(30)</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>Bisoprolol 5mg (pagi hari) Amlodipipin 5 mg (malam hari)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada</td> <td>07 Februari 2024</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada</td> <td>-</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Tn.M. Syafi'i	Umur pasien :	Ada	52 tahun	Berat Badan :	Tidak ada	-	Nama Obat :	Ada	Bisoprolol 5mg Amlodipipin 5 mg	Bentuk sed. :	Tidak ada	-	Jumlah obat :	Ada	Bisoprolol 5mg (30) Amlodipipin 5 mg(30)	Duplikasi terapi :	Tidak ada	-	Aturan pakai :	Ada	Bisoprolol 5mg (pagi hari) Amlodipipin 5 mg (malam hari)	Tanggal penulisan resep :	Ada	07 Februari 2024	Nama dokter :	Ada	-	Surat ijin :	Ada	-
Nama Pasien :	Ada	Tn.M. Syafi'i																																	
Umur pasien :	Ada	52 tahun																																	
Berat Badan :	Tidak ada	-																																	
Nama Obat :	Ada	Bisoprolol 5mg Amlodipipin 5 mg																																	
Bentuk sed. :	Tidak ada	-																																	
Jumlah obat :	Ada	Bisoprolol 5mg (30) Amlodipipin 5 mg(30)																																	
Duplikasi terapi :	Tidak ada	-																																	
Aturan pakai :	Ada	Bisoprolol 5mg (pagi hari) Amlodipipin 5 mg (malam hari)																																	
Tanggal penulisan resep :	Ada	07 Februari 2024																																	
Nama dokter :	Ada	-																																	
Surat ijin :	Ada	-																																	



Alamat dr. : ada -

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

-

C. Perhitungan biaya resep

Bisoprolol 5 mg	x 30	Rp. 12.900
Amlodipin 5 mg	x 30	Rp. 6.600
TOTAL		Rp. 19.500

D. ETIKET

kimia farma
APOTEK KIMIA FARMA
 Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
 APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm
 SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

No. : TGL : 7 Februari 2024

NAMA PASIEN : Tn M. Syafi'i

..... 1.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus
 Sebelum / Sesudah / Bersama makan
 (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)

Nama / Jumlah Obat Bisoprolol 5 mg / 30 (tensi)
 Tgl. Kadaluarsa

(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)



APOTEK KIMIA FARMA

Jl. Kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK

APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm

SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

No. : TGL : 7 Februari 2024

NAMA PASIEN : Tn M. Syafi'i

..... 1.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus

Sebelum / Sesudah / Bersama makan

(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)

[Pagi](#)

[Siang](#)

[Sore](#)

[Malam](#)

Nama / Jumlah Obat amlodipin 5 mg / 30 (tensi)

Tgl. Kadaluarsa

(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)

E. Product knowledge

Nama Obat : Bisoprolol 5 mg Fa
 Kandungan : Bisoprolol 5 mg
 Dosis lazim : 5-10 mg/hari
 Kegunaan : hipertensi, angina, gagal jantung kronik, bronkospastik, gangguan hati
 ESO potensial : kram, abdomen, diare, pusing, sakit kepala, mual, denyut jantung lambat, tekanan darah rendah.
 KI :hipersensitif, gagal jantung akut atau selama episode dekomposisi gagal jantung yang memerlukan terapi intravena intropik
 PERHATIAN : bronkospasme (asma bronkial, penyakit saluran nafas obstuktif).
 Cara penyimpanan : simpan ditempat yang sejuk dan kering, terlindung dari sinar matahari

Nama Obat : Amlodipin 5mg
 Kandungan : Amlodipin 5 mg
 Dosis lazim : 1 kali sehari 5mg
 Kegunaan :hipertensi
 ESO potensial : sakit kepala, pusing, mengantuk, debaran jantung
 KI : hipersensitif
 PERHATIAN : gagal jantung, kehamilan dan laktasi
 Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung

F. Tahap pembuatan

		-																														
		<p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Atas nama Tn. M. Syafi'i. Ini ada 2 macam obat. Yang ini bisoprolol diminum pagi setelah maka. Ini amlodipin digunakan untuk tensi diminum malam setelah makan. . Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.</p> <p>H. Salinan resep</p>																														
No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																														
21.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter .../Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Tn.Mukdiyono</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada</td> <td>61 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Amlodipipin 10 mg Candesartan 8mg Bisoprolol 5mg Cpg 75mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>Amlodipipin 10 mg (30) Candesartan 8mg (30) Bisoprolol 5mg (30) Cpg 75mg (30)</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>Amlodipipin 10 mg (pagi hari) Candesartan 8mg (malam hari) Bisoprolol 5mg (pagi hari) Cpg 75mg (satu kali sehar</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada</td> <td>01-03- 2024</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada</td> <td>Dr. wijaya</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Tn.Mukdiyono	Umur pasien :	Ada	61 tahun	Berat Badan :	Tidak ada	-	Nama Obat :	Ada	Amlodipipin 10 mg Candesartan 8mg Bisoprolol 5mg Cpg 75mg	Bentuk sed. :	Tidak ada	-	Jumlah obat :	Ada	Amlodipipin 10 mg (30) Candesartan 8mg (30) Bisoprolol 5mg (30) Cpg 75mg (30)	Duplikasi terapi :	Tidak ada	-	Aturan pakai :	Ada	Amlodipipin 10 mg (pagi hari) Candesartan 8mg (malam hari) Bisoprolol 5mg (pagi hari) Cpg 75mg (satu kali sehar	Tanggal penulisan resep :	Ada	01-03- 2024	Nama dokter :	Ada	Dr. wijaya
Nama Pasien :	Ada	Tn.Mukdiyono																														
Umur pasien :	Ada	61 tahun																														
Berat Badan :	Tidak ada	-																														
Nama Obat :	Ada	Amlodipipin 10 mg Candesartan 8mg Bisoprolol 5mg Cpg 75mg																														
Bentuk sed. :	Tidak ada	-																														
Jumlah obat :	Ada	Amlodipipin 10 mg (30) Candesartan 8mg (30) Bisoprolol 5mg (30) Cpg 75mg (30)																														
Duplikasi terapi :	Tidak ada	-																														
Aturan pakai :	Ada	Amlodipipin 10 mg (pagi hari) Candesartan 8mg (malam hari) Bisoprolol 5mg (pagi hari) Cpg 75mg (satu kali sehar																														
Tanggal penulisan resep :	Ada	01-03- 2024																														
Nama dokter :	Ada	Dr. wijaya																														



Surat ijin :	Ada	19690604 2014062
Alamat dr. :	ada	Puskesmas alun-alun

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

C. Perhitungan biaya resep

Amlodipipin 10 mg (30)	=60.000
Candesartan 8mg (30)	= 120.000
Bisoprolol 5mg (30)	= 30.000
Cpg 75mg (30)	= 81.000
TOTAL	Rp. 291.000

D. ETIKET

 APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	Hipertensi
No. : TGL. : 1 Maret 2021 NAMA PASIEN : tn.mukdiyono	
..... 1.X sehari 1..... Tablet /Kapsul /Bungkus Sebelum / Sesudah / Bersama makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)	
<u>Pagi</u> Siang <u>Sore</u> Malam	
Nama / Jumlah Obat amlodipine 10/30 Tgl. Kadaluarsa	
(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)	



antiHipertensi

APOTEK KIMIA FARMA

Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK

APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm

SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

No. : TGL. : 1 Maret 2021

NAMA PASIEN : tn.mukdiyono

..... 1.....X sehari 1..... Tablet /Kapsul / Bungkus

Sebelum / Sesudah / Bersama makan

(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)

Pagi

~~Siang~~

Sore

Malam

Nama / Jumlah Obat

candesartan 8/30


Tgl. Kadaluarsa

(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)

			<p>kimia farma Tensi</p> <p>APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597</p> <p>No. : TGL : 1 Maret 2021 NAMA PASIEN : tn.mukdiyono</p> <p>..... 1.....X sehari 1..... Tablet /Kapsul /Bungkus Sebelum / Sesudah / Bersama makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)</p> <p style="text-align: right;">Pagu Siang Sore <u>Malam</u></p> <p>Nama / Jumlah Obat Bisoprolol 5/30 Tgl. Kadaluarsa (hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)</p>			
			<p>kimia farma Hipertensi</p> <p>APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597</p> <p>No. : TGL : 1 Maret 2021 NAMA PASIEN : tn.mukdiyono</p> <p>..... 1.....X sehari 1..... Tablet /Kapsul /Bungkus Sebelum / Sesudah / Bersama makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)</p> <p style="text-align: right;">Pagu Siang Sore <u>Malam</u></p> <p>Nama / Jumlah Obat CPG 75/30 Tgl. Kadaluarsa (hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)</p>			
		<p>E. Product knowledge</p> <table border="1" data-bbox="898 1230 2123 1402"> <tr> <td data-bbox="898 1230 1469 1402"> Nama Obat : amlodipine 10mg Kandungan : amlodipine 10mg Dosis lazim : 5mg 1 x sehari maksimal 10mg/hari Kegunaan : untuk hipertensi dan angina </td> <td data-bbox="1469 1230 1995 1402"> Nama Obat : candesartan 8mg Kandungan : candesrtan 8mg Dosis lazim : dosis awal 4mg/hari, maksimal 16mg/hari. Efek </td> <td data-bbox="1995 1230 2123 1402"></td> </tr> </table>	Nama Obat : amlodipine 10mg Kandungan : amlodipine 10mg Dosis lazim : 5mg 1 x sehari maksimal 10mg/hari Kegunaan : untuk hipertensi dan angina	Nama Obat : candesartan 8mg Kandungan : candesrtan 8mg Dosis lazim : dosis awal 4mg/hari, maksimal 16mg/hari. Efek		
Nama Obat : amlodipine 10mg Kandungan : amlodipine 10mg Dosis lazim : 5mg 1 x sehari maksimal 10mg/hari Kegunaan : untuk hipertensi dan angina	Nama Obat : candesartan 8mg Kandungan : candesrtan 8mg Dosis lazim : dosis awal 4mg/hari, maksimal 16mg/hari. Efek					

		<p>ESO potensial : sakit kepala, edema, kelelahan yang menyeluruh, mual, rasa panas & kemerahan pada wajah, pusing KI : - PERHATIAN : hipersensitivitas Cara penyimpanan : simpan ditempat yang sejuk dan kering, terlindung dari sinar matahari</p>	<p>antihipertensi maksimal dicapai dalam waktu 4 minggu setelah pengobatan Kegunaan : hipertensi, pengobatan pada pasien gagal jantung dan gangguan fungsi sistolik ventrikel kiri ketika obat penghambat ACE tidak ditolerir ESO potensial : back pain, pusing, infeksi saluran pernafasan atas, faringitis, rinitis KI : - PERHATIAN : hipersensitif terhadap komponen, wanita hamil, menyusui, gangguan hati berat dan/atau kolestasia Cara penyimpanan : simpan ditempat yang sejuk dan kering, terlindung dari sinar matahari</p>	
		<p>Nama Obat : bisoprolol 5mg Kandungan : Bisoprolol 5 mg Dosis lazim : 5-10 mg/hari Kegunaan : hipertensi, angina, gagal jantung kronik, bronkospastik, gangguan hati ESO potensial : kram, abdomen, diare, pusing, sakit kepala, mual, denyut jantung lambat, tekanan darah rendah. KI : hipersensitif, gagal jantung akut atau selama episode dekomposisi gagal jantung yang memerlukan terapi intravena intropik PERHATIAN : bronkospasme (asma bronkial, penyakit saluran nafas obstruktif).</p>	<p>Nama Obat : CPG 75 Kandungan : clopidrogel 75 mg Dosis lazim : 1 x sehari 1 tablet Kegunaan : mengurangi kejadian aterosklerotik pada pasien dengan riwayat aterosklerotik oleh stroke, infark miokard, atau penyakit arteri perifer ESO potensial : sakit kepala, pusing, paresthesia, gangguan gastrointestinal & hematologikal, ruam, pruritus KI : - PERHATIAN : hipersensitifitas terhadap komponen, perdarahan aktif, ulkus peptikum, menyusui, gangguan hati berat</p>	

		<p>Cara penyimpanan : simpan ditempat yang sejuk dan kering, terlindung dari sinar matahari</p>	<p>Cara penyimpanan : simpan ditempat yang sejuk dan kering, terlindung dari sinar matahari</p>																						
		<p>F. Tahap pembuatan</p> <p>-</p> <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Atas nama tn.mukdiyono ini ada 4 macam obat. Amlodipine diminum pagi hari, candesartan diminum malam hari, bisoprolol diminum pagi hari dan cpg diminum 1 kali sehari. Ada yang ditanyakan kembali? Terimakasih semoga sehat selalu</p> <p>H. Salinan resep</p>																							
<p>No</p>	<p>Resep</p>	<p>Tahapan Pengerjaan Resep</p>																							
<p>22.</p>	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : 2 Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Ny. Nur uatil latifah</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Votaren gel Minyak cap kapak</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>Votaren gel (1) Minyak cap kapak (1)</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> </table>			Nama Pasien :	Ada	Ny. Nur uatil latifah	Umur pasien :	Tidak Ada	-	Berat Badan :	Tidak ada	-	Nama Obat :	Ada	Votaren gel Minyak cap kapak	Bentuk sed. :	Tidak ada	-	Jumlah obat :	Ada	Votaren gel (1) Minyak cap kapak (1)	Duplikasi terapi :	Tidak ada	-
Nama Pasien :	Ada	Ny. Nur uatil latifah																							
Umur pasien :	Tidak Ada	-																							
Berat Badan :	Tidak ada	-																							
Nama Obat :	Ada	Votaren gel Minyak cap kapak																							
Bentuk sed. :	Tidak ada	-																							
Jumlah obat :	Ada	Votaren gel (1) Minyak cap kapak (1)																							
Duplikasi terapi :	Tidak ada	-																							



Aturan pakai :	Ada	Votaren gel (pemakaian luar) Minyak cap kapak (pemakaian luar)
Tanggal penulisan resep :	Ada	29-02-24
Nama dokter :	Tidak Ada	-
Surat ijin :	Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Tidak ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

-

C. Perhitungan biaya resep

Votaren gel (1)	= 41.000
Minyak cap kapak (1)	= 81.000
TOTAL	Rp. 122.000

D. ETIKET

Voltaren gel

kimia farma
APOTEK KIMIA FARMA
 Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
 APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm
 SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

29 feb 2024

Ny.nur
 Pemakaian luar

OBAT LUAR



Minyak cap kapak

APOTEK KIMIA FARMA

Jl. Kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK

APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm

SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

29 feb 2024


Ny.nur
Pemakaian luar

OBAT LUAR

E. *Product knowledge*

<p>Nama Obat : voltaren gel Kandungan : diclofenac diethylammon 0,1% Dosis lazim : 3-4 kali perhari Kegunaan : inflamasi traumatik pada tendon, ligamen otot, persendian, salah urat, terkilir, memar. Reumatik jaringan lunak yang terlokalisir : tendovaginitis, bursitis. Periartropati. Penyakit reumatik (osteoarthritis pada sendi perifer dan vertebral) ESO potensial : dermatitis kontak alergi atau non alergik, ruam kulit, reaksi hipersensitivitas dan fotosensitivitas KI : asma, urtikaria, rinitis akut yang ditimbulkan oleh salisilat atau obat AINS lainnya</p>	<p>Nama Obat : minyak cap kapak Kandungan : menthol crystal 20%, eucalyptus oil 15% methyl salicylate 15%, camphor 5%, essestiol oil 12% Dosis lazim : Dioleskan pada bagian yang sakit Kegunaan : membantu meredakan sakit kepala, muntah dalam perjalanan, pilek, encok, dan keseleo ESO potensial : - KI : balita PERHATIAN : tidak digunakan untuk anak dibawah usia 2 tahun dan langsung digunakan di bawah lubang hidung. Hanya digunakan untuk pemakaian luar saja. Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>
---	---

		<p>PERHATIAN : asma, urtikaria, rinitis akut yang ditimbulkan oleh salisilat atau obat AINS lainnya Cara penyimpanan : simpan ditempat yang sejuk dan kering, terlindung dari sinar matahari</p>																			
		<p>F. Tahap pembuatan</p> <p>-</p>																			
		<p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p>																			
		<p>Atas nama ny nur ini ada 2 macam obat. Voltaren gel dan minyak cap kapak. Ini untuk pemakaian luar ya bu. Ada yang ditanyakan. Terimakasih. Semoga sehat selalu</p>																			
		<p>H. Salinan resep</p>																			
<p>No</p>	<p>Resep</p>	<p>Tahapan Pengerjaan Resep</p>																			
<p>23.</p>	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : 3 Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>ismadi</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Sporacid Loratadin Formyco salep</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>ada</td> <td>Sporacid Loratadin (15 kapsul) Formyco salep</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>Sporacid Loratadin (15 kapsul)</td> </tr> </table>		Nama Pasien :	Ada	ismadi	Umur pasien :	Ada	67	Berat Badan :	Tidak ada	-	Nama Obat :	Ada	Sporacid Loratadin Formyco salep	Bentuk sed. :	ada	Sporacid Loratadin (15 kapsul) Formyco salep	Jumlah obat :	Ada	Sporacid Loratadin (15 kapsul)
Nama Pasien :	Ada	ismadi																			
Umur pasien :	Ada	67																			
Berat Badan :	Tidak ada	-																			
Nama Obat :	Ada	Sporacid Loratadin Formyco salep																			
Bentuk sed. :	ada	Sporacid Loratadin (15 kapsul) Formyco salep																			
Jumlah obat :	Ada	Sporacid Loratadin (15 kapsul)																			



Duplikasi terapi :	Tidak ada	Formyco salep (1)
Aturan pakai :	Ada	Sporacid Loratadin (3 kali sehari) Formyco salep (pemakaian luar)
Tanggal penulisan resep :	Ada	-
Nama dokter :	Ada	Dr. zulvia untari
Surat ijin :	Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Tidak ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

<p>Racikan 1 Sporacid 1x15 = 15 tab Loratadin 1x15 = 15 tab</p>

C. Perhitungan biaya resep

<p>Racikan 1 Sporacid x 15 = 405.000 Loratadin x 15 = 7500 Kapsul x15 = 1.425 Embalase = 15.000 Formyco salep = 28.000 TOTAL Rp. 456.925</p>

D. ETIKET

Nama Obat/Warna etiket: Amoxsan/ putih



APOTEK KIMIA FARMA

Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm
SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

No. : TGL : 02 Maret 2024

NAMA PASIEN : ismadi

..... 3 X sehari 1 Tablet / Kapsul / Bungkus
Sebelum / Sesudah / Bersama makan
(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)

Pagi
Siang
Sore
Malam

Nama / Jumlah Obat racikan 15 kapsul

Tgl. Kadaluarsa

(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)



APOTEK KIMIA FARMA

Formyco

Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm
SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

2 maret 2024

Tn. Ismadi
Pemakaian luar

OBAT LUAR


E. Product knowledge

Nama Obat : sporacid
Kandungan : Itraconazole
Dosis lazim : Kandidosis vulvovag : 2 kali sehari selama 1 hari 2 kapsul atau 1 kali sehari selama 3 hari 2 kapsul. Profilaksis kandidosis vulvovag berulang : 2 kapsul terbagi dosis tunggal. Berikan tiap bulan pada hari pertama menstruasi. Kandidosis oral : 1

Nama Obat : loratadine
Kandungan : Loratadine 10 mg.
Dosis lazim : • Kondisi alergi
Dewasa: 10 mg sekali sehari atau 5 mg dua kali sehari.
Anak: 2-12 tahun 30 kg: 10 mg 1x/hari.
> 12 tahun sama dengan dosis dewasa.

		<p>kapsul per hari selama 15 hari. Tinea kruris atau korporis : 1 kali sehari 1 kapsul. Tinea pedis atau manum : 1 kali sehari selama 30 hari 1 kapsul. Tinea kapitis : 1 kali sehari selama 4 sampai 8 minggu 1 kapsul. Onikomikosis : 1 kali sehari selama 3 sampai 6 bulan 1 kapsul. Pitiriasis versikolor : 1 kali sehari selama 5 sampai 7 hari 2 kapsul. Keratitis fungal : 1 kali sehari selama 3 minggu 2 kapsul. Mikosis sistemik atau dalam : 1 kali sehari 2 kapsul, dapat ditingkatkan menjadi 2 kali sehari 2 kapsul</p> <p>Kegunaan : Kandidosis vulvovag, Profilaksis kandidosis vulvovag berulang. Berikan tiap bulan pada hari pertama menstruasi. Kandidosis oral . Tinea kruris atau korporisl. Tinea pedis atau manum. Tinea kapitis. pitiriasis versikolor. Mikosis sistemik atau dalam</p> <p>ESO potensial : Gangguan gastrointestinal, sakit kepala, pruritus, ruam, urtikaria</p> <p>KI :</p> <p>PERHATIAN : Laktasi, Anak, Gangguan Lanjut</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>Kegunaan : Alergi dan Sistem Imun</p> <p>ESO potensial : Sakit kepala, mengantuk, kelelahan, gugup.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gangguan gastrointestinal: Mulut kering, nyeri perut, mual, muntah, diare, gastritis. • Gangguan metabolisme dan nutrisi: Nafsu makan meningkat. <p>KI :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wanita hamil dan menyusui. • Anak-anak. <p>PERHATIAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wanita hamil dan menyusui. • Anak-anak. <p>Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	
		<p>Nama Obat :formyco salep</p> <p>Kandungan : Ketokonazol 200mg</p> <p>Dosis lazim : dioleskan tipis 2x sehari selama 4 minggu.</p> <p>Kegunaan : Mengatasi: 1. Tinea corporis / kurap pada badan 2. Tinea curis / kurap pada lipat paha 3. Panu (Tinea versicolor) 4. Kutu air tetapi pada tangan (Tinea manus) 5. Kutu</p>		

		<p>air (Tinea pedis) 6. Kandidiasis kulit 7. Dermatitis seboroik ESO potensial : iritasi dan rasa terbakar KI : - PERHATIAN : - Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>																			
		<p>F. Tahap pembuatan -</p>																			
		<p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p>																			
			<p>Atas nama tn. Ismadi . ini ada 2 obat. Ini 1 racikan 15 kapsul diminum 3 kali sehari sesudah makan. Ini formyco salep untuk pemakaian luar ya pak. Ada yang ditanyakan lagi? Terimakasih semoga sehat selalu.</p>																		
		<p>H. Salinan resep</p>																			
No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																			
24.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Ny. Aleeya</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada</td> <td>2 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Tremenza syr 60 ml R/ Proris suspensi 60 ml R/ Apialys syr</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Tidak ada</td> <td>R/ Tremenza syr 60 ml R/ Proris suspensi 60 ml R/ Apialys syr</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Tremenza syr 60 ml (1) R/ Proris suspensi 60 ml (1) R/ Apialys syr (1)</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Ny. Aleeya	Umur pasien :	Ada	2 tahun	Berat Badan :	Tidak ada	-	Nama Obat :	Ada	R/ Tremenza syr 60 ml R/ Proris suspensi 60 ml R/ Apialys syr	Bentuk sed. :	Tidak ada	R/ Tremenza syr 60 ml R/ Proris suspensi 60 ml R/ Apialys syr	Jumlah obat :	Ada	R/ Tremenza syr 60 ml (1) R/ Proris suspensi 60 ml (1) R/ Apialys syr (1)	
Nama Pasien :	Ada	Ny. Aleeya																			
Umur pasien :	Ada	2 tahun																			
Berat Badan :	Tidak ada	-																			
Nama Obat :	Ada	R/ Tremenza syr 60 ml R/ Proris suspensi 60 ml R/ Apialys syr																			
Bentuk sed. :	Tidak ada	R/ Tremenza syr 60 ml R/ Proris suspensi 60 ml R/ Apialys syr																			
Jumlah obat :	Ada	R/ Tremenza syr 60 ml (1) R/ Proris suspensi 60 ml (1) R/ Apialys syr (1)																			



Duplikasi terapi :	Tidak ada	=
Aturan pakai :	Ada	R/ Tremenza syr 60 ml (3 kali sehari ½ sendok teh) R/ Proris suspensi 60 ml (2 kali sehari ½ sendok teh) R/ Apialys syr (1 kali sehari 1 sendok teh)
Tanggal penulisan resep :	Ada	12 Februari 2024
Nama dokter :	Ada	Dr. Muhammad Alim
Surat ijin :	Ada	SIP : 503.446?2273/SIP.OU/7/2/2017
Alamat dr. :	Tidak ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

-

C. Perhitungan biaya resep

Tremenza syr 60 ml	x 1	Rp. 30.860
Proris suspensi 60 ml	x 1	Rp. 32.700
Apialys syr	x 1	Rp. 50.616
TOTAL		Rp. 114.178

D. ETIKET



Pilek/ flu

APOTEK KIMIA FARMA
 Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
 APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm
 SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

Tgl. 16 Februari 2024 No. R/
 An Aleeya 2.th

SEHARI :3..... X1/2..... SENDOK
 Sebelum / Sesudah makan

TEH
BUBUR
MAKAN

KOCOK DULU



Nyeri (bila nyeri)

APOTEK KIMIA FARMA
 Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
 APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm
 SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

Tgl. 16 Februari 2024 No. R/
 An Aleeya 2.th

SEHARI :2..... X1/2..... SENDOK
 Sebelum / Sesudah makan

TEH
BUBUR
MAKAN

KOCOK DULU



Vitamin

APOTEK KIMIA FARMA
 Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
 APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm
 SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

Tgl. 16 Februari 2024 No. R/
 An Aleeya 2.th

SEHARI :1..... X1..... SENDOK
Sebelum / Sesudah makan

TEH
BUBUR
MAKAN

KOCOK DULU


E. *Product knowledge*

Nama Obat : Tremenza syr 60 ml
Kandungan : Pseudoepedrine HCl 30 ml,
Triprolidine HCl 1,25
Dosis lazim :
Dewasa dan anak > 12 tahun : 3 kali
sehari 2 sendok takar (@10 ml)
Anak-anak 6- 12 tahun : 3 kali sehari 1
sendok takar (@5 ml)
Anak-anak 2- 5 tahun : 3 kali sehari ½
sendok takar (@2,5 ml)
Kegunaan : gejala flu
ESO potensial : tenggorokan kering,
mengantuk, pusing, insomnia
KI : penyakit saluran
pernafasan bawah, termasuk asma,
hipertensi, glukoma, diabetes
PERHATIAN : ibu hamil dan menyusui
Cara penyimpanan : Simpan ditempat
sejuk dan kering, terhindar dari sinar
matahari langsung

Nama Obat : Apialys syr
Kandungan : Vitamin A 5000 IU, vit B1 3
mg, vit B2 2 mg, vit B6 6 mg, vit B12 5
mcg, vit C 50 mg, vit D 400 IU,
nicotinamide 20 mg, lysine HCl 250 mg,
d- pantothenol 5 mg, l- glutamic acid 25
mg
Dosis lazim : 1 kali 1-2 sendok takar

Nama Obat : Proris suspensi 60 ml
Kandungan : ibuprofen 100mg
Dosis lazim : 3-4 kali/ hari 1 sendok
takar
Kegunaan : nyeri ringan pada penyakit
gigi, nyeri pasca bedah, sakit kepala.
ESO potensial : dispepsia, diare, mual,
muntah, nyeri abdomen
KI : penderita dengan ulkus
peptikum (tukak lambung dan
deudonum)
PERHATIAN : lansia, kehamilan,
persalinan, menyusui
Cara penyimpanan : Simpan ditempat
sejuk dan kering, terhindar dari sinar
matahari langsung

		<p>Kegunaan : vitamin, penambah nafsu makan, membantu pertumbuhan tulang dan gigi ESO potensial : hipersensitivitas KI : hipersensitivitas PERHATIAN : kocok dulu sebelum diminum, hentikan jika terjadi alergi Cara penyimpanan :</p>																												
		<p>F. Tahap pembuatan</p> <table border="1" data-bbox="958 544 2132 619"> <tr> <td data-bbox="958 544 1872 619"></td> <td data-bbox="1872 544 2132 619"></td> </tr> </table>																												
		<p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p>																												
		<p>Atas nama An. Aleeya. Ini ada 3 macam obat. Ini tremenza digunakan untuk pilek diminum 3 kali sehari ½ sendok teh, setelah makan. ini proris untuk nyeri, diminum 2 kali sehari ½ sendok teh jika nyeri, setelah makan. ini apialys untuk penambah nafsu makan diminum 1 kali sehari 1 sendok teh. Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.</p>																												
		<p>H. Salinan resep</p>																												
<p>No</p>	<p>Resep</p>	<p>Tahapan Pengerjaan Resep</p>																												
<p>25.</p>	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : 1 Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="958 1043 1827 1399"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Ny. Siti</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada</td> <td>41 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Inj novorapid</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>Inj novorapid (1)</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>Inj novorapid (3 kali 10 iu)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada</td> <td>22 Februari 2024</td> </tr> </table>		Nama Pasien :	Ada	Ny. Siti	Umur pasien :	Ada	41 tahun	Berat Badan :	Tidak ada	-	Nama Obat :	Ada	Inj novorapid	Bentuk sed. :	Tidak ada	-	Jumlah obat :	Ada	Inj novorapid (1)	Duplikasi terapi :	Tidak ada	-	Aturan pakai :	Ada	Inj novorapid (3 kali 10 iu)	Tanggal penulisan resep :	Ada	22 Februari 2024
Nama Pasien :	Ada	Ny. Siti																												
Umur pasien :	Ada	41 tahun																												
Berat Badan :	Tidak ada	-																												
Nama Obat :	Ada	Inj novorapid																												
Bentuk sed. :	Tidak ada	-																												
Jumlah obat :	Ada	Inj novorapid (1)																												
Duplikasi terapi :	Tidak ada	-																												
Aturan pakai :	Ada	Inj novorapid (3 kali 10 iu)																												
Tanggal penulisan resep :	Ada	22 Februari 2024																												



Nama dokter :	Ada	-
Surat ijin :	Ada	-
Alamat dr. :	Tidak aa	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

C. Perhitungan biaya resep

Inj novorapid	x 1	Rp. 208.000
TOTAL		Rp. 208.000

D. ETIKET

Nama Obat/Warna etiket: histrine / putih



APOTEK KIMIA FARMA
 Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
 APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm
 SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

22 Februari 2024

Ny. Siti
 3 kali 1sehari 10 unit

OBAT LUAR

		<p>E. Product knowledge</p> <p>Nama Obat : Inj novorapid Kandungan : insulin aspart Dosis lazim : 0,5-1 iu/kg perhari Kegunaan :diabetes melitus ESO potensial : hipoglikemia, reaksi anafilasis KI : hipoglikemia, hipersensitif PERHATIAN : priksa label untuk memastikan insulin yang tepat Cara penyimpanan : simpan obat di dalam kulkas di suhu 2-8 derajat Celcius</p> <p>F. Tahap pembuatan</p> <p>-</p> <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Atas nama Ny. Siti. Ini untuk obat nya 1 ya bu inj novorapid, disuntikan 3 kali 10 unit, Setelah makan. Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.</p> <p>H. Salinan resep</p>																		
No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																		
26.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : 2 Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>tn. martono</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Brainact q-ten</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>Brainact (15)</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	tn. martono	Umur pasien :	Tidak Ada	-	Berat Badan :	Tidak ada	-	Nama Obat :	Ada	Brainact q-ten	Bentuk sed. :	Tidak ada	-	Jumlah obat :	Ada	Brainact (15)
Nama Pasien :	Ada	tn. martono																		
Umur pasien :	Tidak Ada	-																		
Berat Badan :	Tidak ada	-																		
Nama Obat :	Ada	Brainact q-ten																		
Bentuk sed. :	Tidak ada	-																		
Jumlah obat :	Ada	Brainact (15)																		



		q-ten com (20)
Duplikasi terapi :	Tidak ada	-
Aturan pakai :	Ada	Brainact (1 kali sehari) q-ten com(1 kali sehari)
Tanggal penulisan resep :	Ada	12 Februari 2024
Nama dokter :	Ada	Dr. zulvia untari
Surat ijin :	Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Tidak aa	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

--

C. Perhitungan biaya resep

Brainact 500 x 15 Q -ten com x 20 TOTAL Rp.

D. ETIKET

 APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	
No. : TGL. : 12 feb2024 NAMA PASIEN : tn.murtono	
..... 1X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus Sebelum / Sesudah / Bersama makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)	
Nama / Jumlah Obat brainact 500/15 Tgl. Kadaluarsa	
(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)	



APOTEK KIMIA FARMA

Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK

APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm

SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

No. : TGL. : 12 feb2024

NAMA PASIEN : tn.murtono

..... 1.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus

Sebelum / Sesudah / Bersama makan

(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)

[Pagi](#)

[Siang](#)

[Sore](#)

[Malam](#)

Nama / Jumlah Obat Q-ten com/20

Tgl. Kadalua

(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)

E. Product knowledge

Nama Obat : brainact 500

Kandungan : citicolin 500mg

Dosis lazim : 1000-2000mg per hari dalam dosis terbagi

Kegunaan : untuk membantu menangani penurunan kognitif pada usia lanjut

ESO potensial : sakit perut, mual, kemerahan pada kulit, pusing

KI : -

PERHATIAN : anak-anak, wanita hamil dan menyusui

Cara penyimpanan : simpan ditempat yang sejuk dan kering, terlindung dari sinar matahari

Nama Obat : q ten com

Kandungan : Coenzyme Q10. 60 mg, l-carnitin 250 mg, alpha lipoic acid 200 mg

Dosis lazim : 1 x sehari 1 kaplet

Kegunaan : sebagai katalis alami untuk pembentukan energi dari makanan dan sebagai antioksidan untuk mencegah kerusakan sel. Memelihara kesehatan jantung.

ESO potensial : -

ESI potensial : -


KI : -

PERHATIAN : wanita hamil dan menyusui.

Pasien yang menggunakan warfarin

Cara penyimpanan : simpan ditempat yang sejuk dan kering, terlindung dari sinar matahari

		<p>F. Tahap pembuatan</p> <p>-</p> <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Atas nama tn. Murtono. Ini ada 2 macam obat ya pak. Brainact dan q ten com. Ini sama diminum 1 kali sehari saja . ada yang ditanyakan kembali. Terimakasih semoga sehat selalu</p> <p>H. Salinan resep</p>																								
No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																								
27.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>tn. Rusmin</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Reinpid Lasgan Lipitor 20mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>Reinpid (30) Lasgan (15) Lipitor 20mg(15)</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>Reinpid (1 kali sehari) Lasgan (2 kali sehari, pagi dan malam)</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	tn. Rusmin	Umur pasien :	Tidak Ada	-	Berat Badan :	Tidak ada	-	Nama Obat :	Ada	Reinpid Lasgan Lipitor 20mg	Bentuk sed. :	Tidak ada	-	Jumlah obat :	Ada	Reinpid (30) Lasgan (15) Lipitor 20mg(15)	Duplikasi terapi :	Tidak ada	-	Aturan pakai :	Ada	Reinpid (1 kali sehari) Lasgan (2 kali sehari, pagi dan malam)
Nama Pasien :	Ada	tn. Rusmin																								
Umur pasien :	Tidak Ada	-																								
Berat Badan :	Tidak ada	-																								
Nama Obat :	Ada	Reinpid Lasgan Lipitor 20mg																								
Bentuk sed. :	Tidak ada	-																								
Jumlah obat :	Ada	Reinpid (30) Lasgan (15) Lipitor 20mg(15)																								
Duplikasi terapi :	Tidak ada	-																								
Aturan pakai :	Ada	Reinpid (1 kali sehari) Lasgan (2 kali sehari, pagi dan malam)																								



		Lipitor 20mg(malam hari)
Tanggal penulisan resep :	Ada	7 -03-24
Nama dokter :	Ada	Dr. zulvia untari
Surat ijin :	Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Tidak aa	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

--

C. Perhitungan biaya resep

Reinpid (30)	270.000
Lasgan (15)	300.000
Lipitor 20mg(15)	10.500
TOTAL	Rp. 580.500

D. ETIKET

Nama Obat/Warna etiket: Racikan 1/ putih

kimia farma APOTEK KIMIA FARMA
 Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
 APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm
 SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

No. : TGL. : 7 maret 2024

NAMA PASIEN : tn.rusmin

..... 1X sehari 1Tablet / Kapsul / Bungkus

Sebelum / Sesudah / Bersama makan

(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)

[Pagi](#)
[Siang](#)
[Sore](#)
[Malam](#)

Nama / Jumlah Obat	reinpid/30
Tgl. Kadaluarsa	
(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)	

 APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	
No. :	TGL. : 7 maret 2024
NAMA PASIEN : tn.rusmin	
..... 2.....X sehari	1.....Tablet / Kapsul / Bungkus
Sebelum / Sesudah / Bersama makan	
(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)	Pagi Siang Sore Malam
Nama / Jumlah Obat	lasgan/15
Tgl. Kadaluarsa	
(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)	


 APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	
No. : TGL. : 7 maret 2024	
NAMA PASIEN : tn.rusmin	
..... 1.X sehari 1.....Tablet / Kapsul / Bungkus Sebelum / Sesudah / Bersama makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)	<u>Pagi</u> <u>Siang</u> <u>Sore</u> <u>Malam</u>
Nama / Jumlah Obat Tgl. Kadaluausa	Lipitor 20/15
(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)	

E. *Product knowledge*

<p>Nama Obat : reinpid Kandungan : Dutasteride. Dosis lazim : Hiperplasia prostat jinak. -Dewasa: 500 mcg sekali sehari setidaknya selama 6 bulan. -Anak: Dikontraindikasikan. Kegunaan : Hiperplasia prostat jinak. ESO potensial : Gangguan payudara (misalnya nyeri tekan, pembesaran). • Reaksi hipersensitivitas (misalnya ruam, pruritus, urtikaria, edema terlokalisasi, reaksi kulit serius, angioedema). KI : Wanita hamil dan menyusui. • Anak-anak. PERHATIAN : Wanita hamil dan menyusui. • Anak-anak. Cara penyimpanan : suhu ruang</p>	<p>Nama Obat : lasgan Kandungan : lansoprazole 30 mg Dosis lazim :) Dyspepsia : 15-30 mg 1 kali sehari di pagi hari selama 2-4 minggu.2) GERD : 15-30 mg 1 kali sehari di pagi hari selama 4-8 minggu. Dosis pemeliharaan: 15-30 mg 1 kali sehari.3) Esofagitis erosif : 30 mg 1 kali sehari di pagi hari hingga 8 minggu. Dosis pemeliharaan: 15 mg 1 kali sehari. Untuk intravena, dosis yang diberikan 30 mg selama 30 menit hingga 7 hari. Kegunaan : Digunakan untuk mengobati dan mencegah ulkus lambung dan usus, erosif esofagitis, dan kondisi lain yang melibatkan asam lambung yang berlebihan. ESO potensial : Diare, gatal-gatal, Meningkatkan atau menurunkan nafsu makan, nyeri sendi, mual, sakit perut,</p>
--	---

		<p>muntah, kegelisahan, pilek, sembelit, batuk, depresi mental, nyeri otot, perdarahan dubur, pendarahan atau memar yang tidak biasa. KI : Jangan berikan obat ini pada pasien yang menggunakan obat rilpivirine dan atazanavir. PERHATIAN : Jangan dikunyah, minum secara utuh, konsultasikan dengan dokter untuk penggunaan pada ibu hamil dan ibu menyusui, jangan berikan pada anak dibawah 1 tahun. Cara penyimpanan : suhu ruang</p>	
		<p>Nama Obat : Lipitor 20 Kandungan : atorvastatin Ca 20 mg Dosis lazim : dosis awal yang biasa adalah 10 mg sekali sehari. Penyesuaian dosis harus dilakukan dengan interval = 4 minggu. Dosis maksimum adalah 80 mg sekali sehari. Kegunaan : menurunkan kolesterol total, LDL-kolesterol, apolipoprotein B & triglycerides pada hiperkolesterolemia, hiperlipidaemia. ESO potensial : gangguan GI, sakit kepala, mual, myalgia, asthenia, insomnia, kram otot, myositis, myopathy, paraesthesia, neuropatik perifer, pancreatitis, hepatitis, cholestatic jaundice, alopecia, pruritus, rash, impotence, hyper- & hypoglycemia. KI : Hamil & laktasi PERHATIAN : Peny hati aktif, atau kenaikan serum transaminase > 3 x batas normal tertinggi. Hamil & laktasi.</p>	

		<p>Cara penyimpanan : suhu ruang</p> <p>F. Tahap pembuatan</p> <p>-</p> <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Atas nama tn rusmin ini ada 3 macam obat. Ini reinpid diminum 1 kali sehari setelah makan, lasgan diminum 2 kali sehari pagi dan malam setelah makan, dan Lipitor 20 diminum 1 kali sehari setelah makan . ada yang ditanyakan lagi? Terimakasih semoga sehat selalu</p> <p>H. Salinan resep</p>																					
No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																					
28.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli</p> <p>Resep obat : Racikan/non racikan</p> <p>Jumlah obat dalam resep : 2</p> <p>Polifarmasi (>/Tidak</p> <p>Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter</p> <p>Tempel Resep/salin resep disini!</p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Septaria s</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Disflatyl Pantozol 40</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>Disflatyl (20) Pantozol 40 (15)</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Septaria s	Umur pasien :	Tidak Ada	-	Berat Badan :	Tidak ada	-	Nama Obat :	Ada	Disflatyl Pantozol 40	Bentuk sed. :	Tidak ada	-	Jumlah obat :	Ada	Disflatyl (20) Pantozol 40 (15)	Duplikasi terapi :	Tidak ada	-
Nama Pasien :	Ada	Septaria s																					
Umur pasien :	Tidak Ada	-																					
Berat Badan :	Tidak ada	-																					
Nama Obat :	Ada	Disflatyl Pantozol 40																					
Bentuk sed. :	Tidak ada	-																					
Jumlah obat :	Ada	Disflatyl (20) Pantozol 40 (15)																					
Duplikasi terapi :	Tidak ada	-																					



Aturan pakai :	Ada	Disflatyl (3 kali sehari 30 menit sebelum makan dikunyah) Pantozol 40 (1 kali sehari 30 menit sebelum makan)
Tanggal penulisan resep :	Tidak Ada	-
Nama dokter :	Ada	Dr. zulvia untari
Surat ijin :	Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Tidak aa	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

-

C. Perhitungan biaya resep

Disflatyl (20)	140.000
Pantozol 40 (15)	260.000
TOTAL	Rp. 400.000

D. ETIKET

30 menit sebelum makan, dikunyah

kimia farma APOTEK KIMIA FARMA
 Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
 APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm
 SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

No. : TGL. : **2 maret 2024**

NAMA PASIEN : septaria

[Pagi](#)
[Siang](#)
[Sore](#)
[Malam](#)

..... 3.....X sehari 1.....Tablet / Kapsul / Bungkus
 Sebelum / Sesudah / Bersama makan
 (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)

Nama / Jumlah Obat **disflatyl / 20**

Tgl. Kadaluarsa
(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)

30 menit sebelum makan

kimia farma APOTEK KIMIA FARMA
Jl. Kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm
SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

No. : TGL. : **2 maret 2024**

NAMA PASIEN : **septaria**

..... **1**X sehari **1** Tablet / Kapsul / Bungkus
Sebelum / ~~Sesudah~~ / Bersama makan [Pagi](#)
[Siang](#)
[Sore](#)
[Malam](#)

(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)


Nama / Jumlah Obat **pantozol / 15**
Tgl. Kadaluarsa
(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)

E. Product knowledge

Nama Obat : disflatyl
Kandungan : Dimetilpolisiloksan

Nama Obat : pantozol
Kandungan : Pantoprazole 20 mg

		<p>Dosis lazim : Dewasa : 1-2 tablet dikunyah sesudah makan dan sebelum tidur. Persiapan untuk pemeriksaan sinar X, 1-2 tablet 2-3 hari sebelum pemeriksaan.</p> <p>Kegunaan : Mengurangi penimbunan gas dalam saluran cerna, perasaan penuh pada epigastrium, meteorismus sementara dan pasca operasi, sindrom gastrokardiak, persiapan pemeriksaan dengan sinar X dan sebelum gastroskopi</p> <p>ESO potensial : - KI : - PERHATIAN : - Cara penyimpanan : suhu ruang</p> <p>F. Tahap pembuatan -</p> <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Atas nama septaria ini ada 2 macam, yang disflatyl diminum 3 kali sehari 30 menit sebelum makan dikunyah, pantozol diminum 1 kali sehari 30 menit sebelum makan . apakah ada yang ditanyakan? Terimakasih, semoga sehat selalu.</p> <p>H. Salinan resep</p>	<p>Dosis lazim : 40 mg/hari selama 4-8 minggu IV</p> <p>Kegunaan : Menghilangkan gejala dan terapi jangka pendek gangguan gaster dan pengurangan asam lambung; ulkus duodenal; ulkus gaster; refluks esofagitis sedang dan berat</p> <p>ESO potensial : Sakit kepala, diare. Jarang, mual, nyeri perut bagian atas, kembung, ruam kulit, pruritus, pusing</p> <p>KI : - PERHATIAN : - Cara penyimpanan : suhu ruang</p>													
No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep														
29.	Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="958 1225 1827 1404"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>An. Medina safwa</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ simfix 25 mg Tremenza 1/5 tab</td> </tr> </table>			Nama Pasien :	Ada	An. Medina safwa	Umur pasien :	Tidak ada	-	Berat Badan :	Tidak ada	-	Nama Obat :	Ada	R/ simfix 25 mg Tremenza 1/5 tab
Nama Pasien :	Ada	An. Medina safwa														
Umur pasien :	Tidak ada	-														
Berat Badan :	Tidak ada	-														
Nama Obat :	Ada	R/ simfix 25 mg Tremenza 1/5 tab														



		Ambroxol ¼ tab L bio sach Tempra drop
Bentuk sed. :	ada	R/ simfix 25 mg Tremenza 1/5 tab Ambroxol ¼ tab Dibuat puyer
Jumlah obat :	Ada	L bio sach Tempra drop R/ simfix 25 mg (3) Tremenza 1/5 tab (2) Ambroxol ¼ tab (3) 10 puyer
Duplikasi terapi :	Tidak ada	L bio sach (6) Tempra drop (1)
Aturan pakai :	Ada	-
Tanggal penulisan resep :	Ada	Racikan 1 (2 kali 1 bungkus, sesudah makan) L-Bio sach (2 kali 1 sachet) Tempra drop (4 kali 1 ml, bila panas, sesudah makan)
Nama dokter :	Ada	28 Februari 2024
Surat ijin :	Ada	Dr. Tresnaningsih S
Alamat dr. :	Tidak ada	446/1866/437.52/2023
		-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Racikan 1
 Simfix : $25/100 \times 10 = 2,5$
 Tremenza : $1/5 \times 10 = 2$
 Epexol : $\frac{1}{4} \times 10 = 2,5$

C. Perhitungan biaya resep

R/ simfix 100 mg	x3	Rp. 86.580
Tremenza	x 3	Rp. 6.000
Epexol 30mg	x 3	Rp. 3.897
Kertas puyer	x 10	Rp. 620
EMBALASE		Rp.15.000
L bio sach	x6	Rp. 66.000
Tempra drop	x1	Rp.60.000
TOTAL		Rp. 238.097

D. ETIKET

kimia farma
APOTEK KIMIA FARMA
 Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
 APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm
 SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

Anda : TGL. : **28 Februari 2024**

NAMA PASIEN : **An. Madina**

..... 2.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus Pagi
Sebelum / Sesudah / Bersama makan Siang
(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak) Sore
Malam

Nama / Jumlah Obat **racikan 10 puyer**
 Tgl. Kadaluarsa

(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)



APOTEK KIMIA FARMA

Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK

APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm

SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

Anda. : TGL. : **28 Februari 2024**

NAMA PASIEN : **An. Madina**

..... **2**X sehari **1** Tablet / Kapsul / Bungkus

Sebelum / Sesudah / Bersama makan

(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)

Pagi

Siang

Sore

Malam

Nama / Jumlah Obat **L-BIO SACH / 6**

Tgl. Kadaluarsa

(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)



APOTEK KIMIA FARMA

Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK

APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm

SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

Tgl. **28 Februari 2024** Anda. R/

An. Medina

.....th

SEHARI : **4** X **1 ml**..... SENDOK

Sebelum / Sesudah makan

TEH

BUBUR

MAKAN

KOCOK DULU

BILA PANAS

E. *Product knowledge*


<p>Nama Obat : simfix 100 Kandungan : Cefixime 100 Dosis lazim : Anak-anak 50-100 mg perhari Dewasa : 100-400 mg perhari Kegunaan : saluran kemih, bakteri pada saluran kemih telinga, saluran pernafasan, demam tifoid pada anak ESO potensial :ganguan saluran cerna, gangguan saluran nafas, syok KI : PERHATIAN : jangan diberikan kepada pasien yang asih diobati dengan antibiotik lain Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>Nama Obat : tremenza Kandungan :Pseudoepedrine Dosis lazim : Dewasa dan anak > 12 tahun : 1 tab 3-4 kali sehari Anak-anak <12 tahun : ½ tab 3-4 kali sehari Kegunaan : gejala flu ESO potensial :tenggorokan kering, mengantuk, pusing, insomnia KI :penyakit saluran pernafasan bawah, termasuk asma, hipertensi, glukoma, diabetes PERHATIAN : ibu hamil dan menyusui Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>
<p>Nama Obat : epexol 30 Kandungan : Ambroxol 30 Dosis lazim : 30 mg, 2-3 kali sehari Kegunaan : saluran pernafasan akut dan kronis ESO potensial : mual, muntah, diare, sakit perut KI : hipersensitif PERHATIAN : tukak lambung atau dodenum, gangguan ginjal dan hati, anak-anak</p>	<p>Nama Obat : L-Bio Kandungan : probiotik lactobacillus acidopilus Dosis lazim : Anak > 2 tahun : 2-4 sachet/ hari Anak <2 tahun 1-2 sachet / hari Kegunaan : pencernaan ESO potensial : - KI : - PERHATIAN : langsung dikonsumsi setelah dibuka</p>

		<p>Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p> <p>Nama Obat : tempra drop Kandungan :paracetamol Dosis lazim : usia 3-9 bulan :0,8ml usia 10-24 bulan 1,2 ml Kegunaan : sakit kepala dan sakit gigi ESO potensial : hipersensitif, gangguan fungsi hati, mual, muntah, ttakardi, lelah, kram otot, insomnia, ansietes. KI : hipersensitif dan gangguan fungsi hati berat PERHATIAN : gangguan ginjal dan hati Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>Cara penyimpanan : Simpan dibawah 25 drajat ce</p>		
<p>F. Tahap pembuatan</p>					
		<p>Racikan 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siapkan obat yang akan diracik 2. Obat yang sudah di siapkan dibuka dan obat tersebut dimasukan kedalam belender 3. Kemudian obat diayak dan dibagi secara kasat mata, dimasukan kedalam kertas puyer <p>Lalu kertas puyer di tutup dan dimasukan ke dalam plastik klip dan di beri obat</p>			
<p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p>					
<p>Atas nama An.medina. ini obat nya ada 3, ini ada 1 racikan untuk batuk pilek, diminum 2 kali sehari 1 bungkus setelah makan, ini L-Bio sach untuk pencernaan 2 kali sehari 1 bungkus setelah makan, kemudian ini tempra drop digunakan untuk panas atau demam, 4 kali sehari 1</p>					

ml sesudah makan. Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.

H. Salinan resep

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																														
30.	Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : 1 Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!	<p style="text-align: center;">A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="958 616 1227 651">Nama Pasien :</td> <td data-bbox="1227 616 1451 651">Ada</td> <td data-bbox="1451 616 1827 651">Ernawati</td> </tr> <tr> <td data-bbox="958 651 1227 686">Umur pasien :</td> <td data-bbox="1227 651 1451 686">ada</td> <td data-bbox="1451 651 1827 686">51 tahun</td> </tr> <tr> <td data-bbox="958 686 1227 721">Berat Badan :</td> <td data-bbox="1227 686 1451 721">Tidak ada</td> <td data-bbox="1451 686 1827 721">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="958 721 1227 863">Nama Obat :</td> <td data-bbox="1227 721 1451 863">Ada</td> <td data-bbox="1451 721 1827 863">Buscopan Lodia tab Pharolit probiotik</td> </tr> <tr> <td data-bbox="958 863 1227 898">Bentuk sed. :</td> <td data-bbox="1227 863 1451 898">Tidak ada</td> <td data-bbox="1451 863 1827 898"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="958 898 1227 1040">Jumlah obat :</td> <td data-bbox="1227 898 1451 1040">Ada</td> <td data-bbox="1451 898 1827 1040">Buscopan (10) Lodia tab (10) Pharolit (10) Probiotik (10)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="958 1040 1227 1075">Duplikasi terapi :</td> <td data-bbox="1227 1040 1451 1075">Tidak ada</td> <td data-bbox="1451 1040 1827 1075">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="958 1075 1227 1283">Aturan pakai :</td> <td data-bbox="1227 1075 1451 1283">Ada</td> <td data-bbox="1451 1075 1827 1283">Buscopan (3 kali sehari saat melilit) Lodia tab (2 kali 2 tablet sehari) Pharolit (3 kali sehari) Probiotik 2 kali sehari)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="958 1283 1227 1353">Tanggal penulisan resep :</td> <td data-bbox="1227 1283 1451 1353">Ada</td> <td data-bbox="1451 1283 1827 1353">29 Februari 2024</td> </tr> <tr> <td data-bbox="958 1353 1227 1390">Nama dokter :</td> <td data-bbox="1227 1353 1451 1390">Ada</td> <td data-bbox="1451 1353 1827 1390">Dr. Tassyra firdausi</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Ernawati	Umur pasien :	ada	51 tahun	Berat Badan :	Tidak ada	-	Nama Obat :	Ada	Buscopan Lodia tab Pharolit probiotik	Bentuk sed. :	Tidak ada		Jumlah obat :	Ada	Buscopan (10) Lodia tab (10) Pharolit (10) Probiotik (10)	Duplikasi terapi :	Tidak ada	-	Aturan pakai :	Ada	Buscopan (3 kali sehari saat melilit) Lodia tab (2 kali 2 tablet sehari) Pharolit (3 kali sehari) Probiotik 2 kali sehari)	Tanggal penulisan resep :	Ada	29 Februari 2024	Nama dokter :	Ada	Dr. Tassyra firdausi
Nama Pasien :	Ada	Ernawati																														
Umur pasien :	ada	51 tahun																														
Berat Badan :	Tidak ada	-																														
Nama Obat :	Ada	Buscopan Lodia tab Pharolit probiotik																														
Bentuk sed. :	Tidak ada																															
Jumlah obat :	Ada	Buscopan (10) Lodia tab (10) Pharolit (10) Probiotik (10)																														
Duplikasi terapi :	Tidak ada	-																														
Aturan pakai :	Ada	Buscopan (3 kali sehari saat melilit) Lodia tab (2 kali 2 tablet sehari) Pharolit (3 kali sehari) Probiotik 2 kali sehari)																														
Tanggal penulisan resep :	Ada	29 Februari 2024																														
Nama dokter :	Ada	Dr. Tassyra firdausi																														



Surat ijin :	Ada	446/2076/437.52/2019
Alamat dr. :	Tidak ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

-

C. Perhitungan biaya resep

Buscopan (10)	= 35.000
Lodia tab (10)	= 15.000
Pharolit (10)	= 20.000
Probiotik (10)	= 50.000
TOTAL	= Rp. 120.000

D. ETIKET



APOTEK KIMIA FARMA
 Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
 APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm
 SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

Anda : TGL. : 29 Februari 2024
 NAMA PASIEN : ny. ernawati

[Pag](#)

..... 3.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus
Sebelum / Sesudah / Bersama makan
(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)

[Siang](#)
[Sore](#)
[Malam](#)

Nama / Jumlah Obat buscopan/10
Tgl. Kadaluarsa
(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)

 **Diare**
APOTEK KIMIA FARMA
Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm
SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

Anda. : TGL. : 29 Februari 2024
NAMA PASIEN : ny. ernawati

[Pagi](#)
[Siang](#)
[Sore](#)
[Malam](#)

..... 2.....X sehari 2..... Tablet / Kapsul / Bungkus
Sebelum / Sesudah / Bersama makan
(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)

Nama / Jumlah Obat lodia/10
Tgl. Kadaluarsa
(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)

 **oralit**
APOTEK KIMIA FARMA
Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm
SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

Anda. : TGL. : 29 Februari 2024
NAMA PASIEN : ny. ernawati

[Pagi](#)
[Siang](#)
[Sore](#)
[Malam](#)

..... 3.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus
Sebelum / Sesudah / Bersama makan
(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)

Nama / Jumlah Obat pharolit/10

Tgl. Kadaluarsa
(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)

kimia farma **Suplemen**
APOTEK KIMIA FARMA
 Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
 APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm
 SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

Anda : TGL. : 29 Februari 2024
 NAMA PASIEN : ny. ernawati

..... 2.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus
 Sebelum / Sesudah / Bersama makan
 (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)

Pagi
Siang
Sore
Malam


Nama / Jumlah Obat probiotik
 Tgl. Kadaluarsa
 (hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)

E. Product knowledge

<p>Nama Obat : buscopan Kandungan : hyoscine-N-butylbromide 10mg, parasetamol 500mg Dosis lazim : 1-2 tab 3 x sehari, maksimum 6 tablet Kegunaan : nyeri paroksismal pada penyakit-penyakit lambung/usus halus, dan kerusakan fungsi traktus biliaris, urinarius dan organ wanita (dismenore) ESO potensial : gangguan sistem darah, hipersensitif, takikardi, bronkospasme, mulut kering, retensi urin KI : - PERHATIAN : stenosis mekanik, gangguan fungsi hati, kelainan hepatoselular berat</p>	<p>Nama Obat : lodia Kandungan : Loperamide HCL Dosis lazim : Diare akut non spesifik Dosis awal 2 tablet, selanjutnya dapat dikonsumsi setiap setelah BAB 1-2 tablet 1-2 x/hari. Maksimal 8 tablet per hari. Diare kronik Dosis awal 2 tablet, lalu dapat dikonsumsi kembali setiap setelah BAB 2-4 tablet /hari dalam dosis terbagi. Maksimal 8 tablet/ hari. Bila setelah 48 jam tdk ada perbaikan, hentikan terapi. Kegunaan : Diare akut non spesifik dan diare kronik ESO potensial</p>
---	---

		<p>Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>KI : - PERHATIAN : Hentikan setelah 48 jam jika tdk ada perbaikan. Kolitis akut. Infeksi bakteri atau parasit. Anak kurang dari 2 Tahun. Ggn fungsi hati. Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>
		<p>Nama Obat : pharolit Kandungan : NaCl, Na Sitrat, Glukosa Dosis lazim : Sesuai kebutuhan Kegunaan : Dapat mencegah dan mengobati dehidrasi pada muntah dan diare, Gastroenteritis (infeksi yang terjadi pada usus atau perut), kolera (diare akut karena adanya infeksi pada usus) ESO potensial : - KI : - PERHATIAN : Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>Nama Obat : probiotik Kandungan : berbagai jenis mikroorganism Dosis lazim : 2 kali sehari Kegunaan : suplemen pencernaan ESO potensial - KI : - PERHATIAN : Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>
		<p>F. Tahap pembuatan</p>	
		<p>-</p>	
		<p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p>	
		<p>Atas nama ny. Ernawati. Ini obatnya ada 4 macam. Buscopan untuk melilit diminum 3 kali sehari jika melilit. Lodia untuk diare 2 kali sehari 2 tablet . pharolit untukoralit diminum 3 kali sehari. Probiotik untuk suplemen diminum 2 kali sehari</p>	

		H. Salinan resep
--	--	------------------



B .PRODUK KNOWLEDGE BERDASARKAN KELS TERAPI

(1) ANALGETIK- ANTIPIRETIK- ANTIINFLAMASI

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan

Analgetik- Antipiretik- Antiinflamasi	Acetaminophen	Pamol	Penderita gangguan fungsi hati berat dan hipersensitif	Meredakan sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot dan menurunkan demam dan nyeri	Dewasa : 1 - 2 tab 3 - 4 kali / hari. Max 8 tab / hari. Anak 6 - 12 tahun : 1/2 - 1 tab, 3 - 4 kali / hari. Max 4 tab / hari	Dosis yang besar dan pemakaian jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati. Reaksi alergi. Mual, muntah, diare, diaforesis, wajah pucat dan nyeri perut	Disimpan di suhu ruang. Ditempat yang kering dan terlindung dari cahaya matahari langsung
	Metampiron	Neuralgin	Ulkus peptikum. Bronkospasme, alergi rinitis, urtikaria, hipersensitif metampiron	Meringankan rasa nyeri seperti sakit kepala, sakit gigi, kram perut (dysminorrhea), nyeri pasca operasi, nyeri saraf seperti neuritis dan neuralgia	Dewasa : 3 - 4 x sehari, 1 - 2 tab. Anak 3 - 4 x sehari, 1/2 - 1 tab	Efek samping yang mungkin terjadi dalam penggunaan obat adalah: Gangguan saluran cerna, gangguan pembekuan darah, gangguan kardiovaskuler, reaksi hipersensitif, gangguan fungsi ginjal	. Disimpan di suhu ruang. Ditempat yang kering dan terlindung dari cahaya matahari langsung

Ibuprofen	Spedifen	Hipersensitif terhadap ibuprofen, penderita ulkus peptik, pasien penyakit hati dan ginjal berat, masa	Mengurangi nyeri dari berbagai gejala pada: sakit kepala, nyeri setelah pencabutan	Rekomendasi dosis harian sebesar 1200 mg per hari yang terbagi menjadi 3-4 tablet sehari, pada kasus rheumatoid	Gangguan saluran cerna termasuk mual, muntah, diare, konstipasi, nyeri lambung atau rasa panas pada perut bagian atas, ruam kulit. Pada kasus	Disimpan di suhu ruang. Ditempat yang kering dan terlindung dari cahaya	

			awal kehamilan, gagal jantung berat	gigi serta nyeri pasca operasi.	asthritis dosis mungkin diutuhkan lebih tinggi, namun dianjurkan tidak melebihi dosis 2400 mg per hari. Untuk nyeri haid dosis 400mg setiap 4 jam	jarang ibuprofen dapat menyebabkan bronkospasme	matahari langsung
Diklofenak	flamar 50mg	Kontraindikasi dengan pasien dengan riwayat ulkus peptikum (kerusakan lapisan mukosa pada saluran cerna), dan pasien dengan riwayat asma. Flamar merupakan obat berbentuk tablet salut enterik, yang didesain untuk pelepasan obat didalam usus sehingga meningkatkan efektivitas dari obat.	Meredakan nyeri dan mengurangi inflamasi pada pasien rematoid atritis akut dan kronis, nyeri pada tulanag, spondilitis ankilosa	Dewasa dan anak diatas 14 tahun 25mg atau 50mg , 2-3 x per hari	Gangguan gastrointestinal, pusing, sakit kepala	Disimpan di suhu ruang. Ditempat yang kering dan terlindung dari cahaya matahari langsung	

<p>Asam Mefenamat</p>	<p>Topgesic 500mg</p>	<p>Hipersensitif terhadap asam mefenamat, aspirin, atau obat golongan NSAID lainnya, peradangan pada usus besar, memiliki luka pada lambung yang sudah kronis, gagal ginjal, memiliki riwayat asma, biduran, atau tipe alergi yang lain, untuk terapi penghilang nyeri paska operasi bypass jantung (CABG)</p>	<p>Digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri ringan sampai dengan sedang akibat berbagai kondisi. Obat ini dapat digunakan juga untuk mengurangi nyeri saat haid, meredakan sakit gigi, sakit kepala, pegal otot dan sendi.</p>	<p>Dewasa. Dosis awal: 2 kaplet sehari. Dosis pemeliharaan: 1 kaplet tiap 6-8 jam perhari. Anak > 6 bulan atau lebih: 6.5 mg/kg berat badan perhari tiap 6-8 jam dan diberikan selama maksimal 7 hari.</p>	<p>Rasa tidak nyaman pada perut, mual, rasa terbakar pada ulu hati, mengantuk, pusing, diare, sakit kepala. Segera hubungi dokter apabila muncul efek samping serius seperti pendarahan, gejala infeksi (demam, nyeri tenggorokan), kaku pada leher, perubahan warna urin</p>	<p>Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya</p>
<p>Piroxicam</p>	<p>Pirofel 10mg dan 20 mg</p>	<p>hipersensitivitas atau asma terhadap piroxicam, aspirin, dan NSAID lainnya, riwayat tukak dan pendarahan saluran cerna (seperti kanker saluran cerna dan ulcera kolitis/peradangan usus besar dan rektum)</p>	<p>Sebagai terapi pada rheumatoid arthritis, osteoarthritis, ankilosa spondilitis, gout akut, dan gangguan muskuloskeletal.</p>	<p>Dewasa: Untuk reumatoid arthritis, osteoarthritis, ankilosing spondilitis diberikan dosis awal 20 mg dalam dosis tunggal; Untuk dosis pemeliharaan pada umumnya 20 mg per hari. Untuk gout akut mula-mula diberikan</p>	<p>Gangguan pencernaan, perpanjangan waktu pendarahan, rhinitis (iritasi selaput lendir hidung), urtikaria (biduran) dan gangguan epigastrik (gangguan asam lambung), angioedema (pembengkakan pada kulit), telinga berdenging,</p>	<p>Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya.</p>

					40 mg per hari sebagai dosis tunggal.	bronkospasma (pembengkakan bronkus).	
Indometasin	Tidak ada						
Fenilbutazon	Tidak ada						
Aspirin	Cardio aspirin	Pasien yang hipersensitif terhadap aspirin	Digunakan untuk meredakan nyeri ringan sampai sedang, meredakan demam dan untuk dosis tertentu dapat digunakan untuk membantu mencegah infark miokard/kerusakan pada otot jantung.	Pencegahan infark miokard: 75-325 mg/hari. Pemasangan stent pada jantung: 325 mg 2 jam sebelum operasi, kemudian 160-325 mg/hari. Mengurangi demam dan nyeri: 325-650 mg jeda 4-6 jam. Mengurangi nyeri dan peradangan yang disebabkan oleh gangguan sendi dan alat gerak: 2.4-3.6 g/hari. dosis pemeliharaan: 3.6-5.4 g/hari.	Gangguan pencernaan, perpanjangan waktu pendarahan, rhinitis (iritasi selaput lendir hidung), urtikaria (biduran) dan gangguan epigastrik (gangguan asam lambung), angioedema (pembengkakan pada kulit), telinga berdenging, bronkospasma (pembengkakan bronkus).	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya.	

Meloksikam	Ostelox 7,5mg dan 15 mg	Tidak boleh diberikan pada pasien yang memiliki reaksi berlebih (hipersensitivitas) dengan meloksikam, aspirin dan obat NSAID lainnya, memiliki riwayat asma, urtikaria (kaligata), atau tipe reaksi alergi, terapi nyeri setelah operasi Coronary Artery Bypass Graft (CABG).	Digunakan sebagai terapi untuk osteoarthritis (OA) dan reumatoid arthritis (RA)	Terapi ankylosing spondylitis (peradangan tulang belakang) dan rheumatoid arthritis (peradangan pada sendi): 15 mg/hari dosis tunggal. Pasien dengan risiko efek samping: dosis awal 7,5 mg/hari. Terapi osteoarthritis (pengapuran sendi) akut: 7,5 mg/hari. Dosis maksimal 15 mg/hari dosis tunggal.	Nyeri lengan/punggung/rahang, gusi berdarah, kembang, urin berdarah, penglihatan buram/kabur, nyeri lambung atau perut bagian atas, sariawan, sesak dada, panas dingin, urin keruh, batuk,	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya
Celecoxib	Celebrex 100mg dan 200mg	Hipersensitif, pengobatan nyeri pasca operasi, gangguan jantung dan ginjal, hamil (trimester 3) dan menyusui.	Meredakan gejala dan tanda osteoarthritis (radang pada sendi atau tulang rawan sendi), reumatik arthritis, dan spondilitis ankilosa pada orang dewasa	Terapi Osteoarthritis : 200 mg/hari dalam dosis tunggal atau dosis terbagi dua. Dosis dapat ditingkatkan menjadi 200 mg 2x1. 2) Terapi Rheumatoid arthritis : 100- 200 mg 2x1. 3) Terapi Spondilitis Ankilosa: dosis awal: 200 mg/hari dalam 1 atau 2 dosis	Batuk, demam, kulit kemerahan, bersin- bersin, tenggorokan serak, pembengkakan (wajah, jari, kaki, tungkai bagian bawah), pertumbuhan payudara yang abnormal, nyeri (lengan, punggung, dan rahang), feses berwarna hitam/berdarah, pandangan kabur, rasa terbakar pada dada atau perut	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya

					terbagi. Dapat ditingkatkan menjadi 400 mcg/hari setelah 6 minggu. 4) Terapi nyeri haid; terapi nyeri: 400 mg dilanjutkan dengan 200 mg pada hari pertama. Dosis pemeliharaan: 200 mg 2x1.		
	Parecoxib	Tidak ada					

(2) ANTIMIKROBA

(2.a) ANTIBIOTIK

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Penisilin	Ampicillin	Binotal 500mg	Pasien yang hipersensitif terhadap komponen obat	Digunakan untuk mengobati infeksi saluran pernafasan, demam tifoid dan paratifoid, gonorrhoea, pencegahan infeksi bakteri streptokokus saat melahirkan, meningitis, sepsis (infeksi bakteri pada darah).	pasien yang rentan infeksi: 500 mg setiap 6 jam sekali. Dosis untuk terapi infeksi saluran nafas atas: 500 mg setiap 8 jam. Dosis untuk terapi demam tifoid dan	Mual, muntah, diare, mulut kering, lidah berbulu hitam, kemerahan, stevens-Johnson syndrome, angioedema (pembengkakan pada jaringan bawah kulit), demam, nyeri sendi,	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya

					paratifoid: 1-2 g setiap 6 jam selama 2 minggu (infeksi akut), 4-12 minggu (karier).	anemia, trombositopenia (penurunan trombosit), leukopenia (jumlah sel leukosit menurun), neutropenia (jumlah neutrofil menurun)	
Amoksisilin	Kimoxil 500mg		Digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang peka terhadap amoxicillin	Dewasa diberikan 250-500 mg setiap 8 jam atau 500-875 mg setiap 12 jam. Anak <40 kg diberikan 40-90 mg/kg BB sebanyak 2-3 kali sehari.	Mual, muntah, diare, erythematous maculopapular rashes (ruam merah pada kulit), Stevens-Johnson syndrome, kulit terkelupas, hypersensitivitas vaskulitis (peradangan pada pembuluh darah), urtikaria (biduran)	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya	

	Ticarcillin	Tidak ada					
Cephalosporin	Cefadroxil	Cefat 500mg	Hipersensitif terhadap golongan Cephalosporin.	Untuk mengobati infeksi saluran kemih kelamin, saluran pernapasan, kulit dan jaringan lunak karena mikro organisme yang peka	Dewasa 2 x sehari. Anak-anak : 30 mg/kg berat badan dalam 2 dosis terbagi.	Cefadroxil memiliki efek samping seperti feses berwarna hitam, gusi berdarah, kulit terkelupas, menggigil, batuk, diare, demam, gatal, muntah.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya

	Cefixime	Cefspan, cefila	Hipersensiitif terhadap golongan Cephalosporin.	Mengandung cefixime/sefiksim yang digunakan untuk mengobati berbagai infeksi yang disebabkan oleh bakteri pada saluran kemih, gonorrhoe, telinga, saluran pernapasan, termasuk infeksi parah yang mengancam nyawa.	Dewasa dan anak dengan berat badan >30 kg: 50-100 mg 2 kali sehari. Untuk infeksi berat, dosis dapat ditingkatkan hingga 200 mg 2 kali sehari.	Diare, sering/jarang buang air besar, sakit perut, feses berwarna hitam, gusi berdarah, nyeri dada, menggigil, kulit terkelupas, darah dalam urin dan feses, keram pada perut, sakit punggung, nyeri pada kaki, batuk atau suara serak	Simpan pada suhu 20-25°C.
	Cefotaxime	Tidak ada					
Chloramphenicol	Kloramfenikol	Kalmicetine, colsacentine	Hipersensitif, penderita gangguan fungsi hati, penderita gangguan fungsi ginjal berat.	Digunakan untuk mengobati demam tifoid dan paratifoid, infeksi berat disebabkan oleh bakteri Salmonella, H. influenza, riketsia, Limfogranuloma-psitakosis, kuman Gram	Dewasa dan bayi > 2 minggu: 50 mg/kg berat badan sehari dalam 4 dosis terbagi. Bayi <2 minggu: 25	Depresi sum-sum tulang, anemia aplastik, sindroma gray pada bayi, ruam kulit, urtikaria, gangguan pencernaan, enterokolitis	Simpan di tempat yang sejuk dan kering terlindung dari sinar matahari

				Negatif (-) penyebab meningitis, infeksi saluran kemih dan infeksi bakteri yang peka terhadap kloramfenikol.	mg/kg berat badan sehari dalam 4 dosis terbagi.		
Thiamfenicol	Biothicol 500mg, thiamicyn 500mg dan 1000mg	Pasien yang hipersensitif terhadap Komponen obat	Digunakan untuk mengobati berbagai infeksi karena bakteri, mengobati demam tifus dan paratifus, bakteri gram negatif yang menyebabkan bakterimia meningitis, dan dapat mengatasi gonore.	Dewasa : 1.5 g/hari dalam dosis bagi. Anak-anak: Bayi di atas 2 minggu 50 mg/kg berat badan dalam dosis terbagi 3-4 kali sehari.	Selain memiliki efek yang diinginkan, thiamphenicol memiliki beberapa reaksi yang tidak diinginkan seperti: diskrasia darah, gangguan pencernaan, demam, ruam angioedema dan urtikaria, sakit kepala, sindrom grey, neuritis optik, depresi mental.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya	

Macrolides dan Lincosamide	Eritromisin	Erysanbe 500mg, 250mg, 200mg	-	Mengandung erythromycin/eritromisin yang digunakan untuk mengobati infeksi saluran napas, kulit dan jaringan lunak, pneumonia, gonorae, dan infeksi lain karena bakteri yang peka terhadap Eritromisin	Dewasa dan anak >20 kg : 1 kapsul, 4 kali sehari. Anak-anak <20 kg : 30-50 mg/kg berat badan per hari dalam 4 dosis terbagi	Mual, muntah, diare, kembung, dispepsia, palpitasi, flatulensi, ruam kulit, sakit kepala, fotosensitifitas, reaksi alergi, superinfeksi.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya
	Azitromisin	Zithromax 250mg dan 500mg, zibramax 500mg	Hipersensitif thd azithromycin, eritromisin atau makrolid lain atau ketolid	Untuk terapi infeksi dari bakteri yang rentan, seperti infeksi pernapasan, infeksi kulit, infeksi telinga, dan penyakit menular seksual.	Dewasa 500 mg 1 kali sehari selama 3 hari. Untuk anak-anak: 10 mg/ kg berat badan per hari selama 3 hari.	Mual, rasa tidak enak pada perut, muntah, kembung, diare, gangguan pendengaran, nefritis interstisial, gagal ginjal akut, fungsi hati abnormal, pusing atau vertigo, kebingungan mental, sakit kepala, kehilangan kesadaran.	Simpan ditempat sejuk dan terhindar dari sinar matahari langsung

--	--	--	--	--	--	--	--



Klaritromisin	Bicrolid 500mg	Hipersensitif terhadap clarithromycin atau antibiotik golongan makrolida lainnya	Infeksi saluran pernafasan, otitis media akut, infeksi kulit dan struktur kulit	250 mg 2x1, sampai 500 mg 2x1 untuk infeksi yang berat, diminum selama 7-14 hari	Batuk, demam atau menggigil, serak, nyeri punggung, sulit atau sakit saat berkemih.	Simpan ditempat sejuk dan terhindar dari sinar matahari langsung
Klindamisin	Prolic 150mg dan 300mg	Tidak boleh diberikan kepada pasien yang hipersensitif pada	Digunakan untuk mengobati infeksi serius yang disebabkan oleh mikroorganisme yang sensitif terhadap Clindamycin terutama	Dewasa : 150-300 mg tiap 6 jam. Anak-anak: Infeksi serius diberikan 8-16 mg/kg	Clindamycin memiliki efek samping yang jarang terjadi, seperti kulit pecah-pecah, kulit	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya

			clindamycin atau lincomycin.	Streptokokus, Pneumokokus, Stafilokokus dan bakteri anaerob	berat badan/hari, terbagi 3-4 kali sehari.	kemerahan, bengkak dan berkerak.	
Aminoglikosida	Neomisin	Nebacetin cr	Penderita yang hipersensitif / alergi terhadap Nebacetin atau neomisin atau basitrasin.	Untuk pengobatan infeksi kulit dan membran mukosa lokal	Oleskan pada bagian kulit atau bagian yang sakit sesuai dengan aturan pakai. Jangan digunakan untuk luka terbuka kecuali obat memang diperuntukkan pada luka terbuka	Reaksi alergi dapat berupa kemerahan pada kulit, tumpulak seperti dermatitis eksaserbasi atau penyakit tidak kunjung sembuh.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya
	Gentamisin	Sagestam, digenta	Hipersensitif	Digunakan untuk mengobati infeksi kulit primer seperti folikulitis superfisial, furunkulosis, impetigo kontagiosa, pioderma gangrenosa dan untuk infeksi kulit	Oleskan 3-4 kali sehari	Kemerahan, rasa panas dan gatal pada kulit.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya

				sekunder seperti dermatitis eksematus infeksiosa, akne pustular, psoriasis pustular, dermatitis seboroik terinfeksi, dermatitis kontak			
Quinolones	Ciprofloxacin	Baquinor forte	Pasien yang hipersensitif terhadap komponen obat	Digunakan untuk mengobati infeksi saluran kemih, uretritis, servitis gonorea, infeksi saluran cerna, demam tifroid dan paratifoid, infeksi saluran nafas, infeksi kulit dan jaringan lunak, infeksi tulang dan sendi.	Dewasa : 500 mg 2 kali perhari	Diare	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya
	Levofloxacin	Levacin 500mg	Tidak boleh diberikan pada pasien yang memiliki reaksi berlebihan (hipersensitivitas) pada obat levofloxacin atau quinolon lainnya.	Untuk pengobatan sinusitis maksilaris akut, eksaserbasi akut dari bronkitis kronik, pneumonia nosokomial dan pneumonia dari masyarakat, infeksi kulit dan struktur kulit dengan komplikasi, prostatitis baktrial kronik, infeksi saluran kemih/infeksi saluran kemih (termasuk pielonefritis)	Dewasa : 500 mg 1 kali sehari untuk 7-14	Kram perut atau perut atau nyeri (parah), kulit melepuh, kebingungan, diare (berair dan berat) dan dapat disertai darah, halusinasi, demam, nyeri, peradangan atau pembengkakan di betis kaki, bahu atau tangan	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya

Tetrasiklin	Tetrasiklin	Supertetra, tetrasanbe	Pasien yang hipersensitif, gangguan ginjal berat, anak usia dibawah 12 tahun, wanita hamil	Digunakan untuk mengobati infeksi oleh mikroorganisme yang peka terhadap tetrasiklin	1 kapsul, 3-4 kali sehari	Mual, muntah, ruam kulit, urtikaria, nyeri epigastrium, hepatotoksik & nefrotoksik eksaserbasi SLE	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya
	Doksisiklin	Siclidon, interdoxin 100mg dan 50mg	Hipersensitivitas terhadap doksisiklin atau tetrasiklin lainnya.	Untuk mengobati untuk infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang peka.	100-200 mg 2 x sehari selama 14 hari.	Mual, muntah, kulit memerah, urtikaria, diare, fotosensivitas, peningkatan kadar urea darah, anemia hemolitik, trombositopenia, neutropenia, eosinofilia.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya
	Minosiklin	Tidak ada					

Sulfa	Sulfametoksazol-Trimetoprim	Sanprima forte	Pasien dengan riwayat hipersensitif/alergi terhadap kandungan sulfametoksazol dan trimetoprim	Digunakan untuk Mengobati infeksi saluran kemih, saluran cerna, saluran napas, infeksi telinga, infeksi hidung, infeksi tenggorokan, toksoplasmosis dan infeksi lain karena bakteri.	Dewasa : 2 kali sehari 960 mg. Anak usia 6-12 tahun : 2 kali sehari 480 mg. Anak usia 6 bulan-6 tahun : 2 kali sehari 240 mg. Anak usia 6 minggu-6 bulan : 2 kali sehari 120 mg.	Mual, sariawan, diare, anemia.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya
-------	-----------------------------	----------------	---	--	--	--------------------------------	---

(2.b) ANTIJAMUR

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Polyenes	Amphotericin B	Tidak ada					
	Nistatin	Mycostatin drop	Kehamilan trimester 1	Digunakan untuk pengobatan kandidiasis pada rongga mulut.	Dewasa dan anak : 1-6 mL (100.000-600.000 IU), 4 kali sehari. Bayi : 1-2 mL (100.000-200.000 IU), 4 kali sehari	Hipersensitivitas, gatal pada kulit, urtikaria dan pruritus sering terjadi eritema multiformae, angioedema dan anafilaksis jarang dilaporkan terjadi, mual, rasa logam pada lidah dan kadang-kadang	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya

						disertai muntah dan anoreksia.	
Imidazole	ketoconazol,	Formyco cr	Hipersensitif terhadap ketoconazole	Untuk mengobati tinea korporis, tinea kruris, tinea manus, tinea pedis, tinea versikolor, kandidiasis kutaneus dan dermatitis seboroik	Oleskan tipis 1 kali sehari selama 2 minggu. Dermatitis seboroik : Oleskan tipis 2 kali sehari selama 4 minggu	Iritasi, pruritus, rasa terbakar dan reaksi alergik dapat terjadi selama pengobatan dengan Ketoconazole	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya
	mikonazol,	Daktarin cr, miconazole cr	Hipersensitif terhadap kandungan obat ini	Untuk mengobati infeksi kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur seperti panu,	Diolskan 2 x sehari	Reaksi Alergi	Disimpan ditempat yang sejuk dan terhindar dari cahaya matahari

				kurap, dan lain-lain			
	Klotrimazol	Fungiderm cr, neo ultracilin cr	Hipersensitif	Untuk mengobati infeksi jamur pada kulit dan kuku karena dermatofit, kandida, ragi dan jamur lainnya	Oleskan 2-3 kali sehari secara teratur selama 10-14 hari.	Rasa tersengat, eritema, edema, vesikasi, deskuamasi, pruritus, urtikaria, kulit melepuh, mengelupas.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya
Triazole	flukonazol, Itraconazole	Diflucan cap	Tidak disarankan untuk menggunakan obat ini pada orang dengan riwayat alergi atau hipersensitif pada fluconazole atau golongan azole.	Untuk mengobati infeksi jamur yang peka dan juga dapat digunakan untuk mencegah infeksi jamur pada pasien yang memiliki sistem imun lemah yang disebabkan oleh terapi kanker, transplantasi sumsum tulang belakang, atau penyakit seperti AIDS.	50 mg/hari, sampai 100 mg/hari.	Menggigil, feses berwarna seperti tanah liat, batuk, urin berwarna gelap, diare, kesulitan bernafas, pening, detak jantung cepat, demam, perasaan lelah atau lemah seluruh tubuh, sakit kepala	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya
	griseofulvin	Tidak ada					

(2.c) ANTIVIRUS

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
-----------------	------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------	-----------------------------	---------------------	--------------------

Obat HIV-AIDS	NRTI (zidovudine, abacavir),	Tidak ada					
	NNRTI (efavirenz, nevirapine),	Tidak ada					
	PI (saquinavir, indinavir)	tidak ada					
Herpes virus	acyclovir	Zoter	Tidak boleh digunakan untuk pasien yang hipersensitif pada acyclovir dan valacicovir.	Untuk mengobati infeksi herpes simplex pada kulit dan membran mukosa , pencegahan infeksi herpes simplex pada pasien immuno-compromised, infeksi herpes zoster	Dewasa: 800 mg 4-5x sehari selama 5-7 hari, anak >2 tahun: 20 mg/kgBB	kulit kemerahan, demam, sakit kepala, pusing, gangguan pencernaan, hepatitis, penyakit kuning, angioedema (pembengkakan pada jaringan bawah kulit), gangguan saraf reversibel, rambut rontok, rasa menyengat, terbakar, gatal.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya
Hepatitis B dan C	interferon,	Tidak ada					
	lamivudine	Heplav	Hipersensitif terhadap komponen obat	Digunakan untuk perawatan hepatitis b kronis serta infeksi HIV	Obat dapat diminum sebelum atau sesudah makan, dengan dosis sesuai dengan aturan pakai/resep dokter	infeksi saluran nafas bagian atas, mual, muntah, diare, nyeri perut; batuk; sakit kepala, insomnia; malaise, nyeri muskuloskeletal; gejala nasal; dilaporkan adanya neuropati perifer; pankreatitis	Simpan di tempat kering dan sejuk, serta terhindar dari panas sinar matahari langsung.

Influenza A dan Bvirus	amantadine,	Tidak ada					
	rimantadine,	tidak ada					
	oseltamivir	Oseltamivir	-	Sebagai profilaksis Influenza A dan, mengobati Influenza A dan B.	Dewasa: 75 mg 2 kali sehari selama 5 hari.	Mual, muntah, nyeri perut, insomnia, bronkitis, vertigo, diare, batuk, sakit kepala, lelah, angina tidak stabil, anemia, aritmia, perdarahan lambung, pneumonia, dispepsia.	Simpan di bawah suhu 30°C, terlindung dari cahaya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.

(2.d) ANTIPROTOZOA

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antiamoeba	metronidazole	trichodazol	Hipersensitivitas, diskrasia darah, penyakit sistem saraf pusat aktif, wanita hamil trimester 1	Untuk mengobati infeksi bakteri yang peka terhadap metronidazole	Dewasa diberikan 500 mg, 3 kali sehari selama 7 hari. Anak-anak diberikan 7.5 mg/kgBB, 3 kali sehari.	Gangguan GI, anoreksia, lidah kotor, mulut kering, rasa tidak enak, sakit kepala, pruritus, ruam kulit. Jarang : muntah, diare, efek neurologik, gangguan berkemih & urin berwarna gelap. Leukopenia. Neuropati perifer.	Simpan pada suhu kamar
Antimalaria	primaquine,	Tidak ada					

	artemisinin, doksisiklin	Tidak ada Interdoxin, siclidon	Hipersensitivitas terhadap doksisiklin atau tetrasiklin lainnya.	Untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang peka.	100-200 mg 2 x sehari selama 14 hari.	Mual, muntah, kulit memerah, urtikaria, diare, fotosensitivitas, peningkatan kadar urea darah, anemia hemolitik, trombositopenia, neutropenia, eosinofilia.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya
--	---------------------------------	--	--	---	---------------------------------------	---	---

(2.e) ANTELMINTIK

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antelmintik	albendazole, mebendazole,	Tidak ada Vermox tab	Pasien yang memiliki riwayat alergi/hipersensitivitas terhadap kandungan obat didalamnya	Untuk mengobati trikhuriasis (infeksi cacing cambuk usus), askariasis (infeksi cacing gelang), oxyuriasis (infeksi cacing kremi) dan	1 tablet sebagai dosis tunggal	Pusing, sakit kepala, mual, muntah, nyeri di bagian perut, diare, rasa kantuk, gatal, demam, angioedema, gangguan fungsi hati, hematuria, alopecia	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya

	pirantel pamoat, dietilkarbamazine (DEC), piperazine	combantrin	Hipersensitif	<p>ankilostomiasis/infeksi cacing tambang (A. duodenale dan N. americanus)</p> <p>Untuk mengobati infeksi (sebagai infeksi tunggal atau ganda) dari cacing kremi (Enterobius vermicularis), cacing gelang (Ascaris lumbricoides), cacing tambang (Ancylostoma duodenale), cacing tambang (Necator americanus), Trichostrongylus colubriformis dan Trichostrongylus orientalis</p>	<p>Anak 2-6 tahun : 1-2 tablet sehari. Anak 6-12 tahun : 2-3 tablet sehari. Anak >12 tahun : 3-4 tablet sehari.</p>	<p>Anoreksia (nafsu makan hilang), mual, muntah, diare, sakit kepala, pusing, mengantuk dan merah-merah pada kulit, keringat dingin, berkeringat, pruritus, urtikaria.</p>	<p>Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya</p>
--	--	------------	---------------	---	--	--	--

(2.f) OBAT TB

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat TB	Rifampisin, etambutol, isoniazid, pirazinamid	Pro TB 4	Penderita hipersensitif, penderita gangguan saluran empedu, serta selama kehamilan trimester pertama.	Untuk penanganan TBC dan infeksi mikobakterial oportunistik tertentu	Pasien dengan berat >71 kg 5 tablet / hari Pasien dengan berat 55-70 kg 4 tablet / hari Pasien dengan berat 38-54 kg 3 tablet / hari Pasien dengan berat 30-37 kg 2 tablet / hari. Harus diminum sekali sehari.	Urine dan keringat menjadi merah, gangguan hati, gangguan lambung, nyeri sendi, gatal-gatal dan gangguan pendengaran.	Simpan di tempat yang sejuk dan terhindar dari cahaya matahari

(3) ANTIHISTAMIN DAN ANTIALERGI

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Generasi I	chlorpheniramine,	Alleron	Hipersensitif terhadap kandungan obat.	Digunakan untuk mengobati alergi rhinitis, konjungtivitis, urticaria, gatal-	Dewasa : 4 mg tiap 4-6 jam; maksimal 24 mg/hari. Anak di bawah 1	sedasi, gangguan saluran cerna, efek antimuskarinik, hipotensi, kelemahan otot,	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya

				gatal karena gigitan serangga, alergi eksema dan dermatitis	tahun tidak dianjurkan; 1-2 tahun 1 mg 2 kali sehari; 2-5 tahun 1 mg tiap 4-6 jam, maksimal 6 mg/hari; 6-12 tahun 2 mg tiap 4-6 jam, maksimal 12 mg/hari.	tinnitus, euforia, nyeri kepala, stimulasi SSP, reaksi alergi, kelainan darah.	
	diphenhyramine	Tidak ada					
Generasi II	Ketotifen,	Intifen, Profilas	Hipersensitif, penggunaan bersama antidiabetik oral	Digunakan untuk profilaksis terhadap asma bronkial.	Dewasa: 1-2 tablet, 2 kali sehari. Anak dengan berat badan > 35 kg: 1 tablet 2 kali sehari	Mengantuk, sedasi, peningkatan berat badan, mulut kering, pusing.	Simpan di tempat kering dan sejuk, serta terhindar dari panas sinar matahari langsung
	loratadine,	Alloris	Hipersensitif terhadap kandungan obat.	Digunakan untuk mengobati bersin, hidung berair, mata berair, gatal-gatal, ruam kulit, gatal, dan gejala pilek atau alergi lainnya. Loratadine juga digunakan untuk	Dewasa dan anak >6 tahun: 10 mg 1 kali sehari atau 5 mg setiap 12 jam. Anak 2-5 tahun: 5 mg 1 kali sehari	Sakit kepala, sulit tidur, merasa gelisah, dan kelelahan, mulut kering, tukak lambung, penurunan nafsu makan, pusing, kejang.	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari kelembaban.

				mengobati gatal-gatal kulit dan gatal pada orang dengan reaksi kulit kronis.			
	cetirizine	Alergin, incidal	Hipersensitivitas terhadap cetirizine atau hydroxizine, dan pasien yang sedang menyusui.	Digunakan untuk terapi rinitis alergi musiman dan tahunan, urtikaria kronik.	Dewasa dan anak >6 tahun: Dosis awal diberikan 5 atau 10 mg 1 kali perhari. Pasien dengan gangguan ginjal dan hati, serta pasien lanjut usia: 5 mg 1 kali perhari	Mengantuk, pusing, sakit kepala, agitasi, mulut kering, dan rasa tidak nyaman pada saluran cerna, reaksi hipersensitivitas, termasuk reaksi kulit dan angioedema.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya
Generasi III	Desloratadin	Aerius	Pasien yang hipersensitif terhadap Komponen obat	Untuk mengobati gejala alergi seperti, bersin-bersin, mata berair, hidung berair. Obat ini juga digunakan untuk mengobati bentol-bentol dan gatal-gatal pada kulit pada pasien yang memiliki reaksi alergi kulit kronis.	1 kali 1 tablet per hari.	Reaksi alergi berlebihan seperti batuk, sulit menelan, kepala pening, detak jantung cepat, bentol-bentol, gatal-gatal, pembengkakan pada kelopak mata, bibir dan lidah, kulit kemerahan	Simpan pada suhu 25-30°C, terlindung dari kelembaban.

(4) SITOSTATISTIKA

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Sitostatika	siklofosfamid,	Tidak ada					
	doksorubisin,	Tidak ada					
	5- fluorourasil,	Tidak ada					
	carboplatin,	Tidak ada					
	metroteksat	Tidak ada					

(5) OBAT SISTEM SARAF

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat hipnotik sedatif/antiansietas	benzodiazepin (alprazolam, diazepam, lorazepam, nitrazepam),	Xanax, Valisanbe	Memiliki masalah hati atau ginjal.	menangani ansietas, spasme otot, tetanus, kejang, insomnia, premedikasi sebelum anestesi, sedasi sebelum tindakan, dan gejala putus alkohol.	Dewasa: 2-10 miligram (mg), 2 sampai 4 kali sehari. Anak-anak usia 6 bulan ke atas: Awalnya, 1 hingga 2,5 mg, 3 atau 4 kali per hari.	Mengantuk, pusing, kelelahan, penglihatan kabur, atau ketidakstabilan	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya
	barbiturat (fenobarbital),	Tidak ada					
	lainnya (buspiron)	Tidak ada					
Obat analgetik sentral	fentanil,	tidak ada					
	petidin,	Tidak ada					
	morfin,	Tidak ada					

	nalokson.	Tidak ada					
Obat antidepresan	amitriptilin, imipramin, fluoksetin, setralin	Tidak ada					
Obat anestesi lokal	bupivakain, lidokain	Tidak ada					
Obat sistem sarafotonom (antikolinergik, kholinergik)	prostigmin, pilokarpin, atropin, pirenzepin, ipratropium, skopolamin, triheksifenidil	Tidak ada					
Obat sistem sarafotonom (adrenergik, antiadrenergik)	klonidin, fenilefrin, noradrenalin, adrenalin, fenoterol, terbutalin,	Tidak ada Berotec Lasmalin	Pasien yang hipersensitif terhadap Komponen obat Peningkatan kadar tiroid (Tirotoksikosis).	Asma bronkial, bronkitis obstruktif, emfisema, asma disebabkan suatu gerakan olahraga dan kelainan bronkopulmonari Untuk pengobatan asma bronkial, bronkitis kronik,	Episode asma akut : 1 semprot. Pencegahan asma : 1-2 semprot, maksimal 8 semprot/hari. Dewasa: 1-2 tablet, 2-3 kali sehari.	Reaksi hipersensitivitas; hipokalemia; agitasi, gugup; tremor, sakit kepala, pusing; iskemia miokard, aritmia, takikardia, palpitasi; bronkospasme paradoks, batuk Tremor dan palpitasi	Simpan di tempat yang sejuk dan terhindar dari cahaya matahari Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta

	salbutamol,	Lasal, ventolin	Penderita yang hipersensitif terhadap salbutamol.	emfisema dan penyakit paru lain dimana bronkospasme sebagai komplikasi Digunakan untuk mengobati asma (memperbaiki aliran pernapasan), bronkitis kronis dan emfisema.	Maksimal 15 mg per hari. Anak 7-15 tahun: 1 tablet, 2-3 kali sehari Dewasa: 2-4 mg 3-4 kali sehari. Anak 6-12 tahun: 2 mg 3-4 kali sehari. Anak 2-6 tahun: 1-2 mg 3-4 kali sehari	Tremor, tensi meningkat, kecepatan detak jantung meningkat, nausea, sakit kepala, palpitasi, vasodilatasi periferal, dan hipokalemi yang kadang-kadang timbul sesudah pemberian dosis tinggi.	terlindung dari cahaya Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya
	propranolol,	Propranolol	Riwayat asma bronkial, bronkospasme, penyakit saluran napas obstruktif kronik, bradikardia, syok kardiogenik, hipotensi, asidosis metabolik, gangguan	Digunakan untuk menangani tremor, angina (nyeri dada), hipertensi (tekanan darah tinggi), gangguan ritme jantung. Propranolol juga digunakan untuk mencegah dan mengatasi serangan jantung dan	40-80 mg 2x sehari	Propranolol memiliki beberapa efek samping yang tidak diinginkan seperti mual muntah, diare, konstipasi, kram perut, impotensi, penurunan sex	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya

	atenolol,	Internolol, betablok	sirkulasi arteri perifer	mengurangi frekuensi migrain.			
	prazosin	Tidak ada	Sinus, bradikardi, gagal jantung, asma parah, syok kardiogenik, asidosis metabolik, gangguan sirkulasi darah perifer yang parah, penyumbatan pembuluh darah jantung derajat 2 atau 3.	Angina, hipertensi, menurunkan tekanan darah sehingga dapat mencegah stroke, serangan jantung, dan masalah pada ginjal.	25-100 mg sehari sekali.	Kepala terasa berputar, kepala terasa ringan, kelelahan, mual, detak jantung sangat lambat, pusing parah, wajah pucat, kesulitan bernafas, jari tangan/kaki membiru	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya


--	--	--	--	--	--	--	--

(6) OBAT KARDIOVASKULAR

(6.a) Obat antihipertensi

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Diuretik	Furosemid	Furosemid, lasix	Pasien dengan kondisi gagal ginjal akut, hiperkalemia, hiperurikemia	Edema jantung, ginjal, dan hati, edema perifer karena obstruksi mekanis atau insufisiensi vena dan hipertensi	Dewasa: 20-80 mg dosis tunggal. Anak-anak: 1-2 mg/kg berat badan (BB) dosis tunggal.	Rasa tidak enak pada perut, hipotensi ortostatik, gangguan saluran pencernaan, pandangan kabur, pusing, sakit kepala	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya
	HCT	HCT	Simpan pada tempat sejuk dan	hipertensi, gagal jantung, dan	Dewasa : 12,5–50 mg/hari,	pusing	Simpan pada tempat sejuk dan

			<p>kering, serta terlindung dari cahaya</p>	<p>mengurangi edema akibat berbagai penyakit, seperti sirosis hepatis.</p>	<p>peroral, diberikan sekali sehari. Anak : 1-3 mg/kgBB/hari, dosis maksimal 3 mg/kgBB/hari atau 100 mg/hari</p>		<p>kering, serta terlindung dari cahaya</p>
--	--	--	---	--	--	--	---



	Spironolakton	spironolakton	Pasien dengan riwayat dan penyakit gagal ginjal berat, hiperkalemia, pemakaian bersama kalium atau terapi diuretika hemat kalium.	Digunakan untuk mengobati penyakit jantung, tekanan darah tinggi, penurunan kalium dalam darah (hipokalemia).	200-400 mg/hari	Spironolakton memiliki efek samping seperti mual muntah, diare, payudara membesar, pusing, sakit kepala, impotensi dan kram kaki, ngantuk, gangguan saluran pencernaan, ataksia.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya
	Amilorid	Tidak ada					
CCB	Amlodipine	Amlodipin, tensivask, norvask	Hipotensi berat, syok kardiogenik, obstruksi saluran keluar ventrikel	Digunakan sebagai terapi angina stabil kronis, hipertensi, angina Prinzmetal.	Dewasa maksimal 10 mg sekali sehari; Anak-	Hipotensi, sakit pada dada, mual, diare, sembelit, sakit perut, kelelahan, sakit	Simpan pada suhu 15-30°C, terlindung dari cahaya.

			kiri, gagal jantung setelah infark miokard akut.		anak 6-17 tahun: 2,5 mg sekali sehari	punggung, sakit kepala, pusing, mengantuk.	
	Nifedipin	Nifedipin, nifedipin	Bradikardi, syok kardiogenik, hipotensi, asidosis metabolik, gangguan sirkulasi arteri perifer	Digunakan untuk mengobati hipertensi (tekanan darah tinggi) dan mencegah angina.	10-20 mg 3 kali sehari.	Sakit kepala atau perasaan tertekan di kepala, flushing, pusing, gangguan lambung, mual, lemas, palpitasi, hipotensi, hipertensi ortostatik, edema tungkai,	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya
	Verapamil	Tidak ada					
	Nicardipine	Tidak ada					
ARB	Losartan, Valsartan,	Tidak ada Diovan	Hipersensitif, gangguan fungsi hati berat, wanita hamil, obstruksi empedu.	Digunakan untuk mengatasi tekanan darah tinggi (hipertensi) pada dewasa dan anak usia 6 tahun atau lebih.	Dosis maksimal diberikan 320 mg 1 kali sehari	Kelelahan, sakit kepala, diare, mimisan, trombositopenia, nyeri sendi.	Simpan di tempat yang kering pada suhu di bawah 30°C dan terlindung dari cahaya matahari langsung.
	Candesartan,	Canderin	Hipersensitif terhadap candesartan. Gangguan hati yang berat	membantu menangani tekanan darah tinggi (hipertensi), serta gagal jantung dan gangguan fungsi	Dosis awal: 4 mg per hari, dapat ditingkatkan	Pusing. Bengkak pada kaki. Peningkatan kadar trigliserida.	Simpan di tempat yang kering pada suhu di bawah 30°C dan terlindung

			<p>dan/atau ketoasidosis. Wanita hamil dan menyusui.</p>	<p>sistolik ventrikel kiri jika ACE inhibitor tidak ditoleransi.</p>	<p>menjadi 16 mg per hari.</p>	<p>Hiperurisemia (peningkatan asam urat). Lemas. Sakit maag. Diare. Mual. Nyeri sendi. Sakit punggung.</p>	<p>dari cahaya matahari langsung.</p>
Irbesartan,	Irvell		<p>Penggunaan bersama aliskiren pada pasien dengan diabetes dan kerusakan ginjal (GFR <60 ml/menit), wanita hamil</p>	<p>Digunakan untuk mengobati tekanan darah yang tinggi. Irbesartan dapat juga digunakan untuk mengatasi gangguan ginjal yang disebabkan oleh diabetes tipe 2.</p>	<p>150 mg sekali sehari, dapat ditingkatkan menjadi 300 mg sekali sehari jika dibutuhkan.</p>	<p>Menggigil, keringat dingin, kebingungan, pening, nyeri pada kandung kemih, urin mengandung darah atau keruh, kesulitan berkemih, detak jantung tak beraturan, sering berkemih, nyeri punggung, mual, muntah.</p>	<p>Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya</p>
Telmisartan	Micardis		<p>hipersensitivitas, kehamilan trimester dua dan tiga, menyusui, gangguan obstruktif empedu, gangguan hati berat</p>	<p>Untuk pengobatan hipertensi esensial</p>	<p>Dewasa : 40 mg 1 kali per hari. Maksimal 80 mg 1 kali per hari.</p>	<p>Selain memiliki efek yang diinginkan, telmisartan memiliki beberapa reaksi yang tidak diinginkan seperti, hidung tersumbat, sinus, nyeri punggung, diare.</p>	<p>Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya</p>

ACEI	Kaptopril	Tensicap	Tidak boleh diberikan kepada pasien hipersensitif terhadap penggunaan obat golongan ACE inhibitor.	Digunakan untuk mengobati hipertensi ringan sampai sedang dan untuk gangguan gagal jantung kongestif	Awal diberikan 12.5-25 mg, 3 kali sehari, dapat dinaikkan hingga 50 mg, 2-3 kali sehari setelah 1-2 minggu	Efek samping yang dapat timbul adalah nyeri dada, urin keruh, jantung berdebar debar, detak jantung tidak teratur, proteinurea pada penderita penyakit ginjal, hipotensi, ruam, dan pruritis.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya.
	Lisinopril	Lisinopril	jangan berikan obat ini pada pasien yang memiliki riwayat angiodema dengan pengobatan ACE inhibitor	Digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi (hipertensi) pada orang dewasa dan anak-anak yang berusia minimal 6 tahun. Lisinopril juga digunakan untuk mengobati gagal jantung pada orang dewasa atau untuk pengobatan setelah mengalami serangan jantung.	Dosis awal: 10 mg per hari. Dosis pemeliharaan: 20 mg 1 kali sehari, dapat diberikan hingga 80 mg per hari jika diperlukan	Pusing atau kepala terasa ringan terutama saat bangkit dari posisi duduk atau berbaring, hipotensi, ruam, pruritis, proteinurea pada penderita penyakit ginjal.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya
	Ramipril	Ramipril	riwayat angioderma, gagal ginjal dengan hemodialisis,	Untuk pengobatan hipertensi dan gagal jantung kongestif	2.5-5 mg/hari hingga 10 mg/hari jika diperlukan.	sakit kepala, batuk, pusing, lemah, mudah capek.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya

			penggunaan bersamaan dengan aliskiren pada pasien dengan diabetes mellitus atau gangguan ginjal sedang hingga berat				
Beta blocker	Atenolol,	Internolol	Sinus, bradikardi, gagal jantung, asma parah, syok kardiogenik, asidosis metabolik, gangguan sirkulasi darah perifer yang parah, penyumbatan pembuluh darah jantung derajat 2 atau 3.	Angina, hipertensi, menurunkan tekanan darah sehingga dapat mencegah stroke, serangan jantung, dan masalah pada ginjal.	25-100 mg sehari sekali.	Kepala berputar, terasa ringan, kelelahan, mual, detak jantung sangat lambat, pusing parah, wajah pucat, kesulitan bernafas, jari tangan/kaki membiru, perubahan mood/mental. Segera temui dokter jika terjadi efek samping tersebut.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya
	propranolol,	Propranolol	Riwayat asma bronkial, bronkospasme, penyakit saluran napas obstruktif kronik, bradikardia, syok	Digunakan untuk menangani tremor, angina (nyeri dada), hipertensi (tekanan darah tinggi), gangguan ritme jantung.	Dosis awal 40-80 mg 2x sehari, rentang pada umumnya 160-320 mg/hari, dosis	mual muntah, diare, konstipasi, kram perut, impotensi, penurunan sex, susah mengalami orgasme, insomnia, perasaan lelah.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya

			kardiogenik, hipotensi, asidosis metabolik, gangguan sirkulasi arteri perifer berat	Propranolol juga digunakan untuk mencegah dan mengatasi serangan jantung dan mengurangi frekuensi migrain.	maksimal 640 mg/hari		
	bisoprolol	Bisovell, opiprol, concor	Tidak boleh digunakan untuk pasien dengan kondisi syok pada jantung, gagal jantung, sumbatan pada pembuluh darah jantung, mengalami bradikardi dan hipotensi	Digunakan untuk hipertensi, bisa digunakan sebagai monoterapi atau dikombinasikan dengan antihipertensi lain.	5-10 mg sehari sekali	nyeri badan, nyeri dada, menggigil, batuk, sulit bernafas, telinga tersumbat, demam, sakit kepala, suara hilang, hidung tersumbat	Simpan pada suhu 20-25°C. Terlindung dari kelembaban.
Alfa blocker	Prazosin, hidralazin	Tidak ada tidak ada					
Sentral	Metildopa,	Dopamet	Pasien yang memiliki riwayat hipersensitifitas pada metildopa dan penyakit hipotensi	Untuk mengobati hipertensi (tekanan darah tinggi), hipertensi pada taraf permulaan kehamilan	Dosis awal 250 mg untuk 2 hari dengan interval waktu minimal 2 hari. Dosis pemeliharaan: 500-2000 mg/hari. Dosis maksimal 3000 mg/hari.	Demam, pembengkakan kaki, depresi, cemas, mimpi buruk, urin berwarna gelap atau kecoklatan, diare, kram lambung berkelanjutan, demam atau panas dingin	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya

	klonidin	Tidak ada					
--	----------	-----------	--	--	--	--	--

(6.b) OBAT ANTIANGINA

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat antiangina	Isosorbide dinitrate,	Cedocard	Pasien yang hipersensitif terhadap Komponen obat	Digunakan untuk mengobati dan mencegah serangan nyeri dada (angina).	20-120 mg/hari dalam dosis terbagi. Maksimal: 240 mg/hari.	Pening, sakit kepala, tenggorokan serak, detak jantung yang tidak beraturan.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya
	nitrogliserin	Tidak ada					

--	--	--	--	--	--	--	--

(6.c) OBAT GAGAL JANTUNG KONGESTIF

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat gagal jantung kongestif	Digoksin	Fargoxin, digoxin	Pasien dengan kondisi Takikardia/fibrilasi ventrikel, kardiomiopati obstruktif hipertrofik, amiloidosis jantung, perikarditis konstrikatif Aritmia akibat keracunan obat golongan glikosida jantung AV blok derajat 2	Digunakan untuk mengobati gagal jantung. Digoxin juga digunakan untuk mengobati fibrilasi atrial (denyut jantung tidak teratur dan sering kali cepat yang umumnya menyebabkan aliran darah tidak lancar).	Dosis awal: 0.75-1.5 mg dalam 24 jam pertama. Digitalisasi lambat: 250 mcg 1-2 kali sehari.	Pening, wajah pucat, detak jantung cepat atau tidak teratur, detak jantung melemah, feses berwarna gelap, gusi berdarah, darah dalam urin atau feses, muntah darah, bintik kemerahan pada kulit, sakit perut parah, pendarahan atau memar yang tidak biasa.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya

(6.d) ANTIPLATELET

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antiplatelet	Asetosal,	Aspilet, cardio aspirin	Pasien yang hipersensitif terhadap komponen obat	Digunakan untuk meredakan nyeri ringan sampai sedang, meredakan	75-325 mg/hari	Gangguan pencernaan, perpanjangan waktu pendarahan, rhinitis	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta

	klopidogrel	Plavix, cpg	<p>Tidak boleh diberikan kepada pasien dengan kondisi pendarahan patologis aktif misalnya tukak lambung atau pendarahan intrakranial (tengkorak kepala), hipersensitif, pendarahan patologis aktif misalnya ulkus peptik, pendarahan intrakranial,</p>	<p>demam dan untuk dosis tertentu dapat digunakan untuk membantu mencegah infark miokard/kerusakan pada otot jantung.</p> <p>Mencegah kejadian aterotrombosis pada pasien yang menderita infark miokard, stoke iskemik, atau penyakit arteri perifer tahap lanjut</p>	75 mg sehari sekali.	<p>(iritasi selaput lendir hidung), urtikaria (biduran) dan gangguan epigastrik (gangguan asam lambung), angioedema (pembengkakan pada kulit), telinga berdenging, bronkospasma (pembengkakan bronkus).</p> <p>Hematoma, mimisan, diare, nyeri lambung, nyeri perut, memar, pendarahan pada daerah luka bekas tusukan, sakit kepala, pusing, gangguan parestesia, gastrointestinal dan hematologi, ruam, pruritus.</p>	<p>terlindung dari cahaya</p> <p>Simpan pada tempat sejuk, kering dan terlindung dari cahaya</p>
--	-------------	-------------	--	---	----------------------	--	--

			penurunan fungsi hati yang berat, ibu hamil dan menyusui.				
--	--	--	---	--	--	--	--

(6.e) OBAT DYSLIPIDEMIA

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat dyslipidemia	Simvastatin, atorvastatin,	Cholestet, simvastatin Atorvastatin, lipitor, truvas	<p>Pasien dengan riwayat penyakit hati atau peningkatan serum transaminase yang tidak diketahui penyebabnya, wanita hamil dan menyusui</p> <p>Pasien yang memiliki riwayat alergi/hipersensitivitas terhadap atorvastatin. Memiliki penyakit hati aktif, atau kenaikan serum transaminase > 3 x batas normal tertinggi. Ibu Hamil & Ibu menyusui</p>	<p>Untuk menurunkan kadar kolesterol tinggi (hiperkoleterolemia)</p> <p>Digunakan sebagai tambahan untuk menurunkan kadar kolesterol total, LDL, apolipoprotein B, dan trigliserida yang meningkat pada pasien dengan hiperkoleterolemia</p>	<p>Untuk menurunkan kadar kolesterol tinggi (hiperkoleterolemia)</p> <p>Digunakan sebagai terapi tambahan untuk menurunkan kadar kolesterol total, LDL, apolipoprotein B, dan trigliserida yang meningkat</p>		

	fenofibrate,	Lipantyl, fibesco	Hipersensitivitas, gangguan kandung empedu, pankreatitis, gangguan ginjal dan hati, wanita hamil dan menyusui, serta anak	Fenofibrate digunakan untuk mengobati kolestrol yang tinggi dan kadar trigliserida yang tinggi.	pada pasien dengan hiperkolester olemia Fenofibrate digunakan untuk mengobati kolestrol yang tinggi dan kadar trigliserida yang tinggi.	
	gemfibrozil,	Hypofil	Hipersensitivitas, gangguan fungsi hati berat, gangguan fungsi ginjal, penyakit kantung empedu, pemberian bersama simvastatin dan golongan HMG- CoA reductase inhibitor lainnya.	Untuk pengobatan hiperkolesterolemia, dislipidemia campuran dan hipertrigliseridemia	Untuk pengobatan hiperkolester olemia, dislipidemia campuran dan hipertrigliseri demia	
	ezetimib	Tidak ada				

(6.f) OBAT ANTIARITMIA

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat antiaritmia	Amiodaron	Kendaron	Jangan gunakan obat ini pada pasien dengan riwayat gangguan tiroid, sensitif terhadap iodin, gagal napas berat, kolaps pembuluh darah, hipotensi berat, shock kardiogenik (syok jantung), sinus bradikardi (detak jantung lebih lambat dari normal), ibu menyusui.	Digunakan untuk terapi supraventrikular (meningkatnya kecepatan denyut jantung) dan ventrikular aritmia (gangguan irama jantung yang penyebabnya di bagian bilik bawah jantung/ventrikel). Dan juga digunakan untuk pasien yang mengalami pulseless ventrikular takikardi (henti jantung).	Awal 600 mg per hari untuk 8-10 hari. Dosis pemeliharaan: 100-400 mg per hari, 5 hari dalam 1 minggu	Bradikardi (detak jantung lebih lambat), hipotensi, neuropati perifer (kerusakan sistem saraf tepi), tekanan intrakranial (peningkatan tekanan pada tengkorak kepala) meningkat	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya

7. OBAT SALURAN CERNA

(7.a) Obat gastritis dan tukak lambung

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antasida	Al(OH) ₃ , Mg(OH) ₂ ,	Promag, mylanta,	Sakit perut yang parah dan/atau	Digunakan untuk mengurangi gejala	Dewasa : 1-2 tablet 3-4 kali	Sembelit, diare, mual dan muntah	Simpan pada tempat sejuk

	natrium bikarbonat	polysilane, plantacid tidak ada	kemungkinan obstruksi usus. Pasien yang sangat lemah. Gagal ginjal.	yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung gastritis, tukak lambung, tukak usus 12 jari, dengan gejala seperti mual, nyeri lambung, nyeri pada ulu hati	perhari. Anak 6-12 tahun : 1/2 -1 tablet 3-4 kali perhari. Diminum setelah makan dan menjelang tidur		dan kering, serta terlindung dari cahaya
H ₂ Bloker	Simetidin ranitidin	Sanmetidin Rantin	Hipersensitif simetidin Tidak boleh diberikan pada pasien dengan riwayat akut porfiria (kelainan genetik sehingga pembentukan heme tidak sempurna), penderita	Untuk terapi pada tukak lambung dan usus 12 jari, sindroma Zollinger-Ellison, serta Hipersekresi lambung Untuk terapi pada tukak lambung, usus dua belas jari, hipersekresi patologis sehubungan dengan sindrom Zollinger-Ellison	1-2 tablet, 3-4 kali sehari, Minimal selama 4 minggu. Dosis awal 300 mg sebelum tidur atau 150 mg 2x sehari selama 4-8 minggu. pemeliharaan 150 mg sebelum tidur. Dosis	Sakit kepala, diare, alopesia, lelah, nyeri otot, pusing. sakit kepala biasa hingga berat, pusing, insomnia, penurunan gairah sex, pembengkakan dada pada lelaki, mual muntah, nyeri perut, nyeri otot, diare, ruam kulit, malaise,	Simpan di tempat kering dan sejuk, serta terhindar dari panas sinar matahari langsung Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya

	famotidin	Famocid	gangguan fungsi ginjal, wanita hamil dan menyusui Jangan menggunakan obat ini jika memiliki riwayat hipersensitif pada famotidine	Untuk mengurangi tukak usus 12 jari aktif, terapi pemeliharaan tukak usus 12 jari aktif, hipersekresi patologis seperti sindrom Zollinger Ellison dan adenoma endokrin berganda	maksimal 300 mg 2x sehari 1 kali 40 mg per hari sebelum tidur atau 2 kali 20 mg per hari selama 4-8 minggu.	nausea, dan konstipasi. Reaksi hipersensitifitas dan hematologikal, serta rasa tidak enak pada lambung usus	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya
PPI	Omeprazol	Pumpitor, omz	Hipersensitif terhadap kandungan obat ini. Penggunaan bersama dengan obat nelfinavir atau rilpivirine.	Terapi jangka pendek ulkus duodenum yang tidak responsif terhadap obat antagonis reseptor H2. Terapi jangka pendek ulkus gaster. Refluks esofagitis erosif atau ulseratif yang sudah didiagnosa melalui endoskopi. Terapi jangka lama untuk sindroma Zollinger-Ellison	20 mg sehari selama 2-4 minggu	Sakit kepala, diare, nyeri abdomen, mual, muntah, infeksi saluran nafas atas, vertigo, ruam, konstipasi, batuk, nyeri tulang belakang.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya

	lansoprazol,	Lancid, lasgan, lapraz	Jangan berikan obat ini pada pasien yang menggunakan obat rilpivirine dan atazanavir.	Digunakan untuk mengobati dan mencegah ulkus lambung dan usus, erosi esofagitis (kerusakan pada kerongkongan akibat asam lambung), dan kondisi lain yang melibatkan asam lambung yang berlebihan.	15-30 mg 1 kali sehari di pagi hari selama 2-4 minggu.	Diare, gatal-gatal, Meningkat atau menurunkan nafsu makan, nyeri sendi, mual, sakit perut, muntah, kegelisahan, pilek, sembelit, batuk, depresi mental, nyeri otot, perdarahan dubur, pendarahan atau memar yang tidak biasa.	Simpan obat pada suhu ruang dan terhindar dari lembab, panas, dan cahaya.
	pantoprazol	Vomizole	Hipersensitivitas	Menghilangkan gejala dan terapi jangka pendek gangguan gaster dan pengurangan asam lambung; ulkus duodenal; ulkus gaster; refluks esofagitis sedang dan berat	40 mg sehari sekali selama 4-8 minggu	Sakit kepala, diare. Jarang, mual, nyeri perut bagian atas, kembung, ruam kulit, pruritus, pusing	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung

Pelindung mukosa	Sukralfat	Episan	Hipofosfastemia, reaksi alergi	Terapi jangka pendek tukak duodenum (hingga 8 minggu).	2 sendok takar (10 mL) 4 kali perhari. Sebaiknya diberikan pada saat perut kosong: Berikan pada saat perut kosong 1 jam sblm atau 2 jam sesudah makan.	Konstipasi & mulut kering; diare, mual, muntah, rasa tidak nyaman pada lambung, kembung, pruritus, ruam kulit, mengantuk, vertigo, nyeri punggung, & sakit kepala.	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung

Antiflatulen	Dimetilpolisiloksan	Disflatyl	Hipersensitiv, aritmia, hipokalsemia	Mengurangi penimbunan gas dalam saluran cerna, perasaan penuh pada epigastrium, meteorismus sementara dan pasca operasi, sindrom gastrokardiak, persiapan pemeriksaan dengan sinar X dan sebelum gastroskopi	Dewasa : 1-2 tablet dikunyah sesudah makan dan sebelum tidur. Persiapan untuk pemeriksaan sinar X, 1-2 tablet 2-3 hari sebelum pemeriksaan.	Terjadi sesuai masing-masing individu	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung

Analog prostaglandin	Misoprostol	Gastrul	Hamil, merencanakan kehamilan, penyakit jantung, diare	Tukak lambung, tukaka duodenum, pencegahan tukak akibat oains	2 - 4 kali sehari 1 tablet	Mual , muntah, kembung, diare	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung

--	--	--	--	--	--	--	--

(7.b) Obat antidiare

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antimotilitas	Loperamid	Lodia	kolitis akut, hamil, menyusui	Diare akut non spesifik dan diare kronik	Diare akut non spesifik Dosis awal 2 tablet, selanjutnya dapat dikonsumsi setiap setelah BAB 1-2 tablet 1-2 x/hari. Maksimal 8 tablet per hari. Diare kronik Dosis awal 2 tablet,	Nyeri abdomen, megakolon toksik, pusing, lelah, ruam kulit	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung

					<p>lalu dapat dikonsumsi kembali setiap setelah BAB 2-4 tablet /hari dalam dosis terbagi. Maksimal 8 tablet/ hari. Bila setelah 48 jam tdk ada perbaikan, hentikan terapi.</p>		
Adsorben	Kaolin pektin, attapulgit	omegdiar	Jangan berikan pada pasien yang hipersensitif terhadap kandungan obat, kondisi konstipasi, obstruksi usus	Digunakan untuk mengobati diare non-spesifik.	<p>Dewasa dan anak-anak 12 tahun keatas: 2 tablet setiap setelah buang air besar (maksimum penggunaan 12 tablet dalam 24 jam). Anak-anak 6-12 tahun: 1 tablet setiap setelah buang air besar (maksimum penggunaan 6</p>	<p>Terjadinya ketidakseimbangan elektrolit dengan meningkatkan kehilangan natrium dan kalium dalam tinja.</p>	<p>Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>

					tablet dalam 24 jam).		
Antisekresi	Bismut subsalisilat	scantoma	Hamil, menyusui, merencanakan kehamilan, reaksi alergi obat	Untuk gangguan pencernaan seperti diare, mulas, mual, dan sakit perut. Dapat mengikat racun penyebab diare di saluran cerna.	Untuk pengobatan diare/mencoret non-spesifik: Dewasa/usia diatas 12 tahun : 1 tablet Diberikan tiap 30 menit - 1 jam, bila perlu diulang sampai 8 dosis dalam 24 jam.	Muntah berwarna hitam, BAB berdarah atau berwarna hitamSakit perut yang parah, Telinga berdenging atau tuli mendadak	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung

(7.c) Obat laksatif

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Laksatif osmotikgaram	Mg sulfat	Tidak ada					
Laksatif osmotik alkohol/gula tdk dicerna	Gliserin,	laxadine	Hindari penggunaan jangka lama dan terus menerus karena dapat mengakibatkan tubuh menjadi kekurangan cairan dan elektrolit, kelemahan otot, dan penurunan BB. Hentikan	pelicin jalannya feses (kotoran), penambahan volume feses (kotoran) secara sistematis sehingga mudah dikeluarkan	>12 th: 1 x sehari 1-2 sendok makan, 6-12 th: 1 x sehari 0.5-1 sendok makan	reaksi alergi kulit rash dan pruritus, perasaan terbakar, kolik, kehilangan cairan & elektrolit, diare, mual dan muntah	Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari

			penggunaan jika terjadi gangguan usus misalnya mual dan muntah. Hamil, laktasi, anak < 6 tahun, lanjut usia				
	laktulosa	Dulcolatol	Penderita DM. Hamil dan menyusui. Lanjut usia.	Konstipasi kronik.	Dewasa : Konstipasi ringan : Awal 15 ml/hari, pemeliharaan 10 ml/hari. Konstipasi sedang : Awal 15-30 ml/hari, pemeliharaan 10-15 ml/hari. Konstipasi berat : Awal 15 ml 2x/hari, pemeliharaan 15-25 ml/hari. Anak 5-10 tahun : Awal 10 ml 2x/hari, pemeliharaan 10 ml/hari. Anak 1-5 tahun : Awal 5 ml 2x/hari, pemeliharaan 5-10 ml/hari.	Diare, Kehilangan cairan, Hipokalemia, Hiponatremia, Mual, Muntah, Rasa tidak nyaman pada perut.	Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari

					Anak < 1 tahun : Awal 2,5 ml 2x/hari, pemeliharaan 2,5-5 ml/hari.		
Laksatif stimulan	Turunan difenilmetan (bisakodil, fenolftalein), antrakuinon	Dulcolax	pasiun ileus, obstruksi usus, radang usus	untuk mengatasi konstipasi	> 12 th: 2-3 tablet sekali sehari, 6-12 th: 1 tablet sekali sehari	rasa tidak enak pada perut termasuk kram, sakit perut dan diare	Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari

(7.d) Antiemetik

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antiemetik	Dimenhidrinat,	dimenhidrinat	Penggunaan dengan antibiotik dapat menyebabkan ototoksitas. Dapat mengganggu kemampuan untuk mengendarai & mengoperasikan mesin.	Mencegah & menghilangkan mabuk perjalanan & mengobati vertigo, mual atau muntah akibat terapi eletrosyok, anestesi & pembedahan, gangguan labirintin, mual akibat radiasi & sindroma setelah fenestrasi.	Mual muntah vertigo, mabuk perjalanan: Dewasa: 50-100 mg setiap 4-6 jam. Maksimal: 300-400 mg setiap hari. Untuk pencegahan mabuk perjalanan,	Mengantuk , Mulut kering, pusing, sakit kepala.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung.

	ondansetron	Narfoz	hipersensitif terhadap ondansetron	menangani mual dan muntah yang diinduksi oleh kemoterapi dan radioterapi sitotoksik	berikan waktu 30 menit hingga 1 jam sebelum beraktivitas. Anak: 2-5 tahun 12,5-25 mg setiap 6-8 jam. Maksimal: 75 mg setiap hari; 6-<12 tahun 25-50 mg setiap 6-8 jam. Maksimal: 150 mg setiap hari; 12 tahun atau lebih sama dengan dosis dewasa.	2 x sehari 8 mg	sakit kepala, sensasi kemerahan atau hangat pada kepala.	Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
--	-------------	--------	------------------------------------	---	--	-----------------	--	---

	metoklorpramide	metoklorpramide	pasien dengan neurologis, gangguan konduksi jantung, bradikardi, gangguan ginjal dan hati, lansia, anak-anak, ibu hamil dan menyusui.	mual dan muntah akibat kemoterapi dan radioterapi kanker, GERD, refluks esofagitis	mual & muntah: 3 kali sehari 10mg. maks. 5 hari. GERD: 4 kali sehari 10-15mg. refluks esofagitis: 4 kali sehari 10-15mg. dapat ditingkatkan menjadi 20mg. maks. 12 minggu. lansia: 5mg/ dosis	gelisah, mengantuk, pusing, rasa cemas dan bingung, tremor, sakit kepala, reaksi alergi	Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
--	-----------------	-----------------	---	--	---	---	---

(8) OBAT SALURAN NAPAS

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat Batuk	codein,	Codikaf	Pasien dengan keadaan koma, pasien yang mengkonsumsi alkohol, perut kembung, gagal hati	untuk mengatasi batuk kering (Cantatusif) dan mengatasi nyeri (analgetik) Obat ini termasuk dalam golongan narkotika	Dewasa 15-30 mg sebanyak 3-1 kali/hari	Mual, nuntah, Kesulitan buang air besar, mulut kering dan sakit kepala	Simpan di tempat sejuk dan kering, serta Terhindar dan sinar matahari dan jauhkan dari jangkauan anak

	dekstromethorphan, gliseril guaikolat,	Grantusif	Hipersensitivitas, gangguan fungsi hati, asma akut, dan laktasi.	Untuk mengobati batuk yang disertai alergi Obat ini dapat menyebabkan kantuk, sebaiknya tidak mengendarai kendaraan bermotor atau menjalankan mesin ketika mengkonsumsi obat ini	Dewasa dan Anak > 12 th 3 kali sehari 1 -2 kaplet. Anak 6-12 tahun 3 kali sehari 0.5-1 kaplet. Atau menurut petunjuk dokter Aturan Pakai Diberikan setelah makan	Mulut terasa kering. mengantuk, pusing, mual, konstipasi.	Simpan tempat di sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari dan jauhkan dari jangkauan anak
	bromheksin	Mucohexin	Tukak lambung	Batuk yang memerlukan ekspektoran	Dewasa dan anak > 10 tahun : 3 x sehari 1 tablet, anak 5-10 tahun : 3 x	Gangguan GI GI. Kenaikan transaminase sementara.	Simpan pada suhu ruangan, hindarkan dari sinar matahari langsung

	ambroxol	Epexol	Gangguan hati dan ginjal	sebagai sekretolitik pada gangguan pernapasan akut dan kronis, terutama pada eksaserbasi bronkitis kronis, bronkitis kronik dan asma bronkia	sehari 1/2 tablet, anak 2-5 tahun : 2 x sehari 1/2 tablet. 3 x sehari 1 tablet	efek gastrointestinal ringan, reaksi alergi	Simpan pada suhu ruangan, hindarkan dari sinar matahari langsung
	Asetilsistein	Fluimucil 200	Hipersensitif terhadap Acetylcysteine atau zat tambahan obat ini Anakanak dibawah 2 tahun	Hipersensitif terhadap Acetylcysteine atau zat tambahan obat ini Anak-anak dibawah 2 tahun	Dewasa dan anak diatas 14 tahun 1 Kapsul 2-3 kali sehari Aturan Pakai diatas 14 tahun 1 kapsul 2-3 Kali	Reaksi alergi, sakit kepala, telinga berdengung. peningkatan denyut jantung, muntah, diare, radang mulut, sakit perut, iritasi kulit, ruam, pembengkakan	Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari

	Ammonium kloride	Sanadryl	Penyakit hati, Asma, Glaukoma, MAOI, Hamil, Anak, Mempengaruhi kemampuan mengemudi/menjalankan mesin.	Untuk meringankan batuk berdahak yang disebabkan alergi	Anak-anak 6-12 tahun : 5 ml, 3-4 kali sehari. Dewasa : 10 ml, 3-4 kali sehari. Atau menurut petunjuk dokter.	akibat akumulasi cairan disekitar mulut dan mata, gatal, demam dan penurunan tekanan darah Jarang Mengantuk, pusing, gangguan koordinasi, sekresi saluran pernapasan mengental, mulut kering; kejang epileptiform (dosis besar)	Simpan pada suhu kamar
Obat asma	terbutaline salbutamol, budesonid, ipratropium bromida, teofilin, aminofilin	Lasmalin	Jangan diminum bersama obat simpatomimetik lain dan beta adrenoceptor bloker	Asma bronkial, bronkitis kronik, emfisema, penyakit paru lain dengan komplikasi bronkospasme	Dewasa : 2-3 x sehari 1-2 tablet, Anak : 2-3 x sehari 1 tablet	Tremor, palpitasi	Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari
		Salbutamol	Hipertiroidisme, penyakit jantung dan pembuluh darah, aneurisma,	asma bronkial, bronkitis kronis, emfisema	Dewasa : 1-2 tablet 3-4 kali sehari, Anak-anak usia 6-12	tremor khususnya pada tangan,	Simpan di tempat sejuk dan kering, serta

			diabetes melitus, glaukoma sudut tertutup. Pasien yang menerima terapi antihipertensi atau anestesi halogen		tahun : 1 tablet sehari 3 kali, Anak usia 2-6 tahun : 1/2 tablet 3 kali sehari	palpitasi, dan kram otot	terhindar dari sinar matahari
--	--	--	---	--	--	--------------------------	-------------------------------

(9) VITAMIN, MINERAL, ENZIM

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Vitamin	Vitamin A, D, E, K, B1 (thiamin), B6(piridoksin), asam folat, B12, C	Becom zet folavit 400	Hipersensitif Terapi jangka panjang pada defisiensi	Suplementasi vitamin B kompleks, vitamin C. vitamin E dan zinc untuk memenuhi kebutuhan asam	1 x sehari 1 kaplet setelah makan	Gangguan gastrointestinal -	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup kering. rapat, dan terlindung dari cahaya kelembaban simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari

			kobalamin yang tidak diobati	folat terutama ibu hamil	1 x sehari 1 tablet sesudah makan		paparan sinar matahari langsung
Mineral	Ca, P, K, Mg, Na, Cl, Fe, Zn, Mn, Cu, I ₂	licokalk plus	gangguan fungsi ginjal atau riwayat batu saluran kemih. pasien yang mendapat terapi glikosida jantung	untuk membantu mencegah defisiensi Ca. Membantu pertumbuhan tulang dan gigi. Suplemen Ca pada masa hamil dan menyusui	dewasa: 3 kali sehari 1-2 kaplet. anak: 3 kali sehari 1 kaplet setelah makan	anoreksia (gangguan makan hingga alami penurunan berat badan), nyeri otot dan sendi, mual, muntah, haus, poliuria (produksi urin berlebih), aritmia (gangguan detak jantung atau irama jantung)	simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung

(10) OBAT SISTEM ENDOKRIN

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat Diabetes melitus	Sulfonilurea (glibenclamide, glimepiride), metformin, pioglitazone, acarbose, insulin	Amaryl 2mg,4mg	Hipersensitif terhadap sulfonilurea, sulfonamid atau biguanid. IDDM (DM tipe 1), ketonemia diabetik dan koma/prekoma diabetes, asidosis metabolik. Hamil, laktasi. Gangguan	Dm tipe 2 yang tidak dapat dikendalikan secara adekuat melalui diet, olahraga dan penurunan BB saja. Dapat digunakan dalam kombinasi dengan metformin atau insulin	Dosis 1-8 mg/hr. Dosis awal dan dosis titrasi 1mg 1x/hr. Dapat ditingkatkan secara bertahap setiap 1-2 minggu: 1 mg - 2 mg- 3 mg- 4 mg- 6 mg- 8 mg	hipoglikemia, gangguan penglihatan sementara, gangguan GI, gangguan fungsi hati. Rasa logam pada pengecapan , ruam kulit	simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung

			fungsi paru berat, hipoksemia, alkoholisme, gangguan gagal jantung. Hemodialisis		(kasus tertentu)		
		Glucophage XR	Hipoksia (kekurangan oksigen) dan gangguan fungsi ginjal dan hati	gangguan gastrointestinal, pusing, sakit kepala, infeksi saluran napas atas, gangguan daya pengecapan, asidosis laktat	1 kali sehari 1 tablet, bersama makan malam.	gangguan gastrointestinal, pusing, sakit kepala, infeksi saluran napas atas, gangguan daya pengecapan, asidosis laktat	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung
		Deculin	Jika terjadi disfungsi menstruasi, pertimbangkan risiko dan keuntungan dari dilanjutkannya pemberian pioglitazone. Pioglitazone tidak dianjurkan untuk diabetes melitus	Terapi kombinasi dengan sulfonilurea atau metformin pada pasien diabetes melitus tipe 2 yang tidak terkontrol dengan monoterapi sulfonilurea dan metformin.	Untuk dewasa : Kombinasi dengan metformin atau sulfonilurea dapat dimulai dengan dosis pioglitazone 15-30 mg sekali sehari	Efek samping kombinasi pioglitazone dengan metformin: anemia, meningkatnya berat badan, sakit kepala, Gangguan penglihatan, artalgia, hematuria. Efek samping kombinasi pioglitazone dengan	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung

			<p>tipe 1 atau ketoasidosis. Kehamilan dan laktasi. Gangguan hati. Anak-anak</p>			<p>sulfonylurea: meningkatnya berat badan, hipoglikemia, meningkatnya lactate dehydrogenase, meningkatnya nafsu makan, pusing, sakit kepala, vertigo, Gangguan penglihatan, berkeringat, proteinuria, letih</p>	
		Glucobay	<p>gangguan gastrointestinal kronik berkaitan dengan absorpsi dan pencernaan, keadaan yang bisa memburuk karena pembentukan gas dalam usus, kerusakan ginjal berat, hamil, menyusui</p>	<p>terapi tambahan yang berhubungan dengan diet pada pasien diabetes melitus</p>	<p>50 mg dapat ditingkatkan sampai 100 mg-200 mg 3x sehari</p>	<p>kembung, bising usus meningkat, kadang diare dan nyeri abdomen</p>	<p>Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>

Obat hipertiroid dan hipotiroid	Propiltiourasil, levotiroksin.	Propylthiouracil	Wanita hamil dan menyusui	Untuk mengatasi hipertiroidisme	Dewasa: 150-450 mg/hari dalam dosis terbagi. Dosis awal 600-1200 mg diberikan pada kasus yang lebih berat.	Ruam kulit, urtikaria, artralgia, dan demam, muntah, sakit kepala.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung
Kortikosteroid	hidrokortison, betametason, prednison, metilprednisolon	Nestacort 2,5mg cream	Penyakit kulit karena virus. Dermatitis karena bakteri atau jamur. Urtikaria, rosacea, luka	Mengatasi eksim, radang, dermatitis, dan penyakit kulit disebabkan alergi yang responsif terhadap kortikosteroid.	Aturan pakai harus sesuai dengan petunjuk dokter. Oleskan tipis-tipis 2-4 kali sehari pada bagian kulit yang sakit.	Rasa terbakar, gatal, iritasi, kulit kering, hipertrikosis, erupsi yang menyerupai akne, hipopigmentasi, dermatitis kontak alergi, dermatitis perioral, maserasi kulit, infeksi sekunder, atrofi kulit, striae, miliaria	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya
		Benoson n cream	hipersensitif, Herpes simplex, vaccina, varicella, chickenpox, tuberkulosis kulit, Rosacea, akne vulgaris dan prioral dermatitis, prienal dan gatal	peradangan pada kulit atau mukosa yang disertai infeksi bakteri	dioleskan pada tempat yang sakit atau radang 2-3 kali sehari	alergi, hipersensitif, efek samping lokal, rasa terbakar, gatal, iritasi, kulit kering, folikulitis, hipertrikosis, erupsi menyerupai akne, hipopigmentasi,	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya

			<p>pada alat kelamin, erupsi napkin dan infeksi virus</p>			<p>dermatitis prioral, dermatitis kontak alergik</p>	
		Lupred	-	<p>untuk mengobati gangguan akibat alergi, gangguan kulit, kolitis ulserativa, arthritis, psoriasis, gangguan pernapasan</p>	<p>dewasa 1-2 kali sehari 5-60mg</p>	<p>sakit kepala, pusing, gugup, mudah marah, gelisah</p>	<p>Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya</p>
		Prednicort 4mg, 8mg	<p>Infeksi jamur sistemik kecuali terapi antiinfeksi spesifik digunakan; Admin IM pada purpura trombositopenik idiopatik. Admin intratekal. Pemberian vaksin hidup atau hidup yang dilemahkan secara bersamaan (pada pasien yang</p>	<p>Penyakit kolagen, kelainan kulit, radang mata akut & kronik, penyakit keganasan, kolitis ulseratif & enteritis regional (penyakit Crohn), kelainan endokrin, kelainan hematologik, reumatik</p>	<p>Awal 4-48 mg/hr kemudian scr bertahap diturunkan sampai dosis terendah yg masih efektif.</p>	<p>Ulkus gaster & duodenal, gangguan penyembuhan luka, atrofi kulit, miopati proksimal, osteoporosis, gangguan elektrolit & cairan tubuh, sindroma Cushing, peningkatan TIO, glaukoma, insufisiensi adrenal sekunder</p>	<p>simpan pada suhu ruangan dan terlindung dari cahaya</p>

			menerima dosis imunosupresif).				
Obat KB	levonorgestrel, etinilestradiol, lynestrenol	Andalan	Hipersensitif, gangguan fungsi hati berat, hamil	Sebagai kontrasepsi oral untuk mencegah kehamilan	Permulaan pemakaian : tunggu sampai periode haid berikutnya. Mulailah minum pada pagi hari pertama siklus haid (hari pertama perdarahan) dari bagian Blister berwarna kuning (tablet plasebo) sesuai dengan hari dimulainya haid. Tekanlah tablet sampai keluar melalui lapisan aluminium dan telan dengan sedikit air. Lanjutkan minum tablet tiap hari mengikuti	kongenital anomalies, sindrom premenstrual, katarak, neuritis optik, perubahan nafsu makan, sakit kepala, gugup, pusing, hirsutisin, rambut rontok, eritema multiformis, eritema nodosum, erupsi hemoragik, vaginitis, porphyria, gangguan fungsi ginjal, jerawat, perubahan libido, kolitis, serebral vaskular, lupus-like syndrome, Budd-Chiari syndrome, Cystitis-like syndrome	simpan pada suhu ruangan dan terlindung dari cahaya

		Andalan laktasi	Wanita hamil atau sedang merencanakan kehamilan, penyakit hati berat, perdarahan vagina yang tidak terdiagnosa, riwayat ikterik, pruritus, herpes gestasionis.	kontrasepsi oral dosis rendah untuk ibu menyusui.	tanda panah sampai semua tablet dalam Blister habis. Hendaklah tablet diminum pada waktu yang sama setiap hari Harus sesuai petunjuk dokter. 1 hari 1 tablet	mual, pusing	simpan pada suhu ruangan dan terlindung dari cahaya
--	--	-----------------	--	---	---	--------------	---

B. PRODUCT KNOWLEDGE ALAT KESEHATAN

(1) ALKES PERAWATAN

No	Alkes perawatan	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Bandage gauze (kasa hidrofil) (sumber dari : halodoc)		Kasa steril ini digunakan untuk operasi besar/ kecil, khitan, penutup luka, dan bebat pusar bayi	Bersihkan luka dari kotoran, bakteri dan partikel untuk mencegah infeksi. Keringkan kulit sekitar luka. Tutup luka dari kotoran menggunakan kasa steril.
2.	Elastic bandage (sumber dari : halodoc)		Menutup luka dengan menyangga cedera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegang perban sehingga bagian awal gulungan menghadap ke atas. 2. dimulai ujung perban yang longgar diatas kaki. Biarkan jari-jari ana lepas dari perban. 3. Pegang ujung perban yang longgar pada tempatnya dengan satu tangan, dengan tangan yang lain, lingkarkan perban dua kali dengan melingkari kaki. Selali balut perban dari luar ke dalam. 4. Setelah bagian atas kaki anda dibalut dua kali, gerakkan tangan anda ke tumit 5. Pasang dengan pola seperti angka "8" , biarkan tumit anda terbuka. Tumpang tindih perban sebanyak 1/2 lebarnya setiap kali anda memutarnya. 6. Silangkan perban diatas kaki anda,

			<p>gerakan keatas, dan letakkan di belakang pergelangan kaki anda. Pindahkan perban kebawah dan silangkan diatas kaki anda. Bungkus perban dibawah kaki anda. Ulangi sekali lagi.</p> <p>7. Letakan perban betis Anda dan balut dalam lingkaran ke atas menuju lutut Anda. Berhenti membungkus di bawah lutut Anda. Anda tidak perlu lagi membalut betis Anda dengan perban.</p> <p>8. Kencangkan ujungnya ke sisa perban. Jangan gunakan klip logam di tempat kulit Anda terlipat atau terlipat, seperti di belakang lutut.</p>	
3.	Kapas pembalut (sumber dari : halodoc)		<p>Membersihkan dan menutupi luka agar tidak mudah terinfeksi serta dapat digunakan untuk lapisan perban</p>	<p>Ambil kapas secukupnya dan bersihkan area tubuh yang mengalami luka.</p>

4.	Kasa berisi obat (sufra tulle, daryant tulle, bacti grass, actisorb, paronet) (sumber dari : alodokter)		Menutup luka seperti luka bakar, dan infeksi bakteri sekunder dan mendukung penyembuhan luka.	Potong Daryant-Tulle seluas daerah luka, dan tempelkan pada luka
5.	Kasa dressing		Untuk menutupi luka bakar	Potong kain kasa sesuai ukuran dan lekatkan pada luka.
6.	Kasa steril	 <p>Kasa Steril 16x16cm (KS B10)</p>	Untuk operasi besar atau kecil, khitan, penutup luka dan bebet pusar bayi.	Bersihkan luka dari kotoran, bakteri, dan partikel untuk mencegah infeksi. Keringkan kulit sekitar luka dengan lembut. Tutup luka dari kotoran dan bakteri menggunakan kasa steril.

7.	Pembalut gips (gypsona)		Untuk membalut bagian tubuh setelah diberi lap kapas atau saat patah tulang.	
8.	Pembalut leher/cervical collar		Menopang kepala, membatasi gerak dan mengurangi nyeri bagian leher.	Masukan cervical collar secara perlahan lalu rekatkan kedua sisi.
9.	Plester Elastik (handyplas, band aid, elastikon)		Menutup luka dan memberi bantalan bagi luka	Buka dan pasang lalu posisikan kasa yang ada ditengah plaster pada luka.

10.	Plester kertas (leukopor, dermilite)		Untuk menutup luka yang memiliki daya rekat dan tembus udara sehingga meminimalisir terjadinya iritasi pada kulit.	Tutup luka dengan menggunakan plester kertas dengan daya rekat yang tinggi dan terhindar dari air (waterproof).
11.	Plester plastik (leukofix, transfor)		Digunakan sebagai perekat untuk plester infus, kateter, kanula dan lainnya.	Sebagai isolasi yang melekatkan perban.
12.	Plester plastik waterprof (setonplast, blenderm)		Plater luka kedap air plester ini digunakan untuk membantu menjaga luka cepat sembuh, serta melindungi luka dari kuman dan kotoran	Plater ditempelkan pada luka, plater ini melindungi luka dari air agar tidak perih.

13.	Plester rayon (microfore, dermisel)		Untuk menutup luka	Rekatkan bersamaan dengan kasa untuk menutupi bagian yang luka
14.	Plester sutera (leukosilk)		Menutup luka menggunakan nanodiamon ke dalam serat sutra.	Luka dibersihkan menggunakan alkohol atau antiseptik lainnya, tempel plaster pada luka, plaster ini lebih cepat memulihkan luka karena mengandung nano diamon.
15.	Plester ZnO (leukoplas)		Untuk perekat penutup luka, perekat tube, eatheter, dan cannulae.	Leucoplast digunakan seperlunya untuk pengobatan pada luka.

(2) PERAWATAN PASIEN

No	Perawatan pasien	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Bedpan		Untuk Menampung feses atau kotoran pada pasien yang tidak boleh atau bisa ke WC.	Letakan bedpan yang nyaman, pasien dibantu untuk berdiri atau diangkat atau posisinya diatas badpan, jika suah buang feses kemudian dicuci.

2.	Breast pump		Untuk membantu memompa air susu	Alat pemeras asi cukup diletakan alat nya di payudara, alat pemeras asi akan menekan payudara dan menyimpan adi langsung ke dalam botol yang terpasang.
3.	Colostomy bag		Untuk menampung feses atau kotoran pada pasien setelah menjalankan oprasi colon (pembedahan usus untuk membuat anus buatan melalui otot dan kulit pada perut).	Dokter akan membuat sayatan lalu menanamkan cincin didinding perut untuk menyangga agar ujung usus besar dapat berada dilokasi tepat pada dinding perut.
4.	Ihsjap/eskap		Kompres dingin, digunakan untuk menurunkan demam dikepala atau dibagian yang sakit perdangan atau pembengkakan.	Isi eskap dengan es batu yang sudah hancur dengan volume $\frac{3}{4}$, komres pada area yang diinginkan, jika sudah selesai gantung eskap dengan posisi tutup dibawah untuk dikeringkan.

5.	Kruk		Tongkat untuk alat bantu untuk orang yang cacat atau cedera.	Sesuaikan ukuran tongkat kruk. bangun dari duduk kemudian ambil tongkat kruk dan diletakkan di lengan untuk membantu menyangga saat berjalan.
6.	Pus basin/emesis basin		Menampung muntah, nanah, kapas, dll.	Pada saat melakukan operasi dokter akan menggunakan pus basin sebagai tempat pembuangan kapa bekas,
7.	Spalk		Untuk menahan atau menjaga agar bagian tulang yang patah tidak bergerak.	Lepaskan area yang menutupi area bagian tubuh yang mengalami patah tulang, rekatkan area yang patah tulang dengan bidal atau spalk lalu lilit dengan perban atau kertas koran atau sepotong kain apa bila tidak ada.

8.	Tapelhoed/nipple shield		Melindungi puting susu saat menyusui.	Tempelkan nipple shield pada puting sebelum menyusui. Biarkan bayi menyusui melewati nipple shield.
9.	Tongkat pyramide/elbow		Alat bantu jalan untuk menopang tubuh waktu berdiri.	Pasang tongkat dengan tangan yang berlawanan pastikan tongkat sedikit kesamping, gerakan tongkat kedepan pada saat yang sama maju degan kaki yang sakit dan pegang tongkat seecara stabil.
10.	Urinal		Penampung urine untuk pria.	Posisikan alat kelamin kedalam wadah, gunakan untuk menampung urine.

11.	Walker		Alat bantu jalan untuk keseimbangan	Pegang tongkat dengan tangan yang berlawanan dengan sisi yang sakit, posisikan tongkat sedikit kesamping, gerakan tongkat terlebih dahulu kemudian kaki yang sakit dan pegang tongkat secara stabil.
12.	Warm water zak		Untuk menghangatkan tubuh	Masukan air panas kedalam Warm water zak, dan ditelpekan kedalam bagian tubuh yang sakit.
13.	Windring/air cushion		Untuk membantu penderita ambeien atau wasir dan penderita cedera punggung agar lebih nyaman saat duduk.	Meletakkan Windring/air cushion sebagai alas untuk duduk.


(3) ALKES TINDAKAN MEDIS

No	Alkes tindakan medis	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Ballon/foley cathether		Digunakan untuk membantu mengeluarkan urine serta mengosongkan kandung kemih pada pasien yang mengalami kesulitan buang air kecil (retensi urine).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencuci tangan dan membuka alat kateter. 2. Letakkan perlak dibawah anus pasien setelah pakaian bawah pasien dibuka. 3. Daerah vulva akan dibersihkan dengan kapas dan cairan antiseptik. 4. Selang karakter diberikan pelumas agar mudah dimasukan ke saluran uretra 5. Selang kateter dimasukan hingga mencapai leher kandung kemih sekitar 5 cm. 6. Bernapas hingga urine keluar. 7. Kosongkan kantung urine yang terhubung dengan karter setiap 6-7 jam sekali.
2.	Condom cathether (sumber dari: Healthline)		Untuk penampung urine pria.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gunakan sabun dan air hangat, cuci tangan dan penis. Bersihkan kepala penis, tarik kembali melewati kepala. 2. Bilas penis, lalu biarkan hingga benar-benar kering. 3. Periksa penis anda apakah ada yang iritasi atau luka terbakar. 4. Jika menggunakan sealant, oleskan pada kulit penis dan sekitar area kemaluandan biarkan mengering, seharusnya tersasa halus dan licin saat kering. 5. Letakkan kondom diujung penis dan buka gulunganya secara perlahan

			<p>hingga mencapai pangkalnya. Sisakan ruang yang cukup pada ujungnya (1 sampai 2 inci) agar tidak bergesekan dengan kondom</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Jika kondom mengansung perekat, tempelkan pada penis anda sekitar 15 detik 7. Tempatkan penahan sarung di sekitar penis anda dipangkalnya, jaga agar sedikit longgar agar tidak menghentikan aliran darah. 8. Hubungkan selang pada tas pengumpul ke kondom. 9. Ikat tas pengumpul ke kaki anda (dibawah lutut) unntuk drainase yang baik. 10. Jika ingin melepas kondom lama dengan mengulungnya, bukan menariknya.
3.	Disposable syringe		<p>Alat bantu medis yang berupa pompa piston sederhana untuk menyuntikan atau menghisap cairan atau gas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buka penutup alat suntik, 2. Celupkan ujung jarum ke cairan atau obat yang akan dihisap, 3. Tarik piston sampai obat atau cairan terhisap dengan sesuai yang dibutuhkan, 4. Kemudian, arahkan jarum ke bagian tubuh yang akan disuntikkan.

4.	Endotracheal		<p>Untuk menjaga jalan napas tetap terbuka pada pasien yang tidak mampu bernapas sendiri atau mempertahankan jalan napasnya sendiri.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dibius terlebih dahulu, 2. Masukkan tabung endotrakeal ke batang tenggorokan dengan ventilator
5.	Enema syringe (sumber dari : alodokter)		<p>Untuk membersihkan lubang anal sehingga saluran pengeluaran kotoran menjadi bersih.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berbaring miring kearah kiri pada alas 2. Kedua kaki ditekuk dan lutut ditempelkan ke dada, 3. Masukkan selang enema secara perlahan melalui dubur kira-kira sampai kedalaman 10 cm.
6.	Feeding syringe		<p>Digunakan untuk membantu memberikan susu atau makanan</p>	<p>Masukan makanan yang sudah dihaluskan atau susu ke dalam Feeding syringe, lalu dimasukkan kedalam mulut.</p>

7.	Feeding tube		Memasukan cairan makanan yang tidak dapat makan atau minum.	Masukan selang melalui hidung / mulut masukan spuit kedalam lubang bawah untuk memasukan makanan kedalam tubuh.
8.	Gliserin syringe		Untuk menyemprotkan lavement/ clyisma melalui rectal atau anus.	Letakan badpan dibawah anus, lalu masukan gliserin keatas secara perlahan dengan tangan kiri memegang anus dan tangan kanan memasukan gliserin ke dalam anus.
9.	Gloves/handschoen (sumber dari: halodoc)		Untuk mencegah penularan kuman, dan untuk oprasi atau bedah.	Cuci tangan terlebih dahulu lalu pasang gloves sebelum melakukan tindakan
10.	Infusion set dewasa (sumber dari: halodoc)		Untuk keperluan infus untuk orang dewasa.	Usap tangan pasien dengan alkohol swab, lalu cari intravena nya untuk dipasang selang infus.

11.	Infusion set pediatrik (sumber dari: halodoc)		Untuk mengatur obat atau ntrisi parenteral melalui selang keperluan infus pada anak/ bayi.	Usap tangan pasien anak/bayi dengan menggunakan alkohol swab, lalu cari intravena nya untuk dipasang selang infus
12.	Insulin syringe (sumber dari: halodoc)		Untuk suntik insulin (diabetes).	Cubit kulit yang akan disuntik, bersihkan menggunakan tisu alkohol, masukan jarum suntik dengan posisi 90°, kemudian dorong pompa suntik hingga semua dosis insulin masuk kedalam tubuh, lalu saat selsai tarik jarum suntik sebelum melepas cubitan.
13.	Intra vena catheter (sumber dari: halodoc)		Sebagai vena tambahan dalam pengobatan jangka panjang (48 jam).	Masukan jarum infus ke pembuluh darah disiapkan tabung IV, pilih IV kateter yang sesuai.
14.	Masker oksigen (sumber dari: halodoc)		Untuk memberikan O ₂ dengan kadar sedang	Pastikan sudah terpasang selang ke sumber oksigen, pastikan kantung reservoir mengembang, dan pastikan terdapat katup satu arah berfungsi baik, ubah aliran O ₂ menjadi 10-15 L/menit dan letakan masker oksigen pada wadah pasien menutupi hidung dan mulut.

<p>15. Masker nebulizer anak-anak (sumber dari: halodoc)</p>		<p>Untuk mengubah cairan obat menjadi uap atau aerosol dengan partikel yang kecil dan halus sehingga dapat dengan mudah dihirup oleh pasien dengan melalui pernafasan menuju paru-paru yang digunakan untuk anak-anak.</p>	<p>Masukan obat kecangkir nabulzer sesuai aturan dokter, sambungkan corong mulut kecangkir nebulzer pasang selang penyambung antara mesin kompresor dan cangkir nebulzizer, nyalakan mesin, letakkan corong mulut kemulut dan pastikan tidak ada celah, biasanya membutuhkan waktu 15-20 menit.</p>
<p>16. Masker nebulizer dewasa (sumber dari: halodoc)</p>		<p>Melegakan saluran nafas untuk orang dewasa.</p>	<p>Masukan obat kecangkir nabulzer sesuai aturan dokter, sambungkan corong mulut kecangkir nebulzer pasang selang penyambung antara mesin kompresor dan cangkir nebulzizer, nyalakan mesin, letakkan corong mulut kemulut dan pastikan tidak ada celah, biasanya membutuhkan waktu 15-20 menit.</p>
<p>17. Metal cathether (sumber dari: halodoc)</p>		<p>Untuk mengeluarkan urine/ bak/ kencing yang terbuat dari metal/ besi stainliss steel.</p>	<p>Alat ini biasanya digunakan untuk mengeluarkan kencing, dengan memasukan metal cateter kedalam kelamin lalu tarik ujung bulat metal cateter agar bisa mengeluarkan kencing.</p>
<p>18. Mucus extractor (sumber dari: halodoc)</p>		<p>Untuk menghisap lendir pada hidung bayi yang baru lahir supaya lendir pada hidung tidak mengganggu pernafasan bayi.</p>	<p>Memasukan selang yang tidak ada tonjolan ke dalam hidung, kemudian ditarik sambil dihisap.</p>

19.	Nasal gastric tube (sumber dari: halodoc)		Untuk menyuplai makanan dan minuman pada pasien yang tidak normal.	Memasukan selang melalui lubang hidung, melewati tenggorokan hingga masuk ke lambung. Setelah itu, masukan makanan, minuman dan obat.
20.	Nebulizer set		Untuk mengubah cairan obat menjadi uap.	Masukan obat ke cangkir nebulizer dengan anjuran dokter, sambungkan corong ke canagkir nebulzer, pasang selang penyambung antara mesin kompresor, nyalakan mesin, letakan corong ke mulut dan pastikan tidak ada celah, prosedur ini membutuhkan waktu 15-20 menit.
21.	Needle		untuk menembus kulit agar sampai ke pembuluh darah untuk memasukkan obat cair	Buka bungkus jarum suntik, masukkan ke dalam spuit, dan siap digunakan.
22.	Nelaton cathether		digunakan untuk drainase urine jangka pendek atau alat bantu pengosongan kandung kemih dalam proses kateterisasi.	Selang kateter diberi pelumas untuk memudahkan ketika dimasukan kedalam sle uretra, dimasukan hingga mencapai kanung kmeih, setelah itu pasien sudah bsa kencing menggunakan selang kateter.
23.	Oxygen nasal canula		digunakan untuk memberikan oksigen pada orang dewasa dengan kebutuhan oksigen rendah atau pada bayi dan anak dengan nares paten yang membutuhkan oksigen tambahan tingkat rendah.	Posisikan pasien untuk duduk, hubungkan selang kanul ke sumber O2, nyalakan oksigen sesuai yang dibutuhkan pasien.

24.	Rectal tube	<p>RECTAL TUBE</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengeluarkan udara dari usus atau menghilangkan ketegangan perut 2. Mengeluarkan faeses yang berbentuk cair terutama pada pasien diare 	<p>Pasang alas dipantat, memasang plastik diujung rectal tube dan ikat dengan karet, olesi dengan pelumas, buka anus dengan tangan kiri, masukan rectal tube perlahan, memfiksasi rectal tube dengan menghilang.</p>
25.	Spinal needle		<p>Digunakan sebagai alat untuk menstabilkan penempatan jarum berukuran kecil selama anestesi tulang belakang.</p>	<p>Masukkan spinal needle kedalam spuit lali masukan obat atau cairan, suntikan kedalam tubuh.</p>
26.	Stomach tube		<p>Untuk pengambilan getah lambung atau membilas atau mencuci perut</p>	<p>Masukan selang kedalam tubuh dengan melapisi pelumas dulu, pasang selang dengan stomach tube yang digunakan untuk membilas isi perut.</p>

<p>27.</p>	<p>Suction cathether</p>	 <p>Selang Suction Catheter Penghisap Lendir Cairan</p>	<p>Untuk mengeluarkan cairan berlebih khususnya pada daerah oropharyngeal dan Nasopharyngeal. (daerah rongga mulut dan rongga hidung).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan cuci tangan dan Identifikasi pasien 2. Siapkan dan dekatkan alat ke pasien <ol style="list-style-type: none"> a. Alat penghisap lendir b. botol berisi larutan desinfektan c. Kateter penghisap lendir steril d. Pinset steril e. Sarung tangan steril 3. Tempatkan pasien pada posisi terlentang atau kepala miring ke arah perawat (Pakai sarung tangan) 4. Hubungkan kateter penghisap dengan slang alat penghisap 5. Hidupkan mesin penghisap 6. Lakukan penghisapan lendir dengan memasukkan kateter penghisap kedalam kom berisi aquades atau NaCl 0,9% untuk mempertahankan tingkat kesterilan (asepsis) 7. Masukkan kateter penghisap dalam keadaan tidak menghisap 8. Gunakan alat penghisap dengan tekanan 110 - 150 mmHg untuk dewasa, 95 – 110 mmHg untuk anak-anak dan 50 - 95 mmHg untuk bayi (Potter & Perry,1995) 9. Lakukan penghisapan dengan tarik memutar kateter penghisap tidak lebih dari 10. detik, bisa dilakukan 3 – 5 kali jika masih kotor 11. Bilas kateter dengan aquades atau NaCl 0,9%
------------	--------------------------	---	--	---

				<p>12. Apabila pasien mengalami distress pernafasan, biarkan istirahat 20 - 30 detik sebelum melakukan penghisapan berikutnya.</p> <p>13. Setelah selesai, kaji jumlah, konsistensi, warna, bau sekret dan respons pasien terhadap prosedur yang dilakukan</p>
28.	Suction connecting		Selang penghubung antara chateter dengan mesin penyedot.	Selang penghubung yang dihubungkan dengan suction chateter.
29.	Tranfusion set		Alat steril yang berfungsi mengalirkan mengalirkan darah atau produk darah dari kantong darah ke dalam pembuluh darah pasien.	Pasang selang ketangan pasien, sebelumnya diusap dengan alkohol swab, cari intravena pasien lalu pasang tranfusi set.
30.	Tuberculin syringe		untuk pasien penderita TBC / suntik vaksinisasi	Masukkan cairan ke alat suntik, pastikan gelembung udara di alas suntik tidak ada, suntikan dengan tegakan lurus mendorong pelan stik di tabung ke dalam.

31. Urine bag		Menampung air kencing	Pasang kondom chateter lalu pasang urine bag pada pasien.
32. Wing needle		Sebagai vena tambahan	Tentukan vena pasien, masukkan cairan kedalam spuit, pasang wing needle, tusuk bagian yang akan diambil darahnya.

(4) ALAT-ALAT BEDAH

No	Alat-alat bedah	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Arterie klem/artery forceps		Alat untuk menjepit suatu benda	Pegang arteri klem dengan jari lalu caprit benda yang akan dipakai.

2.	Bandage scissors (gunting perban)		Alat untuk menggunting perban tanpa mencungkil kulit	Siapkan perban dan bandage scissors lalu gunting perban dengan bandage scissors sesuai kebutuhan.
3.	Benang jahit catgut chromic		Benang jahit unuk penjahitan luka yang dianggap bekam rapat dalam waktu 10 hari	Masukkan benang jahit ke jarum bedah, bius pasien dahulu sebelum melakukan operasi.


4.	Benang jahit catgut plain		Menjahit jaringan lunak seperti otot, usus dan uterus. Dapat diserap 3-7 hari	Masukkan benang jahit ke jarum bedah, bius pasien terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan.
5.	Benang jahit silk		Menjahit luka yang ada dikulit dan sering bergerak	Masukkan benang jahit ke jarum bedah, bius pasien dahulu sebelum melakukan tindakan.

6.	Bisturi		Pisau operasi untuk prmbedahan	Pegang bisturi dengan menggenggam bagian bawah, pastikan pisau bisturi sudah disterilisasi, lalu arahkan ke tempat yang akan disayat.
7.	Forceps/pinset anatomis		Penjepit jaringan dalam proses operasi	Tekan pada bagian tengah (bagian yang berisi-garis) dengan menggunakan jari.
8.	Forceps/pinset cilia		Untuk mencabut rambut, untuk membantu proses melahirkan normal	Pasien akan dianstesi dulu, lalu pasaang kateter urine untuk mengosongkan kandung kemih. Dokter akan membuat sayatan dijalan lahir untuk mempermudah proses mengeluarkan bayi dengan forceps.

9.	Forceps/pinset sirugis		Untuk menjepit jaringan pada waktu diseksi membentuk pola jahitan	Genggam pinset dengan ibu jari dan dua atau tiga jari lain dalam satu tangan, lalu gunakan untuk menggenggam objek kecil dengan cepat dan mudah.
10.	Forceps/pinset splinter		Mencabut pecahan yang menancap dipermukaan kulit	Jika ada pasien yang mengalami kecelakaan seperti terkena pecahan kecil, bisa diambil dengan alat tersebut.

11.	Gunting bedah mayo		Memotong jaringan dan menggunting balutan	Selama pembedahan bila ada jaringan atau balutan yang tidak sesuai maka bisa dipotong dengan gunting bedah mayo
12.	Gunting bedah metzenbaum		Untuk memotong jaringan halus dan diseksi tumpul untuk menggunting jaringan	Pegang gunting dengan tangan kanan. lalu gunting perban atau bagian tubuh yang akan dilakukan pembedahan.
13.	Gunting bedah runcing		Untuk mencukur, memotong atau membedah (usus, jantung)	Memegang gunting dengan ibu jari dan jari telunjuk untuk memotong organ tubuh.

14.	Gunting tali pusar		Memotong tali pusar bayi baru lahir	Genggam alat dengan tangan kanan lalu potong tali pusar pada bayi yang baru lahir.
15.	Hecting set		Alat bedah minor untuk menjahit luka	Membantu saat benang jahit keluar dan masuk ke dalam kulit.

16.	Jarum jahit		Menutupi goresan, luka dan sayatan	Anestesi dulu, pembersihan luka, jahit luka dengan jarum jahit yang sesuai yang akan digunakan.
17.	Klem mosquito		Menjepit jaringan tubuh maupun pembuluh darah untuk menghentikan pendarahan	Jepit jaringan dengan memegang klem dengan tangan kanan (dominan).

18.	Klem tali pusat/umbilical cordclem		Menjepit tali pusat yang baru dipotong dari plasenta	Jepit tali pusar dengan klemtasi pusar pada bayi yang baru lahir.
19.	Needle hoolders		Menjepit jarum jahit serta menjahit luka tertentu	Memotong benang dengan alat ini selama pembedahan.

20.	Peritoneum forceps		Menjepit jaringan selaput perut	Genggam peritoneum dengan tangan kanan, jepit jaringan dengan peritoneum
21.	Skalpel		Pisau untuk pembedahan	Tentukan lokasi tubuh bagian yang akan dilakukan pembedahan bedak bagian atau dengan skalpel.

(5) Disinfektan

No	Disinfektan	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Alkohol 70%			Basuh luka dengan alkohol 70% dan lakukan

			<p>Untuk antiseptik, membersihkan luka dan membersihkan alat-alat medis</p>	<p>dengan hati-hati.</p>
<p>2.</p>	<p>Alkohol swab</p>		<p>alat kesehatan berupa kapas atau tisu alkohol antiseptik yang digunakan untuk membersihkan luka dan pembersih alat-alat kesehatan</p>	<p>siapkan alat yang akan dibersihkan sebelum digunakan, lap dengan alkohol swab dan sebelum disuntik biasanya kulit dilap dengan alkohol swab agar bersih dari kuman.</p>

<p>3. H₂O₂ 3%</p>			<p>Antiseptik untuk mencuci luka berfungsi untuk mencegah infeksi kulit dari luka gores, luka bakar, luka potong</p>	<p>Bersihkan luka dengan alkohol terlebih dahulu, lalu obati luka dengan hidrogen peroksida dengan kapas.</p>
<p>4. Povidone iodine</p>			<p>Agen antiseptik yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi pada luka</p>	<p>Bersihkan daerah yang luka, oleskan sedikit larutan povidon iodine ke luka lalu tutup luka dengan perban steril.</p>

5.	Rivanol		Cairan desinfektan yang di gunakan untuk membersihkan luka.	Tuang rivanol pada kapas, kemudian usapkan pada luka.
----	---------	--	---	---

(6) APD

No	APD	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Apron		pelindung tubuh untuk melapisi luar gaun yang digunakan oleh petugas kesehatan dari penetrasi cairan infeksius pasien dan melindungi diri dari suhu panas dan percikan bahan kimia berbahaya	Sebelum memasuki laboratorium atau tempat yang berbau kimia, pakai apron terlebih dahulu untuk melindungi diri.

<p>2. Masker</p>		<p>suatu benda yang fungsinya digunakan untuk melindungi serta menutup hidung dan mulut agar terhindar dari paparan virus</p>	<p>Pasang masker diwajah sebelum melakukan aktifitas yang membutuhkan masker.</p>
<p>3. Masker N95 disposable</p>		<p>Pelindung wajah dengan penyaring partikel</p>	<p>Pasang masker setelah memakai masker bedah.</p>

4.	Non woven/surgical cap		Menutup dan melindungi rambut dan mencegah terjadinya jatuhnya keringat atau rambut	Siapkan surgeon cap, pasang di kepala sebelum melakukan tindakan.
----	------------------------	--	---	---

5.	Sarung tangan		pelindung tangan dari pengaruh lingkungan	Siapkan gloves, pasang di kedua tangan.
6.	Shoe cover		pelindung bagian kaki dari paparan virus/bakteri penyebab penyakit	Pastikan telah memakai sepatu atau sandal yang bersih, pakailah shoe cover dengan benar.

7.	Kaca mata google		Pelindung terhadap paercikan cairan tubuh /benda lain pada saat melakukan operas, melindungi terhadap sinar UV	Sebelum melakukan tindakan operasi pasang kacamata google di mata dengan posisi yang nyaman.
----	------------------	--	--	--

(7) ALKES UNTUK DIAGNOSA


No	Alkes untuk diagnosa	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Anaroid spygmomanometer		Untuk mengukur tekanan darah	Sipkan spygmomanometer, pasang menseset tempatkan stetoskop, pompa manset.periksa tekanan darah sistolik dan diastolik, baca hasil tekanan darah.

2.	Electrical sphygmomanometer		Untuk mengukur tekanan darah	Gunakan manset pada lengan atas pastikan ujung selang berada di tengah lengan, kencangkan manset, saat pengukuran duduk tegak dan kaki merapat dilantai.
3.	Mercurial sphygmomanometer		Untuk mengukur tekanan darah (lebih akurat, bebas air raksa)	Lengan pasien diminta untuk lurus lalu pasang manset di kengan pompa sampai selesai.

4.	Chart vision Snellen		Untuk mengetahui kesehatan mata pasien	Pasien diminta duduk/berdiri dengan jarak 6 meter dari kartu snellen, tutup salah satu mata pasien, pasien akan membaca dari garis paling atas ke bawah dan petugas kesehatan akan memeriksa.
5.	Ear speculum		Memeriksa rongga telinga	Spekulum di fixasi dengan ibu jari dan jari telunjuk, daun telinga dijepit menggunakan jari tengah & jari manis tangan kiri, sebaliknya dilakukan apabila ingin memeriksa telinga kiri.

6.	Ear thermometer		<p>Mengukur suhu dalam saluran telinga menggunakan inframerah</p>	<p>Tekan tombol ON masukkan perlahan termometer kedalam telinga belakang, ukur suhu tubuh hingga terdengar bunyi yang sebagai penanda pengukuran sudah selesai, lihat hasil di layar termometer dan tekan tombol OFF untuk mematikan.</p>
7.	Gelang pasien		<p>Tanda pengenal atau penanda pasien</p>	<p>Kuning: pasien dengan pengawasan Merah: alergi obat Biru pasien laki-laki Pink: pasien perempuan Abu-abu: pasien kemoterapi</p>

8.	Head lamp		Lampu senter kepala untuk periksa pasien, biasanya digunakan dibagian THT. IGD, ruang bedah	Memasang di kepala sebelum memulai tindakan.
9.	Hemometer		Untuk menentukan kadar hemoglobin dalam darah berdasarkan saluran warna	Mengisi tabung degan HCl 0,01N sampai garis batas, mengambil darah dengan sanli sebanyak 0,02 ml. memasukkan darah ke tabung suhu dan aduk, mengencerkan dengan aquades sedikit demi sedikit hingga didapatkan warna yang sama dengan warna standar hemometer.

<p>10.</p>	<p>Ishihara's test for colour blindness</p>		<p>Untuk menentukan kelainan buta warna</p>	<p>Pasien disuruh membaca huruf/angka yang ada di buku, ada pula pola untuk pasien ikuti dengan perbedaan warna yang ada.</p>
<p>11.</p>	<p>Laringeal mirror</p>		<p>Memeriksa keadaan dalam mulut</p>	<p>Cermin dimasukkan ke belakang rongga mulut dengan permukaan cermin menghadap keatas.</p>

12.	Nasal speculum		Memeriksa rongga hidung	Masukan alat ke rongga hidung dengan posisi vertikal, masukkan specukulum I cm ke dalam vesti bulum.
13.	Pen needle		Untuk penggunaan insulin, untuk mengendalikan kadar gula dalam darah	Siapkan insulin pen dan pen needle pasang pen needle dibawah lalu insulin pen siap digunakan.

14.	Percussion hammer		Mengetuk permukaan tubuh untuk menghasilkan suara dengan tujuan diagnostik	Pegang pada gagang pegangan oleh dokter, kemudian ayunkan alat ke arah bagian tubuh yang sakit/berkelainan.
15.	Pulse meter		Mengukur kadar oksigen dalam darah	Cuci tangan, nyalakan mesin kemudian jari tangan dimasukkan ke oxymeter, tunggu hingga mengeluarkan hasil pada layar, lepaskan klip, bersihkan oxymeter dengan alkohol.

16.	Rectum speculum		Memeriksa lubang anus/rectal	Cuci tangan, masukkan bagian anoskop ke dalam anus, sisipan itu melebarkan anus hingga diameter tabung.
17.	Reflex hamer		Memancing reaksi untuk mendeteksi kelaian fisik	dipegang pada bagian gagang pegangan oleh dokter yang bersangkutan. Kemudian palu tersebut akan di ayunkan mengarah ke bagian dari tendon yang disinyalir memiliki kelainan.

18.	Spirometer		<p>Mengukur aliran udara masuk dan keluar dari paru-paru</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Duduklah dengan posisi paling nyaman. 2. Kemudian, dokter akan menutup hidung Anda menggunakan alat semacam klip tepat di atas hidung. 3. Tarik napas dalam-dalam dan tahanlah selama beberapa detik. 4. Embuskan ke dalam mouthpiece pada spirometer sekuat dan secepat yang Anda bisa
19.	Stethoscope binaural		<p>Untuk mendengar bunyi /detak organ tubuh</p>	<ul style="list-style-type: none"> *Pastikan alat pendengar menghadap ke depan. Jika Anda memakainya menghadap ke belakang. Anda tidak akan bisa mendengar bunyi apa pun. *Pastikan alat pendengar memiliki bantalan yang ukurannya pas dan dapat mengunci" dengan baik di telinga Anda untuk menghindari suara-suara dari lingkungan sekitar. Jika ukurannya tidak pas, biasanya bantalan tersebut dapat dilepas. Kunjungi toko penyedia alat medis untuk membeli bantalan barua *Pada beberapa jenis stetoskop. Anda juga dapat memiringkan atau menekuk gagang alat pendengar ke depan untuk membuatnya pas di telinga

20.	Stethoscope monoaural		<p>Untuk mendengar suara organ dakim tubuh detak jantung bayi</p>	<p>Tempelkan bulat besar diperut ibu lalu gunakan untuk mendengar detak jantung bayi dengan bulatan kecil.</p>
21.	Stopwatch		<p>Untuk menghitung waktu</p>	<p>Stopwatch sesuai yang diinginkan, lalu letakan stopwatch di tempat aman.</p>

22.	Termometer digital		<p>Untuk mengukur suhu tubuh digital melalui mulut, ketiak dan rektal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nyalakan termometer dengan menekan atau menggeser tombol ON. 2. Masukkan termometer secara perlahan dan hati-hati ke dalam mulut, lipatan ketiak atau liang telinga anak. 3. Biarkan selama 3 sampai 5 menit atau tunggu sampai ada bunyi yang menunjukkan pengukuran suhu sudah selesai dilakukan.
23.	Termometer oral	 <p>hellery1</p>	<p>Mengukur suhu tubuh melalui oral</p>	<p>meletakkan ujung termometer di bagian bawah lidah dan tutup mulut hingga alat mengeluarkan bunyi tertentu.</p>

24.	Termometer rektal		<p>Mengukur suhu tubuh melalui rektal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencuci Tangan. 2. Siapkan Termometer. 3. Posisikan Tubuh dalam Keadaan Nyaman. 4. Masukkan Termometer ke Anus. Cabut Termometer dari Anus. 5. Catat Hasilnya dan Bersihkan Termometer
25.	Timer lab		<p>Untuk pengingat waktu medis</p>	<p>Searah jarum jam hingga ke-angka 55 Kemudian diputar balik ke arah waktu sesuai yang diinginkan.</p>

26.	Tongue depressor		<p>Untuk menekan lidah agar dapat melihat lebih jelas keadaan tenggorokan</p>	<p>Pasien diminta untuk membuka mulut, lalu tekan lidah dengan Tongue depressor</p>
27.	Tourniquet		<p>Untuk menghentikan pendarahan pada luka terbuka di lengan dan kaki</p>	<p>tourniquet dipasang pada 3-4 inci di atas tempat tusukan. Jika terlalu dekat dari tempat tusukan, vena dapat kolaps ketika darah terisap ke dalam tabung dan jika terlalu jauh dari tempat tusukan pengambilan darah tidak akan efektif.</p>

28.	Vaginal speculum		Untuk memeriksa lubang vagina	Dikedalam vagina selama opearsi langsung dan memeriksa vagina didalamnya.
-----	------------------	--	-------------------------------	---

C. SWAMEDIKASI

Buatlah studi kasus setiap harinya dengan katagori obat yang berbeda dan wajib menyelesaikan 20 jenis Obat yang tertera dalam tabel

No	Nama obat	Kategori	Studi Kasus	Patient assesment	Pemilihan Obat dan alasannya	Pelayanan informasi obat
1.	Analgetik dan antipiretik	Paracetamol; ibuprofen	<p>T: Selamat datang di kimia farma, ada yang bisa saya bantu</p> <p>P: Saya ingin membeli obat sakit kepala, kepala saya sering nyeri</p> <p>T: Baik mbak, udah berapa lama mbaknya mengalami nyeri kepalanya?</p> <p>P: Kira-kira sudah 5 bulan mbak, biasanya 3-4 kali seminggu muncul rasa nyerinya.</p> <p>T: Baik mbak, kalau keluhannya bagaimana mbak? untuk bagian kepala mana yang sering nyeri ya kak?</p> <p>P: Ini kepla bagian atas sama belakang dan rasanya seperti tertekan.</p> <p>T: Baik mbak, sebelumnya sudah mengonsumsi obat apa?</p> <p>P: Belum mbak, hanya saya gosok dengan minyak angin saja.</p> <p>T: Baik mbak, mohon maaf untuk usia mbaknya berapa ya?</p> <p>P: Saya berusia 35 tahun mbak</p> <p>T: Baik mbak, apakah mbaknya punya riwayat penyakit?</p> <p>P: Tidak ada mbak</p> <p>T: apakah mbaknya ada alergi obat</p>	<p>W: perempuan usia 35 tahun</p> <p>W: nyeri kepala bagian atas dan belakang seperti tertekan.</p> <p>H: 5 bulan, muncul rasa sakit 3-4 kali dalam seminggu</p> <p>A: gosok minyak angin</p> <p>M: belum ada</p>	<p>Obat yang terpilih yakni ibu profen 400mg</p> <p>Alasannya karena untuk mengobati sakit kepala dan sering nyeri</p>	<p>Indikasi : Mengobati sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot, rasa sakit pada saat haid, rasa sakit/nyeri setelah operasi.</p> <p>Cara penggunaan: diminum setelah makan 3 kali sehari</p> <p>Kapan berhenti: apabila kepala sudah tidak terasa nyeri</p> <p>Kapan harus ke dokter: apabila tidak ada perubahan setelah minum obat tersebut selama 3 hari lebih.</p> <p>ESO yang sering : Mual, muntah, diare, konstipasi, nyeri kambung, ruam kulit, sakit kepala, pusing.</p> <p>Cara penyimpanan: simpan ditempat yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari</p>

		<p>tertentu? P: Tidak ada mbak T: Baik mbak, tunggu sebentar ya saya ambilkan obatnya P: Baik mbak T: Mbak ini ada obat ibu profen 400mg diberikan denga tujuannya untuk mengurangi nyeri sakit kepala mbak. Diminum setelah makan 3 kali sehari. Untuk penyimpanan obatnya disimpan ditempat yang sejuk dan tidak terpapar sinar matahari. Nah, untuk kesehariannya sebaiknya istirahat yang cukup, konsumsi makanan yang sehat, olahraga dan minum yang cukup. Sampai disini ada yang ditanyakan lagi mbak? P: Baik mbak, tidak ada . untuk minumnya tadi 3 kali sehari setelah makan ya mbak? T: Betul mbak P: Baik mbak untuk total obatnya berapa ya? T: Totalnya 5.400 mbak P: Baik mbak ini uangnya T: Baik mbak saya terima ya, ini untuk notanya. Ada yang ditanya kembali? P: tidak ada mbak T: Baik mbak terimakasih, semoga sehat selalu</p>		
--	--	--	--	--

2.	Batuk	gliseril guaiakolat (guafenisin), bromheksin, diphenhidramin, asetilsistein, noskapin	<p>T : Selamat datang di kimia farma, ada yang bisa saya bantu?</p> <p>P : ini saya mau membeli obat, akhir akhir ini saya batuk berdahak, tidak bisa ngeluarin dahaknya obat apa yang cocok ya mbk ?</p> <p>T : Mohon maaf sebelumnya, ini dengan mbk siapa dan umur mbk berapa ya?</p> <p>P: Nama saya Nabila mbk umur saya 20 tahun</p> <p>T: Apakah sebelumnya mbk sudah priksa kedokter atau sudah menggunakan obat batuk lainnya?</p> <p>P: Belum ada mbk</p> <p>T: Baik mbk, kira-kira sakit batuknya sudah berapa lama ya?</p> <p>P: Baru 3 hari yang lalu mbk dan masih belum redah</p> <p>T: Baik tunggu sebentar mbk, saya ambilkan obatnya dahulu</p> <p>P: Baik mbk</p>	<p>W: Nabila usia 20 tahun</p> <p>W: batuk berdahak,dahak tidak bisa keluar</p> <p>H: 3 hari</p> <p>A: tidak ada</p> <p>M: belum ada</p>	<p>Obat yang terpilih flumucil dry syr (asetilsistein) alasannya karena pasien megeluh batuk berdahak tetapi dahak tidak bisa keluar dan sirup lebih cepat diserap tubuh karena dalam bentuk terlarut</p>	<p>Indikasi : sebagai obat batuk mukolitik untuk mengencerkan dahak disaluran pernapasan</p> <p>Cara penggunaan: diminum setelah makan 3 kali sehari 10ml</p> <p>Kapan berhenti: apabila sudah tidak batuk (maksimal 12 hari)</p> <p>Kapan harus ke dokter: apabila batuk lebih dari 10 hari</p> <p>ESO yang sering : Mual, muntah, diare, sakit kepala, radang mulut</p> <p>Cara penyimpanan: simpan ditempat yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari</p>
----	-------	---	--	--	---	---

T: mbk Nabila ini saya ada obat fluimucil dry syrup digunakan untuk mengencerkan dahaknya

P: Untuk aturan minumnya bagaimana ya mbk?

T: sebelumnya tambahkan air dahulu sampai garis batas yang ada dibotol setelah itu tutup botol dan kocok hingga tercampur rata. untuk aturan minumnya setelah makan 3 kali sehari 10ml ya mbk.

P: Kalau sudah sembuh apakah harus diminum ya mbk?

T: Kalau mbknya sudah sembuh tidak perlu diminum, mbk bisa simpan obat di tempat yang sejuk dan hindarkan dari matahari secara langsung

P: Baik mbk

T: Apakah sudah jelas terkait informasi dan aturan pakai yang saya jelaskan tadi mbk?

P: Iyah mbk saya faham, berapa harga obatnya mbk ?

T: harganya Rp.87.000 mbk

P: ini uangnya mbk

			<p>T: Saya terima uangnya mbk</p> <p>P: iyah baik mbk</p> <p>T: ini obatnya mbk dan uang kembalianya, Terima kasih semoga sehat selalu</p> <p>P: Iyah mbk terima kasih</p>			
3.	Obat Flu	<p>Sediaan kombinasi parasetamol, dekstrometorf an, gliseril guaiaikolat (guafenisin), CTM, dan efedrin/pseudo efedrin/ fenilpropanolamin</p>	<p>A: selamat datang di kimia farma, ada yang bisa saya bantu?</p> <p>Ibu B: iya mbak, sore. Gini mbak saya mau membelikan obat untuk anak saya, sudah 2 hari yang lalu dia mengeluh demam dan hidung tersumbat.</p> <p>A: Baik bu, tadi gejalanya disertai batuk atau tidak bu?</p> <p>Ibu B: tidak mbak.</p> <p>A: Apakah sebelumnya sudah diberi obat bu?</p> <p>Ibu B: belum mbak, soalnya belum terlalu parah. Terus hanya saya suruh istirahat dulu jangan sekolah.</p> <p>A: apa demam nya sudah tinggi bu?</p> <p>Ibu B: belum terlalu sih mbak, tadi saya cek dirumah dengan thermometer suhunya 38°C.</p>	<p>W: Anak usia 10 tahun</p> <p>W: demam dan hidung tersumbat</p> <p>H: 2 hari</p> <p>A: tidak ada</p> <p>M: belum ada</p>	<p>Obat yang terpilih inza sirup (sediaan kombinasi paracetamol) Alasannya karena pasien mengalami gejala flu dan pasien menginginkan sediaan sirup</p>	<p>Indikasi : obat flu yang dapat meringankan gejala flu pada anak seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat dan bersin-bersin.</p> <p>Cara penggunaan: diminum setelah makan sehari 3 kali 2 sendok takar</p> <p>Kapan berhenti: apabila sudah tidak ada gejala flu</p> <p>Kapan harus ke dokter: apabila demam belum turun dan hidung masih tersumbat</p> <p>ESO yang sering : mengantuk, diare, mual.</p> <p>Cara penyimpanan: simpan ditempat yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari</p>

A: anaknya usia berapa bu? Ibu B: umurnya 10 tahun mbak.

A: oo... iya. Ini anaknya mau dikasih sirup apa tablet aja ya bu?

Ibu B: sirup aja mbak.

A: ya bu, tunggu sebentar ya saya ambilkan obatnya.

Ibu B: baik mbak.

A: ibu, ini obat untuk anaknya.

Ibu B: oo.... Di kasih inza sirup ya mbak? A: iya bu, soalnya anaknya kan nggak batuk, terus demamnya juga belum terlalu tinggi.

Ibu B: gitu ya mbak?

A: iya bu. Ini nanti diminum sehari 3x2 sendok takar ya bu. Diminum sesudah makan, terus ini sendok takarnya sudah ada di dalam. Nanti efek sampingnya ngantuk ya bu.

Ibu B: oo... ya mbak. Ya sudahlah tidak apa-apa efek sampingnya ngantuk biar anaknya sekalian istirahat.

A: iya bu sebaiknya anaknya banyak-banyak istirahat dan konsumsi makanan yang bergizi


			<p>biar cepat sembuh. Sudah jelas belum bu untuk aturan minumnya?</p> <p>Ibu B: iya mbak, ini diminum sehari 3 kali 2 sendok takar sesuai makan .</p> <p>A: iya bu betul... terus ini nanti kalau anaknya demamnya belum turun dan hidungnya masih tersumbat setelah 3 hari penggunaan obat, segera periksa ke dokter ya bu.</p> <p>Ibu B: Baik mbak, berapa harga obatnya mbak</p> <p>A: untuk harganya 27.000</p> <p>ibu B : baik mbak ini uangnya</p> <p>A: baik ibu ini untuk notanya , ada yang ditanyakan kembali bu?</p> <p>Ibu B: sudah mbk tidak ada terimakasih mbak</p> <p>A : terimakasih kembali bu, semoga sehat selalu</p>			
4.	Obat Maag	Antasida, antagonis H2 (ranitidine, famotidine)	<p>T : selamat datang di kimia farma, ada yang bisa dibantu ?</p> <p>P : saya mau beli obat, saya mengalami keluhan sakit lambung</p> <p>T : maaf sebelumnya mbak, umur mbaknya berapa ya ?</p>	<p>W: perempuan usia 24 tahun</p> <p>W: sakit lambung(sakit dibagian ulu hati), pusing</p>	<p>Obat yang terpilih adalah antasida</p> <p>Alasannya karena antasida dapat menetralkan asam</p>	<p>Indikasi : Mengurangi gejala-gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung, tukak lambung, gastritis, tukak usus 12 jari, dengan gejala mual, nyeri</p>

		<p>P: umur saya 24 tahun T : sudah berapa lama mengalami keluhan tersebut?apakah rasa sakitnya konstan atau hilang timbul mbak? P : sudah hampir 2 minggu, untuk rasa sakitnya hilang timbul mbak T : untuk sakitnya dibagian mana ya mbak ? P : Dibagian ulu hati mbak T : apakah ada keluhan lainnya mbak? P : terkadang sering pusing mbak T : pusingnya ini mbak bisa diakibatkan karena gejala maag ini, sebelumnya sudah mengonsumsi obat apa mbak? P: belum mbak T : sebentar ya mbak saya ambikan obatnya dulu P : baik mbak T : ini mbak saya beri antasida, yang mana antasida itu dapat menetralsir asam lambung, mengurangi nyeri lambug, tetapi untuk pemakaian obat seperti ini hanya dalam waktu singkat karena jika pemakaian dalam waktu lama akan menyebabkan diare. Untuk minumnya 2 kali sehari sebelum makan ya mbak, tabletnya dikunyah terlebih dahulu sebelum ditelan ya mbak. Untuk penyimpanan obat ini disimpan di tempat yang kering dan terhindar dari sinar matahari. Bagaimana mbak apakah ada yang ditanyakan lagi ? P : Baik mbak untuk pantangannya apa</p>	<p>H: hampir 2 minggu, hilang timbul A: belum ada M: belum ada</p>	<p>lambung , mengurangi nyeri lambung</p>	<p>lambung, nyeri ulu hati. Cara penggunaan: diminum sebelum makan 2 kali sehari (dikunyah) Kapan berhenti: apabila sudah tidak terasa sakit Kapan harus ke dokter: apabila masih ada keluhan setelah minum obat tersebut selama 3 hari. ESO yang sering : Mual, muntah, diare, konstipasi. Cara penyimpanan: simpan ditempat yang sejuk, kering dan terhindar dari sinar matahari</p>
--	--	---	--	---	---

		<p>aja ya mbak ?</p> <p>T : pola makan diatur, hindari stress, tidak bergadang dan tidak boleh banyak minum kopi ya mbak</p> <p>P : baik mbak terimakasih banya</p> <p>T : oh iya mbak jika keluhan masih ada sesudah mengonsumsi antasida selama 3 hari segera konsultasikan ke dokter ya mbak.</p> <p>P: baik mbak, untuk harga obatnya berapa ya?</p> <p>T: untuk harganya Rp.4.000</p> <p>P : oke ini uangnya mbak</p> <p>T : baik ini uangnya saya terima, ini untuk notanya. Apakah ada yang ditanyakan kembali?</p> <p>P : tidak mbak sudah cukup terimakasih</p> <p>T : terima kasih kembali, semoga sehat selalu.</p>		
--	--	--	--	--

5.	Kecacingan	Pirantel pamoat, piperazin, mebendazol	<p>T : Selamat datang di kimia farma, ada yang bisa saya bantu?</p> <p>P : Saya mau membeli obat mbak. Jadi gini mbak saya dalam beberapa hari ini mengalami gejala gatal dan timbul ruam pada kulit, berat badan saya juga turun, sakit perut, lemes dan juga hilang nafsu makannya mbak.</p> <p>T : mohon maaf sebelumnya, masnya umur berapa ya?</p> <p>P : umur 20 tahun</p> <p>T : sudah berapa lama masnya mengalami keluhan ini?</p> <p>P : kalau untuk turun berat badan sudah sekitar 1 minggu mbak dan untuk gatal serta timbul ruam baru munculnya 2 hari kemarin</p> <p>T : apakah sudah periksa kedokter atau sudah mengonsumsi obat lain?</p> <p>P : belum mbak</p> <p>T : baik mas , sepertinya dilihat dari gejala masnya mengalami gejala penyakit kecacingan</p> <p>P : oh gitu ya mbak, kalau begitu obat apa yang cocok mbak?</p> <p>T : sebentar ya mas saya ambilkan obatnya dulu</p> <p>P : baik mbak</p>	<p>W: laki-laki usia 20 tahun</p> <p>W: gejala gatal dan timbul ruam pada kulit, berat badan saya juga turun, sakit perut, lemes dan juga hilang nafsu makan</p> <p>H: turun berat badan sudah sekitar 1 minggu, gatal serta timbul ruam baru munculnya 2 hari kemarin</p> <p>A: belum ada</p> <p>M: belum ada</p>	<p>Obat yang terpilih yakni mebendazol</p> <p>Alasannya karena dapat membasmi cacing dan berspektrum luas</p>	<p>Indikasi : mengobati berbagai jenis infeksi cacing di usus. Beberapa kondisi yang bisa diatasi dengan obat ini adalah infeksi cacing kremi (<i>enterobiasis</i>), cacing gelang (<i>ascariasis</i>), cacing tambang, dan cacing cambuk.</p> <p>Cara penggunaan: diminum 2 kali sehari 1 tablet sesudah makan dalam 3 hari berturut – turut.</p> <p>Kapan berhenti: apabila sesudah minum 3 hari berturut-turut tidak ada perubahan</p> <p>Kapan harus ke dokter: apabila tidak ada perubahan setelah minum obat tersebut selama 3 hari lebih.</p> <p>ESO yang sering : Mual, muntah, perut kembung, nafsu makan berkurang.</p> <p>Cara penyimpanan: simpan</p>

		<p>T : ini mas untuk kecacingan yaitu mebendazol, diminum 2 kali sehari 1 tablet sesudah makan dalam 3 hari berturut – turut. Untuk efek sampingnya yakni mual sakit perut, diare dan sakit kepala.</p> <p>P : untuk penyimpanan obatnya bagaimana ya mbak ?</p> <p>T : disimpan ditempat yang sejuk , kering dan terhindar dari sinar matahari ya mas, ada yang ditanyakan kembali?</p> <p>P : baik mbak sudah jelas, untuk minumnya tadi 2 kali sehari 1 tablet sesudah makan ya mbak</p> <p>T : iya betul mas</p> <p>P : baik mbak untuk harganya berapa ya?</p> <p>T : harganya Rp.23.000 mas</p> <p>P : baik mbak ini uangnya</p> <p>T : baik saya terima uangnya ya mas, ini untuk notanya, ada yang ditanyakan kembali</p> <p>P : sudah mbak terimakasih banyak ya</p> <p>T : terimakasih kembali mas, semoga sehat selalu</p>		<p>ditempat yang kering sejuk dan terhindar dari sinar matahari</p>
--	--	---	--	---



6.	Diare	Attal pugit, kaolin pectin, oralit, Norit	T : selamat datang di kimia farma, ada yang bisa saya bantu? P : saya mau beli obat untuk diare mbak T : obatnya untuk ibunya sendiri atau orang lain? P : iya untuk saya sendiri	W: perempuan usia 45 tahun W: diare , sehari 5 kali H: 1 hari	Obat yang terpilih diagit (attapulgit dan pectin) Alasannya	Indikasi : Untuk pengobatan simptomatik pada diare yang tidak diketahui penyebabnya. Cara penggunaan: Dewasa dan anak-anak > 12 tahun : Mula -

		<p>T : untuk usianya ibu berapa? P : usia saya 45 tahun T : baik bu, sudah berapa lama ibu mengalami diare? P : baru hari ini mbak sudah 5 kali ke kamar mandi T : apakah ada keluhan lain bu? P : tidak ada mbak T : sebelumnya sudah mengonsumsi obat apa ? dan tindakan apa yang sudah dilakukan ? P : belum mengonsumsi obat hanya saja perut saya kasih minyak kayu putih T : baik bu, sebentar saya ambilkan obatnya dulu P : baik mbak T : ini bu untuk obatnya saya beri diagit ya bu, untuk cara minumnya diminum sesudah makan 2 tablet, lalu apabila buang air lagi diminum 2 tablet lagi setelah buang air. Maksimal 12 tablet selama 1 hari atau 24 jam.</p> <p>P : baik mbak, untuk penyimpanan obatnya bagaimana ya ? T : obatnya disimpan ditempat yang kering, sejuk dan tidak terkena paparan sinar matahari ya bu P : baik mbak, untuk harganya berapa ya? T : harganya Rp.38.000 P : ini mbak uangnya T : baik uangnya saya terima ya bu, ini untuk notanya , ada yang ditanyakan kembali?</p>	<p>A: memberi minyak kayu putih di perut M: belum ada</p>	<p>karena dapat mengabsorpsi beberap racun dan bakteri penyebab virusserta dapat mengurangi frekuensi buang air besar</p>	<p>mula 2 tablet, diikuti dengan penambahan 2 tablet lagi setiap selesai buang air besar, maksimum 12 tablet selama 24 jam. Anak-anak 6-12 tahun : Mula - mula 1 tablet kemudian 1 tablet lagi, setiap selesai buang air besar, maksimum 6 tablet selama 24 jam.</p> <p>Kapan berhenti: apabila 2 hari belum ada perubahan</p> <p>Kapan harus ke dokter: apabila lebih dari 2 hari tidak ada perubahan</p> <p>ESO yang sering : Mual, pusing, konstipasi</p> <p>Cara penyimpanan: simpan ditempat yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari</p>
--	--	---	--	---	--

			<p>P : sudah mbak terimakasih T : terima kasih kembali bu , semoga sehat selalu</p>			
7.	Laksatif	Bisakodil, laktulosa, Na lauril sulfat.	<p>T : selamat datang di kimia farma, ada yang bisa dibantu? P : iya mbak saya mau membeli obat untuk melancarkan BAB T : obatnya untuk ibunya sendiri? P : tidak mbak untuk ibu saya T : baik, untuk ibunya usianya berapa ya? P : 65 tahun mbak, ibu saya sudah tidak bisa kemana- mana hanya ditempat tidur T : keluhan apa yang dirasakan saat ini bu? P : akhir – akhir ini katanya susah buang air besar,nyeri perut, kembung, muntah, demam dan berat badannya turun. T : sudah berapa lama bu untuk keluhannya? P : sudah seminggu yang lalu mbak T : apakah sebelumnya sudah mengonsumsi obat lain? P : belum mbak T : maaf kalau untuk pola makan ibunya bagaimana ya bu? Apakah suka mengonsumsi sayuran? P : jarang sih mbak T : apakah sekarang ibunya sedang mengonsumsi obat lain? P : iya mbak sekarang rutin mengonsumsi obat kolestrolnya T : oh begitu, apakah ibunya memiliki riwayat lain atau ada alergi obat?</p>	<p>W: perempuan lansia umur 65 tahun (hanya bisa ditempat tidur) W: susah buang air besar,nyeri perut, kembung, muntah, demam dan berat badannya turun H: 1 minggu A: belum ada M: belum ada</p>	<p>Obat yang terpilih yakni microlax gel Alasannya karena dapt mengatasi susah BAB dan mudah digunakan untuk lansia yang hanya bisa ditempat tidur</p>	<p>Indikasi : Obat ini digunakan untuk mengatasi susah buang air besar/BAB (sembelit), khususnya diberikan pada penderita yang harus tinggal di tempat tidur, orang dewasa, lansia, anak-anak dan wanita hamil.</p> <p>Cara penggunaan: Pertama-tama cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun, lalu buka tutup kemasan obat dan ambil posisi badan duduk atau berbaring miring ke kanan/ kiri. Kemudian tekan tube dan keluarkan sedikit obat untuk melumasi bagian ujung kemasan. Masukkan ujung kemasan kedalam dubur secara perlahan, lalu tekan tube hingga semua isi kemasan masuk seluruhnya. Setelah seluruh isi kemasan keluar seluruhnya, tarik perlahan ujung kemasan dengan tetap menekan tube.kemudian terakhir cuci tangan kembali</p>

		<p>P : tidak ada mbak</p> <p>T : oke jadi gini bu, penyebab ibunya njenengan susah BAB karena kurang asupan makanan yang berserat, tunggu sebentar saya ambilkan obatnya ya bu</p> <p>P : baik mbak</p> <p>T : ini bu obatnya, namanya microlax , ini tidak untuk ditelan ya bu tetapi pemakaiannya melalui dubur . sebelumnya apakah ibu pernah menggunakan obat ini</p> <p>P : belum mbak, bagaimana mbak caranya?</p> <p>T : Kalau begitu saya jelaskan cara menggunakannya ya bu. Pertama-tama cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun, lalu buka tutup kemasan obat dan ambil posisi badan duduk atau berbaring miring ke kanan/ kiri. Kemudian tekan tube dan keluarkan sedikit obat untuk melumasi bagian ujung kemasan. Masukkan ujung kemasan kedalam dubur secara perlahan, lalu tekan tube hingga semua isi kemasan masuk seluruhnya. Setelah seluruh isi kemasan keluar seluruhnya, tarik perlahan ujung kemasan dengan tetap menekan tube. Terakhir ibu cuci tangan kembali menggunakan air dan sabun. Nah biasanya obat Microlax ini dapat memberikan efek sekitar 5-30 menit setelah pemakaian.</p> <p>P : oh iya mbak faham</p> <p>T : baik bu, satu kemasan microlax ini untuk satu kali pemakaian, jika kondisi</p>			<p>Kapan berhenti: apabila tidak kunjung membaik</p> <p>Kapan harus ke dokter: apabila tidak kunjung membaik</p> <p>ESO yang sering : BAB berdarah,mual, muntah</p> <p>Cara penyimpanan: Disimpan di tempat bersuhu dingin 2 derajat C - 8 derajat C dan dalam wadah tertutup rapat.</p>
--	--	---	--	--	--

			<p>tidak kunjung membaik segera konsultasi dengan dokter saja ya bu</p> <p>P : baik bu</p> <p>T : saya sarankan banyak mengonsumsi makanan yang berserat tinggi ya seperti sayuran dan buah buahan.</p> <p>P : baik mbak</p> <p>T : ada yang ditanyakan lagi ?</p> <p>P : tidak mbak sudah cukup , berapa harganya mbak?</p> <p>T : untuk harganya Rp.29.000</p> <p>P : baik mbak ini uangnya</p> <p>T : uangnya saya terima ya bu, ini untuk notanya terimakasih , semoga sehat selalu</p> <p>P : aamiin makasii mbak</p>			
8.	Biang keringat, pruritus, antihistamin topikal	Salisil talk dan sediaan yang mengandung kalamini; difenhidramin 2%, prometazin HCl 2%.	<p>T : selamat datang di kimia farma , ada yang bisa dibantu ?</p> <p>P : saya mau beli obat untuk gatal kemerahan ada mbak?</p> <p>T : mohon maaf ibu untuk ibu sendiri atau anak ibu ya?</p> <p>P : untuk anak saya umur 4 tahun</p> <p>T : sebelumnya ada keluhan apa ya bu?</p> <p>P : gini mbak, gatal kemerahan di punggung dan rasa panas, timbul bintik-bintik merah dikulit mbak</p> <p>T : sudah berapa hari bu ?</p> <p>P : sudah 2 hari ini</p>	<p>W: anak usia 4 tahun</p> <p>W: gatal kemerahan di punggung dan rasa panas, timbul bintik-bintik merah dikulit</p> <p>H: 2 hari</p> <p>A: belum ada</p> <p>M: belum ada</p>	Obat yang terpilih adalah caladine lotion Alasannya karena dapat mengurangi rasa gatal dan penyejuk kulit. Pasienn ingin obat dari luar	<p>Indikasi : Mengobati gatal karena biang keringat, udara panas, gigitan serangga. Selain itu dapat digunakan sebagai antialergi, antideptik dan penyejuk kulit</p> <p>Cara penggunaan: Bersihkan bagian kulit yang gatal lalu oleskan, sebaiknya digunakan sehabis mandi pagi dan sore.</p> <p>Kapan berhenti: -</p>

		<p>T : baik apakah sebelumnya sudah mengonsumsi obat</p> <p>P : belum ada mbak, saya ingin obat luar saja mbak karena anak saya susah banget minum obat</p> <p>T : apakah sebelumnya ada alergi?</p> <p>P : tidak ada mbak</p> <p>T : baik sebentar bu saya ambilkan obatnya</p> <p>P : baik mbak</p> <p>T : bu ini untuk obatnya saya kasih caladine lotion ya bu. Untuk pemakaiannya bersihkan area yang gatal lalu oleskan secukupnya, sebaiknya beri setelah mandi pagi dan sore.</p> <p>P : baik mbak</p> <p>T : bila gatal tidak kunjung membaik seger konsultasikan ke dokter saja</p> <p>P : baik mbak, untuk harganya berapa?</p> <p>T : untuk harganya Rp.20.000</p> <p>P : baik mbak ini uangnya</p> <p>T : baik bu, uangnya saya terima. Ini untuk notanya . ada yang ditanyakan kembali?</p> <p>P : sudah cukup mbak</p> <p>T : baik bu terimakasih , semoga sehat selalu</p> <p>P : aamiin sama- sama mbak</p>			<p>Kapan harus ke dokter: apabila tidak ada perubahan</p> <p>ESO yang sering : Pemakaian obat umumnya memiliki efek samping tertentu dan sesuai dengan masing-masing individu. Jika terjadi efek samping yang berlebihan dan berbahaya, harap konsultasikan kepada tenaga medis. Efek samping yang mungkin terjadi dalam penggunaan obat adalah: Jarang terjadi: Mungkin bisa menimbulkan alergi, periksakan ke dokter bila muncul gejala alergi. Cara penyimpanan: simpan ditempat yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari</p>	
9.	Jerawat	Obat yang mengandung sulfur;	<p>T : selamat datang di kimia farma , ada yang bisa dibantu ?</p> <p>P : saya mau beli obat untuk jerawat ada</p>	<p>W: perempuan umur 21 tahun</p> <p>W: jerawat tidak</p>	Obat yang terpilih yakni bioacne cream	Indikasi : membantu menghilangkan dan mencegah jerawat

	<p>resorsinol; asamsalisilat; benzoil peroksida; triclosan, minosiklin1%.</p>	<p>mbak? T : mohon maaf mbak, untuk mbak sendiri atau orang lain? P : untuk saya sendiri T : mohon maaf sebelumnya dengan mbak siapa dan umurnya berapa nggeh? P : dengan mbak salma, umur saya 21 tahun T : baik mbak salma, untuk keluhannya bagaimana ya? P : gini mbak biasanya jerawat saya muncul saat saya haid saja, tetapi sekarang sudah satu minggu jerawat saya tidak menghilang malah bertambah padahal saya tidak haid. T : baik apakah ada keluhan lain? P : tidak ada mbak T : baik sebentar saya ambilkan obatnya dulu P : baik mbak T : permisi mbak salma ini untuk obatnya saya ada bioacne cream ya untuk menghilangkan dan mencegah adanya jerawat. Untuk pemakaiannya oleskan tipis 2-3 kali sehari setelah kulit dibersihkan ya mbak. P : baik mbak, apakah ada pantangannya mbak? T : sebaiknya hindari makanan yang tinggi karbohidrat, coklat dan makanan cepat saji.jangan lupa selalu membersihkan wajah saat dari luar rumah ya mbak karena debu juga bisa menjadi</p>	<p>kunjung menghilang dan makin bertambah H: 1 minggu A: belum ada M: belum ada</p>	<p>(cetrimide, resolsinol, sulfur) alasan nya karena dapat menghilangkan dan mencegah adanya jerawat serta keluhan hanya jerawat biasa tidak meradang</p>	<p>Cara penggunaan: oleskan tipis 2-3 kali sehari setelah wajah dibersihkan</p> <p>Kapan berhenti: apabila jerawat tidak kunjung membaik</p> <p>Kapan harus ke dokter: apabila tidak kunjung membaik</p> <p>ESO yang sering : rasa panas, iritasi</p> <p>Cara penyimpanan: simpan ditempat yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari</p>
--	---	--	---	---	---

			<p>penyebab munculnya jerawat</p> <p>P : baik mbak, untuk harganya berapa?</p> <p>T : harganya Rp.25.000 mbak</p> <p>P : baik mbak ini uangnya</p> <p>T : baik saya terima uangnya, ini untuk notanya . ada yang ditanyakan kembali mbak?</p> <p>T : sudah cukup mbak terima kasih banyak ya mbak</p> <p>P : terima kasih kembali, semoga sehat selalu mbak</p>			
10.	Kadas/kurap, antifungi	<p>Obat yang mengandung klotrimazol 1%, mikonasol nitrat 2%, ketoconazole nitrat</p>	<p>T : selamat datang di kimia farma , ada yang bisa dibantu ?</p> <p>P : saya mau beli obat untuk gatal-gatal ada mbak?</p> <p>T : mohon maaf mbak, untuk mbak sendiri atau orang lain?</p> <p>P : untuk saya sendiri mbak</p> <p>T : untuk keluhannya bagaimana ya pak?</p> <p>P : gini mbak selama tiga hari ini saya merasakan gatal di tangan saya seperti ini (menunjukkan gatal ditangannya)</p> <p>T : sebelumnya apakah ada alergi pak?</p> <p>P : tidak ada mbak</p> <p>T : baik pak, sebelumnya apakah sudah mengonsumsi atau memakai obat lain?</p> <p>T : belum mbak</p> <p>T : baik pak, sepertinya bapak terkena kurap. Sebentar saya ambilkan obatnya terlebih dahulu</p>	<p>W: laki-laki</p> <p>W: kurap</p> <p>H: 3 hari</p> <p>A: belum ada</p> <p>M: belum ada</p>	<p>Obat yang terpilih adalah neo ultrasilin (klotrimazol 1%) alasannya karena dapat mengobati kurap dan harganya terjangkau</p>	<p>Indikasi : Untuk pengobatan topikal dari candidiasis, Pityriasis versicolor, Tinea pedis, Tinea cruris dan tinea corporis.</p> <p>Cara penggunaan: oleskan tipis 2-3 kali sehari setelah kulit dibersihkan</p> <p>Kapan berhenti: apabila tidak kunjung membaik</p> <p>Kapan harus ke dokter: apabila tidak kunjung membaik dan bertambah</p> <p>ESO yang sering : rasa panas, iritasi, rasa terbakar</p>

		<p>P : baik mbak T : ini pak saya ada fungiderm krim kandungannya klotrimazol P : untuk harganya berapa ya mbak? T : untuk harganya Rp.31.000 pak P : maaf mbak adakah yang lebih murah lagi? T : kalo yang lebih murah ini ada neo ultrasilin untuk kandungannya sama pak P : baik mbak, saya ambil neo ultrasilin saja T : baik pak, untuk cara pemakaiannya oleskan tipis-tipis 2-3 kali sehari setelah tangan yang gatal tadi dibersihkan nggeh. Setelah mengoleskan jangan lupa cuci tangan ya pak karena bisa menular ke kulit lainnya. P : baik mbak T : ada yang ditanyakan lagi pak? P : sampun mbak terimakasih, ini untuk uangnya mbak T : baik pak saya terima uangnya, ini untuk notanya. Oh iya pak jika kurap tidak kunjung membaik dan bertambah segera konsultasikan ke dokter saja ya pak P : baik mbak terimakasih banyak T : terima kasih kembali pak, semoga sehat selalu</p>		<p>Cara penyimpanan: simpan ditempat yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari</p>
--	--	---	--	---

11.	Ketombe	<p><i>Shampoo</i> yang mengandung Selenium sulfid, Zinc pyrithione.</p>	<p>T : selamat datang di kimia farma , ada yang bisa dibantu ? P : saya mau beli shampo untuk ketombe T : mohon maaf bu, untuk ibu sendiri atau orang lain? P : untuk anak saya T : mohon maaf bu, anaknya usia berapa nggeh? P : anak saya usia 19 tahun T : baik bu, untuk keluhannya bagaimana ya bu? P : katanya 5 hari ini kepalanya terasa sedikit gatal dan ternyata ada ketombenya T : baik bu sebentar saya ambilkan shamponya P : baik mbak T : permisi bu ini untuk shampo ketombenya saya ada selsun gold dengan kandungan selenium sulfid dapat mengatasi rambut berketombe P : untuk harganya berapa ya mbak? T : harganya Rp.50.000 bu P : baik mbak saya ambil satu ya, untuk cara pemakaiannya bagaimana ya? T : waktu keramas jangan langsung di</p>	<p>W: perempuan berusia 19 tahun W: rambut berketombe sedikit gatal H: 5 hari A: belum ada M: belum ada</p>	<p>obat yang terpilih adalah shampoo selsun gold alasannya karena dapat mengatasi rambut berketombe</p>	<p>Indikasi :mengatasi rambut berketombe</p> <p>Cara penggunaan: untuk keramas, dibiarkan 2-3 menit saat pemakaian untuk mendapatkan hasil yang maksimal</p> <p>Kapan berhenti: Apabila tidak kunjung mebaik</p> <p>Kapan harus ke dokter: apabila semakin parah</p> <p>ESO yang sering : -</p> <p>Cara penyimpanan: simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>

			<p>bilas nggeh bu, tunggu 2-3 menit baru dibilas agar dapat hasil yang maksimal</p> <p>P : baik mbak siap, ini untuk uangnya</p> <p>T : baik bu saya terima uangnya, ini untuk notanya , ada yang ditanyakan kembali?</p> <p>P : sudah mbak tidak ada terimakasih</p> <p>T : terima kasih kembali bu, semoga sehat selalu</p>			
12.	Kutil	<p>obat yang mengandung asam salisilat 2 g, asam laktat 0,5 g.</p>	<p>T : selamat datang di kimia farma , ada yang bisa dibantu ?</p> <p>P : saya mau beli obat untuk penyakit kulit saya mbak</p> <p>T : mohon maaf bu, untuk keluhannya bagaimana ya bu?</p> <p>P : tidak ada mbak, cuman 2 hari yang lalu saya baru menyadari kalau di jari tangan saya ada tonjolan seperti ini mbak.</p> <p>T : mohon maaf sebelumnya, boleh saya lihat kondisi tangannya bu?</p> <p>P : ini mbak</p> <p>T : baik bu, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah periksa ke dokter ?</p> <p>P : belum mbak</p> <p>T: baik bu, jadi ini penyakit kulit yang Ibu alami namanya kutil.</p> <p>P : lalu bagaimana mbak cara pengobatannya ?</p> <p>T : sebentar saya ambilkan obatnya ya bu.</p> <p>P : iya mbak</p> <p>T: ibu ini obatnya Callusol. Obat ini untuk menghilangkan penyakit kulit</p>	<p>W: perempuan</p> <p>W: kutil</p> <p>H: 2 hari</p> <p>A: belum ada</p> <p>M: belum ada</p>	<p>Obat yang terpilih adalah callusol(asam salisilat, asam laktat, polidocanol) alasannya karena dapat mengobati kutil</p>	<p>Indikasi : mengobati mata ikan, kulit yang mengeras dan kulit</p> <p>Cara penggunaan: callusol dituangkan ke kapas/kasa, ditempelkan di bagian yang luka selama semalam</p> <p>Kapan berhenti: apabila tidak ada perubahan atau iritasi</p> <p>Kapan harus ke dokter: apabila tidak kunjung membaik dan bertambah</p> <p>ESO yang sering : iritasi</p> <p>Cara penyimpanan: simpan ditempat yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari</p>

seperti mata ikan, kapalan, atau kutil yang muncul dikulit.

P : untuk cara penggunaannya gimana ya mbak ?

T: untuk penggunaannya ibu cukup bersihkan terlebih dahulu daerah kulit yang akan di obati. kemudian Ibu sediakan kapas, lalu teteskan obat Callusol di atas kapas, selanjutnya kapas tersebut di tempelkan ke permukaan kulit yang di obati. Pemakaian obat ini setiap habis mandi pagi dan sore bu. Apakah Ibu sudah paham ?

P : sudah mbak.

T : baik. Bisakah Ibu mengulangi penjelasan saya ?

P : sebelum saya menggunakan obat Callusol saya bersihkan terlebih dahulu tangan saya, kemudian obatnya di teteskan di atas kapas lalu di tempelkan di tangan yang akan saya obati. Obat ini digunakan habis mandi pagi dan sore.

T : baik bu saya kira ibu sudah paham dengan penjelasan saya. Ada yang perlu ditanyakan kembali bu?

P : sudah cukup mbak, untuk harganya berapa ?

T : harganya Rp. 37.000

P : baik mbak ini uangnya

T : baik bu saya terima uangnya, ini untuk notanya

P : baik mbak terimakasih

T ; terima kasih kembali bu, semoga sehat

			selalu			
13.	Luka bakar	Obat yang mengandung perak sulfadiazin; oleumiecoris aselli (minyak ikan, "levertraan").	<p>T: selamat datang di kimia farma, ada yang bisa saya bantu ibu?</p> <p>P: ini lo mbak tadi saya habis goreng ikan dan tangan saya terkena cipratan minyak</p> <p>T: untuk keluhannya bagaimana bu?</p> <p>P: ini mbak panas terus sakit</p> <p>T: sebelumnya sudah dikasih obat apa ibu?</p> <p>P: belum mbak, hanya saya siram air saja</p> <p>T: baik bu, saya ambilkan obatnya dulu nggeh</p> <p>P: baik mbak</p> <p>T: bu ini saya ada burnazin salep gunannya untuk mengobati dan mencegah infeksi pada luka bakar yang rentan pada infeksi sekunder</p> <p>P: untuk harganya berapa ya mbak?</p> <p>T: harganya Rp. 85.000 bu</p>	<p>W: Ibu rumah tangga</p> <p>W: terdapat luka ditangan karena minyak goreng</p> <p>H: baru saja</p> <p>A: disiram air mengalir</p> <p>M: belum ada</p>	Obat yang terpilih adalah benazin cream Alasannya karena silvir sulfadiazine dapat digunakan untuk mengobati atau mencegah infeksi pada luka bakar yang rentan terhadap infeksi sekunder	<p>Indikasi : Obat antimikroba topikal yang diindikasikan untuk pencegahan dan pengobatan sepsis luka pada pasien tingkat luka bakar ke dua dan ke tiga</p> <p>Cara penggunaan: 2-3kali sehari, Dioleskan tipis pada kulit yang sakit.</p> <p>Kapan berhenti : Apabila luka bakar sudah sembuh</p> <p>Kapan harus ke dokter : Apabila luka bakar semakin parah</p> <p>ESO yang sering :</p>

			<p>P : baik mbak saya beli itu saja, untuk cara pemakaiannya bagaimana ya mbak?</p> <p>T : cukup oleskan 2-3 kali sehari dan oleskan tipis-tipis saja ya bu</p> <p>P : baik mbak, apakah ada efek sampingnya?</p> <p>T : untuk efek sampingnya gatal , rasa terbakar dan ruam pada kulit bu. Oh iya bu jika luka ibu semakin parah segera periksakan ke dokter saja ya bu</p> <p>P : baik mbak, ini uangnya</p> <p>T : baik bu saya terima, terimakasih semoga sehat selalu</p>			<p>Rasa terbakar, gatal, dan ruam pada kulit</p> <p>Cara penyimpanan: Simpan pada suhu ruang, tempat yang kering dan terhindar dari sinar matahari</p>
14.	Luka iris	Povidon iodine	<p>T : selamat datang di kimia farma ada yang bisa dibantu mbak ?</p> <p>P : ini mbak tangan saya terkena sayatan pisau</p> <p>T : apakah darahnya masih keluar mbak?</p> <p>P : masih keluar sedikit mbak</p> <p>T : sebelumnya sudah dikasih pertolongan apa mbak ?</p> <p>P : hanya saya siram air mengalir dan saya beri alcohol antiseptic</p> <p>T : sebelumnya sudah dikasih obat apa?</p> <p>P : belum mbak</p> <p>T : baik saya mabilkan obatnya ya mbak</p> <p>P : iya mbak</p> <p>T : ini mbak saya beri betadine luka ya untuk antiseptic dan desinfektannya, harganya Rp.15.000</p> <p>P : iya mbak itu saja, bagaimana cara penggunaannya ya mbak?</p> <p>T : dioleskan pada luka dengan kapas,</p>	<p>W : remaja</p> <p>W : luka sayatan pisau</p> <p>H : baru saja</p> <p>A : disiram dengan air</p> <p>M : diberi alcohol antiseptic</p>	<p>Obat yang terpilih yakni betadine luka</p> <p>Alasannya karena betadine digunakan sebagai antiseptic dan deinfektan pada kulit dan luka</p>	<p>Indikasi : desinfektan sebelum atau sesudah operasi, mencegah dan pengobatan infeksi pada luka, irigasi dan kompres luka bernanah</p> <p>Cara penggunaan: sesuai kebutuhan, dioleskan, untuk irigasi (mencuci), untuk kompres</p> <p>Kapan berhenti : Apabila sudah sembuh</p> <p>Kapan harus ke dokter : Apabila luka bakar semakin parah</p>

			<p>sebagai pencuci diencerkan dengan 40 bagian air dan dipakai beberapa kali sehari</p> <p>P : baik mbak, ini uangnya</p> <p>T : baik saya terima, terimakasih semoga sehat selalu</p>			<p>ESO yang sering : iritasi</p> <p>Cara penyimpanan: Simpan pada suhu ruang, tempat yang kering dan terhindar dari sinar matahari</p>
15.	Alergi	<p>Klorfeniramin maleat, prometazine, diphenhidramine, dekslorfeniramin maleat, loratadine, cetirizine.</p>	<p>T : selamat datang di kima farma, ada yang bisa dibantu pak?</p> <p>P : ini mbak saya mau beli obat alergi, kayaknya saya alergi debu</p> <p>T : untuk keluhannya bagaimana ya pak?</p> <p>P : bersin- bersin dan hidung sya terasa gatal</p> <p>T : sudah berapa lama pak ?</p> <p>P : baru kemarin mbak</p> <p>T : mohon maaf pak, untuk usia bapak berapa ya pak?</p> <p>P : usia saya 35 tahun</p> <p>T : sebelumnya sudah dikasih obat apa pak?</p> <p>P : belum mbak</p> <p>T : apakah bapak ada alergi obat ?</p> <p>P : tidak mbak</p> <p>T : baik saya mabilkan obatnya dulu ya pak</p> <p>P : iya mbak</p> <p>T : ini pak saya ada cetrizine yang digunakan untuk alerginya ya pak, untuk harganya Rp.22.000</p> <p>P : iya mbak ini saja</p> <p>T : baik pak untuk minumnya sehari 1</p>	<p>W : laki-laki usia 35 tahun</p> <p>W : mengeluh bersin-bersin dan hidung gatal karena alergi debu</p> <p>H : kemarin</p> <p>A : belum ada</p> <p>M : belum ada</p>	<p>Obat yang terpilih yakni cetirizine</p> <p>Alasannya karena cetirizine merupakan antihistamin yang diindikasikan untuk mengobati rhinitis alergi seasonal</p>	<p>Indikasi : Rinitis musiman atau tahunan, urtikaria idiopatik kronik.</p> <p>Cara penggunaan: • Usia >12 th: 10 mg (1 tablet per hari). • Anak 6-11 tahun: 5-10 mg (1/2-1 tablet per hari). • Anak 2-5 th: 2,5-5 mg (1/4-1/2 tablet per hari).</p> <p>Kapan berhenti : Apabila sudah sembuh</p> <p>Kapan harus ke dokter : Apabila alergi tidak kunjung sembuh</p> <p>ESO yang sering : Mulut kering, mual, sakit perut, diare</p> <p>Cara penyimpanan: Simpan pada suhu ruang, tempat yang kering dan</p>

			<p>tablet ya pak sesudah makan</p> <p>P : baik mbak</p> <p>T : jangan lupa selalu pakai masker ya pak, dan apabila alergi semakin parah segera periksa ke dokter ya pak</p> <p>P : nggeh mbak siap, ini uangnya</p> <p>T : baik pak saya terima, terimakasih semoga sehat selalu</p>			terhindar dari sinar matahari
16.	Vitamin dan mineral	Vit C, Vit A, Vit B1, Vit B6, Vit B12, Vitamin D, Asam folat, Mn, Zn, Fe, dll	<p>T : selamat datang dikimia farma ada yang bisa dibantu bu?</p> <p>P : ini mbak 2 hari ini saya sering kesemutan dan pegal otot</p> <p>T : mohon maaf bu, ibunya usia berapa ya ?</p> <p>P : saya usia 57 tahun</p> <p>T : sebelumnya sudah konsumsi obat apa bu?</p> <p>P : belum nak</p> <p>T : baik buu, apakah ibu ada alergi obat</p> <p>P : tidak ada</p> <p>T : baik bu saya ambilkan dulu obatnya</p> <p>P : baik nak</p> <p>T : ini bu saya berikan neurosanbe yang dapat mengobati kesemutan dan pegal-pegal otot, untuk harganya Rp. 19.000</p> <p>P : baik nak, untuk minumannya bagaimana nak?</p> <p>T : cukup 1 hari 1 tablet setelah makan ya bu</p> <p>P : baik nak saya ambil itu, ini uangnya</p> <p>T : baik bu, uangnya saya terima, ada yang ditanyakan kembali bu?</p>	<p>W : ibu berusia 57 tahun</p> <p>W : mengeluh kesemutan, pegal-pegal otot</p> <p>H : 2 hari</p> <p>A : belum ada</p> <p>M : belum ada</p>	<p>Obat yang terpilih neurosanbe</p> <p>Alasannya mengandung vitamin B1, B6, B12 untuk mengobati pegal - pegal otot dan kesemutan</p>	<p>Indikasi:pengobatan defisiensi vitamin B1, B6, B12 untuk mengobati pegal - pegal otot dan kesemutan</p> <p>Cara penggunaan: 1 kali sehari, 1 tablet</p> <p>Kapan berhenti: apabila kesemutan sudah hilang</p> <p>Kapan harus ke dokter: apabila pegal pegal otot dan kesemutan semakin parah ESO yang sering: reaksi alergi</p> <p>Cara penyimpanan : simpan di tempat yang sejuk dan kering serta terhindar dari panas matahari secara langsung</p>

			<p>P : sudah nak cukup T : baik bu apabila sakitnya semakin parah segera ke dokter ya bu? P : iya nak terimakasih T : terimakasih kembali bu, semoga sehat selalu</p>			
17.	Antiseptik dan disinfektan	Alkohol 70%, povidone iodine 10%, klorheksidin, setrimida 0,5%, serbuk PK.	<p>T : selamat datang dikimia farma ada yang bisa dibantu? P : saya mau beli alkohol 70% mbak T : mohon maaf mas apakah buat mas sendiri? P : tidak mbak, ini buat bersihin luka adik saya barusan jatuh dari sepeda T : mohon maaf adiknya usia berapa ya mas? P : usia 16 tahun T : oh baik mas saya ambilkan dulu ya P : iya mbak T : ini mas alkohol 70% nya untuk harganya Rp.14.000 P : baik mbak, oh iya mbak cara menggunakannya gimana ya T : untuk penggunaannya alkohol oleskan dengan kasa steril ya mas untuk membersihkan lukanya agar dapat membunuh dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme di luka tersebut P : baik mbak terimakasih, ini uangnya T : baik saya terima uangnya, terimakasih semoga sehat selalu</p>	<p>W : adik usia 16 tahun W : baru jatuh dari sepeda H : baru saja A : belum ada M : belum ada</p>	Obat yang terpilih alcohol 70% Alasannya dapat digunakan sebagai antiseptic (membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme)	<p>Indikasi: sebagai antiseptic, membersihkan luka Cara penggunaan: dituang pada kasa steril atau kapas, lalu diusapkan pada luka atau alat medis Kapan berhenti: apabila luka sudah tertutup Kapan harus ke dokter: apabila luka semakin parah ESO yang sering: ruam kulit, gatal - gatal Cara penyimpanan : simpan pada suhu 25-27°C, dan jauhkan dengan barang-barang yang mudah terbakar</p>

18.	Antiinflamasi topikal	sediaan topikal yang mengandung flusinolon asetonida; hidrokortison asetat 1%; desoksimesason 2,5 mg.	<p>T: selamat datang di kimia farma. Ada yang bisa saya bantu bu?</p> <p>P: ini kak tangan saya muncul bitnik bitnik kemerahan dan rasanya gatal panas gitu</p> <p>T: mohon maaf, kalau boleh tau usianya berapa bu?</p> <p>P: usia saya 38 tahun</p> <p>T: sebelumnya sudah dikasih obat atau belum bu?</p> <p>P: belum sih kak</p> <p>TTK: apakah ibu memiliki riwayat alergi terhadap obat bu?</p> <p>P: tidak ada kak</p> <p>T: baik, sebentar saya ambikan obatnya terlebih dahulu ya bu</p> <p>P: iya kak</p> <p>T : ini bu saya berikan desoksimesason salep untuk dermatitis,tipe eksema dan psoriasis</p> <p>P : untuk pemakaiannya bagaimana kak?</p> <p>T : dioleskan pada kulit yang sakit sebanyak 1-2 kali sehari</p> <p>P : iya kak saya ambil ini</p> <p>T : baik bu untuk harganya Rp.26.000</p> <p>P : baik kak, ini uangnya. Oh iya untuk penyimpanannya bagaimana ya kak?</p> <p>T : disimpan ditempat yang sejuk dan kering bu dan terhindar dari sinar matahari</p> <p>P : baik kak terimakasih</p> <p>T : ini uangnya saya terima ya bu,</p>	<p>W : ibu berusia 38 tahun</p> <p>W : gatal kemerahan pada kulit</p> <p>H : kemarin</p> <p>A : belum ada</p> <p>M : belum ada</p>	<p>Obat yang terpilih</p> <p>desoximethason 2,5 mg</p> <p>Alasannya digunakan untuk dermatitis, tipe eksema, dan psoriasis</p>	<p>Indikasi :untuk dermatitis, tipe eksema, dan psoriasis</p> <p>Cara penggunaan: dioleskan pada kulit yang sakit, gatal, peradangan, 1-2 kali sehari</p> <p>Kapan berhenti: apabila gatal sudah membaik</p> <p>Kapan harus ke dokter: apabila gatal kemerahan meradang</p> <p>ESD yang sering: gatal dan rasa panas</p> <p>Cara penyimpanan : simpan di tempat</p>
-----	-----------------------	---	---	--	--	---

			<p>terimakasih. Ada yang ditanyakan kembali?</p> <p>P : tidak ada kak</p> <p>T : baik bu semoga sehat selalu</p>			
19.	Obat topikal penghilang rasa sakit	<p>sediaan yang mengandung mentol, campor, metil salisilat, oleum mentae; kayu puti; lotion lidokain HCl 3%, natrium diklofenak 1% gel.</p>	<p>T : selamat datang di kimia farma ada yang bisa dibantu?</p> <p>P : ini mbak kaki saya memar habis terbentur dan rasanya nyeri</p> <p>T : sebelumnya sudah dikasih apa?</p> <p>P : belum sama sekali mbak</p> <p>T : sudah berapa lama mbak?</p> <p>P : sudah 2 hari ini</p> <p>T : mohon maaf sebelumnya, usia mbaknya berapa ya?</p> <p>P : usia saya 25 tahun</p> <p>T : mbaknya mau obat dari luar apa dalem</p> <p>P : dari luar aja mbak</p> <p>T : baik saya ambilkan salep dulu ya</p> <p>P : iya mbak</p> <p>T : ini mbak saya ada voltadex gel fungsinya untuk meredakan memarnya</p> <p>P : untuk cara pemakaiannya bagaimana mbak?</p> <p>T : dioleskan 3-4 kali sehari bagian-bagian yang sakit sambil digosok secara perlahan</p> <p>P : baik kak untuk harganya berapa?</p> <p>T : untuk harganya Rp.38.000</p> <p>P : baik mbak ini uangnya</p> <p>T : baik saya terima uangnya, terimakasih semoga sehat selalu</p> <p>P : iya mbak</p>	<p>W : wanita usia 25 tahun</p> <p>W : kaki memar akibat terbentur</p> <p>H : 2 hari</p> <p>A : belum ada</p> <p>M : belum ada</p>	<p>Obat yang terpilih voltadex gel Alasannya diclofenac dapat meredakan nyeri otot dan memar</p>	<p>Indikasi :membantu meredakan nyeri otot da persendian dan memar</p> <p>Cara penggunaan: dioleska 3-4 kali sehari pada bagian bagian yang sakit sambil digosok secara perlahan lahan</p> <p>Kapan berhenti: apabila nyeri dan memar sembuh</p> <p>Kapan harus ke dokter: apabila memar semakin parah</p> <p>ESO yang sering : ruam kulit</p> <p>Cara penyimpanan : simpan di tempat sejuk dan kering serta terhindar dari panas matahari secara langsung</p>

20	Terapi komplementer / obat tradisional	Jamu, OHT, Fitofarmaka	<p>T : selamat datang di kimia farma da yang bisa saya bantu bu?</p> <p>P : ini mbak saya mau cari sirup penambah imun tubuh untuk anak saya karenakan mau study tour</p> <p>T : mohon maaf bu , anaknya usia berapa nggeh?</p> <p>P : anak saya usia 7 tahun</p> <p>T : apakah anak ibu sedang sakit ?</p> <p>P : tidak mbak</p> <p>T : baik bu saya ambilkan obatnya ya</p> <p>P : iya mbak</p> <p>T : ini bu saya beri stimuno, untuk minumnya 1-3 kali sehari 1 sendok takar ya bu</p> <p>P : baik mbak, untuk harganya berapa?</p> <p>T : harganya Rp.45.000 bu</p> <p>P : baik mbak ini uangnya</p> <p>T : baik bu uangnya saya terima, oh iya bu jika terjadi alergi segera ke dokter saja ya bu</p> <p>P : baik mbak terimakasih</p> <p>T : terimakasih kembali, semoga sehat selalu bu</p>	<p>W : anak 7 tahun</p> <p>W: mau study tour</p> <p>H : -</p> <p>A : -</p> <p>M :-</p>	<p>Obat yang terpilih stimuno sirup</p> <p>Alasannya klinik dan sudah teruji secara pre klinik membantu merangsang tubuh memproduksi i lebih n sistem banyak antibodi dan mengaktifka kesehatan tubuh agar daya tahan tubuh bekerja optimal</p>	<p>Indikasi : membantu merangsang tubuh memproduksi lebih banyak antibodi dan mengaktifkan sistem kesehatan tubuh agar daya tahan tubuh bekerja optimal</p> <p>Cara penggunaan: 1-3 kali sehari 1 sendok takar (5 mL)</p> <p>Kapan berhenti: Kapan harus ke dokter : apabila terjadi reaksi alergi</p> <p>ESO yang sering :-</p> <p>Cara menyimpan : simpan pada suhu 30°C</p>
----	--	------------------------	---	--	---	--

**PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
DI APOTEK KIMIA FARMA KARTINI**



**SHOLAHATUL FAJRIL UTAMI
211105032**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III FARMASI
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK**

2024

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)


Minggu ke : 1

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Senin, 05 Feb 2024 (07.30 - 16.30)	<p>a) Menyerahkan dokumen Pelaksanaan PKL kepada Pembimbing Lapangan Apotek Kinia Farma Kartini</p> <p>b) mempelajari tentang posisi, Peran dan tanggung jawab Seorang TVK di apotek</p> <p>c) Mempelajari mengenai Penyimpanan dan penataan Obat di apotek Kinia Farma Kartini</p> <p>d) membantu Apoteker dan TVK di apotek Kinia Farma Kartini untuk meracik obat sesuai resep</p>	<p>➤ Mahasiswa menyerahkan berkas kelengkapan dari Kampus kepada Pembimbing Lapangan apotek Kinia Farma Kartini dan memperkenalkan diri</p> <p>➤ Tugas seorang TVK di apotek yakni melakukan pelayanan pasien mulai dari menerima pasien hingga menyerahkan obat yang dibutuhkan. Seorang TVK mampu melakukan peracikan obat sesuai dengan resep yang diberikan pasien.</p> <p>➤ Mengetahui mengenai penyimpanan dan penataan obat di apotek Kinia Farma Kartini</p> <p>➤ tata letak penyimpanan obat di apotek Kinia Farma Kartini yakni dibedakan berdasarkan Farmakologi, Sedimen Serta diurutkan sesuai alfabet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyimpanan obat Lasa diberi label di kotak yakni label "Lasa" - Penyimpanan obat bebas dan bebas terbatas ditempatkan di rak depan - Penyimpanan obat keras ditempatkan di rak belakang - Penyimpanan Obat narkotik dan psikotropik disimpan di lemari khusus <p>➤ Mengetahui mengenai cara peracikan obat sesuai resep di apotek Kinia Farma Kartini</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
2.	Selasa, 06 Feb Februari 2024 (08.00 - 15.00)	<p>a) menanyakan kepada apoteker tentang peraturan-peraturan di apotek, visi dan misi di apotek Kinia Farma Kartini</p> <p>b) menanyakan kepada apoteker tentang struktur organisasi dan kegiatan di apotek Kinia Farma Kartini</p> <p>c) mampu membantu menata stok obat yang baru datang</p>	<p>➤ mendapatkan pengetahuan tentang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peraturan-peraturan di apotek Kinia Farma Kartini yakni datang tepat waktu, memakai seragam dan atribut sesuai yang sudah ditentukan, melayani pasien dengan sepenuh hati dan senyum, dan bertanggung jawab. b. visi - misi apotek Kinia Farma. <ul style="list-style-type: none"> - visi menjadikan perusahaan health care pilihan utama yang integritas dan menghasilkan yang berkesinambungan - misi <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan aktivitas usaha dibidang-bidang industri kimia dan farmasi, perdagangan dan jaringan distribusi, ritel farmasi dan layanan kesehatan serta optimalisasi aset 2. mengelola perusahaan secara Good Corporate Governance dan optimal excellence didukung oleh sumber daya manusia (SDM) profesional. 3. memberikan nilai tambahan dan manfaat bagi stock holder <p>➤ Struktur organisasi dan jabatannya di apotek Kinia Farma Kartini</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. apt. Rana Manjaya, S. Farm sebagai Apoteker manager pharmacy 2. apt. Serdian Pinaris Rama. S. Farm sebagai apoteker pengelola apotek 3. apt. Rayanti Fitri, S. Farm sebagai Apoteker pedamping (Aping) 4. 6 orang Asisten apoteker yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian 5. 3 orang SPB sebagai petugas swalayan yang membantu menawarkan obat yang dapat dijual bebas <p>➤ mampu menata stok obat sesuai tempatnya</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
3.	Rabu, 07 Februari 2024 (14.00 - 21.00)	<p>a) membantu menata stok obat yang baru datang</p> <p>b) Menanyakan mengenai perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian dan embalase di apotek Kimia Farma Kartini.</p> <p>c) membantu apoteker dan tuk meracik obat dan memberikan etiket</p>	<p>➤ Dapat menata obat sesuai tempat obat</p> <p>➤ Di apotek Kimia Farma Kartini untuk embalase resep biasanya setiap 1 resep</p> <p>➤ Perencanaan di apotek Kimia Farma Kartini yakni setiap 1 minggu sekali setiap hari Kamis</p> <p>➤ Pemusnahan di apotek Kimia Farma Kartini yakni pertama dilist barangnya kemudian ditata lalu didokumentasikan, untuk pemusnahan obat/barang tersebut yakni hanya menggunakan air seja (ember berisi air lalu obat dimasukkan/dituangkan kedalam ember)</p> <p>- untuk pemusnahan resep yakni resep yang sudah berumur lebih dari setahun</p> <p>➤ untuk penyimpanan resep dan faktur yakni disimpan sesuai bulan</p> <p>➤ untuk penerimaan yakni tahap pertama cek surat pesanan dan barang yang datang sesuai dengan sp dan faktur</p> <p>➤ meracik obat sesuai resep yang diberikan dan menuliskan atau memberi etiket pada obat tersebut</p>



No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1	Kamis, 8 Feb Februari 2024 (08.00-15.00)	<p>a) mempelajari membuat nota untuk pembelian obat</p> <p>b) membantu TVE untuk menyiapkan pesanan obat yang akan dikirim</p>	<p>► Mengetahui cara menulis atau membuat nota tertulis untuk pembelian obat</p>  <p>► Membantu mengemas obat yang akan dikirim melalui jasa kirim (ke wibite dan Tokopedia)</p> <p>► Mengantarkan pesanan obat secara langsung ke tempat orang yang memesan obat</p>  <p>► Mengantarkan obat dari resep online</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
5.	Jumat, 9 Feb Mars 2024 (15.00 - 22.00)	<p>a) Menyiapkan pesanan obat</p> <p>b) mempelajari tentang alur pelayanan resep (umum, BPJS, PLM, Smeling dan kredit)</p>	<p>➤ Menyiapkan pesanan obat sebanyak 1.908 bungkus</p> <p>➤ Resep umum : pasien datang membawa resep → apoteker dan tuk melakukan pengecekan stok obat di apotek → jika obat tersedia maka apoteker atau tuk melakukan perhitungan biaya obat sesuai dengan resep → jika pasien sudah menyetujui maka obat segera di racik oleh apoteker dan tuk → setelah obat sudah siap langsung diberi etiket pada obat tersebut → dicek ulang untuk obat yang sudah disiapkan → obat diberikan ke pasien dan diberi KIE</p> <p>* Resep BPJS : syarat yang harus dibawa untuk membus resep yakni pasien harus membawa resep yang akan ditelus → Apoteker atau tuk melakukan pengecekan apakah pasien membawa foto copy kartu BPJS, surat rujuk balik, resep asli, no kunjungan dan lampiran hasil laboratorium → jika data pasien benar maka resep diproses → setelah obat siap dan diberikan etiket → obat dicek ulang → obat diberikan ke pasien dan diberi KIE</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
6-	Minggu (11 Februari 2024 (13.00 - 20.00))	a) membantu tvk untuk memfotocopy berkas-berkas Apotek	➤ mampu membantu tvk untuk memfotocopy berkas-berkas Apotek

Gresik, 19 Februari 2024


Dosen Pembimbing,



Diah Ratnasari, S.Farm., Apt., M.T.
NIDN. 0721119001

Gresik, 19 Februari 2024

Pembimbing Lapangan (Apotek Kimia Farma Kartini)



Apt. Rana Imanjaya, S.Farm
SIP. 19850502A

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 2

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Senin, 12 Feb 2024 (08.00 - 15.00)	<p>a. Membantu mengecek barang datang</p> <p>b. Membantu menata obat yang baru datang</p> <p>c. Membantu meracik resep</p>	<p>➤ Mendapatkan pengetahuan tentang :</p> <p>a. cara penerimaan barang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. cek faktur dengan barang yang datang meliputi: nama obat, jumlah dan ED. 2. faktur disamakan dengan surat pesanan (SP). Jika sudah sama maka ditanda tangani oleh apoteker dan distempel Kimia Farma. <p>b. menata obat yang baru datang sesuai tempatnya. cara menata obat yakni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obat ditata secara FEFO (first EXpired First out) yakni metode Pengelolaan barang yang punya masa kadaluarsa paling dekat <p>c.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghitung obat yang diminta 2. mengambil obat sesuai yang diminta 3. mencampur obat tersebut dan dimasukkan puyer/kapsul 4. dimasukkan klip dan diberi etiket

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
2.	Selasa, 13 Feb 2024 (08.00 - 15.00)	<p>a. melakukan pengamatan dalam komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dengan pasien di apotek Kimia Farma Kartini</p> <p>b. membantu tdk dan apoteker menyiapkan obat dan meracik resep</p> <p>c. membantu membersihkan apotek dan menata obat</p>	<p>➤ cara komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) di apotek Kimia Farma Kartini</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memanggil nama pasien 2. memastikan nama, usia, alamat sama dengan di resep 3. menanyakan riwayat alergi obat 4. Menjelaskan obat dan dosis yang diberikan kepada pasien 5. menjelaskan indikasi obat 6. Memberi petunjuk cara penggunaan obat meliputi waktu minum obat / penguasaan obat dan cara obat digunakan (diminum, dioles atau dilantkan) 7. memberitahu efek samping obat 8. memberitahu cara penyimpanan obat 9. menjelaskan kepada pasien berapa lama penggunaan obat, seperti antibiotik harus habis 10. meminta pasien untuk menjelaskan ulang apa yang sudah disampaikan untuk mengetahui sejauh mana pasien memahami terhadap obat tersebut.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
3.	Rabu, 14 Feb 2024 (08.00 - 15.00)	a. Membantu TVK dan apoteker untuk menyiapkan obat dan meracik resep	<p>a. Mengetahui cara meracik obat (puyer), dengan resep berikut:</p> <p>R/ Amoxicillin 250 mg m.f. p.u.v dtd no. x ∫ 3 ddi</p> <hr/> <p>R/ Paracetamol 250 mg m.f. p.u.v dtd no. x ∫ 3 ddi</p> <p>- perhitungan pengambilan obat</p> <p>➤ Amoxicillin = $\frac{250 \times 10}{500} = 5 \text{ tab}$</p> <p>➤ Paracetamol = $\frac{250 \times 10}{500} = 5 \text{ tab}$</p> <p>- mengambil obat yang akan diracik sesuai jumlah yang diminta Setelah itu obat diracik dan dimasukkan ke dalam bungkus puyer</p> <p>- setelah obat sudah siap, dimasukkan ke dalam plastik klip dan diberi etiket → R/1 → 3 x sehari 1 bungkus sesudah makan (Antibiotik dihabiskan)</p> <p style="margin-left: 150px;">R/2 → 3 x sehari 1 bungkus sesudah makan (bila demam)</p> <p>- obat diberikan ke pasien dan dilakukan KIR</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
4.	Kamis, 15 Feb 2024 (15.00 - 22.00)	<p>a. Mengambil obat di apotek Kimia Farma cabang lain</p> <p>b. membantu tvk dan apoteker dalam menyiapkan obat dan meracik resep</p> <p>c. menyiapkan obat yang diperamu melalui tokopedia</p>	<p>a. apotek Kimia Farma jika kehabisan obat maka mengambil di apotek Kimia Farma cabang terdekat dengan cara :</p> <p>obat yang dibutuhkan di apotek Kimia Farma cabang terdekat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. cek stok di apotek Kimia Farma terdekat 2. telfon ke apotek Kimia Farma yang tersedia obat yang dibutuhkan dan dicek terlebih dahulu fisik obat yang ada. 3. Kirim permintaan obat tersebut ke apotek Kimia Farma tersebut 4. kemudian diambil obat tersebut oleh tvk atau kurir apotek. Jika sudah diterima maka di komputer akan otomatis stok obat di apotek Kimia Farma Kartini bertambah <p>b. membantu tvk dan apoteker menyiapkan dan meracik sesuai resep</p> <p>c. obat di Kimia Farma Kartini juga dijual di online shop seperti tokopedia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jika ada pesanan obat maka ada notifikasi di komputer Kimia Farma Kartini 2. barang yang dipesan dicek terlebih dahulu stok fisik Kimia Farma 3. setelah barang / obat sudah ada, barang diambil dan dibungkus ke dalam box dan disipisi bubble wrap. 4. no. resi dicetak dan ditempelkan di box tersebut 5. paket tersebut akan diambil oleh kurir

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
5.	Jumat, 16 Feb 2024 (15.00-22.00)	<p>a. Bertanya kepada apoteker mengenai uji petik di apotek Kimia farma kartini</p> <p>b. membantu tuk membersihkan apotek</p>	<p>a. Uji petik di apotek kimia farma kartini dilakukan setiap pergantian shift. Cara uji petik di apotek kimia farma kartini yakni nama obat ditulis dan terdapat berapa stok dan ditulis secara online / komputerisasi.</p> <p>b. membersihkan obat-obat yang sudah berdebu dan membersihkan apotek.</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
6.	Sabtu, 17 Feb 2024 (14.00 - 21.00)	1. Bertanya kepada apoteker dan tuk tentang pengadaan di apotek Kimia Farma Kartini	→ Mendapatkan pengetahuan tentang pengadaan di Kimia Farma Kartini a. Pengadaan di apotek Kimia Farma terpusat di kantor cabang Kimia Farma Gresik. Pengadaan dilakukan setiap 1 minggu sekali tepatnya di hari Kamis. Obat akan dipesankan oleh pihak pusat ke pbf lalu pihak apotek akan menerima surat pesanan yang akan diprint untuk dicetakan pada sangat barang datang.

Gresik, 19 Feb 2024

Dosen Pembimbing,



Diah Ratnasari, S.Farm., Apt., M.T.
NIDN. 0721119001

Gresik, 19 Feb 2024

Pembimbing Lapangan (Apotek Kimia Farma Kartini)



Apt. Rana Imanjaya, S.Farm
SIP. 10850502A

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 3

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Senin, 19 Feb 2024 (08.00 - 15.00)	a. Mempelajari tentang pemusnahan dan penarikan obat	<p>a. Mengetahui kriteria sediaan farmasi yang harus dimusnahkan yakni > sediaan farmasi yang sudah kadaluarsa dan sudah tidak bisa diratur</p> <p>b. Pemusnahan obat non narkotika yakni obat dikeluarkan dari kemasan → dihancurkan dan dilarutkan dengan air yang berada di ember lalu dibuang ke closet. → kemasan obat dibuang di tong sampah.</p> <p>> membuat bentuk acara pemusnahan obat yang berisikan sebagai berikut →</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daftar nama obat yg dimusnahkan • Surat berita acara acara ditandatangani 2 saksi dan apoteker penanggung jawab • foto dokumentasi saat proses pemusnahan obat <p>⇒ untuk obat narkotika dan psikotropika kimi farmasi kartini belum pernah melakukan pemusnahan obat sebagai tersebut</p> <p>c. Mengetahui cara penarikan obat</p> <p>> penarikan obat akan dilakukan pada sediaan obat yang bermasalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. apoteker akan mendapatkan surat pemberitahuan dari kantor pusat mengenai nama obat dan nomor batch obat yang akan ditarik 2. pihak apoteker akan mengecek ketersediaan obat dan nomor batch tersebut untuk ditarik, jika tidak ada maka surat pemberitahuan diabaikan

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			<p>3. Sales akan mengambil obat yang akan ditank dengan menyerahkan surat berita acara penarikan obat kepada apotik</p> <p>f. Menunggu surat retur dari sales. apabila surat retur sudah turun maka stok di sistem bisa ditetap</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)																																	
2.	Selasa, 20 Feb 2024 (08.00-15.00)	a. mempelajari obat lasa yang ada di apotek kimia farma Kartini	<p>a. Obat lasa di apotek kimia farma Kartini ditanda di kotak obat dengan tulisan lasa berwarna merah. berikut ini sebagian obat lasa yang ada di apotek kimia farma Kartini Lasa (look alike sound alike)</p> <table border="1" data-bbox="940 446 2004 1165"> <thead> <tr> <th>nama obat</th> <th>nama obat</th> <th>keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Cefia 100</td> <td>Cefia 200</td> <td>nama obat sama kekuatan beda</td> </tr> <tr> <td>2. Craut</td> <td>Craut</td> <td>mirip pengucapan</td> </tr> <tr> <td>3. esola 20</td> <td>esola 40</td> <td>nama obat sama kekuatan beda</td> </tr> <tr> <td>4. histapan</td> <td>histine</td> <td>mirip pengucapan</td> </tr> <tr> <td>5. proxi</td> <td>Ryvel</td> <td>kemasan mirip</td> </tr> <tr> <td>6. lameson 4</td> <td>lameson 8</td> <td>nama obat sama kekuatan beda</td> </tr> <tr> <td>7. kelfas 0D</td> <td>kelfas 60</td> <td>nama obat sama kekuatan beda</td> </tr> <tr> <td>8. lesichol 600</td> <td>lesichol 300</td> <td>nama obat sama kekuatan beda</td> </tr> <tr> <td>9. Cholestet 10</td> <td>Cholestet 20</td> <td>nama obat sama kekuatan beda</td> </tr> <tr> <td>10. Nistrol 10</td> <td>Nistrol 20</td> <td>nama obat sama kekuatan beda</td> </tr> </tbody> </table> <p>> Di apotek kimia farma Kartini obat lasa (look alike sound alike) lebih banyak nama obat sama kekuatan berbeda.</p>	nama obat	nama obat	keterangan	1. Cefia 100	Cefia 200	nama obat sama kekuatan beda	2. Craut	Craut	mirip pengucapan	3. esola 20	esola 40	nama obat sama kekuatan beda	4. histapan	histine	mirip pengucapan	5. proxi	Ryvel	kemasan mirip	6. lameson 4	lameson 8	nama obat sama kekuatan beda	7. kelfas 0D	kelfas 60	nama obat sama kekuatan beda	8. lesichol 600	lesichol 300	nama obat sama kekuatan beda	9. Cholestet 10	Cholestet 20	nama obat sama kekuatan beda	10. Nistrol 10	Nistrol 20	nama obat sama kekuatan beda
nama obat	nama obat	keterangan																																		
1. Cefia 100	Cefia 200	nama obat sama kekuatan beda																																		
2. Craut	Craut	mirip pengucapan																																		
3. esola 20	esola 40	nama obat sama kekuatan beda																																		
4. histapan	histine	mirip pengucapan																																		
5. proxi	Ryvel	kemasan mirip																																		
6. lameson 4	lameson 8	nama obat sama kekuatan beda																																		
7. kelfas 0D	kelfas 60	nama obat sama kekuatan beda																																		
8. lesichol 600	lesichol 300	nama obat sama kekuatan beda																																		
9. Cholestet 10	Cholestet 20	nama obat sama kekuatan beda																																		
10. Nistrol 10	Nistrol 20	nama obat sama kekuatan beda																																		

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
3.	Rabu, 21 Feb 2024 (08.00 - 15.00)	a. membantu melayani resep BPJS	<p>a. mengetahui cara pemberian resep BPJS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengecek dokumen seperti : foto copy kartu BPJS, surat rujukan dari teresep asli, no. kunjungan, lampiran hasil laboratorium atau RIM 2. pengecekan data menggunakan komputer 3. setelah data lengkap maka obat dapat dispensing → contoh resep <p>R/ amlodipin 10mg no. xxx \int 1-0-0</p> <hr/> <p>R/ Candesartan 8mg no. xxx \int 0-0-1</p> <hr/> <p>R/ Bisoprolol 5mg no. xxx \int 1-0-0</p> <hr/> <p>R/ CPG 75 mg no. xxx \int 1dd1</p> <hr/> <p>4. menyiapkan etiket dan dimasukkan ke dalam plastik kepheserta obatnya</p> <ul style="list-style-type: none"> → amlodipin 10 mg / 30 : 1 x sehari 1 tablet sesudah makan (fensi) → pagi → Candesartan 8mg / 30 : 1 x sehari 1 tablet (malam) → malam → Bisoprolol 5mg / 30 : 1 x sehari 1 tablet (jantara) → pagi → CPG 75 mg / 30 : 1 x sehari 1 tablet (pengenceran darah) <p>5. menulis nama obat yang dispensing, nama, jumlah obat dalam buku BPJS</p> <p>6. Apoteker atau tuk melakukan pengecekan kembali pelayanan RIE kepada pasien</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuai pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
4.	Kamis, 22 feb 2024 (15.00-12.00)	a. Mengetahui pencatatan dan pelaporan	<p>a. Mengetahui tujuan pencatatan dan pelaporan di apotek</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukti pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai telah dilakukan - Sumber data untuk melakukan pengaturan dan pengendalian - Sumber data untuk pembuatan laporan <p>b. Cara pengarsipan faktor (umum, psikotropika, oot, prekursor dan narkotika)</p> <ul style="list-style-type: none"> - faktor yang datang diinput ke sistem - faktor fp dan bukti penerimaan di sistem di jadikan satu - pada saat akhir bulan rekapitan faktor tersebut akan di jadikan 1 dan disimpan ke dalam container box arsip data apotek pada tahun tersebut. <p>c. pelaporan obat narkotika dan psikotropika</p> <ul style="list-style-type: none"> > obat narkotika dan psikotropika dilaporkan setiap bulannya tanggal 10 di aplikasi SIPNAP. Caranya yakni <ul style="list-style-type: none"> • login akun SIPNAP • pilih pelaporan narkotika / psikotropika • pilih satu-satu item obat • data yang dimasukkan adalah jumlah keluar masuknya obat tersebut • apabila sudah terinput semua lalu klik Simpan dan kirim > untuk pelaporan tersebut dilakukan oleh apoteker, peran tuk pada pelaporan hanya sekedar tahu. > pelaporan pajak dilakukan oleh pusat (resional gudang)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
5.	Jumat, 23 Feb 2024 (15.00 - 21.00)	a. Mempelajari tentang obat high alert yang ada di apotek Kimia Farma Kartini	<p>a. Obat high alert adalah obat yang harus diwaspadai karena sering menyebabkan terjadi kesalahan atau kesalahan servis dan obat yang berisiko tinggi menyebabkan reaksi obat yang tidak diinginkan (ROTD)</p> <p>> Obat high alert yang ada di apotek Kimia Farma Kartini</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Piboglitazone 2. Ca Carbonate 3. fonylin Mr 60 4. Galvus 50 5. Glimepiride 1 mg, Glimepiride 2 mg, Glimepiride 3 mg, Glimepiride 4 mg dan Glimepiride 5 mg 6. Glicazide 8 mg 7. metformin 500 mg dan metformin 850 mg

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
6.	Minggu, 25 Feb 2024 (13.00 - 20.00)	a. membantu menata obat yang akan dimasukkan b. membantu apoteker mengecek batch dan exp barang yang akan diterima	a. barang yang akan dimasukkan dikumpulkan di dalam box dan akan dimasukkan b. mengambil produk → mengecek batch dan exp → barang diterima ke pbf tersebut.

Gresik, 26 Feb 2024

Dosen Pembimbing,



Diah Ratnasari, S.Farm., Apt., M.T.
NIDN. 072 111 9001

Gresik, 26 Feb 2024

Pembimbing Lapangan (Apotek Kimia Farma Kartini)



Apt. Rana Imanjaya, S.Farm
SIP . 19850502A

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 4

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Senin, 26 Feb 2024 (08.00 - 15.00)	a. menamakan tentang PBF	<p>a. kriteria PBF untuk apotek Kinia farma Kartini Gresik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan PBF 2. Kualitas produknya 3. Harga produk 4. Kualitas pelayanan 5. Kontrak, insentif dan diskon <p>b. PBF dan obat yang dijual, berikut sebagian PBF yang bekerjasama dengan Kinia farma.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PT. Bina San Prima → CAPribuse, Samdryl, Amoxsan b. PT. Marga nusantara Jaya → Konidin, Siladex, Konicare c. PT. Millenium Pharmacn International Tbk → sp toches, thecot d. PT. Surya Sentra Bakti → omega complex, squalene Suryaprana Nutrisindo

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
2.	Selasa, 27 Feb 2024	<p>a. mempelajari penyimpanan obat di apotek Kimia Farma Kartini</p> <p>b. membantu apoteker dan TVF meracik obat</p>	<p>1. Mengetahui obat-obat apa saja yang harus disimpan di lemari es suhu dingin, disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu stabil 2°C - 8°C</p> <p>> Berikut contoh obat yang disimpan dalam lemari es</p> <ul style="list-style-type: none"> > suppositoria : dvt corac, prone supp, dll > insulin : Novorapid, Apidra, dll > DVU a : Vagistatn ovul, dll

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
3.	Rabu, 28 Feb 2024	n- Mempelajari tentang Dispensing obat di apotek kimia farma Kartini	<p>a. Dispensing adalah proses pemberian obat yang menyangkut kegiatan persiapan dan penyerahan obat kepada pasien dengan tujuan untuk memastikan pasien menerima obat sesuai kebutuhan</p> <p>b. Pelaksanaan dispensing</p> <p>a. Menggunakan resep Resep diterima oleh apoteker / TVK. Pengkajian resep, konsultasi dokter penulis apabila tidak sesuai, apabila sesuai melakukan perhitungan obat dan perhitungan harga, mengkonfirmasi harga kepada pasien, melakukan pembayaran, menyiapkan obat, obat diserahkan ke pasien beserta KIE</p> <p>b. Tanpa resep Pasien datang dengan keluhan / pasien langsung menyebutkan merk obat yang diinginkan, TVK mencari informasi tentang apa yang dikeluhkan pasien, beri pasien pilihan obat minimal 2, dan dijelaskan manfaat obat serta harga. Pasien memilih. Melakukan pembayaran serta KIE</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
f.	Kamis, 20 Feb 2024	a. Membantu TUF Menata Obat b. Membantu meracik obat c. Membantu TUF mengemas Pesanan Obat	a. Obat ditata sesuai FEFO dan jika barang sudah penuh ditempatkan maka barang/ obat akan ditata di gudang penyimpanan b. Meracik obat sesuai resep yang diberikan pasien c. Di apotek Kimia Farma Kartini menerima pesanan obat dari Kimiafarma mobile dan tokopedia

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
5.	Jumat, 1 Maret 2024	<p>a. membantu membersihkan dan merata obat dalam rak</p> <p>b. membantu apoteker dan TVF dalam meracik obat</p>	<p>> Meracik Obat Kapsul</p> <p>R/ paracetamol 300 mg As. mefenamat 300 mg mf. 1a Caps dtd no. 2 J 3 dd)</p> <p>> perhitungan obat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paracetamol $\frac{300 \times 10}{50} = 6 \text{ tab}$ • As. Mefenamat $\frac{300 \times 10}{50} = 6 \text{ tab}$ <p>> ambil obat yang akan diracik sesuai dengan jumlah yang diminta</p> <p>> membuat etiket dan diletakkan ditempat yang disediakan R/i = Sehari 3 x 1 kapsul (sesudah makan)</p> <p>> Meracik obat dgn blender & diayak, dimasukkan kedalam kantong kapsul no. 60</p> <p>> kemudian dimasukkan kedalam wadah kapsul dan ditempel etiket</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
G.	Minggu, 3 Maret 2024	n. Mengamati TVF melakukan Swamedikasi dengan pasien	a. pasien mengalami mata berairan di kelopak mata atas, TVF menyarankan Cendo xitrol dan Wellnes OCU Care, Pasien mau membeli, dilakukan transaksi pembayaran dan dilakukan KIE yakni Cendo xitrol dipakai 3 kali sehari dan Wellnes OCU Care diminum 1 kali sehari.

Gresik, 8 Maret 2024


Dosen Pembimbing,



Diah Ratnasari, S.Farm., Apt., M.T.
NIDN. 0721119001

Gresik, 8 Maret 2024

Pembimbing Lapangan (Apotek Kimia Farma Kartini)



Apt. Rana Imanjaya, S.Farm
SIP. 19850502A

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 5

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Senin, 9 Maret 2024	<p>a. Membantu pencatatan dan pelaporan di Klinik Farma Kartum</p> <p>b. Membantu apoteker dan TVF dalam menata obat</p>	<p>a. Pelaporan obat narkotika dan psikotropika Obat narkotika dan psikotropika dilaporkan setiap bulannya Max tanggal 10 di aplikasi SIPNAP. Berikut caranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. login akun SIPNAP 2. pilih pelaporan narkotika dan psikotropika 3. pilih satu item obat 4. Data yang dimatikan jumlah keluar dan masuknya obat tersebut 5. apabila sudah terinput semua, klik simpan dan kirim <p>Selain pelaporan narkotika dan psikotropika ada pelaporan Pajak, akan tetapi laporan pajak dilaporkan oleh pusat (Rasional Medik)</p> <p>b. mendapatkan ilmu tentang perusahaan atau orang yang akan meminta barang atau obat dengan cara melist harga obat yang dibutuhkan kemudian dikirim.</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
2.	Selasa, 5 Maret 2024	<p>a. mengamati faktur yang akan di entry kedalam pos</p> <p>b. Membantu mengambil obat di apotek Kimia Farma terdekat</p> <p>c. melihat kartu stok obat di apotek Kimia Farma Kartini</p>	<p>a. Cara entry faktur di Kimia Farma</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pengecekan PO dengan faktur 2. Masukkan no-PO kedalam pos di bagian penerimaan barang 3. entry barang sesuai dengan faktur 4. Masukan nama obat, tanggal kadaluarsa, no batch, qty 5. Cocokkan hasil akhir dengan faktur akhir 6. jika sudah sesuai, klik Simpan <p>b. Jika stok obat di apotek Kimia Farma Kartini habis dan ada pasien membutuhkan obat tersebut maka akan mengambil obat di apotek cabang terdekat.</p> <p>c.</p>  <p>Kartu stok</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
3.	Rabu, 6 Maret 2024	<p>a. Menanyakan tentang Stok opname dan Perencanaan kepada TVF</p> <p>b. membantu mengambil obat dan meracik obat</p>	<p>a. Stok opname dilakukan selama 3 bulan sekali pada stok opname yang pertama melakukan pengecekan Stok fisik setelah itu disamakan dengan jumlah stok yang ada di komputer, perencanaan dilakukan selama 2 minggu sekali</p> <p>> Metode perencanaan menggunakan metode konsumtif dengan rumus</p> $A = B + C + D + E$ <p>A = obat yang dipesan B = pemakaian rata-rata C = simpanan stok D = waktu tunggu E = sisa stok</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)																								
4.	Kamis, 7 Maret 2024	<p>a. memperhatikan tvf melakukan swamedikasi terhadap pasien</p> <p>b. memperhatikan obat golongan obat bebas terbatas di apotek Kimia Farma Kartini</p>	<p>a. pasien berusia 1 tahun 4 bulan mengalami Batuk pilek, tvf menyarankan obata untuk batuk diminum 3 kali sehari, rhinos neb untuk pilek diminum 3 kali sehari.</p> <p>b. obat bebas terbatas →</p> <table border="0"> <tr> <td>ambeven</td> <td>• paramex</td> </tr> <tr> <td>Antimo</td> <td>• NEOremacyl</td> </tr> <tr> <td>Dulcolax</td> <td>• lacobdin</td> </tr> <tr> <td>Dracet</td> <td>• Bufect</td> </tr> <tr> <td>Saumol</td> <td>• Diangit</td> </tr> <tr> <td>Kondien</td> <td>• Diatabl</td> </tr> <tr> <td>Bodrex</td> <td>• ACitral</td> </tr> <tr> <td>Panadol</td> <td>• lalap</td> </tr> <tr> <td>Dumin</td> <td>• Mixanrip</td> </tr> <tr> <td>Inza</td> <td>• Pefirrol</td> </tr> <tr> <td>femina x</td> <td>• Sari don</td> </tr> <tr> <td>stop cold</td> <td>• Decolgen</td> </tr> </table>	ambeven	• paramex	Antimo	• NEOremacyl	Dulcolax	• lacobdin	Dracet	• Bufect	Saumol	• Diangit	Kondien	• Diatabl	Bodrex	• ACitral	Panadol	• lalap	Dumin	• Mixanrip	Inza	• Pefirrol	femina x	• Sari don	stop cold	• Decolgen
ambeven	• paramex																										
Antimo	• NEOremacyl																										
Dulcolax	• lacobdin																										
Dracet	• Bufect																										
Saumol	• Diangit																										
Kondien	• Diatabl																										
Bodrex	• ACitral																										
Panadol	• lalap																										
Dumin	• Mixanrip																										
Inza	• Pefirrol																										
femina x	• Sari don																										
stop cold	• Decolgen																										

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke :

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
5.	Jum'at, 8 Maret 2024	<p>a. mengamati obat berdasarkan kelas terapi</p> <p>b. membantu apoteker / TVF dalam meracik obat / mengambil obat</p> <p>c. melihat penyimpanan obat narkotika, psikotropika, obat keras dan obat yang ada di suhu 2°-8°C</p>	<p>a. Obat berdasarkan kelas terapi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obat Alergi & Imune sistem → Aerys, Batulin, Ceon, Dicom, Depman, Ketocin, Lameson, tilac, sedares 2. Sistem pernafasan → Mpara, Demacolin, epepi, flumucil, Teomena mucera, vektin 3. Obat Diabetes → Actos 30, Actos met, Amadiab, Janumet, forbetes, glucon, Diamicon, Trujenta 4. Genetik → Aciclovir, cefadroxil, Domperidon, Episone, folic acid, Ibu profen, loratadine, vit c 5. hormon dan kontraseptif → Atovel, Diane, Fetrie, mucolas, yas 6. Antibiotik → Amoxan, Binotal, cefat, primadex, Palaxin, Sanprima, zitrax 7. BPJS → Acarbose, Bisoprolol, Candesartan, ISON, morfamin 8. Kolesterol → Fastur, upitor, Hupoti, Kolesterol 9. Kardio / hipertensi → lasix, Cardio, Amelcor 10. Vitamin & mineral → Becomzet, Atencom, Cal 95 11. Sistem Saraf → Catafcom, hipagin, Diflam 12. Pencernaan → Iudia, Vaselon, Gsua, Rantin

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			<p>b. untuk embalase dan tuslah setiap rakikan yakni dikenakan biaya Rp.15.000.</p> <p>c. Penyimpanan obat narko & psiko</p>  <p>Penyimpanan obat dengan suhu 2°-8°C</p>  <p>Penyimpanan Obat keras</p> 

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
6.	Sabtu, 03 Maret 2024	a. Memperhatikan TVF melakukan swamedikasi terhadap pasien	<p>T: selamat datang di kimia farma, ada yang bisa dibantu pak?</p> <p>P: ini mbak saya sudah 2 hari pipis nyendat dan perih serta keluar nanah</p> <p>T: Baik pak, ada keluhan lain lagi pak</p> <p>P: tidak mbak</p> <p>T: Mohon maaf bapaknya usia berapa</p> <p>P: usia 55 tahun</p> <p>T: Baik pak ini saya ada thzamicin untuk antibiotik diminum 3 kali sehari dan prosta med diminum 2 kali sehari</p> <p>P: Baik mbak saya beli, berapa?</p> <p>T: untuk harganya 250.000 pak</p> <p>P: Baik mbak ini uangnya</p> <p>T: Terimakasih pak. Semoga sehat selalu</p>

Gresik, 27 Mei 2024

Dosen Pembimbing,



Diah Ratnasari, S.Farm., Apt., M.T.
NIDN. 07 2111 9001

Gresik, 27 Mei 2024


Pembimbing Lapangan (Apotek Kimia Farma Kartini)



Apt. Rana Imanjaya, S.Farm
SIP. 19850502A

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 6

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)																
7-	Senin, 11 Maret 2024	<p>a. Membantu apoteker dalam Menulis rekaman keluar masuk obat narkotik, psikotropik</p> <p>b. Membantu apoteker menerima barang yang datang</p>	<p>a. menulis ulang data yang ada di komputer tentang jumlah obat narkotik dan psikotropik, jumlah keluar masuk obat dan jumlah akhir obat. contoh format penulisan di buku.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th>Tanggal</th> <th>Kode</th> <th>nama dokter</th> <th>nama pasien</th> <th>Alamat</th> <th>keluar</th> <th>masuk</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>b. * mengecek faktur dan mencocokkan dengan surat pesanan * mengecek faktur dan barang apakah sudah cocok dan sesuai * Apabila sudah cocok faktur dittd oleh apoteker dan di stampel</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Surat pesanan</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>faktur</p> </div> </div>	Tanggal	Kode	nama dokter	nama pasien	Alamat	keluar	masuk	Jumlah								
Tanggal	Kode	nama dokter	nama pasien	Alamat	keluar	masuk	Jumlah												