

LAMPIRAN


Lampiran 1. Penataan Obat di Apotek Kimia Farma Kartini











Lampiran 2. Penataan Alat kesehatan di Apotek Kimia Farma Kartini



This image shows a handwritten table with multiple columns and rows. The text is written in blue ink on a white background. The table appears to be a ledger or inventory list, with various entries and calculations. The columns are not clearly labeled, but the structure suggests a systematic record-keeping format.

This image shows a handwritten table titled "Kamus Farmasi" (Pharmacy Dictionary). The table has four main columns: "Nama Obat" (Drug Name), "Dosis" (Dose), "Waktu" (Time), and "Tipe Obat" (Drug Type). There are several rows of handwritten entries, including "Aspirin" and "Parasetamol".

Nama Obat	Dosis	Waktu	Tipe Obat
Aspirin	100 mg	3x sehari	Analgesik
Parasetamol	500 mg	3x sehari	Analgesik



This image shows a handwritten table with columns for "No", "Nama Obat", "Dosis", "Waktu", and "Tipe Obat". It contains several rows of handwritten entries, including "Aspirin" and "Parasetamol".

No	Nama Obat	Dosis	Waktu	Tipe Obat
1	Aspirin	100 mg	3x sehari	Analgesik
2	Parasetamol	500 mg	3x sehari	Analgesik

This image shows the header of a document titled "Kamus Farmasi". It includes contact information for "Muzak Resman (Pharmacist) 1" and "Muzak Resman (Pharmacist) 2". The text is printed in black ink on a white background.

Kamus Farmasi
 Muzak Resman (Pharmacist) 1
 Muzak Resman (Pharmacist) 2

Lampiran 4. Lembar Bimbingan PL



PRODI FARMASI
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK



Lembar ke :

LEMBAR BIMBINGAN PKL*
PEMBIMBING PKL (PL)

TAHUN AKADEMIK : 2023/2024

Nama Mahasiswa : Anis Zahro Ridihamah MILA
NIM : 2502026
Nama instansi PKL : Aptek Kamin Farma Kartini
Nama Pembimbing Lapangan : Apt. Rana Manjaya, S.Farm.

No.	Tanggal	Bimbingan dan Saran	Paraf Pembimbing
1.	7 Februari 2024	Bimbingan awal PKL	
2.	21 Februari 2024	Bimbingan log book	
3.	5 Maret 2024	Bimbingan log book dan tugas khusus	
4.	8 Maret 2024	Bimbingan log book dan tugas khusus	
5.	20 Maret 2024	Bimbingan tugas khusus	
6.	6 Juni 2024	Bimbingan tugas khusus dan laporan	

*JMINIMAL BIMBINGAN 6 KALI

AKREDITASI BAN-PT

0633/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2018

The Power of Islamic Entrepreneurship

Jl. Sumatera 101 Gresik Kota Baru (GKB) Gresik, 61121 Telp: (031) 3951414, Fax: (031) 3952585 Website: <http://www.umg.ac.id>, Email: info@umg.ac.id

Lampian 5. Lembar Bimbingan DPL



PRODI FARMASI
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK



**LEMBAR BIMBINGAN PKL
DOSEN PEMBIMBING PKL (DPP)***

TAHUN AKADEMIK : 2023/2024

Nama Mahasiswa : Anis Zahro Mulhoma'ul Mirah
 NIM : 211105026
 Nama instansi PKL : Apotek Kinia Farma Kartini
 Nama Dosen Pembimbing PKL : Diah Patranani S.Farm. Apt. M.T.

No.	Tanggal	Bimbingan dan Saran	Paraf Pembimbing
1.	12 Februari 2024	Bimbingan Logbook Minggu Ke-1	<i>DF</i>
2.	21 Februari 2024	Bimbingan logbook minggu ke-2	<i>DF</i>
3.	6 Maret 2024	Bimbingan Logbook minggu ke-3	<i>DF</i>
4.	13 Maret 2024	Bimbingan Logbook Minggu ke-4	<i>DF</i>
5.	20 April 2024	Bimbingan logbook minggu ke-5 dan tugas khusus	<i>DF</i>
6.	27 Mei 2024	Bimbingan logbook, tugas khusus dan laporan	<i>DF</i>
7.	5 Juni 2024	Bimbingan laporan dan tugas khusus	<i>DF</i>

***)MINIMAL BIMBINGAN 6 KALI**

AKREDITASI BAN-PT

0633/LAM-PTKes/Akr/Dip.1X/2018

The Power of Islamic Entrepreneurship

Jl. Sumatera 101 Gresik Kota Baru (GKB) Gresik, 61121 Telp: (031) 3951414, Fax: (031) 3952585 Website: <http://www.umg.ac.id>, Email: info@umg.ac.id

**AGENDA HARIAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
DI KIMIA FARMA KARTINI**




**ANIS ZAHRO NIDHOMATUL MILAH
NIM. 211105026**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III FARMASI
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK
2024**


No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Senin, 05 Februari 2024 (07.30 - 16.30)	<p>a). Belajar tentang Peran, Posisi dan tanggung Jawab TTK di apotek</p> <p>b). Memahami tentang Penyimpanan obat-obatan</p> <p>c). Membantu Apoteker dan TTK di apotek kimia farma Larkini untuk menyiapkan dan meracik resep</p> <p>d). Membantu mengambil obat di apotek lain.</p>	<p>➤ Mendapatkan ilmu tentang :</p> <p>a. Tugas TTK di apotek yaitu melakukan pelayanan kepada pasien mulai dari menerima pasien sampai dengan menyerahkan obat yang diperlukan. Seorang TTK juga melakukan peracikan resep sesuai dengan resep yang diberikan oleh pasien.</p> <p>b. Seorang apoteker atau TTK, dalam melakukan pelayanan kepada pasien harus memberikan Informasi yang benar, jelas dan mudah dimengerti oleh pasien. Informasi yang diberikan meliputi : Cara Penataan obat, cara penyimpanan obat, jangka waktu pengobatan, aktivitas serta makanan dan minuman yang harus dihindari selama terapi pengobatan.</p> <p>c. Penataan obat pada kimia farma terkini dibedakan berdasarkan kelas terapi, bentuk sediaan, obat generik, obat fort moving, narkotik, psitotropik dan suhu penyimpanan yang kemudian diurutkan secara alfabetis.</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
a.	Selasa, 06 Februari 2024 (15.00 - 22.00)	a). Bertanya kepada apoteker dan TTK tentang Visi dan misi diapotek Kimia Farma b). Bertanya tentang struktur organisasi dan kepmnya di Kimia Farma terkini. c). Membantu membersihkan rak dan obat d). Membantu menata obat yang baru datang e). Membantu apoteker dan TTK di Apotek Kimia Farma terkini untuk mengambil obat dan meresepkan resep	> Mendapatkan pengetahuan tentang : a. Visi dan Misi Apotek Kimia Farma - Visi Menjadi perusahaan Healthcare pilihan utama yang terintegrasi dan menghasilkan nilai yang berkelanjutan. - Misi 1. Melakukan aktivitas usaha di bidang - bidang Industri Kimia dan Farmasi, perdagangan dan jaringan distribusi, ritel farmasi dan layanan kesehatan serta optimalisasi aset 2. Mengelola perusahaan secara Good Corporate Governance dan operational excellence didukung oleh sumber daya manusia (SDM) profesional. 3. Memberikan nilai tambahan dan manfaat bagi seluruh stakeholder. b. Struktur organisasi dan kepmnya diapotek Kimia Farma terkini 1. apt. Rana Imangy, S. Farm sebagai Apoteker manager Pharmacy 2. apt. Sedian Pinans Rama, S. Farm sebagai Apoteker pengelola apotek 3. apt. Rayani Fitri, S. Farm sebagai Apoteker pendamping (APing) 4. 2 orang Asisten Apoteker, 4 ttt yang membantu Apoteker 5. 3 orang SGA sebagai petugas swalayan yang membantu menawarkan dan menjualkan obat yang dapat dijual bebas

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
3.	Rabu, 07 Februari 2019 (08.00 - 16.30)	<p>a). Membantu dan menata obat yang baru datang</p> <p>b). Bertanya mengenai perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pemurnihan, pengendalian, dan embalase</p> <p>c). Membantu Apoteker dan TTK di Kimia Farma Kartini untuk memetik dan mengambil obat</p>	<p>Mendapatkan pelajaran tentang :</p> <p>a. cet surat pesanan dan barang yang datang sesuai dengan SP dan fatur</p> <p>b. Di Apotek Kimia Farma Kartini untuk embalase resep biasanya setiap 1 resep, perencanaan dalam Kimia Farma tersebut setiap 1 minggu setelah setiap hari Kamis, pemurnihan di apotek Kimia Farma yang pertama dibst, kemudian dokumentasi, dan air. resep yang ditancurkan epitu yang lebih dari 5 tahun.</p> <p><i>di susutankedim</i></p>



No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
9.	Kamis, 08 Februari 2024 (15.00 - 22.00)	<p>a. Mengamati kartu stok, resep, copy resep, dan etiket di Apotek Kimia Farma Kartini</p> <p>b. Membantu Apoteker dan TTT di apotek Kimia Farma Kartini untuk menyiapkan obat dan meracik resep</p>	<p>→ Mendapatkan pengetahuan tentang :</p> <p>a. Mendapatkan gambaran tentang isi yang ada di dalam kartu stok : nama obat, nama barang, kemasan, tanggal, nomor, masuk, keluar, sisa, No. batch, kadaluarsa, paraf dan keterangan</p>  <p>b. Mendapatkan gambaran tentang isi yang ada di dalam kertas resep. Resep dicatatkan lengkap dan meliputi bagian-bagian antara lain: identitas penulis resep, tanggal penulisan resep, superscriptio, inscriptio, subscriptio, signatura, paraf penulis resep dan identitas pasien</p> <p>c. Mendapatkan gambaran tentang isi yang ada di dalam copy resep yaitu dengan mencatatkan semua fotokopian yang terdapat dalam lembar resep, bitum bal dengan identitas apotek, identitas AIA, tanggal pemberian obat, no resep, tanda pengembilan obat, tanda pcc, tanda tangan apoteker dan cap apotek</p> 

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			<p>b. Mendapatkan gambaran tentang isi yang ada dalam etiket yaitu identitas apoteker, nama, alamat, no telepon, identitas apoteker, nama SIPA, identitas pasien, ahurungpung uraian obat, tanggal, nama obat dan jumlah obat, dan perbedaan etiket biru digunakan untuk obat luar sedangkan yang putih digunakan untuk obat dalam (dapat ditelan)</p> 

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
5.	Jumat, 09 Februari 2024 (08.00 - 17.00)	<p>a. Mempelajari alur pelayanan resep (Lunum, BPJS, PLM, SMeeting, Kredit)</p> <p>b. Membranu menyiapkan pesanan Obat</p> <p>c. Membantu apoteker dan TTK di apotek kimia farma kartini untuk menyiapkan obat dan meracet resep</p>	<p>> Mendapatkan pengetahuan tentang :</p> <p>a. Alur pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resep umum : pasien datang membawa resep → Apoteker dan TTK melakukan pengecekan stok obat tersedia diapotek atau tidak → jika obat tersedia maka Apoteker atau TTK melakukan perhitungan biaya obat sesuai dengan resep → jika pasien sudah menyetujui maka obat langsung disiapkan oleh Apoteker atau TTK → setelah obat siap diberi etiket pada masing-masing obat dan dilakukan pengecekan ulang → mem berikan KIE kepada pasien. - Surat resep BPJS pasien rujuk kembali yaitu : pasien membawa resep yang akan ditebus. Apoteker atau TTK melakukan pengecekan apakah pasien membawa foto copy kartu BPJS, surat rujuk balik, resep asli, no kunjungan, lampiran hasil laboratorium atau tidak → jika sudah lengkap maka Apoteker atau TTK melakukan pengecekan data menggunakan komputer → jika data pasien benar maka resep akan diproses → setelah obat siap dan diberikan etiket pada masing-masing obat. Apoteker atau TTK melakukan pengecekan kembali serta memberikan KIE kepada pasien.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuai pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)																				
6.	Sabtu, 10 Februari 2024 (08.00 - 15.00)	a. Menjelajahi obat bebas yang ada di apotek Kimia Farma Kartini b. Membantu apoteker dan TTK di apotek Kimia Farma Kartini untuk menyiapkan	> Mendapatkan pengetahuan tentang : a. Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa resep dokter atau sudah terdapat di Daftar FT b. Contoh obat bebas di apotek Kimia Farma. <table border="1" data-bbox="1032 448 1984 842"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Dagang</th> <th>Komposisi</th> <th>Fungsi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Samol</td> <td>Parasetamol 500mg</td> <td>Anti inflamasi dan analgesik</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Magsida</td> <td>Al 200 mg, Mg 200mg, Cinnchon 20mg</td> <td>Antisida dan obat maag</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Badrelin</td> <td>Acetylsalicylic Acid 80mg (Aspirin)</td> <td>Pemaman dan rasa nyeri</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Dicolactol</td> <td>Lactosa 10g</td> <td>Menaikan tekanan osmosis sehingga faeces menjadi lunak. (mengatasi konstipasi)</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nama Dagang	Komposisi	Fungsi	1.	Samol	Parasetamol 500mg	Anti inflamasi dan analgesik	2.	Magsida	Al 200 mg, Mg 200mg, Cinnchon 20mg	Antisida dan obat maag	3.	Badrelin	Acetylsalicylic Acid 80mg (Aspirin)	Pemaman dan rasa nyeri	4.	Dicolactol	Lactosa 10g	Menaikan tekanan osmosis sehingga faeces menjadi lunak. (mengatasi konstipasi)
No.	Nama Dagang	Komposisi	Fungsi																				
1.	Samol	Parasetamol 500mg	Anti inflamasi dan analgesik																				
2.	Magsida	Al 200 mg, Mg 200mg, Cinnchon 20mg	Antisida dan obat maag																				
3.	Badrelin	Acetylsalicylic Acid 80mg (Aspirin)	Pemaman dan rasa nyeri																				
4.	Dicolactol	Lactosa 10g	Menaikan tekanan osmosis sehingga faeces menjadi lunak. (mengatasi konstipasi)																				

Gresik, 12 Februari 2024
Dosen Pembimbing,*



Apt. Diah Ratnasari, S. Farm., Apt., M. T.
NIDN 0721119001

Gresik, 21 Februari 2024
Pembimbing Lapangan* (Instansi PKL)



Kimia Farma
Apotek Kimia Farma 164
Apt. Rana Imanjaya, S. Farm
SIP 19050502A

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 2


No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
7.	Senin, 12 Feb 2024 (15.00 - 22.00)	<p>a. Melakukan pengamatan dalam komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dengan pasien di apotek Kimia Farma Kartini</p> <p>b. Membantu Mengambil obat di apotek Kimia Farma lain</p> <p>c. Membantu TTK dan Apoteker menyiapkan obat dan meracik resep</p> <p>d. Membantu membersihkan apotek dan mematu obat beserta harganya</p>	<p>→ Cara Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memanggil nama pasien 2. Memastikan nama, usia, alamat sudah sama dengan yang ada di resep 3. Menanyakan apakah ada riwayat alergi obat 4. Menjelaskan obat dan dosis yang diberikan kepada pasien 5. Menjelaskan indikasi obat 6. Memberi tahu jadwal penggunaan obat: kapan minum obat, sebelum atau sesudah makan 7. Memberitahu cara menggunakan obat: <ul style="list-style-type: none"> / Apakah diminum / Dilantkan terlebih dahulu / Digosok / Digosokan atau yang lain 8. Memberitahu efek samping obat 9. Memberitahu cara penyimpanan obat 10. Menjelaskan kepada pasien lama penggunaan obat, misalnya harus minum obat sampai habis, tidak boleh berhenti tanpa seizin dokter atau yang lain 11. meminta pasien untuk menjelaskan ulang apa yang sudah disampaikan untuk mengetahui sejauh mana pasien memahami terhadap obat tersebut

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
8.	Selasa, 13 Feb 2023 (15.00-22.00)	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu mengecek barang datang b. Membantu mengantur obat ke pasien c. Membantu TTE dan Apoteker mengambil obat dan menulis resep d. Membantu menentu obat dan harga obat di Apotek Kimia Farma Kartini 	<p>→ Mendapatkan ilmu tentang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Cara penerimaan barang <ul style="list-style-type: none"> 1. Cek faktur dengan barang yang datang seperti nama obat, jumlah, ED 2. Faktur disamakan dengan surat pesanan (SP), jika sudah sama maka ditunda tangani oleh Apoteker

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
9.	Rabu, 14 Feb 2024 (15.00 - 22.00)	a. Membantu TTK dan Apoteker dalam mengambil obat dan meracik resep b. Membantu menjualkan Colagen dengan cara Online	> Mendapatkan ilmu tentang : a. Mengetahui Cara pemberian resep BPJS 1. Mengecetak dokumen Seperti : Foto copy Kartu BPJS, Surat rujuk balik, resep asli, NO. Kunjungan, Lampiran hasil laboratorium atau idat 2. Pengecetan data menggunakan komputer 3. Setelah data lengkap maka obat disicpran → Contoh resep F/ fonilyn MR no. xix S1dd' F/ Amlodipin smg no. xix S0-0-1 4. Menyiapkan Etiket dan dimasukkan kedalam plastik klip beserta obatnya → Fonilyn MR /30 : 1 x sehari 1 tablet sebelum makan (gula) → Amlodipin smg /30 : malam x sehari 1 tablet sesudah makan (Tensi) c. Menulis nama obat yang diresepkan, signa, jumlah obat dalam buku BPJS 6. Apoteker atau TTK melakukan proseskan temosi atau melakukan EIE kepada pasien

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuai pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
10.	Kamis, 15 Feb 2024 (08.00 - 11.00)	a. Mengantar obat kepada pasien b. Membantu TTK dan Apoteker dalam mengambil obat dan meracik resep c. Membantu menaruh obat yang baru datang	> Mendapatkan ilmu tentang a. mengetahui cara pembuatan obat racikan (puyer), yaitu R/ Azitromycin 0,200 Lorutudine 0,009 mf. puv dtl no. V S 1dd 1 R/ Zoter 0,300 mf. puv dtl no. XV S 3dd 1 R/ Naprex syr no. 1 S 3dd 10ml - perhitungan pengambilan obat / Azitromycin = $\frac{200 \times 5}{500} = 2 \text{ tub}$ / Lorutudine = $\frac{4 \times 5}{10} = 2 \text{ tub}$ / Zoter = $\frac{300 \times 15}{900} = 11,25 \text{ tub}$ - mengambil obat yang akan dicetak sesuai dengan jumlah yang diminta dan diletakkan ditempat yang disediakan - membuat etiket dan letakkan pada tempat yang akan dicetak untuk menghindari kesalahan pembuatan obat racikan R/ 1 → 1 x sehari / bungkus sesudah makan (Antibiotik dihabiskan) R/ 2 → 3 x sehari / bungkus sesudah makan (Antibiotik dihabiskan) R/ 2 → 3 x 10 ml (sesudah makan (Demam)) - memasukkan obat kedalam blander dan diafak - Dibagi secara kasar mata dan dimasukkan kedalam kertas puyer dan di pres menggunakan alat - Dimasukan kedalam plastik klip dan diberikan etiket dan melampirkan KIF Kpd pasien

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
11.	Jumat, 16 Feb 2024 (08.00 - 15.00)	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengambil obat di Apotek lain b. Membantu TTK dan Apoteker dalam mengambil obat dan membuat resep c. Bertanya ke TTK jika ingin mengambil obat di Apotek lain 	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Mendapatkan lima tentang : <ul style="list-style-type: none"> a. Apotek Kimia Farma kosong obatnya mengambil di Apotek terdekat <ul style="list-style-type: none"> 1. Cek stok di apotek kimia Farma mana yang ada stok obatnya 2. Telfon Apotek yang ada stok obatnya dan harus dicek langsung fisik obatnya 3. Kirim permintaan ke apotek kimia Farma tersebut 4. Kemudian diambil obatnya, jika sudah diterima maka dikomputer dan otomatis stok yang ada di kimia Farma kembali bertumbu



No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
12.	Sabtu, 17 Feb 2024 (08.00 - 15.00)	a. Bertanya kepada Apoteker mengenai uji pektik di apotek Kimia Farma Kartini b. Membantu Ttt dan Apoteker dalam mengambil obat dan meracik resep	> Mendapatkan ilmu tentang : a. Uji pektik pada Kimia Farma Kartini dilakukan setiap pergantian shift, dengan cara nama obat ditulis dan terdapat berapa stok dan ditulis secara online.

Gresik, ... 21 Februari 2024 ...
 Dosen Pembimbing,*



Apt. Diah Ratnasari, S. Farm., Apt., M. T.
 NIDN 0721112001

Gresik, ... 21 Februari 2024 ...
 Pembimbing Lapangan* (Instansi PKL)







Apt. Rana Imanjaya, S. Farm
 SIP 19850502A

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke: 3


No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
13.	Senin 19 Feb 8029 (15.00 - 22.00)	a. Membantu TTK dan Apoteker dalam mengambil obat dan Merakit resep di Apotek Kimia Farma Karini	<p>→ Mendapatkan ilmu tentang</p> <p>a. Mengetahui Cara pelayanan resep</p> <p>R/ Alpara tab no. IX S 3 dd 1</p> <p>R/ Ambroxol tab no. VI S 2 dd 1</p> <p>R/ Methyl Prednisolon 4 mg no. IX S 3 dd 1</p> <p>✓ Mengambil obat yang sesuai dengan jumlah yang diminta</p> <p>✓ Membuat etiket dan dimasukkan kedalam plastik klip</p> <p>R/ 1 → sehari 3 x 1 tab sesudah makan (Flu)</p> <p>R/ 2 → sehari 2 x 1 tab sesudah makan (Batuk berdehak)</p> <p>R/ 3 → sehari 3 x 1 tab sesudah makan (radang)</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
14.	Selasa, 20 Feb 2024 (15.00 - 21.00)	<p>a. Mengunjungi perbelanjaan Surat Pesanan di Apotek Kimia Farma Kartini</p> <p>b. Membantu TTK dan Apoteker Untuk mengambil obat dan Meraacit resep di Apotek Kimia Farma Kartini</p> <p>c. Membantu Membersihkan rak obat dan menentu obat</p>	<p>> Mendapatkan ilmu tentang</p> <p>a. Mendapatkan gambaran perbedaan Surat pesanan</p> <p>1. Jumlah obat dalam Surat pesanan Surat pesanan non-narkotika dan non-psikotropika bisa lebih dari satu jenis obat, Surat pesanan narkotik hanya boleh digunakan satu jenis obat, sedangkan psikotropik boleh digunakan lebih dari satu obat</p> <p>2. PBF yang di kunjungi - Obat-obat Terentu (OOT) dapat di kunjungi pada PBF seperti PT. Enceval Putra Mega trading (Promedex tub), terdiri dari 2 rangkaian</p>  <p>3. Narkotika hanya boleh di kunjungi oleh PT. Kimia Farma (Codicaf Codein 10mg dan 20 mg), terdiri dari 9 rangkaian</p> 

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			<p>- Psikotropika dapat dihijaukan PBF lain yang mendistribusikan psikotropika, terdiri dari 2 rangkap</p>  <p>- prekursor dapat dihijaukan PBF lain yang mendistribusikan prekursor seperti PT. PINT Padang global (Triaminic Exporterent syr), terdiri 2 rangkap</p> 

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
15.	Rabu, 21 Feb 2024 (15.00 - 22.00)	<p>a. Mempelajari tentang peraturan obat dan penyimpanan obat serta akses di Apotek kimia farma karhini</p> <p>b. Membantu Apoteker dan TTK untuk menyiapkan obat dan meracik resep</p>	<p>→ Mendapatkan ilmu tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> perataan obat pada apotek kimia farma 169 dibedakan berdasarkan kelas terapi, bentuk sediaan, obat generik, obat fast moving, Narkotik - psiko tropik, suhu penyimpanan yang disusun secara alfabetis. Obat fast moving diletakan di dekat meja kasir dan Meja rucik agar mudah dan cepat dalam pelayanannya Obat-obatan yang dipisahkan berdasarkan kelas terapi seperti obat sistem Saraf pusat, Obat Vitamin, obat kolestrol, obat kardiovaskular, Antibiotik, Urologi, hormon, Sistem imun dan alergi, Farmakologi, dan diabet Obat lara (Look Alike - Sound Alike) Obat dengan peramaan dan pengucapan yang sama ini diberi <u>Label Lera</u> pada setiap kotak obatnya dengan nyam agar tidak terjadi kesalahan saat pengambilan obat, Contoh obat Vomceran 4 - vomceran 8, Myonep - Myonal Obat HAC (High Alert) merupakan obat beresiko tinggi dan diberi tulisan HA pada setiap kotak agar mengetahui obat HA, Contoh obat HA, Metformin 500 - Metformin 850, Capribose 50 - Capribose 100 Obat salep, krim, gel, drop, sirup, injeksi dan obat tetes mata disendikan disusun secara alfabetis. Contoh obat apolar, Boniginol - N, Cravit Drop, LFX Obat psikotropika dan narkotika diletakan pada lemari terendah di letakan disetiap kotak rak psikotropika dan Narkotika harus merataan nama pasien. Rak lemari ini dilengkapi dengan 2 pintu dan 2 kunci yang dipengas oleh apoteker. Obat-obat tertentu (ODT) diletakan pada lemari terendah di bawah obat nyeri dan dilengkapi dengan kartu stok. Contoh obat <u>ODT</u>, Aldomet, Analfam, Lamictul

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			<p>i. Obat yang memerlukan suhu dingin diletakkan didalam kulkas dengan suhu 2-10°C seperti obat supositoria, insulin, dan beberapa obat tetes mata</p> <p>j. Obat yang dijual bebas dan akses diletakkan di depan kasir atau swalayan yang disusun berdasarkan khasiat, bentuk sediaan, dan ukuran sediaan. Seperti bodrex, Sanmol, Diatabs, Dulcolactol, Lactulax</p>



No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
16.	Kamis, 22 Feb 2024 (08.00 - 15.00)	<p>a. Membantu menata dan membersihkan rak dan obat</p> <p>b. Membantu TTK dan Apoteker untuk mengambil obat dan merakit obat di apotek Kimia Farma Karini</p> <p>c. Mempelajari tentang alat kesehatan yang ada pada Apotek Kimia Farma Karini</p>	<p>→ Mempelajari Ilmu tentang</p> <p>a. Beberapa alat kesehatan yang ada di apotek Kimia Farma Karini yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alkes perawatan seperti bandage gauze, kapas pembalut, kasa steril, pembalut gips (Gersona), plester kertas, plester 2nd (leukopar). 2. Perawatan pasien seperti; Bedpan, hisap / eskap, krut 3. Alkes tindakan medis seperti Ballon / Folly catheter, Condom catheter, feeding tube, Inusion set dewasa, Marker oksigen, Needle, urine bag. 4. Alat-alat bedah seperti benang jahit, gunting bedah, jarum jahit, skalpel 5. Disinfektan seperti Alkohol 70%, Alkohol swab, H₂O₂ 3%, Povidone iodine, Ivarol. 6. Apd seperti Apron, masker, sarung tangan, Gaze Cover, Kacamata safety 7. Alkes untuk diagnosis seperti heard lamp, termometer

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuai pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
17.	Jumat, 23 Feb 2024 (08.00 - 15.00)	<p>a. Mempelajari alor pelayanan Suameditasi</p> <p>b. Membaw TTE atau Apoteker dalam mengambil obat dan merakit resep di kimia Farma Kartini</p>	<p>→ Mendapatkan ilmu tentang :</p> <p>a. Alur pelayanan pelayanan Suameditasi dengan pasien yang tidak atau tanpa membawa resep dokter → Apoteker atau TTE membantu memilih obat dan melakukan anamnesis terhadap pasien → Apoteker atau TTE bertanya mengenai keluhan yang dialami pasien dan dicatat seperti keluhan apa yang dialami, berapa lama keluhan terjadi, apakah ada alergi, apa ada obat yang sudah dikonsumsi sebelumnya → Apoteker dan TTE bertanya mengenai identitas pasien yang sakit → Apoteker dan TTE memberikan rekomendasi obat yang dibutuhkan oleh pasien → jika pasien bersedia maka diberikan perhitungan harga obat yang sesuai dengan permintaan → jika pasien sudah menyetujui maka langsung dibayar → dan diberikan KIE</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
18.	Sabtu, 29 Feb 2024 (08.00 - 15.00)	<p>a. Membantu TTK dan Apoteker dalam mengecek dan Menata barang yang baru datang</p> <p>b. Melakukan pengamatan dalam pelayanan swamedikasi di Apotek Kimia Farma Karhni</p> <p>c. Membantu apoteker atau TTK dalam mengambil obat dan merujuk resep di apotek kimia farma Karhni</p>	<p>➢ Mendapatkan Ilmu tentang</p> <p>a. pelayanan swamedikasi</p> <p>A : Selamat datang di Kimia Farma, ada yang bisa saya bantu ?</p> <p>P : Saya mau beli obat panas, Tetapi yang sirup</p> <p>A : Untuk siapa ya bu?</p> <p>P : Ini Untuk anak saya, dari tadi pagi panasnya ngak turun-urun.</p> <p>A : Apakah anaknya ada batuk dan pileknya bu, atau panas aja ?</p> <p>P : Iya, panas aja</p> <p>A : Anaknya usia berapa, ngah bu ?</p> <p>P : Anak saya usianya 7-tahun</p> <p>A : Apakah ada riwayat Alergi ?</p> <p>P : tidak ada</p> <p>A : Apa sudah pernah mengonsumsi obat sebelumnya ?</p> <p>P : Belum pernah mbak</p> <p>A : Baik, tunggu sebentar ngah bu</p> <p>P : baik</p> <p>A : Ibu ini saya ada rekomendasi obat panas sanmol syr sama fermal syr</p> <p>P : Saya mau yang sanmol aja berapa</p> <p>A : yang sanmol harganya 22.000</p> <p>P : Baik mbak, saya mau yang sanmol aja</p> <p>A : Ini Sanmol syr nya diminum 3 x 15 ml, 15 ml setara dengan 1 sendok makan, jika dalam 3 hari belum turun segera dipikirkan kedokteran ya</p> <p>P : Baik mbak ini ungu ya</p> <p>A : Baik bu, uangnya 25.000 kembali 3000 ngah bu.</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			<p>P : baik terimakasih Mbak A : Sama - sama bu, semoga cepat Sembuh</p>

Gresik, 6 Maret 2024
Dosen Pembimbing*



Apt. Diah Ratnasari, S. Farm., Apt., M. T.
NIK/SIPA. 072.11.9001

Gresik,
Pembimbing Lapangan* (Instansi PKL)







Apt. Rana Imanjaya, S. Farm
SIP 198505024

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)


Minggu ke : 4

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
19.	Senin, 26 Feb 2024 (15.00 - 22.00)	<p>a. Bertanya kepada TTK mengenai perencanaan obat di Apotek Kimia Farma Karini</p> <p>b. membantu membungkus Pesanan dari online</p> <p>c. membantu Apoteker dan TTK dalam penerimaan obat yang baru datang dan disimpan</p> <p>d. membantu Apoteker atau TTK dalam mengambil obat dan merakit resep di Apotek Kimia Farma Karini</p>	<p>→ Mendapatkan ilmu tentang</p> <p>a. perencanaan obat</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Perencanaan obat dilakukan 2 minggu sekali ✓ Pemesanan obat dilakukan langsung oleh pihak pusat KF, dengan perhitungan stok terjual + Buffer stock, lalu pihak apotek akan menerima surat pesanan lalu nanti akan di print untuk dicocokkan pada saat barang datang ✓ SP. Narkotika, Psikotropika, dan kredit berbeda karena yang memesan pihak apotek sendiri <p>b. membantu membungkus pesanan dari penjualan online seperti, tokopedia dan kimia Farma mobil.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kardus → U/ melindungi produk atau barang saat pengiriman - Buble wrap kalau kaca - Label KF - Label pengiriman di print - Cek barang sebelum dibungkus untuk dikirim - Pakan jasa pengiriman antar aja, Lion Parcel - Nama di tetep (Kimia Farma Apotek Official Store)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
20.	Selasa, 27 Feb 2024 (08.00 - 15.00)	<p>a. Membantu TIK dan Apoteker dalam pengambil obat dan meracik obat di Apotek kimia farma</p> <p>b. Membantu menata dan mengecet barang yang baru datang di Apotek kimia farma Farhini</p> <p>c. Membantu membungkus Resaman obat online</p> <p>d. Membantu mengantur obat ke pasien.</p>	<p>→ mendapatkan ilmu tentang</p> <p>a. Mengetahui cara pembuatan obat rasakan (Kapsul)</p> <p>R/ Coditax 20 mg Eplexol 30 mg Lapiped 1 tab Ranitidin 60 mg Lameton 9 mg mf. Cap dtd no. xx s 3 dd 1</p> <p>R/ Hi bone no. xxx s 2 dd 1</p> <p>✓ Perhitungan</p> <p>Ranitidin = $\frac{60 \times 20}{150} = 8 \text{ tab}$</p> <p>Coditax = $\frac{20 \times 20}{20} = 20 \text{ tab}$ Lapiped $1 \times 20 = 20 \text{ tab}$</p> <p>Eplexol = $\frac{30 \times 30}{20} = 20 \text{ tab}$ Lameton $\frac{9 \times 9}{20} = 20 \text{ tab}$</p> <p>✓ mengambil obat yang akan diracik sesuai dengan jumlah yang diminta dan diletakkan ditempat yg sudah disiapkan</p> <p>✓ membuat etiket dan diletakkan ditempat yang sudah disediakan untuk menghindari kebalaharan dalam peracikan</p> <p>R/ 1 : serani 3x1 Kapsul, Setelah makan (Basil)</p> <p>R/ 2 : serani 2x1 Kapsul, Setelah makan (Vitamin)</p> <p>✓ Meracik obat dengan blender dan diayak dan dimasukkan kedalam Cangkrang Kapsul no. 00</p> <p>✓ Kemudian dimasukkan kedalam wadah kapsul dan ditempel etiket.</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
21.	Rabu, 28 Feb 2024 (15.00 - 22.00)	<p>a. Membantu TTK dan Apoteker untuk menyiapkan Spreadingan</p> <p>b. membantu mengantur obat ke pasien</p> <p>c. Membantu TTK dan Apoteker dalam menyiapkan obat dan meracik resep di Apotek Kimia Farmasi Karini</p>	<p>→ Mendapatkan ilmu tentang</p> <p>a. Spreading merupakan keterangan di apotek tersebut dan meminta obat ke apotek lain. Yang memiliki lebih stok obatnya. dan dikertas spreadingan harus ditulis Exp obat tersebut</p> <p>+ contoh</p>    

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuai pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
22.	Kamis, 29 Feb SDA4 (08.00 - 15.00)	<ul style="list-style-type: none"> a. Belajar Menulis Sp Narkotika b. Membantu mengoreksi Spredingan dari pihak apotek lain c. Membantu TTK dan Apoteker dalam mengambil obat dan meracik resep di Apotek Karsin Prima Karini d. Membantu mengambil obat ke apotek terdekat 	<p>→ Mendapatkan ilmu tentang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dapat mengetahui langsung dalam menulis sp Narkotika. Sp Narkotika 9 rangkap, 3 rangkap dikasih ke PBF sedangkan 1 rangkap buat di Apotek. 

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
23.	Jumat, 1 Maret 2024 (08.00 - 15.00)	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu menerima dan menata barang yang baru datang di Apotek Kimia Farma Karahi b. Membantu merapikan resep umum dan psik-norko c. Membantu menerima dan menata spradingan dari apotek lain. d. Membantu meracit dan mengambil obat di Apotek Kimia Farma. 	<p>→ Mendapatkan ilmu tentang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Resep diuntkan mulai dari tunggal, bulatan, tuhan kemudian dirasukan pedata m kotak untuk disimpan  <ul style="list-style-type: none"> b. Menerima Spreadingan, dicek mulai dari ram obat, exp obat harus lebih dari 9 bulan, jika ada kesalahan obat atau exp dekat maka dikonfirmasi dan ditembalikan

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
29.	Sabtu, 2 Maret 2024 (13.00 - 21.00)	a. Bertanya tentang pengendalian atau stok opname b. membantu mencari dan menyiapkan obat di apotek Kimia Farma Kartini	7 Mendapatkan ilmu tentang a. stok opname dilakukan 3 bulan sekali yang disebut dengan tri wulan 1/2/3 dengan cara mengecek di komputer dan dicetak fisik untuk semua obat yang ada di apotek kimia Farma kartini

Gresik, 6 Maret 2024
 Dosen Pembimbing*



Apt. Diah Ratnasari, S. Farm., Apt., M. T.
 NIK/SIPA 0781119001

Gresik,
 Pembimbing Lapangan* (Instansi PKL)



Apt. Rana Imanjaya, S. Farm
 SIP 198505024

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 5

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuai pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
25.	Senin, 4 Maret 2024 (08.00 - 15.00)	<p>a. Mempelajari penyimpanan obat yang diletakan / disimpan di lemari es di Kimia Farma Karhini</p> <p>b. Membantu Apoteker atau TTK di Apotek Kimia Farma Karhini untuk mengambil obat dan merujuk resep</p>	<p>> Mendapatkan ilmu tentang</p> <p>a. Mengetahui obat apa saja yang harus diletakan / disimpan di lemari es. Suhu dingin. Disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu stabil 2°C - 8°C</p> <p>7 Berikut contoh obat yang disimpan dalam lemari es</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suppositoria = Dulcolax, Pamol supp, Proris supp, dll 2. Ovula : Vogistin ovul, Flegistin ovul, dll 3. Inulin : Apidra, Mowampid, Levemir, dll 4. Obat tetes : Glaxo plus, otipain

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
26.	Selasa, 05 Maret 2024 (08.00 - 18.00)	a. Membantu pencatatan dan pelaporan di kimia farma b. Membantu nge list harga untuk PT. c. Membantu menerima dan menata barang yang baru datang d. Membantu apoteker dan TTK dalam mengambil obat dan merujuk obat	1. mendapatkan ilmu tentang a. pelaporan obat narkotika dan psitotropika. obat narkotika dan psitotropika dilaporkan setiap bulannya max tanggal 10 diaplikasi SIPNAP. Untuk caranya - log in Akun SIPNAP - pilih pelaporan narkotika dan psitotropika - pilih salah item obat - data yang dimasukkan jumlah keluar dan macunya obat tersebut - apabila sudah terinput semua, klik simpan dan kirim selain pelaporan narkotika dan psitotropika ada pelaporan pajak, akan tetapi laporan pajak dilaporkan oleh pusat (Regional Gresik) b. Mendapatkan ilmu bahwa perusahaan atau orang yang akan meminta barang atau obat dengan cara melist harga obat yang dibutuhkan kemudian dikirim

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
27.	Rabu, 6 Maret 2024 (15.00- 22.00)	<p>a. membantu membersihkan dan mematu obat dalam rak</p> <p>b. membantu Apoteker dan TTK dalam mengambil obat dan mematik obat</p>	<p>→ Mendapatkan ilmu tentang</p> <p>a. Meracik obat kapsul</p> <p>R/ Paracetamol 300 mg As. Mefenamat 300 mg Mf. la caps dtd no. 2 S 3 dd 1</p> <p>✓ Perhitungan obat</p> <ul style="list-style-type: none"> Paracetamol $\frac{300 \times 10}{500} = 6 \text{ tub}$ As. Mefenamat $\frac{300 \times 10}{500} = 6 \text{ tub}$ <p>✓ Ambil obat yang akan diracik sesuai dengan jumlah yang diminta</p> <p>✓ Membuat etiket dan diletakkan di tempat yang disediakan</p> <p>R/1 = Sehari 3x 1 kapsul (sesudah makan) / (panas / pusing)</p> <p>✓ Meracik obat dgn belender dan diayak, dimasukkan ke dalam cangkang kapsul no. 00</p> <p>✓ memudahkan dengan kelainan sudah kapsul dan ditempel etiket.</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
28.	Kamis, 7 Maret 2024 (15.00 - 22.00)	a. Membantu Membungkus Pesanan obat online b. Mengamati obat berdasarkan kelas terapi c. Membantu Apoteker dan TK dalam mengonfirmasi obat dan memetik obat	→ Mendapatkan ilmu tentang a. Obat berdasarkan kelas terapi 1. Obat diabetes → Actos 30, Actos met, Amadiab 1/2/3/4, Caribore 50/100, Diamicon MR 60, Euthyox 50/100, Forbeter 500/850, Glucan, Janumet 50/500, Kombialyze XR, Lapijin 2/100, Metphar XR 300/750, Obeslim, Pionat, Truym, Xigluo, Vitatrit 2. Alergi & Imune sistem → Aeras, Batulin, Cerini, Dicom, Keptulan, Inclanin, Ketriain, Lameton 9/8/16, Medixon 9/8/16, Opicort, Predicort, Ryel, Sedares, Triac 3. Sistem pernafasan → Alpani, Urad, Kemcolin, Egexol, Elumucil, Lapijed, Mucem, N-Ace, Profilas, Temonza, Vestern. 4. Genetik → Aciclovir 200/400, Betuhistine, Cepadaxil, Domperidon, Episone, Folic acid, Guaifenesin, Ibuprofen, Ketocazole, Lamudrine, Nihil prednisolone, Nifedipin, Omeprazole, Pantoprazole, Ranitidine VitC, Zinc sulfate. 5. hormon dan kontraseptif → Alovel, Blesiven, Lripsn, Diane, Fetrie, Mucolas, Nosalut, Prowia, regumen, Turnover, utingeran, Uicane, Yas 6. Antibiotik → Amoxin, Bimotal, Cefet, Dalacin, Formyco, Hecilon, Informax, Fivoxir, Lapicef, Maxprinol, Primadex, Rifurax, Sanprim TB 3/12, Zitrox 20

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			<p>7. BPJS → Acarbose, Bisoprolol, Candesartan, Digoxin, Fomepizole, Glimperide, Herbeseer CD, ISDN, Minipri, Nifedipin, Famipril, Simvastatin, Turmpres, Voltaren.</p> <p>8. Kandro dan hipertensi → Arloacor, Betniga, Cardio Aspirin, Dovan, Etorge, Farnasal, Hystetur, Interpril, Kalmar, Lasix, Narkisi, Statelov, Tbofan, Verclo.</p> <p>9. kolestrol → Actakar, Crestor, Ezetrol, Fator, Hystiril, Lipin, Nistrol, orant, rohin, statin, Tulip</p> <p>10. Vitamin & mineral → Ashim, Berom cet, cal 99, Dec, Elkan, Fibonase, Glucosamin, Hippro, lambot</p> <p>11. Sistem saraf → Diflam, Epligen, Camaflam, kalmeio, ketep, Liorcal</p> <p>12. obat → Esola, Lodia, Fenhin, Reprol, Spasmim</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
29.	Jumat, 8 Maret 2024 (15.00-22.00)	<p>a. Melakukan pengamatan dalam pelayanan swamediasi di apotek kimia farma bawini</p> <p>b. Membantu TTE dan Apoteker dalam menerima dan menantu yang baru datang.</p> <p>c. Membantu TTE dan Apoteker dalam mengambil obat dan menulis resep</p>	<p>→ mendapatkan ilmu tentang</p> <p>a. pelayanan swamediasi</p> <p>A : Selamat datang dikimia farma, ada yang bisa saya bantu</p> <p>P : mbak saya mau beli obat buat saya untuk batuk pilek ?</p> <p>A : Iya saya ada Nutrimax CXC</p> <p>P : Itu bagus tu mbak ?</p> <p>A : Bagus bu untuk batuk pilek</p> <p>P : Baik mbak, saya mau yang itu</p> <p>A : Baik bu 144.000</p> <p>P : Baik mbak, ini uangnya</p> <p>A : Baik bu uangnya saya terima 150.000 kembali 6.000</p> <p>P : baik mbak</p> <p>A : bu ini diminum 1 1/2 sendok teh, 3xali sehari setelah makan</p> <p>P : baik mbak</p> <p>A : Baik bu semoga cepat sembuh</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
30.	Sabtu, 09 Maret 2024 (08.00 - 15.00)	<p>a. membantu menata dan menerima obat yang baru datang.</p> <p>b. membantu Apoteker dan TTK dalam mengambil obat dan merucik obat</p> <p>c. membantu mengambil obat dan mengantarkan obat</p>	<p>→ mendapatkan ilmu tentang</p> <p>a. merucik resep</p> <p>R/ Codein 15mg Ambroxol 20mg mp 8mg $\frac{1}{3}$ tub Mf. 1a caps Htl no. 1x S 3dd 1</p> <p>R/ Tremenza no. 1/1 S 2dd 1</p> <p>✓ perhitungan obat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Codein $\frac{15 \times 9}{15} = 9 \text{ tub}$ • Ambroxol $\frac{20 \times 9}{30} = 6 \text{ tub}$ • mp $\frac{1}{3} \times 9 = 3$ • Tremenza 6 tub <p>✓ Ambil obat yang akan dirucik sesuai dengan jumlah obat yang diminta</p> <p>✓ membuat etiket dan ditempelkan ditempat yang disediakan</p> <p>H₁ : 3x sehari 1 kapsul, sesudah makan (bank)</p> <p>H₂ : 2x sehari 1 tub, sesudah makan (pilek)</p> <p>✓ merucik obat menggunakan blender dan diayak, dimasukkan ke dalam kantong kapsul no. 00</p> <p>✓ kemudian dimasukkan ke dalam wadah kapsul dan diberi etiket.</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
31.	Senin, 11 Maret 2024 (08.00 - 16.00)	a. Mengamati Faktur yang akan di entry kedalam pos b. Membantu mengambil obat di Apotek terdekat c. Membantu TIF dan Apoteker dalam mengambil obat dan memilik obat	→ mendapatkan ilmu tentang a. mengetahui cara entry faktur di klinik farmasi 1. melakukan pengecekan PO dengan faktur 2. memasukan no. PO kedalam pos dibagian penerimaan barang 3. Fenty barang sesuai dengan faktur 4. memasukan nama obat, tanggal kadaluarsa, no batch, qty / jumlah 5. Cocokkan hasil akhir dengan faktur akhir 6. jika sudah selesai, bisa simpan

Gresik,.....
Dosen Pembimbing,*



Apt. Diah Ratnasari, S. Farm., Apt., M. T.
NIK/SIPA. 0721119001

Gresik,.....
Pembimbing Lapangan* (Instansi PKL)



Apt. Rana Imanjaya, S. Farm
NIDN. 1905050214

**TUGAS KHUSUS
PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)
DI KIMIA FARMA KARTINI**




**ANIS ZAHRO NIDHOMATUL MILAH
NIM. 211105026**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III FARMASI
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK**

2024

A. TUGAS KHUSUS RESEP

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (3), resep polifarmasi (3), resep obat mata/telinga (1), resep obat kulit (1), resep mengandung sediaan inhaler (1), resep obat KB (1), Resep mengandung insulin (1), resep kudis/kurap (1), Resep obat saluran cerna (1), Resep saluran nafas (1), resep racikan anak (3), Resep racikan dewasa (3), resep pasien DM (1), Resep pasien HT (1), Resep pasien syaraf (1), resep yang ada pengulangan /iter (3), dan resep lainnya (4)
 Total : 30 Resep


No.	Resep	Tahapan pengerjaan resep																					
1	Jenis Resep : Resep asli Resep obat : Racikan Jumlah obat dalam resep : 4 Pengulangan resep : neiter Tempel Resep/salin resep disini! 	A. Skrining Administrasi <table border="1" data-bbox="927 512 1794 1385"> <tr> <td data-bbox="927 512 1193 549">Nama Pasien :</td> <td data-bbox="1193 512 1420 549">Ada</td> <td data-bbox="1420 512 1794 549">An. zuma</td> </tr> <tr> <td data-bbox="927 549 1193 585">Umur pasien :</td> <td data-bbox="1193 549 1420 585">Ada</td> <td data-bbox="1420 549 1794 585">7 th</td> </tr> <tr> <td data-bbox="927 585 1193 622">Berat Badan :</td> <td data-bbox="1193 585 1420 622">Tidak ada</td> <td data-bbox="1420 585 1794 622">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="927 622 1193 935">Nama Obat :</td> <td data-bbox="1193 622 1420 935">Ada</td> <td data-bbox="1420 622 1794 935"> Zithrax 200 Loratadine 4 Zoter 350 Vometa 4 Naprex syr 1 Alcolopus DM syr 1 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="927 935 1193 971">Bentuk sed. :</td> <td data-bbox="1193 935 1420 971">Tidak ada</td> <td data-bbox="1420 935 1794 971"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="927 971 1193 1353">Jumlah obat :</td> <td data-bbox="1193 971 1420 1353">Ada</td> <td data-bbox="1420 971 1794 1353"> Racikan 1 (5) Zithrax 200 Loratadine 4 Razikan 2 (15) Zoter 350 Vometa 4 Naprex syr 1 Alcolopus DM syr 1 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="927 1353 1193 1385">Duplikasi terapi :</td> <td data-bbox="1193 1353 1420 1385">Tidak ada</td> <td data-bbox="1420 1353 1794 1385">-</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	An. zuma	Umur pasien :	Ada	7 th	Berat Badan :	Tidak ada	-	Nama Obat :	Ada	Zithrax 200 Loratadine 4 Zoter 350 Vometa 4 Naprex syr 1 Alcolopus DM syr 1	Bentuk sed. :	Tidak ada		Jumlah obat :	Ada	Racikan 1 (5) Zithrax 200 Loratadine 4 Razikan 2 (15) Zoter 350 Vometa 4 Naprex syr 1 Alcolopus DM syr 1	Duplikasi terapi :	Tidak ada	-
Nama Pasien :	Ada	An. zuma																					
Umur pasien :	Ada	7 th																					
Berat Badan :	Tidak ada	-																					
Nama Obat :	Ada	Zithrax 200 Loratadine 4 Zoter 350 Vometa 4 Naprex syr 1 Alcolopus DM syr 1																					
Bentuk sed. :	Tidak ada																						
Jumlah obat :	Ada	Racikan 1 (5) Zithrax 200 Loratadine 4 Razikan 2 (15) Zoter 350 Vometa 4 Naprex syr 1 Alcolopus DM syr 1																					
Duplikasi terapi :	Tidak ada	-																					

		Aturan pakai :	Ada	1 x sehari 1 bungkus 3 x sehari 1 bungkus 3 x sehari 1 sendok teh 3 x sehari 1 sendok teh
		Tanggal penulisan resep :	Ada	04 Maret 2024
		Nama dokter :	Ada	Dr. Ali Faisal
		Surat ijin :	Ada	SIPD: 446/4268/437.52/2022
		Alamat dr. :	ada	Jl. Panglima Sudirman 22- 24 Gresik
		B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi		
		R/ Zithrax 200 /500 x 5 = 2 Loratadine 4/10 x 5 = 2 R/ Zoter 350/400 x 15 =13,1 Vometa 4/10 x 15 = 6 R/ Naprex syr 1 R/ Alcolopus DM syr 1		
		C. Perhitungan biaya resep		
		Racikan 1 Zithrax 500 x 2 Rp. 89.984 Loratadine 10 x 2 Rp. 894 Kertas puyer berlogo KF x 5 Rp. 310 Embalase Rp. 15.000 Racikan 2 Zoter 400 x 14 Rp. 224.350 Vometa 4/10 x 6 Rp. 36.660 Kertas puyer berlogo KF x 15 Rp. 930 Embalase Rp. 15.000		


Naprex syr 1	Rp. 58.475
Alcolopus DM syr 1	Rp. 69.682
TOTAL TRANSAKSI	Rp. 511.285

D. Etiket

1. Nama Obat /warna etiket : RACIKAN 1 (5 BUNGKUS) / etiket putih

		Antibiotik dihabiskan	
APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597			
No. :		TGL. : 04 MARET 2024	
NAMA PASIEN : An. Zuma (7 th)			
1 X sehari		1 Tablet / Kapsul / Bungkus	
Sebelum / Sesudah / Bersama makan		Pagi Siang Sore Malam	
(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)			
Nama / Jumlah Obat		RACIKAN 1 (5 BUNGKUS)	
Tgl. Kadaluarsa			
(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)			

2. Nama Obat /warna etiket : RACIKAN 2 (15 BUNGKUS) / etiket putih


		Antibiotik dihabiskan	
APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597			
No. :		TGL. : 04 MARET 2024	
NAMA PASIEN : An. Zuma (7 th)			
3 X sehari		1 Tablet / Kapsul / Bungkus	
Sebelum / Sesudah / Bersama makan		Pagi Siang Sore Malam	
(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)			
Nama / Jumlah Obat		RACIKAN 2 (15 BUNGKUS)	
Tgl. Kadaluarsa			
(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)			

		<p>Kegunaan : Antibiotik, radang tenggorokan ESO potensial : mual, muntah, kembung, sakit perut diare, pusing KI : Hipersensitif PERHATIAN : gangguan fungsi hati atau ginjal Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>Kegunaan : untuk menyembukan gejala-gejala yang berhubungan dengan rinitis alergi seperti ; bersin-bersin, pilk dan rasa gatal serta rasa terbakar pada mata ESO potensial : lelah, mual, sakit kepala KI : hipersensitif PERHATIAN : gangguan hati atau ginjal yang parah. Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>
		<p>Nama Obat : Zoter Kandungan : acyclovir Dosis lazim : 200 mg , 5 kali sehari selama 5 hari Kegunaan : Pengobatan infeksi yang disebabkan oleh herpes simplex pada kulit dan membrane mukosa, termasuk herpes genital awal dan kambuhan, pencegahan infeksi herpes simplex pada pasien <i>immune-compromised</i> ESO potensial : gatal-gatal, gangguan gastrointestinal KI : hipersensitif PERHATIAN : - Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>Nama Obat : Vometa Kandungan : domperidone 10 mg Dosis lazim : Dewasa : 10 mg, 1 kali sehari. Maks, 10 mg setiap hari. Durasi perawatan 7 hari. Anak-anak < 12 tahun < 35 kg : 0,25 mg/kh diberikan 3 kali sehari maksimal 0,75 mg sehari. Anak-anak 12 tahun 35 kg sama seperti dosis dewasa Kegunaan : mual dan muntah akut ESO potensial : KI : gangguan hati sedang sampai berat. PERHATIAN : mempunyai riwayat kanker payudara, raktor rasio kematian jantung mendadak Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>
		<p>Nama Obat : Naprex syr 1 Kandungan : paracetamol 250 Dosis lazim :</p>	<p>Nama Obat :Alcolopus DM syr Kandungan : Pseudoepedrin Dosis lazim :</p>

		<p>Anak 6-12 tahun : 3-4 kali 1-2 sendok teh Anak 2-6 tahun : 3-4 kali ½ sendok teh Kegunaan : demam dan meringankan sakit kepala dan sakit gigi ESO potensial : hipersensitif, gangguan fungsi hati, mual, muntah, takardi, lelah, kram otot, insomnia, ansietes. KI : hipersensitif dan gangguan fungsi hati berat PERHATIAN : gangguan ginjal dan hati Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>Dewasa dan anak < 12 tahun : 3 kali 1 sendok teh Anak 6-12 tahun : 3 kali ½ sendok teh Anak 2-6 tahun : 3 kali ¼ sendok teh Kegunaan : meredakan batuk yang disertai bersin-bersin dan hidung tersumbat karena flu ESO potensial : insomnia, sakit kepala, tremor, takikardia, palpitasi KI : hipertensi, stroke, palpitasi, insomnia PERHATIAN : menyebabkan kantuk, gangguan fungsi ginjal/hati, diabetes melitus, hipoksia, kondisi lemah, anak < 2 tahun, hamil dan laktasi. Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>
F. Tahap pembuatan		<p>Racikan 1 dan 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siapkan obat yang akan diracik 2. Obat yang sudah di siapkan dibuka dan obat tersebut dimasukan kedalam belender 3. Kemudian obat di ayak dan dibagi secara kasat mata, dimasukan kedalam kertas puyer 4. Lalu kertas puyer di tutup dan dimasukan ke dalam plastik klip dan di beri obat 	
G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)		<p>Atas nama An. Azuma. Ini dapat 4 obat yang 2 racikan kemudian yang ini sirup, ini untuk yang racikan 1 antibiotik untuk alerginya harus habis diminum 1 kali sehari, ini untuk racikan 2 digunakan untuk mual muntah diminum 3 kali sehari, ini untuk naprex sirup digunakan untuk panas atau demam diminum 3 kali sehari 1 sendok teh, ini untuk Alcoloplus DM syr digunakan untuk batuk 3 kali sehari 1 sendok teh. Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.</p>	

2

Jenis Resep : Resep asli
 Resep obat : non racikan
 Jumlah obat dalam resep : 2
 Pengulangan resep : neiter
 Tempel Resep/salin resep disini!



A. Skrining Administrasi

Nama Pasien :	Ada	Tn. Rofiul Amin
Umur pasien :	Tidak ada	-
Berat Badan :	Tidak ada	-
Nama Obat :	Ada	Simprazole Inpepsa susp
Bentuk sed. :	Ada	Simprazole 20 mg Inpepsa susp 100ml/10
Jumlah obat :	Ada	Inpepsa suspensi 100/10ml
Duplikasi terapi :	Ada	Simprazole 20 mg (10) Inpepsa susp 100ml/10 (1)
Aturan pakai :	Tidak ada	-
Tanggal penulisan resep :	Ada	Simprazole (2 x sehari 1 kapsul, sebelum makan) Inpepsa susp (3 x sehari 1 sendok teh, sebelum makan)
Nama dokter :	Ada	28 Februari 2024
Surat ijin :	Ada	Dr. Trisnaningsih S
Alamat dr. :	Ada	SIP : 446/1866/437.52/2023

B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi


Esoferr 20 mg	(10)
Inpepsa susp 100ml/10	(1)

C. Perhitungan biaya resep


Esoferr 20 mg x 10	Rp. 148.150
Inpepsa susp 100ml/10 x 1	Rp. 99.600
TOTAL TRANSAKSI	RP. 247.750

D. Etiket

1. Nama Obat /warna etiket : Simprazole/ putih

 APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	
No. :	TGL : 28 Februari 2024
NAMA PASIEN : Tn. Rofiul Amin	
..... 2.....X sehari 1.....	Tablet / Kapsul / Bungkus
Sebelum / Sesudah / Bersama makan	
(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)	
Nama / Jumlah Obat	
Tgl. Kadaluarsa	
(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)	

2. Nama obat / warna etiket : innepsa/ putih


 APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	
Tgl. 28 Februari 2024	No. R/
Tn. Rofiul Amin	
.....th	
SEHARI : 3..... X 1.....	SENDOK
Sebelum / Sesudah makan	
KOCOK DULU	
TEH	
BUBUR	
MAKAN	

E. Product Knowledge

Nama Obat : Simprazole 20mg
Kandungan : Esomeprazole

Nama Obat : Inpepsa susp 100ml/10
Kandungan : sucralfate

		<p>Dosis lazim : dewasa : 1 x sehari 1 tab Kegunaan : meringankan saluran cerna atas (GERD, PUD, atau Gastritis) dengan menghambat kinerja pompa proton dalam memproduksi asam yang berlebih ESO potensial : sakit kepala, nyeri perut, konstipasi, diare, kembung, dan bual/muntah KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>Dosis lazim : 4 x sehari 2 sendok teh Kegunaan : sakit maag, tukak usus halus, tukak lambung, gastritis kronis ESO potensial : susah buang air besar, mulut kering KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>															
		<p>F. Tahap pembuatan -</p> <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal) Atas nama Tn. Rofium Amin. Ini ada 2 obat yang ini untuk Simprazole digunakan untuk saluran cerna diminum 2 kali sehari 1 kapsul, sebelum makan, ini untuk innepsa digunakan untuk lambung diminum 3 kali sehari 1 sendok teh, sebelum makan. Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.</p>																
3	<p>Jenis Resep : Resep asli Resep obat : Racikan Jumlah obat dalam resep : 3 Pengulangan resep : neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p>	<p>A. Skrining Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="927 1082 1794 1369"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Tn. Adjie</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada</td> <td>25 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Cefadroxil Paracetamol Ibu profen Metilprednisolon</td> </tr> <tr> <td>kekuatan</td> <td>ada</td> <td>Cefadroxil tab 500 mg</td> </tr> </table>		Nama Pasien :	Ada	Tn. Adjie	Umur pasien :	Ada	25 tahun	Berat Badan :	Tidak ada	-	Nama Obat :	Ada	Cefadroxil Paracetamol Ibu profen Metilprednisolon	kekuatan	ada	Cefadroxil tab 500 mg
Nama Pasien :	Ada	Tn. Adjie																
Umur pasien :	Ada	25 tahun																
Berat Badan :	Tidak ada	-																
Nama Obat :	Ada	Cefadroxil Paracetamol Ibu profen Metilprednisolon																
kekuatan	ada	Cefadroxil tab 500 mg																



		Paracetamol syr 500mg Ibu profen tab 400 mg Metilprednisolon tab 4mg
Bentuk sed. :	ada	Cefadroxil tab Paracetamol syr Ibu profen tab Metilprednisolon tab
Jumlah obat :	Ada	Cefadroxil tab 500 mg (10) Paracetamol syr 500mg (1) Ibu profen tab 400 mg(10) Metilprednisolon tab 4mg (10)
Duplikasi terapi :	Tidak ada	-
Aturan pakai :	Ada	Cefadroxil tab 500 mg (2 kali sehari 1 tab, sesudah makan) Paracetamol syr 500mg (3 kali sehari 2 sendok makan, sesudah makan, bila nyeri) Ibu profen tab 400 mg (3 kali sehari 1 tab, sesudah makan, bila nyeri) Metilprednisolon tab 4mg (3 kali sehari 1 tab, sesudah makan)
Tanggal penulisan resep :	Ada	06 Februari 2024
Nama dokter :	Ada	Drg. Rizki Fanny Aviandono, Sp.KG.
Surat ijin :	Ada	SIP : 446/858/457.52/2019
Alamat dr. :	ada	Jl. kapuas No. 2 Gresik

B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi


Cefat tab 500 mg	(10)
Sanmol Forte 250 mg	(1)
Ibu profen tab 400 mg	(10)
Metilprednisolon tab 4mg	(10)

C. Perhitungan biaya resep

Cefat tab 500 mg	x 10	Rp. 157.290
Sanmol Forte 250 mg	x 1	Rp. 37.962
Ibu profen tab 400 mg	x 10	Rp. 5.400
Metilprednisolon tab 4mg	x 10	Rp. 5.500
TOTAL TRANSAKSI		Rp. 206.162

D. Etiket

1. Nama Obat /warna etiket : cefat / putih

 APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Sirdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597 No. TGL. : 4 Februari 2024 NAMA PASIEN : Tn. Adjie	
..... 2.X sehari 1. Sebelum / Sesudah / Bersama makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak) Malam	Pagi Siang Sore
Nama / Jumlah Obat : cefadroxil 500/ 10 Tgl. Kadaluaarsa : (hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)	

2. Nama Obat /warna etiket : sanmol/ putih

 APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Sirdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597 Tgl. 4 Februari 2024		Bila nyeri No. R/ Tn. Adjie
---	--	-----------------------------------


25 th

SEHARI :3..... X1..... SENDOK
 Sebelum / Sesudah makan


TEH
BUBUR
MAKAN

KOCOK DULU

3. Nama Obat /warna etiket : ibu profen / putih


		Bila nyeri
APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597		
No. : TGL. : 04 MARET 2024 NAMA PASIEN :Tn. Adjie (25 th)		
3 X sehari 1 Tablet / Kapsul / Bungkus Sebelum / Sesudah / Bersama makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)		<u>Pagi</u> <u>Siang</u> <u>Sore</u> <u>Malam</u>
Nama / Jumlah Obat Tgl. Kadaluausa (hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)		RACIKAN 2 (15 BUNGKUS)

4. Nama Obat /warna etiket : metilprednisolon / putih

		
APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597		
No. : TGL. : 04 MARET 2024 NAMA PASIEN :Tn. Adjie (25 th)		
3 X sehari 1 Tablet / Kapsul / Bungkus Sebelum / Sesudah / Bersama makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)		<u>Pagi</u> <u>Siang</u> <u>Sore</u> <u>Malam</u>
Nama / Jumlah Obat Tgl. Kadaluausa (hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)		RACIKAN 2 (15 BUNGKUS)

		<p>E. Product Knowledge</p> <p>Nama Obat : cefat Kandungan : cefadroxil 500mg Dosis lazim : dewasa atau anak-anak >40 kg : 1.000 mg sehari atau 500mg 2 kali sehari. Kegunaan : antibiotik, saluran pernafasan, saluran kemih, dan kelamin serta infeksi kulit dan jaringan lunak ESO potensial : hipersensitif, diare, mual, muntah, sakit perut KI : hipersensitif PERHATIAN : hipersensitif, alergi berat atau asma, gangguan ginjal, wanita hamil Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p> <p>Nama Obat : ibuprofen Kandungan : ibuprofen 400 Dosis lazim : Dewasa : 200-250 mg 3-4 kali sehari. Osteoarthritis, artritis reumatoid : 1200-1800 mg 3 kali sehari Anak-anak 1-2 tahun : 50 mg 3-4 kali sehari, Anak-anak 3-7 tahun 100-125 mg 3-4 kali sehari Anak-anak 8-12 tahun : 200-250 mg 3-4 kali sehari Kegunaan : nyeri pada gigi atau pencabutan gigi, sakit kepala</p>	<p>Nama Obat : sanmol forte Kandungan : paracetamol 250 Dosis lazim : Dewasa dan anak 12 tahun 3-4 kali sehari 2 sendok takar Anak 6-12 tahun : 3-4 kali 1-2 sendok teh Kegunaan : demam dan meringankan sakit kepala dan sakit gigi ESO potensial : hipersensitif, gangguan fungsi hati, mual, muntah, takardi, lelah, kram otot, insomnia, ansietes. KI : hipersensitif dan gangguan fungsi hati berat PERHATIAN : gangguan ginjal dan hati Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p> <p>Nama Obat : methyl prednisolon Kandungan : methylprednisolon 4 mg Dosis lazim : 4/80 mg/hari Kegunaan : alergi atau mengurangi peradangan ESO potensial : insomnia, tukak lambung, hipertensi KI : infeksi jamur sistemik PERHATIAN : TBC, ulkus peptikum, infeksi jamur sistemik, herpes simpleks. Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>
--	--	---	--

		<p>ESO potensial : pusing, sakit kepala, dispepsia, diare, mual, muntah KI : penderita dengan ulkus peptikum (tukak lambung dan duodenum), hipersensitif PERHATIAN : lansia, kehamilan, persalinan, menyusui Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>												
		<p>F. Tahap pembuatan</p> <p>-</p> <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Atas nama Tn. Adjie. Untuk obatnya ada 4, ini cefat digunakan untuk antibiotik, diminum 2 kali 1 tab, sesudah makan, ini untuk paracetamol diminum bila nyeri, diminum 3 kali 2 sendok teh setelah makan, ini untuk ibuprofen diminum bila nyeri, diminum 3 kali 1 tab setelah makan, ini untuk methyl prednisolon digunakan untuk peradangannya, diminum 3 kali 1 tab sesudah makan. Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.</p>												
4	<p>Jenis Resep : Resep asli Resep obat : Racikan Jumlah obat dalam resep : 3 Pengulangan resep : neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p>	<p>A. Skrining Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>An. Medina safwa</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ simfix 25 mg Tremenza 1/5 tab Ambroxol ¼ tab</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	An. Medina safwa	Umur pasien :	Tidak ada	-	Berat Badan :	Tidak ada	-	Nama Obat :	Ada	R/ simfix 25 mg Tremenza 1/5 tab Ambroxol ¼ tab
Nama Pasien :	Ada	An. Medina safwa												
Umur pasien :	Tidak ada	-												
Berat Badan :	Tidak ada	-												
Nama Obat :	Ada	R/ simfix 25 mg Tremenza 1/5 tab Ambroxol ¼ tab												



		L bio sach Tempra drop
Bentuk sed. :	ada	R/ simfix 25 mg Tremenza 1/5 tab Ambroxol 1/4 tab Dibuat puyer
Jumlah obat :	Ada	L bio sach Tempra drop R/ simfix 25 mg (3) Tremenza 1/5 tab (2) Ambroxol 1/4 tab (3) 10 puyer L bio sach (6) Tempra drop (1)
Duplikasi terapi :	Tidak ada	-
Aturan pakai :	Ada	Racikan 1 (2 kali 1 bungkus, sesudah makan) L-Bio sach (2 kali 1 sachet) Tempra drop (4 kali 1 ml, bila panas, sesudah makan)
Tanggal penulisan resep :	Ada	28 Februari 2014
Nama dokter :	Ada	Dr. Tresnaningsih S
Surat ijin :	Ada	SIP. 446/1866/437.52/2023
Alamat dr. :	Tidak ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi


<p>Racikan 1 Simfix : $25/100 \times 10 = 2,5$ Tremenza : $1/5 \times 10 = 2$ Eplexol : $1/4 \times 10 = 2,5$</p>

C. Perhitungan biaya resep

R/ simfix 100 mg	x3	Rp. 86.580
Tremenza	x2	Rp. 4.618
Epexol 30mg	x 3	Rp. 3.897
L bio sach	x6	Rp. 69.972
Temptra drop	x1	Rp. 59.600
TOTAL TRANSAKSI		Rp. 224.667

D. Etiket


1. Nama Obat /warna etiket : racikan 1/ putih

	
APOTEK KIMIA FARMA	
Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK	
APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm	
SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	
Anda :	TGL. : 28 Februari 2024
NAMA PASIEN : An. Madina	
..... 2X sehari	1..... Tablet / Kapsul / Bungkus
Sebelum / Sesudah / Bersama makan	
<small>(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)</small>	
Pagi	
Siang	
Sore	
Malam	
Nama / Jumlah Obat	L-BIO SACH / 6
Tgl. Kadaluarsa	
<small>(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)</small>	

2. Nama Obat /warna etiket : L-bio/ putih

 APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	
Anda. : TGL. : 28 Februari 2024	
NAMA PASIEN : An. Madina	
..... 2X sehari 1	Pagi Siang Sore Malam
Tablet / Kapsul / Bungkus Sebelum / Sesudah / Bersama makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)	
Nama / Jumlah Obat : L-BIO SACH / 6 Tgl. Kadaluarsa : (hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)	

3. Nama Obat /warna etiket : Tempra Drop/ putih

 APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597		BILA PANAS
Tgl. 28 Februari 2024		Anda. R/ An. Medinath
SEHARI : 4 X 1 ml..... Sebelum / Sesudah makan		TEH BUBUR MAKAN
KOCOK DULU		


E. Product Knowledge

Nama Obat : simfix 100
 Kandungan : Cefixime 100
 Dosis lazim :

Nama Obat : tremenza
 Kandungan :Pseudoepedrine
 Dosis lazim :

		<p>Anak-anak 50-100 mg perhari Dewasa : 100-400 mg perhari Kegunaan : saluran kemih, bakteri pada saluran kemih telinga, saluran pernafasan, demam tifoid pada anak ESO potensial :ganguan saluran cerna, gangguan saluran nafas, syok KI : PERHATIAN : jangan diberikan kepada pasien yang asih diobati dengan antibiotik lain Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>Dewasa dan anak > 12 tahun : 1 tab 3-4 kali sehari Anak-anak <12 tahun : ½ tab 3-4 kali sehari Kegunaan : gejala flu ESO potensial :tenggorokan kering, mengantuk, pusing, insomnia KI :penyakit saluran pernafasan bawah, termasuk asma, hipertensi, glukoma, diabetes PERHATIAN : ibu hamil dan menyusui Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>
		<p>Nama Obat : epexol 30 Kandungan : Ambroxol 30 Dosis lazim : 30 mg, 2-3 kali sehari Kegunaan : saluran pernafasan akut dan kronis ESO potensial : mual, muntah, diare, sakit perut KI : hipersensitif PERHATIAN : tukak lambung atau dodenum, gangguan ginjal dan hati, anak-anak Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>Nama Obat : L-Bio Kandungan : probiotik lactobacillus acidopilus Dosis lazim : Anak > 2 tahun : 2-4 sachet/ hari Anak <2 tahun 1-2 sachet / hari Kegunaan : pencernaan ESO potensial : - KI : - PERHATIAN : langsung dikonsumsi setelah dibuka Cara penyimpanan : Simpan dibawah 25 drajat ce</p>
		<p>Nama Obat : tempra drop Kandungan :paracetamol Dosis lazim : usia 3-9 bulan :0,8ml usia 10-24 bulan 1,2 ml Kegunaan : sakit kepala dan sakit gigi</p>	

		<p>ESO potensial : hipersensitif, gangguan fungsi hati, mual, muntah, takardi, lelah, kram otot, insomnia, ansietes. KI : hipersensitif dan gangguan fungsi hati berat PERHATIAN : gangguan ginjal dan hati Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>																						
		<p>F. Tahap pembuatan</p> <p>Racikan 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siapkan obat yang akan diracik 2. Obat yang sudah di siapkan dibuka dan obat tersebut dimasukan kedalam belender 3. Kemudian obat diayak dan dibagi secara kasat mata, dimasukan kedalam kertas puyer 4. Lalu kertas puyer di tutup dan dimasukan ke dalam plastik klip dan di beri obat <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Atas nama An.medina. ini obat nya ada 3, ini ada 1 racikan untuk batuk pilek, diminum 2 kali sehari 1 bungkus setelah makan, ini L-Bio sach untuk pencernaan 2 kali sehari 1 bungkus setelah makan, kemudian ini tempura drop digunakan untuk panas atau demam, 4 kali sehari 1 ml sesudah makan. Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.</p>																						
5	<p>Jenis Resep : Resep asli Resep obat : non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/ tidak Pengulangan resep : neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p>	<p>A. Skrining Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="927 1123 1794 1374"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Ny. Siti</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada</td> <td>41 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Inj novorapid</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>Inj novorapid (1)</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Ny. Siti	Umur pasien :	Ada	41 tahun	Berat Badan :	Tidak ada	-	Nama Obat :	Ada	Inj novorapid	Bentuk sed. :	Tidak ada	-	Jumlah obat :	Ada	Inj novorapid (1)	Duplikasi terapi :	Tidak ada	-	
Nama Pasien :	Ada	Ny. Siti																						
Umur pasien :	Ada	41 tahun																						
Berat Badan :	Tidak ada	-																						
Nama Obat :	Ada	Inj novorapid																						
Bentuk sed. :	Tidak ada	-																						
Jumlah obat :	Ada	Inj novorapid (1)																						
Duplikasi terapi :	Tidak ada	-																						



Aturan pakai :	Ada	Inj novorapid (3 kali 10 iu)
Tanggal penulisan resep :	Ada	22 Februari 2024
Nama dokter :	Ada	-
Surat ijin :	Ada	-
Alamat dr. :	Tidak aa	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi

Inj novorapid (1)

C. Perhitungan biaya resep

Inj novorapid	x 1	Rp. 208.228
TOTAL TRANSAKSI		Rp. 208.228

D. Etiket

1. Nama Obat /warna etiket :

kimia farma
APOTEK KIMIA FARMA
 Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
 APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm
 SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

22 Februari 2024


Ny. Siti
3 kali 1 sehari 10 unit

OBAT LUAR

E. Product Knowledge

Nama Obat : Inj novorapid Kandungan : insulin aspart Dosis lazim : 0,5-1 iu/kg perhari Kegunaan :diabetes melitus
--

		<p>ESO potensial : hipoglikemia, reaksi anafilasis KI : hipoglikemia, hipersensitif PERHATIAN : priksa label untuk memastikan insulin yang tepat Cara penyimpanan : simpan obat di dalam kulkas di suhu 2-8 derajat Celcius</p>																						
6	<p>Jenis Resep : Salinan Resep obat : non racikan Jumlah obat dalam resep : 4 Pengulangan resep : neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p>	<p>A. Skrining Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Tn. Romadhon</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Soliqua 100 iu/33mcg Apidra solostar Jarum nova twist Alkohol swab Forxiga</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Tidak ada</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>Soliqua 100 iu/33mcg (2) Apidra solostar (5) Jarum nova twist (120) Alkohol swab (120) Forxiga (30)</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Tn. Romadhon	Umur pasien :	Tidak ada	-	Berat Badan :	Tidak ada	-	Nama Obat :	Ada	Soliqua 100 iu/33mcg Apidra solostar Jarum nova twist Alkohol swab Forxiga	Bentuk sed. :	Tidak ada	=	Jumlah obat :	Ada	Soliqua 100 iu/33mcg (2) Apidra solostar (5) Jarum nova twist (120) Alkohol swab (120) Forxiga (30)	Duplikasi terapi :	Tidak ada	-	
Nama Pasien :	Ada	Tn. Romadhon																						
Umur pasien :	Tidak ada	-																						
Berat Badan :	Tidak ada	-																						
Nama Obat :	Ada	Soliqua 100 iu/33mcg Apidra solostar Jarum nova twist Alkohol swab Forxiga																						
Bentuk sed. :	Tidak ada	=																						
Jumlah obat :	Ada	Soliqua 100 iu/33mcg (2) Apidra solostar (5) Jarum nova twist (120) Alkohol swab (120) Forxiga (30)																						
Duplikasi terapi :	Tidak ada	-																						



Aturan pakai :	Ada	Soliqua 100 iu/33mcg (malam 17 unit) Apidra solostar (pagi, siang, malam 15 unit, sebelum makan) Jarum nova twist (berikan ke dokter atau serahkan ke dokter) Alkohol swab (berikan ke dokter atau serahkan ke dokter) Forxiga (1 kali sehari, setelah makan)
Tanggal penulisan resep :	Ada	28 Februari 2024
Nama dokter :	Ada	Dr.Abdul Fatah
Surat ijin :	Tidak ada	-
Alamat dr. :	Tidak ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi

Soliqua 100 iu/33mcg	(1)
Apidra solostar	(3)
Jarum Nova Twist	(60)
Alkohol Swab	(100)
Forxiga	(14)

C. Perhitungan biaya resep

Soliqua 100 iu/33mcg	x1	Rp. 607.900
Apidra solostar	X 3	Rp. 1.215.000
Jarum Nova Twist	X60	Rp. 60.000
Alkohol Swab	X 100	Rp. 40.000
Forxiga	X14	Rp. 422.800

TOTAL TRANSAKSI

Rp. 2.345.700

D. Etiket

1. Nama Obat /warna etiket : Soliqua 100 iu/33mcg / biru



kimia farma
APOTEK KIMIA FARMA
Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm
SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597
22 Februari 2024

Tn. Romadhon
Saat malam 17 unit

OBAT LUAR


2. Nama Obat /warna etiket : Apidra solostar / biru

kimia farma
APOTEK KIMIA FARMA
Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm
SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597
22 Februari 2024

Tn. Romadhon
3 (pagi, siang, malam) kali 1 sehari 15 unit
Sebelum makan

OBAT LUAR

3. Nama Obat /warna etiket : jarum/ biru


APOTEK KIMIA FARMA
Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm
SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597
22 Februari 2024

Tn. Romadhon
Diserahkan ke dokter

OBAT LUAR

4. Nama Obat /warna etiket : alkohol swab/ biru


APOTEK KIMIA FARMA
Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm
SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597
22 Februari 2024

Tn. Romadhon
Diserahkan ke dokter

OBAT LUAR

5. Nama Obat /warna etiket : forxiga/ putih


APOTEK KIMIA FARMA
Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm
SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

Anda : TGL. : 28 Februari 2024

NAMA PASIEN : Tn. Romadhon

..... 1X sehari 1 Tablet / Kapsul / Bungkus
Sebelum / Sesudah / Bersama makan
(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)

[Pagi](#)
[Siang](#)
[Sore](#)
[Malam](#)

Nama / Jumlah Obat	FORXIGA/ 14
Tgl. Kadaluaarsa	
(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)	

E. Product Knowledge


Nama Obat : Soliqua 100 iu/33mcg
 Kandungan : insuline glargine 100u/ml, lixisentide 50mcg/ml
 Dosis lazim :60/20 unit/mcg
 Kegunaan : memperbaiki kontrol gula darah pada pasien diabetes melitus tipe 2
 ESO potensial : hipoglikemia, hipersensitif
 KI : hipersensitif
 PERHATIAN : tidak digunakan untuk diabetes melitus tipe 1
 Cara penyimpanan : simpan obat di dalam kulkas di suhu 2-8 derajat Celcius

Nama Obat : Apidra solostar
 Kandungan :insuline gluisine 100 IU
 Dosis lazim : 0,5-1 IU/Kg/hari
 Kegunaan :mengontrol gula darah tinggi pada orang diabetes melitus
 ESO potensial : hipoglikemia
 KI : hipersensitif
 PERHATIAN : jangan berbagi pen antara pasien, hipeplikemia
 Cara penyimpanan : simpan obat di dalam kulkas di suhu 2-8 derajat Celcius

Nama Obat : forxiga
 Kandungan : Dapaglifozin 10mg
 Dosis lazim : 10/1 mg/hari
 Kegunaan : memperbaiki kontrol gula darah pada pasien diabetes melitus tipe 2
 ESO potensial : hipoglikemia, pusing, nyeri pungung
 KI : hipersensitif
 PERHATIAN : tidak digunakan untuk diabetes melitus tipe 1
 Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung

F. Tahap pembuatan

		-																								
		<p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Atas nama Tn. Romadhon. Ini ada 5 macam, ini soliqua untuk diabetes melitus disuntikan saat malam hari 17 unit, ini Apidra untuk diabetes melitus disuntikan saat pagi, siang, malam hari 15 unit sebelum makan, ini jarum nuvo sama alkohol swab nya diberikan ke dokter, ini forziga diabetes melitus diminum 1 kali sehari sesudah makan. Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.</p>																								
7	<p>Jenis Resep : Salinan/ Resep asli Resep obat : Racikan/ non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/ tidak Pengulangan resep : iter..... kali / neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p>	<p>A. Skrining Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>An.Ayra</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ CTM 1/6 tab Dexamethasone 0,5 mg 1/6 tab</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada</td> <td>R/ bedak salicyl R/ CTM 1/6 tab Dexamethasone 0,5 mg 1/6 tab</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ bedak salicyl R/ CTM 1/6 tab (2) Dexamethasone 0,5 mg 1/6 tab (2) (12 puyer) R/ bedak salicyl (1)</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>R/ CTM 1/6 tab (2) Dexamethasone 0,5 mg 1/6 tab (2)</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	An.Ayra	Umur pasien :	Tidak ada	-	Berat Badan :	Tidak ada	-	Nama Obat :	Ada	R/ CTM 1/6 tab Dexamethasone 0,5 mg 1/6 tab	Bentuk sed. :	Ada	R/ bedak salicyl R/ CTM 1/6 tab Dexamethasone 0,5 mg 1/6 tab	Jumlah obat :	Ada	R/ bedak salicyl R/ CTM 1/6 tab (2) Dexamethasone 0,5 mg 1/6 tab (2) (12 puyer) R/ bedak salicyl (1)	Duplikasi terapi :	Tidak ada	-	Aturan pakai :	Ada	R/ CTM 1/6 tab (2) Dexamethasone 0,5 mg 1/6 tab (2)
Nama Pasien :	Ada	An.Ayra																								
Umur pasien :	Tidak ada	-																								
Berat Badan :	Tidak ada	-																								
Nama Obat :	Ada	R/ CTM 1/6 tab Dexamethasone 0,5 mg 1/6 tab																								
Bentuk sed. :	Ada	R/ bedak salicyl R/ CTM 1/6 tab Dexamethasone 0,5 mg 1/6 tab																								
Jumlah obat :	Ada	R/ bedak salicyl R/ CTM 1/6 tab (2) Dexamethasone 0,5 mg 1/6 tab (2) (12 puyer) R/ bedak salicyl (1)																								
Duplikasi terapi :	Tidak ada	-																								
Aturan pakai :	Ada	R/ CTM 1/6 tab (2) Dexamethasone 0,5 mg 1/6 tab (2)																								



		(12 puyer)/ (3 kali sehari 1 bungkus, bila gatal)
		R/ bedak salicyl (1)
Tanggal penulisan resep :	Ada	21 Februari 2024
Nama dokter :	Ada	Dr. Tresnaningsih S
Surat ijin :	Ada	SIP. 446/1866/437.52/2023
Alamat dr. :	Tidak ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi


Racikan 1
CTM $1/6 \times 12 = 2$
Dexamethasone $0,5 \text{ mg } 1/6 \times 12 = 2$

C. Perhitungan biaya resep


Paperbag	x1	Rp. 5.000
Racikan 1		
CTM	x2	Rp. 406
Alegi	x2	Rp. 5.052
Kertas puyer	x12	Rp. 809
Embalase		Rp. 15.000
Bedak salicyl	x 1	Rp. 6.777
TOTAL TRANSAKSI		Rp. 33.044

D. Etiket

1. Nama Obat /warna etiket : Racikan 1 / putih

		BILA GATAL	
APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597			
No. : TGL. : 21 Februari 2024			
NAMA PASIEN : An. Ayura			
..... 3X sehari 1.....		Tablet / Kapsul / Bungkus	Pagi
Sebelum / Sesudah / Bersama makan			Siang
(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)			Sore
Malam			
Nama / Jumlah Obat	Racikan 1 (12 bungkus)		
Tgl. Kadaluarsa			
(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)			


2. Nama Obat/ warna etiket : Bedak Salicyl/ biru

	
APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	
21 Februari 2024	
An.Ayura Taburkan setelah mandi pada bagian yang gatal	
OBAT LUAR	

E. Product Knowledge

Nama Obat : CTM Kandungan : Chlorpheniramine maleate Dosis lazim : Dewasa : 3 kali sehari 1 tab Anak-anak : 3 kali ½ tab	Nama Obat : Alegi Kandungan : Dexametasone 0,5 Dosis lazim : Dewasa : 3-4 kali sehari 1 tab Anak-anak 6-12 : 3-4 kali sehari ½ tab Anak-anak 2-6 : 3-4 kali sehari ¼ tab
--	---


		<p>Kegunaan : alergi seperti urtikaria, dermatitis, dan rinitis ESO potensial : mengantuk, gangguan saluran cerna, efek antimuskarinik, kelemahan otot, nyeri kepala KI : anak < 2 tahun, penderita serangan asma akut PERHATIAN : tidak boleh mengendarai kendaraan karena menyebabkan kantuk Cara penyimpanan : : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>Kegunaan : ESO potensial : mulut ering,, retensi cairan dan elektrolit KI :tukak peptik, hipersensitif PERHATIAN : hipertensi, DM, gagal ginjal kronik, penyakit infeksi Cara penyimpanan : : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>
		<p>Nama Obat : Bedak salicyl Kandungan : Ac. Salycicum 2% Dosis lazim : taburkan bagian yang gatal Kegunaan : mengurangi gangguan kulit, seperti gatal-gatal, biang kringat ESO potensial :hipersensitif KI :- PERHATIAN : tidak digunakan untuk anak < 3 tahun Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	
		<p>F. Tahap pembuatan</p> <div data-bbox="927 1102 2033 1283" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Racikan 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siapkan obat yang akan diracik 2. Obat yang sudah di siapkan dibuka dan obat tersebut dimasukan kedalam belender 3. Kemudian obat diayak dan dibagi secara kasat mata, dimasukan kedalam kertas puyer <p>Lalu kertas puyer di tutup dan dimasukan ke dalam plastik klip dan di beri obat</p> </div> <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p>	

		<p>Atas nama An. Ayra. Ini ada 2 macam obat, ini ada 1 racikan untuk gatal- gatal, 3 kali sehari setelah makan, kemudian ini bedak salicyl digunakan untuk yang kulit yang gatal setelah mandi. Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.</p>																																														
<p>8</p>	<p>Jenis Resep : Resep asli Resep obat : non racikan Jumlah obat dalam resep : 2 Pengulangan resep : neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrining Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="927 376 1794 1051"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Ny. pipit</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Otilon 8 ml Cataflam 50 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>Otilon 8 ml (1) Cataflam 50 mg (10)</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>Otilon 8 ml () Cataflam 50 mg</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada</td> <td>22 Februari 2024</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada</td> <td>Dr. Muhammad Alim</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada</td> <td>SIP : 503.446?2273/SIP.OU/7/2/2017</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi</p> <table border="1" data-bbox="927 1123 2033 1198"> <tr> <td>Otilon 8 ml</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td>Cataflam 50 mg</td> <td>(10)</td> </tr> </table> <p>C. Perhitungan biaya resep</p> <table border="1" data-bbox="927 1270 2033 1345"> <tr> <td>Otilon 8 ml</td> <td>x 1</td> <td>Rp. 61.400</td> </tr> <tr> <td>Cataflam 50 mg</td> <td>x 10</td> <td>Rp. 86.460</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Ny. pipit	Umur pasien :	Tidak ada	-	Berat Badan :	Tidak ada	-	Nama Obat :	Ada	Otilon 8 ml Cataflam 50 mg	Bentuk sed. :	Tidak ada	-	Jumlah obat :	Ada	Otilon 8 ml (1) Cataflam 50 mg (10)	Duplikasi terapi :	Tidak ada	-	Aturan pakai :	Ada	Otilon 8 ml () Cataflam 50 mg	Tanggal penulisan resep :	Ada	22 Februari 2024	Nama dokter :	Ada	Dr. Muhammad Alim	Surat ijin :	Ada	SIP : 503.446?2273/SIP.OU/7/2/2017	Alamat dr. :	Tidak ada	-	Otilon 8 ml	(1)	Cataflam 50 mg	(10)	Otilon 8 ml	x 1	Rp. 61.400	Cataflam 50 mg	x 10	Rp. 86.460
Nama Pasien :	Ada	Ny. pipit																																														
Umur pasien :	Tidak ada	-																																														
Berat Badan :	Tidak ada	-																																														
Nama Obat :	Ada	Otilon 8 ml Cataflam 50 mg																																														
Bentuk sed. :	Tidak ada	-																																														
Jumlah obat :	Ada	Otilon 8 ml (1) Cataflam 50 mg (10)																																														
Duplikasi terapi :	Tidak ada	-																																														
Aturan pakai :	Ada	Otilon 8 ml () Cataflam 50 mg																																														
Tanggal penulisan resep :	Ada	22 Februari 2024																																														
Nama dokter :	Ada	Dr. Muhammad Alim																																														
Surat ijin :	Ada	SIP : 503.446?2273/SIP.OU/7/2/2017																																														
Alamat dr. :	Tidak ada	-																																														
Otilon 8 ml	(1)																																															
Cataflam 50 mg	(10)																																															
Otilon 8 ml	x 1	Rp. 61.400																																														
Cataflam 50 mg	x 10	Rp. 86.460																																														

TOTAL TRANSAKSI Rp. 147.860

D. Etiket

1. Nama Obat /warna etiket : Otilon / biru



kimia farma
APOTEK KIMIA FARMA
Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm
SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597
22 Februari 2024

Ny.pipt
Teteskan ketelinga kanan dan kiri

OBAT LUAR

2. Nama Obat /warna etiket : Cataflam / putih

kimia farma
APOTEK KIMIA FARMA
Jl. Kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm
SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597
No. : TGL : 22 Februari 2024
NAMA PASIEN : Ny.Pipit

..... 3.....X sehari..... 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus
Sebelum / Sesudah / Bersama makan
(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)

[Pagi](#)
[Siang](#)
[Sore](#)
[Malam](#)


Nama / Jumlah Obat Cataflam 50 /10
Tgl. Kadaluarsa
(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)

E. Product Knowledge

Nama Obat : Otilon 8 ml
Kandungan : polymyxin B Sulfate,
Neomycin Sulfat, Fludrocortisone acetat,
Lidocaine HCl

Nama Obat : Cataflam 50 mg
Kandungan : kalium diklofenak 50
Dosis lazim : 3 kali sehari 1 tab

		<p>Dosis lazim :2-4 kali sehari 4-5 tetes Kegunaan : mengobati infeksi, gatal, dan peradangan pada penderita otitis externa akut dan kronis ESO potensial : sensitasi pada kulit, ototoksisitas, hiperpigmetasi, dermatis oral, dermatis kontak alergi KI :hipersensitivitas, gangguan liang telinga external, infeksi virus pada telinga PERHATIAN : sensitasi atau iritasi pada kulit Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>Kegunaan : mengurangi rasa sakit dan pembekakann(inflamasi), OA (osteoarthritis) dan spondilitis ankilosa ESO potensial : sakit kepala pusing, vertigo, mual, muntah, riare, sakit perut, ruam KI : hipersensitivitas, pasien yang pernah mengalami asma PERHATIAN :penyakit hipertensi, rentasi cairan atau gagal jantung dapat mengganggu saat mengemudi kendaraan Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>															
		<p>F. Tahap pembuatan -</p> <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal) Atas nama Ny. pipit. Ini ada 2 macam obat. Ini otilon digunakan untuk 2 kali sehari 5 tetes telinga kanan dan kiri , ini cataflam 3 kali sehari setelah makan. Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.</p>																
9	<p>Jenis Resep : Resep asli Resep obat : non racikan Jumlah obat dalam resep : 3 Pengulangan resep : neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p>	<p>A. Skrining Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="927 1082 1794 1396"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Tn. Ali</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ alpara R/ Ambroxol R/ methyl prednisolon 4</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada</td> <td>R/ alpara tab R/ Ambroxol tab R/ methyl prednisolon 4</td> </tr> </table>		Nama Pasien :	Ada	Tn. Ali	Umur pasien :	Tidak ada	-	Berat Badan :	Tidak ada	-	Nama Obat :	Ada	R/ alpara R/ Ambroxol R/ methyl prednisolon 4	Bentuk sed. :	Ada	R/ alpara tab R/ Ambroxol tab R/ methyl prednisolon 4
Nama Pasien :	Ada	Tn. Ali																
Umur pasien :	Tidak ada	-																
Berat Badan :	Tidak ada	-																
Nama Obat :	Ada	R/ alpara R/ Ambroxol R/ methyl prednisolon 4																
Bentuk sed. :	Ada	R/ alpara tab R/ Ambroxol tab R/ methyl prednisolon 4																



Jumlah obat :	Ada	R/ alpara tab (9) R/ Ambroxol tab (6) R/ methyl prednisolon 4 (9)
Duplikasi terapi :	Tidak ada	-
Aturan pakai :	Ada	R/ alpara tab (3 kali sehari 1 tab, setelah makan) R/ Ambroxol tab (2 kali sehari 1 tab, setelah makan) R/ methyl prednisolon 4 (3 kali sehari 1 tab, setelah makan)
Tanggal penulisan resep :	Ada	19 Februari 2024
Nama dokter :	Ada	Dr. Tresnaningsih S
Surat ijin :	Ada	SIP. 446/1866/437.52/2023
Alamat dr. :	Tidak ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi


R/ alpara	(10)
R/ Epexol 30mg	(6)
R/ methyl prednisolon 4 mg	(10)

C. Perhitungan biaya resep


R/ alpara	x 10	Rp. 10.900
R/ Epexol 30mg	x 6	Rp. 6.500
R/ methyl prednisolon 4 mg	x 10	Rp. 5.500
TOTAL TRANSAKSI		Rp. 22.900

D. Etiket


1. Nama Obat /warna etiket : Alpara / putih

 APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	
No. :	TGL. : 19 Februari 2024
NAMA PASIEN : Tn. Ali Syahid	
..... 3.....X sehari 1.....	Tablet / Kapsul / Bungkus
Sebelum / Sesudah / Bersama makan	Pagi Siang Sore Malam
(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)	
Nama / Jumlah Obat	Alpara / 10 (BAPILNAS)
Tgl. Kadaluarsa	
(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)	


2. Nama Obat /warna etiket : Epexol / putih

 APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	
No. :	TGL. : 19 Februari 2024
NAMA PASIEN : Tn. Ali Syahid	
..... 2.....X sehari 1.....	Tablet / Kapsul / Bungkus
Sebelum / Sesudah / Bersama makan	Pagi Siang Sore Malam
(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)	
Nama / Jumlah Obat	Epexol / 6 (BatuK berdahak)
Tgl. Kadaluarsa	
(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)	

3. Nama Obat /warna etiket : Metil Prednisolon/ putih

		 <p>APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597</p> <p>No. : TGL : 19 Februari 2024</p> <p>NAMA PASIEN : Tn. Ali Syahid</p> <p>..... 3.....X sehari..... 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus Sebelum / Sesudah / Bersama makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)</p> <p>Nama / Jumlah Obat metil prednisolon / 10 Tgl. Kadaluarsa</p> <p>(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)</p>	
		<p>E. Product Knowledge</p> <p>Nama Obat : Alpara Kandungan : paracetamol 500mg, phenypropanolamine HCl 12,5mg, chloropinamine meleate 2mg, dextromethorphan HBr 15mg Dosis lazim : 3 kali sehari 1 tab Kegunaan : meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat dan bersin-bersin yang disertai batuk ESO potensial : mengantuk, gangguan pencernaan, gangguan psikomotorik, takikardia. KI : gangguan jantung dan diabetes PERHATIAN : tidak boleh saat mengendarai kendaraan, gangguan fungsi hati dan ginjal</p>	<p>Nama Obat : epexol 30 Kandungan : Ambroxol 30 Dosis lazim : 30 mg, 2-3 kali sehari Kegunaan : saluran pernafasan akut dan kronis ESO potensial : mual, muntah, diare, sakit perut KI : hipersensitif PERHATIAN : tukak lambung atau dodenum, gangguan ginjal dan hati, anak- anak Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>

		<p>Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p> <p>Nama Obat : metil prednisolon Kandungan : metil prednisolon 4 mg Dosis lazim : 4-8 mg/hari Kegunaan : alergi dan mengurangi peradangan atau supresi inflamasi ESO potensial : gangguan kejiwaan, insomnia, penekanan ardenal, reaksi anafilaksis KI : infeksi jamur sistemik PERHATIAN :- Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>													
		<p>F. Tahap pembuatan</p> <p>-</p>													
		<p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Atas nama Tn. Ali syahid. Pak ini obatnya ada 3 macam, ini alpara digunakan untuk bapilnas, 3 kali sehari 1 tab setelah makan, ini Ambroxol digunakan untuk batuk berdahak, diminum 2 kali sehari sesudah makan, dan yang ini metilprednisolon digunakan untuk mengurangi peradangan, diminum 3 kali sehari setelah makan. Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.</p>													
10	<p>Jenis Resep : Resep asli Resep obat : non racikan Jumlah obat dalam resep : 2 Pengulangan resep : neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p>	<p>A. Skrining Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Ny. Muzayanah</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada</td> <td>65 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Fonilyn MR R/ Amplodipin 5 mg</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Ny. Muzayanah	Umur pasien :	Ada	65 tahun	Berat Badan :	Tidak ada	-	Nama Obat :	Ada	R/ Fonilyn MR R/ Amplodipin 5 mg	
Nama Pasien :	Ada	Ny. Muzayanah													
Umur pasien :	Ada	65 tahun													
Berat Badan :	Tidak ada	-													
Nama Obat :	Ada	R/ Fonilyn MR R/ Amplodipin 5 mg													



Bentuk sed. :	Tidak ada	-
Jumlah obat :	Ada	R/ Fonilyn MR (30) R/ Amplodipin (30)
Duplikasi terapi :	Tidak ada	-
Aturan pakai :	Ada	R/ Fonilyn MR (1 kali sehari, sebelum makan) R/ Amplodipin 5mg (malam sekali sehari sesudah makan)
Tanggal penulisan resep :	Ada	12 februari 2024
Nama dokter :	Ada	-
Surat ijin :	Ada	-
Alamat dr. :	Tidak ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi


R/ Fonilyn MR	(30)
R/ Amplodipin 5 mg	(30)

C. Perhitungan biaya resep


R/ Fonilyn MR	x 30	Rp. 199.500
R/ Amplodipin 5 mg	x 30	Rp. 6.600
TOTAL TRNASAKSI		Rp. 206.100

D. Etiket


1. Nama Obat /warna etiket : Folilyn MR/ putih

 APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	
No. : TGL : 14 Februari 2024 NAMA PASIEN : Ny. Muzayanah	
..... 1.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus Sebelum / Sesudah / Bersama makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)	Pagi Siang Sore Malam
Nama / Jumlah Obat Tgl. Kadaluarsa	Folinin MR / 30 (gula)
(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)	

2. Nama Obat /warna etiket : Amlodipin 5 mg/ putih

 APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	
No. : TGL : 14 Februari 2024 NAMA PASIEN : Ny. Muzayanah	
..... 1.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus Sebelum / Sesudah / Bersama makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)	Pagi Siang Sore Malam
Nama / Jumlah Obat Tgl. Kadaluarsa	amlodipin 5 mg / 30 (tensi)
(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)	

		<p>E. Product Knowledge</p> <table border="1" data-bbox="943 233 2033 647"> <tr> <td data-bbox="943 233 1487 647"> Nama Obat : Fonilyn MR Kandungan :Glicazide 60 mg Dosis lazim : - Kegunaan : diabetes ESO potensial : - KI : - PERHATIAN :meningkatkan risiko hipoglikemia Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung </td> <td data-bbox="1487 233 2033 647"> Nama Obat : Amlodipin 5mg Kandungan : Amlodipin 5 mg Dosis lazim : 1 kali sehari 5mg Kegunaan :hipertensi ESO potensial : sakit kepala, pusing, mengantuk, debaran jantung KI : hipersensitif PERHATIAN : gagal jantung, kehamilan dan laktasi Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung </td> </tr> </table> <p>F. Tahap pembuatan</p> <p>-</p> <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Atas nama Ny.muzayanah. ini ada 2 macam obat. Ini fonilyn MR untuk gula diminum 1 kali sehari sebelum makan, kemudian ini amlodipin untuk tensi diminum malam hari sesudah makan. Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.</p>	Nama Obat : Fonilyn MR Kandungan :Glicazide 60 mg Dosis lazim : - Kegunaan : diabetes ESO potensial : - KI : - PERHATIAN :meningkatkan risiko hipoglikemia Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung	Nama Obat : Amlodipin 5mg Kandungan : Amlodipin 5 mg Dosis lazim : 1 kali sehari 5mg Kegunaan :hipertensi ESO potensial : sakit kepala, pusing, mengantuk, debaran jantung KI : hipersensitif PERHATIAN : gagal jantung, kehamilan dan laktasi Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung																
Nama Obat : Fonilyn MR Kandungan :Glicazide 60 mg Dosis lazim : - Kegunaan : diabetes ESO potensial : - KI : - PERHATIAN :meningkatkan risiko hipoglikemia Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung	Nama Obat : Amlodipin 5mg Kandungan : Amlodipin 5 mg Dosis lazim : 1 kali sehari 5mg Kegunaan :hipertensi ESO potensial : sakit kepala, pusing, mengantuk, debaran jantung KI : hipersensitif PERHATIAN : gagal jantung, kehamilan dan laktasi Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung																			
11	Jenis Resep : Salinan/ Resep asli Resep obat : Racikan/ non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/ tidak Pengulangan resep : iter..... kali / neiter Tempel Resep/salin resep disini!	<p>A. Skrining Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="927 1086 1794 1370"> <tr> <td data-bbox="927 1086 1193 1121">Nama Pasien :</td> <td data-bbox="1193 1086 1420 1121">Ada</td> <td data-bbox="1420 1086 1794 1121">Ny. Ninik Puspa Arum</td> </tr> <tr> <td data-bbox="927 1121 1193 1157">Umur pasien :</td> <td data-bbox="1193 1121 1420 1157">Ada</td> <td data-bbox="1420 1121 1794 1157">60 tahun</td> </tr> <tr> <td data-bbox="927 1157 1193 1192">Berat Badan :</td> <td data-bbox="1193 1157 1420 1192">Tidak ada</td> <td data-bbox="1420 1157 1794 1192">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="927 1192 1193 1259">Nama Obat :</td> <td data-bbox="1193 1192 1420 1259">Ada</td> <td data-bbox="1420 1192 1794 1259">R/ Amaryl M 2/500 R/ Zigduo XR 10/500</td> </tr> <tr> <td data-bbox="927 1259 1193 1294">Bentuk sed. :</td> <td data-bbox="1193 1259 1420 1294">Tidak ada</td> <td data-bbox="1420 1259 1794 1294">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="927 1294 1193 1370">Jumlah obat :</td> <td data-bbox="1193 1294 1420 1370">Ada</td> <td data-bbox="1420 1294 1794 1370">R/ Amaryl M 2/500 (30) R/ Zigduo XR 10/500 (30)</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Ny. Ninik Puspa Arum	Umur pasien :	Ada	60 tahun	Berat Badan :	Tidak ada	-	Nama Obat :	Ada	R/ Amaryl M 2/500 R/ Zigduo XR 10/500	Bentuk sed. :	Tidak ada	-	Jumlah obat :	Ada	R/ Amaryl M 2/500 (30) R/ Zigduo XR 10/500 (30)
Nama Pasien :	Ada	Ny. Ninik Puspa Arum																		
Umur pasien :	Ada	60 tahun																		
Berat Badan :	Tidak ada	-																		
Nama Obat :	Ada	R/ Amaryl M 2/500 R/ Zigduo XR 10/500																		
Bentuk sed. :	Tidak ada	-																		
Jumlah obat :	Ada	R/ Amaryl M 2/500 (30) R/ Zigduo XR 10/500 (30)																		



Duplikasi terapi :	Tidak ada	-
Aturan pakai :	Ada	R/ Amaryl M 2/500 (diminum pagi sebelum makan) R/ Zigduo XR 10/500 (diminum malam setelah makan)
Tanggal penulisan resep :	Ada	13 Februari 2024
Nama dokter :	Ada	Dr. Tassya Firdausi
Surat ijin :	Ada	SIP : 446/2076/437.52/2019
Alamat dr. :	ada	Klinik PT. PLN NP UP Gresik

B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi

R/ Amaryl M 2/500	(30)
R/ Zigduo XR 10/500	(30)

C. Perhitungan biaya resep

R/ Amaryl M 2/500	x 30	Rp. 293.100
R/ Zigduo XR 10/500	x 30	Rp. 605.100
TOTAL TRANSAKSI		Rp. 898.200

D. Etiket

1. Nama Obat /warna etiket : Amaryl M 2/500 / putih



No. : TGL. : 14 Februari 2024
 NAMA PASIEN : Ny. Ninik

..... 1.X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus Pagi
 Sebelum / Sesudah / Bersama makan Siang
 (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak) Sore
 Malam

Nama / Jumlah Obat Amaryl M 2/500 / 30 (gula)
 Tgl. Kadaluarsa
 (hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)

2. Nama Obat /warna etiket : Zigduo XR 10/500 / putih

kimia farma
 APOTEK KIMIA FARMA
 Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
 APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm
 SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

No. : TGL. : 14 Februari 2024
 NAMA PASIEN : Ny. Ninik


..... 1.X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus Pagi
 Sebelum / Sesudah / Bersama makan Siang
 (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak) Sore
 Malam

Nama / Jumlah Obat Zigduo XR 10/500 / 30 (gula)
 Tgl. Kadaluarsa
 (hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)

E. Product Knowledge

<p>Nama Obat : Amaryl M 2/500 Kandungan : glimepiride 2 mg, Metformin HCl 500mg Dosis lazim : 1 kali sehari 1 tab Kegunaan : diabetes melitus tipe 2 ESO potensial : hipoglikemia, gangguan pengelihan sementara, mual, muntah KI : hipersensitif, tidak digunakan untuk diabetes melitus tipe 1</p>	<p>Nama Obat : Zigduo XR 10/500 Kandungan : dipaglifozin propanediol 10 mg, metformin HCl 500mg Dosis lazim : 1 kali sehari 1 tab Kegunaan : diabetes melitus tipe 2 ESO potensial : dehidrasi, hipoglikemia, mual, muntah, kangker kandung kemih KI : hipersensitif tidak digunakan untuk diabetes melitus tipe 1</p>
--	--

		<p>PERHATIAN : mempengaruhi fungsi ginjal Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>PERHATIAN : mempengaruhi fungsi ginjal Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>																								
		<p>F. Tahap pembuatan</p> <p>-</p>																									
		<p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Atas nama Ny.muzayanah. ini ada 2 macam obat. Ini Amaryl M untuk gula diminum pagi sebelum makan, kemudian ini xigduo XR untuk gula diminum malam hari sesudah makan. Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.</p>																									
12	<p>Jenis Resep : Resep asli Resep obat : non racikan Jumlah obat dalam resep : 4 Pengulangan resep : neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p>	<p>A. Skrining Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Tn. Sunarto Wongso Sumartha</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada</td> <td>63 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Velacom plus 2/500 Janumet XR 50/500 Nistrol 20 mg Fres diab</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>Velacom plus 2/500 (30) Janumet XR 50/500 (30) Nistrol 20 mg (30) Fres diab (30)</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>Velacom plus 2/500 (pagi sebelum makan)</td> </tr> </table>		Nama Pasien :	Ada	Tn. Sunarto Wongso Sumartha	Umur pasien :	Ada	63 tahun	Berat Badan :	Tidak ada	-	Nama Obat :	Ada	Velacom plus 2/500 Janumet XR 50/500 Nistrol 20 mg Fres diab	Bentuk sed. :	Tidak ada	-	Jumlah obat :	Ada	Velacom plus 2/500 (30) Janumet XR 50/500 (30) Nistrol 20 mg (30) Fres diab (30)	Duplikasi terapi :	Tidak ada	-	Aturan pakai :	Ada	Velacom plus 2/500 (pagi sebelum makan)
Nama Pasien :	Ada	Tn. Sunarto Wongso Sumartha																									
Umur pasien :	Ada	63 tahun																									
Berat Badan :	Tidak ada	-																									
Nama Obat :	Ada	Velacom plus 2/500 Janumet XR 50/500 Nistrol 20 mg Fres diab																									
Bentuk sed. :	Tidak ada	-																									
Jumlah obat :	Ada	Velacom plus 2/500 (30) Janumet XR 50/500 (30) Nistrol 20 mg (30) Fres diab (30)																									
Duplikasi terapi :	Tidak ada	-																									
Aturan pakai :	Ada	Velacom plus 2/500 (pagi sebelum makan)																									



		Janumet XR 50/500 (malam sesudah makan) Nistrol 20 mg (malam sesudah makan) Fres diab (1 kali sehari setelah makan)
Tanggal penulisan resep :	Ada	13 Februari 2024
Nama dokter :	Ada	Dr. Tassya Firdausi
Surat ijin :	Ada	SIP : 446/2076/437.52/2019
Alamat dr. :	ada	Klinik PT. PLN NP UP Gresik

B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi


-



C. Perhitungan biaya resep

Velacom plus 2/500	x 30	Rp. 182.700
Janumet XR 50/500	x 28	Rp. 701.900
Nistrol 20 mg	x 30	Rp. 388.200
Fres diab	x30	Rp. 211.800
TOTAL TRANSAKSI		Rp. 1.485.600

D. Etiket


1. Nama Obat /warna etiket : Velacom plus 2/500 / putih


 APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597 No. : TGL : 13 Februari 2024


		<p>NAMA PASIEN : Tn. Sunarto</p> <p>..... 1.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus Sebelum / Sesudah / Bersama makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)</p> <p>Pagi Siang Sore Malam</p> <hr/> <p>Nama / Jumlah Obat Velacom plus 2/500 / 30 (diabetes) Tgl. Kadaluarsa (hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)</p> <p>2. Nama Obat /warna etiket : Janumet XR 50/500 / putih</p> <div data-bbox="969 528 1648 986" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597</p> <p>No. : TGL : 13 Februari 2024</p> <p>NAMA PASIEN : Tn. Sunarto</p> <p>..... 1.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus Sebelum / Sesudah / Bersama makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)</p> <p>Pagi Siang Sore Malam</p> <hr/> <p>Nama / Jumlah Obat Janumet XR 50/500 / 28 (diabetes) Tgl. Kadaluarsa (hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)</p> </div> <p>3. Nama Obat /warna etiket : Nistrol 20 mg / putih</p> <div data-bbox="969 1161 1648 1390" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597</p> <p>No. : TGL : 13 Februari 2024</p> <p>NAMA PASIEN : Tn. Sunarto</p> </div>
--	--	---

			<p>..... 1.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus <u>Sebelum</u> / <u>Sesudah</u> / <u>Bersama</u> makan <i>(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)</i></p> <p style="text-align: right;"><u>Pagi</u> <u>Siang</u> <u>Sore</u> <u>Malam</u></p> <hr/> <p>Nama / Jumlah Obat Nistrol 20mg / 30 (kolestrol) Tgl. Kadaluarsa <i>(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)</i></p>	<p>4. Nama Obat /warna etiket : Fres diab / putih</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>kimia farma APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597</p> <p>No. : TGL : 13 Februari 2024 NAMA PASIEN : Tn. Sunarto</p> <p>..... 1.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus <u>Sebelum</u> / <u>Sesudah</u> / <u>Bersama</u> makan <i>(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)</i></p> <p style="text-align: right;"><u>Pagi</u> <u>Siang</u> <u>Sore</u> <u>Malam</u></p> <hr/> <p>Nama / Jumlah Obat Fres Diab / 30 (supelmen) Tgl. Kadaluarsa <i>(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)</i></p> </div> <p>E. Product Knowledge</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="943 1023 1487 1366"> <p>Nama Obat : Velacom plus 2/500 Kandungan :Glimipiride 2 mg, metrformin HCl 500 mg Dosis lazim :1 kali sehari Kegunaan : untuk pasien diabetes melitus tipe 2 ESO potensial : Hipoglikemia, gangguan pengelihatn sementara, reaksi alergi ; gatal, kemerahan pada kulit</p> </td> <td data-bbox="1487 1023 2045 1366"> <p>Nama Obat : Janumet XR 50/500 Kandungan : sitagliptin 50mg, metrformin HCl 500 mg Dosis lazim : 1 kali sehari Kegunaan : untuk pasien diabetes melitus tipe 2 ESO potensial : diare, mual, muntah, kembung, rasa tidak nyaman pada perut, gangguan pencernaan, sakit kepala KI : gangguan fungsi ginjal</p> </td> </tr> </table>	<p>Nama Obat : Velacom plus 2/500 Kandungan :Glimipiride 2 mg, metrformin HCl 500 mg Dosis lazim :1 kali sehari Kegunaan : untuk pasien diabetes melitus tipe 2 ESO potensial : Hipoglikemia, gangguan pengelihatn sementara, reaksi alergi ; gatal, kemerahan pada kulit</p>	<p>Nama Obat : Janumet XR 50/500 Kandungan : sitagliptin 50mg, metrformin HCl 500 mg Dosis lazim : 1 kali sehari Kegunaan : untuk pasien diabetes melitus tipe 2 ESO potensial : diare, mual, muntah, kembung, rasa tidak nyaman pada perut, gangguan pencernaan, sakit kepala KI : gangguan fungsi ginjal</p>
<p>Nama Obat : Velacom plus 2/500 Kandungan :Glimipiride 2 mg, metrformin HCl 500 mg Dosis lazim :1 kali sehari Kegunaan : untuk pasien diabetes melitus tipe 2 ESO potensial : Hipoglikemia, gangguan pengelihatn sementara, reaksi alergi ; gatal, kemerahan pada kulit</p>	<p>Nama Obat : Janumet XR 50/500 Kandungan : sitagliptin 50mg, metrformin HCl 500 mg Dosis lazim : 1 kali sehari Kegunaan : untuk pasien diabetes melitus tipe 2 ESO potensial : diare, mual, muntah, kembung, rasa tidak nyaman pada perut, gangguan pencernaan, sakit kepala KI : gangguan fungsi ginjal</p>					

		<p>KI :dipersensitif, tidak boleh digunakan pada penderita diabetes melitus tingkat 1 PERHATIAN : hipoglikemia, gangguan saraf, gangguan hati dan ginjal, hamil, ibu menyusui, lansia Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p> <p>Nama Obat : Nistrol 20 mg Kandungan : rosuvastatin Calcium 20 mg Dosis lazim : 20 mg/hari Kegunaan : untuk mengontrol kadar lemak (kolesterol dan trigliserida),mencegah penyumbatan pembuluh darah ESO potensial : sakit kepala, nyeri diarea perut dan otot, mual, ruam kulit, sakit tenggorokan, penurunan nafsu makan KI :penyakit gangguan ginjal berat, wanita hamil dan menyusui PERHATIAN : hamil/ sedang program hamil, menyusui, gangguan kulit, hipersensitif Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>PERHATIAN :penggunaan bersama dengan obat hipoglikemia Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p> <p>Nama Obat : Fres diab Kandungan : Alpha-lipic acid (ALA) 300mg Dosis lazim : 1 kali 1 tablet Kegunaan : membantu memelihara kesehatan pada penderita diabetes ESO potensial : sakit kepala, pusing, dan kelelahan. KI :- PERHATIAN : hati-hati jika punya masalah tiroid, tidak dianjurkan untuk anak-anak Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>
		<p>F. Tahap pembuatan</p> <p>-</p>	
		<p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p>	


		<p>Atas nama Tn. Sunarto. Ini ada 4 macam obatnya. Ini ada velacom plus untuk diabetes diminum pagi sebelum makan, ini janumer XR untuk diabetes diminum malam setelah makan, ini nistrol untuk kolestrol diminum malam setelah makan, kemudian ini fres diab untuk supelmen diminum 1 kali sehari. Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.</p>																								
13	<p>Jenis Resep : Salinan/ Resep asli Resep obat : Racikan/ non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/ tidak Pengulangan resep : iter..... kali / neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrining Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="927 451 1193 488">Nama Pasien :</td> <td data-bbox="1193 451 1420 488">Ada</td> <td data-bbox="1420 451 1794 488">Grailin</td> </tr> <tr> <td data-bbox="927 488 1193 525">Umur pasien :</td> <td data-bbox="1193 488 1420 525">Ada</td> <td data-bbox="1420 488 1794 525">5 tahun</td> </tr> <tr> <td data-bbox="927 525 1193 561">Berat Badan :</td> <td data-bbox="1193 525 1420 561">Tidak ada</td> <td data-bbox="1420 525 1794 561">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="927 561 1193 732">Nama Obat :</td> <td data-bbox="1193 561 1420 732">Ada</td> <td data-bbox="1420 561 1794 732">R/ Cefadroxil 0,165 Nystatin 165.000 Operma 1/3 tab Vometa 2mg R/ Vitacur Syr</td> </tr> <tr> <td data-bbox="927 732 1193 943">Bentuk sed. :</td> <td data-bbox="1193 732 1420 943">Ada</td> <td data-bbox="1420 732 1794 943">R/ Cefadroxil 0,165 Nystatin 165.000 Operma 1/3 tab Vometa 2mg R/ Vitacur Syr</td> </tr> <tr> <td data-bbox="927 943 1193 1118">Jumlah obat :</td> <td data-bbox="1193 943 1420 1118">Ada</td> <td data-bbox="1420 943 1794 1118">R/ Cefadroxil 0,165 (5) Nystatin 165.000 (5) Operma 1/3 tab(5) Vometa 2mg (3) R/ Vitacur Syr (1)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="927 1118 1193 1155">Duplikasi terapi :</td> <td data-bbox="1193 1118 1420 1155">Tidak ada</td> <td data-bbox="1420 1118 1794 1155">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="927 1155 1193 1359">Aturan pakai :</td> <td data-bbox="1193 1155 1420 1359">Ada</td> <td data-bbox="1420 1155 1794 1359">R/ Cefadroxil 0,165 Nystatin 165.000 Operma 1/3 tab Vometa 2mg (3 kali sehari setelah makan)</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Grailin	Umur pasien :	Ada	5 tahun	Berat Badan :	Tidak ada	-	Nama Obat :	Ada	R/ Cefadroxil 0,165 Nystatin 165.000 Operma 1/3 tab Vometa 2mg R/ Vitacur Syr	Bentuk sed. :	Ada	R/ Cefadroxil 0,165 Nystatin 165.000 Operma 1/3 tab Vometa 2mg R/ Vitacur Syr	Jumlah obat :	Ada	R/ Cefadroxil 0,165 (5) Nystatin 165.000 (5) Operma 1/3 tab(5) Vometa 2mg (3) R/ Vitacur Syr (1)	Duplikasi terapi :	Tidak ada	-	Aturan pakai :	Ada	R/ Cefadroxil 0,165 Nystatin 165.000 Operma 1/3 tab Vometa 2mg (3 kali sehari setelah makan)
Nama Pasien :	Ada	Grailin																								
Umur pasien :	Ada	5 tahun																								
Berat Badan :	Tidak ada	-																								
Nama Obat :	Ada	R/ Cefadroxil 0,165 Nystatin 165.000 Operma 1/3 tab Vometa 2mg R/ Vitacur Syr																								
Bentuk sed. :	Ada	R/ Cefadroxil 0,165 Nystatin 165.000 Operma 1/3 tab Vometa 2mg R/ Vitacur Syr																								
Jumlah obat :	Ada	R/ Cefadroxil 0,165 (5) Nystatin 165.000 (5) Operma 1/3 tab(5) Vometa 2mg (3) R/ Vitacur Syr (1)																								
Duplikasi terapi :	Tidak ada	-																								
Aturan pakai :	Ada	R/ Cefadroxil 0,165 Nystatin 165.000 Operma 1/3 tab Vometa 2mg (3 kali sehari setelah makan)																								

		R/ Vitacur Syr (2 kali sehari 1 sendok teh)																											
Tanggal penulisan resep :	Ada	15 Februari 2024																											
Nama dokter :	Ada	Dr. Ali Faisal																											
Surat ijin :	Ada	SIPD: 446/4268/437.52/2022																											
Alamat dr. :	ada	Jl. Panglima Sudirman 22- 24 Gresik																											
<p>B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi</p> <p>Racikan 1 Cefadroxil $165/500 \times 15 = 4,95$ Nystatin $165.000/500.000 \times 15 = 4.95$ Operma $1/3 \times 15 = 5$ Vometa $2/10 \times 15 = 3$</p>																													
<p>C. Perhitungan biaya resep</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="3">Racikan 1</td> </tr> <tr> <td>Cefat 500</td> <td>x 5</td> <td>Rp. 78.645</td> </tr> <tr> <td>Nystatin 500.000</td> <td>x 5</td> <td>Rp. 8.250</td> </tr> <tr> <td>Operma 4 mg</td> <td>x 5</td> <td>Rp. 5.300</td> </tr> <tr> <td>Vometa 2mg</td> <td>x 3</td> <td>Rp. 19.914</td> </tr> <tr> <td>Kertas puyer berlogo KF</td> <td>x 15</td> <td>Rp. 930</td> </tr> <tr> <td>Embalase</td> <td>x 1</td> <td>Rp. 15.000</td> </tr> <tr> <td>Vitacur Syr</td> <td>x 1</td> <td>Rp. 59.940</td> </tr> <tr> <td>TOTAL TRANSAKSI</td> <td></td> <td>Rp. 177.979</td> </tr> </table>			Racikan 1			Cefat 500	x 5	Rp. 78.645	Nystatin 500.000	x 5	Rp. 8.250	Operma 4 mg	x 5	Rp. 5.300	Vometa 2mg	x 3	Rp. 19.914	Kertas puyer berlogo KF	x 15	Rp. 930	Embalase	x 1	Rp. 15.000	Vitacur Syr	x 1	Rp. 59.940	TOTAL TRANSAKSI		Rp. 177.979
Racikan 1																													
Cefat 500	x 5	Rp. 78.645																											
Nystatin 500.000	x 5	Rp. 8.250																											
Operma 4 mg	x 5	Rp. 5.300																											
Vometa 2mg	x 3	Rp. 19.914																											
Kertas puyer berlogo KF	x 15	Rp. 930																											
Embalase	x 1	Rp. 15.000																											
Vitacur Syr	x 1	Rp. 59.940																											
TOTAL TRANSAKSI		Rp. 177.979																											
<p>D. Etiket</p> <p>1. Nama Obat /warna etiket : Racikan 1/ putih</p>																													
																													

		<p>Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597</p> <p>No. : TGL : 15 Februari 2024</p> <p>NAMA PASIEN : An. Grailin</p> <p>..... 3.....X sehari 1..... <u>Tablet / Kapsul / Bungkus</u> <u>Pagi</u> <u>Sebelum / Sesudah / Bersama</u> makan <u>Siang</u> (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak) <u>Sore</u> <u>Malam</u></p> <p>Nama / Jumlah Obat Racikan 1/ 15 bungkus Tgl. Kadaluarsa (hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)</p>	
		<p>2. Nama Obat /warna etiket : Vitacur Syr</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  <p>ANTIBIOTIK HARUS DIHABISKAN</p> <p>APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597</p> <p>Tgl. 15 Februari 2024 Anda. R/ An. Gralin 5 th</p> <p>SEHARI : 3..... X 1..... SENDOK <u>TEH</u> <u>Sebelum / Sesudah</u> makan <u>BUBUR</u> <u>MAKAN</u></p> <p>KOCOK DULU</p> </div>	
		<p>E. Product Knowledge</p> <p>Nama Obat : cefat Kandungan : cefadroxil 500mg Dosis lazim : dewasa atau anak-anak >40 kg : 1.000 mg sehari atau 500mg 2 kali sehari.</p>	<p>Nama Obat : Nystatin Kandungan : Nystatin 500.000 IU Dosis lazim : 100.000 IU/ hari Kegunaan : infeksi jamur dalam rongga mulut ESO potensial : Diare, rasa tidak nyaman pada gastrointestinal, mual, dan muntah</p>

		<p>Kegunaan : antibiotik, saluran pernafasan, saluran kemih, dan kelamin serta infeksi kulit dan jaringan lunak ESO potensial :hipersensitif, diare, mual, muntah, sakit perut KI :hipersensitif PERHATIAN : hipersensitif, alergi berat atau asma, gangguan ginjal, wanita hamil Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>KI : hipersensitivitas PERHATIAN :tidak boleh digunakan untuk trapi mikosis sistemik Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>
		<p>Nama Obat : operma Kandungan : Sipoheptadin hidroklorida 4mg Dosis lazim :3 kali sehari 4mg. Kegunaan : mengurangi gatal-gatal alergi, ESO potensial : kebingungan, tremor, kejang, anemia hemolitik, pengelihatan kabur, gangguan pencernaan KI : hipersensitif PERHATIAN :hati-hati pada penderita asma bronikal, hipertrioidisme Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>Nama Obat : Vometa Kandungan : domperidone 10 mg Dosis lazim : Dewasa : 10 mg, 1 kali sehari. Maks, 10 mg setiap hari. Durasi perawatan 7 hari. Anak-anak < 12 tahun < 35 kg : 0,25 mg/kh diberikan 3 kali sehari maksimal 0,75 mg sehari. Anak-anak 12 tahun 35 kg sama seperti dosis dewasa Kegunaan :mual dan muntah akut ESO potensial : KI : gangguan hati sedang sampai berat. PERHATIAN : memounyai riwayat kanker payudara, raktor rasio kematian jantung mendadak Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>
		<p>Nama Obat : Vitacur Syr Kandungan : Curcuminoid 2 mg, beta-carotene 10% 4mg, Vit B1 3mg, vit B2 2mg, vit B6 5mg, Vit B12 5 mcg, vit D 100</p>	

		<p>IU, Dexpantenol 3mg, Fructo-oligosaccharide 300mg Dosis lazim : 2 kali 1 sendok takar Kegunaan : menambah nafsu makan dan stamina dalam pascapertumbuhan anak ESO potensial :- KI :- PERHATIAN :- Cara penyimpanan : simpan ditempat yang sejuk dan terlindung dari sinar matahari</p>																			
		<p>F. Tahap pembuatan</p>	-																		
		<p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p>	<p>Atas nama An. Grailin. Ini ada 2 obat. Ini ada 1 racikan antibiotik harus dihabiskan diminum 3 kali sehari setelah makan, kemudian ini vitacur syr nya digunakan untuk penambah nafsu makan, diminum 2 kali sehari 1 sendok teh. Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.</p>																		
14	<p>Jenis Resep : Salinan/ Resep asli Resep obat : Racikan/ non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/ tidak Pengulangan resep : iter..... kali / neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p>	<p>A. Skrining Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Ny. Endang</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Lapiva 20/5 Vesicare Celebrax 100</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>Lapiva 80/5 (30) Vesicare (30) Celebrax 100 (20)</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Ny. Endang	Umur pasien :	Tidak ada	-	Berat Badan :	Tidak ada	-	Nama Obat :	Ada	Lapiva 20/5 Vesicare Celebrax 100	Bentuk sed. :	Tidak ada	-	Jumlah obat :	Ada	Lapiva 80/5 (30) Vesicare (30) Celebrax 100 (20)	
Nama Pasien :	Ada	Ny. Endang																			
Umur pasien :	Tidak ada	-																			
Berat Badan :	Tidak ada	-																			
Nama Obat :	Ada	Lapiva 20/5 Vesicare Celebrax 100																			
Bentuk sed. :	Tidak ada	-																			
Jumlah obat :	Ada	Lapiva 80/5 (30) Vesicare (30) Celebrax 100 (20)																			



Duplikasi terapi :	Tidak ada	-
Aturan pakai :	Ada	Lapiva 80/5 (1 kali sehari, setelah makan) Vesicare (2 kali sehari, setelah makan) Celebrax 100 (2 kali sehari setelah makan)
Tanggal penulisan resep :	Ada	04 Maret 2024
Nama dokter :	Ada	-
Surat ijin :	Ada	-
Alamat dr. :	Tidak ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi


Lapiva 80/5 (30)
Vesicare (30)
Celebrax 100 (20)

C. Perhitungan biaya resep

Lapiva 80/5	x 30	Rp. 510.000
Vesicare	x 30	Rp. 898.200
Celebrax 100	x 20	Rp. 312.280
TOTAL TRANSAKSI		Rp. 1.720.480

D. Etiket



1. Nama Obat /warna etiket : Lapiva 80/5 / putih



APOTEK KIMIA FARMA
 Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
 APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm
 SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597


No. : TGL : 04 Maret 2024

NAMA PASIEN : Ny. Endang

			<p>..... 1.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus <u>Sebelum</u> / <u>Sesudah</u> / <u>Bersama</u> makan <i>(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)</i></p> <p style="text-align: right;">Pagi Siang Sore Malam</p>
			<p>Nama / Jumlah Obat Lapiva/30 (hipertensi) Tgl. Kadaluarsa <i>(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)</i></p>
		<p>2. Nama Obat /warna etiket : vesicare / putih</p>	 <p>kimia farma APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597</p>
			<p>No. : TGL : 04 Maret 2024 NAMA PASIEN : Ny. Endang</p>
			<p>..... 2.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus <u>Sebelum</u> / <u>Sesudah</u> / <u>Bersama</u> makan <i>(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)</i></p> <p style="text-align: right;">Pagi Siang Sore Malam</p>
			<p>Nama / Jumlah Obat Vesicare/ 30 (pipis- pipis) Tgl. Kadaluarsa <i>(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)</i></p>
		<p>3. Nama Obat /warna etiket :Celebrex 100</p>	 <p>kimia farma APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597</p>
			<p>No. : TGL : 04 Maret 2024 NAMA PASIEN : Ny. Endang</p>

		<p>..... 2.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus <u>Sebelum</u> / <u>Sesudah</u> / <u>Bersama</u> makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)</p> <p>Pagi Siang Sore Malam</p>
		<p>Nama / Jumlah Obat : celebrex/ 20 (pipis- pipis) Tgl. Kadaluarsa (hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)</p>
	E. Product Knowledge	
	<p>Nama Obat : Lapiva 80/5 Kandungan : Amplodipin 5mg, valsartan 80mg Dosis lazim : 1 kali 1 tab Kegunaan : hipertensi atau tekanan darah ESO potensial : pusing, mual, sakit kepala, batuk KI : diabetus melitus tipe II, gangguan hati berat, ibu hamil PERHATIAN : gangguan ginjal, gangguan hati, wanita hamil, dan ibu menyusui. Cara penyimpanan : simpan ditempat yang sejuk dan kering, terlindung dari sinar matahari</p>	<p>Nama Obat : Vesicare Kandungan : Solivenaxcin Succinate 5mg Dosis lazim : 1kali sehari 2 tablet Kegunaan : trapi sistemik inkontinensia urin (BAK/ buang air kecil tidak terkontrol) ESO potensial : mulut kering, konstipasi, mual, dispepsia, nyeri perut KI : retensi urin, gangguan gastrointestinal (saluran cerna) berat, gangguan ginjal berat, gangguan hati sedang atau berat PERHATIAN : obstruksi aliran keluar kandung kemih yang signifikan, wanita hamil dan menyusui. Cara penyimpanan : simpan ditempat yang sejuk dan kering, terlindung dari sinar matahari</p>
		<p>Nama Obat : celebrex 100 Kandungan : celecosib 100mg Dosis lazim : 2 kali sehari Kegunaan : osteoarthritis, nyeri aku, nyeri haid,, membantu mengurangi rasa sakit dan pembengkakan</p>

		<p>ESO potensial : nyeri abdomen, diare, dispepsia, kembung, mual, nyeri punggung, memperburuk hipertensi KI : hipersensitivitas, penyakit inflamasi usus, kehamilan, menyusui PERHATIAN : pasien dengan riwayat komplikasi gastrointtestinal (misalnya ulserasi dan peradangan), hipertensi, diabetes. Cara penyimpanan : simpan ditempat yang sejuk dan kering, terlindung dari sinar matahari</p>													
15	<p>Jenis Resep : Salinan/ Resep asli Resep obat : Racikan/ non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/ tidak Pengulangan resep : iter..... kali / neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p>	<p>F. Tahap pembuatan -</p> <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal) Atas nama Ny. Endang. Ini ada 3 obat. Ini Lapiva untuk hipertensi, diminum 1 kali sehari setelah makan, ini Vesicare untuk pipis-pipis, diminum 2 kali sehari setelah makan, kemudian yang ini celebrex untuk nyeri lutut, diminum 2 kali sehari setelah makan. Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.</p>	<p>A. Skrining Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Ny. Sri Moempoeni</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada</td> <td>77 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Cedocard retard 20 mg Plavix 75 mg Concor 5mg Lipantyl supra Lipitor 20mg Lecosib 60 mg Exforge 10/160 Nexium 20mg</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Ny. Sri Moempoeni	Umur pasien :	Ada	77 tahun	Berat Badan :	Tidak ada	-	Nama Obat :	Ada	Cedocard retard 20 mg Plavix 75 mg Concor 5mg Lipantyl supra Lipitor 20mg Lecosib 60 mg Exforge 10/160 Nexium 20mg
Nama Pasien :	Ada	Ny. Sri Moempoeni													
Umur pasien :	Ada	77 tahun													
Berat Badan :	Tidak ada	-													
Nama Obat :	Ada	Cedocard retard 20 mg Plavix 75 mg Concor 5mg Lipantyl supra Lipitor 20mg Lecosib 60 mg Exforge 10/160 Nexium 20mg													



Bentuk sed. :	Tidak ada	-
Jumlah obat :	Ada	Cedocard retard 20 mg (60) Plavix 75 mg (30) Concor 5mg (30) Lipantyl supra (30) Lipitor 20mg(30) Lecosib 60 mg (30) Exforge 10/160(30) Nexium 20mg(30)
Duplikasi terapi :	Tidak ada	-
Aturan pakai :	Ada	Cedocard retard 20 mg (2 kali sehari pagi dan malam) Plavix 75 mg (siang setelah makan) Concor 5mg (1 kali sehari pagi) Lipantyl supra (1 kali sehari pagi) Lipitor 20mg (1 kali sehari malam) Lecosib 60 mg (2 kali sehari setelah makan) Exforge 10/160 ((1 kali sehari pagi) Nexium 20mg (1 kali sehari pagi, sebelum makan)
Tanggal penulisan resep :	Ada	05 Maret 2024
Nama dokter :	Ada	Dr. Tassya Firdausi
Surat ijin :	Ada	SIP : 446/2076/437.52/2019
Alamat dr. :	ada	Klinik PT. PLN NP UP Gresik

B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi

Cedocard retard 20 mg (60)
Plavix 75 mg (30)
Concor 5mg (30)
Lipantyl supra (30)
Lipitor 20mg(30)
Lecosib 60 mg (30)
Exforge 10/160(30)
Nexium 20mg(30)

C. Perhitungan biaya resep

Cedocard retard 20 mg	x 60	Rp. 216.890
Plavix 75 mg	x 30	Rp. 1.181.070
Concor 5mg	x 30	Rp. 380.871
Lipantyl supra 160	x 30	Rp. 818.901
Lipitor 20mg	x 30	Rp. 935.250
Lecosib 60 mg	x 30	Rp. 327.044
Exforge 10/160	x 30	Rp. 528.428
Nexium 20mg	x 30	Rp. 857.700
TOTAL TRANSAKSI		Rp. 5.246154

D. Etiket

1. Nama Obat /warna etiket : Cedocard retard 20 mg / putih



APOTEK KIMIA FARMA

Jl. Kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK

APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm

SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

No. : TGL : 05 Maret 2024

NAMA PASIEN : Ny. Sri Moempoeni

..... 2.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus

Sebelum / Sesudah / Bersama makan

(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)

[Pagi](#)

[Siang](#)

[Sore](#)

[Malam](#)

Nama / Jumlah Obat Cedocard / 60 (jantung)

Tgl. Kadaluarsa

(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)

2. Nama Obat /warna etiket : Plavix 75 mg / putih

kimia farma

APOTEK KIMIA FARMA

Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK

APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm

SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

No. : TGL : 05 Maret 2024

NAMA PASIEN : Ny. Sri Moempoeni

..... 1.....X sehari..... 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus

Sebelum / Sesudah / Bersama makan

(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)

[Pagi](#)

[Siang](#)

[Sore](#)

[Malam](#)

Nama / Jumlah Obat Plafix / 30 (pengencer darah)

Tgl. Kadaluarsa

(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)

3. Nama Obat /warna etiket : Concor 5mg / putih

kimia farma

APOTEK KIMIA FARMA

Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK

APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm

SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

No. : TGL : 05 Maret 2024

NAMA PASIEN : Ny. Sri Moempoeni

..... 1.....X sehari..... 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus

Sebelum / Sesudah / Bersama makan

(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)

[Pagi](#)

[Siang](#)

[Sore](#)

[Malam](#)


Nama / Jumlah Obat concor / 30 (hipertensi)

Tgl. Kadaluarsa
(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)

4. Nama Obat /warna etiket : Lipantyl supra/ putih

 APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	
No. : TGL : 05 Maret 2024 NAMA PASIEN : Ny. Sri Moempoeni	
..... 1.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus Sebelum / Sesudah / Bersama makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)	Pagi Siang Sore Malam
Nama / Jumlah Obat lipanthyl supra / 30 (trigliserida) Tgl. Kadaluarsa (hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)	

5. Nama Obat /warna etiket : Lipitor 20mg /putih


 APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	
No. : TGL : 05 Maret 2024 NAMA PASIEN : Ny. Sri Moempoeni	
..... 1.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus Sebelum / Sesudah / Bersama makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)	Pagi Siang Sore Malam
Nama / Jumlah Obat lipitor / 30 (kolestrol)	

Tgl. Kadaluarsa
(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)

6. Nama Obat /warna etiket : Lecosib 60 mg / putih

 APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	
No. : TGL : 05 Maret 2024	
NAMA PASIEN : Ny. Sri Moempoeni	
..... 1.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus Sebelum / Sesudah / Bersama makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)	Pagi Siang Sore Malam
Nama / Jumlah Obat Lecosib / 30 (nyeri lutut)	
Tgl. Kadaluarsa (hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)	

7. Nama Obat /warna etiket : Exforge 10/160 / putih

 APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	
No. : TGL : 05 Maret 2024	
NAMA PASIEN : Ny. Sri Moempoeni	
..... 1.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus Sebelum / Sesudah / Bersama makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)	Pagi Siang Sore Malam
Nama / Jumlah Obat Exforge 10/160 / 30 (hipertensi)	

Tgl. Kadaluarsa
(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)

8. Nama Obat /warna etiket : Nexium 20mg/ putih

kimia farma
APOTEK KIMIA FARMA
 Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
 APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm
 SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

No. : TGL : 05 Maret 2024
 NAMA PASIEN : Ny. Sri Moempoeni

..... 1.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus
 Sebelum / Sesudah / Bersama makan
 (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)

Pagi
Siang
Sore
Malam

Nama / Jumlah Obat : concor / 30 (hipertensi)
 Tgl. Kadaluarsa
 (hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)

E. Product Knowledge


Nama Obat : Cedocard retard 20 mg
 Kandungan : Isosorbide dinitrate 20mg
 Dosis lazim : 2 kali sehari 1 tablet
 Kegunaan : gagal jantung
 ESO potensial : sakit kepala, hipotensi postural dan mual
 KI : hipotensi, syok kardiogenik, anemia berat
 PERHATIAN : hamil, anak, glukoma
 Cara penyimpanan : simpan ditempat yang sejuk dan kering, terlindung dari sinar matahari

Nama Obat : Plavix 75 mg
 Kandungan : clopidogrel 75 mg
 Dosis lazim : 1 kali sehari 1 tab
 Kegunaan : pengencer darah, infarkmiokard
 ESO potensial : sakit kepala, parasthesia, ruan
 KI :hipersensitivotas, kerusakan hati
 PERHATIAN : tidak dianjurkan 7 hari pertama setelah stroke
 Cara penyimpanan : simpan ditempat yang sejuk dan kering, terlindung dari sinar matahari

		<p>Nama Obat : Concor 5mg Kandungan : Bisoprolol Fumarate 5mg Dosis lazim : 5-10 mg/hari Kegunaan : hipertensi, angnia, gagal jantung kronik, bronkospastik, gangguan hati ESO potensial : kram, abdomen, diare, pusing, sakit kepala, mual, denyut jantung lambat, tekanan darah rendah. KI :hipersensitif, gagal jantung akut atau selama episode dekomposisi gagal jantung yang memerlukan terapi intravena intropik PERHATIAN : bronkospasme (asma bronkial, penyakit saluran nafas obstruktif). Cara penyimpanan : simpan ditempat yang sejuk dan kering, terlindung dari sinar matahari</p>	<p>Nama Obat : Lipantyl supra Kandungan :Fenofibrate 160mg Dosis lazim : 1 kali sehari 1 tab Kegunaan : trigliserida, hiperkolestrolemia tipe IIA ESO potensial : reaksi alergi kulit, nyeri otot dengan peningkatan CPK, alopecia, astenia seksual KI : hipersensitivitas, hanhuan hati dan ginjal, penyakit kandung empedu, anak kehamilan dan laktasi PERHATIAN : riwayat pribadi atau keluarga gangguan otot herediter, hipotriodisme atau konsumsi alkohol yang tinggi Cara penyimpanan : : simpan ditempat yang sejuk dan kering, terlindung dari sinar matahari</p>
		<p>Nama Obat : Lipitor 20mg Kandungan : Actovastatin Calium Trihydrate 20 mg Dosis lazim : 1 kali sehari Kegunaan : menurunkan kolestrol total, kolestrol LDL ESO potensial : konstipasi, sakit kepala, mual, diare, sakit perut, dispepsia, perut kembung, hepatitis KI : hipersensitif, Penyakit hati aktif atu peningkatan serum transaminase PERHATIAN : wanita hamil dan kemungkinan hamil</p>	<p>Nama Obat : Lecosib 60 Kandungan : Etoricoxib 60 Dosis lazim : 60 mg/hari Kegunaan : mengatasi nyeri dan pembengkakan akibat rheumatoid arthritis ESO potensial : rasa lelah, pusing, sakit kepala, edema, rasa panas pada ulu hati, hpertensi, dispepsia, peningkatan ALT/AST KI : hipersensitif, penderita tukak lambung PERHATIAN : wanita hamil dan menyusui, tidak mengemudi kendaraan</p>

		<p>Cara penyimpanan : : simpan ditempat yang sejuk dan kering, terlindung dari sinar matahari</p> <p>Nama Obat : Exforge 10/160 Kandungan : Amlodipine 10, valsartan 160 Dosis lazim : 1 kali sehari 1 tab Kegunaan : hipertensi ESO potensial : influenza, kelelahan, vertigo, diare, mual, sakit perut, semblit KI :hipersensitif, gangguan gagal ginjal berat PERHATIAN : gagal hati, DM, ginjal Cara penyimpanan : : simpan ditempat yang sejuk dan kering, terlindung dari sinar matahari</p>	<p>Cara penyimpanan : : simpan ditempat yang sejuk dan kering, terlindung dari sinar matahari</p> <p>Nama Obat : Nexium 20mg Kandungan :Esomeprazole 20mg Dosis lazim : 20-40 mg/hari Kegunaan : pasien tukak lambung ESO potensial : gangguan slauran cerna, sakit kepala dan pusing KI : hipersensitivitas, pemberian bersama atazanavir, intoleransi fruktosa PERHATIAN : gatroitestinal (lambung dan usus) yang ringan seperti dispepsia karena kecemasan Cara penyimpanan : : simpan ditempat yang sejuk dan kering, terlindung dari sinar matahari</p>
		<p>F. Tahap pembuatan</p> <p>-</p>	
		<p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Atas nama Ny. Sri Moempoeni. Ini ada 8 macam obat. Ini cendocard retard 20 mg untuk jantung diminum pagi sama malam, setelah makan. ini plafix 75 untuk pengencer darah diminum siang, setelah makan. Conor 5 mg untuk hipertensi diminum pagi, setelah makan. Lipanthyl supra untuk trigliserida, diminum pagi, setelah makan. ini lipitor 20 mg untuk kolestrol, diminum malam setelah makan. lecosib 60 mg untuk nyeri otot diminum 1 kali sehari setelah makan. Eforge 10/160 untuk hipertensi diminum pagi setelah makan. ini nexium 20 mg digunakan untuk lambung diminum pagi sebelum makan. Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.</p>	
16	Jenis Resep : Resep asli Resep obat : Racikan	A. Skrining Administrasi	

Jumlah obat dalam resep : 5
 Pengulangan resep : neiter
 Tempel Resep/salin resep disini!



Nama Pasien :	Ada	Tn Dicky Agriawan
Umur pasien :	Tidak ada	-
Berat Badan :	Tidak ada	-
Nama Obat :	Ada	R/ Codein 20mg Ambroxol 20mg Loratadine ½ tab Metil prednisolon 8 1/3 tab
Bentuk sed. :	Ada	R/ Codein 20mg Ambroxol 20mg Loratadine ½ tab Metil prednisolon 8 1/3 tab (9 kapsul)
Jumlah obat :	Ada	R/ Codein 20mg Ambroxol 20mg Loratadine ½ tab Metil prednisolon 8 1/3 tab (9 kapsul)
Duplikasi terapi :	Tidak ada	-
Aturan pakai :	Ada	3 kali sehari 1 kapsul
Tanggal penulisan resep :	Ada	09 Maret 2024
Nama dokter :	Ada	Dr. Tresnaningsih S
Surat ijin :	Ada	SIP. 446/1866/437.52/2023
Alamat dr. :	Tidak ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi

Codein 20 x 9 = 9
 Ambroxol 20/30 x 9 = 6
 Loratadine ½ x 9 = 4,5
 Metil presnisolon 8 1/3 x 9 = 3

C. Perhitungan biaya resep

Racikan 1		
codicaf 20 mg	x 9	Rp. 12.360
Ambroxol 30 mg	x 6	Rp. 3.300
Loratadine 10mg	x 5	Rp. 2.400
Metilprednisolon 8 mg	x 3	Rp. 2898
Kapsul No.00	x 9	Rp. 850
Pot kapsul	x 1	Rp. 3.000
Embalase		Rp. 15.000
TOTAL TRANSAKSI		Rp. 39.808

D. Etiket

1. Nama Obat /warna etiket : Racikan 1 / putih



APOTEK KIMIA FARMA
Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm
SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

No. : TGL. : 09 Maret 2024
NAMA PASIEN : Tn. Dicky

..... 3X sehari 1 Tablet / Kapsul / Bungkus [Pagi](#)
Sebelum / Sesudah / Bersama makan [Siang](#)
[Malam](#)
(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)

		<p>Nama / Jumlah Obat Racikan 1 / 9 Caps Tgl. Kadaluarsa (hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)</p>	
E. Product Knowledge			
<p>Nama Obat : codicaf 20 mg Kandungan : codein 20mg Dosis lazim :30-60 mg/hari Kegunaan : nyeri sedang hingga parah ESO potensial : sakit kepala, mual, lemas kantuk, susah buang air kecil, halusinasi, haid tidak teratur KI : - PERHATIAN : - Cara penyimpanan : simpan ditempat yang sejuk dan kering, terlindung dari sinar matahari</p>		<p>Nama Obat : Ambroxol 30 Kandungan : Ambroxol 30 Dosis lazim : 30 mg, 2-3 kali sehari Kegunaan : saluran pernafasan akut dan kronis ESO potensial : mual, muntah, diare, sakit perut KI : hipersensitif PERHATIAN : tukak lambung atau dodenum, gangguan ginjal dan hati, anak- anak Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	
<p>Nama Obat : Loratadine 10 Kandungan : Loratadine Dosis lazim : dewasa dan anak-anak³ 12 thn : 1 tablet sehari Kegunaan : untuk menyembukan gejala-gejala yang berhubungan dengan rinitis alergi seperti ; bersin-bersin, pilk dan rasa gatal serta rasa terbakar pada mata ESO potensial : lelah, mual, sakit kepala KI : hipersensitif PERHATIAN : gangguan hati atau ginjal yang parah. Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>		<p>Nama Obat : methyl prednisolon Kandungan :methylprednisolon 8 mg Dosis lazim :4/80 mg/hari Kegunaan : alergi atau mengurangi peradangan ESO potensial :insomnia, tukak lambung, hipertensi KI : infeksi jamur sistemik PERHATIAN : TBC, ulkus peptikum, infeksi jamur sistemik, herpes simpleks. Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	

		<p>F. Tahap pembuatan</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Racikan 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siapkan obat yang akan diracik 2. Obat yang sudah di siapkan dibuka dan obat tersebut dimasukan kedalam belender 3. Kemudian obat diayak kedalam kapsul 4. Lalu kapsul di tutup dan dimasukan ke dalam pot kapsul dan di beri etiket </div> <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Atas nama Tn. Dicky. Ini ada 1 obat racikan digunakan untuk bapil, diminum 3 kali 1 hari, setelah makan. Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.</p> </div>																		
17	<p>Jenis Resep : Salinan/ Resep asli Resep obat : Racikan/ non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/ tidak Pengulangan resep : iter..... kali / neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p>	<p>A. Skrining Administrasi</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama Pasien :</td> <td style="width: 30%;">Ada</td> <td style="width: 40%;">Rubenda</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Codein 10mg Paratusin 1 tab Ambroxol 20 mg R/ Lameson 4 mg R/ Polycrol F tab R/ Omeprazole</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Tidak ada</td> <td>R/ Codein 10mg Paratusin 1 tab Ambroxol 20 mg (12 capsule) R/ Lameson 4 mg R/ Polycrol F tab R/ Omeprazole</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Codein 10mg</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Rubenda	Umur pasien :	Tidak ada	-	Berat Badan :	Tidak ada	-	Nama Obat :	Ada	R/ Codein 10mg Paratusin 1 tab Ambroxol 20 mg R/ Lameson 4 mg R/ Polycrol F tab R/ Omeprazole	Bentuk sed. :	Tidak ada	R/ Codein 10mg Paratusin 1 tab Ambroxol 20 mg (12 capsule) R/ Lameson 4 mg R/ Polycrol F tab R/ Omeprazole	Jumlah obat :	Ada	R/ Codein 10mg
Nama Pasien :	Ada	Rubenda																		
Umur pasien :	Tidak ada	-																		
Berat Badan :	Tidak ada	-																		
Nama Obat :	Ada	R/ Codein 10mg Paratusin 1 tab Ambroxol 20 mg R/ Lameson 4 mg R/ Polycrol F tab R/ Omeprazole																		
Bentuk sed. :	Tidak ada	R/ Codein 10mg Paratusin 1 tab Ambroxol 20 mg (12 capsule) R/ Lameson 4 mg R/ Polycrol F tab R/ Omeprazole																		
Jumlah obat :	Ada	R/ Codein 10mg																		



		Paratusin 1 tab Ambroxol 20 mg (12 capsule)
		R/ Lameson 4 mg (8) R/ Polycrol F tab (10) R/ Omeprazole (8)
Duplikasi terapi :	Tidak ada	
Aturan pakai :	Ada	R/ Codein 10mg Paratusin 1 tab Ambroxol 20 mg (3kali sehari setelah makan)
		R/ Lameson 4 mg (2 kali sehari setelah makan) R/ Polycrol F tab (3kali sehari setelah makan) R/ Omeprazole (3kali sehari pagi dan malam, sebelum makan)
Tanggal penulisan resep :	Ada	
Tanggal penulisan resep :	Ada	09 Maret 2024
Nama dokter :	Ada	Dr. Tresnaningsih S
Surat ijin :	Ada	SIP. 446/1866/437.52/2023

B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi


Codein 10mg x 12 = 12
 Paratusin 1tab x 12 = 12
 Ambroxol 20/30 x 12 = 8

C. Perhitungan biaya resep


Racikan 1		
Codicaf 10mg	x 12	Rp. 13.958
Paratusin	x 12	Rp. 21.360
Ambroxol 30 mg	x 8	Rp. 4.400
Kapsul No. 00	x 12	Rp. 1.133
Embalase		Rp. 15.000
R/ Lameson 4 mg	x 8	Rp. 45.600
R/ Polycrol F tab	x 10	Rp. 8.500
R/ Omeprazole	x 8	Rp. 5.216
TOTAL TRANSAKSI		Rp. 115.167

D. Etiket

1. Nama Obat /warna etiket : Racikan 1 / putih

		BAPILNAS	
APOTEK KIMIA FARMA Jl. Kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597			
No. :		TGL : 09 Maret 2024	
NAMA PASIEN : Rubenda			
..... 3.....X sehari		1..... <u>Tablet / Kapsul / Bungkus</u>	
<u>Sebelum / Sesudah / Bersama</u> makan		<u>Pagi</u> <u>Siang</u> <u>Sore</u> <u>Malam</u>	
<i>(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)</i>			
Nama / Jumlah Obat		Racikan 1 / 12 Caps	
Tgl. Kadaluarsa			
(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)			

2. Nama Obat /warna etiket : Lameosn 4/ putih

	
--	--

ANTI RADANG

APOTEK KIMIA FARMA

Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK

APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm

SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

No. : TGL : **09 Maret 2024**

NAMA PASIEN : **Rubenda**

..... **2**X sehari **1** Tablet / Kapsul / Bungkus

Sebelum / Sesudah / Bersama makan

(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)

Pagi

Siang

Sore

Malam

Nama / Jumlah Obat **Lameson 4 / 8 Caps**

Tgl. Kadaluarsa

(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)

3. Nama Obat /warna etiket : Polycrol F / putih



Lambung

APOTEK KIMIA FARMA

Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK

APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm

SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

No. : TGL : **09 Maret 2024**

NAMA PASIEN : **Rubenda**

..... **3**X sehari **1** Tablet / Kapsul / Bungkus

Sebelum / Sesudah / Bersama makan

(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)

Pagi

Siang

Sore


Malam

Nama / Jumlah Obat **Polycrol F / 10 Caps**

Tgl. Kadaluarsa


(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)

4. Nama Obat /warna etiket : Omeprazole / putih

		 <p style="text-align: center;">LAMBUNG</p> <p>APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597</p> <p>No. : TGL : 09 Maret 2024</p> <p>NAMA PASIEN : Rubenda</p> <p>..... 2X sehari 1 <u>Tablet / Kapsul / Bungkus</u> <u>Sebelum / Sesudah / Bersama makan</u> <i>(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)</i></p> <p><u>Nama / Jumlah Obat</u> Omeprazole / 12 Caps <u>Tgl. Kadaluarsa</u> (hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)</p>			
		<p>E. Product Knowledge</p> <table border="1" data-bbox="943 774 2029 1359"> <tr> <td data-bbox="943 774 1487 1359"> <p>Nama Obat : Codicaf 10mg Kandungan : codein 20mg Dosis lazim :30-60 mg/hari Kegunaan : nyeri sedang hingga parah ESO potensial : sakit kepala, mulas, lemas kantuk, susah buang air kecil, halusinasi, haid tidak teratur KI : - PERHATIAN : - Cara penyimpanan : simpan ditempat yang sejuk dan kering, terlindung dari sinar matahari</p> </td> <td data-bbox="1487 774 2029 1359"> <p>Nama Obat : Paratusin Kandungan : Noscapine 10mg, clorpheniramine maleate 2 mg, glyceril guaiacolate 50 mg, Paracetamol 500mg, phenylpropanolamine HCl 15 mg Dosis lazim : 3 kali sehari 1 tab Kegunaan : untuk meringankan gejala- gela flu seperti demam, kepala pusing, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk ESO potensial : mengantuk, gangguan pencernaan, gangguan psikomotor, takikardi, aritmia, mulut kering. KI : gangguan fungsi hati berat, wanita usia subur karena mempunyai efek mutegenik yang potensial, hipersesitif</p> </td> </tr> </table>	<p>Nama Obat : Codicaf 10mg Kandungan : codein 20mg Dosis lazim :30-60 mg/hari Kegunaan : nyeri sedang hingga parah ESO potensial : sakit kepala, mulas, lemas kantuk, susah buang air kecil, halusinasi, haid tidak teratur KI : - PERHATIAN : - Cara penyimpanan : simpan ditempat yang sejuk dan kering, terlindung dari sinar matahari</p>	<p>Nama Obat : Paratusin Kandungan : Noscapine 10mg, clorpheniramine maleate 2 mg, glyceril guaiacolate 50 mg, Paracetamol 500mg, phenylpropanolamine HCl 15 mg Dosis lazim : 3 kali sehari 1 tab Kegunaan : untuk meringankan gejala- gela flu seperti demam, kepala pusing, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk ESO potensial : mengantuk, gangguan pencernaan, gangguan psikomotor, takikardi, aritmia, mulut kering. KI : gangguan fungsi hati berat, wanita usia subur karena mempunyai efek mutegenik yang potensial, hipersesitif</p>	
<p>Nama Obat : Codicaf 10mg Kandungan : codein 20mg Dosis lazim :30-60 mg/hari Kegunaan : nyeri sedang hingga parah ESO potensial : sakit kepala, mulas, lemas kantuk, susah buang air kecil, halusinasi, haid tidak teratur KI : - PERHATIAN : - Cara penyimpanan : simpan ditempat yang sejuk dan kering, terlindung dari sinar matahari</p>	<p>Nama Obat : Paratusin Kandungan : Noscapine 10mg, clorpheniramine maleate 2 mg, glyceril guaiacolate 50 mg, Paracetamol 500mg, phenylpropanolamine HCl 15 mg Dosis lazim : 3 kali sehari 1 tab Kegunaan : untuk meringankan gejala- gela flu seperti demam, kepala pusing, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk ESO potensial : mengantuk, gangguan pencernaan, gangguan psikomotor, takikardi, aritmia, mulut kering. KI : gangguan fungsi hati berat, wanita usia subur karena mempunyai efek mutegenik yang potensial, hipersesitif</p>				

			<p>PERHATIAN : gangguan hati dan ginjal, glukoma, hipertrofi prostat, hipertiroid dan retensi urine</p> <p>Cara penyimpanan : simpan ditempat yang sejuk dan kering, terlindung dari sinar matahari</p>
		<p>Nama Obat : Ambroxol 30 Kandungan : Ambroxol 30 Dosis lazim : 30 mg, 2-3 kali sehari Kegunaan : saluran pernafasan akut dan kronis ESO potensial : mual, muntah, diare, sakit perut KI : hipersensitif PERHATIAN : tukak lambung atau dodenum, gangguan ginjal dan hati, anak-anak Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>Nama Obat : lameson 4 Kandungan : methylprednisolon 4 mg Dosis lazim : 4/80 mg/hari Kegunaan : alergi atau mengurangi peradangan ESO potensial : insomnia, tukak lambung, hipertensi KI : infeksi jamur sistemik PERHATIAN : TBC, ulkus peptikum, infeksi jamur sistemik, herpes simpleks. Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>
		<p>Nama Obat : Polycrol F Kandungan : Activeted metilpolysilozane 125 mg, Mh (OH)₂ 100mg, Al(OH)₃- mg carbonate 275 mg Dosis lazim : 1-2 tablet dikunyah Kegunaan : sakit maag, ulkus/ tukak lambung, Hiperasiditas, perut kembung ESO potensial : mual KI : Hipersensitivitas PERHATIAN : Diet rendah fosfat, pemakaian jangka panjang Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>Nama Obat : Omeprazole Kandungan : Omeprazole 20mg Dosis lazim : 2 kali sehari 1 tab Kegunaan : pengobatan jangka pendek untuk tukak lambung dan tukak deudenum. ESO potensial : mual, muntah, diare, konstipasi, perut kembung, sakit perut KI : hipersensitivitas PERHATIAN : perhatian khusus kepada pasien dengn penurunan simpanan tubuh atau faktor risiko penurunan penyerapan vitamin B12</p>

			<p>Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>																		
18	<p>Jenis Resep : Resep asli Resep obat : Racikan/ non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/ tidak Pengulangan resep : iter..... kali / neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p>	<p>F. Tahap pembuatan</p> <p>Racikan 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siapkan obat yang akan diracik 2. Obat yang sudah di siapkan dibuka dan obat tersebut dimasukan kedalam belender 3. Kemudian obat diayak dan dimasukan kedalam kapsul 4. Lalu kapsul di tutup dan dimasukan ke dalam pot kapsul dan di beri etiket <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Atas nama Rubenda. Ini ada 4 macam obat, ada 1 racikan untuk batuk pilek panas diminum 2 kali sehari setelah makan. ini lameson 4 untuk radang diminum 2 kali sehari, sesudah makan. ini Polycrol Forte untuk lambung, diminum 3 kali sehari setelah makan. ini omeprazole untuk lambung diminum 2 kali sehari pagi sama malam, sebelum makan. . Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.</p> <p>A. Skrining Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="927 882 1794 1372"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Ny. Siswantin</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Glucoryl 3 R/ Glucophage XR 500 R/ Cinolon N 10gr Sagestam 10gr</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Cinolon N 10gr Sagestam 10gr (Unguentum)</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Glucoryl 3 (30) R/ Glucophage XR 500 (30) R/ Cinolon N 10gr (1) Sagestam 10gr(1)</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Ny. Siswantin	Umur pasien :	Tidak ada	-	Berat Badan :	Tidak ada	-	Nama Obat :	Ada	R/ Glucoryl 3 R/ Glucophage XR 500 R/ Cinolon N 10gr Sagestam 10gr	Bentuk sed. :	Ada	R/ Cinolon N 10gr Sagestam 10gr (Unguentum)	Jumlah obat :	Ada	R/ Glucoryl 3 (30) R/ Glucophage XR 500 (30) R/ Cinolon N 10gr (1) Sagestam 10gr(1)	
Nama Pasien :	Ada	Ny. Siswantin																			
Umur pasien :	Tidak ada	-																			
Berat Badan :	Tidak ada	-																			
Nama Obat :	Ada	R/ Glucoryl 3 R/ Glucophage XR 500 R/ Cinolon N 10gr Sagestam 10gr																			
Bentuk sed. :	Ada	R/ Cinolon N 10gr Sagestam 10gr (Unguentum)																			
Jumlah obat :	Ada	R/ Glucoryl 3 (30) R/ Glucophage XR 500 (30) R/ Cinolon N 10gr (1) Sagestam 10gr(1)																			



		(Unguentum 1)
Duplikasi terapi :	Tidak ada	-
Aturan pakai :	Ada	R/ Glucoryl 3 (3 kali sehari pasi dan malam, sebelum makan) R/ Glucophage XR 500 (2 kali sehari siang dan malam, setelah makan) R/ Cinolon N 10gr Sagestam 10gr (Obat luar, oleh tipis-tipis)
Tanggal penulisan resep :	Ada	02 Maret 2024
Nama dokter :	Ada	Dr. Zulvia Vatan
Surat ijin :	Tidak ada	-
Alamat dr. :	Tidak ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi

R/ Glucoryl 3 (30)
R/ Glucophage XR 500 (30)
R/ Cinolon N 10gr (1)
Sagestam 10gr(1)
(Unguentum 1)

C. Perhitungan biaya resep


R/ Glucoryl 3	x 30	Rp. 203.070
R/ Glucophage XR 500	x 30	Rp. 102.800
Resep 1		
Cinolon N 10gr	x1	Rp. 17.500
Sagestam 10gr	x1	Rp.
Pot salep	x1	Rp. 3.000
Embalase		Rp. 15.000

TOTAL TRANSAKSI


Rp.

D. Etiket

1. Nama Obat /warna etiket : Glucoryl 3/ putih

 kimia farma	Diabetes
APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	
No. : TGL : 09 Maret 2024	
NAMA PASIEN : Ny. Siswanti	
..... 2.....X sehari..... 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus Sebelum / Sesudah / Bersama makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)	Pagi Siang Sore Malam
Nama / Jumlah Obat Glucoryl 3 / 12 Caps Tgl. Kadaluaarsa (hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)	

2. Nama Obat /warna etiket :Glucopage XR 500/ putih

 kimia farma	Diabetes
APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	
No. : TGL : 09 Maret 2024	
NAMA PASIEN : Ny. Siswanti	
..... 2.....X sehari..... 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus Sebelum / Sesudah / Bersama makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)	Pagi Siang Sore Malam
Nama / Jumlah Obat Glucopage XR / 12 Caps Tgl. Kadaluaarsa (hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)	


3. Nama Obat /warna etiket : Racikan 1/ biru



E. Product Knowledge

<p>Nama Obat : Glucoryl 3 Kandungan : Glimепiride 3 Metformin HCl 500mg Dosis lazim : 1 kali sehari 1 tab Kegunaan : diabetes melitus tipe 2 ESO potensial : hipoglikemia, gangguan penglihatan sementara, mual, muntah KI : hipersensitif PERHATIAN : Risiko hipoglikomia Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>Nama Obat : Glucopage XR 500 Kandungan : Metformin Hidroclorid 500 mg Dosis lazim : 1 kali sehari 1 tab Kegunaan : diabetes ESO potensial : ruam kulit, Anoreksia, mual, muntah, diare KI : hipersensitifitas PERHATIAN : hipersensitivitas Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>
<p>Nama Obat : Cinolon N Kandungan : Flucinolane Acetonide 0,025% Dosis lazim : oleskan 2-4 kali sehari Kegunaan : dermatitis yang disertai infeksi ESO potensial : iritasi, rasa terbakar, gatal, kekeringan kulit</p>	<p>Nama Obat : Sagestam Kandungan : Gentamisin 0,1% Dosis lazim : oleskan 3-4 kali sehari Kegunaan : infeksi kulit primer seperti folikulitis superfisial ESO potensial : iritasi kulit, fotosensitisasi KI : hipersensitivitas</p>

		<p>KI : hipersensitivitas PERHATIAN : hindari penggunaan lama pada bayi dan anak- wanita hamil Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>PERHATIAN : jika terjadi infeksi harus dihentikan. Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>																								
		<p>F. Tahap pembuatan</p> <p>Racikan 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siapkan obat yang diperlukan 2. Masukkan obat ke dalam mortir kemudian gerus ad homogen 3. Masukkan ke dalam pot salep dan beri etiket <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Atas nama Ny Siswanti. Ini ada 3 macam obat. Yang ini racikan salem untuk iritasi kulit, dioles titip-tipis dibagian yang sakit. Ini glucoryl 3 untuk diabetes. Diminum 2 kali sehari pagi dan malam, sebelum makan. kemudian ini glukopage Xr untuk diabetes diminum 2 kali, setelah makan. . Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.</p>																									
19	<p>Jenis Resep : Salinan/ Resep asli Resep obat : Racikan/ non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/ tidak Pengulangan resep : iter..... kali / neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p>	<p>A. Skrining Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="927 951 1794 1374"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Tn.M. Syafi'i</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada</td> <td>52 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Bisoprolol 5mg Amlodipipin 5 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>Bisoprolol 5mg (30) Amlodipipin 5 mg(30)</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>Bisoprolol 5mg (pagi hari) Amlodipipin 5 mg (malam hari)</td> </tr> </table>		Nama Pasien :	Ada	Tn.M. Syafi'i	Umur pasien :	Ada	52 tahun	Berat Badan :	Tidak ada	-	Nama Obat :	Ada	Bisoprolol 5mg Amlodipipin 5 mg	Bentuk sed. :	Tidak ada	-	Jumlah obat :	Ada	Bisoprolol 5mg (30) Amlodipipin 5 mg(30)	Duplikasi terapi :	Tidak ada	-	Aturan pakai :	Ada	Bisoprolol 5mg (pagi hari) Amlodipipin 5 mg (malam hari)
Nama Pasien :	Ada	Tn.M. Syafi'i																									
Umur pasien :	Ada	52 tahun																									
Berat Badan :	Tidak ada	-																									
Nama Obat :	Ada	Bisoprolol 5mg Amlodipipin 5 mg																									
Bentuk sed. :	Tidak ada	-																									
Jumlah obat :	Ada	Bisoprolol 5mg (30) Amlodipipin 5 mg(30)																									
Duplikasi terapi :	Tidak ada	-																									
Aturan pakai :	Ada	Bisoprolol 5mg (pagi hari) Amlodipipin 5 mg (malam hari)																									



Tanggal penulisan resep :	Ada	07 Februari 2024
Nama dokter :	Ada	-
Surat ijin :	Ada	-
Alamat dr. :	ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi

-

C. Perhitungan biaya resep

Bisoprolol 5 mg	x 30	Rp. 12.900
Amlodipin 5 mg	x 30	Rp. 6.600
TOTAL TRANSAKSI		Rp. 19.500

D. Etiket

1. Nama Obat /warna etiket :

kimia farma
APOTEK KIMIA FARMA
 Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
 APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S. Farm
 SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

No. : TGL : 7 Februari 2024

NAMA PASIEN : Tn M. Syafi'i

..... 1.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus

Sebelum / Sesudah / Bersama makan

(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)

Nama / Jumlah Obat **Bisoprolol 5 mg / 30 (tensi)**

Tgl. Kadaluarsa

(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)

2. Nama Obat / warna etiket :



APOTEK KIMIA FARMA

Jl. Kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK

APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm

SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

No. : TGL : 7 Februari 2024

NAMA PASIEN : Tn M. Syafi'i

..... 1.....X sehari..... 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus
Sebelum / Sesudah / Bersama makan
(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)

Pagi
Siang
Sore
Malam


Nama / Jumlah Obat amlodipin 5 mg / 30 (tensi)
Tgl. Kadaluarsa

(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)

E. Product Knowledge

Nama Obat : Bisoprolol 5 mg Fa
Kandungan : Bisoprolol 5 mg
Dosis lazim : 5-10 mg/hari
Kegunaan : hipertensi, angina, gagal jantung kronik, bronkospastik, gangguan hati
ESO potensial : kram, abdomen, diare, pusing, sakit kepala, mual, denyut jantung lambat, tekanan darah rendah.
KI : hipersensitif, gagal jantung akut atau selama episode dekomposisi gagal jantung yang memerlukan terapi intravena intropik
PERHATIAN : bronkospasme (asma bronkial, penyakit saluran nafas obstruktif).
Cara penyimpanan : simpan ditempat yang sejuk dan kering, terlindung dari sinar matahari

Nama Obat : Amlodipin 5mg
Kandungan : Amlodipin 5 mg
Dosis lazim : 1 kali sehari 5mg
Kegunaan : hipertensi
ESO potensial : sakit kepala, pusing, mengantuk, debaran jantung
KI : hipersensitif
PERHATIAN : gagal jantung, kehamilan dan laktasi
Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung

		<p>F. Tahap pembuatan</p> <p>-</p> <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Atas nama Tn. M. Syafi'i. Ini ada 2 macam obat. Yang ini bisoprolol diminum pagi setelah maka. Ini amlodipin digunakan untuk tensi diminum malam setelah makan. . Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.</p>																											
20	<p>Jenis Resep : Salinan/ Resep asli Resep obat : Racikan/ non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/ tidak) Pengulangan resep : iter..... kali / neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrining Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Ny. Aleeya</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada</td> <td>2 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Tremenza syr 60 ml R/ Proris suspensi 60 ml R/ Apialys syr</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Tidak ada</td> <td>R/ Tremenza syr 60 ml R/ Proris suspensi 60 ml R/ Apialys syr</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Tremenza syr 60 ml (1) R/ Proris suspensi 60 ml (1) R/ Apialys syr (1)</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak ada</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Tremenza syr 60 ml (3 kali sehari ½ sendok teh) R/ Proris suspensi 60 ml (2 kali sehari ½ sendok teh) R/ Apialys syr (1 kali sehari 1 sendok teh)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada</td> <td>12 Februari 2024</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Ny. Aleeya	Umur pasien :	Ada	2 tahun	Berat Badan :	Tidak ada	-	Nama Obat :	Ada	R/ Tremenza syr 60 ml R/ Proris suspensi 60 ml R/ Apialys syr	Bentuk sed. :	Tidak ada	R/ Tremenza syr 60 ml R/ Proris suspensi 60 ml R/ Apialys syr	Jumlah obat :	Ada	R/ Tremenza syr 60 ml (1) R/ Proris suspensi 60 ml (1) R/ Apialys syr (1)	Duplikasi terapi :	Tidak ada	=	Aturan pakai :	Ada	R/ Tremenza syr 60 ml (3 kali sehari ½ sendok teh) R/ Proris suspensi 60 ml (2 kali sehari ½ sendok teh) R/ Apialys syr (1 kali sehari 1 sendok teh)	Tanggal penulisan resep :	Ada	12 Februari 2024
Nama Pasien :	Ada	Ny. Aleeya																											
Umur pasien :	Ada	2 tahun																											
Berat Badan :	Tidak ada	-																											
Nama Obat :	Ada	R/ Tremenza syr 60 ml R/ Proris suspensi 60 ml R/ Apialys syr																											
Bentuk sed. :	Tidak ada	R/ Tremenza syr 60 ml R/ Proris suspensi 60 ml R/ Apialys syr																											
Jumlah obat :	Ada	R/ Tremenza syr 60 ml (1) R/ Proris suspensi 60 ml (1) R/ Apialys syr (1)																											
Duplikasi terapi :	Tidak ada	=																											
Aturan pakai :	Ada	R/ Tremenza syr 60 ml (3 kali sehari ½ sendok teh) R/ Proris suspensi 60 ml (2 kali sehari ½ sendok teh) R/ Apialys syr (1 kali sehari 1 sendok teh)																											
Tanggal penulisan resep :	Ada	12 Februari 2024																											

Nama dokter :	Ada	Dr. Muhammad Alim
Surat ijin :	Ada	SIP : 503.446?2273/SIP.OU/7/2/2017
Alamat dr. :	Tidak ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi


R/ Tremenza syr 60 ml (1)
R/ Proris suspensi 60 ml (1)
R/ Apialys syr (1))

C. Perhitungan biaya resep


R/ Tremenza syr 60 ml	x 1	Rp. 30.860
R/ Proris suspensi 60 ml	x 1	Rp. 32.700
R/ Apialys syr	x 1	Rp. 50.616
TOTAL TRANSAKSI		Rp. 114.178

D. Etiket


1. Nama Obat /warna etiket : Tremenza syr 60 ml/ putih

		Pilek/ flu
APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597		
Tgl. 16 Februari 2024	No. R/ An Aleeya	2.th
SEHARI :3..... X1/2..... Sebelum / Sesudah makan	SENDOK <u>TEH</u> <u>BUBUR</u> <u>MAKAN</u>	
KOCOK DULU		

2. Nama Obat /warna etiket : Proris suspensi 60 ml/ putih

		Nyeri (bila nyeri)	
APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597			
Tgl. 16 Februari 2024		No. R/	
		An Aleeya	
		2.th	
SEHARI :2..... X1/2.....		TEH BUBUR MAKAN	
Sebelum / Sesudah makan			
KOCOK DULU			

3. Nama Obat /warna etiket : Apialys syr/ putih


		Vitamin	
APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597			
Tgl. 16 Februari 2024		No. R/	
		An Aleeya	
		2.th	
SEHARI :1..... X1.....		TEH BUBUR MAKAN	
Sebelum / Sesudah makan			
KOCOK DULU			

E. Product Knowledge

Nama Obat : Tremenza syr 60 ml Kandungan : Pseudoepedrine HCl 30 ml, Triprolidine HCl 1,25 Dosis lazim :	Nama Obat : Proris suspensi 60 ml Kandungan : ibuprofen 100mg Dosis lazim : 3-4 kali/ hari 1 sendok takar
---	--

		<p>Dewasa dan anak > 12 tahun : 3 kali sehari 2 sendok takar (@10 ml) Anak-anak 6- 12 tahun : 3 kali sehari 1 sendok takar (@5 ml) Anak-anak 2- 5 tahun : 3 kali sehari ½ sendok takar (@2,5 ml) Kegunaan : gejala flu ESO potensial :tenggorokan kering, mengantuk, pusing, insomnia KI :penyakit saluran pernafasan bawah, termasuk asma, hipertensi, glukoma, diabetes PERHATIAN : ibu hamil dan menyusui Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p> <hr/> <p>Nama Obat : Apialys syr Kandungan : Vitamin A 5000 IU, vit B1 3 mg, vit B2 2 mg, vit B6 6 mg, vit B12 5 mcg, vit C 50 mg, vit D 400 IU, nicotinamide 20 mg, lysine HCl 250 mg, d- pantothenol 5 mg, l- glutamic acid 25 mg Dosis lazim : 1 kali 1-2 sendok takar Kegunaan : vitamin, penambah nafsu makan, membantu pertumbuhan tulang dan gigi ESO potensial : hipersensitivitas KI : hipersensitivitas PERHATIAN :kocok dulu sebelum diminum, hentikan jika terjadi alergi Cara penyimpanan :</p>	<p>Kegunaan :nyeri ringan pada penyakit gigi, nyeri pasca bedah, sakit kepala. ESO potensial : dispepsia, diare, mual, muntah, nyeri abdomen KI : penderita dengan ulkus peptikum (tukak lambung dan deudonum) PERHATIAN : lansia, kehamilan, persalinan, menyusui Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>
		F. Tahap pembuatan	

		-																								
		<p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Atas nama An. Aleeya. Ini ada 3 macam obat. Ini tremenza digunakan untuk pilek diminum 3 kali sehari ½ sendok teh, setelah makan. ini proris untuk nyeri, diminum 2 kali sehari ½ sendok teh jika nyeri, setelah makan. ini apialys untuk penambah nafsu makan diminum 1 kali sehari 1 sendok teh. Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.</p>																								
21	<p>Jenis Resep : Salinan/ Resep asli Resep obat : Racikan/ non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/ tidak Pengulangan resep : iter..... kali / neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p>	<p>A. Skrining Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Tn Ena</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ lipitor 10mg R/ Glimepiride 4 mg R/ Cerini 10 R/ aleoris</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada</td> <td>R/ lipitor 10mg tab R/ Glimepiride 4 mg tab R/ Cerini 10 tab R/ aleoris tab</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ lipitor 10mg (10) R/ Glimepiride 4 mg (20) R/ Cerini 10 (20) R/ aleoris (60)</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>R/ lipitor 10mg (1 kali sehari tab) R/ Glimepiride 4 mg (1 kali sehari tab) R/ Cerini 10 (1 kali sehari tab) R/ aleoris (2 kali sehari tab)</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Tn Ena	Umur pasien :	Tidak ada	-	Berat Badan :	Tidak ada	-	Nama Obat :	Ada	R/ lipitor 10mg R/ Glimepiride 4 mg R/ Cerini 10 R/ aleoris	Bentuk sed. :	Ada	R/ lipitor 10mg tab R/ Glimepiride 4 mg tab R/ Cerini 10 tab R/ aleoris tab	Jumlah obat :	Ada	R/ lipitor 10mg (10) R/ Glimepiride 4 mg (20) R/ Cerini 10 (20) R/ aleoris (60)	Duplikasi terapi :	Tidak ada	-	Aturan pakai :	Ada	R/ lipitor 10mg (1 kali sehari tab) R/ Glimepiride 4 mg (1 kali sehari tab) R/ Cerini 10 (1 kali sehari tab) R/ aleoris (2 kali sehari tab)
Nama Pasien :	Ada	Tn Ena																								
Umur pasien :	Tidak ada	-																								
Berat Badan :	Tidak ada	-																								
Nama Obat :	Ada	R/ lipitor 10mg R/ Glimepiride 4 mg R/ Cerini 10 R/ aleoris																								
Bentuk sed. :	Ada	R/ lipitor 10mg tab R/ Glimepiride 4 mg tab R/ Cerini 10 tab R/ aleoris tab																								
Jumlah obat :	Ada	R/ lipitor 10mg (10) R/ Glimepiride 4 mg (20) R/ Cerini 10 (20) R/ aleoris (60)																								
Duplikasi terapi :	Tidak ada	-																								
Aturan pakai :	Ada	R/ lipitor 10mg (1 kali sehari tab) R/ Glimepiride 4 mg (1 kali sehari tab) R/ Cerini 10 (1 kali sehari tab) R/ aleoris (2 kali sehari tab)																								



Tanggal penulisan resep	Ada	17 Februari 2-24
Nama dokter :	Ada	Dr. Muhammad Alim
Surat ijin :	Ada	SIP : 503.446?2273/SIP.OU/7/2/2017
Alamat dr. :	Tidak ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi

R/ lipitor 10mg (10)
R/ Glimepiride 4 mg (20)
R/ Cerini 10 (20)
R/ aleoris (60)

C. Perhitungan biaya resep

R/ lipitor 10mg	x 30	Rp. 823.410
R/ Glimepiride 4 mg	x 30	Rp. 45.000
R/ Cerini 10 mg	x 30	Rp. 150.600
R/ Aleoris	x 30	Rp. 390.600
TOTAL TRANSAKSI		Rp. 1.409.610


D. Etiket

1. Nama Obat /warna etiket : Lipitor 10mg/ putih

<p>kimia farma APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597</p>	
No. : TGL : 17 Februari 2024	
NAMA PASIEN : Tn Ena	
..... 1.X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus	Pagi
Sebelum / Sesudah / Bersama makan	Siang
(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)	Sore
Malam	
Nama / Jumlah Obat	Lipitor 10 mg / 10 (kolesterol)

Tgl. Kadaluarsa
(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)

2. Nama Obat /warna etiket : Glimpiride 4mg


 APOTEK KIMIA FARMA Jl. Kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	
No. : TGL : 17 Februari 2024	
NAMA PASIEN : Tn Ena	
..... 1.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus Sebelum / Sesudah / Bersama makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)	Pagi Siang Sore Malam
Nama / Jumlah Obat	Glimpiride 4 mg / 20 (gula)
Tgl. Kadaluarsa (hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)	

3. Nama Obat /warna etiket : Cerini / puth

 APOTEK KIMIA FARMA Jl. Kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	
No. : TGL : 17 Februari 2024	

		<p>NAMA PASIEN : Tn Ena</p> <p>..... 1.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus Sebelum / Sesudah / Bersama makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)</p>	<p>Pagi Siang Sore Malam</p>
		<p>Nama / Jumlah Obat Lipitor 10 mg / 20 (alergi) Tgl. Kadaluarsa (hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)</p>	
<p>4. Nama Obat /warna etiket : Aleoris / putih</p>			
<p>kimia farma APOTEK KIMIA FARMA Jl. Kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597</p>			
<p>No. : TGL : 17 Februari 2024</p>			
		<p>NAMA PASIEN : Tn Ena</p> <p>..... 2.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus Sebelum / Sesudah / Bersama makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)</p>	<p>Pagi Siang Sore Malam</p>
		<p>Nama / Jumlah Obat Aleoris/ 10 (flu/ pilek) Tgl. Kadaluarsa (hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)</p>	
<p>E. Product Knowledge</p>			
		<p>Nama Obat : Lipitor 10 Kandungan : Actovastatin Calcium Trihydrate 10 mg Dosis lazim : 1 kali sehari</p>	<p>Nama Obat : Glimepiride 4mg Kandungan : Glimepiride 4mg Metformin HCl 500mg Dosis lazim : 1 kali sehari 1 tab</p>

		<p>Kegunaan : menurunkan kolestrol total, kolestrol LDL ESO potensial : konstipasi, sakit kepala, mual, diare, sakit perut, dispepsia, perut kembung, hepatitis KI : hipersensitif, Penyakit hati aktif atau peningkatan serum transaminase PERHATIAN : wanita hamil dan kemungkinan hamil Cara penyimpanan : simpan ditempat yang sejuk dan kering, terlindung dari sinar matahari</p>	<p>Kegunaan : diabetes melitus tipe 2 ESO potensial : hipoglikemia, gangguan pengelihan sementara, mual, muntah KI : hipersensitif PERHATIAN : Risiko hipoglikomia Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>
		<p>Nama Obat : Cerini 10mg Kandungan : Cetirizine Dosis lazim : 1 kali sehari 1 tab Kegunaan : meredakan gejala alergi ESO potensial : kantuk, sakit kepala, lelah, sakit tenggorokan atau batuk, diare KI : hipersensitifitas, gangguan ginjal berat PERHATIAN : tidak boleh diminum orang yang alergi terhadap cetirizine Cara penyimpanan : simpan ditempat yang sejuk dan kering, terlindung dari sinar matahari</p>	<p>Nama Obat : Aleoris Kandungan : Loratadine 10 mg Dosis lazim : dewasa dan anak-anak 12 thn : 1 tablet sehari Kegunaan : untuk menyembukan gejala-gejala yang berhubungan dengan rinitis alergi seperti ; bersin-bersin, pilk dan rasa gatal serta rasa terbakar pada mata ESO potensial : lelah, mual, sakit kepala KI : hipersensitif PERHATIAN : gangguan hati atau ginjal yang parah. Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>
		<p>F. Tahap pembuatan</p>	

		<p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Atas nama Tn. Ena. Ini obat nya ada 4 macam. Ini lipitor untuk kolestrol, diminum 1 kali sehari setelah makan. ini Glimепiride 4 untuk gula, diminum 1 kali sehari setelah makan. ini cerini untuk alergi, diminum 1 kali sehari setelah makan. ini Aleoris untuk pilek atau flu, diminum 2 kali sehari setelah makan. Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.</p>																																												
22	<p>Jenis Resep : Salinan/ Resep asli Resep obat : Racikan/ non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/ tidak Pengulangan resep : iter..... kali / neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrining Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="927 485 1796 1090"> <tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada</td><td>Ferry R</td></tr> <tr><td>Umur pasien :</td><td>Tidak ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Berat Badan :</td><td>Tidak ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada</td><td>R/ Antasida doen R/ alpara</td></tr> <tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Tidak ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada</td><td>R/ Antasida doen (10) R/ alpara (10)</td></tr> <tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Tidak ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada</td><td>R/ Antasida doen (3 kali sehari) R/ alpara (3 kali sehari)</td></tr> <tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada</td><td>22 Februari 2024</td></tr> <tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada</td><td>HN</td></tr> <tr><td>Surat ijin :</td><td>Tidak ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Alamat dr. :</td><td>Tidak ada</td><td>-</td></tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi</p> <table border="1" data-bbox="927 1161 2033 1233"> <tr><td>R/ Antasida doen (10)</td></tr> <tr><td>R/ alpara (10)</td></tr> </table> <p>C. Perhitungan biaya resep</p> <table border="1" data-bbox="927 1305 2033 1374"> <tr><td>R/ Antasida doen</td><td>x 10</td><td>Rp. 2.500</td></tr> <tr><td>R/ alpara</td><td>x 10</td><td>Rp. 10.900</td></tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Ferry R	Umur pasien :	Tidak ada	-	Berat Badan :	Tidak ada	-	Nama Obat :	Ada	R/ Antasida doen R/ alpara	Bentuk sed. :	Tidak ada	-	Jumlah obat :	Ada	R/ Antasida doen (10) R/ alpara (10)	Duplikasi terapi :	Tidak ada	-	Aturan pakai :	Ada	R/ Antasida doen (3 kali sehari) R/ alpara (3 kali sehari)	Tanggal penulisan resep :	Ada	22 Februari 2024	Nama dokter :	Ada	HN	Surat ijin :	Tidak ada	-	Alamat dr. :	Tidak ada	-	R/ Antasida doen (10)	R/ alpara (10)	R/ Antasida doen	x 10	Rp. 2.500	R/ alpara	x 10	Rp. 10.900
Nama Pasien :	Ada	Ferry R																																												
Umur pasien :	Tidak ada	-																																												
Berat Badan :	Tidak ada	-																																												
Nama Obat :	Ada	R/ Antasida doen R/ alpara																																												
Bentuk sed. :	Tidak ada	-																																												
Jumlah obat :	Ada	R/ Antasida doen (10) R/ alpara (10)																																												
Duplikasi terapi :	Tidak ada	-																																												
Aturan pakai :	Ada	R/ Antasida doen (3 kali sehari) R/ alpara (3 kali sehari)																																												
Tanggal penulisan resep :	Ada	22 Februari 2024																																												
Nama dokter :	Ada	HN																																												
Surat ijin :	Tidak ada	-																																												
Alamat dr. :	Tidak ada	-																																												
R/ Antasida doen (10)																																														
R/ alpara (10)																																														
R/ Antasida doen	x 10	Rp. 2.500																																												
R/ alpara	x 10	Rp. 10.900																																												

TOTAL TRANSAKSI

Rp. 13.400

D. Etiket

1. Nama Obat /warna etiket : Antasida Doen / putih

 APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	
No. :	TGL : 22 Februari 2024
NAMA PASIEN : Tn. Ferry R	
..... 3.....X sehari..... 1.....	Tablet / Kapsul / Bungkus
Sebelum / Sesudah / Bersama makan	Pagi Siang Sore Malam
(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)	
Nama / Jumlah Obat	antasida doen / 10 (MAAG)
Tgl. Kadaluarsa	
(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)	

2. Nama Obat /warna etiket : Alpara / Putih


 APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK	
--	--

APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	
No. : TGL : 22 Februari 2024 NAMA PASIEN : Tn. Ferry R	
..... 3.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus Sebelum / Sesudah / Bersama makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)	Pagi Siang Sore Malam
Nama / Jumlah Obat Tgl. Kadaluarsa	Alpara / 10 (BAPILNAS) (hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)

E. Product Knowledge

Nama Obat : Antasida Doen
 Kandungan : Aluminium Hydrozide 200mg, Magnesium Hydroxide 200mg
 Dosis lazim : 3-4 kali sehari 1-2 tab
 Kegunaan : sakit maag
 ESO potensial : Nyeri perut, konstipasi, diare, mual, muntah
 KI : disfungsi ginjal berat, hipersensitif.
 PERHATIAN : hamil dan laktasi
 Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung

Nama Obat : Alpara
 Kandungan : paracetamol 500mg, phenypropanolamine HCl 12,5mg, chloropinamine meleate 2mg, dextromethorphan HBr 15mg
 Dosis lazim : 3 kali sehari 1 tab
 Kegunaan : meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat dan bersin-bersin yang disertai batuk
 ESO potensial : mengantuk, gangguan pencernaan, gangguan psikomotorik, takikardia.
 KI : gangguan jantung dan diabetes
 PERHATIAN : tidak boleh saat mengendarai kendaraan, gangguan fungsi hati dan ginjal
 Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung

		<p>F. Tahap pembuatan</p> <p>-</p> <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Atas nama Ferry. Ini ada 2 macam obatnya. Ini Antasida doen untuk sakit maag, diminum 3 kali segari sebelum makan. ini alpara untuk bapilnas, diminum 3 kali sehari sesudah makan. Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.</p>																																				
23	<p>Jenis Resep : Salinan/ Resep asli Resep obat : Racikan/ non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/ tidak Pengulangan resep : iter..... kali / neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrining Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="927 560 1794 1233"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Ny. Astin</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada</td> <td>31 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Clinamycin 300 mg R/ Asam Mefenamat 5mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Clinamycin 300 mg (10) R/ Asam Mefenamat 5mg (10)</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Clinamycin 300 mg (2 kali sehari) R/ Asam Mefenamat 5mg (jika perlu)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada</td> <td>19 Februari 2024</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada</td> <td>Aditya T.N.P</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi</p> <p>R/ Clinamycin 300 mg (10) R/ Asam Mefenamat 5mg (10)</p>	Nama Pasien :	Ada	Ny. Astin	Umur pasien :	Ada	31 tahun	Berat Badan :	Tidak ada	-	Nama Obat :	Ada	R/ Clinamycin 300 mg R/ Asam Mefenamat 5mg	Bentuk sed. :	Tidak ada	-	Jumlah obat :	Ada	R/ Clinamycin 300 mg (10) R/ Asam Mefenamat 5mg (10)	Duplikasi terapi :	Tidak ada	-	Aturan pakai :	Ada	R/ Clinamycin 300 mg (2 kali sehari) R/ Asam Mefenamat 5mg (jika perlu)	Tanggal penulisan resep :	Ada	19 Februari 2024	Nama dokter :	Ada	Aditya T.N.P	Surat ijin :	Tidak ada	-	Alamat dr. :	Tidak ada	-
Nama Pasien :	Ada	Ny. Astin																																				
Umur pasien :	Ada	31 tahun																																				
Berat Badan :	Tidak ada	-																																				
Nama Obat :	Ada	R/ Clinamycin 300 mg R/ Asam Mefenamat 5mg																																				
Bentuk sed. :	Tidak ada	-																																				
Jumlah obat :	Ada	R/ Clinamycin 300 mg (10) R/ Asam Mefenamat 5mg (10)																																				
Duplikasi terapi :	Tidak ada	-																																				
Aturan pakai :	Ada	R/ Clinamycin 300 mg (2 kali sehari) R/ Asam Mefenamat 5mg (jika perlu)																																				
Tanggal penulisan resep :	Ada	19 Februari 2024																																				
Nama dokter :	Ada	Aditya T.N.P																																				
Surat ijin :	Tidak ada	-																																				
Alamat dr. :	Tidak ada	-																																				

C. Perhitungan biaya resep

R/ Clinamycin 300 mg	x 10	Rp. 19.500
R/ Asam Mefenamat 5mg	x 10	Rp. 4.500
TOTAL TRANSAKSI		Rp. 24.000

D. Etiket

1. Nama Obat /warna etiket : Clindamicin/ putih


 APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	
No. : TGL. : 19 Februari 2024	
NAMA PASIEN : Ny. Astin	
..... 2X sehari 1 Sebelum / Sesudah / Bersama makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)	Pagi Siang Sore Malam
Nama / Jumlah Obat	Clindamicyn /10
Tgl. Kadaluarsa	
(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)	

2. Nama Obat /warna etiket : Asam mefenamat/ putih

 APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	Bila nyeri
---	------------

		<p>No. : TGL. : 19 Februari 2024 NAMA PASIEN : Ny. Astin</p> <p>.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus Sebelum / Sesudah / Bersama makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)</p> <p>Pagi Siang Sore Malam</p> <p>Nama / Jumlah Obat Asam Mefenamat /10 Tgl. Kadaluarsa</p> <p>(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)</p>			
24	Jenis Resep : Salinan/ Resep asli	<p>E. Product Knowledge</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="943 563 1487 1015"> <p>Nama Obat : clindamycin Kandungan : clindamicyn 300mg Dosis lazim : Dewasa 150-450 mg 4 x sehari; anak > 1 bulan 8-25 mg/kgBB/hari; anak < 10 kg awal 37.5 mg. Infeksi strep hemolitik, lama terapi dianjurkan 5-10 hari Kegunaan : mengobati infeksi bakteri ESO potensial : KI : hipersensitif PERHATIAN : riwayat penyakit gastrointestinal Cara penyimpanan : Suhu di bawah 30 °C</p> </td> <td data-bbox="1487 563 2029 1015"> <p>Nama Obat : Asam mefenamat Kandungan : asam mefenamat 500 mg Dosis lazim : 3 kali sehari 1 tablet Kegunaan : mengatasi nyeri ESO potensial : mual, muntah KI : hipersensitivitas PERHATIAN : informasikan kedokter jika hamil atau menyusui Cara penyimpanan : Suhu di bawah 30 °C</p> </td> </tr> </table> <p>F. Tahap pembuatan</p> <p>-</p> <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Atas nama Ny. astin. Ini ada 2 macam obat. Ini clindamicyn untuk infeksi, diminum 2 kali sehari setelah makan. kemudian ini asam mefenamat untuk nyeri, diminum bila nyeri. Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.</p>	<p>Nama Obat : clindamycin Kandungan : clindamicyn 300mg Dosis lazim : Dewasa 150-450 mg 4 x sehari; anak > 1 bulan 8-25 mg/kgBB/hari; anak < 10 kg awal 37.5 mg. Infeksi strep hemolitik, lama terapi dianjurkan 5-10 hari Kegunaan : mengobati infeksi bakteri ESO potensial : KI : hipersensitif PERHATIAN : riwayat penyakit gastrointestinal Cara penyimpanan : Suhu di bawah 30 °C</p>	<p>Nama Obat : Asam mefenamat Kandungan : asam mefenamat 500 mg Dosis lazim : 3 kali sehari 1 tablet Kegunaan : mengatasi nyeri ESO potensial : mual, muntah KI : hipersensitivitas PERHATIAN : informasikan kedokter jika hamil atau menyusui Cara penyimpanan : Suhu di bawah 30 °C</p>	A. Skrining Administrasi
<p>Nama Obat : clindamycin Kandungan : clindamicyn 300mg Dosis lazim : Dewasa 150-450 mg 4 x sehari; anak > 1 bulan 8-25 mg/kgBB/hari; anak < 10 kg awal 37.5 mg. Infeksi strep hemolitik, lama terapi dianjurkan 5-10 hari Kegunaan : mengobati infeksi bakteri ESO potensial : KI : hipersensitif PERHATIAN : riwayat penyakit gastrointestinal Cara penyimpanan : Suhu di bawah 30 °C</p>	<p>Nama Obat : Asam mefenamat Kandungan : asam mefenamat 500 mg Dosis lazim : 3 kali sehari 1 tablet Kegunaan : mengatasi nyeri ESO potensial : mual, muntah KI : hipersensitivitas PERHATIAN : informasikan kedokter jika hamil atau menyusui Cara penyimpanan : Suhu di bawah 30 °C</p>				

Resep obat : Racikan/ non racikan
 Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi
 (>/ tidak
 Pengulangan resep : iter..... kali / neiter
 Tempel Resep/salin resep disini!



Nama Pasien :	Ada	Tn. Agus
Umur pasien :	Tidak ada	-
Berat Badan :	Tidak ada	-
Nama Obat :	Ada	R/ lipitor 20mg
Bentuk sed. :	Tidak ada	-
Jumlah obat :	Ada	R/ lipitor 20mg (15)
Duplikasi terapi :	Tidak ada	-
Aturan pakai :	Ada	R/ lipitor 20mg (1 kali sehari malam)
Tanggal penulisan resep :	Ada	28 Februari 2024
Nama dokter :	Ada	Dr. Zulvia Vatan
Surat ijin :	Tidak ada	-
Alamat dr. :	Tidak ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi

R/ lipitor 20mg (15)

C. Perhitungan biaya resep

R/ lipitor 20mg x 15	Rp. 667.625
TOTAL TRANSAKSI	Rp. 667.625

D. Etiket

1. Nama Obat /warna etiket : Lipitor 20mg/ putih

kimia farma
 APOTEK KIMIA FARMA
 Jl. Kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
 APA : apt. Sirdian Pinaris Rama, S.Farm
 SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

No. : TGL : 22 Februari 2024


NAMA PASIEN : Tn. Agus

..... 1.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus
 Sebelum / Sesudah / Bersama makan

Pagi
Siang
Sore

		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; color: red; font-size: small;">(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)</td> <td style="text-align: right; color: blue; font-size: small;">Malam</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="color: blue; font-size: small;">Nama / Jumlah Obat lipitor / 15 (kolesterol)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="color: blue; font-size: small;">Tgl. Kadaluarsa</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="color: blue; font-size: small;">(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)</td> </tr> </table> <p>E. Product Knowledge</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> <p>Nama Obat : Lipitor 20mg Kandungan : Actovastatin Calcium Trihydrate 20 mg Dosis lazim : 1 kali sehari Kegunaan : menurunkan kolestrol total, kolestrol LDL ESO potensial : konstipasi, sakit kepala, mual, diare, sakit perut, dispepsia, perut kembung, hepatitis KI : hipersensitif, Penyakit hati aktif atau peningkatan serum transaminase PERHATIAN : wanita hamil dan kemungkinan hamil Cara penyimpanan : simpan ditempat yang sejuk dan kering, terlindung dari sinar matahari</p> </td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> </table> <p>F. Tahap pembuatan</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="height: 20px;">-</td> </tr> </table> <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;"> <p>Atas nama Tn. Agus. Ini obatnya lipitor 20mg untuk kolestrol diminum 1 kali sehari malam, setelah makan Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.</p> </td> </tr> </table>	(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)	Malam	Nama / Jumlah Obat lipitor / 15 (kolesterol)		Tgl. Kadaluarsa		(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)		<p>Nama Obat : Lipitor 20mg Kandungan : Actovastatin Calcium Trihydrate 20 mg Dosis lazim : 1 kali sehari Kegunaan : menurunkan kolestrol total, kolestrol LDL ESO potensial : konstipasi, sakit kepala, mual, diare, sakit perut, dispepsia, perut kembung, hepatitis KI : hipersensitif, Penyakit hati aktif atau peningkatan serum transaminase PERHATIAN : wanita hamil dan kemungkinan hamil Cara penyimpanan : simpan ditempat yang sejuk dan kering, terlindung dari sinar matahari</p>		-	<p>Atas nama Tn. Agus. Ini obatnya lipitor 20mg untuk kolestrol diminum 1 kali sehari malam, setelah makan Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.</p>
(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)	Malam													
Nama / Jumlah Obat lipitor / 15 (kolesterol)														
Tgl. Kadaluarsa														
(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)														
<p>Nama Obat : Lipitor 20mg Kandungan : Actovastatin Calcium Trihydrate 20 mg Dosis lazim : 1 kali sehari Kegunaan : menurunkan kolestrol total, kolestrol LDL ESO potensial : konstipasi, sakit kepala, mual, diare, sakit perut, dispepsia, perut kembung, hepatitis KI : hipersensitif, Penyakit hati aktif atau peningkatan serum transaminase PERHATIAN : wanita hamil dan kemungkinan hamil Cara penyimpanan : simpan ditempat yang sejuk dan kering, terlindung dari sinar matahari</p>														
-														
<p>Atas nama Tn. Agus. Ini obatnya lipitor 20mg untuk kolestrol diminum 1 kali sehari malam, setelah makan Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.</p>														
25	Jenis Resep : Salinan/ Resep asli	A. Skrining Administrasi												

Resep obat : Racikan/ non racikan
 Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi
 (>/ tidak
 Pengulangan resep : iter..... kali / neiter
 Tempel Resep/salin resep disini!



Nama Pasien :	Ada	Tn . Brilianti Qori
Umur pasien :	Ada	25 tahun
Berat Badan :	Tidak ada	-
Nama Obat :	Ada	R/ mefinal 500mg R/ Cataflam 50
Bentuk sed. :	Tidak ada	-
Jumlah obat :	Ada	R/ mefinal 500mg (10) R/ Cataflam 50 (10)
Duplikasi terapi :	Tidak ada	-
Aturan pakai :	Ada	R/ mefinal 500mg (3 kali sehari) R/ Cataflam 50 (2 kali sehari)
Tanggal penulisan resep :	Ada	26 Februari 2024
Nama dokter :	Ada	Dr. Zulvia Vatan
Surat ijin :	Tidak ada	-
Alamat dr. :	Tidak ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi

-


C. Perhitungan biaya resep

R/ mefinal 500mg	x 10	Rp. 86.480
R/ Cataflam 50 mg	x 10	Rp. 84.290
TOTAL TRANSAKSI		Rp. 170.770


D. Etiket

1. Nama Obat /warna etiket : mefinal 500



		<p>No. : TGL : 26 Februari 2024 NAMA PASIEN : Nn. Brilianti</p> <p>..... 3X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus Sebelum / Sesudah / Bersama makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)</p> <p style="text-align: right;">Pagi Siang Sore Malam</p> <p>Nama / Jumlah Obat Mefinal 500 /10 Tgl. Kadaluarsa</p> <p>(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)</p>			
		<p>2. Nama Obat/ waran etiket : Cataflam 50mg</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597</p> </div> <p>No. : TGL : 26 Februari 2024 NAMA PASIEN : Nn. Brilianti</p> <p>..... 2X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus Sebelum / Sesudah / Bersama makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)</p> <p style="text-align: right;">Pagi Siang Sore Malam</p> <p>Nama / Jumlah Obat Cataflam 50 /10 Tgl. Kadaluarsa</p> <p>(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)</p>			
		<p>E. Product Knowledge</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="943 1129 1487 1334"> Nama Obat : Mefinal 500 mg Kandungan : Asam mefenamat 500 mg Dosis lazim : 3x500 mg Kegunaan : mengatasi nyeri ESO potensial : mual, muntah KI : hipersensitivitas </td> <td data-bbox="1487 1129 2031 1334"> Nama Obat : Cataflam 50 mg Kandungan : kalium diklofenak 50 Dosis lazim : 3 kali sehari 1 tab Kegunaan : mengurangi rasa sakit dan pembekakann(inflamasi), OA (osteoartritis) dan spondilitis ankilosa </td> </tr> </table>	Nama Obat : Mefinal 500 mg Kandungan : Asam mefenamat 500 mg Dosis lazim : 3x500 mg Kegunaan : mengatasi nyeri ESO potensial : mual, muntah KI : hipersensitivitas	Nama Obat : Cataflam 50 mg Kandungan : kalium diklofenak 50 Dosis lazim : 3 kali sehari 1 tab Kegunaan : mengurangi rasa sakit dan pembekakann(inflamasi), OA (osteoartritis) dan spondilitis ankilosa	
Nama Obat : Mefinal 500 mg Kandungan : Asam mefenamat 500 mg Dosis lazim : 3x500 mg Kegunaan : mengatasi nyeri ESO potensial : mual, muntah KI : hipersensitivitas	Nama Obat : Cataflam 50 mg Kandungan : kalium diklofenak 50 Dosis lazim : 3 kali sehari 1 tab Kegunaan : mengurangi rasa sakit dan pembekakann(inflamasi), OA (osteoartritis) dan spondilitis ankilosa				

		<p>PERHATIAN : tukak GI atau penyakit inflamasi pada saluran cerna atas atau bawah Cara penyimpanan : Suhu di bawah 30 °C</p>	<p>ESO potensial : sakit kepala pusing, vertigo, mual, muntah, riare, sakit perut, ruam KI : hipersensitivitas, pasien yang pernah mengalami asma PERHATIAN : penyakit hipertensi, rentasi cairan atau gagal jantung dapat mengganggu saat mengemudi kendaraan Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>																		
26	<p>Jenis Resep : Salinan/ Resep asli Resep obat : Racikan/ non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/ tidak Pengulangan resep : iter..... kali / neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p>	<p>F. Tahap pembuatan -</p> <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal) Atas nama Nn. Berlianti Qori. Ini ada 2 macam obat. Ini mefinal untuk nyeri, diminum 3 kali sehari setelah makan. ini cataflan untuk mengurangi rasa sakit, diminum 2 kali sehari, setelah makan. Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu. Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.</p>	<p>A. Skrining Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Tn. Slamet</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada</td> <td>69 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Analsik R/ Flamar gel R/ Neurosanbe plus</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Flamar gel</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Analsik (10) R/ Flamar gel (1) R/ Neurosanbe plus (10)</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Tn. Slamet	Umur pasien :	Ada	69 tahun	Berat Badan :	Tidak ada	-	Nama Obat :	Ada	R/ Analsik R/ Flamar gel R/ Neurosanbe plus	Bentuk sed. :	Ada	R/ Flamar gel	Jumlah obat :	Ada	R/ Analsik (10) R/ Flamar gel (1) R/ Neurosanbe plus (10)
Nama Pasien :	Ada	Tn. Slamet																			
Umur pasien :	Ada	69 tahun																			
Berat Badan :	Tidak ada	-																			
Nama Obat :	Ada	R/ Analsik R/ Flamar gel R/ Neurosanbe plus																			
Bentuk sed. :	Ada	R/ Flamar gel																			
Jumlah obat :	Ada	R/ Analsik (10) R/ Flamar gel (1) R/ Neurosanbe plus (10)																			



Duplikasi terapi :	Tidak ada	-
Aturan pakai :	Ada	R/ Analsik (3 kali sehari, bila nyeri) R/ Flamar gel (dioles tipis-tipis) R/ Neurosanbe plus(1 kali 1 tab)
Tanggal penulisan resep :	Ada	01 Maret 2024
Nama dokter :	Ada	Dr. Zulvia Vatan
Surat ijin :	Tidak ada	-
Alamat dr. :	Tidak ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi

R/ Analsik (10)
R/ Flamar gel (1)
R/ Neurosanbe plus (10)

C. Perhitungan biaya resep

R/ Analsik	x 10	Rp. 20.870
R/ Flamar gel	x 1	Rp. 23.900
R/ Neurosanbe plus	x 10	Rp. 16.700
TOTAL TRANSAKSI		Rp. 61.470

D. Etiket


1. Nama Obat /warna etiket : Analsik / putih

kimia farma
APOTEK KIMIA FARMA
 Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK
 APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm
 SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597

No. : TGL. : 01 Maret 2024
 NAMA PASIEN : Tn. Slamet

		<p>..... 3.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus <u>Sebelum</u> / <u>Sesudah</u> / <u>Bersama</u> makan <small>(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)</small></p> <p style="text-align: right;"> Pagi Siang Sore Malam </p>
		<p>Nama / Jumlah Obat Analsik/10 (bila nyeri) Tgl. Kadaluarsa <small>(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)</small></p>
		<p>2. Nama Obat /warna etiket : Flamar gel/ biru</p> <div style="border: 1px solid black; background-color: #e6f2ff; padding: 5px;"> <p style="text-align: right;">01 Maret 2024</p> <p style="text-align: center;">Tn. Slamet Oles tipis-tipis</p> <p style="text-align: center;">OBAT LUAR</p> </div>
		<p>3. Nama Obat /warna etiket : Neurosanbe plus/ putih</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: right;">TGL : 01 Maret 2024</p> <p>NAMA PASIEN : Tn. Slamet</p> <p>..... 1.....X sehari 1..... Tablet / Kapsul / Bungkus <u>Sebelum</u> / <u>Sesudah</u> / <u>Bersama</u> makan <small>(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)</small></p> <p style="text-align: right;"> Pagi Siang Sore Malam </p> </div> <p>Nama / Jumlah Obat Analsik/10 (bila nyeri) Tgl. Kadaluarsa <small>(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)</small></p>

		<p>E. Product Knowledge</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="943 300 1487 715"> <p>Nama Obat :Analsik Kandungan : Metamizole 500mg, Diazepam 2 mg Dosis lazim : 4 tablet per hari selang 6 jam Kegunaan : Nyeri ESO Potensial: Gangguan GI KI : Hipersensitif PERHATIAN : hipersensitif Cara penyimpanan : simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p> </td> <td data-bbox="1487 300 2031 715"> <p>Nama Obat : Flamar gel Kandungan : Diclovenac 0 mg Dosis lazim : 3-4 kali sehari, Max 8g perhari Kegunaan : menyurangi nyeri ESO potensial : iritasi lokal, KI : hipersensitif PERHATIAN : hati-hati pada pasien dengan riwayat gastrointestinal Cara penyimpanan : simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 715 1487 1235"> <p>Nama Obat : Neurosanbe plus Kandungan : Vitamin B1 50 mg, Vitamin B6 100 mg, Vitamin B12 100 mcg, methampyrone 500 Dosis lazim : 1 kali sehari, 1 tablet Kegunaan : Untuk pengobatan kekurangan Vitamin B1, B6 dan B12 seperti pada polineuritis ESO potensial : Sindrom neuropati akibat penggunaan Vitamin B6. Reaksi alergi KI : hipersensitivitas PERHATIAN : Sebaiknya tidak digunakan untuk pasien yang sedang menerima terapi levodopa Cara penyimpanan : Suhu di bawah 30 °C</p> </td> <td data-bbox="1487 715 2031 1235"></td> </tr> </table> <p>F. Tahap pembuatan</p> <div data-bbox="925 1310 2031 1350" style="border: 1px solid black; height: 25px;"></div>	<p>Nama Obat :Analsik Kandungan : Metamizole 500mg, Diazepam 2 mg Dosis lazim : 4 tablet per hari selang 6 jam Kegunaan : Nyeri ESO Potensial: Gangguan GI KI : Hipersensitif PERHATIAN : hipersensitif Cara penyimpanan : simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>	<p>Nama Obat : Flamar gel Kandungan : Diclovenac 0 mg Dosis lazim : 3-4 kali sehari, Max 8g perhari Kegunaan : menyurangi nyeri ESO potensial : iritasi lokal, KI : hipersensitif PERHATIAN : hati-hati pada pasien dengan riwayat gastrointestinal Cara penyimpanan : simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>	<p>Nama Obat : Neurosanbe plus Kandungan : Vitamin B1 50 mg, Vitamin B6 100 mg, Vitamin B12 100 mcg, methampyrone 500 Dosis lazim : 1 kali sehari, 1 tablet Kegunaan : Untuk pengobatan kekurangan Vitamin B1, B6 dan B12 seperti pada polineuritis ESO potensial : Sindrom neuropati akibat penggunaan Vitamin B6. Reaksi alergi KI : hipersensitivitas PERHATIAN : Sebaiknya tidak digunakan untuk pasien yang sedang menerima terapi levodopa Cara penyimpanan : Suhu di bawah 30 °C</p>	
<p>Nama Obat :Analsik Kandungan : Metamizole 500mg, Diazepam 2 mg Dosis lazim : 4 tablet per hari selang 6 jam Kegunaan : Nyeri ESO Potensial: Gangguan GI KI : Hipersensitif PERHATIAN : hipersensitif Cara penyimpanan : simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>	<p>Nama Obat : Flamar gel Kandungan : Diclovenac 0 mg Dosis lazim : 3-4 kali sehari, Max 8g perhari Kegunaan : menyurangi nyeri ESO potensial : iritasi lokal, KI : hipersensitif PERHATIAN : hati-hati pada pasien dengan riwayat gastrointestinal Cara penyimpanan : simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>					
<p>Nama Obat : Neurosanbe plus Kandungan : Vitamin B1 50 mg, Vitamin B6 100 mg, Vitamin B12 100 mcg, methampyrone 500 Dosis lazim : 1 kali sehari, 1 tablet Kegunaan : Untuk pengobatan kekurangan Vitamin B1, B6 dan B12 seperti pada polineuritis ESO potensial : Sindrom neuropati akibat penggunaan Vitamin B6. Reaksi alergi KI : hipersensitivitas PERHATIAN : Sebaiknya tidak digunakan untuk pasien yang sedang menerima terapi levodopa Cara penyimpanan : Suhu di bawah 30 °C</p>						


		<p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Atas nama Tn. Slamet. Ini ada 3 macam obat. Ini analisik untuk nyeri, diminum 3 kali sehari bila nyeri, setelah makan. ini flamar gel untuk nyeri, diolest tipis-tipis. Kemudian ini neurosanbe plus untuk vit pegal-pegal, diminum 1 kali sehari 1 tab sesudah makan. Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.</p>																																											
27	<p>Jenis Resep : Salinan/ Resep asli Resep obat : Racikan/ non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/ tidak Pengulangan resep : iter..... kali / neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrining Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="927 448 1794 1123"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Nn. Anik</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada</td> <td>50 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Amlodipin 5mg R/ Alupurinol 100 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Amlodipin 5mg (20) R/ Alupurinol 100 mg (10)</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Amlodipin 5mg (malam hari) R/ Alupurinol 100 mg (malam hari)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada</td> <td>02 Maret 2024</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada</td> <td>Dr Nanang Rudianro</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>ada</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi</p> <table border="1" data-bbox="927 1193 2033 1267"> <tr> <td>R/ Amlodipin 5mg (20)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>R/ Alupurinol 100 mg (10)</td> <td></td> </tr> </table> <p>C. Perhitungan biaya resep</p> <table border="1" data-bbox="927 1337 2033 1372"> <tr> <td>R/ Amlodipin 5mg</td> <td>x 20</td> <td>Rp. 25.200</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Nn. Anik	Umur pasien :	Ada	50 tahun	Berat Badan :	Tidak ada	-	Nama Obat :	Ada	R/ Amlodipin 5mg R/ Alupurinol 100 mg	Bentuk sed. :	Tidak ada	-	Jumlah obat :	Ada	R/ Amlodipin 5mg (20) R/ Alupurinol 100 mg (10)	Duplikasi terapi :	Tidak ada	-	Aturan pakai :	Ada	R/ Amlodipin 5mg (malam hari) R/ Alupurinol 100 mg (malam hari)	Tanggal penulisan resep :	Ada	02 Maret 2024	Nama dokter :	Ada	Dr Nanang Rudianro	Surat ijin :	Ada	-	Alamat dr. :	ada	-	R/ Amlodipin 5mg (20)		R/ Alupurinol 100 mg (10)		R/ Amlodipin 5mg	x 20	Rp. 25.200
Nama Pasien :	Ada	Nn. Anik																																											
Umur pasien :	Ada	50 tahun																																											
Berat Badan :	Tidak ada	-																																											
Nama Obat :	Ada	R/ Amlodipin 5mg R/ Alupurinol 100 mg																																											
Bentuk sed. :	Tidak ada	-																																											
Jumlah obat :	Ada	R/ Amlodipin 5mg (20) R/ Alupurinol 100 mg (10)																																											
Duplikasi terapi :	Tidak ada	-																																											
Aturan pakai :	Ada	R/ Amlodipin 5mg (malam hari) R/ Alupurinol 100 mg (malam hari)																																											
Tanggal penulisan resep :	Ada	02 Maret 2024																																											
Nama dokter :	Ada	Dr Nanang Rudianro																																											
Surat ijin :	Ada	-																																											
Alamat dr. :	ada	-																																											
R/ Amlodipin 5mg (20)																																													
R/ Alupurinol 100 mg (10)																																													
R/ Amlodipin 5mg	x 20	Rp. 25.200																																											

R/ Alupurinol 100 mg x 10 Rp. 4.200


TOTAL TRANSAKSI Rp. 29.400

D. Etiket

1. Nama Obat /warna etiket : Amlodipin/ putih

 APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	
No. :	TGL : 2 Maret 2024
NAMA PASIEN : Ny. anik	
..... 1.....X sehari 1.....	Tablet / Kapsul / Bungkus
Sebelum / Sesudah / Bersama makan	Pagi Siang Sore Malam
(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)	
Nama / Jumlah Obat	amlodipin 5 mg / 20 (tensi)
Tgl. Kadaluarsa	
(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)	


2. Nama Obat /warna etiket : allupurinol/ putih

 APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	
No. :	TGL : 02 Maret 2024
NAMA PASIEN : Ny. Anik	
..... 1.....X sehari 1.....	Tablet / Kapsul / Bungkus
Sebelum / Sesudah / Bersama makan	Pagi Siang Sore

		<p style="text-align: center;">(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak) Malam</p> <p>Nama / Jumlah Obat Allupurinol / 30 (asam urat) Tgl. Kadaluarsa</p> <p style="text-align: center;">(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)</p>		
		<p>E. Product Knowledge</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Nama Obat : Amlodipin 5mg Kandungan : Amlodipin 5 mg Dosis lazim : 1 kali sehari 5mg Kegunaan : hipertensi ESO potensial : sakit kepala, pusing, mengantuk, debaran jantung KI : hipersensitif PERHATIAN : gagal jantung, kehamilan dan laktasi Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Nama Obat : Allupurinol Kandungan : Allupurinol 100 mg Dosis lazim : Dewasa: 2-10 mg/kg berat badan/hari atau 100 - 200 mg setiap hari dalam keadaan yang ringan 300 - 600 mg setiap hari dalam keadaan agak berat. Kegunaan : Asam urat ESO Potensial: Tremor otot terutama pada tangan, palpitasi, dan kram otot. KI : Hipersensitivitas PERHATIAN : Hipertiroid, DM, penyakit kardiovaskuler, aneurisma, glaukoma sudut sempit, pasien dengan terapi antihipertensi atau menggunakan anestesi halogen. Cara penyimpanan : simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p> </td> </tr> </table> <p>F. Tahap pembuatan</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-</p> <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Atas nama Ny. anik. Ini ada 2 macam obatnya. Ini Amlodipin untuk hipertensi, diminum 1 kali sehari saat malam hari, setelah makan. ini alupurinol untuk asam urat, diminum 1 kali sehari saat malam hari, setelah makan.</p>	<p>Nama Obat : Amlodipin 5mg Kandungan : Amlodipin 5 mg Dosis lazim : 1 kali sehari 5mg Kegunaan : hipertensi ESO potensial : sakit kepala, pusing, mengantuk, debaran jantung KI : hipersensitif PERHATIAN : gagal jantung, kehamilan dan laktasi Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>Nama Obat : Allupurinol Kandungan : Allupurinol 100 mg Dosis lazim : Dewasa: 2-10 mg/kg berat badan/hari atau 100 - 200 mg setiap hari dalam keadaan yang ringan 300 - 600 mg setiap hari dalam keadaan agak berat. Kegunaan : Asam urat ESO Potensial: Tremor otot terutama pada tangan, palpitasi, dan kram otot. KI : Hipersensitivitas PERHATIAN : Hipertiroid, DM, penyakit kardiovaskuler, aneurisma, glaukoma sudut sempit, pasien dengan terapi antihipertensi atau menggunakan anestesi halogen. Cara penyimpanan : simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>
<p>Nama Obat : Amlodipin 5mg Kandungan : Amlodipin 5 mg Dosis lazim : 1 kali sehari 5mg Kegunaan : hipertensi ESO potensial : sakit kepala, pusing, mengantuk, debaran jantung KI : hipersensitif PERHATIAN : gagal jantung, kehamilan dan laktasi Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>Nama Obat : Allupurinol Kandungan : Allupurinol 100 mg Dosis lazim : Dewasa: 2-10 mg/kg berat badan/hari atau 100 - 200 mg setiap hari dalam keadaan yang ringan 300 - 600 mg setiap hari dalam keadaan agak berat. Kegunaan : Asam urat ESO Potensial: Tremor otot terutama pada tangan, palpitasi, dan kram otot. KI : Hipersensitivitas PERHATIAN : Hipertiroid, DM, penyakit kardiovaskuler, aneurisma, glaukoma sudut sempit, pasien dengan terapi antihipertensi atau menggunakan anestesi halogen. Cara penyimpanan : simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>			

28

Jenis Resep : Salinan/ Resep asli
 Resep obat : Racikan/ non racikan
 Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi
 (>/ tidak
 Pengulangan resep : iter..... kali / neiter
 Tempel Resep/salin resep disini!



A. Skrining Administrasi

Nama Pasien :	Ada	Tn. Suharto
Umur pasien :	Ada	60 tahun
Berat Badan :	Ada	65
Nama Obat :	Ada	R/ Tensivask 5mg
Bentuk sed. :	Tidak ada	-
Jumlah obat :	Ada	R/ Tensivask 5mg (30)
Duplikasi terapi :	Tidak ada	-
Aturan pakai :	Ada	R/ Tensivask 5mg (malam hari)
Tanggal penulisan resep :	Ada	06 Maret 2024
Nama dokter :	Ada	Dr. Aden Bagus Wahyu L.Y.
Surat ijin :	Ada	SIP: 446/2202/437.52.2023
Alamat dr. :	ada	Jl. RA. kartini 236/C9, Kebomas-Gresik

B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi


R/ Tensivask 5mg (30)

C. Perhitungan biaya resep

R/ Tensivask 5mg	x 10	Rp. 84.420
TOTAL TRANSAKSI		Rp. 84.420

D. Etiket


1. Nama Obat /warna etiket : Tensivask / putih

 APOTEK KIMIA FARMA Jl. Kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	
No. :	TGL. : 02 Maret 2024
NAMA PASIEN : Tn. Suharto	
..... 1.....X sehari 1.....	Tablet / Kapsul / Bungkus
Sebelum / Sesudah / Bersama makan	
(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)	
Malam	
Nama / Jumlah Obat	Tensivask / 10 (Hipertensi)
Tgl. Kadaluarsa	
(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)	



E. Product Knowledge

Nama Obat : Tensivask 5mg Kandungan : Amlodipine 5 mg Dosis lazim : 1 kali sehari 5mg Kegunaan : hipertensi ESO potensial : sakit kepala, pusing, mengantuk, debaran jantung KI : hipersensitif PERHATIAN : gagal jantung, kehamilan dan laktasi Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung


F. Tahap pembuatan

		-																								
		<p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Atas nama Tn. Suharto. Ini ada 1 obat saja. Ini tensivask untuk hipertensi, diminum 1 kali sehari malam hari, sesudah makan. Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.</p>																								
29	<p>Jenis Resep : Salinan/ Resep asli Resep obat : Racikan/ non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/ tidak) Pengulangan resep : iter..... kali / neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrining Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Ananda</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Amoxsan 250 mg R/ Sanmol 250mg R/ lapifed ¼ tab Epexol ½ tab MP 4mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Amoxsan 250 mg R/ Sanmol 250mg R/ lapifed ¼ tab Epexol ½ tab MP 4mg (10 puyer)</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Amoxsan 250 mg (5) R/ Sanmol 250mg R/ lapifed ¼ tab Epexol ½ tab MP 4mg</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak ada</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Amoxsan 250 mg (3 kali sehari) R/ Sanmol 250mg (3 kali sehari) R/ lapifed ¼ tab (3) Epexol ½ tab (5)</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Ananda	Umur pasien :	Tidak ada	-	Berat Badan :	Tidak ada	-	Nama Obat :	Ada	R/ Amoxsan 250 mg R/ Sanmol 250mg R/ lapifed ¼ tab Epexol ½ tab MP 4mg	Bentuk sed. :	Ada	R/ Amoxsan 250 mg R/ Sanmol 250mg R/ lapifed ¼ tab Epexol ½ tab MP 4mg (10 puyer)	Jumlah obat :	Ada	R/ Amoxsan 250 mg (5) R/ Sanmol 250mg R/ lapifed ¼ tab Epexol ½ tab MP 4mg	Duplikasi terapi :	Tidak ada		Aturan pakai :	Ada	R/ Amoxsan 250 mg (3 kali sehari) R/ Sanmol 250mg (3 kali sehari) R/ lapifed ¼ tab (3) Epexol ½ tab (5)
Nama Pasien :	Ada	Ananda																								
Umur pasien :	Tidak ada	-																								
Berat Badan :	Tidak ada	-																								
Nama Obat :	Ada	R/ Amoxsan 250 mg R/ Sanmol 250mg R/ lapifed ¼ tab Epexol ½ tab MP 4mg																								
Bentuk sed. :	Ada	R/ Amoxsan 250 mg R/ Sanmol 250mg R/ lapifed ¼ tab Epexol ½ tab MP 4mg (10 puyer)																								
Jumlah obat :	Ada	R/ Amoxsan 250 mg (5) R/ Sanmol 250mg R/ lapifed ¼ tab Epexol ½ tab MP 4mg																								
Duplikasi terapi :	Tidak ada																									
Aturan pakai :	Ada	R/ Amoxsan 250 mg (3 kali sehari) R/ Sanmol 250mg (3 kali sehari) R/ lapifed ¼ tab (3) Epexol ½ tab (5)																								

				MP 4mg (10)
	Tanggal penulisan resep :	Ada		05 Maret 2024
	Nama dokter :	Ada		HN
	Surat ijin :	Tidak ada		-
	Alamat dr. :	Tidak ada		-
	B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi			
	<p>Racikan 1</p> <p>lapifed $\frac{1}{4}$ tab x 10 = 3</p> <p>Epexol $\frac{1}{2}$ tab x 10 = 5</p> <p>MP 4mg x 10 = 10</p> <p>Amoxan 250/500 x 10 = 5</p> <p>sanmol 250/500 x 10 = 5</p>			
	C. Perhitungan biaya resep			
	R/ Amoxsan 500 mg	x 5		Rp. 43.590
	R/ Sanmol 500 mg	x 5		Rp. 3.000
	Racikan 1			
	lapifed	x 3		Rp. 11.760
	Epexol 30mg	x 5		Rp. 6.100
	Metilprednisolon 4mg	x 10		Rp. 5.500
	Kertas puyer berlogo KF	x 10		Rp. 620
	Embalase			Rp. 15.000
	Paperbag			Rp. 5.000
	TOTAL TRANSAKSI			Rp. 90.570
	D. Etiket			
	1. Nama Obat /warna etiket : Amoxsan/ putih			

		<div data-bbox="969 193 1648 411">  <p style="text-align: right;">Antibiotik habiskan</p> <p>APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597</p> </div> <div data-bbox="969 411 1648 624"> <p>No. : TGL : 05 Maret 2024</p> <p>NAMA PASIEN : Ananda</p> <p>..... 3.....X sehari 1/2..... Tablet / <u>Kapsul</u> / <u>Bungkus</u> <u>Sebelum</u> / <u>Sesudah</u> / <u>Bersama</u> makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)</p> <p style="text-align: right;">Pagi Siang Sore Malam</p> </div> <div data-bbox="969 624 1648 711"> <p>Nama / Jumlah Obat Amoxan / 5 Tgl. Kadaluarsa (hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)</p> </div> <p data-bbox="920 783 1496 815">2. Nama Obat /warna etiket : Sanmol/ putih</p> <div data-bbox="969 815 1648 1034">  <p style="text-align: right;">Demam/ panas</p> <p>APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597</p> </div> <div data-bbox="969 1034 1648 1246"> <p>No. : TGL : 05 Maret 2024</p> <p>NAMA PASIEN : Ananda</p> <p>..... 3.....X sehari 1/2..... Tablet / <u>Kapsul</u> / <u>Bungkus</u> <u>Sebelum</u> / <u>Sesudah</u> / <u>Bersama</u> makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)</p> <p style="text-align: right;">Pagi Siang Sore Malam</p> </div> <div data-bbox="969 1246 1648 1334"> <p>Nama / Jumlah Obat Amoxan / 5 Tgl. Kadaluarsa (hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)</p> </div> <p data-bbox="920 1366 1532 1398">3. Nama Obat /warna etiket : Racikan 1/ putih</p>
--	--	--

		<p>KI : hipersensitif atau riwayat alergi, PERHATIAN : Hipersensitif Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	
		<p>Nama Obat :Lapifed Kandungan : triprolidine hcl 2,5 mg, pseudoephedrine hcl 60 mg Dosis lazim : 3 kali sehari 1 tablet Kegunaan : meringankan gejala peradangan saluran pernafasan bagian atas, rinitis alergi, rinitis vasomotor ESO potensial : mengantuk, depresi, tremor, denyut jantung cepat, hidung dan tenggorokan kering KI : hipertensi berat PERHATIAN : hipersensitif Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>Nama Obat : epexol 30 Kandungan : Ambroxol 30 Dosis lazim : 30 mg, 2-3 kali sehari Kegunaan : saluran pernafasan akut dan kronis ESO potensial : mual, muntah, diare, sakit perut KI : hipersensitif PERHATIAN : tukak lambung atau dodenum, gangguan ginjal dan hati, anak-anak Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>
		<p>Nama Obat : metil prednisolon Kandungan : metil prednisolon 4 mg Dosis lazim : 4-8 mg/hari Kegunaan : alergi dan mengurangi peradangan atau supresi inflamasi ESO potensial : gangguan kejiwaan, insomnia, penekanan ardenal, reaksi anafilaksis KI : infeksi jamur sistemik PERHATIAN :- Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	

		<p>F. Tahap pembuatan</p> <p>-</p> <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Atas nama Ananda. Ini obatnya ada 3 macam. Ini Amoxan antibiotik dihabiskan, diminum 3 kali sehari ½ tab, setelah makan. ini sanmol untuk demam, diminum 3 kali sehari ½ tab setelah makan. kemudian ini racikan nya untuk babil, diminum 3 kali sehari 1 bungkus, setelah makan. Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.</p>																																				
30	<p>Jenis Resep : Salinan/ Resep asli Resep obat : Racikan/ non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/ tidak Pengulangan resep : iter..... kali / neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrining Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="927 632 1796 1305"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>M.munir Ega</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ tensivask 5 mg R/ Analsik</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ tensivask 5 mg (10) R/ Analsik (10)</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>R/ tensivask 5 mg (diminum malam) R/ Analsik (2 kali sehari 1 tab)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada</td> <td>06 Maret 2024</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada</td> <td>Dr. Tresnaningsih S</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada</td> <td>SIP. 446/1866/437.52/2023</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi</p>	Nama Pasien :	Ada	M.munir Ega	Umur pasien :	Tidak ada	-	Berat Badan :	Tidak ada	-	Nama Obat :	Ada	R/ tensivask 5 mg R/ Analsik	Bentuk sed. :	Tidak ada	-	Jumlah obat :	Ada	R/ tensivask 5 mg (10) R/ Analsik (10)	Duplikasi terapi :	Tidak ada	-	Aturan pakai :	Ada	R/ tensivask 5 mg (diminum malam) R/ Analsik (2 kali sehari 1 tab)	Tanggal penulisan resep :	Ada	06 Maret 2024	Nama dokter :	Ada	Dr. Tresnaningsih S	Surat ijin :	Ada	SIP. 446/1866/437.52/2023	Alamat dr. :	Tidak ada	-
Nama Pasien :	Ada	M.munir Ega																																				
Umur pasien :	Tidak ada	-																																				
Berat Badan :	Tidak ada	-																																				
Nama Obat :	Ada	R/ tensivask 5 mg R/ Analsik																																				
Bentuk sed. :	Tidak ada	-																																				
Jumlah obat :	Ada	R/ tensivask 5 mg (10) R/ Analsik (10)																																				
Duplikasi terapi :	Tidak ada	-																																				
Aturan pakai :	Ada	R/ tensivask 5 mg (diminum malam) R/ Analsik (2 kali sehari 1 tab)																																				
Tanggal penulisan resep :	Ada	06 Maret 2024																																				
Nama dokter :	Ada	Dr. Tresnaningsih S																																				
Surat ijin :	Ada	SIP. 446/1866/437.52/2023																																				
Alamat dr. :	Tidak ada	-																																				


R/ tensivask 5 mg (10)
R/ Analsik (10)

C. Perhitungan biaya resep

R/ tensivask 5 mg	x 10	Rp. 81.420
R/ Analsik	x 10	Rp. 26.100
TTOTAL TRANSAKSI		Rp. 107.530

D. Etiket

1. Nama Obat /warna etiket : Tensivask/ putih

 APOTEK KIMIA FARMA Jl. Kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	
No. : TGL : 06 Maret 2024	
NAMA PASIEN : Tn. M.Munir Ega	
..... 1.....X sehari 1.....	Tablet / Kapsul / Bungkus
Sebelum / Sesudah / Bersama makan	Pagi Siang Sore Malam
(Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)	
Nama / Jumlah Obat	Tensivask / 10 (Hipertensi)
Tgl. Kadaluarsa	
(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)	

2. Nama Obat /warna etiket : analsik/ putih

 APOTEK KIMIA FARMA Jl. kartini 150-156 Tlp. (031)3984783 GRESIK APA : apt. Serdian Pinaris Rama, S.Farm SIPA : 19980807/SIPA.35.25/2022/2374 – STRA : 19980807/STRA-UMS/2021/270597	
No. : TGL : 06 Maret 2024	
NAMA PASIEN : Tn. M.Munir Ega	
..... 2.....X sehari 1..... Sebelum / Sesudah / Bersama makan (Jauhkan Obat Dari Jangkauan Anak-Anak)	Pagi Siang Sore Malam
Nama / Jumlah Obat Tgl. Kadaluarsa	Analsik/10
(hubungi apoteker / asisten apoteker bila Anda membutuhkan informasi obat)	

E. Product Knowledge

Nama Obat : Tensivask 5mg Kandungan : Amlodipine 5 mg Dosis lazim : 1 kali sehari 5mg Kegunaan :hipertensi ESO potensial : sakit kepala, pusing, mengantuk, debaran jantung KI : hipersensitif PERHATIAN : gagal jantung, kehamilan dan laktasi Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung	Nama Obat :Analsik Kandungan : Metamizole 500mg, Diazepam 2 mg Dosis lazim : 4 tablet per hari selang 6 jam Kegunaan : Nyeri ESO Potensial: Gangguan GI KI : Hipersensitif PERHATIAN : hipersensitif Cara penyimpanan : simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung
--	--

F. Tahap pembuatan

--

		<p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Atas nama M. Munir Ega. Ini ada 2 macam obat. Ini tensivask untuk hipertensi diminum 1 kali sehari saat malam, setelah makan. ini Analsik untuk nyeri, diminum 2 kali sehari, setelah makan. Apakah sudah paham ?, ada yang ditanyakan lagi ?. terimakasih semoga sehat selalu.</p>
--	--	---

Dosen Pembimbing PKL



Diah Ratnasari, S.Farm., Apt., M.T
NIDN. 0721119001

Pembimbing PKL,



Apt. Rana Imanjaya, S.Farm.
SIP. 19850502A

B. PRODUCT KNOWLEDGE BERDASARKAN KELAS TERAPI

(1) ANALGETIK- ANTIPIRETIK- ANTIINFLAMASI

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Analgetik- Antipiretik- Antiinflamasi	acetaminophen	Paracetamol 500 mg tab, sumagesic 600mg tab, farmadol 500mg tab, biogesic, decolgen	Hindari penggunaan pada penderita insufisiensi hepatoseluler yang parah.	Sakit kepala, demam, nyeri otot dan sakit gigi. Untuk pengobatan jangka pendek nyeri sedang (terutama sesudah operasi) & demam	Dewasa dan anak > 12 tahun : 3-4 x sehari 1 tablet, Anak 6-12 tahun : 3-4 x sehari 1/2 tablet Anak 3-5 tahun : 3-4 x sehari 1/4 tablet. Diberikan Bersama atau tanpa makan	Reaksi hematologi, kulit & alergi lainnya. Tdk enak badan, reaksi hipersensitivitas, hipotensi, peningkatan kadar enzim hati, trombositopenia, leukopenia, neutropenia.	Simpan di tempat yang kering dan terlindung dari cahaya
	Metampriron	Spasminal, analsik	Hipersensitif, hamil dan laktasi, gangguan pendarahan	Nyeri paroximal pada lambung atau usus halus, nyeri spasifik pada saluran empedu, saluran kemih dan organ genital wanita.	3-4 x sehari 1 tab Diminum sesudah makan	Mulut kering, mual, muntah, ruam kulit, berkeringat, sulit bernafas.	Simpan di tempat yang kering dan terlindung dari cahaya
	Ibu profen	Ibu profen suspensi, proris suspensi, bufect suspensi, hufagripp	Hipersensitif, asma yang sensitif dengan aspirin atau NSAID lainnya, pendarahan gastrointestinal	Nyeri ringan sampai sedang antara lain nyeri pada penyakit gigi atau pencabutan gigi, nyeri pasca bedah, sakit kepala, gejala	Dewasa: 3-4 kali sehari 10 ml Anak-anak usia 1-2 tahun: 3-4 kali sehari 1/2 sendok takar (2.5 ml). Anak-anak usia 3-7 tahun : 3-4 kali	Nyeri ringan sampai sedang antara lain nyeri pada penyakit gigi atau pencabutan gigi, nyeri pasca bedah, sakit kepala, gejala artritis reumatoid, gejala osteoarthritis, gejala	Simpan ditempat sejuk dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung

			aktif atau tukak lambung	arthritis reumatoid, gejala osteoarthritis, gejala juvenile arthritis reumatoid, dan menurunkan demam.	sehari 1 sendok takar (5 ml). Anak-anak usia 8-12 tahun: 3-4 kali sehari 2	juvenile arthritis reumatoid, dan menurunkan demam.	
diclofenak	Flamar 50 tab, flamar emulgel, cataflam 50, voltaren emulgel 1%,	Hipersensitif, pasien dengan penyakit asma, urtikaria, dan tukak lambung	Inflamasi karena trauma pada tendon, ligamen, otot, persendian, reumatik jaringan lunak serta penyakit rheumatoid arthrititis dan osteoarthritis.	Dosis tablet 2-3 x sehari 1 tab Setelah makan Dosis gel Sehari 3-4 kali dioleskan pada bagian yang sakit	Iritasi lokal, eritemia, penhelupasan,, diare, perut kembung.	Simpan ditempat sejuk dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung	
As. mefenamat	Mefinal 500 tab, asam mefenamat 500	Hipersensitivitas. Pasien dengan aktif atau riwayat tukak/perdarahan peptikum berulang, riwayat perdarahan gastrointestinal atau perforasi (terkait dengan terapi NSAID sebelumnya), penyakit radang usus, gagal jantung berat,	Meredakan nyeri ringan hingga sedang pada sakit kepala, sakit gigi, dismenore primer, juga nyeri traumatik, otot, dan pasca operasi	Dewasa : awal 500 mg, dilanjutkan 250 mg/6 jam. Segera sesudah makan.	Gangguan gastrointestinal, mengantuk, hipertensi, diare	Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari	

			<p>riwayat asma, bronkospasme, rinitis, angioedema, urtikaria, atau tipe alergi reaksi setelah minum aspirin atau NSAID lainnya. Pengobatan nyeri peri-operatif dalam pengaturan operasi CABG. Ginjal (CrCl <30 mL/menit) dan gangguan hati berat. Kehamilan (trimester ketiga).</p>			
Piroxicam	pirofel 20	<p>hipersensitivitas terhadap piroxicam, tukak atau perdarahan lambung, bronkospasme, polip hidung dan angioedema atau urtikaria apabila diberikan asetosal atau obat antiinflamasi non steroid (OAINS) lain.</p>	<p>terapi gangguan pada rematoid arteritis (rematik), osteoarthritis (sendi terasa nyeri akibat inflamasi ringan yang timbul akibat gesekan ujung-ujung tulang penyusun sendi, (radang sendi pada punggung yang membuat punggung terasa</p>	<p>Dewasa: rematoid arteritis, osteoarthritis, ankilosing spndilitis : dosis awal 1 kali sehari 20 mg dosis tunggal. Muskulokeletal akut : awal 40 mg sehari selama 2 hari, selanjutnya 20 mg sehari selama 7-14 hari.</p>	<p>Dosis lebih dari 20 mg sehari meningkatkan efek samping gastrointestinal, uderma (pembengkakan karena penumpukan cairan), nyeri bagian atas perut, diare, mual muntah dan mulut kering, sakit kepala.</p>	<p>Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>

				nyeri dan kaku), gangguan muskulokeletal akut dan gout akut.	Gout akut : mula-mula 40 mg sehari sebagai dosis tunggal, diikuti 4-6 hari berikutnya 40 mg sehari. Diminum sesudah makan		
Fenilbutazon	Tidak ada	-		Penyakit radang dan rematik	Dosis awal 100-200 mg 3 perhari. Dikonsumsi bersamaan dengan makan	Sakit perut atau muntah, <i>Heartburn</i> , Diare atau konstipasi, kembung, pusing, kantuk dan lemas.	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung
Aspirin	Ascardia, aspilet, farmasal 100, cardio aspirin	Pasien dengan hipersensitif pada kandungan dari aptor, riwayat asma bronkial, hamil dan menyusui.		untuk pengobatan dan pencegahan proses agregasi trombosit pada pasien infark miokard atau penyumbatan pada otot jantung dan kondisi pasca stroke.	Dosis obat ini 80-160 mg sehari. Untuk infark miokard : sampai dengan 300 mg sehari. Untuk transit ischaemic attack (TIA) atau stroke ringan : sampai dengan 1000 mg sehari. Diberikan sesudah makan	Nyeri lambung, rasa panas, terbakar mual, pendarahan gastrointestinal, hipersensitif, trombositopenia.	Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari

	Meloksikam	Meloxin 12	Hipersensitif terhadap meloxicam, Pasien yang akan atau telah menjalani operasi coronaru Artery Bypass Graft (CABG) dikaren akan meningkatkan kejadian trombotik,infark miokard dan stroke Kehamilan (trimester ke-3) dan menyusui.	nyeri dan radang pada penyakit reumatik, osteoarthritis yang memburuk (jangka pendek), dan onkilosing spondilitis.	Dewasa : ½ tab, dosis dapat ditingkatkan menjadi 15 mg per hari. Lansia : ½ mg setiap hari untuk pengobatan jangka panjang.	Jantung berdebar, dehidrasi, sakit perut, sembelit, perut kembung, diare, ruam, kecemasan, penambahan atau pengurangan berat badan vertigo, dan badan lemas	Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
	Celecoxib	Celebrex 100/ 200	Hipersensitifitas terhadap celecoxib, telah menerima terapi nyeri sebelum operasi dalam pengaturan operasi CABG	Mengobati arthritis, nyeri akut, nyeri haid, membantu mengurangi rasa sakit dan pembengkakan (inflamasi)	Osteoarthritis dan ankylosing spondylitis: Dewasa: 200 mg per hari sebagai dosis tunggal atau dibagi 2 dosis. Lansia dengan berat badan < 50 kg:	Nyeri perut, diare, dispepsia, kembung, mual, nyeri punggung, edema perifer, luka km kecelakaan, pusing sakit kepala, insomnia.	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung

					<p>diberikan dosis terendah. Nyeri akut dan nyeri haid: Dewasa: Dosis awal 400 mg dilanjutkan dengan dosis lanjutan 200 mg sehari sekali. Rheumatoid arthritis: Dewasa: 100 mg atau 200 mg, diminum 2 kali sehari, maksimal 400 mg per hari. Lansia dengan berat badan < 50 kg: diberikan dosis terendah. Diminum sesudah makan</p>	
--	--	--	--	--	--	--

(2) ANTIMIKROBA

(2.a) ANTIBIOTIK

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping
----------	-----------	-------------------------	----------------	----------	----------------------	--------------

<p>Penisilin</p>	<p>Ampicillin, amoksisilin,</p>	<p>Amoxan 500mg, Intermoxil Syrup, Amoxan drop</p>	<p>Hipersensitivitas atau riwayat reaksi alergi berat (misalnya anafilaksis, sindrom Stevens-Johnson) terhadap amoksisilin atau -laktam lainnya (misalnya penisilin, sefalosporin, karbapenem, monobaktam). Mononukleosis menular (dicurigai atau dikonfirmasi).</p>	<p>Untuk terapi infeksi gram positif dan negatif, seperti pada saluran nafas atas dan bawah, saluran kemih dan kelamin. Kulit & jaringan lunak, infeksi tulang, GO, abses gigi (terapi tambahan thd penanganan bedah/operasi)</p>	<p>Dewasa & anak-anak dengan berat badan 20 kg atau lebih : 250-500 mg tiap 8 jam. Anak-anak dengan berat badan lebih dari 8 kg : 125-250 mg tiap 8 jam. Tifoid & paratifoid : dewasa : 4 gram/hari dalam dosis terbagi selama 14-21 hari. anak-anak : 100 mg/kg berat badan/hari dalam dosis terbagi selama 14-21 hari. Pembawa tifoid/tifus : 3-4 gram/hari dalam dosis terbagi minimum selama 1 bulan. Gonore : 3 gram Amoksan + 1 gram Probenesid sebagai dosis tunggal. Infeksi saluran kemih tanpa komplikasi : dosis tunggal sebesar 3 gram. Sifilis : 250 mg tiap 6 jam selama 4 minggu sampai dengan 5 bulan. Infeksi saluran pernafasan bagian bawah yang berat atau berulang : 2 kali sehari 3 gram. Abses gigi : 2 kali sehari 3 gram dengan jarak pemberian 8 jam. Otitis media pada pasien dewasa dan anak berusia 3-10 tahun</p>	<p>Reaksi hipersensitivitas da gangguan GI.</p>
------------------	-------------------------------------	--	--	---	---	---

					: 2 kali sehari 750 mg selama 2 hari.	
	ticarcillin	Tetrasanbe	Hipersensitif, gangguan ginjal berat, Hamil, dan anak < 12 tahun.	Infeksi saluran pernafasan, saluran pencernaan, saluran kencing, alat kelamin	Dosis umum: 250 mg tiap 6 jam. Pada infeksi berat dapat ditingkatkan sampai 500 mg tiap 6-8 jam. Sifilis primer, sekunder dan laten: 500 mg tiap 6-8 jam selama 15 hari. Uretritis non gonokokus: 500 mg tiap 6 jam selama 7-14 hari (21 hari bila pengobatan pertama gagal atau bila kambuh).	Anoreksia, mual, muntah, diare, glossitis, disfagia, enterokolitis, lesi inflamasi, ruam makulopapular dan eritematosa, fotosensitasi
Cephalosporin	cefadroxil	Cefadroxil kapsul 500 mg, Cefat kapsul 500 mg, Cefat sirup, Cefadroxyl sirup, Lapicef drop	Tidak boleh di berikan pada pasien yang hipersensitif terhadap sefalosporin.	Infeksi saluran pernafasan, infeksi kulit dan jaringan lunak, infeksi saluran kemih, osteomielitis dan septik artritis	2 kali sehari 1 kapsul, atau bisa dosis tunggal 1000mg sekali minum per hari. Sebelum atau sesudah makan dihabiskan	Mual, muntah, diare, ruam urtikaria, pruritis, genital pruritus, genital moniliasis, vaginitis
	cefixime	Cefila 200/100mg, Cefila sirup, Cefacef 100mg,	Tidak boleh diberikan pada pasien yang memiliki riwayat hipersensitif (reaksi alergi) terhadap sefalosporin.	Otitis media, faringitis, tonsilitis, bronkitis akut & bronkitis kronik dengan eksaserbasi akut, Infeksi Saluran Kemih tak terkomplikasi, GO.	Dewasa & anak lebih dari 30 kg 50-100 mg 2 x sehari. Infeksi berat: 200 mg 2 x sehari. Anak kurang dari 30 kg 1.5-3 mg/kg BB 2 x sehari. Infeksi berat: 6 mg/kg BB 2 x sehari.	Reaksi alergi, perubahan parameter hematologi, gangguan Gastro Intestinal, defisiensi vit K.

	cefotaxime	Cefotaxime	Tidak dapat digunakan untuk pasien yang memiliki hipersensitif terhadap antibiotik cephalosporin (antibiotik untuk membunuh bakteri dengan cara menghambat pembentukan dinding sel bakteri).	Untuk membantu mengobati infeksi pada saluran nafas bagian bawah, sistem saluran kemih dan saluran kelamin, infeksi alat kelamin, infeksi saluran cerna, infeksi tulang dan sendi, infeksi sistem syaraf, serta infeksi sel darah	<ul style="list-style-type: none"> • Infeksi bakteri yang peka terhadap Cefotaxime: dosis 1-2 g diberikan tiap 8-12 jam. Maksimal dosis: 12 g / hari. • Septikemia: diberikan dosis sampai 6-8 g/ hari dalam 3-4 dosis terbagi. • Mencegah infeksi bedah: dosis 1 g diberikan 30-90 menit sebelum prosedur pembedahan. • Gonore: dosis 0,5 g atau 1 g sebagai dosis tunggal. • Semua dosis diberikan melalui injeksi intravena (pembuluh darah) atau intramuskular (melalui otot). 	<ul style="list-style-type: none"> • Gangguan saluran pencernaan: colitis (peradangan pada usus besar), diare, mual, muntah, nyeri perut. • Susunan sara pusat: sakit kepala, pusing
Chloramphenicol	kloramfenikol	Tidak Tersedia	hipersensitivitas, ibu hamil, menyusui, porfiria	Bruselosis, pneumonia bakteri, pertusis, meningitis non-TBC, demam tifus dan	Dewasa, anak dan bayi > 2 minggu: sehari 50 mg/kgBB dalam 3-4 dosis. Bayi < 2 minggu & bayi prematur 25	Depresi sum-sum tulang, anemia aplastik, sindroma gray pada bayi, ruam

				<p>paratifus, skrub tipus, tifus epidemi, limfogranuloma inguinale, gastroenteritis pada bayi, laringotrakeobronkitis, disentri basil, demam Q, ornitosis, sifilis, gonore, tularemia</p>	<p>mg/kgBB/hari dibagi 4 dosis.</p>	<p>kulit, urtikaria, gangguan pencernaan enterokolitis</p>
	thiamfenicol	Bioticol 500mg	<p>Hindari penggunaan Thiamphenicol pada pasien yang memiliki indikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hipersensitivitas atau reaksi alergi terhadap antibiotik kloramfenikol. • Depresi sumsum tulang yang sudah ada sebelumnya (diskrasia darah). • Imunisasi aktif. • Wanita hamil dan menyusui. 	<p>Infeksi saluran kemih dan kelamin, gonore (GO), infeksi saluran pencernaan, infeksi tifus dan paratifus, infeksi saluran pernafasan.</p>	<p>Dewasa : 4 kali sehari 250-500 mg. Anak-anak atau bayi berusia lebih dari 2 minggu : 50 mg/kg berat badan/hari dibagi menjadi 3-4 kali pemberian. Bayi berusia kurang dari 2 minggu : 25 mg/kg berat badan/hari dibagi menjadi 4-6 kali pemberian. Bayi prematur : 25 mg/kg berat badan/hari dibagi menjadi 2 kali pemberian.</p>	<p>Reaksi hipersensitivitas/alergi gangguan saluran pencernaan (mual, muntah, diare), sariawan, glositis, ensefalopati, depresional, sakit kepala dan ototoksitas. Anemia hemolitik. Reaksi Jarish-herxheimer. Pemakaian jangka panjang dapat menyebabkan perdarahan, neuritis optik dan perifer. Efek samping yang potensial fatal : depresi sumsum tulang, greibaby syndrome, anafilaktik.</p>

Macrolides dan Lincosamide	eritromisin	Erysanbe syrup, Erysanbe kaplet	Hipersensitif	Infeksi saluran nafas, kulit dan jaringan lunak, pneumonia, GO, infeksi karena kuman yang peka terhadap eritromisin	Dewasa > 20 kg : 1 - 2g 4 kali sehari. Anak : 30 - 50 mg/kg BB/hari. Diberikan dalam dosis terbagi tiap 6 jam. Berikan sebelum makan.	Gangguan Gl. Jaran hepatotoksik, ototoksik
	azitromisin	Zitrax 500, Mezatrin 250, Azitromisin 500	Hipersensitif, pasien dengan kerusakan hati.	Infeksi saluran napas atas & bawah, kulit & struktur kulit, uretritis & servisititis non GO krn Chlamydia trachomatis	Dewasa : 1 g dosis tunggal oral. Semua indikasi lainnya 500 mg 1 x/hari selama 3 hari. Anak 10 mg/kg BB/hari dosis tunggal selama 3 hari.	Mual, rasa tidak nyaman di perut, muntah, kembung, diare, gangguan pendengaran, nefritis interstisial, gangguan ginjal akut, fungsi hati abnormal, pusing/vertigo, kejang, sakit kepala, somnolen, pemanjangan interval QT.
	klaritromisin	Bicrolid	-	Faringitis atau tonsilitis, sinusitis maksilaris akut, bronkitis kronis eksaserbasi akut, infeksi kulit dan strukturnya tanpa komplikasi	Faringitis dan tonsilitis : 2 kali sehari 250 mg 10 hari. Sinusitis maksilaris akut : 2 kali sehari 500 mg selama 14 hari. Bronkitis kronis eksaserbasi akut : 2 kali sehari 250-500 mg selama 7-14 hari. Infeksi kulit dan strukturnya tanpa komplikasi : 2 kali sehari 250 mg selama 7-14 hari	Diare, mual, gangguan rasa, nyeri abdomen, sakit kepala

	klindamisin	Clinmas 300 mg Clindamicin 300 mg	Superinfeksi, bayi prematur, diare. Gangguan fungsi hati & ginjal	Infeksi saluran nafas bawah, kulit & jaringan lunak, tulang & sendi, intra abdominal, ginekologi, septikemia	Dewasa 150-450 mg 4 x sehari; anak > 1 bulan 8-25 mg/kgBB/hari; anak < 10 kg awal 37.5 mg. Infeksi strep hemolitik, lama terapi dianjurkan 5-10 hari	Gangguan pencernaan
Aminoglikosida	neomisin,	Bioplasenton, Apolar- N, Cinolon- N, Betason- N	Herpes simplex, varicella, TB kulit, dermatitis yang disebabkan oleh syphilis & luka pada kulit. Pengobatan pada mata. Hipersensitivitas terhadap neomycin.	Infeksi dermatitis, atopik & seborrheic dermatitis, pruritus & vulvae, otitis externa.	2-3 x sehari	-
	gentamisin	Sagestam, Digenta, Gentasolon, cendo genta,	Hipersensitivitas	Untuk pengobatan infeksi topikal baik infeksi kulit primer maupun sekunder yang disebabkan oleh bakteri yang peka terhadap Gentamicin.	3-4 kali sehari.	Dapat mengakibatkan iritasi ringan (eritema dan pruritis).
Quinolones	Ciprofloxacin	Kifarox 500, Bernoflox	Hipersensitivitas	infeksi saluran kencing termasuk prostatitis,	infeksi saluran kencing ringan-sedang 2x250mg	Mual muntah, diare, dispesia, nyeri

		500, Baquinor, Simflox, interflox		urethritis dan cervicitis gonorrhea, infeksi saluran pencernaan, demam tifus karena bakteri Salmonella typhosa, infeksi saluran pernafasan karena bakteri Streptococcus, infeksi kulit dan jaringan lunak	perhari; infeksi berat 2x500mg perhari; prostat kronis 2x 500 mg; akut gonorrhea 250 mg dosis tunggal; infeksi saluran pencernaan 2x500 mg perhari; infeksi saluran pernafasan, kulit dan jaringan lunak	abdominal, flatulencia, anoreksia, pusing, sakit kepala, kelelahan, insomnia, tremor, gatal.
	levofloxacin	Cendo LFX, Levoxin, Crafox, Cravit	Hipersensitivitas	Terapi sinusitis maksilaris akut, bronkitis kronik eksaserbasi akut, pneumonia yang didapat dari komunitas, Infeksi saluran kemih, infeksi kulit dan jaringan lunak tanpa komplikasi.	Sinusitis maksilaris akut: 500 mg/hari untuk 10-14 hari. Bronkitis kronik eksaserbasi akut: 500 mg/hari untuk 7 hari. Pneumonia yang didapat dari masyarakat: 500 mg/hari untuk 7-14 hari. Infeksi Saluran Kemih dengan komplikasi: 250 mg/hari untuk 10 hari. Infeksi Saluran Kemih tanpa komplikasi: 250 mg/hari untuk 3 hari. Pielonefritis akut: 250 mg/hari untuk 10 hari. Infeksi kulit dan struktur kulit tanpa komplikasi: 500 mg/hari untuk 7-14 hari.	Reaksi hipersensitivitas, insomnia, sakit kepala, anemia, mual, rasa tidak nyaman pada abdomen.
Tetrasiklin	Tetrasiklin	Tetrasanbe	Hipersensitivitas	Infeksi saluran pernafasan, saluran	2 x sehari 1 tablet	Anoreksia, mual, muntah, diare, glossitis, disfagia,

				pencernaan, saluran kencing, alat kelamin		enterokolitis, lesi inflamasi, ruam makulopapular dan eritematosa, fotosensitasi
	Doksisiklin	Interdoxin, siclidon	Hipersensitivitas	Infeksi saluran napas, saluran pencernaan, saluran empedu, saluran kemih dan kelamin, kulit dan jaringan lunak.	Dewasa dan anak-anak dengan berat badan lebih dari 50 kg : dosis awal 200 mg, pemeliharaan 100 mg sehari sebagai dosis tunggal atau 50 mg tiap 12 jam. Infeksi berat : 200 mg sehar	-
	Minosiklin	Nomika	Hipersensitivitas	Infeksi yang disebabkan oleh organisme yang sensitif atau resisten terhadap tetrasiklin lain, terapi tambahan untuk amubiasis intestinal akut, akne berat.	Dewasa: awal 2 kali sehari setiap 12 jam 200mg kemudian 100mg. anak >8 tahun: awal 2 kali sehari setiap 12 jam 4mg/kgBB kemudian 2mg/kgBB. Gonore pada pasien yang sensitif terhadap penisilin: awal 2 kali sehari setiap 12 jam 200mg kemudian 100mg. minimal 4 hari dengan 2-3 hari kultur pasca terapi. karier meningokokus: 2 kali sehari setiap 12 jam 100mg selama 5 hari. infeksi	Gangguan saluran cerna, ruam makulopapular dan eritema, reaksi hipersensitif, pusing, vertigo, mual, tinitus, anemia hemolitik, trombositopenia, neutropenia dan eosinofilia.

					Mycobacterium marinum 2 kali sehari 100mg selama 5 hari. lama terapi infeksi strep 10 hari dan sifilis 10-15 hari	
Sulfa	sulfametoksazol-trimetoprim	Sanprima forte, sanprima sirup,	Hipersensitivitas	Infeksi saluran napas, kulit, saluran kemih dan kelamin, gastrointestinal, infeksi THT	<p>Dewasa & Anak >12tahun : 1 kaplet forte 2x sehari. Infeksi berat : 1,5 kaplet forte 2x sehari. Infeksi akut berikan sampai dengan minimal 5 hari atau sampai 2 hari bebas gejala.</p> <p>Pneumocytis carinii pneumonitis : 20mg/kg/hr TM & 100mg/kg/hr SMZ dalam dosis terbagi tiap 6 jam selama 14 hari. GO tanpa komplikasi : 2 kaplet Forte 2x sehari selama 2 hari, dilanjutkan dengan 2,5 kaplet 8 hari kemudian.</p> <p>Anak 6-12 tahun: 1/4-1/2 dosis dewasa. Anak 2-6 tahun : 1/4 dosis dewasa.</p>	<p>Gangguan gastrointestinal, sindroma Steven-Johnson&Lyell, JARANG : hepatitis, gangguan hematologi kolitis, pseudomembranos</p>

(2.b) ANTIJAMUR

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
----------	-----------	-------------------------	----------------	----------	----------------------	--------------	-------------

Polyenes	Nistatin	Candistin, Nyimiko, Nyistin mycostatin, kindistatin	Hipersensitivitas	Pengobatan infeksi jamur dalam rongga mulut	Dewasa : 4 kali sehari 5 mL Bayi dan anak : 4 kali sehari 1 mL. infeksi pada rongga mulut karena candida albicans : kumur-kumur suspensi sebelum di telan	Gangguan gastrointestinal, diare, mual, dan muntah	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung
Imidazole	ketoconazol	Ktomed, Formyco, Nizoral, Mycoral	Hipersensitivitas	Infeksi Jamur Sistemik, seperti: 1. Kandidiasis 2. Blastomikosis (infeksi dari Blastomyces dermatitis, terutama menyerang paru-paru) 3. Histoplasmosis (infeksi jamur pada paru-paru yang disebabkan karena menghirup spora jamur) 4. Koksidiomukosis / Demam lembah 5. Parakoksidiomukosis 6. Kandidiasis mukokutan kronis yang	Dewasa : 1 tablet sekali sehari. Pada infeksi berat atau bila respon klinis kurang memadai dalam waktu yang diharapkan : dosis dapat ditingkatkan sampai 2 tablet sekali sehari. Anak-anak > 2 tahun : 5 mg/kg BB/hari.	Mual dan muntah biasa terjadi, tetapi berkurang bila obat diberikan bersama makanan. Efek samping lain jarang terjadi, yaitu: sakit kepala, pusing, nyeri abdominal, konstipasi, diare, demam dan menggigil, fotofobia. parestesia, gusi berdarah, trombositopenia, ginekomastia dan Impoten. Reaksi hipersensitivitas seperti urtikaria,	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung

				tidak responsif terhadap nistatin dan obat-obat lainnya 7. Kromomikosis		pruritus. Insiden dari gangguan fungsi hati yang spontan berpotensi menjadi toksisitas hati yang serius sangat rendah (kira-kira 1 dari 15,000 penderita).	
	Mikonazol	Benoson-M, Thecort, Mycozol	Hipersensitivitas	Infeksi kuku dan kulit karena dermatofita, kandida atau jamur lain dan bakteri gram positif	Oleskan 2 x sehari	Sensasi rasa terbakar, maserasi, dermatitis alergik	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung
	klotrimazol	Canesten, fungider,	Hipersensitivitas	Infeksi jamur seperti panu	2-3 kali sehari dioles tipis-tipis	Iritasi atau gatal pada kulit, rasa terbakar atau perih, melupasnya kulit,	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar

							matahari langsung
Triazole	Flukonazol	Diflucan, Flucoral	Gangguan fungsi hati, < 16 tahun, hipersensitif terhadap fluconazole, golongan azole, terfenadin, sisaprid, astemizol, pimozid, dan kuinidin	Meningitis kriptokokal, kandidemia, kandidiasis diseminata dan infeksi kandidal invasif, kandidiasis orofaringeal, kandidiasis esofageal, kandidiasis vaginal, pencegahan kandidiasis, tinea pedis, korporis, kruris, infeksi kandida awal, infeksi kandida superfisial pada anak	1 x sehari 1 tablet	Gangguan saluran cerna termasuk mual, nyeri abdominal, diare dan kembung, ruam, nyeri kepala, hepatotoksitas	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung
	Itraconazole	Sporacid	Pasien dengan riwayat penyakit hati atau hepatotoksitas karena obat lainnya. Fungsi ginjal abnormal. Hentikan penggunaan obat ini jika terjadi neuropati. Monitor hasil tes enzim hati. Laktasi dan anak.	Terapi jangka pendek: Kandidosis vulvovaginitis, pitiriasis versikolor, dermatomikosis, keratitis karena jamur, kandidosis oral. Terapi jangka panjang untuk Aspergillosis, Kandidosis, Kriptokokkus non meningeal, Meningitis kriptokokkus, Histoplasmosis, Sporotrikosis,	Kandidosis vulvovaginitis 2 kapsul 2 kali sehari selama 1 hari atau 2 kapsul 1 kali sehari selama 3 hari. Pitiriasis versikolor 2 kapsul 1 kali sehari selama 7 hari. Dermatomikosis 1 kapsul 1 kali sehari selama 15 hari. Keratinisasi kuat 1 kapsul 1 kali sehari selama 30 hari. Kandidosis oral 1 kapsul 1 kali sehari	Terapi jangka pendek: mual, nyeri abdomen, sakit kepala, pusing, dispepsia, pruritus, ruam kulit, urtikaria, angioedema, peningkatan reversible enzim hati, sindrom Steven-Johnson. Terapi jangka panjangL gangguan gastrointestinal, hipokalemia, edema,	simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung

				<p>Parakoksidiomikosis, Blastomikosis.</p>	<p>selama 15 hari. Keratitis fungal 2 kapsul 1 kali sehari selama 21 hari. Aspergillosis 2 kapsul 1 kali sehari selama 2-5 bulan. Kandidosis 1-2 kapsul 1 kali sehari selama 3 minggu-7 bulan. Kriptokokkus non meningeal 2 kapsul 1 kali sehari selama 2 bulan-1 tahun. Meningitis kriptokokkus 2 kapsul 2 kali sehari selama 2 bulan-1 tahun. Histoplasmosis 2 kapsul 1-2 kali sehari selama 8 bulan. Sporotrikosis 1 kapsul 1 kali sehari selama 3 bulan. Parakoksidiomikosis 1 kapsul 1 kali sehari selama 3 bulan. Blastomikosis 1-2 kapsul 1-2 kali sehari selama 6 bulan.</p>	<p>peningkatan reversible enzim hati, hepatitis, rambut rontok, neuropati perifer.</p>	
Lainnya	griseofulvin	Gicin 500, Rexafin	Gangguan fungsi hati, < 16 tahun,	Meningitis kriptokokal, kandidemia, kandidiasis diseminata	1 x sehari 1 tablet	Gangguan saluran cerna termasuk mual, nyeri	Simpan di tempat

			hipersensitif terhadap fluconazole, golongan azole, terfenadin, sisaprid, astemizol, pimoqid, dan kuinidin	dan infeksi kandidal invasif, kandidiasis orofaringeal, kandidiasis esofageal, kandidiasis vaginal, pencegahan kandidiasis, tinea pedis, korporis, kruris, infeksi kandida awal, infeksi kandida superfisial pada anak		abdominal, diare dan kembung, ruam, nyeri kepala, hepatotoksitas	sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung
--	--	--	--	--	--	--	--

(2.c) ANTIVIRUS

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat HIV-AIDS	NRTI (zidovudine, abacavir), NNRTI (efavirenz, nevirapine), PI (saquinavir, indinavir)	*Tidak tersedia	Hipersensitivitas.	Digunakan untuk mengatasi penyakit human immunodeficiency virus (HIV), pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak pada wanita hamil.	Dewasa: Dikombinasikan dengan obat antiretroviral lain: Awalnya, 200 mg sekali sehari selama 14 hari. Pemeliharaan: Sebagai tab konvensional: tawaran 200 mg. Sebagai tab rilis diperpanjang: 400 mg sekali sehari.	Signifikan: Sindrom pemulihan kekebalan, redistribusi lemak (misalnya obesitas sentral, punuk kerbau, pengecilan perifer, pengecilan wajah, pembesaran payudara, penampilan cushingoid),	Simpan pada suhu 25°C.

					<p>Anak: Sebagai tablet konvensional atau suspensi dalam kombinasi dengan obat antiretroviral lainnya: Awalnya, 150 mg/m² sekali sehari selama 14 hari. Pemeliharaan: 150 mg/m² tawaran atau sebagai tab rilis diperpanjang 400 mg sekali sehari. ≥16 tahun atau berat ≥50 kg atau dengan BSA >1,25 m²: Sama dengan dosis dewasa.</p>	<p>rhabdomyolysis, peningkatan transaminase. Gangguan sistem darah dan limfatik: Granulositopenia, neutropenia. Gangguan gastrointestinal: Mual, muntah, diare, sakit perut. Gangguan umum dan kondisi tempat pemberian: Demam, kelelahan. Gangguan hepatobilier: Hepatitis.</p>	
Herpes virus	acyclovir	Acyclovir 400 mg, Zoter, Poviral, Azovir	Hipersensitivitas	Pengobatan infeksi yang disebabkan oleh herpes simplex pada kulit dan membrane mukosa, termasuk herpes genital awal dan kambuhan, pencegahan	200 mg , 5 kali sehari selama 5 hari	Gatal- gatal, gangguan gastrointestinal	Simapan pada suhu di bawah

				infeksi herpes simplex pada pasien <i>immune-compromised</i>			
Hepatitis B dan C	interferon, lamivudine	*Tidak tersedia	Hipersensitivitas	Pengobatan Hepatitis dan HIV	<ul style="list-style-type: none"> • Dewasa: 100 mg, sekali sehari. Khusus pasien yang menderita hepatitis B bersamaan dengan HIV, diberikan dosis 150 mg, 2 kali sehari; atau 300 mg, 1 kali sehari. • Anak-anak usia 2–17 tahun: 3 mg/kgBB, 1 kali sehari. Dosis maksimal adalah 100 mg per hari. 	Sakit kepala, mual, diare	
Influenza A dan B virus	amantadine, rimantadine, oseltamivir	*Tidak tersedia	Memiliki riwayat alergi dengan obat ini, pasien	Mengatasi infeksi virus seperti virus	Sesuai petunjuk dokter atau 1. Pencegahan virus	Sakit kepala, diare, mual,	Simpan di tempat sejuk dan

			dengan riwayat penyakit jantung, penyakit liver, gangguan fungsi ginjal, gangguan saluran pernapasan, penyakit paru-paru kronis.	influenza tipe A dan tipe B.	influenza tipe A dan B, Dewasa: 75 mg/hari, 2.Pengobatan influenza A dan B, Dewasa: 75 mg 2x/hari.	muntah, sulit tidur.	kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.
--	--	--	--	------------------------------	---	----------------------	---

(2.d) ANTIPROTOZOA

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antiamoeba	metronidazole	Trichodazole tablet 500 Metronidazole infus 500 mg	Hipersensitivitas	Trikomonas, Saluran kemih, kelamin	3x 1 tablet	Sakit kepala mengantuk , Pusing	Suhu ruang terlindung cahaya
Antimalaria	primaquine, artemisinin, doksisisiklin	Siclidone 100, Interodoxin	Hipersensitivitas terhadap tetrasiklin	Infeksi saluran nafas, urogenital, jaringan kulit dan lunak	8 th 45 kg 100 mg / 12 jam sesudah makan	Mual, muntah, diare	Suhu ruang terlindung cahaya

(2.e) ANTELMINTIK

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antelmintik	Mebendazole	vermox	Tidak untuk ibu hamil, anak	Infeksi cacing tunggal dan campuran	Dewasa 1 tablet 1 x / hari . Anak > 5 tahun sama	Nyeri perut, diare akut	Suhu Ruang terlindung cahaya

			dibawah usia 5 tahun		dengan dosis dewasa. Sebelum atau sesudah makan		
	pirantel pamoat,	Combastrin	Hipersensitivitas	Untuk mengatasi cacing kremi, gelang, tambang	Umur 2-6 tahun : 1-2 tablet, umur 6-12 tahun : 2-3 tablet, umur >12 tahun : 3-4 tablet	Anoreksia (nafsu makan hilang), mual, muntah, diare, sakit kepala, pusing, mengantuk dan merah-merah pada kulit	Suhu Ruang terlindung cahaya

(2.f) OBAT TB

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat TB	Rifampisin	Rifampicin 600 mg, Rifampicin 450 mg, pro TB 2	Hipersensitivitas, gangguan saluran empedu, kehamilan tri semester 1	Tuberkulosis dan lepra	Dewasa= 450-600 mg sebagai dosis tunggal, 1 jam sebelum / 2 jam sesudah makan	Fungsi hati abnormal, Gangguan GI tract	Suhu ruang terlindung cahaya
	Ethambutol	Ethambutol 500 mg, Santibi Plus	Neuritis optic, anak usia kurang dari 13 th	TB Paru yang resistensi	15- 25 mg per Kg BB/ hari dosis tunggal sesudah makan	Gangguan GI, SSP, Hiperurisemia	Suhu ruang terlindung cahaya
	Isoniazid	Tidak ada	Penyakit hati yang diinduksi obat	Tuberkulosis paru	1 Tablet per hari, 1 jam sebelum makan/ 2 jam	Remam, demam	Suhu ruang terlindung cahaya

					sesudah makan		
	Pyrazinamide	Tidak ada	Hipersensitivitas, gangguan fungsi hati yang parah	TB Paru dan TB luar paru	20-35 mg/ Kg BB/ hari. Maksimal 3 gram / hari	Hepatotoksik	Suhu ruang terlindung cahaya

(3) ANTIHISTAMIN DAN ANTIALERGI

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Generasi I	Chlorpheniramine	CTM, Decolsin, Decolgen, Aleron, Ocuson, Siladex,	Anak di bawah 2 tahun	Mengatasi gatal dan alergi	Dewasa 1 tablet 3-4 kali/ hari	Mengantuk, pusing	Suhu ruang terlindung cahaya
	Diphenhyramine	Sanadryl DMP/ EXP, Siladex, Borruginol-N, Woods, Lapisiv-T	Hipersensitivitas	Mengatasi gatal dan alergi	Dewasa 3x 1 tablet / hari	Mengantuk, pusing	Suhu ruang terlindung cahaya
Generasi II	Ketotifen	Profilas tablet/syrup, Intifen	Hipersensitivitas terhadap cetirizine	Meredakan gejala alergi	Dewasa dan anak lebih dari 12 tablet , 1 tablet per hari	Mengantuk, sakit kepala	Suhu ruang terlindung cahaya
	Loratadine	Alloris, Aerus, Logista,	Wanita hamil dan lakatsi	Pengobatan rhinitis alergi, urtikaria	Dewasa 1 tablet / hari	Mengantuk, pusing	Suhu ruang terlindung cahaya

		Clartin, Loratadine, Claritin,			sesudah makan		
	cetirizine	Falergi, Rylfel plus, Triz, Cerini tab/ syrup, Histrine drop	Hipersensitivitas, ibu hamil dan menyusui	Mengobati gejala alergi seperti rhinitis alergi	1 tablet sehari sesudah makan	Detak jantung cepat	Tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya
Generasi III	Desloratadin	Aerius tab/ syrup, destavell tab/ syrup, Simdes syr	Anak di bawah 2 tahun	Mengatasi gatal dan alergi	Dewasa 1 tablet 3-4 kali/ hari	Mengantuk, pusing	Suhu ruang terlindung cahaya

(4) SITOSTATISTIKA

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Sitostatika	siklofosamid,	Tidak ada	Hipersensitivitas terhadap obat siklofosamid	Digunakan dalam pengobatan sindrom nefrotik	Kondisi : kanker Dewasa : dosisnya 40-50 mg/kg BB yang dibagi pemberiannya selama 2-5 hari dan akan di ulang setelah 2-5	Mual, muntah, diare, Sakit Perut, kulit, dan kuku berwarna merah menjadi levi h gelap, rambut rontok.	Disimpan pada suhu ruangan. Pastikan untuk tidak menyimpannya ditempat yang lembab dan jauhkan dari cahaya matahari.

					<p>minggu pengobatan. Kondisi : Kanker payudara Dewasa dosisnya 600mg.m2 luas permukaan tubuh (LPT). Bisa dikombinasikan dengan obat anti kanker lainnya. Kondisi : limfoma non-hodgkin Dewasa : dosisnya 600-1.500 mg/m2 luas permukaan tubuh (LPT). Kondisi : Sindrom nefrotik Dewasa : dosisnya 2-3 mg/kg BB, bisa diberikan sampai 12 minggu ketika pengobatan dengan kortikosteroid tidak berhasil</p>		
	Doksorubisin	Tidak ada	Hipersensitivitas	terapi pengobatan leukemia akut,	Dosis alternatif 1: 60-75 mg/m ² tiap 21 hari sekali.	Mual, muntah, diare, kehilangan selera makan,	Disimpan pada kulkas dengan suhu 2-8°C

				tumor Wilm, neuroblastoma, sarkoma jaringan lunak dan tulang, kanker payudara, kanker ovarium, kanker kandung kemih transisional), (sel kanker tiroid, kanker paru, kanker lambung	Dosis alternatif 2: 60 mg/m ² tiap 14 hari sekali. Dosis alternatif 3: 40-60 mg/m ² tiap 21-28 hari sekali. Dosis alternatif 4: 20 mg/m ² tiap 1 minggu sekali	rambut rontok selama pengobatan, infeksi jamur dan kuku	
	5- fluorourasil	Tidak ada	Hipersensitivitas	Mengobati berbagai jenis kanker, seperti kanker usus besar (kolorektal), kanker lambung, dan kanker payudara	Dosis fluorourasil yang direkomendasikan ialah 200 mg/m ² LPT. Obat diberikan melalui infus IV secara terus-menerus dalam minggu tiga yang terhitung sebagai satu siklus.	Mual, muntah, diare, kehilangan selera makan,	Simpan disuhu 20-25°
	carboplatin	Tidak ada	Jangan digunakan untuk pasien yang mempunyai riwayat hipersensitif.	Menangani kanker tertentu, seperti kanker ovarium	Dewasa: Untuk pasien yang pernah dewasa belum mendapatkan	Sakit kepala, kantuk, gusi terasa sakit dan bengkak	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya.

					pengobatan sebelumnya, dosisnya adalah 400 mg/m ² LPT		
	Metroteksat	Rheu-trex	Hipersensitif, Anemia, Leukopenia	Untuk mengobati penyakit trofoblas ganas, leukemia limfositik akut, leukomia meningeal, kanker payudara, kepala dan leher (epidermoid), paru.	1) Koriokarsinoma pada dewasa: 15-30 mg setiap hari selama 5 hari. Ulangi setelah setidaknya 1 minggu. Atau, 0,25-1 mg / kg (maksimal: 60 mg) setiap 48 jam untuk 4 dosis diikuti dengan penyelamatan asam folinat, ulangi dengan interval 7 hari selama 4 atau lebih kursus. Di berikan melalui injeksi intramuskular (melalui otot).Fungoides mikosisDewasa: di berikan dosis 50 mg seminggu sebagai dosis	Gangguan saluran pencernaan, gagal ginjal, reaksi kulit, hepatotoksisitas (kerysahan hati karena zat kimia)	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya.

					<p>tunggal atau 2 dosis terbagi. Diberikan melalui injeksi intramuskular (melalui otot). 2) Leukemia limfoblastik akut pada dewasa: Pemeliharaan: 15 mg / m² satu atau dua kali seminggu. Diberikan melalui injeksi intramuskular (melalui otot). Cara Pemakaian Diberikan pada saat perut kosong; 1 jam sebelum atau 2-3 jam sesudah makan</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

(5) OBAT SISTEM SARAF

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
----------	-----------	-------------------------	----------------	----------	----------------------	--------------	-------------

Obat hipnotik sedatif/antiansietas	benzodiazepin (alprazolam, diazepam, lorazepam, nitrazepam),	Diazepam, Nozepav, Zipraz, Alprazolam	Hipersensitivitas dan pasien pendiatri usia <6 bulan	Mengatasi gangguan kecemasan, meredakan kejang, kaku otot, atau sebagai obat penenang sebelum oprasi	Dewasa : 5-15 mg, dikonsumsi menjelang tidur. Lansia : 2,5-7,5 mg dikonsumsi menjelang tidur	Kantuk, pusing, lelah, penglihatan buram, gangguan keseimbangan, tubuh gemetar, bingung	Suhu ruang terlindung dari cahaya
	barbiturat (fenobarbital)	Tidak ada	obstruksi saluran pernapasan porfiria, sleep apnea, depresi sistem saraf pusat kambuhan atau orang yang koma	Digunakan dalam pengobatan insomnia berat.	Dosis awal: 3 x sehari 5 mg. dapat ditingkatkan menjadi 5 mg pada interval 2- 3 hari sampai efek terapeutik optimal diperoleh	Kantuk, pusing, mual, muntah, konstipasi, vertigo	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya.
	lainnya (buspiron)	Tidak ada	hipersensitif	Gangguan ansites umum dan gejala ansietes non spesifik dengan atau tanpa depresi.	Total dosis harian 20-30 mg sehari dalam 2-3 dosis terbagi	Sedasi, tidak nyaman lambung, kesulitan tidur, pusing, gugup	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya.
Obat analgetik sentral	Fentanil	Tidak ada	Hipersensitivitas	nyeri tiba-tiba pada pasien yang sudah dalam terapi opioid untuk nyeri kanker kronik; nyeri kronik yang sukar	Dewasa dan anak usia >2 tahun: 25-100 mcg/jam, diberikan	Rasa panas, gatal, perih, bengkak, kesemutan, perubahan warna kulit, muntah, berkeringat	Simpan pada suhu antara 20-25 derajat Celcius, dan Terhindar dari cahaya

				ditangani, indikasi lain	diberikan setiap 72 jam.		
	Petidin	Tidak ada	Hipersensitivitas	untuk manajemen nyeri derajat sedang-berat, misalnya akibat persalinan, pankreatitis atau kolelitiasis	Dewasa Dosisnya sekitar 25-150 mg melalui injeksi IM atau SC setiap 4 sesuai jam kebutuhan; juga dapat diberikan melalui injeksi IV lambat dengan dosis 25-50 mg. diulang setiap 4 jam sesuai kebutuhan	Sesak napas, napas menjadi lebih lambat, depresi disertaitubuh kelelahan.	Simpan pada suhu antara 20-25 derajat Celcius, dan Terhindar dari cahaya
	Morfin	Morphin injeksi, Mst Continous 10 mg	Depresi pernapasan, penyakit hati akut	Penatalaksanaan nyeri pada pasien yang perlu analgesik opioid	Awal 10- 15 mg , tiap 12 jam dapat diberikan sebelum / sesudah makan	Mual, muntah, konstipasi	Suhu ruang terlindung dari cahaya
	Nalokson	Tidak ada	Hipersensitivitas	Reversal pernapasan pasca pemberian obat pioid terapeutik dan pasca oprasi maupun mengurangi efek	Orang dewasa nalokason hiroklorida : 100-200 mcg pemberian tambahan 100 mcg bila	hipotensi, takikardi ventrikel hingga henti jantung	Simpan pada suhu antara 20-25 derajat Celcius, dan Terhindar dari cahaya

				samping dari pemberian opioid secara epidural.	pasien memerlukan dengan interval 2-3 menit dokter akan melakukan pengulangan salam 1-2 jam tergantung jenis dan interval waktu pemberian opioid terakhir		
Obat antidepresan	amitriptilin,	Tidak ada	Infark miokard yang baru, aritmia, penyakit hati berat	Depresi, nocturnal enuresis pada anak	Dosis anjuran untuk depresi : 75-150mg/hari	Mulut kering, sedasi, pandangan kabur, konstipasi, mual, aritmia, brekeringat, tremor, ruam	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya.
	Imipramin	Tidak ada	Infark miokard akut	depresi	Dosis anjuran untuk depresi : 75-150 mg/hari	Sering : efek antikolinergik Jarang : gangguan fungsi hati, gangguan kardiovaskular	Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya.
	Fluoksetin	Kalsetin 10/20	Hipersensitivitas	Depresi/ gangguan depresi mayor	20 mg/ hari maksimal 80 mg/ hari dalam 2 dosis terbagi. Dapat diberikan sebelum/ sesudah makan	Ansietas, gelisah, insomnia, mengantuk	Suhu ruang terlindung cahaya dan kelembaban

	Setralin	Serlof	Hipersensitivitas	Terapi simptomatik untuk depresi	50 mg/ hari maksimal 150 mg- 200 mg / hari. Dapat diberikan sebelum atau sesudah makan	Mual, diare, dispepsia	Suhu ruang terlindung cahaya dan kelembaban
Obat anestesi lokal	Bupivakain	Tidak ada	Hipersensitivitas terhadap anaestesi lokal jenis amida	Anaestesi spinal untuk bedah, bedah abdomen	7,5 mg- 15 mg diinjeksi pada posisi duduk	Hipotensia, bradikardia	Simpan pada suhu ruang terlindung cahaya
	Lidokain	Tidak ada	Lidokain injeksi	Hipertensi berat, penyakit jantung	Anaestesi lokal	0,5- 10 mg secara infiltrasi	Sedasi, kedutan
Obat sistem sarafotonom (antikolinergik, kholinergik)	prostigmin	Tidak ada	Hipersensitif, obstruksi GI atau sal kemih, asma bronkial	Miastenia garvis, ileus paralitik dan retensi urine pasca oprasi	Miastenia gravis dewasa : 30-120 mg/hari. anak-anak 6-12 tahun 60mg/hari Anak < 6 tahun 30mg/hari	Mual, muntah, hiperselivasi, diare, kram abdomen	Simpan pada suhu ryang dan jauhkan dari jangkauan anak-anak
	Pilokarpin	Tidak ada	hipersensitif	Antiglukoma simplek kronis	Diteteskan pada mata sakit	Sakit kepala, mata terasa gatal dan perih, pengelihatan kabur	Simpan pada suhu ryang dan jauhkan dari jangkauan anak-anak
	Atropin	Tidak ada	Hipersensitivitas, glaucoma sudut tertutup, ileus paralitik	Bradikardia dan beberapa jenis keracunan	0,5 mg setiap 3-5 menit maksimal 3 mg	Detak jantung tidak teratur	Suhu ruang terlindung cahaya

	Pirenzepin	Tidak ada	Hipersensitif	Menurunkan produksi asam lambung dan pepsin	Dosis 50 mg dikonsumsi 2-3 kali sehari selama 4-6 minggu	Mulut kering dan pengelihatn kabur	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat kering dan sejuk
	Ipratropium	Combivent 2,5 ml, aerosol	-	Meredahkan dan mencegah gejala karena penyempitan saluran pernapasam (bronkospasme), seperti mengi atau sesak nafas, akibat penyakit paru obstruktif kronik (PPOK)	Dewasa dan anak-anak usia >12 tahun : 20-40 mcg, 3-4 kali sehari. Anak-anak 6-12 tahun : 20-40 mcg, 3 kali sehari. Anak-anak <6 tahun : 20 mcg, 3 kali sehari. Cara penggunaan : 1. buka kunci pengaman inheler 2. buang napas terlebih dahulu sebelum menghirup inheler 3. letakkan moncong inheler didalam mulut	Gejala flu, seperti hidung tersumbat, bersin, atau sakit tenggorokan, pusing atau sakit kepala, mual, sakit perut, mulut kering, konstipasi atau sembelit.	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat kering dan sejuk

					4. tutup bibir rapat-rapat, lalu tarik nafas dalam-dalam. Jangan mengigit moncong inheler		
	Skopolamin	Tidak ada	Hipersensitif	Mengatasi kram perut, usus, atau saluran kemih	Dewasa : 20 mg, 4 kali sehari. Anak-anak 6-11 tahun : 10 mg, 3 kali sehari	Mulut kering, gangguan saluran cerna, pusing, penglihatan kabur	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat kering dan sejuk
	Triheksifenidil	Tidak ada	Hipersensitivitas	Parkinson, gangguan Ekstrapiramidal yang disebabkan obat SSP	2 mg diberikan 2-3 kali/ hari selama 3 – 5 5 hari sesudah makan	Mulut kering, mual	Suhu ruang terlindung cahaya
Obat sistem sarafotonom (adrenergik, antiadrenergik)	klonidin	Clonidin	Hipersensitivitas	Hipertensi	75-150 mg/hari, sesudah makan	Mulut kering, mual muntah	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat kering dan sejuk
	Fenilefrin	Bisolvon	Hipertensi berat dan hiperteroid berat	Hidung tersumbat	Dewasa dan anak > 12 tahun : 3 kali sehari 10 ml. Anak-anak 6-12 tahun : 5 kali sehari 5 ml	Mual, muntah, sakit perut, pusing, tremor	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat kering dan sejuk

	Noradrenalin	Noradrenalin	-	Aritmia, hipovelmia	Hipotensi akut : dosis awal 8-12 mcg/menit melalui infus dan dapat ditingkatkan untuk menamatkan ektivitasnya. Dosis perawatan 2-4mcg/menit melalui infus	Perasaan dingin pada tubuh, bibir dan kuku yang membiru, kesulitan bernafas, bunag air kecil hanya sedikit atau tidak ada sama sekali, detak jantung melambat, sakit kepala parah	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat kering dan sejuk
	Adrenalin	Epinephrine	Hipertensi, jantung koroner	Syok anafilasi, alergi berat, bronkospasme	Dewasa : 0,5 mg, diberikan	Untuk Menangani syok anafilaktik : Dewasa: 0,5 mg, diberikan melalui suntik ke otot (intramuskular/IM), setiap 5 menit hingga muncul tanda-tanda pasien pulih dari syok anafilaktik, atau 0,5 mg melalui suntik di pembuluh darah (intravena/IV) secara perlahan hingga kondisi membaik. Anak-anak: 0,01 mg/kgBB, diberikan	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat kering dan sejuk

						<p>melalui suntikan IM atau suntikan IV.</p> <p>Untuk Tindakan bantuan hidup dasar dan resusitasi jantung paru (RJP) : Dewasa: 1 mg, diberikan melalui suntikan IV. Dosis dapat diulangi setiap 2–3 menit hingga kondisi pasien mulai pulih dan denyut jantung normal kembali.</p> <p>Anak-anak: 0,01 mg/kgBB, diberikan melalui suntikan IV. Dosis dapat diulangi setiap 2–3 menit sekali hingga kondisi pasien mulai pulih dan denyut jantung normal kembali.</p> <p>Untuk Menangani syok septik : Dewasa: 0,0005 – 0,002 mg/kgBB, diberikan melalui infus. Dosis dapat diulang setiap 10–15</p>
--	--	--	--	--	--	--

						menit hingga tekanan darah pasien stabil. Selanjutnya, dosis bisa diberikan tiap 30 menit selama 12–24 jam.	
	Fenoterol	Berotec	Kardiomonopati obstruktif, takiaritmia, glaukoma, gangguan prostat,	Meredahkan dan mengendalikan gejala asma dan pronkopasme	Asma akut : 1 puff/ semprot, jika gejala tidak membaik setelah 5 menit, dapat diberikan puff/ semprotan ke-2 pencegahan asma akibat aktivitas fisik, asma bronkial	Gemetar halus otot rangka, gugup, takikardia, pusing, berdebar atau sakit kepala, iritasi lupal, mual muntah, berkeringat, otot lemah, mialgia, kram otot	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat kering dan sejuk
	Terbutalin	Astherin	Tiroksikosis	Mengobati, mengi dan sesak nafas karena masalah paru-pari seperti asma, peyakit paru obstrituktif kronis, bronchitisdan enfisemia	Dewasa : dosis awal 1 tablet 2 kali sehari, lalu dinaikan menjadi 2 tablet 3 kali sehari setelah 2-4 minggu. Maksimim 6 tablet/hari. Anak-anak sampai dengan usia 12 tahun 3 kali sehari ½	Gemetar dan berdebar	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat kering dan sejuk

					tablet, maksimum 3 kali sehari 1 tablet		
	Salbutamol	Grafalin, sabutamol, Valutine	Hipersensitif, takikardia jantung	Bronkopasme pada semua senis asma bronkial, bronkitis kronik dan enfisema	Dewasa :3-4 kali sehari 1-2 tablet. Anak-anak 6- 12 tahun : 3 kali sehari 1 tablet. Anak-anak 2-6 tahun : 3 kali sehari ½ tablet.	Mual pusing, palpitapsi, tremor, tegang, sakit kepala, vasodilastasi perifer	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat kering dan sejuk
	Propranolol	Propranolol	gangguan fungsi hati, riwayat asma, diabetes, wanita hamil dan menyusui, penggunaan bersama obat aritmia lainnya, hipersensitif terhadap propranolol	terapi hipertensi, angina, aritmia, pencegahan migrain	Dewasa dan anak > 12 tahun untuk hipertensi : 20 mg, 3-4 kali sehari; aritmia : 10-20 mg, 3- 4 kali sehari; angina : 10-20 mg, 3-4 kali sehari; mencegah migrain : 40 mg,2-3 kali sehari. Anak- anak : aritmia : 0,5 mg/kgBB/hari	lemah, lesu, mual, bradikardi (denyut jantung lebih lambat), konstipasi, diare	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat kering dan sejuk

					dibagi 3-4 kali pemberian; hipertensi : 1-3 mg/kgBB/hari dibagi 3 kali pemberian.		
	Atenolol	betablok	Asma, gagal jantung, sindrom penyakit asma, bronkospasme	Hipertensi, terapi infark miokard akut	hipertensi : 50-100mg/hari terapi infark miokard akut : 50-200mg/hari	Bradikardi, gagal jantung, hipotensi, gangguan konduksi, gangguan saluran cerna, gangguan tidur, ruam kulit	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat kering dan sejuk
	Prazosin	minipres	Hipersensitif	Hipertensi	Dosis awal 0,5-1 mg/hari, dosis maks 4mg.hari	Hipotensi artotensik, pusing, palpitesi	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat kering dan sejuk

(6) OBAT KARDIOVASKULAR

(6.a) Obat antihipertensi

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Diuretik	furosemid	Farsix 40, ursix 40, lasix 40	Hipersensitivitas, anuria atau gagal ginjal, hipovolemia	Edema akibat gangguan jantung, hati dan ginjal, serta hipertensi	dewasa: dosis awal 20-80 mg sebagai dosis harian tunggal. Anak-anak: 1-2 mg/kg bb sebagai dosis tunggal.	Gangguan ringan pada saluran cerna, kehabisan calsium, kalium, natrium	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari

					Maksimum 40 mg. Hipertensi: awal 80 mg/hari		
	HCT	CO-irvel, CO-aprovel 150/300	Hipersensitivitas	Hipertensi	1 kali sehari 1 tab, sesudah makan	Pusing, hipotensi ortostatik, hipotensi, edema, takikardia, sakit kepala, tinitus, hepatitis	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
	Spironolakton	Spirola 100 mg, Spirola 25 mg, Spironolacton 100 mg, Spironolacton 25 mg	Gangguan ginjal	Hipertensi	3-4 tablet perhari sesudah makan	Sakit kepala	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
	Amilorid	Tidak ada	Hipersensitif	Hipertensi esensial, edema akibat CHF/ gagal jantung kongestif, sirosis hepatic disertai asites	1 tablet/hari, setelah makan	Parestesia, haus, pusing, hiperurisemia, ruam kulit	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
CCB	Amlodipine	Unisa, opivask, calsvas, cardisan, amcor, norvask, caduet, egoji, coveram,	Hipersensitivitas	Hipertensi dan angina	Dewasa: Dosis awal 5 mg, 1 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan berdasarkan kondisi dan respons pasien	Kantuk, pusing, lelah, sakit perut, mual, kulit wajah atau leher memerah	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari

		<p>normetec. Farmadral, calsivas, divask, simvask, exforge, tensivask,</p>		<p>terhadap pengobatan setelah 1–2 minggu. Dosis maksimal 10 mg 1 kali sehari. Anak-anak usia 6–17 tahun: Dosis awal 2,5 mg, 1 kali sehari. Jika perlu, dosis dapat ditingkatkan menjadi 5 mg, 1 kali sehari, setelah 4 minggu. Peningkatan dosis ditentukan berdasarkan kondisi dan respons pasien terhadap pengobatan. Lansia: Dosis awal 2,5 mg 1 kali sehari.</p>	
--	--	--	--	---	--

	Nifedipin	Adalat oros 30 mg, Nifedipine 10 mg	Hamil, laktasi	Terapi dan profilaksis hipertensi kronis	5- 10 mg / hari . Sebelum / sesudah makan	Asthenia, ederma perifer, palpitasi, sakit kepala, konstipasi	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
	Verapamil	Tidak ada	Hipersensitivitas	Hipertensi, aritmia, angina	Untuk takikardia Dewasa: 40–120 mg, 3–4 kali per hari. Anak usia 2 tahun ke atas: 40–120 mg per hari, 2–3 kali sehari. Anak usia kurang dari 2 tahun: 20 mg, 2–3 kali sehari. Untuk Tekanan darah tinggi Dewasa: Dosis awal 240 mg per hari, dibagi ke dalam 2–3 kali pemberian. Dosis maksimal 480 mg per hari.	Mual, sembelit, sakit kepala, tekanan darah rendah, jantung berdetak kencang, sesak nafas	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari

					<p>Anak usia 2 tahun ke atas: 40–120 mg per hari, 2–3 kali sehari.</p> <p>Anak usia kurang dari 2 tahun: 20 mg, 2–3 kali sehari.</p> <p>Untuk Nyeri dada</p> <p>Dewasa: 80–120 mg, 3 kali sehari.</p>		
	Nicardipine	Tidak ada	Hemostatis, kerusakan hati	Hipertensi	4 mg 1x / hari maksimal 16 mg/ hari	Nyeri punggung, pusing	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
ARB	Losartan	Tidak ada	Hipersensitivitas	Pengobatan hipertensi	50 mg 1x / hari selama 3-6 minggu, dapat ditingkatkan sampai 100 mg/ hari. Sebelum/ sesudah makan	Pusing	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
	Valsartan	Valsartan, diovan, vartan, exforge	Hamil dan laktasi, kerusakan hati	Pengobatan hipertensi, terapi gagal jantung	80 mg 1x per hari dapat ditingkatkan sampai 160	Sakit kepala, pusing, vertigo	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering,

					mg/ hari. Sebelum/ sesudah makan		terlindung dari cahaya matahari
	Candesartan	Canderin 8/16mg , Candensartan 8 mg, bilopres, candefar,	Hamil trimester 2 dan 3, gangguan hati berat	Hipertensi	4 mg 1x sehari maksimal 16 mg / hari	Nyeri punggung, pusing	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
	Irbesartan	Irvel 150 mg, Tensira 300 mg, Irbesartan 300 mg, co irvel, irvask,	Hamil dan laktasi	Hipertensi , sebagai terapi tunggal maupun kombinasi	150 mg 1x per hari dapat ditingkatkan hingga 300 mg	Sakit kepala, pusing	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
	Telmisartan	Micardis plus, twynsta, telsat, tinov	Hamil, laktasi, gangguan fungsi ginjal dan hati yang berat, sirosis hati	Hipertensi	Dewasa : 1 kali sehari 1 tablet, max 1 kali sehari 2 tab. Sebelum atau sesudah makan	Impotensi, nyeri punggung, influenza, pusingm vertigo, nyeri abdomen	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
ACEI	Kaptopril	Captopril 25 mg	Hipersensitivitas terhadap ACE Inhibitor	Terapi tunggal/ kombinasi anti hipertensi	12,5 – 25 mg, 3 x / hari. Dapat dinaikkan hingga 50 mg 2-3 kali/ hari, saat perut kosong	Ruam, anemia, trombositopenia	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari

	Lisinopril	Lisinopril 10 mg, Intepiril 5/10 mg	Riwayat angio edema yang berhubungan dengan terapi ACE Inhibitor sebelumnya	Gagal jantung kongestiv, Hipertensi	10 mg 1 kali / hari sebelum / sesudah makan	Pusing , Sakit kepala, batuk	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
	Ramipril	Ramipril 2,5/5 mg, hyperil, Triatec,	Hipersensitivitas, Riwayat angioedema	Hipertensi, gagal jantung kongestiv	2,5 mg 1x / hari sesudah makan	Gangguan kulit	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
Beta blocker	Atenolol	Farnomin 50mg	Hipotensi, bradikardia,penyakit arteri perifer berat, syok syok kardiogenik, gagal jantung	Stroke, serangan jantung, gangguan pada ginjal, nyeri pada dada (angnia), hipertensi	Kondisi: Hipertensi Sebagai obat tunggal atau kombinasi dengan obat lain, dosisnya 25–100 mg, 1 kali sehari. Dosis dapat disesuaikan berdasarkan kondisi dan respons pasien terhadap pengobatan. Kondisi: Angina pektoris	Lelah, mual, tangan atau kaki terasa dingin.	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari

					<p>Dosis awal 50 mg, 1 kali sehari. Dosis dapat disesuaikan berdasarkan kondisi dan respons pasien terhadap pengobatan.</p> <p>Dosis perawatan pada umumnya adalah 50–100 mg, 1 kali sehari.</p> <p>Kondisi: Gangguan irama jantung (aritmia)</p> <p>Dosis perawatan 50–100 mg, 1 kali sehari, diberikan setelah aritmia terkontrol.</p> <p>Kondisi: Serangan jantung</p> <p>Dosis perawatan 100</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					mg, 1 kali sehari, diberikan setelah kondisi pasien stabil.		
	Propanolol	Propanolol 10 mg, Propanolol 40 mg	Sinus, bradikardia dan asma	Hipertensi, angina, aritmia	Dewasa dan anak > 12 tahun 20 mg , 3-4 kali/ hari	Lemah lesu, mual	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
	Bisoprolol	Concor 10 mg, Beta- one 2,5/5 mg, bisovell, bipro, maintate, opoprol,	Gagal jantung akut, bradikardia	Gagal jantung sedang- berat, pengobatan hipertensi	5- 10 mg/ hari, dosis dapat dinaikkan hingga 20 mg/ hari. Sebelum/ sesudah makan	Gagal jantung, Dispnoea, pusing	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
Alfa blocker	Prazosin, Hidralazin	Tidak ada	Pasien yang diketahui hipersensitivitas terhadap zat aktif, untuk quinazolines lainnya (misalnya prazosin, doxazosin)	Pengobatan hipertensi ringan sampai sedang. Pengobatan simptomatik obstruksi urin yang disebabkan oleh benign prostatic hyperplasia (BPH).	5- 10 mg , 1 x sehari	Mual muntah	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
Sentral	Metildopa	Dopamet 250 mg	Sirosis hati	Hipertensi essensial, termasuk hipertensi berat	½ tablet- 1 tablet/ hari, ditingkatkan bertahap. Sesudah makan	Lesu, mulut kering	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari

	Klonidin	Clonidin tablet	Hipersensitivitas	Hipertensi	75-150 mg/hari . Sesudah makan	Mulut kering, mual muntah, pusing	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
--	----------	-----------------	-------------------	------------	--------------------------------	-----------------------------------	--

(6.b) OBAT ANTIANGINA

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat antiangina	Isosorbide dinitrate	Glaukoma, anemia	Terapi dan profilaksis angina pektoris	Dewasa 1- 2 mg/hari dapat ditingkatkan hingga 10 mg	Hipotensi	Glaukoma, anemia	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
	Nitrogliserin	Hamil dan laktasi. Alkoholisme. Dapat mengganggu kemampuan mengemudi atau menjalankan mesin.	Pencegahan dan terapi jangka panjang angina pektoris.	2.5 mg 2-3 kali/hari. Kasus berat : 5 mg 2-3 kali/hari. Obat harus ditelan utuh dengan segelas air.	Sakit kepala, hipotensi ortostatik, takikardi, kolaps yang disertai dengan aritmia bradikardi, mengantuk. Jarang : kolaps,	Hamil dan laktasi. Alkoholisme. Dapat mengganggu kemampuan mengemudi atau menjalankan mesin.	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari

					kemerahan pada kulit.		
--	--	--	--	--	-----------------------	--	--

(6.c) OBAT GAGAL JANTUNG KONGESTIF

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat gagal jantung kongestif	Digoksin	Fargoxin 0,25 mg, Fargoxin injeksi	Takikardia, Ventikular dan fiblasi	Gagal jantung Kongestif	3-4 kali/ hari. Sebelum / sesudah makan	Gangguan SSP dan GI	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari

(6.d) ANTIPLATELET

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antiplatelet	Asetosal	Proxime 100 mg, Aptor 100 mg, aspilet, cardio aspirin, farmasal	Pendarahan, asma	Pengobatan dan pencegahan angina pektoris dan infark miokard, demam, nyeri pasca vaksinasi, sakit gigi, nyeri otot dan nyeri saraf	Pengobatan dan pencegahan angina pektoris dan infark miokard : 1 x sehari 1 tablet ; Untuk keluhan Demam, flu, pusing dan nyeri pada pasien dewasa	Gangguan lambung, pusing, reaksi hipersensitif	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari

					: 4-6 x sehari 1 tablet, Anak 5-12 tahun : 2-3 x sehari 1 tablet, Anak 1-4 tahun : 3-4 x sehari 1/4 tablet		
	klopidogrel	Clotix, copidre, clogin, CPG,	Pendarahan patologi aktif	hipersensitif komponen obat, gangguan liver, tukak lambung, perdarahan intrakranial, ibu menyusui	untuk pencegahan antithrombosis pada pasien infark miokard, stroke iskemik, penderita sindrom jantung akut	dewasa: 1x sehari 1 tablet	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari

(6.e) OBAT DYSLIPIDEMIA

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat dyslipidemia	Simvastatin	Statcol, vytorin, Cholestat 10/20mg	Penyakit hati aktif	Menurunkan jumlah kolesterol total dan LDL pada hiperkolestolemia	10 mg/ hari, dosis tunggal pada malam hari 20 mg	Nyeri abdomen, konstipasi	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari

	Atorvastatin	Atorvastatin 20 mg, Lipitor 40 mg, Atover, truvaz	Penyakit hati aktif, hamil dan laktasi	Tambahan diet untuk menurunkan kadar kolesterol total	10-80 mg / hari sesudah makan	Konstipasi, kembung	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
	Fenofibrate	Fenofibrate 300 mg, Evothy 300 mg, trolip, Lypanthyl penta, lypanthil supra	Hipersensitivitas, gangguan ginjal dan hati	Hiperkolesterolemi a, hipertrigliserida	300 mg/ hari dapat ditingkatkan hingga 400 mg/ hari. Diminum Bersama makan	Gangguan GI, Sakit kepala	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
	Gemfibrozil	Tidak tersedia	Penyakit kandung empedu dan hati berat, disfungsi ginjal	Hiperkolesterolemi a, Hipertrigliserida, Dislipidemia	900-1500 terbagi dalam 2 dosis sebelum makan	Gangguan GI, Mual muntah	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
	Ezetimib	Enzetrol	Hipersensitif	Menurunkan kolestrol total, LDL, apolipoprotein b dan trigliserida dan meningkatkan HDL pada pasien hiperkolestrol primer	1 kali sehari 1 tablet, dikonsumsi dengan atau tanpa makan dan dikonsumsi dengan waktu yang sama	Sakit perut, nyeri perut, diare. Bila dikombinasi dengan statin : sakitperut, lemas, nyeri perut, smebelit, kembung, mual. Bila dikombinasi dengan fenofibrate : nyeri perut	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari

(6.f) OBAT ANTIARITMIA

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat antiaritmia	Amiodaron	Tidak ada	Hindari mengonsumsi amiodarone jika memiliki riwayat gangguan kelenjar tiroid, hipotensi berat, bradikardia, syok kardiogenik, dan gangguan pernapasan	mengatasi irama jantung yang tidak stabil.	- Dewasa: Dosis awal adalah 300 mg atau 5 mg/kgBB, dengan injeksi cepat. Dosis lanjutan adalah 150 mg atau 2.5 mg/kgBB.	Hipotensi, pusing	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari

7. OBAT SALURAN CERNA

(7.a) Obat gastritis dan tukak lambung

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antasida	Al(OH) ₃ , Mg(OH) ₂ , natrium bikarbonat	Acitral , Sanmag syrup, hufamag, trioacid, dexanta	Gangguan fungsi ginjal, diet rendah fosfat.	Ulkus peptik, hiperasiditas, gastritis, flatulen, dispepsia, hiatus hernia.	1-2 tablet dikunyah. Diberikan diantara waktu makan & sebelum tidur.	Gangguan GI.	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
H ₂ Bloker	Simetidin	Sanmetidin	Hipersensitif	Tukak usus, tukak lambung, saluran cerna atas, hipersekresi patologis	dewasa: tukak lambung 3-4 kali sehari 1-2 tablet, minimal 4 minggu. sindroma zollinger-	Diare ringan, lelah pusing	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari

					<p>ellison dan hipersekresi lambung 4 kali sehari 1 tablet, maksimal 2400mg/hari. esofagitis 4 kali sehari 2 tablet selama 4-8 minggu. anak: menghambat sekresi lambung 20-40mg/kgBB/hari dalam dosis terbagi.</p>		
	Ranitidin	Xeradine, tricker, gastridin, acran, ranvel tab/ syrup, rantine 150,	-	Tukak lambung, ulkus gaster akut	<p>Dosis: tukak duodenum, lambung : 2 kali sehari 150mg (pagi dan malam) selama 4-8minggu. tukak lambung aktif : 2 kali sehari 150mg (pagi dan malam) selama 2 minggu.</p>	Mengantuk, sakit kepala, ruam, lemas, sembelit	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari

					<p>terapi pemeliharaan tukak duodenum dan lambung : 1 kali sehari 150mg sebelum tidur.</p> <p>refluks gastroesofagitis : 2 kali sehari 150mg.</p> <p>esofagitis erosif : 4 kali sehari 150mg.</p> <p>terapi pemeliharaan esofagitis erosif : 2 kali sehari 150mg.</p>		
	Famotidin	Famocid, renapepsa, ulcerid, ulmo, promag double	Hipersensitif	Tukak lambung, hipersekresi asam lambung	<p>Untuk tukak lambung Dewasa: 40 mg, 1 kali sehari sebelum tidur, selama 4–8 minggu.</p> <p>Dosis pemeliharaan adalah 20 mg, 1 kali sehari sebelum tidur.</p>	Sakit kepala, konstipasi, mulut kering, pusing	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari

					<p>Anak-anak usia 1–16 tahun: 0,5 mg/kgBB, 1 kali sehari sebelum tidur atau dibagi menjadi 2 dosis. Dosis bisa ditingkatkan sampai 40 mg per hari. Untuk Produksi asam lambung berlebih Dewasa: Dosis awal 20 mg setiap 6 jam. Dosis dapat ditingkatkan hingga 800 mg per hari, disesuaikan dengan kondisi dan respons pasien terhadap pengobatan.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Untuk Sakit maag tanpa ulkus Dewasa: 10–20 mg, 2 kali sehari. Untuk GERD atau penyakit asam lambung Dewasa: 20 mg, 2 kali sehari, selama 6–12 minggu. Dosis bisa ditingkatkan hingga 40 mg. Dosis pemeliharaan adalah 20 mg, 2 kali sehari. Bayi usia <3 bulan: 0,5 mg/kgBB, 1 kali sehari. Bayi usia 3–12 bulan: 0,5 mg/kgBB, 2 kali sehari. Anak-anak usia 1–16 tahun: 0,5 mg/kgBB, 2</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan hingga 40 mg, 2 kali sehari.		
PPI	Omeprazol	Omeprazole 20 mg, norec, esoferr, Ulpraz, Nexum mups, pumitor, protop, Nexium	Hamil, laktasi	Terapi jangka Panjang ulkus duodenum, Terapi jangka pendek ulkus gaster	20-40 mg 1kali/ hari. Segera sebelum makan	Gangguan GI, Sakit kepala	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
	Lansoprazol	Lanzoprazole 20 mg, Lapraz 20 mg, inhipraz, lanvell lexid, caprazole, unzole, gastrolan,	Hipersensitivitas terhadap lansoprazole	Tukak duodenum, Refluk oseofagus	30 mg 1 kali/hari sebelum makan	Konstipasi, diare	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
	Pantoprazol	Pantoprazole 40 mg, pepzol, pantozol, pantopum, pepzol	Kerusakan fungsi hati, kehamilan	Tukak duodenum dan tukak lambung, inflamasi oseofagitis	1 vial per hari, maksimal 2 vial per hari	Nyeri perut, konstipasi	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
Pelindung mukosa	Sukralfat	Sulkrafat syrup, Lanpepsa syrup, episan syrup, propepsa sirup,	-	Terapi gastritis, tukak lambung dan tukak duodenum	2 sendok takar 4 kali/ hari sebelum makan	Sakit kepala, diare, kembung	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari

		muficat syrup, inepsa syrup,					
Antiflatulen	Dimetilpolisiloksan	Disflatil, posilene	Aritmia, hipokalsemia	Mengurangi penimbunan gas dalam saluran cerna	1-2 tablet dikunyah. Sesudah makan dan sebelum tidur	Faringitis, ruam kulit	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
Analog prostaglandin	Misoprostol	Noprostol, neoprost, invitec	Hamil dan laktasi	Mencegah tukak lambung	100-200 mg 4 kali/ hari	Diare, pendarahan per vagina	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari

(7.b) Obat antidiare

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antimotilitas	Loperamid	Lodia, normudol, lopamid Imodium, diadium, lopramid	Konstipasi, kehamilan dan menyusui	Diare akut non spesifik dan diare kronik	Awal 2 tablet kemudian 1 tablet	Mulut kering, nyeri perut	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
Adsorben	Kaolin pektin, attapulgit	Diagit tablet, arapec, diapet,Neo entrostop	Stenosis saluran cerna	Terapi simptomatik untuk diare non spesifik	Dewasa dan anak > 12 tahun 2 tablet sesudah BAB, maksimal 12 tablet per hari	Konstipasi	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari

Antisekresi	Bismut subsalisilat	Tidak ada	Hipersensitivitas, jangan gunakan jika mengalami diare yang berdarah	Mengatasi diare dan tukak lambung	Untuk diare : Dewasa dan anak usia 12 tahun ke atas: 524 mg tiap 30–60 menit. Jangan minum lebih dari 8 kali dalam 24 jam. Untuk tukak lambung Dewasa: 524 mg, dikombinasikan dengan metronidazole dan tetracycline, 4 kali sehari.	Muntah berwarna hitam, bab berdarah berwarna hitam	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
-------------	---------------------	-----------	--	-----------------------------------	--	--	--

(7.c) Obat laksatif

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Laksatif osmotikgaram	Mg sulfat	Tidak ada	-	Membantu melancarkan buang air besar	Anak 6-12 tahun : gunakan 1-2 sendok teg garam.	Kram perut, diare, kembung, dan mual-mual	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari

					Anak-anak >12 tahun dan dewasa 2-6 sendok teh garam setaip hari		
Laksatif osmotik alkohol/gula tdk dicerna	Gliserin	-	Hipersensitif, diabetes, penyakit liver, fenilketouria, hamil dan menyusui	Meringankan batuk produktif (sebagai eksespektoran)	2-4 tablet tiap 4 jam. Maksimal 24 jam sehari. Aturan pakai sebelum atau sesudah makan	Mual, muntah, diare dan nyeri perut bagian bawah, pusing, berkunang-kunang, sakit kepala	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
	Laktulosa	Graphalac sirup, lactulax sirup, constipen sirup, exterlac sirup	Hipersensitivitas, obstruksi intestinal dan galaktosemia	Mengobati konstipasi (susah BAB)	Konstipasi kronis awal untuk 3 hari pertama : dewasa : sekali sehari 15-45 ml (1-3 sendok makan). anak : sekali sehari 5-15 ml (sendok teh). Bayi < 1 tahun : sekali sehari 5 ml (1 sendok teh)	Penggunaan jangka panjang menyebabkan rasa tidak enak pada perut dan lambung, diare kram lambung dan rasa haus.	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
Laksatif stimulan	Turunan difenilmetan (bisakodil, fenolftalein), antrakuinon	Lazana, Dulcolax,	Obstruksi usus, Hipersensitivitas	Konstipasi	Dewasa 2-3 tablet / hari. Sebelum / sesudah makan	Diare	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering,

							terlindung dari cahaya matahari
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

(7.d) Antiemetik

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antiemetik	Dimenhidrinat	Dramamine 50 mg, decadryl, Antimo	Hipersensitivitas	Mencegah / meredakan mual/ muntah akibat mabuk perjalanan, vertigo	Dewasa 3 x 1 tablet sebelum/ sesudah makan	Mengantuk, gangguan penglihatan	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
	Ondansetron	Dansefion 8 mg, Ondansetron 8 mg, Ondansetron 8 mg injeksi	Hipersensitivitas	Mual/ muntah	8 mg , 2 kali sehari. Sebelum makan	Sakit kepala, konstipasi	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
	Metoklorpramide	Damaben 10 mg, Metoklopramide injeksi	Pendarahan GI, Epilepsi	Pencegahan mual dan muntah	Dewasa 5- 10 mg 3 kali/ hari terbagi dalam 3 dosis	Pusing, rasa Lelah, mengantuk	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari

(8) OBAT SALURAN NAPAS

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
----------	-----------	-------------------------	----------------	----------	----------------------	--------------	-------------

Obat Batuk	Codein	Codikaf 10 mg, Codikaf 15 mg, Codikaf 20 mg	Asma Bronkial, efisema paru	Antitusif, analgesik	10-20 mg tiap 4- 6 jam. Sesudah makan	Ketergantungan obat, mual, konstipasi	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
	dekstromethorphan, gliseril guaikolat	-	Hipersensitivitas, gangguan fungsi hati, asma akut, dan laktusi	Untuk mengobati batuk yang disertai alergi.	Dewasa dan anak > 12 tahun : 3 kali sehari 1-2 tablet. Anak 6-12 tahun : 3 kali sehari 0,5 – 1 tablet. Atau menurut petunjuk dokter. Aturan pakai diberikan setelah makan	Mulut terasa kering, mengantuk, pusing, mual, konstipasi	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
	Bromheksin	Mucoheksin syrup, anakonidin mucolityc dan expectoran syrup, woods, siladex M&E, Benadryl syrup, mucohexin tab, bisolvon,	Hipersensitivitas	Batuk yang memerlukan ekspektoran	Dewasa dan anak > 10 tahun 1 tablet 3 kali sehari . Sesudah makan	Gangguan GI	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari

	Ambroksol	Epesol forte syrup, interpec, lapimuc, mucopect syrup, mucos, Epexol, mucera syrup/drop,	Hipersensitivitas	Terapi skretolitik pada bronkopulmonal akut	Dewasa 2-3 kali/ hari. Sesudah makan	Reaksi alergi	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
	Asetilsistein	Flumucil, acerin, memucil,	Hipersensitivitas	Mengencerkan dahak	Untuk Meringankan batuk berdahak Dewasa dan anak usia >6 tahun: Kapsul, sirop kering, atau granul: 200 mg 2-3 kali sehari Tablet effervescent: 600 mg sekali sehari. Anak-anak usia 2-6 tahun: 100 mg, 2-4 kali sehari.	Mual, Muntah, Sakit maag, Demam, Ruam kulit	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
	Amonium klorida	Sinadryl dmp syrup, ikadyl dmp, oralit, apialys sirp	Hipersensitivitas	Batuk	Dewasa: 50-250 mg, dikonsumsi 3-4 kali sehari.	Kantuk, pusing, sakit kepala, mual, bingung, tremor,, gangguan irama jantung (aritmia)	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering,

					Anak-anak: 25–125 mg, dikonsumsi 3– 4 kali sehari.		terlindung dari cahaya matahari
Obat asma	terbutaline, aminofilin	Lasmalin 2,5 mg	Hipersensitivitas	Asma bronkial, Bronkitis akut	1-2 tab 2-3 mg / hari. Sesudah makan	Sakit kepala, Takikardia	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
	Salbutamol	Salbutamol 4 mg, Astharol 4 mg, Velutine 2 mgventoline 2mg, fartolin sirup, lasal tab/sirup, teosal	Hipersensitivitas	Asma bronkial, Brobkospasme	2-3 mg/ hari. Sesudah makan	Tremor halus, takikardia	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
	Ipratropium Bromida	Combivent	Hipersensitivitas	Bronkodilator pada bronchitis akut	Dewasa 2 semprot 2 kali/ hari	Gangguan GI, Sakit kepala	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
	Theofilin	Theobron 130 mg	Tukak lambung, diabetes	Asma bronkial	Dewasa 1 tablet 2 kali/ hari. Bersama / sesudah makan	Mual, muntah, sakit kepala	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari

	Budesonide	Pulmicort, Bud esma	Hipersensitivitas	Asma bronkial	1-2 mg, 2 kali/ hari untuk resphule	Iritasi ringan pada tenggorokan	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
	Aminophyllin	Aminophyllin 200 mg, Aminophyllin injeksi	Hipersensitivitas terhadap derivate zanthin	Pengobatan dan pencegahan bronkospasma dan inflamasi yang berhubungan dengan asma, emfisema dan bronchitis akut	Dewasa 1 tablet 2x/ hari. Diberikan saat perut kosong	Mual, muntah, nyeri perut, diare , sakit kepala	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari

(9) VITAMIN, MINERAL, ENZIM

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Vitamin	Vitamin A, D, E, K, B1 (thiamin), B6(piridoksin), B12, C	Neurosanbe tablet, Neurosanbe injeksi	-	Pencegahan dan pengobatan defisiensi B1, B6, B1 2 pada kanker beri- beri , neuritis perifer	Dewasa 1 tablet / hari. Sesudah makan	-	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
	asam folat	Folas 400 ng	-	Menurunkan resiko kelainan tabung syaraf pada bayi, Mencegah PJK dan anemia megaloblastik	400 ng/ hari, maksimal 600 ng/ hari. Sesudah makan	-	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari

Mineral	Ca, P, K, Mg, Na, Cl, Fe, Zn, Mn, Cu, I ₂	Prenamia	-	Vitamin dan mineral pencegahan defisiensi zat besi	1 kali per hari. Sesudah makan	Warna BAB gelap	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
---------	--	----------	---	--	--------------------------------	-----------------	--

(10) OBAT SISTEM ENDOKRIN

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat Diabetes melitus	Sulfonilurea (glibenclamide, glimepiride), pioglitazone	Glimepiride 2 mg, Glimepiride 3 mg, Metrix 3 mg, Amaglu 2 mg	DM Type 1, gangguan fungsi hati dan ginjal, hamil dan laktasi	DM type 2	1-8 mg/ hari. Sebelum makan	Hypoglikemia, ruam kulit, urtikaria	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
	Metformin	Metformin 500 mg, Reglus 500 mg	Gangguan fungsi ginjal, kerusakan hati, hamil dan laktasi	Terapi DM onset dewasa dengan obesitas/ BB normal	1 tablet 500 mg/ hari. Sebelum makan	Nyeri abdomen, diare. Ruam kulit, urtikaria	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
	Acarbose	Acarbose 100 mg	Hipersensitivitas terhadap acarbose, Gangguan GI	Terapi pasien diabetes yang tidak terkontrol dengan diet	50-100 mg 3 kali/ hari. Bersama makan / setelah suapan pertama	Diare, nyeri abdomen	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari

	Insulin	Apidra, Humalog,Sans ulin	Hipersensitivitas	Pengobatan DM	Bersifat individual, injeksi subkutan	Hipoglikema	Simpan pada lemari es pada suhu 2-8°C,
Obat hipertiroid danhipotiroid	Propiltiourasi	Propiltiourasil 100 mg	Wanita hamil trisemester 3	Hipertiroidsm	100-150 mg tiap 8 jam. Sebelum/ sesudah makan	Nyeri, kaku sendi	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
	Levotiroksin	Eutyrox 50 mcg	Hipertiroidsm	Hipotiroidsm	75-200 mcg 1 kali/ hari. Sebelum makan	Tremor pada jari tangan, Palpitasi, aritmia, Penurunan BB, Diare	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
Kortikosteroid	hidrokortison,	Hidrokortison	Hipersensitivitas, herpes simplex	Dermatitis atopik dan kontak	2- 3 kali / hari dioleskan pada kulit yang bermasalah	Rasa terbakar, gatal, kulit kering	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
	Betametason	Apolar -N	Hipersensitivitas, infeksi primer oleh virus	Meringankan inflamasi dari dermatitis yang responsive terhadap kortikosteroid	Dioleskan 2 kali sehari pada bagian kulit yang bermasalah	Perubahan atopik lokal pada kulit, iritasi kulit kering	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
	Prednison	Prednison	Penderita penyakit TBC aktif, infeksi akut,	Arthritis rheumatoid, Asma bronkial, SLE	1-4 tablet maksimal 5 mg dalam 3-4	Mual, anoreksia, nyeri otot, iritasi lambung	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering,

			infeksi jamur, herpes simplek		dosis terbagi. Setelah makan		terlindung dari cahaya matahari
	Metilprednisolon	Metyl prednisolone 16 mg, Methyl prednisolone 4 mg, Sanexon 16 mg, Lameson 125 mg injeksi	TB, Infeksi jamur sistemik, DM, Osteoporosis berat	Penyakit kulit dan saluran nafas, penyakit autoimmune, syndrome nefrotik	Awal 4-48 mg kemudian dapat diturunkan secara bertahap sampai dengan dosis efektif. Diminum sesudah makan	Gangguan penyembuhan luka, gangguan metabolisme karbohidrat, lemah otot	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
Obat KB	levonorgestrel, etinilestradiol, lynestrenol	*Tidak tersedia Cyclogynon	DM Berat, pasien dengan gangguan tromboflebitis	Kontrasepsi oral	1 x sehari 1 tablet mulai pada haid hari pertama, sebelum 21	Gangguan fungsi ginjal, jerawat, perubahan libido	Simpan pada suhu 15-30°C, ditempat sejuk dan kering,

					hari tanpa putus diikuti 7 tablet yang tidak beisi obat		terlindung dari cahaya matahari
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------

Dosen Pembimbing PKL




Diah Ratnasari, S.Farm., Apt., M.T
NIDN. 0721119001

Pembimbing PKL,


Apt. Rana Imanjaya, S.Farm.

SIP. 19850502A







C. PRODUCT KNOWLEDGE ALAT KESEHATAN

(1) ALKES PERAWATAN

No	Alkes perawatan	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Bandage gauze (kasa hidrofil) (sumber dari : halodoc)		Kasa steril ini digunakan untuk operasi besar/ kecil, khitan, penutup luka, dan bebat pusar bayi	Bersihkan luka dari kotoran, bakteri dan partikel untuk mencegah infeksi. Keringkan kulit sekitar luka. Tutup luka dari kotoran menggunakan kasa steril.
2.	Elastic bandage (sumber dari : halodoc)		Menutup luka dengan menyangga cedera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegang perban sehingga bagian awal gulungan menghadap ke atas. 2. dimulai ujung perban yang longgar diatas kaki. Biarkan jari-jari anda lepas dari perban. 3. Pegang ujung perban yang longgar pada tempatnya dengan satu tangan, dengan tangan yang lain, lingkarkan perban dua kali dengan melingkari kaki. Selali balut perban dari luar ke dalam. 4. Setelah bagian atas kaki anda dibalut dua kali, gerakkan tangan anda ke tumit 5. Pasang dengan pola seperti angka "8" , biarkan tumit anda terbuka. Tumpang tindih perban sebanyak ½ lebarnya setiap kali anda memutarnya. 6. Silangkan perban diatas kaki anda, gerakan keatas, dan letakkan di

				<p>belakang pergelangan kaki anda. Pindahkan perban kebawah dan silangkan diatas kaki anda. Bungkus perban dibawah kaki anda. Ulangi sekali lagi.</p> <p>7. Letakan perban betis Anda dan balut dalam lingkaran ke atas menuju lutut Anda. Berhenti membungkus di bawah lutut Anda. Anda tidak perlu lagi membalut betis Anda dengan perban.</p> <p>8. Kencangkan ujungnya ke sisa perban. Jangan gunakan klip logam di tempat kulit Anda terlipat atau terlipat, seperti di belakang lutut.</p>
3.	<p>Kapas pembalut (sumber dari : halodoc)</p>		<p>Membersihkan dan menutupi luka agar tidak mudah terinfeksi serta dapat digunakan untuk lapisan perban</p>	<p>Ambil kapas secukupnya dan bersihkan area tubuh yang mengalami luka.</p>

4.	Kasa berisi obat (sufra tulle, daryant tulle, bacti grass, actisorb, paronet) (sumber dari : alodokter)		Menutup luka seperti luka bakar, dan infeksi bakteri sekunder dan mendukung penyembuhan luka.	Potong Daryant-Tulle seluas daerah luka, dan tempelkan pada luka
5.	Kasa dressing		Untuk menutupi luka bakar	Potong kain kasa sesuai ukuran dan lekatkan pada luka.
6.	Kasa steril	 <p>Kasa Steril 16x16cm (KS B1-Q)</p>	Untuk oprasi besar atau kecil, khitan, penutup luka dan bebet pusar bayi.	Bersihkan luka dari kotoran, bakteri, dan partikel untuk mencegah infeksi. Keringkan kulit sekitar luka dengan lembut. Tutup luka dari kotoran dan bakteri menggunakan kasa steril.




7.	Pembalut gips (gypsona)		Untuk membalut bagian tubuh setelah diberi lap kapas atau saat patah tulang.	
8.	Pembalut leher/cervical collar		Menopang kepala, membatasi gerak dan mengurangi nyeri bagian leher.	Masukan cervical collar secara perlahan lalu rekatkan kedua sisi.
9.	Plester Elastik (handyplas, band aid, elastikon)		Menutup luka dan memberi bantalan bagi luka	Buka dan pasang lalu posisikan kasa yang ada ditengah plaster pada luka.

10.	Plester kertas (leukopor, dermilite)		Untuk menutup luka yang memiliki daya rekat dan tembus udara sehingga meminimalisir terjadinya iritasi pada kulit.	Tutup luka dengan menggunakan plaster kertas dengan daya rekat yang tinggi dan terhindar dari air (waterproof).
11.	Plester plastik (leukofix, transfor)		Digunakan sebagai perekat untuk plaster infus, kateter, kanula dan lainnya.	Sebagai isolasi yang melekatkan perban.
12.	Plester plastik waterprof (setonplast, blenderm)		Plater luka kedap air plaster ini digunakan untuk membantu menjaga luka cepat sembuh, serta melindungi luka dari kuman dan kotoran	Plater ditempelkan pada luka, plater ini melindungi luka dari air agar tidak perih.




13.	Plester rayon (microfore, dermisel)		Untuk menutup luka	Rekatkan bersamaan dengan kasa untuk menutupi bagian yang luka
14.	Plester sutera (leukosilk)		Menutup luka menggunakan nanodiamon ke dalam serat sutra.	Luka dibersihkan menggunakan alkohol atau antiseptik lainnya, tempel plaster pada luka, plaster ini lebih cepat memulihkan luka karena mengandung nano diamon.
15.	Plester ZnO (leukoplas)		Untuk perekat penutup luka, perekat tube, eatheter, dan cannulae.	Leucoplast digunakan seperlunya untuk pengobatan pada luka.




(2) PERAWATAN PASIEN

No	Perawatan pasien	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Bedpan		Untuk Menampung feses atau kotoran pada pasien yang tidak boleh atau bisa ke WC.	Letakan bedpan yang nyaman, pasien dibantu untuk berdiri atau diangkat atau posisinya diatas badpan, jika suah buang feses kemudian dicuci.



2.	Breast pump		Untuk membantu memompa air susu	Alat pemeras asi cukup diletakan alat nya di payudara, alat pemeras asi akan menekan payudara dan menyimpan asi langsung ke dalam botol yang terpasang.
3.	Colostomy bag		Untuk menampung feses atau kotoran pada pasien setelah menjalankan oprasi colon (pembedahan usus untuk membuat anus buatan melalui otot dan kulit pada perut).	Dokter akan membuat sayatan lalu menanamkan cincin didinding perut untuk menyangga agar ujung usus besar dapat berada dilokasi tepat pada dinding perut.
4.	Ihsjap/eskap		Kompres dingin, digunakan untuk menurunkan demam dikepala atau dibagian yang sakit perdangan atau pembengkakan.	Isi eskap dengan es batu yang sudah hancur dengan volume $\frac{3}{4}$, komres pada area yang diinginkan, jika sudah selesai gantung eskap dengan posisi tutup dibawah untuk dikeringkan.

5.	Kruk		Tongkat untuk alat bantu untuk orang yang cacat atau cedera.	Sesuaikan ukuran tongkat kruk. bangun dari duduk kemudian ambil tongkat kruk dan diletakkanndi lengan untuk membantu menyangga saat berjalan.
6.	Pus basin/emesis basin		Menampung muntah, nanah, kapas, dll.	Pada saat melakukan oprasi dokter akan menggunakan pus basin sebagai tempat pembuangan kapan bekas,
7.	Spalk		Untuk menahan atau menjaga agar bagian tulang yang patah tidak bergerak.	Lepaskan area ynag menutupi area bagian tubuh yang mengalami patah tulang, rekatkan area yang patah tulang dengan bidal atau spalk lalu lilit dengan perban atau kertas koran atau sepotong kain apa bila tidak ada.




8.	Tapelhoed/nipple shield		Melindungi puting susu saat menyusui.	Tempelkan nipple shield pada puting sebelum menyusui. Biarkan bayi menyusui melewati nipple shield.
9.	Tongkat pyramide/elbow		Alat bantu jalan untuk menopang tubuh waktu berdiri.	Pasang tongkat dengan tangan yang berlawanan pastikan tongkat sedikit kesamping, gerakan tongkat kedepan pada saat yang sama maju degan kaki yang sakit dan pegang tongkat seecara stabil.
10.	Urinal		Penampung urine untuk pria.	Posisikan alat kelamin kedalam wadah, gunakan untuk menampung urine.





11.	Walker		Alat bantu jalan untuk keseimbangan	Pegang tongkat dengan tangan yang berlawanan dengan sisi yang sakit, posisikan tongkat sedikit kesamping, gerakan tongkat terlebih dahulu kemudian kaki yang sakit dan pegang tongkat secara stabil.
12.	Warm water zak		Untuk menghangatkan tubuh	Masukan air panas kedalam Warm water zak, dan ditelupkan kedalam bagian tubuh yang sakit.
13.	Windring/air cusion		Untuk membantu penderita ambeien atau wasir dan penderita cedera punggung agar lebih nyaman saat duduk.	Meletakkan Windring/air cusion sebagai alas untuk duduk.




(3) ALKES TINDAKAN MEDIS



No	Alkes tindakan medis	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Ballon/foley cathether		Digunakan untuk membantu mengeluarkan urine serta mengosongkan kandung kemih pada pasien yang mengalami kesulitan buang air kecil (retensi urine).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencuci tangan dan membuka alat kateter. 2. Letakkan perlak dibawah anus pasien setelah pakaian bawah pasien dibuka. 3. Daerah vulva akan dibersihkan dengan kapas dan cairan antiseptik. 4. Selang karakter diberikan pelumas agar mudah dimasukan ke saluran uretra 5. Selang kateter dimasukan hingga mencapai leher kandung kemih sekitar 5 cm. 6. Bernapas hingga urine keluar. 7. Kosongkan kantung urine yang terhubung dengan karter setiap 6-7 jam sekali.
2.	Condom cathether (sumber dari: Healthline)		Untuk penampung urine pria.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gunakan sabun dan air hangat, cuci tangan dan penis. Bersihkan kepala penis, tarik kembali melewati kepala. 2. Bilas penis, lalu biarkan hingga benar-benar kering. 3. Periksa penis anda apakah ada yang iritasi atau luka terbakar. 4. Jika menggunakan sealant, oleskan pada kulit penis dan sekitar area





			<p>kemaluandan biarkan mengering, seharusnya tersasa halus dan licin saat kering.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Letakkan kondom diujung penis dan buka gulungannya secara perlahan hingga mencapai pangkalnya. Sisakan ruang yang cukup pada ujungnya (1 sampai 2 inci) agar tidak bergesekan dengan kondom6. Jika kondom mengansung perekat, tempelkan pada penis anda sekitar 15 detik7. Tempatkan penahan sarung di sekitar penis anda dipangkalnya, jaga agar sedikit longgar agar tidak menghentikan aliran darah.8. Hubungkan selang pada tas pengumpul ke kondom.9. Ikat tas pengumpul ke kaki anda (dibawah lutut) unntuk drainase yang baik.10. Jika ingin melepas kondom lama dengan mengulungnya, bukan menariknya.
--	--	--	--





3.	Disposable syringe		<p>Alat bantu medis yang berupa pompa piston sederhana untuk menyuntikan atau menghisap cairan atau gas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buka penutup alat suntik, 2. Celupkan ujung jarum ke cairan atau obat yang akan dihisap, 3. Tarik piston sampai obat atau cairan terhisap dengan sesuai yang dibutuhkan, 4. Kemudian, arahkan jarum ke bagian tubuh yang akan disuntikkan.
4.	Endotracheal		<p>Untuk menjaga jalan napas tetap terbuka pada pasien yang tidak mampu bernapas sendiri atau mempertahankan jalan napasnya sendiri.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dibius terlebih dahulu, 2. Masukkan tabung endotrakeal ke batang tenggorokan dengan ventilator
5.	Enema syringe (sumber dari : alodokter)		<p>Untuk membersihkan lubang anal sehingga saluran pengeluaran kotoran menjadi bersih.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berbaring miring kearah kiri pada alas 2. Kedua kaki ditekuk dan lutut ditempelkan ke dada, 3. Masukkan selang enema secara perlahan melalui dubur kira-kira sampai kedalaman 10 cm.




6.	Feeding syringe		Digunakan untuk membantu memberikan susu atau makanan	Masukan makanan yang sudah dihaluskan atau susu ke dalam Feeding syringe, lalu dimasukkan kedalam mulut.
7.	Feeding tube		Memasukan cairan makanan yang tidak dapat makan atau minum.	Masukan selang melalui hidung / mulut masukan spuit kedalam lubang bawah untuk memasukan makanan kedalam tubuh.
8.	Gliserin syringe		Untuk menyemprotkan lavement/ clysmo melalui rectal atau anus.	Letakan badpan dibawah anus, lalu masukan gliserin keatas secara perlahan dengan tangan kiri memegang anus dan tangan kanan memasukan gliserin ke dalam anus.
9.	Gloves/handschoen (sumber dari: halodoc)		Untuk mencegah penularan kuman, dan untuk oprasi atau bedah.	Cuci tangan terlebih dahulu lalu pasang gloves sebelum melakukan tindakan

10.	Infusion set dewasa (sumber dari: halodoc)		Untuk keperluan infus untuk orang dewasa.	Usap tangan pasien dengan alkohol swab, lalu cari intravena nya untuk dipasang selang infus.
11.	Infusion set pediatrik (sumber dari: halodoc)		Untuk mengatur obat atau ntrisi parenteral melalui selang keperluan infus pada anak/ bayi.	Usap tangan pasien anak/bayi dengan menggunakan alkohol swab, lalu cari intravena nya untuk dipasang selang infus
12.	Insulin syringe (sumber dari: halodoc)		Untuk suntik insulin (diabetes).	Cubit kulit yang akan disuntik, bersihkan menggunakan tisu alkohol, masukan jarum suntik dengan posisi 90°, kemudian dorong pompa suntik hingga semua dosis insulin masuk kedalam tubuh, lalu saat selsai tarik jarum suntik sebelum melepas cubitan.





13.	Intra vena catheter (sumber dari: halodoc)		Sebagai vena tambahan dalam pengobatan jangka panjang (48 jam).	Masukan jarum infus ke pembuluh darah disiapkan tabung IV, pilih IV kateter yang sesuai.
14.	Masker oksigen (sumber dari: halodoc)		Untuk memberikan O ₂ dengan kadar sedang	Pastikan sudah terpasang selang ke sumber oksigen, pastikan kantung reservoir mengembang, dan pastikan terdapat katup satu arah berfungsi baik, ubah aliran O ₂ menjadi 10-15 L/menit dan letakan masker oksigen pada wadah pasien menutupi hidung dan mulut.
15.	Masker nebulizer anak-anak (sumber dari: halodoc)		Untuk mengubah cairan obat menjadi uap atau aerosol dengan partikel yang kecil dan halus sehingga dapat dengan mudah dihirup oleh pasien dengan melalui pernafasan menuju paru-paru yang digunakan untuk anak-anak.	Masukan obat kecangkir nabulzer sesuai aturan dokter, sambungkan corong mulut kecangkir nebulzer pasang selang penyambung antara mesin kompresor dan cangkir nebulzizer, nyalakan mesin, letakkan corong mulut kemulut dan pastikan tidak ada celah, biasanya membutuhkan waktu 15-20 menit.
16.	Masker nebulizer dewasa (sumber dari: halodoc)		Melegakan saluran nafas untuk orang dewasa.	Masukan obat kecangkir nabulzer sesuai aturan dokter, sambungkan corong mulut kecangkir nebulzer pasang selang penyambung antara mesin kompresor dan cangkir nebulzizer, nyalakan mesin, letakkan corong mulut kemulut dan pastikan tidak ada celah, biasanya membutuhkan waktu 15-20 menit.

17.	Metal cathether (sumber dari: halodoc)		Untuk mengeluarkan urine/ bak/ kencing yang terbuat dari metal/ besi stainliss steel.	Alat ini biasanya digunakan untuk mengeluarkan kencing, dengan memasukan metal cateter kedalam kelamin lalu tarik ujung bulat metal cateter agar bisa mengeluarkan kencing.
18.	Mucus extractor (sumber dari: halodoc)		Untuk menghisap lendir pada hidung bayi yang baru lahir supaya lendir pada hidung tidak mengganggu pernafasan bayi.	Memasukan selang yang tidak ada tonjolan ke dalam hidung, kemudian ditarik sambil dihisap.
19.	Nasal gastric tube (sumber dari: halodoc)		Untuk menyuplai makanan dan minuman pada pasien yang tidak normal.	Memasukan selang melalui lubang hidung, melewati tenggorokan hingga masuk ke lambung. Setelah itu, masukan makanan, minuman dan obat.
20.	Nebulizer set		Untuk mengubah cairan obat menjadi uap.	Masukan obat ke cangkir nebulizer dengan anjuran dokter, sambungkan corong ke canagkir nebulzer, pasang selang penyambung antara mesin kompresor, nyalakan mesin, letakan corong ke mulut dan pastikan tidak ada celah, prosedur ini membutuhkan waktu 15-20 menit.

21.	Needle		<p>untuk menembus kulit agar sampai ke pembuluh darah untuk memasukkan obat cair</p>	<p>Buka bungkus jarum suntik, masukkan ke dalam spuit, dan siap digunakan.</p>
22.	Nelaton cathether		<p>digunakan untuk drainase urine jangka pendek atau alat bantu pengosongan kandung kemih dalam proses kateterisasi.</p>	<p>Selang kateter diberi pelumas untuk memudahkan ketika dimasukan kedalam sle uretra, dimasukan hingga mencapai kanung kmeih, setelah itu pasien sudah bsa kencing menggunakan selang kateter.</p>
23.	Oxygen nasal canula		<p>digunakan untuk memberikan oksigen pada orang dewasa dengan kebutuhan oksigen rendah atau pada bayi dan anak dengan nares paten yang membutuhkan oksigen tambahan tingkat rendah.</p>	<p>Posisikan pasien untuk duduk, hubungkan selang kanul ke sumber O2, nyalakan oksigen sesuai yang dibutuhkan pasien.</p>
24.	Rectal tube		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengeluarkan udara dari usus atau menghilangkan ketegangan perut 2. Mengeluarkan faeses yang berbentuk cair terutama pada pasien diare 	<p>Pasang alas dipantat, memasang plastik diujung rectal tube dan ikat dengan karet, olesi dengan pelumas, buka anus dengan tangan kiri, masukan rectal tube perlahan, memfiksasi rectal tube dengan menghilang.</p>


25.	Spinal needle		Digunakan sebagai alat untuk menstabilkan penempatan jarum berukuran kecil selama anestesi tulang belakang.	Masukkan spinal needle kedalam spuit lali masukan obat atau cairan, suntikan kedalam tubuh.
26.	Stomach tube		Untuk pengambilan getah lambung atau membilas atau mencuci perut	Masukan selang kedalam tubuh dengan melapisi pelumas dulu, pasang selang dengan stomach tube yang digunakan untuk membilas isi perut.
27.	Suction cathether		Untuk mengeluarkan cairan berlebih khususnya pada daerah oropharyngeal dan Nasopharyngeal. (daerah rongga mulut dan rongga hidung).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan cuci tangan dan Identifikasi pasien 2. Siapkan dan dekatkan alat ke pasien <ol style="list-style-type: none"> a. Alat penghisap lendir b. botol berisi larutan desinfektan c. Kateter penghisap lendir steril d. Pinset steril e. Sarung tangan steril 3. Tempatkan pasien pada posisi terlentang atau kepala miring ke arah perawat (Pakai sarung tangan) 4. Hubungkan kateter penghisap dengan slang alat penghisap 5. Hidupkan mesin penghisap 6. Lakukan penghisapan lendir





				<p>dengan memasukkan kateter penghisap kedalam kom berisi aquades atau NaCl 0,9% untuk mempertahankan tingkat kesterilan (asepsis)</p> <ol style="list-style-type: none">7. Masukkan kateter penghisap dalam keadaan tidak menghisap8. Gunakan alat penghisap dengan tekanan 110 - 150 mmHg untuk dewasa, 95 - 110 mmHg untuk anak-anak dan 50 - 95 mmHg untuk bayi (Potter & Perry,1995)9. Lakukan penghisapan dengan tarik memutar kateter penghisap tidak lebih dari10. detik, bisa dilakukan 3 - 5 kali jika masih kotor11. Bilas kateter dengan aquades atau NaCl 0,9%12. Apabila pasien mengalami distress pernafasan, biarkan istirahat 20 - 30 detik sebelum melakukan penghisapan berikutnya.13. Setelah selesai, kaji jumlah, konsistensi, warna, bau sekret dan respons pasien terhadap prosedur yang dilakukan
--	--	--	--	--





28.	Suction connecting		Selang penghubung antara chateter dengan mesin penyedot.	Selang penghubung yang dihubungkan dengan suction chateter.
29.	Tranfution set		Alat steril yang berfungsi mengalirkan mengalirkan darah atau produk darah dari kantong darah ke dalam pembuluh darah pasien.	Pasang selang ketangan pasien, sebelumnya diusap dengan alkohol swab, cari intravena pasien lalu pasang tranfution set.
30.	Tuberculin syringe		untuk pasien penderita TBC / suntik vaksininasi	Masukkan cairan ke alat suntik, pastikan gelembung udara di alas suntik tidak ada, suntikan dengan tegakan lurus mendorong pelan stik di tabung ke dalam.
31.	Urine bag		Menampung air kencing	Pasang kondom chateter lalu pasang urine bag pada pasien.





32.	Wing needle		Sebagai vena tambahan	Tentukan vena pasien, masukkan cairan kedalam spuit, pasang wing needle, tusuk bagian yang akan diambil darahnya.
-----	-------------	--	-----------------------	---




(4) ALAT-ALAT BEDAH




No	Alat-alat bedah	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Arterie klem/artery forceps		Untuk menghentikan pendarahan pembuluh darah kecil dan menggenggam jaringan lainnya dengan tepat tanpa menimbulkan kerusakan yang tidak dibutuhkan.	Pegang arteri klem dengan jari lalu capit benda yang akan dipakai.
2.	Bandage scissors		Alat untuk menggunting perban tanpa mencungkil kulit	Siapkan perban dan bandage scissors lalu gunting perban dengan bandage scissors sesuai kebutuhan.


3.	Benang jahit catgut chromic		Benang jahit unuk penjahitan luka yang dianggap bekam rapat dalam waktu 10 hari	Masukkan benang jahit ke jarum bedah, bius pasien dahulu sebelum melakukan operasi.
4.	Benang jahit catgut plain		Menjahit jaringan lunak seperti otot, usus dan uterus. Dapat diserap 3-7 hari	Masukkan benang jahit ke jarum bedah, bius pasien terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan.
5.	Benang jahit silk		Menjahit luka yang ada dikulit dan sering bergerak	Masukkan benang jahit ke jarum bedah, bius pasien dahulu sebelum melakukan tindakan.
6.	Bisturi		Pisau operasi untuk prmbedahan	Pegang bisturi dengan menggenggam bagian bawah, pastikan pisau bisturi sudah disterilisasi, lalu arahkan ke tempat yang akan disayat.

7.	Forceps/pinset anatomis		Penjepit jaringan dalam proses operasi	Tekan pada bagian tengah (bagian yang berisi-garis) dengan menggunakan jari.
8.	Forceps/pinset cilia		Untuk mencabut rambut, untuk membantu proses melahirkan normal	Pasien akan dianstesi dulu, lalu pasang kateter urine untuk mengosongkan kandung kemih. Dokter akan membuat sayatan dijalan lahir untuk mempermudah proses mengeluarkan bayi dengan forceps.
9.	Forceps/pinset sirugis		Untuk menjepit jaringan pada waktu diseksi membentuk pola jahitan	Genggam pinset dengan ibu jari dan dua atau tiga jari lain dalam satu tangan, lalu gunakan untuk menggenggam objek kecil dengan cepat dan mudah.
10.	Forceps/pinset splinter	 <p data-bbox="824 1348 1052 1380">Pinset Splinter 11,5cm</p>	Mencabut pecahan yang menancap dipermukaan kulit	Jika ada pasien yang mengalami kecelakaan seperti terkena pecahan kecil, bisa diambil dengan alat tersebut.

11.	Gunting bedah mayo		Memotong jaringan dan menggunting balutan	Selama pembedahan bila ada jaringan atau balutan yang tidak sesuai maka bisa dipotong dengan gunting bedah mayo
12.	Gunting bedah metzenbaum		Untuk memotong jaringan halus dan diseksi tumpul untuk menggunting jaringan	Pegang gunting dengan tangan kanan. lalu gunting perban atau bagian tubuh yang akan dilakukan pembedahan.
13.	Gunting bedah runcing		Untuk mencukur, memotong atau membedah (usus, jantung)	Memegang gunting dengan ibu jari dan jari telunjuk untuk memotong organ tubuh.
14.	Gunting tali pusar		Memotong tali pusar bayi baru lahir	Genggam alat dengan tangan kanan lalu potong tali pusar pada bayi yang baru lahir.

15.	Hecting set		Alat bedah minor untuk menjahit luka	Membantu saat benang jahit keluar dan masuk ke dalam kulit.
16.	Jarum jahit		Menutupi goresan, luka dan sayatan	Anestesi dulu, pembersihan luka, jahit luka dengan jarum jahit yang sesuai yang akan digunakan.
17.	Klem mosquito		Menjepit jaringan tubuh maupun pembuluh darah untuk menghentikan pendarahan	Jepit jaringan dengan memegang klem dengan tangan kanan (dominan).


18.	Klem tali pusat/umbilical cord clem	 <p>Umbilical Cord Klem Nylon</p>	Menjepit tali pusat yang baru dipotong dari plasenta	Jepit tali pusat dengan klemtasi pusat pada bayi yang baru lahir.
19.	Needle hoolders	 <p>Needle Holder 18 cm</p>	Menjepit jarum jahit serta menjahit luka tertentu	Memotong benang dengan alat ini selama pembedahan.
20.	Peritoneum forceps		Menjepit jaringan selaput perut	Genggam peritoneum dengan tangan kanan, jepit jaringan dengan peritoneum

21.	Skalpel		Pisau untuk pembedahan	Tentukan lokasi tubuh bagian yang akan dilakukan pembedahan bedak bagian atau dengan skalpel.
-----	---------	--	------------------------	---

(5) Disinfektan

No	Disinfektan	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Alkohol 70%		Untuk antiseptik, membersihkan luka dan membersihkan alat-alat medis	Basuh luka dengan alkohol 70% dan lakukan dengan hati-hati.

2.	Alkohol swab		<p>alat kesehatan berupa kapas atau tisu alkohol antiseptik yang digunakan untuk membersihkan luka dan pembersih alat-alat kesehatan</p>	<p>siapkan alat yang akan dibersihkan sebelum digunakan, lap dengan alkohol swab dan sebelum disuntik biasanya kulit dilap dengan alkohol swab agar bersih dari kuman.</p>
3.	H ₂ O ₂ 3%		<p>Antiseptik untuk mencuci luka berfungsi untuk mencegah infeksi kulit dari luka gores, luka bakar, luka potong</p>	<p>Bersihkan luka dengan alkohol terlebih dahulu, lalu obati luka dengan hidrogen peroksida dengan kapas.</p>
4.	Povidone iodine		<p>Agen antiseptik yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi pada luka</p>	<p>Bersihkan daerah yang luka, oleskan sedikit larutan povidon iodine ke luka lalu tutup luka dengan perban steril.</p>

5.	Rivanol		Cairan desinfektan yang digunakan untuk membersihkan luka.	Tuang rivanol pada kapas, kemudian usapkan pada luka.
----	---------	---	--	---

(6) APD



No	APD	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Apron		pelindung tubuh untuk melapisi luar gaun yang digunakan oleh petugas kesehatan dari penetrasi cairan infeksius pasien dan melindungi diri dari suhu panas dan percikan bahan kimia berbahaya	Sebelum memasuki laboratorium atau tempat yang berbahan kimia, pakai apron terlebih dahulu untuk melindungi diri.
2.	Masker		suatu benda yang fungsinya digunakan untuk melindungi serta menutup hidung dan mulut agar terhindar dari paparan virus	Pasang masker diwajah sebelum melakukan aktifitas yang membutuhkan masker.

3.	Masker N95 disposable		Pelindung wajah dengan penyaring partikel	Pasang masker setelah memakai masker bedah.
4.	Non woven/surgical cap		Menutup dan melindungi rambut dan mencegah terjadinya jatuhnya keringat atau rambut	Siapkan surgeon cap, pasang di kepala sebelum melakukan tindakan.
5.	Sarung tangan		pelindung tangan dari pengaruh lingkungan	Siapkan gloves, pasang di kedua tangan.
6.	Shoe cover		pelidung bagian kaki dari paparan virus/bakteri penyebab penyakit	Pastikan telah memakai sepatu atau sandal yang bersih, pakailah shoe cover dengan benar.

7.	Kaca mata google		Pelindung terhadap paercikan cairan tubuh /benda lain pada saat melakukan operas, melindungi terhadap sinar UV	Sebelum melakukan tindakan operasi pasang kacamata google di mata dengan posisi yang nyaman.
----	------------------	--	--	--





(7) ALKES UNTUK DIAGNOSA





No	Alkes untuk diagnosa	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Anaroid spygmomanometer		Untuk mengukur tekanan darah	Sipkan spygmomanometer, pasang menses tempatkan stetoskop, pompa menses.periksa tekanan darah sistolik dan diastolik, baca hasil tekanan darah.
2.	Electrical sphygmomanometer		Untuk mengukur tekanan darah	Gunakan manset pada lengan atas pastikan ujung selang berada di tengah lengan, kencangkan manset, saat pengukuran duduk tegak dan kaki merapat dilantai.



<p>3.</p>	<p>Mercurial sphygmomanometer</p>		<p>Untuk mengukur tekanan darah (lebih akurat, bebas air raksa)</p>	<p>Lengan pasien diminta untuk lurus lalu pasang manset di kengan pompa sampai selesai.</p>
<p>4.</p>	<p>Chart vision Snellen</p>		<p>Untuk mengetahui kesehatan mata pasien</p>	<p>Pasien diminta duduk/berdiri dengan jarak 6 meter dari kartu snellen, tutup salah satu mata pasien, pasien akan membaca dari garis paling atas ke bawah dan petugas kesehatan akan memeriksa.</p>




5.	Ear speculum		Memeriksa rongga telinga	Spekulum di fixasi dengan ibu jari dan jari telunjuk, daun telinga dijepit menggunakan jari tengah & jari manis tangan kiri, sebaliknya dilakukan apabila ingin memeriksa telinga kiri.
6.	Ear thermometer		Mengukur suhu dalam saluran telinga menggunakan inframerah	Tekan tombol ON masukkan perlahan termometer kedalam telinga belakang, ukur suhu tubuh hingga terdengar bunyi yang sebagai penanda pengukuran sudah selesai, lihat hasil di layar termometer dan tekan tombol OFF untuk mematikan.




7.	Gelang pasien	 <p>GELANG THERMAL PREMIUM SATU ROLL ISI 125 pcs</p>	Tanda pengenal atau penanda pasien	<p>Kuning: pasien dengan pengawasan Merah: alergi obat Biru pasien laki-laki Pink: pasien perempuan Abu-abu: pasien kemoterapi</p>
8.	Head lamp		Lampu senter kepala untuk periksa pasien, biasanya digunakan dibagian THT, IGD, ruang bedah	Memasang di kepala sebelum memulai tindakan.
9.	Hemometer		Untuk menentukan kadar hemoglobin dalam darah berdasarkan saluran warna	Mengisi tabung degan HCl 0,01N sampai garis batas, mengambil darah dengan sanli sebanyak 0,02 ml. memasukkan darah ke tabung suhu dan aduk, mengencerkan dengan aquades sedikit demi sedikit hingga didapatkan warna yang sama dengan warna standar hemometer.

10.	Ishihara's test for colour blindness		Untuk menentukan kelainan buta warna	Pasien disuruh membaca huruf/angka yang ada di buku, ada pula pola untuk pasien ikuti dengan perbedaan warna yang ada.
11.	Laringeal mirror		Memeriksa keadaan dalam mulut	Cermin dimasukkan ke belakang rongga mulut dengan permukaan cermin menghadap keatas.
12.	Nasal speculum		Memeriksa rongga hidung	Masukan alat ke rongga hidung dengan posisi vertikal, masukkan speculum 1 cm ke dalam vesti bulum.
13.	Pen needle		Untuk penggunaan insulin, untuk mengendalikan kadar gula dalam darah	Siapkan insulin pen dan pen needle pasang pen needle dibawah lalu insulin pen siap digunakan.

14.	Percussion hammer		Mengetuk permukaan tubuh untuk menghasilkan suara dengan tujuan diagnostik	Pegang pada gagang pegangan oleh dokter, kemudian ayunkan alat ke arah bagian tubuh yang sakit/berkelainan.
15.	Pulse meter		Mengukur kadar oksigen dalam darah	Cuci tangan, nyalakan mesin kemudian jari tangan dimasukkan ke oxymeter, tunggu hingga mengeluarkan hasil pada layar, lepaskan klip, bersihkan oxymeter dengan alkohol.
16.	Rectum speculum		Memeriksa lubang anus/rectal	Cuci tangan, masukkan bagian anoskop ke dalam anus, sisipan itu melebarkan anus hingga diameter tabung.
17.	Reflex hamer		Memancing reaksi untuk mendeteksi kelaian fisik	dipegang pada bagian gagang pegangan oleh dokter yang bersangkutan. Kemudian palu tersebut akan di ayunkan mengarah ke bagian dari tendon yang disinyalir memiliki kelainan.

18.	Spirometer		Mengukur aliran udara masuk dan keluar dari paru-paru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Duduklah dengan posisi paling nyaman. 2. Kemudian, dokter akan menutup hidung Anda menggunakan alat semacam klip tepat di atas hidung. 3. Tarik napas dalam-dalam dan tahanlah selama beberapa detik. 4. Embuskan ke dalam mouthpiece pada spirometer sekuat dan secepat yang Anda bisa
19.	Stethoscope binaural		Untuk mendengar bunyi /detak organ tubuh	<ul style="list-style-type: none"> • Pastikan alat pendengar menghadap ke depan. Jika Anda memakainya menghadap ke belakang. Anda tidak akan bisa mendengar bunyi apa pun. • Pastikan alat pendengar memiliki bantalan yang ukurannya pas dan dapat mengunci" dengan baik di telinga Anda untuk menghindari suara-suara dari lingkungan sekitar. Jika ukurannya tidak pas, biasanya bantalan tersebut dapat dilepas. Kunjungi toko penyedia alat medis untuk membeli bantalan baru. • Pada beberapa jenis stetoskop. Anda juga dapat memiringkan atau menekuk gagang alat pendengar ke depan untuk membuatnya pas di telinga

20.	Stethoscope monoaural		Untuk mendengar suara organ dalam tubuh detak jantung bayi	Tempelkan bulat besar diperut ibu lalu gunakan untuk mendengar detak jantung bayi dengan bulatan kecil.
21.	Stopwatch		Untuk menghitung waktu	Stopwatch sesuai yang diinginkan, lalu letakan stopwatch di tempat aman.
22.	Termometer digital		Untuk mengukur suhu tubuh digital melalui mulut, ketiak dan rektal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nyalakan termometer dengan menekan atau mengeser tombol ON. 2. Masukkan termometer secara perlahan dan hati-hati ke dalam mulut, lipatan ketiak atau liang telinga anak. 3. Biarkan selama 3 sampai 5 menit atau tunggu sampai ada bunyi yang menunjukkan pengukuran suhu sudah selesai dilakukan.

23.	Termometer oral		Mengukur suhu tubuh melalui oral	Meletakkan ujung termometer di bagian bawah lidah dan tutup mulut hingga alat mengeluarkan bunyi tertentu.
24.	Termometer rektal		Mengukur suhu tubuh melalui rektal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencuci Tangan. 2. Siapkan Termometer. 3. Posisikan Tubuh dalam Keadaan Nyaman. 4. Masukkan Termometer ke Anus. Cabut Termometer dari Anus. 5. Catat Hasilnya dan Bersihkan Termometer
25.	Timer lab		Untuk pengingat waktu medis	Searah jarum jam hingga ke-angka 55 Kemudian diputar balik ke arah waktu sesuai yang diinginkan.

26.	Tongue depressor		Untuk menekan lidah agar dapat melihat lebih jelas keadaan tenggorokan	Pasien diminta untuk membuka mulut, lalu tekan lidah dengan Tongue depressor
27.	Tourniquet		Untuk menghentikan pendarahan pada luka terbuka di lengan dan kaki	tourniquet dipasang pada 3-4 inci di atas tempat tusukan. Jika terlalu dekat dari tempat tusukan, vena dapat kolaps ketika darah terisap ke dalam tabung dan jika terlalu jauh dari tempat tusukan pengambilan darah tidak akan efektif.
28.	Vaginal speculum		Untuk memeriksa lubang vagina	Dikedalam vagina selama operasi langsung dan memeriksa vagina didalamnya.

Dosen Pembimbing PKL



Diah Ratnasari, S.Farm., Apt., M.T
NIDN. 0721119001

Pembimbing PKL,



Apt. Rana Tmanjaya, S.Farm.
SIP. 19850502A

A. SWAMEDIKASI

Buatlah studi kasus setiap harinya dengan katagori obat yang berbeda dan wajib menyelesaikan 20 jenis Obat yang tertera dalam tabel

No	Nama obat	Kategori	Studi Kasus	Patient assesment	Pemilihan Obat dan alasannya	Pelayanan informasi obat
1.	Analgetik dan antipiretik	paracetamol; ibuprofen	<p>A: selamat datang di kimia farma, ada yang bisa saya bantu ?</p> <p>P: saya mau beli obat demam untuk anak saya, sudah demam selama 1 hari.</p> <p>A: baik ibu,kalau boleh tau untuk anaknya usia dan berat badannya berapa bu?</p> <p>P: anak saya sudah berumur 12 bulan untuk berat badannya 10kg.</p> <p>A: apakah ada riwayat sakit atau alergi obat??</p> <p>P: dulu anak saya pernah demam berdarah.</p> <p>A: apakah anaknya sudah minum obat bu?</p> <p>P: belum minum obat sama sekali, hanya dikompres.</p> <p>A: baik tunggu sebentar ngeh bu saya ambilkan obatnya</p> <p>P: baik mbak</p> <p>A: bu ini untuk obatnya ada sanmol sirup sama tempru sirup, sama-sama digunakan</p>	<p>W : anak umur 12 bulan, BB 10 kg</p> <p>W : demam, pernah demam berdarah</p> <p>H : 1hari</p> <p>A :dikompres</p> <p>M :belum munum</p>	<p>Obat yang terpilih paracetamol sirup</p> <p>Alasannya karena pernah demam berdah, anak-anak agar lebih cepat diserap oleh tubuh</p>	<p>Indikasi : meredakan nyeri termasuk sakit kepala, sakit gigi, demam yang menyertai flu dan setelah imunisasi.</p> <p>Cara penggunaan: Usia 9-12 tahun 3-4 kali sehari 15-20 ml</p> <p>Usia 6-9 tahun 3-4 kali sehari 10-15 ml</p> <p>Usia 2-6 tahun 3-4 kali sehari 5-10 ml</p> <p>Usia 1-2 tahun 3-4 kali sehari 5 ml</p> <p>Kapan berhenti: jika mual semakin meningkat</p> <p>Kapan harus ke dokter : 5 hari setelah gejala muncul</p> <p>ESO yang sering :</p>

			<p>untuk demam untuk harganya yang sanmol syrup 21.500 sedangkan untuk temptra syrup 51.500</p> <p>P: saya mau yang sanmol syrup aja mbak</p> <p>A: baik ibu, jadi totalnya 21.500</p> <p>P: baik ini mbak uangnya</p> <p>A: baik ibu saya terima 50.000 kembali 28.500 ya ibu</p> <p>P: baik mbak</p> <p>A: ini untuk sanmol syrup nya ibu bisa diminum 3-4 kali sehari 1 sendok teh, setelah makan ngeh bu</p> <p>P: baik mbak</p> <p>A: apakah ada yang perlu ditanya kan lagi bu?</p> <p>P: sudah tidak ada mbak</p> <p>A: baik ibu terimakasih, semoga sehat selalu</p>			<p>mual, muntah, gangguan hati.</p> <p>Cara menyimpan: simpan ditempat yang sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari.</p>
2.	Batuk	gliseril guaiakolat (guafenisin), bromheksin, diphenhidramin, asetilsistein, noskapin	<p>A: selamat datang di kimia farma, ada yang bisa saya bantu ?</p> <p>P: mbak saya mau beli obat batuk nya itu ngekel sama dahak sulit keluar, sudah 2 hari terakhir ini</p> <p>A: apakah ibu sudah minum obat sebelumnya?</p>	<p>W : ibu dina, usia 60 tahun</p> <p>W :batuk ngekel, dahak sulit keluar</p> <p>H : 2 hari</p> <p>A : minum air garam</p> <p>M : konimex</p>	Obat yang terpilih asetyl sistein seperti L-Acys Alasannya karena mempunyai efek yang baik untuk	Indikasi : trapi pengencer dahak pada penyakit bronkial dan paru akut dan kronik dengan dahak yang tebal, seperti bronkhitis akut, bronkhitis

			<p>P: baru diminumi air garam namun tidak berkurang dan sudah dibelikan konimex oleh anak saya ditoko</p> <p>A: baik ibu, kalau boleh tau dengan ibu siapa dan umur berapa?</p> <p>P: saya bu dina dengan usia 60 tahun</p> <p>A: apakah ada riwayat sakit atau alergi obat?</p> <p>P: tidak ada mbak</p> <p>A: baik ibu tunggu sebentar saya ambilkan obatnya ngeh bu</p> <p>P: baik mbak</p> <p>A: bu ini untuk obatnya ada L-aycs bagus digunakan oleh keluhannya ibu</p> <p>P: baik mbak, untuk harganya berapa?</p> <p>A: untuk harganya 33.500</p> <p>P: baik mbak, ini untuk uangnya</p> <p>A: baik bu, uangnya saya terima pas ngeh bu</p> <p>P: baik mbak</p> <p>A: 2-3 kali sehari 1 kapsul, sesudah makan</p> <p>P: baik mbak</p> <p>A: baik ibu, ada yang bisa saya bantu lagi?</p>	<p>mengencerkan dahak</p>	<p>kronik dan akut berulang, emfisema paru</p> <p>Cara penggunaan: 2-3 kali sehari sesudah makan</p> <p>Kapan berhenti: Jika terjadi reaksi hipersensitivitas</p> <p>Kapan harus ke dokter : Setelah 5 hari gejala belum berkurang</p> <p>ESO yang sering : mual muntah</p> <p>Cara menyimpan : Simpan ditempat sejuk dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>
--	--	--	---	---------------------------	--

			<p>P: sudah mbak terimakasih A: baik bu, semoga sehat selalu</p>			
3.	Obat Flu	<p>Sediaan kombinasi parasetamol, dekstrometorfan, gliseril guaiakolat (guafenisin), CTM, dan efedrin/pseudoefedrin/fenilpropanolamin</p>	<p>A: selamat datang di kimia farma, ada yang bisa saya bantu ? P: mbak mau beli obat meriang sudah 1 hari, tenggorokan terasa gatal seperti mau batuk, dan sering bersin-bersin, saya juga sudah mandi pakai air hangat dan minum jahe hangat tapi sabi belum berkurang mbak. A: baik ibu, kalau boleh tau dengan ibu siapa dan umur berapa? P: saya bu rini dengan usia 30 tahun A: apakah ada riwayat sakit atau alergi obat? P: tidak ada mbak A: baik ibu tunggu sebentar saya ambilkan obatnya ngeh bu P: baik mbak A: bu ini untuk obatnya ada tuzalos P: baik mbak, berapa? A: 6.000 P: oke mbak, ini uangnya A: baik ibu untuk uangnya</p>	<p>W : ibu rini, 30 tahun W : tenggorokan terasa gatal seperti mau batuk, dan sering bersin-bersin H : 1 hari A : mandi pakai air hangat M : minum jahe hangat</p>	<p>Obat yang terpilih kombinasi parasetamol, dekstrometorfan, gliseril guaiakolat (guafenisin), CTM, dan efedrin/pseudoefedrin/fenilpropanolamin seperti Tuzalos Alasannya pasien juga merasakan meriang, batuk serta sering bersin-bersin.</p>	<p>Indikasi : Gejala flu : batuk, demam, pilek karena alergi. Cara penggunaan: 3 kali sehari sesudah makan jika terjadi reaksi hipersensitivitas Kapan harus ke dokter : Setelah 5 hari gejala belum berkurang ESO yang sering : Mengantuk, takikardia Cara menyimpan : Simpan ditempat sejuk dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>

			<p>pas ngeh</p> <p>P: baik mbak</p> <p>A: 3 kali sehari 1 tablet, sesudah makan</p> <p>P: baik mbak</p> <p>A: baik ibu, ada yang bisa saya bantu lagi?</p> <p>P: sudah mbak terimakasih</p> <p>A: baik bu, semoga sehat selalu</p>			
4.	Obat Maag	Antasida, antagonis H ₂ (ranitidine, famotidine)	<p>A: selamat datang di kimia farma, ada yang bisa saya bantu ?</p> <p>P: mbak mau beli obat nyeri perut atas disertai mual sudah 2 hari.</p> <p>A: apakah ibu sudah mengkonsumsi obat seelumnya?</p> <p>P: sudah mbak, saya kasi antasida dan sudah saya kasi minyak kayu putih tapi masi belum berkurang</p> <p>A: baik ibu, kalau boleh tau dengan ibu siapa dan umur berapa?</p> <p>P: saya bu zaro dengan usia 22 tahun</p> <p>A: apakah ada riwayat sakit atau alergi obat?</p> <p>P: tidak ada mbak</p> <p>A: baik ibu tunggu sebentar</p>	<p>W : bu zaro, 22 tahun</p> <p>W : nyeri perut atas disertai mual</p> <p>H :2 hari</p> <p>A : minyak kayu putih</p> <p>M : antasida</p>	<p>Obat yang terpilih</p> <p>Ranitidine</p> <p>Alasannyakarena a dapat mengtasi tukak lambung seperti nyeri di bagian perut atas</p>	<p>Indikasi : tungkak lambung dan tukak duodenum, refluks esofagitis, dispepsia episodik kronik, tukak akibat AINS, tukak duodenum karena H.pylori, sindrom Zollinger-Elison, kondisi lain dimana pengurangan asam lambung</p> <p>Cara penggunaan: 2 kali sehari 30 menit sebelum makan</p> <p>Kapan berhenti: jika terjadi diare, mual</p>

			<p>saya ambilkan obatnya ngeh bu</p> <p>P: baik mbak</p> <p>A: bu ini untuk obatnya ada ranitidine</p> <p>P: baik mbak, berapa?</p> <p>A: 4.000</p> <p>P: oke mbak, ini uangnya</p> <p>A: baik ibu untuk pas ngeh bu</p> <p>P: baik mbak</p> <p>A: 3 kali sehari 1 tablet, sesudah makan</p> <p>P: baik mbak</p> <p>A: baik ibu, ada yang bisa saya bantu lagi?</p> <p>P: sudah mbak terimakasih</p> <p>A: baik bu, semoga sehat selalu</p>			<p>Kapan harus ke dokter: Setelah 5 hari gejala belum berkurang</p> <p>ESO yang sering : sakit kepala, konstipasi, diare, mual</p> <p>Cara menyimpan : Simpan ditempat sejuk dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>
5.	Kecacingan	Pirantel pamoat, piperazin, mebendazol	<p>A: selamat datang di kimia farma, ada yang bisa saya bantu ?</p> <p>P: mbak mau beli buat anak saya sudah 3 hari mengalami nafsu makan yang menurun, terlihat lemas, dan mengeluh gatal dibagian duburnya tiap malam hari, berat badannya juga menurun. Sudah saya kasih vitamin penambah nafsu makan juga masi sama</p> <p>A: baik ibu, kalau boleh tau</p>	<p>W : Anak Dara, 5 tahun</p> <p>W: mengalami nafsu makan yang menurun, terlihat lemas, dan mengeluh gatal dibagian duburnya tiap malam hari, berat badannya juga menurun.</p> <p>H : 3 hari</p>	<p>Obat yang terpilih Pirantel pamoat seperti combantrin</p> <p>Alasannyakarena dapat membasmi cacing (cacing kremi, cacing tambang, cacing gelang, cacing cambuk) didalam tubuh.</p>	<p>Indikasi : cacing kremi, cacing tambang, cacing gelang, cacing cambuk</p> <p>Cara penggunaan: Usia 2-6 tahun : 1-2 sendok teh Usia 6-12 tahun : 2-3 sendok teh Usia diatas 12 tahun : 3-4 sendok teh</p>

		<p>anak nya namanya siapa dan umur berapa?</p> <p>P: anak saya namanya dara dengan usia 5 tahun</p> <p>A: apakah ada riwayat sakit atau alergi obat?</p> <p>P: tidak ada mbak</p> <p>A: baik ibu tunggu sebentar saya ambilkan obatnya ngeh bu</p> <p>P: baik mbak</p> <p>A: bu ini untuk obatnya ada combantrin suspensi dengan rasa jeruk bagus digunakan untuk mengatasi cacangan</p> <p>P: baik mbak, untuk harganya berapa?</p> <p>A: untuk harganya 23.500</p> <p>P: baik mbak, ini untuk uangnya</p> <p>A: baik bu, uangnya 24.000 untuk kembaliannya 500 ngeh bu</p> <p>P: baik mbak</p> <p>A: 1 kali sehari 1-2 sendok teh</p> <p>P: baik mbak</p> <p>A: baik ibu, ada yang bisa saya bantu lagi?</p> <p>P: sudah mbak terimakasih</p> <p>A: baik bu, semoga sehat selalu</p>	<p>A : tidak dilakukan</p> <p>M : vitamin penambah nafsu makan</p>	<p>Diberikan sehari sekali</p> <p>Kapan berhenti: Setelah 5 hari gejala belum berkurang</p> <p>Kapan harus ke dokter :</p> <p>ESO yang sering : sakit perut, demam dan sakit kepala</p> <p>Cara menyimpan : dikotak obat dan terhindar dari sinar matahari secara langsung.</p>
--	--	--	--	---

6.	Diare	Attapulgit, kaolin pectin, oralit, Norit	<p>A: selamat datang di kimia farma, ada yang bisa saya bantu ?</p> <p>P: mbak mau beli obat buat kakak saya mengalami BAB cair sehari sudah 5 kali, sedikit lemas dan perutnya seperti diremas-remas, karena kakak saya tidak sengaja meminum detol</p> <p>A: apakah sudah mengkonsumsi obat?</p> <p>P: sudah minum oralit dan tadi juga dikasi air putih</p> <p>A: baik ibu, kalau boleh tau kakanya namanya siapa dan umur berapa?</p> <p>P: kakak saya jul dengan usia 23 tahun</p> <p>A: apakah ada riwayat sakit atau alergi obat?</p> <p>P: tidak ada mbak</p> <p>A: baik ibu tunggu sebentar saya ambilkan obatnya ngeh bu</p> <p>P: baik mbak</p> <p>A: bu ini untuk obatnya ada diagit baik digunakan untuk pencernaan</p> <p>P: baik mbak, untuk harganya berapa?</p> <p>A: untuk harganya 39.300</p>	<p>W : Jul, 23 tahun</p> <p>W : mengalami BAB cair sehari sudah 5 kali, sedikit lemas dan perutnya seperti diremas-remas.</p> <p>H : 1 hari</p> <p>A : minum air putih banyak</p> <p>M :oralit</p>	<p>Obat yang terpilih antapulgit seperti diagit</p> <p>Alasannya karena pasien kaeracunan cairan pembersih maka obat tersebut agar dapat menyerap racunnya</p>	<p>Indikasi :trapi simtometik untuk diare nonspesifik</p> <p>Cara penggunaan:</p> <p>Usia diatas 12 tahun : 2 tab setelah buang air besar sehari maksimal 12 tab</p> <p>Usia 6-12 tahun : 1 tab setelah buang air besar sehari maksimal 6 tab</p> <p>Kapan berhenti: jika diare sudah reda</p> <p>Kapan harus ke dokter : saat kondisi semakin lemas</p> <p>ESO yang sering : Stenosis saluran cerna</p> <p>Cara menyimpan : simpan dibawah 30°C terlindung cahaya.</p>
----	-------	--	--	--	--	---

			<p>P: baik mbak, ini untuk uangnya</p> <p>A: baik bu, uangnya 50.000 untuk kembaliannya 10.700 ngeh bu</p> <p>P: baik mbak</p> <p>A: diminum langsung 2 tab setelah buang air besar sehari maksimal 12 tab</p> <p>P: baik mbak</p> <p>A: baik ibu, ada yang bisa saya bantu lagi?</p> <p>P: sudah mbak terimakasih</p> <p>A: baik bu, semoga sehat selalu</p>			
7.	Laksatif	Bisakodil, laktulosa, Na lauril sulfat.	<p>A: selamat datang di kimia farma, ada yang bisa saya bantu ?</p> <p>P: mbak mau beli obat buat istri saya mengalami sembelit sudah 3 hari,</p> <p>A: baik ibu, kalau boleh tau dengan ibu siapa dan umur berapa?</p> <p>P: istri saya namanya bu kasma dengan usia 28 tahun</p> <p>A: apakah sudah mengkonsumsi istrinya sudah mengkonsumsi obat pak sebelumnya?</p> <p>P: kan istri saya lagi hamil mbak jadi saya takut kalo</p>	<p>W :kasma, 28 tahun, hamil 4 bulan</p> <p>W : sembelit</p> <p>H : 3 hari</p> <p>A : air putih</p> <p>M : belum minum obat sama sekai</p>	<p>Obat yang terpilih</p> <p>Laktulose seperti lactulax syrup</p> <p>Alasannya aman untuk ibu hamil dan bersifat pencahar</p>	<p>Indikasi : konstipasi (susah BAB)</p> <p>Cara penggunaan: Dewasa : 1xsehari 1-3 sentok makan Anak : 1 sehari 1-3 sendok teh Bayi < 1 tahun : 1 x 1 sendok teh</p> <p>Kapan berhenti: jika BAB sudah lancar</p> <p>Kapan harus ke dokter : Setelah 5 hari gejala belum berkurang</p>

			<p>mau beli obat sembarangan jadi saya kasi air putih aja mbak.</p> <p>A: kalau boleh tau usia kehamilannya berapa bulan pak?</p> <p>P: usia kehamilannya kurang lebih 4 bulan mbak</p> <p>A: apakah ada riwayat sakit atau alergi obat?</p> <p>P: tidak ada mbak</p> <p>A: baik pak di tunggu sebentar saya ambilkan obatnya ngeh pak</p> <p>P: baik mbak</p> <p>A: pak ini untuk obatnya ada lactulax syrup baik digunakan untuk orang hamil</p> <p>P: baik mbak, untuk harganya berapa ya mbak</p> <p>A: untuk harganya 65.500</p> <p>P: baik mbak, ini untuk uangnya</p> <p>A: baik pak, uangnya 70.00 untuk kembaliannya 4.500 ngeh pak</p> <p>P: baik mbak</p> <p>A: 1 kali sehari 1-3 sendok makan</p> <p>P: baik mbak</p> <p>A: baik pak, ada yang bisa saya bantu lagi?</p>			<p>ESO yang sering : diare, kram perut</p> <p>Cara menyimpan : dikotak obat dan terhindar dari sinar matahari secara langsung.</p>
--	--	--	--	--	--	--

			<p>P: sudah mbak terimakasih A: baik pak, semoga sehat selalu</p>			
8.	<p>Biang keringat, pruritus, antihistamin topikal</p>	<p>Salisil talk dan sediaan yang mengandung kalamini; difenhidramin 2%, prometazin HCl 2%.</p>	<p>A: selamat datang di kimia farma, ada yang bisa saya bantu ? P: mbak mau beli obat buat gatal-gatal sudah 1 hari habis olah raga A: baik ibu, kalau boleh tau gatalnya diareta mana ngeh pak? P: gatal nya diareta leher dan lipatan siku A: apakah sudah diberi obat pak sebelumnya? P: cuman saya kompres dengan air dingin mbak. A: kalau boleh tau siapa namanua dan umur berapa pak? P: saya bonang usia saya 18 tahun A: apakah ada riwayat sakit atau alergi obat? P: tidak ada mbak A: baik pak di tunggu sebentar saya ambilkan obatnya ngeh pak P: baik mbak A: pak ini untuk obatnya ada caladine lotion baik</p>	<p>W :bonang, 18 tahun W : gatal-gatal sehabis olah raga diareta leher dan lipatan siku H : 1 hari A : dikompres air dingin M : belum minum obat sama sekali</p>	<p>Obat yang terpilih calamine seperti caladine lotion Alasannya karena mengalami gatal karena biang kringat.</p>	<p>Indikasi :anti alergi, antiseptik, penyejuk kulit. Cara penggunaan: dewasa dan anak : dioleskan 2-3 kali sehari pada bagian yang gatal, baik digunakan setelah mandi. Kapan berhenti: jika sudah sembuh Kapan harus ke dokter : Setelah 5 hari gejala belum berkurang ESO yang sering : iritasi Cara menyimpan : simpan ditempat yang kering, wadah tertutup rapat.</p>

			<p>digunakan untuk biang kringat pak</p> <p>P: baik mbak, untuk harganya berapa ya mbak</p> <p>A: untuk harganya 19.000</p> <p>P: baik mbak, ini untuk uangnya</p> <p>A: baik pak, uangnya 20.00 untuk kembaliannya 1.000 ngeh pak</p> <p>P: baik mbak</p> <p>A: dioleskan 2-3 kali sehari pada bagian yang gatal, baik digunakan setelah mandi.</p> <p>P: baik mbak</p> <p>A: baik pak, ada yang bisa saya bantu lagi?</p> <p>P: sudah mbak terimakasih</p> <p>A: baik pak, semoga sehat selalu</p>			
9.	Jerawat	Obat yang mengandung sulfur; resorsinol; asam salisilat; benzoil peroksida; triclosan, minosiklin 1%.	<p>A: selamat datang di kimia farma, ada yang bisa saya bantu ?</p> <p>P: saya mau beli obat jerawat tidak hilang-hilang terus gatal dan meradang serta ada yang membekas, sudah 5 hari</p> <p>A: baik mbak, kalau boleh tau apa sudah diperiksakan ke dokter?</p> <p>P: belum mbak.</p> <p>A: kalau boleh tau sudah apa</p>	<p>W : Nayla, 18 tahun</p> <p>W : obat jerawat tidak hilang-hilang terus gatal dan meradang serta ada yang membekas</p> <p>H : 5 hari</p> <p>A : memakai sabun mandi</p> <p>M : belum</p>	Obat yang terpilih Obat yang mengandung sulfur seperti acne feldin lotion Alasannya karena dapat mengurangi peradangan dan membantu menghilangkan	Indikasi : membunuh bakteri jerawat, mengobati jerawat, untuk pengobatan acne vulgaris/ jerawat. Cara penggunaan: dioles pada bagian jerawat 2 kali sehari Kapan berhenti: jika terjadi reaksi

		<p>yang sudah dilakukan sebelumnya?</p> <p>P: saya hanya sering cuci muka dengan sabun muka</p> <p>A: mbak kalau bisa jangan cuci muka dengan sabun mandi ya, karena bahan yang digunakan lebih keras sedangkan untuk sabun muka sudah dibuat khusus untuk membersihkan kulit muka yang lebih sensitif dibanding kulit tubuh.</p> <p>A: baik mbak, kalau boleh tau nama mbaknya dan usianya berapa?</p> <p>P: saya nayla, 18 tahun.</p> <p>A: baik tunggu sebentar ngeh mbak saya ambilkan obatnya</p> <p>P: baik mbak</p> <p>A: mbak ini ada Acne feldin baik digunakan untuk mengobati dan menghilangkan jerawat</p> <p>P: baik saya mau itu mbak 1, untuk harganya berapa mbak?</p> <p>A: untuk harganya 50.600</p> <p>P: baik ini mbak uangnya</p> <p>A: baik ibu saya terima 52.000 kembali 1.400 ya ibu</p> <p>P: baik mbak</p>	<p>minum obat sama seklai</p>	<p>bekas jerawat</p>	<p>hipersensitif</p> <p>Kapan harus ke dokter : Jika keluhan belum berkurang selam 5 hari setelah mnggunakan lotion acne</p> <p>ESO yang sering : hipersensitif</p> <p>Cara menyimpan : simpan ditempat yang kering, wadah tertutup rapat</p>
--	--	---	-------------------------------	----------------------	---

			<p>A: ini untuk nanti dioles 2 kali sehari ngeh bu</p> <p>P: baik mbak</p> <p>A: apakah ada yang perlu ditanya kan lagi bu?</p> <p>P: sudah tidak ada mbak</p> <p>A: baik ibu terimakasih, semoga sehat selalu</p>			
10.	Kadas/kurap, antifungi	Obat yang mengandung klotrimazol 1%, mikonazol nitrat 2%, ketoconazole nitrat	<p>A: selamat datang di kimia farma, ada yang bisa saya bantu ?</p> <p>P: mbak obat untuk ruam popok buat nenek saya</p> <p>A: baik bu, kalau boleh tau apa yang sudah dilakukan sebelumnya?</p> <p>P: saya tidak melakukan apa-apa mbak</p> <p>A: baik bu, kalau boleh tau sudah berapa lama?</p> <p>P: sudah 1 hari mbak</p> <p>A: kalau boleh tau untuk nama neneknya dan usianya berapa?</p> <p>P: nama nenek saya Vivin, umur 60 tahun</p> <p>A: baik bu ditunggu sebentar ya bu untuk obatnya</p> <p>P: baik mbak, saya tunggu</p> <p>A: bu ini untuk obatnya ada canesten cream bagus digunakan untuk keluhan</p>	<p>W : vivin, 60 tahun</p> <p>W : ruam popok</p> <p>H : 1 hari</p> <p>A : -</p> <p>M : -</p>	Obat yang terpilih klotrimazol 1% seperti canesten Alasannya karena dapat mengatasi ruam popok	<p>Indikasi : candidiasis atau ruam popok</p> <p>Cara penggunaan: dioles 2-3 kali sehari</p> <p>Kapan berhenti: iritasi</p> <p>Kapan harus ke dokter : jika dalam waktu 5 hari belum berkurang</p> <p>ESO yang sering : hipersensitif</p> <p>Cara menyimpan : simpan ditempat yang kering, wadah tertutup rapat</p>

			<p>ruam popok. P: baik kak, itu yang bagus ya A: iya bu itu udah yang paling bagus P: baik mbak, berapa A: ini ada 2 ada yang kecil sama yang besar, yang kecil 5g harganya 30.000 sedangkan yang besar 10g 52.300 P: saya mau yang 5g aja mbak, ini untuk uangnya A: baik bu, uangnya pas 30.000 P: untuk cara penggunaanya gimana mbak A: dioles 2-3 kali sehari P: baik mbak A: apakah ada yang perlu ditanya kan lagi bu? P: sudah tidak ada mbak A: baik ibu terimakasih, semoga sehat selalu</p>			
11.	Ketombe	<i>Shampoo</i> yang mengandung Selenium sulfid, Zincpyrithione.	<p>A: selamat datang di kimia farma, ada yang bisa saya bantu ? P: mbak saya kan ketombean dan terasa gatal. A: baik bu, kalau boleh tau apa yang sudah dilakukan sebelumnya?</p>	<p>W : Alma, 19 tahun W : ketombean dan gatal H :1 minggu A :memakai sampo ketombe M : memakai</p>	<p>Obat yang terpilih <i>Shampoo</i> yang mengandung Selenium sulfid, seperti selsun yellow Alasannya</p>	<p>Indikasi : mengurangi ketombe dan gatal-gatal dikarenakan ketome Cara penggunaan: saat keramas, dibiarkan 2-3</p>

			<p>P: saya sudah pakai sampo anti ketombe tpi ngak hilang-hilang mbak</p> <p>A: baik bu, kalau boleh tau sudah berapa lama?</p> <p>P: sudah 1 minggu mbak</p> <p>A: kalau boleh tau untuk namanya dan usianya berapa?</p> <p>P: nama saya alma, umur 19 tahun</p> <p>A: baik bu ditunggu sebentar ya bu untuk obatnya</p> <p>P: baik mbak, saya tunggu</p> <p>A: bu ini untuk obatnya ada selsun yellow bagus digunakan ketombe dan gatal</p> <p>P: iya, berapa mbak?</p> <p>A: untuk harganya 30.000</p> <p>P: baik mbak ini untuk uangnya</p> <p>A: baik mbak uangnya saya terima pas ngeh</p> <p>P: baik mbak</p> <p>A: untuk keramas, dibiarkan 2-3 menit saat pemakaian untuk mendapatkan hasil yang maksimal, digunakan 2 minggu sekali</p> <p>P: baik mbak</p> <p>A: baik pak terimakasih, semoga sehat selalu</p>	sampo ketombe	<p>karena dapat mengatasi ketombe yang tergolong berat, pasien mengatakan sudah memakai shampoo anti ketombe namun keluhan belum berkurang.</p>	<p>menit saat pemakaian untuk mendapatkan hasil yang maksimal, digunakan 2 minggu sekali</p> <p>Kapan berhenti: bila iritasi</p> <p>Kapan harus ke dokter : jika selama pemakaian keluhan belum berkurang</p> <p>ESO yang sering : iritasi</p> <p>Cara menyimpan : simpan ditempat yang kering, wadah tertutup rapat.</p>
--	--	--	---	---------------	---	---

12.	Kutil	obat yang mengandung asam salisilat 2 g, asam laktat 0,5 g.	<p>A: selamat datang di kimia farma, ada yang bisa saya bantu ?</p> <p>P: saya mau beli obat untuk jari tangan saya ada benjolan kecil bertekstur kasar dengan warna kecoklatan, tapi tidak sakit dan tidak gatal.</p> <p>A: sudah berapa hari mbak</p> <p>P: sudah 1 minggu mbak</p> <p>A: apakah sudah dikasi obat mbak?</p> <p>P: belum mbak</p> <p>A: kalau boleh tau atas nama siapa dan umur berapa mbak</p> <p>P: saya zerlin umur 19 tahun</p> <p>A: ditunggu sebentar ngeh mbak obatnya</p> <p>P: baik mbak, saya tunggu</p> <p>A: bu ini untuk obatnya ada callusol bagus digunakan ketombe dan gatal</p> <p>P: iya, berapa mbak?</p> <p>A: untuk harganya 35.000</p> <p>P: baik mbak ini untuk uangnya</p> <p>A: baik mbak uangnya saya terima pas ngeh</p> <p>P: baik mbak</p> <p>A: dioles secukupnya, digunakan malam hari selama tidur.</p>	<p>W : Zerlin, 19 tahun</p> <p>W : jari tangan ada benjolan kecil bertekstur kasar dengan warna kecoklatan, tapi tidak sakit dan tidak gatal.</p> <p>H : 1 minggu</p> <p>A : -</p> <p>M : -</p>	Obat yang terpilih yang mengandung asam salisilat 2 g, asam laktat 0,5 g seperti callusol Alasannya karena dapat melunakkan kulit yang mengeras akibat mata ikan, kutil, atau kapalan sehingga mempercepat proses pengelupasan dan pergantian sel kulit.	Indikasi : mata ikan, kapalan, kutil, kulit mengeras atau menebal Cara penggunaan: dioles secukupnya, digunakan malam hari selama tidur. Kapan berhenti: jika terjadi reaksi hipersensitif Kapan harus ke dokter :bila keluhan belum hilang sampai obat habis ESO yang sering : iritasi Cara menyimpan : simpan ditempat yang kering, wadah tertutup rapat.
-----	-------	---	--	---	---	--

			<p>P: baik mbak A: baik pak terimakasih, semoga sehat selalu</p>			
13.	Luka bakar	<p>Obat yang mengandung perak sulfadiazin; oleumiecoris aselli (minyak ikan,"<i>levertraan</i>").</p>	<p>A: selamat datang di kimia farma, ada yang bisa saya bantu ? P: saya mau beli obat untuk luka bakar karena tersiram kopi panas 5 menit yang lalu, merasakan punggung tangan terasa perih dan panas. Setelah terkena kopi panas di siram air dan diberi pasta gigi. A: kalau boleh tau atas nama siapa dan umur berapa mbak P: saya alisa umur 17 tahun A: ditunggu sebentar ngeh mbak obatnya P: baik mbak, saya tunggu A: bu ini untuk obatnya ada Levertran baik digunakan untuk luka bakar P: iya, berapa mbak? A: untuk harganya 4.000 P: baik mbak ini untuk uangnya A: baik mbak uangnya saya terima pas ngeh P: baik mbak A: dioles secukupnya, dibagian yang terbakar.</p>	<p>W :Alisa, 17 tahun W : luka bakar karena tersiram kopi, merasakan punggung tangan terasa perih dan panas H : 5 menit A : dialiri air M : diberi pasta gigi</p>	<p>Obat yang terpilih oleum iecoris aselli (minyak ikan,"<i>levertraa</i>"). Alasannya karena luka bakar nya masih tergolong ringan, dan dapat membantu mempercepat penyembuhan luka</p>	<p>Indikasi : Membantu proses penyembuhan luka dan luka bakar Cara penggunaan: dioleskan pada bagian yang sakit Kapan berhenti:Jika terjadi reaksi hipersensitivitas Kapan harus ke dokter : Jika 1 minggu belum ada perbaikan ESO yang sering :- Cara menyimpan : Simpan ditempat yang kering, wadah tertutup rapat</p>

			<p>P: baik mbak A: baik pak terimakasih, semoga sehat selalu</p>			
14.	Luka iris	Povidon iodine	<p>A: selamat datang di kimia farma, ada yang bisa saya bantu ? P: saya mau beli obat untuk anak saya terkena pisau saat bermain masak- masakan dengan temannya. Kejadian berlangsung 15 menit yang lalu, luka tidak terlalu lebar , namun anaknya mengeluhkan perih. Sementara baru dibersihkan menggunakan rivanol. A: kalau boleh tau atas nama siapa anaknya bu dan umur berapa mbak P: anak saya arum umur 5 tahun A: ditunggu sebentar ngeh bu obatnya P: baik mbak, saya tunggu A: bu ini untuk obatnya ada Betadine Solution baik digunakan untuk luka P: iya, berapa mbak? A: untuk harganya 30.300 P: baik mbak ini untuk uangnya A: baik mbak uangnya saya</p>	<p>W : Arum, 5 tahun W : terkena pisau saat bermain masak- masakan dengan temannya, luka tidak terlalu lebar , namun anaknya mengeluhkan perih. H : 15 menit A : dibersihkan menggunakan rivanol. M : dibersihkan menggunakan rivanol.</p>	<p>Obat yang terpilih povidone iodine Alasannya karena dapat mencegah infeksi pada luka</p>	<p>Indikasi : mencegah infeksi pada luka lecet, luka bakar, luka khitan, luka ringan, melindungi luka setelah operasi dari kemungkinan terkena infeksi Cara penggunaan: Dibersihkan dulu lukanya, baru di oleskan pada bagian yang sakut Kapan berhenti:Terjadi reaksi hipersensitivitas Kapan harus ke dokter : Bila luka semakin memburuk ESO yang sering : Perih Cara menyimpan : Simpan ditempat yang kering, wadah tertutup</p>

			<p>terima pas ngeh</p> <p>P: baik mbak</p> <p>A: ditempel dibagian luka ya bu</p> <p>P: baik mbak</p> <p>A: baik pak terimakasih, semoga sehat selalu</p>			rapat
15.	Alergi	Klorfeniramin maleat, prometazine, diphenhidramine, dekslorfeniramin maleat, loratadine, cetirizine.	<p>A: selamat datang di kimia farma, ada yang bisa saya bantu ?</p> <p>P: saya mau beli obat untuk anak saya selalu gatal-gatal setelah makan udang</p> <p>A: sudah berapa lama bu</p> <p>P: sudah 1 hari</p> <p>A: apa yang sudah dilakukan bu untuk mengatasinya?</p> <p>P: saya belum kasi apa-apa mbak</p> <p>A: kalau boleh tau atas nama siapa anaknya bu dan umur berapa mbak</p> <p>P: anak saya zema, umur 2 tahun</p> <p>A: ditunggu sebentar ngeh bu obatnya</p> <p>P: baik mbak, saya tunggu</p> <p>A: bu ini untuk obatnya ada alergine sirup baik digunakan untuk alergi</p> <p>P: iya, berapa mbak?</p> <p>A: untuk harganya 56.200</p>	<p>W : Zema, 7 tahun</p> <p>W : bersin-bersin tiap pagi hari, apalagi saat musim dingin.</p> <p>H : 1 hari</p> <p>A : -</p> <p>M : -</p>	<p>Obat yang terpilih</p> <p>Cetirizin Drop</p> <p>Alasannya karena dapat bekerja cepat mengatasi alergi tanpa menyebabkan rasa kantuk</p>	<p>Indikasi :</p> <p>Pengobatan rinitis musiman atau tahunan, urtikaria idiopatik kronik</p> <p>Diatas 12 tahun : sehari malam X 2 sendok teh</p> <p>Cara penggunaan: Kapan berhenti: Jika terjadi reaksi hipersensitivitas</p> <p>Kapan harus ke dokter : Jika dalam waktu 5 hari keluhan belum berkurang</p> <p>ESO yang sering : Sakit kepala</p> <p>Cara menyimpan : Simpan ditempat yang kering, wadah tertutup rapat</p>

			<p>P: baik mbak ini untuk uangnya</p> <p>A: baik mbak uangnya saya terima pas ngeh</p> <p>P: baik mbak</p> <p>A: Diminum 2 kali sehari 1 sendok teh, pagi sama malam ya bu</p> <p>P: baik mbak</p> <p>A: baik pak terimakasih, semoga sehat selalu</p>			
16.	Vitamin dan mineral	Vit C, Vit A, Vit B1, Vit B6, Vit B12, Vitamin D, Asam folat, Mn, Zn, Fe, dll	<p>A: selamat datang di kimia farma, ada yang bisa saya bantu ?</p> <p>P: saya mau beli vitamin untuk ibu hamil</p> <p>A: sudah berapa bulan pak</p> <p>P: sudah 2 bulan</p> <p>A: kalau boleh tau atas nama siapa ibunya pak dan umur berapa</p> <p>P: istri saya anis, umur 25 tahun</p> <p>A: ditunggu sebentar ngeh pak saya ambilkan</p> <p>P: baik mbak, saya tunggu</p> <p>A: pak ini untuk vitamin nya ada folas ini bagus buat masa kehamilan</p> <p>P: untuk harganya berapa ya mbak</p> <p>A: untuk harganya 23.400</p>	<p>W : anis, 25 tahun</p> <p>W : kehamilan masi muda</p> <p>H : 2 bulan</p> <p>A : -</p> <p>M :-</p>	<p>Obat yang terpilih asam folat</p> <p>Alasannya karena kehamilan baru berusia muda, jadi sangat bagus pemberian asam folat untuk membantu pembentukan tabung syaraf dan organ-organ penting lain</p>	<p>Indikasi : untuk memenuhi kebutuhan asam folat terutama ibu hamil</p> <p>Cara penggunaan: 1 x 1 tablet</p> <p>Kapan berhenti:- Kapan harus ke dokter : Segera control jika ada keluhan</p> <p>ESO yang sering :-</p> <p>Cara menyimpan : Simpan ditempat yang kering, wadah tertutup rapat</p>

			<p>P: iya mbak ngak papa yang itu aja</p> <p>A: baik pak uangnya saya terima 30.00 kembali 6.600 ngeh pak</p> <p>P: baik mbak</p> <p>A: Diminum sehari 1 kali 1 tablet</p> <p>P: baik mbak</p> <p>A: baik pak terimakasih, semoga sehat selalu</p>			
17.	Antiseptik dan disinfektan	Alkohol 70%, povidone iodine 10%, klorheksidin, setrimida 0,5%, serbuk PK.	<p>A: selamat datang di kimia farma, ada yang bisa saya bantu ?</p> <p>P: saya mau beli pembersih luka</p> <p>A: maaf bu untuk lukanya di daerah mana ngeh bu</p> <p>P: di daerah lutut mbak</p> <p>A: maaf, apakah untuk ibu sendiri?</p> <p>P: iya mbak</p> <p>A: luka nya itu karena terjatuh atau bagaimana ibu?</p> <p>P: iya mbak saya luka karena tadi jatuh waktu mau masuk rumah</p> <p>A: apakah sudah dikasi salep ibu</p> <p>P: sudah ada mbak</p> <p>A: baik ibu, ditunggu sebentar ngeh bu saya</p>	<p>W : Sofiya</p> <p>W : luka karena jatuh</p> <p>H : barusan</p> <p>A : -</p> <p>M : -</p>	Obat yang terpilih alkohol 70% Alasannya karena bisa untuk membersihkan luka	<p>Indikasi : sterilisasi non medis seperti sterilisasi alat-alat medis, membersihkan luka, antiseptik, pelarut.</p> <p>Cara penggunaan: dituang dikapas atau kassa steril jangan terlalu banyak ya bu kemudian diusapkan ke area yang luka</p> <p>Kapan berhenti: jika terjadi reaksi hipersensitivitas</p> <p>Kapan harus ke dokter : jika</p>

			<p>ambulkan pembersih luka nya</p> <p>P: baik mbak, saya tunggu</p> <p>A: ini bu kita ada alkohol 70%</p> <p>P: berapa mbak</p> <p>A; harganya 20.000</p> <p>P: baik mbak ini uangnya</p> <p>A: baik bu uangnya pas ngeh bu</p> <p>A: atas nama siapa bu?</p> <p>P: sofiya</p> <p>P: baik mbak</p> <p>A: nanti dituang dikapas jangan terlalu banyak ya bu kemudian diusapkan ke area yang luka</p> <p>P: baik mbak</p> <p>A: baik pak terimakasih, semoga sehat selalu</p>			<p>keluhan belum membaik</p> <p>ESO yang sering :-</p> <p>Cara menyimpan : simpan dibawah 30°C terlindung cahaya</p>
18.	Antiinflamasi topikal	<p>sediaan topikal yang mengandung flusinolon asetonida; hidrokortison asetat 1%; desoksimeson 2,5 mg.</p>	<p>A: selamat datang di kimia farma, ada yang bisa saya bantu ?</p> <p>P: saya mau beli obat untuk anak saya katanya tangannya meradang terasa panas, katanya habis terkena nyamuk</p> <p>A: sudah berapa lama bu</p> <p>P: sudah 1 hari</p> <p>A: apa yang sudah dilakukan bu untuk mengatasinya?</p> <p>P: saya kasi minyak</p>	<p>W : Aurel (18 tahun)</p> <p>W : mengeluhkan tangannya meradang terasa panas, habis terkena nyamuk</p> <p>H : 1 hari</p> <p>A :-</p> <p>M :Diberi minyak bangleng</p>	<p>Obat yang terpilih</p> <p>Hidrocortison</p> <p>Alasannya karena dapat mencegah infeksi sekunder</p>	<p>Indikasi : Dermatitis atopik, kontak, alergi; pruritus anogenital, neurodermatitis</p> <p>Cara penggunaan: Oleskan 3-4x sehari pada bagian yang sakit atau gatal</p> <p>Kapan berhenti: Jika terjadi reaksi</p>

			<p>bangleng, namun masi belum berkurang mbak</p> <p>A: kalau boleh namanya siapa anaknya bu dan umur berapa mbak</p> <p>P: anak saya aurel, umur 18 tahun</p> <p>A: ditunggu sebentar ngeh bu obatnya</p> <p>P: baik mbak, saya tunggu</p> <p>A: bu ini untuk obatnya ada Hydrocortisone</p> <p>P: iya, berapa mbak?</p> <p>A: untuk harganya 8.700</p> <p>P: baik mbak ini untuk uangnya</p> <p>A: baik mbak uangnya saya terima 10.000 kembali 1.300 ngeh</p> <p>P: baik mbak</p> <p>A: oleskan 2-4 kali sehari pada bagian yang sakit atau gatal.</p> <p>P: baik mbak</p> <p>A: baik pak terimakasih, semoga sehat selalu</p>			<p>hipersensitivitas</p> <p>Kapan harus ke dokter : Jika keluhan belum membaik</p> <p>ESO yang sering : Hilangnya jaringan kolagen kulit.</p> <p>Cara menyimpan : Simpan pada suhu kamar</p>
19.	Obat topikal penghilang rasa sakit	sediaan yang mengandung mentol, campor, metil salisilat, oleum mentae; kayu putih; lotion	<p>A: selamat datang di kimia farma, ada yang bisa saya bantu ?</p> <p>P: saya mau beli obat untuk nyeri otot dibagian betis karena habis main futsal</p>	<p>W :Fahmi, 27 tahun</p> <p>W : nyeri otot dibagian betis karena habis min futsal</p>	Obat yang terpilih Natrium diklofenak 1 % seperti voltaren gel Alasannya	Indikasi meredakan nyeri dan peradangan otot, sendi, tendon, dan ligamen yang disebabkan oleh

		<p>lidokain HCl 3%, natrium diklofenak 1% gel.</p>	<p>A: sudah berapa lama pak P: sudah 1 hari A: apa yang sudah dilakukan bu untuk mengatasinya? P: saya kasi balsam aja mbak A: atas nama siapa dan umur berapa pak? P: saya fahmi, umur 27 tahun A: ditunggu sebentar ngeh bu obatnya P: baik mbak, saya tunggu A: bu ini untuk obatnya ada voltaren emulgel 5g P: iya, berapa mbak? A: untuk harganya 70.800 P: baik mbak ini untuk uangnya A: baik mbak uangnya saya terima 72.000 kembali 1.200 ngeh pak P: baik mbak A: oleskan 3-4 kali sehari pada bagian yang sakit P: baik mbak A: baik pak terimakasih, semoga sehat selalu</p>	<p>H : 1 Hari A : - M : diberi balsem</p>	<p>karena merupakan obat golongan AINS (Anti Inflamasi Non-Steroid), sehingga natrium diklofenak dapat digunakan untuk pengobatan nyeri sendi dan mengatasi peradangan.</p>	<p>kejang atau tergilir, cedera olagraga. Cara penggunaan: 3 - 4 x sehari, digosokkan perlahan pada bagian tubuh yang sakit Kapan berhenti: Jika terjadi reaksi hipersensitivitas Kapan harus ke dokter : Jika keluhan belum membaik ESD yang sering : Iritasi lokal Cara menyimpan : Simpan pada suhu kamar</p>
20	Terapi komplementer / obat tradisional	Jamu, OHT, Fitofarmaka	<p>A: selamat datang di kimia farma, ada yang bisa saya bantu ? P: saya mau beli obat untuk nyeri otot dibagian pinggang A: sudah berapa lama bu</p>	<p>W : mila, 27 Tahun W : nyeri otot dibagian pinggang H : 1 hari</p>	<p>Obat yang terpilih jamu seperti rheumacyl oralinu Alasannya</p>	<p>Indikasi : meredakan nyeri sendi, pegel linu, nyeri akibat encok, dan sakit otot pinggang.</p>

			<p>P: sudah 1 hari</p> <p>A: apa yang sudah dilakukan bu untuk mengatasinya?</p> <p>P: saya pijat mbak</p> <p>A: atas nama siapa dan umur berapa bu?</p> <p>P: saya mila, umur 27 tahun</p> <p>A: ditunggu sebentar ngeh bu obatnya</p> <p>P: baik mbak, kalau biasa dibawah 20.000 ya mbak</p> <p>A: bu ini untuk obatnya ada rheumacyl oralinu</p> <p>P: iya, berapa mbak?</p> <p>A: untuk harganya 11.600</p> <p>P: baik mbak ini untuk uangnya</p> <p>A: baik mbak uangnya saya terima 20.000 kembali 8.400 ngeh</p> <p>P: baik mbak</p> <p>A: diminum 1-2 sachet sehari sebelum tidur</p> <p>P: baik mbak</p> <p>A: baik bu terimakasih, semoga sehat selalu</p>	<p>A :-</p> <p>M :-</p>	<p>karena digunakan untuk memelihara kesehatan nyeri otot yang dikarenakan encok</p>	<p>Cara penggunaan: diminum 1-2 sachet sehari sebelum tidur</p> <p>Kapan berhenti:- Kapan harus ke dokter :jika belum membaik</p> <p>ESO yang sering :-</p> <p>Cara menyimpan : simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>
--	--	--	---	-------------------------	--	---

Dosen Pembimbing PKL



Diah Ratnasari, S.Farm., Apt., M.T
NIDN. 0721119001

Pembimbing PKL,



KAFEDRA FARMASI
Apotek Rana Imanjaya No. 164

Apt. Rana Imanjaya, S.Farm.
SIP. 19850502A

