


# LAMPIRAN







No SP: \_\_\_\_\_  
**SURAT PESANAN**  
**APOTEK BERKAH**  
Jl. Raya Peganden No. 26/1A, Kec. Manyar, Kab. Gresik.

Yang bertanda tangan dibawah ini :  
Nama : Ersanda Nurma Praditaputra, S.Farm., Apt.  
Jabatan : Apoteker Penanggung Jawab Apotek  
No. SIPA : 19961113 SIPA\_35.25/2019/22275

Mengajukan pesanan obat jasi farmasi kepada:  
Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Telp. : \_\_\_\_\_

Jenis obat yang dipesan adalah:

No.	Nama	Satuan	Jumlah

Gresik, \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_  
Pemesan,

Ersanda Nurma P., S.Farm., Apt.  
19961113 SIPA\_35.25/2019/22275

Model N.9  
Lembar ke 1.2/3/4.5

**SURAT PESANAN NARKOTIKA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :  
Nama : Ersanda Nurma Praditaputra S.Farm., Apt.  
Jabatan : Apoteker Penanggung Jawab Apotek  
Alamat rumah : Desa Tehalo RT 005 / RW 001, Manyar.

Mengajukan pesanan Narkotika kepada :  
Nama distributor : PBF KIMIA FARMA  
Alamat & No. Telpn : \_\_\_\_\_

sebagai berikut :

Narkotika tersebut akan dipergunakan untuk keperluan :  
Apotek Berkah

Gresik, \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_  
Pemesan,

Ersanda Nurma P., S.Farm., Apt.  
19961113 SIPA\_35.25/2019/22275



**SURAT PESANAN PSIKOTROPIKA**

Nomor : .....

Yang beranda tangan dibawah ini :

Nama : Ersanda Nurma Pratiptura, S.Farm., Apt.  
 Alamat : Apoteker Pemanggang Jawah Apotek  
 No. SIPA : 19961113 SIPA\_35.25/2019/22275

Mengajukan pesanan Psikotropika kepada :

Nama distributor : .....  
 Alamat : .....

Jenis obat yang dipesan adalah :

No.	Nama Obat Psikotropika	Bentuk Sediaan	Kandungan / Potensi	Jumlah Pesanan	Keterangan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

Psikotropika tersebut akan digunakan untuk :

Nama Pasien : Apoteker Berkah  
 Alamat : Jl. Raya Peganden No. 26/1 A, Kec. Manyar, Kab. Gresik.  
 No. Ura Apotek : .....

Gresik, ..... 20.....  
 Pemesan,

Ersanda Nurma P., S.Farm., Apt.  
 19961113 SIPA\_35.25/2019/22275

**SURAT PESANAN OOT FARMASI**

Nomor SP : .....

Yang beranda tangan dibawah ini :

Nama : Ersanda Nurma Pratiptura, S.Farm., Apt.  
 Alamat : Apoteker Pemanggang Jawah Apotek  
 No. SIPA : 19961113 SIPA\_35.25/2019/22275

Mengajukan pesanan obat jadi farmasi kepada :

Nama Perusahaan : .....  
 Alamat : .....

Jenis obat yang dipesan adalah :

No.	Nama Obat	Kandungan	Bentuk Sediaan	Satuan	Jumlah pesanan	Ket.

OOT farmasi tersebut akan digunakan untuk :

Nama Pasien : Apoteker Berkah  
 Alamat : Jl. Raya Peganden No. 26/1 A, Kec. Manyar, Kab. Gresik.  
 No. Ura Apotek : .....

Gresik, ..... 20.....  
 Pemesan,

Ersanda Nurma P., S.Farm., Apt.  
 19961113 SIPA\_35.25/2019/22275

**SURAT PESANAN PREKURSOR FARMASI**

Nomor SP : .....

Yang beranda tangan dibawah ini :

Nama : Ersanda Nurma Pratiptura, S.Farm., Apt.  
 Alamat : Apoteker Pemanggang Jawah Apotek  
 No. SIPA : 19961113 SIPA\_35.25/2019/22275

Mengajukan pesanan obat jadi farmasi kepada :

Nama Perusahaan : .....  
 Alamat : .....

Jenis obat yang dipesan adalah :



No.	Nama Obat	Zat Aktif Prekursor	Bentuk Sediaan	Satuan	Jumlah pesanan	Ket.

Prekursor farmasi tersebut akan digunakan untuk :

Nama Pasien : Apoteker Berkah  
 Alamat : Jl. Raya Peganden No. 26/1 A, Kec. Manyar, Kab. Gresik.  
 No. Ura Apotek : .....

Gresik, ..... 20.....  
 Pemesan,

Ersanda Nurma P., S.Farm., Apt.  
 19961113 SIPA\_35.25/2019/22275



**APOTEK BERKAH**

Apoteker : Ersanda Nurma P., S.Farm., Apt  
 SIPA : 19961113 SIPA\_35.25/2019/22275  
 Jl. Raya Peganden No. 26 / 1 A  
 Kel. Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik  
 Telp. 0813 3409 7707

---

**COPY RESEP**

No. resep : .....  
 Nama Dokter : .....  
 Tanggal resep : .....  
 Tanggal pembuatan resep : .....  
 Nama Pasien : .....  
 Usia Pasien : .....  
 Alamat Pasien : .....

R/

PCC,










**A. TUGAS KHUSUS RESEP**

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (3), resep polifarmasi (3), resep obat mata/telinga (1), resep obat kulit (1), resep mengandung sediaan inhaler (1), resep obat KB (1), Resep mengandung insulin (1), resep kudis/kurap (1), Resep obat saluran cerna (1), Resep saluran nafas (1), resep racikan anak (3), Resep racikan dewasa (3), resep pasien DM (1), Resep pasien HT (1), Resep pasien syaraf (1), resep yang ada pengulangan /iter (3), dan resep lainnya (4)


Total : 30 Resep


No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																									
1. *	<p>Jenis Resep : Salinan resep                      Resep obat : <del>Racikan</del>/non racikan                      Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (&gt;/Tidak                      Pengulangan resep : Iter.....kali/Neiter                      Tempel resep/salin resep disini  <b>Resep salinan resep</b></p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1095 571 2056 1326"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>M. Zuhri</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Angintriz MR</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada</td> <td>Coten 100mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada</td> <td>Angintriz MR tablet Coten 100mg capsul</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>Angintriz MR tablet No. LX Coten 100mg capsul No. XXX</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>Angintriz MR tablet No. LX S 2 dd 1 (2x sehari 1 tablet) Coten 100mg capsul No. XXX (1x sehari 1 capsul)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada</td> <td>12 / 02 / 2024</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>Dr. Radifit.SpJP</td> </tr> <tr> <td>-Surat ijin :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada</td> <td>Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik</td> </tr> </table>			Nama Pasien :	Ada	M. Zuhri	Umur pasien :	Tidak Ada	-	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Angintriz MR	Kekuatan :	Ada	Coten 100mg	Bentuk sed. :	Ada	Angintriz MR tablet Coten 100mg capsul	Jumlah obat :	Ada	Angintriz MR tablet No. LX Coten 100mg capsul No. XXX	Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada	Angintriz MR tablet No. LX S 2 dd 1 (2x sehari 1 tablet) Coten 100mg capsul No. XXX (1x sehari 1 capsul)	Tanggal penulisan resep :	Ada	12 / 02 / 2024	Nama dokter :	Tidak Ada	Dr. Radifit.SpJP	-Surat ijin :	Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada	Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik
Nama Pasien :	Ada	M. Zuhri																																									
Umur pasien :	Tidak Ada	-																																									
Berat Badan :	Tidak Ada	-																																									
Nama Obat :	Ada	Angintriz MR																																									
Kekuatan :	Ada	Coten 100mg																																									
Bentuk sed. :	Ada	Angintriz MR tablet Coten 100mg capsul																																									
Jumlah obat :	Ada	Angintriz MR tablet No. LX Coten 100mg capsul No. XXX																																									
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-																																									
Aturan pakai :	Ada	Angintriz MR tablet No. LX S 2 dd 1 (2x sehari 1 tablet) Coten 100mg capsul No. XXX (1x sehari 1 capsul)																																									
Tanggal penulisan resep :	Ada	12 / 02 / 2024																																									
Nama dokter :	Tidak Ada	Dr. Radifit.SpJP																																									
-Surat ijin :	Tidak Ada	-																																									
Alamat dr. :	Ada	Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik																																									

		<table border="1" data-bbox="1093 193 2056 268"> <tr> <td data-bbox="1093 193 1361 268"></td> <td data-bbox="1361 193 2056 268">                     Jl. KH. Kholil No. 88, Gresik, Jawa Timur.                 </td> </tr> </table> <p data-bbox="1048 308 1608 339">B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <table border="1" data-bbox="1093 379 2056 491"> <tr> <td data-bbox="1093 379 2056 491">                     Angintriz MR yang dibutuhkan 60 tablet 4.500 x 60 tablet = 270.000                      Coten 100mg yang dibutuhkan 30 kapsul harga 1 box 520.000                 </td> </tr> </table> <p data-bbox="1048 531 1411 563">C. Perhitungan biaya resep</p> <table border="1" data-bbox="1093 603 2056 715"> <tr> <td data-bbox="1093 603 2056 715">                     1. Angintriz MR : Rp. 4.500 x 60 tablet= 270.000                      2. Coten 100mg harga 1 box 3 strip 520.000                      3. Total biaya 790.000                 </td> </tr> </table> <p data-bbox="1048 754 1220 786">D. ETIKET</p> <p data-bbox="1048 794 1646 826">Nama Obat /warna etiket : Angintriz MR /Putih</p> <table border="1" data-bbox="1003 826 1854 1273"> <tr> <td data-bbox="1003 826 1854 962">  <p data-bbox="1160 834 1765 946"> <b>APOTEK BERKAH</b>                      Jl. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden                      Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707                 </p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1003 962 1854 1074"> <p data-bbox="1014 970 1787 1074">                     NAMA : M. Zuhri <span style="float: right;">TGL: 12 / 02 / 2024</span>  <span style="float: right;">ED: 25 / 02 / 2026</span>                      NAMA OBAT: Angintriz MR                 </p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1003 1074 1854 1273"> <p data-bbox="1081 1145 1776 1209" style="text-align: center;">                     2 x SEHARI 1 TAB / <del>ML</del> / <del>SENDOK TAKAR</del> / <del>MAKAN</del>  <del>SEBELUM</del> / SAAT / SESUDAH MAKAN                 </p> </td> </tr> </table> <p data-bbox="1003 1345 1608 1377">Nama Obat /warna etiket : Coten 100mg/ Putih</p>		Jl. KH. Kholil No. 88, Gresik, Jawa Timur.	Angintriz MR yang dibutuhkan 60 tablet 4.500 x 60 tablet = 270.000 Coten 100mg yang dibutuhkan 30 kapsul harga 1 box 520.000	1. Angintriz MR : Rp. 4.500 x 60 tablet= 270.000 2. Coten 100mg harga 1 box 3 strip 520.000 3. Total biaya 790.000	 <p data-bbox="1160 834 1765 946"> <b>APOTEK BERKAH</b>                      Jl. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden                      Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707                 </p>	<p data-bbox="1014 970 1787 1074">                     NAMA : M. Zuhri <span style="float: right;">TGL: 12 / 02 / 2024</span>  <span style="float: right;">ED: 25 / 02 / 2026</span>                      NAMA OBAT: Angintriz MR                 </p>	<p data-bbox="1081 1145 1776 1209" style="text-align: center;">                     2 x SEHARI 1 TAB / <del>ML</del> / <del>SENDOK TAKAR</del> / <del>MAKAN</del>  <del>SEBELUM</del> / SAAT / SESUDAH MAKAN                 </p>
	Jl. KH. Kholil No. 88, Gresik, Jawa Timur.								
Angintriz MR yang dibutuhkan 60 tablet 4.500 x 60 tablet = 270.000 Coten 100mg yang dibutuhkan 30 kapsul harga 1 box 520.000									
1. Angintriz MR : Rp. 4.500 x 60 tablet= 270.000 2. Coten 100mg harga 1 box 3 strip 520.000 3. Total biaya 790.000									
 <p data-bbox="1160 834 1765 946"> <b>APOTEK BERKAH</b>                      Jl. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden                      Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707                 </p>									
<p data-bbox="1014 970 1787 1074">                     NAMA : M. Zuhri <span style="float: right;">TGL: 12 / 02 / 2024</span>  <span style="float: right;">ED: 25 / 02 / 2026</span>                      NAMA OBAT: Angintriz MR                 </p>									
<p data-bbox="1081 1145 1776 1209" style="text-align: center;">                     2 x SEHARI 1 TAB / <del>ML</del> / <del>SENDOK TAKAR</del> / <del>MAKAN</del>  <del>SEBELUM</del> / SAAT / SESUDAH MAKAN                 </p>									





		<p>tempat yang kering dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak</p>	
		<p>F. Tahap pembuatan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan skrining resep</li><li>2. Mengecek ketersediaan obat di rumah sakit</li><li>3. Menghitung harga obat</li><li>4. Mengambil obat di rak</li><li>5. Menulis etiket</li><li>6. Memasukkan kedalam plastic dan menempelkan etiket</li></ol>	
		<p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p><b>(A : APOTEKER , P : PASIEN)</b></p> <p>A : Obat dengan nama tuan zuhri P : Ya, dengan saya sendiri mbakk A : baik pak ini kita kasih obat suplemen antioksidasi dan juga obat antiangina ya pak untuk pemakaiannya Angintriz MR 2 Kali sehari 1 tablet sesudah makan dan untuk obat copen 1 kali sehari sesudah makan, baik pak apakah ada yang ditanyakan. P : Sudah mbak terimakasih A : Baik kalau jika sudah jelas, ini obatnya semoga lekas sembuh</p>	

<p>2. * Jenis Resep : Salinan resep Resep obat : non racikan Jumlah obat dalam resep : Tidak Pengulangan resep :</p>		<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1093 229 2056 1174"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Ny, nita wahyuni</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Ovacare Wanvita Oligocare</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada</td> <td>Ovacare, tab Wanvita tab Oligocare tab</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>Ovacare, tab no xxx Wanvita tab no xxx Oligocare tab no xxx</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak Ada</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>Ovacare, tab no xxx S 1 dd1 Wanvita tab no xxx S 1 dd1 Oligocare tab no xxx S 1 dd1 (untuk suami)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada</td> <td>19-02-2024</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada</td> <td>Dr. rino andriya,SpOG</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada</td> <td>Jl. KH.Kholil 88 Gresik</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <table border="1" data-bbox="1093 1283 2056 1394"> <tr> <td>Ovacare yang dibutuhkan 30 tablet Wanvita yang dibutuhkan 30 tablet Oligocare yang dibutuhkan 30 tablet</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Ny, nita wahyuni	Umur pasien :	Tidak ada	-	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Ovacare Wanvita Oligocare	Kekuatan :	Tidak ada	-	Bentuk sed. :	Ada	Ovacare, tab Wanvita tab Oligocare tab	Jumlah obat :	Ada	Ovacare, tab no xxx Wanvita tab no xxx Oligocare tab no xxx	Duplikasi terapi :	Tidak Ada		Aturan pakai :	Ada	Ovacare, tab no xxx S 1 dd1 Wanvita tab no xxx S 1 dd1 Oligocare tab no xxx S 1 dd1 (untuk suami)	Tanggal penulisan resep :	Ada	19-02-2024	Nama dokter :	Ada	Dr. rino andriya,SpOG	Surat ijin :	Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada	Jl. KH.Kholil 88 Gresik	Ovacare yang dibutuhkan 30 tablet Wanvita yang dibutuhkan 30 tablet Oligocare yang dibutuhkan 30 tablet
Nama Pasien :	Ada	Ny, nita wahyuni																																								
Umur pasien :	Tidak ada	-																																								
Berat Badan :	Tidak Ada	-																																								
Nama Obat :	Ada	Ovacare Wanvita Oligocare																																								
Kekuatan :	Tidak ada	-																																								
Bentuk sed. :	Ada	Ovacare, tab Wanvita tab Oligocare tab																																								
Jumlah obat :	Ada	Ovacare, tab no xxx Wanvita tab no xxx Oligocare tab no xxx																																								
Duplikasi terapi :	Tidak Ada																																									
Aturan pakai :	Ada	Ovacare, tab no xxx S 1 dd1 Wanvita tab no xxx S 1 dd1 Oligocare tab no xxx S 1 dd1 (untuk suami)																																								
Tanggal penulisan resep :	Ada	19-02-2024																																								
Nama dokter :	Ada	Dr. rino andriya,SpOG																																								
Surat ijin :	Tidak Ada	-																																								
Alamat dr. :	Ada	Jl. KH.Kholil 88 Gresik																																								
Ovacare yang dibutuhkan 30 tablet Wanvita yang dibutuhkan 30 tablet Oligocare yang dibutuhkan 30 tablet																																										

C. Perhitungan biaya resep

Ovacare 1box 30 biji Rp. 303.000  
Wanvita 1 pcs 4.466 x 30 biji Rp 134,000  
Oligocare 1 box 30 biji Rp 237,000  
Total biaya yang dikeluarkan 674.000

D. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Ovacare/putih



**APOTEK BERKAH**

JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel.  
Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp  
081324097707

NAMA : Nita wahyuni




TGL: 19-02-2024

ED: 25 / 10/ 2026

NAMA OBAT: Ovacare

1 x SEHARI 1 TAB / ~~ML~~ / ~~SENDOK TAKAR~~ / ~~MAKAN~~  
~~SEBELUM~~ / ~~SAAT~~ / ~~SESUDAH MAKAN~~



	Nama Obat /warna etiket : Wanvita/putih	
	 <b>APOTEK BERKAH</b> JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707	
	NAMA : Nita wahyuni	TGL: 19-02-2024 ED: : 25 / 10/ 2025 NAMA OBAT: Wanvita
	1 x SEHARI 1 KAPS / <del>ML</del> / <del>SENDOK TAKAR</del> / <del>MAKAN</del> <del>SEBELUM</del> / <del>SAAT</del> / <del>SESUDAH MAKAN</del>	
Nama Obat /warna etiket : Oligocare/putih		
 <b>APOTEK BERKAH</b> JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707		
NAMA : Nita wahyuni	TGL: 19-02-2024 ED: 25 / 02 / 2026 NAMA OBAT: Oligocare	
1 x SEHARI 1 TAB / <del>ML</del> / <del>SENDOK TAKAR</del> / <del>MAKAN</del> <del>SEBELUM</del> / <del>SAAT</del> / <del>SESUDAH MAKAN</del>		
E. <i>Product knowledge</i>		
Nama Obat : Ovacare	Nama Obat : Wanvita	

		<p>Kandungan : inositol, L-arginine, N-acetyl Cystein, Celenium, Promium, Asam folat, Mikronutrien                  Dosis lazim : penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. 1 tablet 2 kali sehari sesudah makan                  Kegunaan : untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral pada wanita                  ESO potensial : diare, perut kembung, mual, sulit tidur, sakit kepala                  KI : hipersensitif terhadap komposisi ovacare                  PERHATIAN : Jangan dikunyah ataupun diminum dalam keadaan perut kosong atau dengan teh dan kopi                  Cara penyimpanan : Simpan Ovacare di tempat yang terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan suplemen dari jangkauan anak-anak.</p>	<p>Kandungan : Vit.A 10,000 IU, vit.B1 20 mg ,vit.B2 5mg, Nicotinamide 50mg, Vit.B6 10mg, Ca pantothenate 11.6 mg, Biotin 0.25 mg, vit.B12 5 mcg, vit.C 150 mg, vit.D3 400 iu, vit.E 10 mg, Folic acid 0.4 mg, Ca 50 mg, Phosphorus 38.64 mg, Fe 10 mg, mg 16.4 mg, Manganese 0.379 mg, K 0.035 mg, Selenium 0.061 mg, Fluoride 0.045 mg, Copper 0.712 mg, Zn 0.343 mg, Molybdenum 0.083 mg                  Dosis lazim : penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter 1 kali sehari 1 kapsul sebelum tidur                  Kegunaan : wanita untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral pada ibu hamil dan menyusui                  ESO potensial : kekurangan vitamin dan mineral selama masa penyembuhan, kehamilan, dan lansia                  KI : penderita yang hipersensitif terhadap komponen obat ini                  PERHATIAN : dapat sebabkan fases berwarna hitam                  Cara penyimpanan : simpan pada suhu dibawah 30°C</p>
		<p>Nama Obat : oligocare                  Kandungan : Lycopene 2 mg, Glutathione 2.5 mg, L-carnitine 75 mg, L-arginine 10 mg, Co-Q10 2.5 mg, Elemental Zn 12.5 mg, Elemental</p>	

		<p>selenium 100 mcg, Elemental Fe 5 mg, Elemental manganese 1.5 mg, Elemental copper 500 mcg, Vit E 12.5 mg, Vit C 75 mg, Vit A 1,250 IU, Folic acid 400 mcg, Cyanocobalamin 100 mcg, Thiamine 5 mg, Pyridoxine 10 mg, Ginseng extr 10 mg.</p> <p>Dosis lazim : penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. 2x sehari 1 tablet pada pagi dan sore hari.</p> <p>Kegunaan : Membantu memenuhi kebutuhan mikronutrien untuk mendukung kesehatan pria</p> <p>ESO potensial : -</p> <p>KI : -</p> <p>PERHATIAN : -</p> <p>Cara penyimpanan : simpan pada tempat kering dan sejuk terhindar dari sinar matahari secara langsung</p>	
		<p>F. Tahap pembuatan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan skrining resep</li><li>2. Mengecek kesetersediaan obat di rumah sakit</li><li>3. Menghitung harga obat</li><li>4. Mengambil obat di rak</li><li>5. Menulis etiket</li><li>6. Memasukkan kedalam plastic dan menempelkan etiket</li></ol> <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p>	



(A : APOTEKER , P : PASIEN)

A : obat dengan nama ny nitawahyuni

P : Ya, dengan saya sendiri mbakk

A : baik bu ini kita kasih obat wanvita dan ovacare untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral pada ibu hamil dan menyusui, dan untuk obat oligocare membantu untuk memenuhi vitamin pada bapak ini semua obatnya diminum 1 kali sehari sesudah makan baik bu apakah ada yang di tanyakan.

P : Sudah mbak terimakasih

A : Baik kalau jika sudah jelas, ini obatnya semoga lekas sembuh

3. \*

Jenis Resep : Salinan resep  
 Resep obat : non racikan  
 Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak  
 Pengulangan resep :

**Salinan resep**



**A. Skrinning Administrasi**

Nama Pasien :	Ada	Ny, fiska ayu k,s
Umur pasien :	Tidak ada	-
Berat Badan :	Tidak Ada	-
Nama Obat :	Ada	Syimbicort puff
Kekuatan :	Tidak ada	-
Bentuk sed. :	Ada	Syimbicort puff
Jumlah obat :	Ada	Syimbicort puff no I
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada	Syimbicort puff no I S1 DD1 puff
Tanggal penulisan resep :	Ada	19-02-2024
Nama dokter :	Ada	Dr. rino andriya,SpOG
Surat ijin :	Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Ada	Jl. KH.Kholil 88 Gresik

**B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi**

Syimbicort puff yang dibutuhkan 1 puff per pcs

**C. Perhitungan biaya resep**

Syimbicort puff yang dibutuhkan 1 puff per pcs Rp 700,000

D. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Symbicort/biru



APOTEK BERKAH

JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel.  
Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp  
081324097707

NAMA : fiska ayu k,s

TGL: 19-02-2024

ED: 25 / 02 / 2026

NAMA OBAT: Syimbicort


1 x SEHARI 1 puff  
Untuk pemakaian luar


E. *Product knowledge*

Nama Obat : Syimbicort puff  
Kandungan : Budesonide 160 mcg,  
Formoterol Fumarate 4.5 mcg  
Dosis lazim : PENGGUNAAN OBAT  
INI HARUS SESUAI DENGAN  
PETUNJUK DOKTER. Terapi  
pemeliharaan dan pereda asma :  
Dewasa dan remaja usia di atas 12  
tahun : Dosis tergantung dari beratnya  
gejala, 2 inhalasi perhari. Dosis  
pemeliharaan : 2 x sehari 2 inhalasi.  
PPOK : Dewasa : 2 inhalasi 2 kali  
sehari  
Kegunaan : untuk asma



		<p>ESO potensial : Pemakaian obat umumnya memiliki efek samping tertentu dan sesuai dengan masing-masing individu. Jika terjadi efek samping yang berlebih dan berbahaya, harap konsultasikan kepada tenaga medis. Efek samping yang mungkin terjadi dalam penggunaan obat adalah: Gatal ringan di tenggorokan dan suara serak, infeksi candida (Candidiasis) di mulut dan/atau tenggorokan, palpitasi, sakit kepala, Pneumonia pada pasien PPOK.</p> <p>KI : hipersensitifitas</p> <p>PERHATIAN : HARUS DENGAN RESEP DOKTER. Tidak untuk dihentikan secara tiba-tiba.</p> <p>Tirotoksikosis, feokromositoma, DM, hipokalemia yang tidak diterapi, kardiomiopati obstruktif hipertrofi, stenosis aorta subvalvular idiopatik, hipertensi berat, aneurisma atau gangguan KV berat lain. Pasien dengan perpanjangan interval QT. Asma akut berat. Anak usia di bawah 6 tahun.</p> <p>Kategori Kehamilan : Kategori C: Mungkin berisiko. Obat digunakan dengan hati-hati apabila besarnya manfaat yang diperoleh melebihi besarnya risiko terhadap janin.</p> <p>Penelitian pada hewan uji menunjukkan risiko terhadap janin dan belum terdapat</p>	
--	--	--	--

		<p>penelitian langsung terhadap wanita hamil. Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah suhu 30°C</p>	
		<p>F. Tahap pembuatan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan skrining resep</li><li>2. Mengecek kesetersediaan obat di rumah sakit</li><li>3. Menghitung harga obat</li><li>4. Mengambilm obat di rak</li><li>5. Menulis etiket</li><li>6. Memasukkan kedalam plastic dan menempelkan etiket</li></ol> <p>G . Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>(A : APOTEKER , P : PASIEN)</p> <p>A : Obat dengan nama ny fiska ayu k,s</p> <p>P : Ya, dengan saya sendiri mbak</p> <p>A : baik bu ini kita kasih obat symbicort untuk asmanya ya untuk pemakainannya : 1 x sehari 1 inhalasi jika belum mereda sebaiknya kembali lakukan cek ke dokter. Sudah ada yang ditanyakan lagi</p> <p>P : Sudah mbak terimakasih</p> <p>A : Baik kalau jika sudah jelas, ini obatnya semoga lekas sembuh</p>	

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep		
4.*	<p>Jenis Resep : resep asli                      Resep obat : non racikan                      Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (&gt;/Tidak                      Pengulangan resep :</p> <p><b>Resep polifarmasi</b></p> 	A. Skrinning Administrasi		
		Nama Pasien :	Ada	Fatinah
		Umur pasien :	Tidak Ada	-
		Berat Badan :	Tidak Ada	-
		Nama Obat :	Ada	Analsik Cefixim Lansoprazole Ondancetron Sanmag Sanmol
		Kekuatan :	Ada	Ondancetron 8mg
		Bentuk sed. :	Tidak Ada	-
		Jumlah obat :	Ada	Analsik no X Cefixim no X Lansoprazole no X Ondancetron no X Sanmag no X Sanmol no X
		Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
		Aturan pakai :	Ada	Analsik no X S 2 DD1 Cefixim no X S 2 DD1 Lansoprazole no X S 2 DD1 AC Ondancetron no X S 3 DD 1 AC Sanmag no X S 3 DD 1 Sanmol no X S 3 DD 1

		Tanggal penulisan resep :	Ada	19-02-2024
		Nama dokter :	Ada	dr.Fitri Dwi Prabandhari
		Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-
		Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jl. KH. Kholil 88 Gresik
<p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Analsik yang dibutuhkan 1 strip                      Cefixim yang dibutuhkan 1 strip                      Lansoprazole yang dibutuhkan 1 strip                      Ondancetron yang dibutuhkan 1 strip                      Sanmag yang dibutuhkan 1 strip                      Sanmol yang dibutuhkan 10 tab</p> </div>				
<p>C. Perhitungan biaya resep</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Analsik 1 strip 21.000                      Cefixim 1 strip 20.000                      Lansoprazole 1 strip 15.000                      Ondancetron 1 strip 25.000                      Sanmag 1 strip 2 tab <math>8.500 \times 5 = 42.500</math>                      Sanmol 1 tab <math>650 \times 10 = 6.500</math>                      Total Biaya Rp 130.000</p> </div>				



D. ETIKET

Nama Obat /warna etiket :Analsik/putih



APOTEK BERKAH

JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel.  
Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp  
081324097707

NAMA : Fatinah

TGL: 19-02-2024

ED: 23 / 02 / 2027

NAMA OBAT: Analsik

~~2 x SEHARI 1 TAB / ML / SENDOK TAKAR / MAKAN  
SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN~~

Nama Obat /warna etiket :Cefixime/putih



APOTEK BERKAH

JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel.  
Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp  
081324097707

NAMA : Fatinah

TGL: 19-02-2024



ED: 21 / 05 / 2027

NAMA OBAT: Cefixime

HABISKAN

~~2 x SEHARI 1 TAB / ML / SENDOK TAKAR / MAKAN  
SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN~~

Nama Obat /warna etiket : Lansoprazole/putih

		 <p><b>APOTEK BERKAH</b> JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707</p>	
		<p>NAMA : Fatinah TGL: 19-02-2024 ED: 22 / 07 / 2026 NAMA OBAT: lansoprazole</p> <p>2 x SEHARI 1 KAPS / <del>ML / SENDOK TAKAR / MAKAN</del> SEBELUM / <del>SAAT / SESUDAH MAKAN</del></p>	
<p>Nama Obat /warna etiket : Ondancetron/putih</p>			
		 <p><b>APOTEK BERKAH</b> JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707</p>	
		<p>NAMA : Fatinah TGL: 19-02-2024 ED: 21 / 07 / 2027 NAMA OBAT: Ondancetron</p> <p>3 x SEHARI 1 TAB / <del>ML / SENDOK TAKAR / MAKAN</del> SEBELUM / <del>SAAT / SESUDAH MAKAN</del></p>	

Nama Obat /warna etiket : Sanmag/putih



**APOTEK BERKAH**

JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden  
Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707

NAMA : Fatinah

TGL: 19-02-2024

ED: 21 / 05 / 2027

NAMA OBAT: Sanmag

~~3 x SEHARI 1 TAB / ML / SENDOK TAKAR / MAKAN  
SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN~~

Nama Obat /warna etiket : Ondancetron/putih



**APOTEK BERKAH**

JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden  
Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707

NAMA : Fatinah

TGL: 19-02-2024

ED: 28 / 07 / 2027

NAMA OBAT: Sanmol

~~3 x SEHARI 1 TAB / ML / SENDOK TAKAR / MAKAN  
SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN~~

		<p>E. <i>Product knowledge</i></p> <p>Nama Obat : ondansartan                  Kandungan : Ondansetron 8 mg                  Dosis lazim : Pencegahan mual muntah paska operasi Dewasa dan anak &gt;17 tahun: Awal 8 mg per oral 1-2 jam sebelum anestesi, dilanjutkan dengan 8 mg setelah 8-12 jam. Anak 4-11 tahun: 4 mg 30 menit sebelum kemoterapi. Ulangi dosis setelah 4 dan 8 jam dari dosis awal Mual muntah paska operasi: 16 mg dosis tunggal 1 jam sebelum anestesi. Mual dan muntah yang diinduksi terapi radiasi: 8 mg per oral 1-2 jam sebelum radioterapi                  Kegunaan : Penatalaksanaan mual dan muntah karena kemoterapi dan radioterapi, mual dan muntah paska operasi                  ESO potensial : Nyeri dada, bradikardia, hipotensi, aritmia, hipoksia, peningkatan sementara enzim hati. Jarang terjadi: kebutaan sementara, gejala ekstrapiramidal (misalnya reaksi distonik, krisis okulogirik, diskinesia), kejang, nekrolisis epidermal toksik, sindrom serotonin.                  KI : Hipersensitivitas.                  Sindrom QT panjang bawaan.                  Penggunaan bersamaan dengan apomorphine.</p>	<p>Nama Obat : Lansoprazole                  Kandungan : Lansoprazole 30 mg                  Dosis lazim : Esofagitis refluks Dewasa: Pengobatan: 30 mg 1 kali sehari, selama 4-8 minggu. Profilaksis: 15 mg 1 kali sehari, dapat ditingkatkan hingga 30 mg jika perlu. Refluks gastro-esofagus Dewasa: 15-30 mg 1 kali sehari, selama 4 minggu. Ulserasi terkait NSAID Dewasa: 30 mg sekali sehari selama 4-8 minggu. Sindrom Zollinger-Ellison Dewasa: Awalnya, 60 mg 2 kali sehari, dapat disesuaikan hingga 180 mg setiap hari sesuai respons. Dosis harian &gt;120 mg harus diberikan dalam 2 dosis terbagi. Eradikasi H. pylori Dewasa: Sebagai terapi rangkap 3: 30 mg 2 kali sehari, selama 7-14 hari (dalam kombinasi dengan antibiotik). Sebagai terapi ganda: 30 mg tiga kali sehari selama 14 hari dalam kombinasi dengan amoksisilin. Tukak lambung/duodenum karena NSAID Dewasa: 15-30 mg 1 kali sehari. Tukak Peptik/ Peptic Ulcer Dewasa: 30 mg 1 kali sehari, selama 2-4 minggu (ulkus duodenum) atau selama 4-8 minggu (tukak lambung). Lansia: Maks: 30 mg per hari. Kegunaan : pengobatan tukak duodenum dan tukak lambung ringan,</p>
--	--	--	--



		<p><b>PERHATIAN</b> : Hati-hati penggunaan pada pasien dengan hipokalemia, hipomagnesemia, CHF, kelainan konduksi CV, bradikardia, kondisi lain yang dapat menyebabkan pemanjangan interval QT atau kelainan elektrolit, fenilketonuria, obstruksi usus subakut, dan pembedahan abdomen, dapat menutupi ileus progresif atau distensi lambung, Cara penyimpanan : : Simpan pada suhu dibawah 30°C</p>	<p>tukak peptik, refluks esofagitis, sindrom Zollinger-Ellison dan eradikasi H.pylori. ESO potensial : bahaya, harap konsultasikan kepada tenaga medis. Efek samping yang mungkin terjadi dalam penggunaan obat adalah: Hipomagnesemia, fraktur terkait osteoporosis, polip kelenjar fundus, karsinoma, lupus eritematosus kulit subakut, SLE, nefritis interstisial, diare terkait Clostridium difficile, infeksi saluran cerna (misalnya Salmonella, Campylobacter), defisiensi vitamin B12 (terapi jangka panjang). Gangguan sistem darah dan limfatik: Trombositopenia, leukopenia, eosinofilia. Gangguan mata: Gangguan penglihatan. Gangguan gastrointestinal: Diare, sakit perut, sembelit, mual, KI : Penderita yang hipersensitif terhadap lansoprazole, serta pasien yang sedang mengkonsumsi rilpivirine dan atazanavir. <b>PERHATIAN</b> : Pasien dengan keganasan lambung, faktor risiko berkurangnya penyerapan vitamin B12 atau berkurangnya simpanan tubuh; risiko osteoporosis. Gangguan hati sedang sampai berat. Tua. Kehamilan dan menyusui. metabolisme ultrarapid CYP2C19. Kategori Kehamilan :</p>
--	--	---	---

		<p>Kategori B: Mungkin dapat digunakan oleh wanita hamil. Penelitian pada hewan uji tidak memperlihatkan adanya risiko terhadap janin, namun belum ada bukti penelitian langsung terhadap wanita hamil. Konsultasikan kepada tenaga medis apabila sedang menyusui.                  Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah 30°C</p>
		<p>Nama Obat : analsik                  Kandungan : 500 mg methampyrone dan 2 mg diazepam                  Dosis lazim : Dewasa: 1 kaplet, bila nyeri berlanjut minum 1 kaplet setiap 6-8 jam sehari. Dosis maksimal adalah 4 kaplet per hari.                  Kegunaan : Mengurangi Nyeri Sedang hingga Berat                  ESO potensial : lelah, mengantuk vertigo penglihatan kabur ataksia konstipasi hipotensi jaundice (penyakit kuning) perubahan libido mual, muntah gemetar                  KI : TD &lt;100 mmHg, psikosis akut. Hamil, laktasi. Bayi usia 1 bln pertama                  PERHATIAN : Ggn fungsi hati &amp; ginjal, pasien depresi berat, pasien dg kelainan darah.                  Cara penyimpanan : Simpan obat Analsik pada suhu di bawah 30 derajat Celsius, di tempat kering dan sejuk</p>
		<p>Nama Obat : Sanmol                  Kandungan : Paracetamol 500 mg                  Dosis lazim : Dewasa dan anak &gt;12 tahun: 1 tablet, 3-4 kali per hari. Anak: 1/2 - 1 tablet, 3-4 kali sehari. Atau sesuai petunjuk dokter.                  Kegunaan : untuk meringankan rasa sakit pada keadaan sakit kepala, sakit gigi dan menurunkan demam.                  ESO potensial : Pemakaian obat umumnya memiliki efek samping tertentu dan sesuai dengan masing-masing individu. Jika terjadi efek samping yang berlebih dan berbahaya, harap konsultasikan kepada tenaga medis. Efek samping yang mungkin terjadi dalam penggunaan obat adalah: Hematologi, reaksi kulit, reaksi alergi lainnya, kerusakan hati (penggunaan jangka panjang dan overdosis).                  KI : Penderita gangguan fungsi hati yang berat. Hipersensitivitas terhadap Paracetamol.</p>

		<p>PERHATIAN : Hati-hati penggunaan obat ini pada penderita penyakit ginjal. Bila setelah 2 hari demam tidak menurun atau setelah 5 hari nyeri tidak menghilang, segera hubungi Unit Pelayanan Kesehatan. Penggunaan obat ini pada penderita yang mengonsumsi alkohol, dapat meningkatkan risiko kerusakan fungsi hati. Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah 30°C</p>
		<p>Nama obat: Cefixime Kandungan: Cefixime 200 mg Dosis Lazim: Dewasa dan anak-anak dengan berat badan sama dengan atau lebih dari 30 kg, dosis harian yang direkomendasikan adalah 50-100 (potensi) cefixime, diberikan per oral dua kali sehari. Untuk infeksi yang berat, dosis dapat ditingkatkan sampai 200 mg (potensi) diberikan dua kali sehari. Kegunaan: Infeksi saluran kemih tanpa komplikasi, otitis media, (radang rongga gendang telinga), faringitis dan tonsilitis, bronkhitis akut dan kronis serta eksaserbasi (kumatnya penyakit atau gejala penyakit secara mendadak) akut Eso Potensial: Syok, Hipersensitivitas, Hematologi, Hati, Ginjal, Saluran Cerna, Pernapasan, Perubahan flora</p>
		<p>Nama obat: neosanmag Kandungan: Famotidine 10 mg, Ca carbonate 800 mg, Mg(OH)<sub>2</sub> 165 mg Dosis Lazim: Dewasa dan anak &gt; 12 tahun 1 tablet kunyah, maksimal 2 tablet kunyah/hari Kegunaan: Meredakan gejala hipersekresi lambung seperti mual, nyeri lambung. nyeri epigastrium, kembung, perut terasa penuh Eso Potensial: Diare, konstipasi, sakit kepala, pusing. KI: Hipersensitif terhadap obat penurun asam lambung lain Perhatian: Disfagia, hamil, laktasi Cara Penyimpanan: Simpan pada suhu dibawah 30°C</p>


		<p>bakteri, Defisiensi vitamin, Pengaruh terhadap tes laboratorium Golongan Produ KI: Pasien dengan riwayat syok atau hipersensitif terhadap beberapa bahan dari obat ini. Perhatian:- Cara Penyimpanan: Simpan pada suhu dibawah 30°C</p>	
		<p>F. Tahap pembuatan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ambil obat analsik pada rak obat sebanyak 1 strip, lansoprazole 1 strip, ondancetron 1 strip, cefixim 1 strip,sanmag 1 strip, dan sanmol 10 tab</li><li>2. Tempelkan etiket pada kemasan obat</li><li>3. Masukkan kedalam kemasan plastic</li><li>4. Cek kembali kesesuaian obat yang di ambil dengan resep serta etiket yang tertempel pada kemasan obat</li></ol> <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p>	



		<p>Apt : Pasien atas nama Ny. Fatinah                  Pasien : iya mbak                  Apt : Baik ibu saya jelaskan obatnya dulu ya ibu, ini obatnya ada 6 macam bu yaitu analsik tablet untuk nyeri diminum 2 kali sehari 1 tablet sesudah makan , ondancetron diminum 3 kali sehari 1 tablet sebelum makan, lansoprazol untuk nyeri lambung diminum sebelum makan 2 kali sehari 1 tablet sebelum makan sanmol untuk nyeri dan demam diminum 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan, sanmag diminum 3 kali sehari 1 tablet, dan cefixim ini antibiotic ya bu diminum 2 kali sehari 1 tablet dihabiskan. Apa ada yang di tanyakan atau kurang jela bu dari penjelasan saya ?                  Pasien : sudah jelas mbak, terimakasih</p>
--	--	---

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																
5.*	Jenis Resep : resep asli Resep obat : non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep :  <b>Resep polifarmasi</b>	A. Skrinning Administrasi <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama Pasien :</td> <td style="width: 20%;">Ada</td> <td style="width: 50%;">R. Mulyantoro</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Alpentin Analsik Atorvastatin Citicolin CPG</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada</td> <td>Alpentin 100 Atorvastatin 20</td> </tr> </table>		Nama Pasien :	Ada	R. Mulyantoro	Umur pasien :	Tidak Ada	-	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Alpentin Analsik Atorvastatin Citicolin CPG	Kekuatan :	Ada	Alpentin 100 Atorvastatin 20
Nama Pasien :	Ada	R. Mulyantoro																
Umur pasien :	Tidak Ada	-																
Berat Badan :	Tidak Ada	-																
Nama Obat :	Ada	Alpentin Analsik Atorvastatin Citicolin CPG																
Kekuatan :	Ada	Alpentin 100 Atorvastatin 20																

TUGAS KHUSUS PKL D3 FARMASI UMG\_AZMI SABILA KISBATUL WAFI\_211105018\_APOTEK BERKAH

	Bentuk sed. :	Tidak Ada	-
	Jumlah obat :	Ada	Alpentin 100 no XXX Analisik no X Atorvastatin 20 no XXX Citicolin no XXX CPG no XXX
	Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
	Aturan pakai :	Ada	Alpentin 100 no XXX S 0-0-1 Analisik no X S 1 dd 1 prn nyeri Atorvastatin 20 no XXX S 0-0-1 Citicolin no XXX S 1 dd 1 CPG no XXX S 1 dd 1
	Tanggal penulisan resep :	Ada	19-02-2024
	Nama dokter :	Ada	dr.Firman Prayudi, Sp.N
	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-
	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jl. KH. Kholil 88 Gresik
	B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi		


Alpentin 100 yang dibutuhkan 3 strip  
Analsik yang dibutuhkan 1 strip  
Atorvastatin yang dibutuhkan 3 strip  
Citicolin yang dibutuhkan 3 strip  
CPG yang dibutuhkan 3 strip

C. Perhitungan biaya resep



Alpentin 100mg 1 strip  $45.000 \times 3 = 135.000$   
Analsik 1 strip 21.000  
Atorvastatin 1 strip  $13.000 \times 3 = 39.000$   
Citicolin 1 strip  $90.000 \times 3 = 270.000$   
CPG 1 strip  $180.000 \times 3 = 540.000$   
Total Biaya Rp 1.005.000

D. ETIKET



Nama Obat /warna etiket :Alpentin/putih

	<b>APOTEK BERKAH</b> JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707
NAMA : R. Mulyantoro	TGL: 19-02-2024 ED: 23 / 02 / 2027 NAMA OBAT: Alpentin
Malam x SEHARI 1 TAB / <del>ML</del> / <del>SENDOK TAKAR</del> / <del>MAKAN</del> <del>SEBELUM</del> / <del>SAAT</del> / <del>SESUDAH MAKAN</del>	

Nama Obat /warna etiket :Analsik/putih

		<p> <b>APOTEK BERKAH</b> JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707</p> <hr/> <p>NAMA : R. Mulyantoro TGL: 19-02-2024 ED: 17 / 02 / 2026 NAMA OBAT: Analsik</p> <p>1 x SEHARI 1 TAB / <del>ML / SENDOK TAKAR / MAKAN</del> <del>SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN</del></p> <p>Nama Obat /warna etiket : atorvastatin/putih</p> <p> <b>APOTEK BERKAH</b> JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707</p> <hr/> <p>NAMA : R. Mulyantoro TGL: 19-02-2024 ED: 25 / 10 / 2026 NAMA OBAT: Atorvastatin</p> <p>Malam x SEHARI 1 TAB / <del>ML / SENDOK TAKAR / MAKAN</del> <del>SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN</del></p> <p>Nama Obat /warna etiket : Citicolin/putih</p>
--	--	---



	 <p><b>APOTEK BERKAH</b>                  JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden                  Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707</p>	
	NAMA : R. Mulyantoro	TGL: 19-02-2024 ED: 20 / 09 / 2026 NAMA OBAT: Citicolin
	1 x SEHARI 1 TAB / <del>ML</del> / <del>SENDOK TAKAR</del> / <del>MAKAN</del> <del>SEBELUM</del> / <del>SAAT</del> / SESUDAH MAKAN	
	Nama Obat /warna etiket : CPG/putih	
 <p><b>APOTEK BERKAH</b>                  JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden                  Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707</p>		
NAMA : R. Mulyantoro	TGL: 19-02-2024 ED: 29 / 03 / 202 NAMA OBAT: CPG	
1 x SEHARI 1 TAB / <del>ML</del> / <del>SENDOK TAKAR</del> / <del>MAKAN</del> <del>SEBELUM</del> / <del>SAAT</del> / SESUDAH MAKAN		
<i>E. Product knowledge</i>		
Nama Obat : Alpentin Kandungan : Gabapentin 100 mg	Nama Obat : Atorvastatin Kandungan : Atorvastatin Calcium 20 mg	

		<p>Dosis lazim : Dewasa dan anak usia di atas 12 tahun : 900-1800 mg/hari. Hari ke-1: 300 mg 1x sehari. Hari ke-2 300 mg 2x sehari. Hari ke-3 300 mg 3x sehari. Selanjutnya, dosis dapat ditingkatkan sampai dengan 1200 mg/hari diberikan dalam 3 dosis terbagi. Peningkatan dosis lebih lanjut dapat dilakukan dengan penambahan 300 mg/hari, diberikan dalam 3 dosis terbagi. Maksimal 2.400 mg/hari.</p> <p>Kegunaan: kejang parsial dan kejang dengan generalisasi sekunder pada pasien yang belum terkontrol dengan antikonvulsan standar yang digunakan secara tunggal atau kombinasi, atau yang tidak toleran terhadap dosis terapi obat ini. Gabapentin, sebagai terapi tambahan antikonvulsan, diindikasikan untuk kejang sederhana dan kejang parsial kompleks, terutama kejang umum sekunder tonik-klonik.</p> <p>ESO potensial : Rasa kantuk, rasa kelelahan, pusing.</p> <p>KI : Pasien hipersensitif terhadap gabapentin.</p> <p>PERHATIAN : HARUS DENGAN RESEP DOKTER. Penghentian terapi dilakukan secara bertahap sekurang-kurangnya 1 minggu. Dapat mengganggu kemampuan mengemudi atau menjalankan mesin. Belum</p>	<p>Dosis lazim : Dosis awal yang biasa diberikan adalah 10 mg 1 kali sehari. Rentang dosis adalah antara 10-80 mg sekali sehari. Hyperkolesterolemia primer dan hiperlipidemia campuran: 10 mg, diberikan 1 kali sehari. Familial hyperkolesterolemia homozigot: 10-80 mg per hari. Familial hyperkolesterolemia heterozigot pada pasien anak-anak (10-17 tahun): dosis awal yang direkomendasikan adalah 10 mg/hari, dosis maksimum yang direkomendasikan adalah 20 mg/hari. Penyesuaian harus dilakukan pada interval 4 minggu. Kombinasi dg siklosporin, telaprevir, atau kombinasi tipranavir/ritonavir: Dosis tidak boleh melebihi 10 mg.</p> <p>Kegunaan : Sebagai terapi tambahan di samping diet, untuk menurunkan kolesterol total, kolesterol LDL, apolipoprotein-B, dan kadar trigliserida pada pasien dengan hiperkolesterolemia primer, hiperlipidemia kombinasi (campuran), serta hiperkolesterolemia familial heterozigot dan homozigot, bila diet dan penatalaksanaan non-farmakologik lainnya kurang berhasil</p> <p>ESO potensial : sakit kepala, mual, mialgia, lemas. Efek samping yang mungkin terjadi diantaranya yaitu: Insomnia, sakit kepala, mual, diare,</p>
--	--	---	---

		<p>ditentukan keamanan dan efikasi pada anak usia di bawah 12 tahun. Hamil, laktasi. Kategori Kehamilan : Kategori C: Mungkin berisiko. Obat digunakan dengan hati-hati apabila besarnya manfaat yang diperoleh melebihi besarnya risiko terhadap janin. Penelitian pada hewan uji menunjukkan risiko terhadap janin dan belum terdapat penelitian langsung terhadap wanita hamil.</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah 30°C</p>	<p>sakit perut, dispepsia, sembelit, perut kembung, mialgia, artralgia, asthenia, hipoglikemia, hiperglikemia, anoreksia, neuropati perifer, parestesia, tinitus, pankreatitis, muntah, hepatitis, ikterus kolestatik, alopecia, pruritus, ruam , miopati urtikaria, miositis, kram otot, impotensi, edema angioneurotik, malaise, angina.</p> <p>KI : Hipersensitif terhadap komponen- komponen dalam obat ini. Penyakit hati aktif atau peningkatan serum transaminase yang menetap melebihi 3 kali lipat dari batas atas normal. Ibu hamil, menyusui atau usia produktif yang tidak menggunakan alat kontrasepsi yang adekuat. Atorvastatin harus diberikan pada wanita usia subur hanya jika sangat tidak mungkin hamil dan telah diinformasikan potensi bahayanya terhadap janin.</p> <p>Perhatian: HARUS DENGAN RESEP DOKTER. Pasien yang memberikan tanda atau gejala yang mengarah pada kerusakan hati harus melakukan tes fungsi hati. Pasien dengan kondisi serius yang akut mengarah pada miopatia atau memiliki faktor risiko yang mempengaruhi pada perkembangan menjadi gagal ginjal sekunder dari rhabdomyolysis harus menunda atau menghentikan terapi</p>
--	--	--	--

		<p>sementara. Pasien dengan stroke hemoragi pada saat awal pengobatan tampak memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami stroke hemoragi berulang. Kategori kehamilan: Kategori X: Kontraindikasi (tidak boleh digunakan). Terdapat hasil penelitian terhadap hewan uji dan manusia yang memperlihatkan abnormalitas terhadap janin. Obat ini dikontraindikasikan untuk wanita hamil dan yang berkemungkinan untuk hamil. Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah 30°C</p>
		<p>Nama Obat : analsik                  Kandungan : 500 mg methampyrone dan 2 mg diazepam                  Dosis lazim : Dewasa: 1 kaplet, bila nyeri berlanjut minum 1 kaplet setiap 6-8 jam sehari. Dosis maksimal adalah 4 kaplet per hari.                  Kegunaan : Mengurangi Nyeri Sedang hingga Berat                  ESO potensial : lelah, mengantuk vertigo penglihatan kabur ataksia konstipasi hipotensi jaundice (penyakit kuning) perubahan libido mual, muntah gemetar                  KI : TD &lt;100 mmHg, psikosis akut. Hamil, laktasi. Bayi usia 1 bln pertama</p>
		<p>Nama Obat : Citicolin                  Kandungan : Citicoline 500 mg                  Dosis lazim : 1 x sehari 1 kaplet atau sesuai petunjuk dokter                  Kegunaan : untuk meningkatkan kemampuan kognitif pada lansia dan digunakan untuk terapi gangguan serebrovaskular, gangguan kognitif, cedera kepala, penyakit parkinson.                  ESO potensial : Diare, ketidaknyamanan epigastrium, sakit perut, kelelahan, pusing, sakit kepala, ruam, hipotensi.                  KI : Hipertonia pada sistem saraf parasimpatis                  PERHATIAN : Gangguan kesadaran akut, berat dan progresif; terapi bersama dengan hemostatik atau obat</p>

		<p><b>PERHATIAN</b> : Ggn fungsi hati &amp; ginjal, pasien depresi berat, pasien dg kelainan darah.</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan obat Analsik pada suhu di bawah 30 derajat Celsius, di tempat kering dan sejuk</p>	<p>yang menurunkan TIK atau tindakan untuk menjaga agar suhu tubuh tetap rendah</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah 30°C</p>
		<p>Nama obat: CPG</p> <p>Kandungan: Clopidogrel 75 mg</p> <p>Dosis Lazim: Sehari 1 kali 1 tablet (75 mg). Tidak ada penyesuaian dosis yang diperlukan untuk pasien lanjut usia atau pasien dengan penyakit ginjal.</p> <p>Kegunaan: Mengurangi kejadian aterosklerosis (infark miokard, stroke dan kematian vaskular) pada pasien dengan aterosklerosis yang ditandai dengan stroke yang belum lama, terjadi infark miokard atau penyakit arteri lain.</p> <p>KI: Hipersensitif terhadap Clopidogrel. Perdarahan patologis aktif seperti tukak lambung atau perdarahan intrakranial.</p> <p>Perhatian: Clopidogrel harus digunakan secara hati-hati pada pasien yang mengalami gangguan hati yang mungkin mengalami perdarahan diatesis. - Jika terjadi gejala pendarahan, segera konsultasikan hal tersebut kepada dokter Anda. Kategori Kehamilan: Kategori B: Mungkin dapat digunakan oleh wanita hamil. Penelitian pada hewan uji tidak memperlihatkan ada nya risiko terhadap janin, namun</p>	



		<p>belum ada bukti penelitian langsung terhadap wanita hamil. Cara Penyimpanan: Simpan pada suhu dibawah 30°C</p>	
		<p>F. Tahap pembuatan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ambil obat alpentin 100mg pada rak obat sebanyak 3 strip, analsik 1 strip, atorvastatin 20mg 1 strip, citicolin 3 strip, clopidogrel 3 strip</li><li>2. Tempelkan etiket pada kemasan obat</li><li>3. Masukkan kedalam kemasan plastic</li><li>4. Cek kembali kesesuaian obat yang di ambil dengan resep serta etiket yang tertempel pada kemasan obat</li></ol>	
		<p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p>	


Apt : Pasien atas nama Tn. R. Mulyantoro

Pasien : iya mbak







Apt : Baik bapak saya jelaskan obatnya dulu ya bapak ini obatnya ada 5 macam bu yaitu analsik tablet untuk nyeri diminum 1 kali sehari 1 tablet sesudah makan , alpentin untuk kejang diminum 1 kali sehari 1 tablet malam hari sesudah makan, oatorvastatin untuk menurunkan kolestrol diminum sesudah makan 1 kali sehari 1 tablet saat malam, citicolin diminum 1 kali sehari 1 tablet sesudah makan dan clopidogrel diminum 1 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Apa ada yang di tanyakan atau kurang jela bu dari penjelasan saya ?

Pasien : sudah jelas mbak, terimakasih

Apt : terimakasih kembali bapak, semoga lekas sembuh

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep		
6. *	<p>Jenis Resep : resep asli                      Resep obat : non racikan                      Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (&gt;/Tidak                      Pengulangan resep :</p> <p><b>Resep polifarmasi</b></p> 	A. Skrinning Administrasi		
		Nama Pasien :	Ada	Nur Khusnawati
		Umur pasien :	Tidak Ada	-
		Berat Badan :	Tidak Ada	-
		Nama Obat :	Ada	Analsik Curcuma omeprazole Sanmol Sucralfate
		Kekuatan :	Tidak ada	-
		Bentuk sed. :	Tidak Ada	-
		Jumlah obat :	Ada	Analsik no X Curcuma no X Omeprazole no X Sanmol no X Sucralfate no I
		Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
		Aturan pakai :	Ada	Analsik no X S 3X1 Curcuma no X S 1X1 Omeprazole no X S 2X1 Sanmol no X S 3X1 Sucralfate no I S 3X1 sdm
		Tanggal penulisan resep :	Ada	21-02-2024
		Nama dokter :	Ada	dr.Lailatul Inayah
		Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-

		Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jl. KH. Kholil 88 Gresik
<b>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</b>				
Analsik yang dibutuhkan 1 strip Curcuma yang dibutuhkan 1 strip Omeprazole yang dibutuhkan 1 strip Sucralfate syr yang dibutuhkan 1 botol Sanmol yang dibutuhkan 10 tab				
<b>C. Perhitungan biaya resep</b>				
Analsik 1 strip 21.000 Curcuma 1 strip 15.000 Omeprazole 1 strip 6.000 Sucralfate syr 1 botol 21.000 Sanmol 1 tab 650 x10 = 6.500 Total Biaya Rp 69.500				
<b>D. ETIKET</b>				
Nama Obat /warna etiket :Analsik/putih				

		<table border="1"><tr><td data-bbox="922 199 1765 327"><p><b>APOTEK BERKAH</b> JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707</p></td><td data-bbox="1774 199 2020 327"></td></tr><tr><td data-bbox="922 327 1774 635"><p>NAMA : Nur Khusnawati TGL: 21-02-2024 ED: 23 / 02 / 2027 NAMA OBAT: Analsik</p><p><del>3 x SEHARI 1 TAB / ML / SENDOK TAKAR / MAKAN SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN</del></p></td><td data-bbox="1774 327 2020 635"></td></tr><tr><td colspan="2" data-bbox="922 694 1774 742"><p>Nama Obat /warna etiket :Curcuma/putih</p></td></tr><tr><td data-bbox="922 742 1765 869"><p><b>APOTEK BERKAH</b> JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707</p></td><td data-bbox="1765 742 2020 869"></td></tr><tr><td data-bbox="922 869 1765 1181"><p>NAMA : Nur Khusnawati TGL: 21-02-2024 ED: 10 / 05 / 2028 NAMA OBAT: Curcuma</p><p><del>1 x SEHARI 1 TAB / ML / SENDOK TAKAR / MAKAN SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN</del></p></td><td data-bbox="1765 869 2020 1181"></td></tr></table>	 <p><b>APOTEK BERKAH</b> JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707</p>		<p>NAMA : Nur Khusnawati TGL: 21-02-2024 ED: 23 / 02 / 2027 NAMA OBAT: Analsik</p> <p><del>3 x SEHARI 1 TAB / ML / SENDOK TAKAR / MAKAN SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN</del></p>		<p>Nama Obat /warna etiket :Curcuma/putih</p>		 <p><b>APOTEK BERKAH</b> JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707</p>		<p>NAMA : Nur Khusnawati TGL: 21-02-2024 ED: 10 / 05 / 2028 NAMA OBAT: Curcuma</p> <p><del>1 x SEHARI 1 TAB / ML / SENDOK TAKAR / MAKAN SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN</del></p>	
 <p><b>APOTEK BERKAH</b> JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707</p>												
<p>NAMA : Nur Khusnawati TGL: 21-02-2024 ED: 23 / 02 / 2027 NAMA OBAT: Analsik</p> <p><del>3 x SEHARI 1 TAB / ML / SENDOK TAKAR / MAKAN SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN</del></p>												
<p>Nama Obat /warna etiket :Curcuma/putih</p>												
 <p><b>APOTEK BERKAH</b> JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707</p>												
<p>NAMA : Nur Khusnawati TGL: 21-02-2024 ED: 10 / 05 / 2028 NAMA OBAT: Curcuma</p> <p><del>1 x SEHARI 1 TAB / ML / SENDOK TAKAR / MAKAN SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN</del></p>												



Nama Obat /warna etiket : Omeprazole/putih



**APOTEK BERKAH**

JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden  
Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707

NAMA : Nur Khusnawati

TGL: 21-02-2024

ED: 10 / 11 / 2028

NAMA OBAT: Omeprazole

~~2 x SEHARI 1 KAPS / ML / SENDOK TAKAR / MAKAN  
SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN~~

Nama Obat /warna etiket : Sanmol/putih



**APOTEK BERKAH**

JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden  
Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707


NAMA : Nur Khusnawati

TGL: 21-02-2024

ED: 10 / 11 / 2026

NAMA OBAT: Sanmol

~~3 x SEHARI 1 TAB / ML / SENDOK TAKAR / MAKAN  
SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN~~

		<p>Nama Obat /warna etiket : Sucralfate/putih</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p><b>APOTEK BERKAH</b>                  JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden                  Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707</p> </div> <p>NAMA : Nur Khusnawati TGL: 21-02-2024                  ED: 05/ 07 / 2026                  NAMA OBAT: Sucralfate syr</p> <p>3 x SEHARI 1 SDM <del>BH / ML / SENDOK TAKAR /</del> SEBELUM                  MAKAN / <del>SAAT / SESUDAH</del> MAKAN</p> <p><i>E. Product knowledge</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p>Nama Obat : Curcuma tab                      Kandungan : Tiap tablet mengandung Ekstrak Curcumae xanthorrhizae Rhizoma 20 mg                      Dosis lazim : 3 x sehari 1-2 tablet                      Kegunaan : Untuk membantu memelihara kesehatan fungsi hati, membantu menjaga daya tahan tubuh, serta membantu memperbaiki nafsu makan                      ESO potensial : sakit perut, mual, dan diare                      KI : Memiliki hipersensitif atau alergi terhadap kandungan suplemen ini</p> </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p>Nama Obat : Omeprazole                      Kandungan : Omeprazole 20 mg                      Dosis lazim : Tukak Lambung/duodenum krn NSAID:                      Dewasa: 20 mg 1 kali sehari hingga 8 minggu Eradikasi H.Pylori: Dewasa: 20 mg 2 kali sehari/ 40 mg 1 kali sehari, selama 1 minggu (dikombinasi dengan antibiotik) Anak: &gt;4 tahun, 15-30 kg: 10 mg 2 kali sehari. &gt; 4 tahun, 31-40 kg: 20 mg 1 kali sehari. selama 1 minggu (dikombinasi dengan antibiotik)                      Tukak Peptik/ Peptic Ulcer: Dewasa: Pengobatan: 20-40 mg 1 kali sehari,</p> </td> </tr> </table>	<p>Nama Obat : Curcuma tab                      Kandungan : Tiap tablet mengandung Ekstrak Curcumae xanthorrhizae Rhizoma 20 mg                      Dosis lazim : 3 x sehari 1-2 tablet                      Kegunaan : Untuk membantu memelihara kesehatan fungsi hati, membantu menjaga daya tahan tubuh, serta membantu memperbaiki nafsu makan                      ESO potensial : sakit perut, mual, dan diare                      KI : Memiliki hipersensitif atau alergi terhadap kandungan suplemen ini</p>	<p>Nama Obat : Omeprazole                      Kandungan : Omeprazole 20 mg                      Dosis lazim : Tukak Lambung/duodenum krn NSAID:                      Dewasa: 20 mg 1 kali sehari hingga 8 minggu Eradikasi H.Pylori: Dewasa: 20 mg 2 kali sehari/ 40 mg 1 kali sehari, selama 1 minggu (dikombinasi dengan antibiotik) Anak: &gt;4 tahun, 15-30 kg: 10 mg 2 kali sehari. &gt; 4 tahun, 31-40 kg: 20 mg 1 kali sehari. selama 1 minggu (dikombinasi dengan antibiotik)                      Tukak Peptik/ Peptic Ulcer: Dewasa: Pengobatan: 20-40 mg 1 kali sehari,</p>
<p>Nama Obat : Curcuma tab                      Kandungan : Tiap tablet mengandung Ekstrak Curcumae xanthorrhizae Rhizoma 20 mg                      Dosis lazim : 3 x sehari 1-2 tablet                      Kegunaan : Untuk membantu memelihara kesehatan fungsi hati, membantu menjaga daya tahan tubuh, serta membantu memperbaiki nafsu makan                      ESO potensial : sakit perut, mual, dan diare                      KI : Memiliki hipersensitif atau alergi terhadap kandungan suplemen ini</p>	<p>Nama Obat : Omeprazole                      Kandungan : Omeprazole 20 mg                      Dosis lazim : Tukak Lambung/duodenum krn NSAID:                      Dewasa: 20 mg 1 kali sehari hingga 8 minggu Eradikasi H.Pylori: Dewasa: 20 mg 2 kali sehari/ 40 mg 1 kali sehari, selama 1 minggu (dikombinasi dengan antibiotik) Anak: &gt;4 tahun, 15-30 kg: 10 mg 2 kali sehari. &gt; 4 tahun, 31-40 kg: 20 mg 1 kali sehari. selama 1 minggu (dikombinasi dengan antibiotik)                      Tukak Peptik/ Peptic Ulcer: Dewasa: Pengobatan: 20-40 mg 1 kali sehari,</p>			

		<p>PERHATIAN : - Cara penyimpanan : : Simpan pada suhu dibawah 30°C</p>	<p>selama 4 minggu (ulkus duodenum) dan 8 minggu (ulkus lambung). Kegunaan : Pengobatan jangka pendek untuk tukak lambung dan tukak duodenum, tukak lambung dan duodenum yang terkait dengan AINS, lesi lambung dan duodenum, regimen eradikasi H. pylori pada tukak peptik, refluks esofagitis, Sindrom Zollinger Ellison ESO potensial : Mual, muntah, diare, konstipasi, perut kembung, sakit perut. Gangguan umum dan kondisi tempat pemberian: Kelemahan, malaise. Gangguan hepatobilier: Peningkatan enzim hati. Gangguan sistem kekebalan: Urtikaria. Gangguan metabolisme dan nutrisi: Edema perifer KI : Omeprazole dikontraindikasikan untuk pasien yang diketahui hipersensitivitas terhadap obat ini atau bahan lain yang terdapat dalam formulasi. Penggunaan dengan nelfinavir. Perhatian: HARUS DENGAN RESEP DOKTER. Perhatian khusus pada Pasien dengan penurunan simpanan tubuh atau faktor risiko penurunan penyerapan vitamin B12; risiko osteoporosis. Gangguan hati. Anak-anak, orang tua Kategori kehamilan Kategori C: Mungkin berisiko. Obat</p>
--	--	---	--

		<p>digunakan dengan hati-hati apabila besarnya manfaat yang diperoleh melebihi besarnya risiko terhadap janin. Penelitian pada hewan uji menunjukkan risiko terhadap janin dan belum terdapat penelitian langsung terhadap wanita hamil. Konsultasikan kepada tenaga medis apabila sedang menyusui.                  Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah 30°C</p>	
		<p>Nama Obat : analsik                  Kandungan : 500 mg methampyrone dan 2 mg diazepam                  Dosis lazim : Dewasa: 1 kaplet, bila nyeri berlanjut minum 1 kaplet setiap 6-8 jam sehari. Dosis maksimal adalah 4 kaplet per hari.                  Kegunaan : Mengurangi Nyeri Sedang hingga Berat                  ESO potensial : lelah, mengantuk vertigo penglihatan kabur ataksia konstipasi hipotensi jaundice (penyakit kuning) perubahan libido mual, muntah gemetar                  KI : TD &lt;100 mmHg, psikosis akut. Hamil, laktasi. Bayi usia 1 bln pertama                  PERHATIAN : Ggn fungsi hati &amp; ginjal, pasien depresi berat, pasien dg kelainan darah.</p>	<p>Nama Obat : Sanmol                  Kandungan : Paracetamol 500 mg                  Dosis lazim : Dewasa dan anak &gt;12 tahun: 1 tablet, 3-4 kali per hari. Anak: 1/2 - 1 tablet, 3-4 kali sehari. Atau sesuai petunjuk dokter.                  Kegunaan : untuk meringankan rasa sakit pada keadaan sakit kepala, sakit gigi dan menurunkan demam.                  ESO potensial : Pemakaian obat umumnya memiliki efek samping tertentu dan sesuai dengan masing-masing individu. Jika terjadi efek samping yang berlebih dan berbahaya, harap konsultasikan kepada tenaga medis. Efek samping yang mungkin terjadi dalam penggunaan obat adalah: Hematologi, reaksi kulit, reaksi alergi lainnya, kerusakan hati (penggunaan jangka panjang dan overdosis).</p>

		<p>Cara penyimpanan : Simpan obat Analisik pada suhu di bawah 30 derajat Celsius, di tempat kering dan sejuk</p>	<p>KI : Penderita gangguan fungsi hati yang berat. Hipersensitivitas terhadap Paracetamol.  <b>PERHATIAN</b> : Hati-hati penggunaan obat ini pada penderita penyakit ginjal. Bila setelah 2 hari demam tidak menurun atau setelah 5 hari nyeri tidak menghilang, segera hubungi Unit Pelayanan Kesehatan. Penggunaan obat ini pada penderita yang mengkonsumsi alkohol, dapat meningkatkan risiko kerusakan fungsi hati.                  Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah 30°C</p>
		<p>Nama obat: Sucralfat syr                  Kandungan: Per 5 ml : Sucralfate 500 mg                  Dosis Lazim: Dewasa : 4 x sehari 1 g (2 sendok takar)                  Kegunaan: Tukak lambung dan usus, gastritis kronik dan profilaksis perdarahan gastrointestinal                  Eso Potensial: osteodistrofi Al, osteomalasia dan ensefalopati (pada pasien dengan gangguan ginjal), pembentukan bezoar dan obstruksi usus (pada pasien yang sakit parah), hiperglikemia, aspirasi disertai komplikasi pernafasan, vertigo, Sembelit, diare, perut kembung, ketidaknyamanan lambung, mulut kering, dispepsia, mual, muntah.</p>	



		<p>KI: Hipersensitivitas Perhatian: HARUS DENGAN RESEP DOKTER. Hati-hati penggunaan pada penderita diabetes melitus, kondisi yang dapat mengganggu proses menelan (misalnya intubasi baru atau jangka panjang, disfagia, trakeostomi, riwayat aspirasi), atau kondisi lain yang dapat mengubah refleks muntah/batuk atau mengurangi koordinasi orofaringeal atau motilitas. Pasien yang sakit parah, terutama mereka dengan pengosongan lambung yang tertunda dan pemberian makanan enteral bersamaan. Gangguan ginjal (misalnya gagal ginjal kronis atau mereka yang menerima dialisis). Lansia. Kehamilan dan menyusui. Kategori kehamilan : Kategori B: Mungkin dapat digunakan oleh wanita hamil. Penelitian pada hewan uji tidak memperlihatkan adanya risiko terhadap janin, namun belum ada bukti penelitian langsung terhadap wanita hamil. Cara Penyimpanan: Simpan pada suhu dibawah 30°C</p>	
F. Tahap pembuatan			

1. Ambil obat analisik pada rak obat sebanyak 1 strip, omeprazole 1 strip, curcuma 1 strip, sanmol 1 strip, sucralfate 1 botol sirup
2. Tempelkan etiket pada kemasan obat
3. Masukkan kedalam kemasan plastic
4. Cek kembali kesesuaian obat yang di ambil dengan resep serta etiket yang tertempel pada kemasan obat

G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)


Apt : Pasien atas nama Nur Khusnawati




Pasien : iya mbak

Apt : Baik ibu saya jelaskan obatnya dulu ya ibu, ini obatnya ada 5 macam bu yaitu analisik tablet untuk nyeri diminum 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan , curcuma untuk nafsu makan diminum 1 kali sehari 1 tablet sesudah makan, omeprazol untuk nyeri lambung diminum sebelum makan 2 kali sehari 1 tablet sebelum makan sanmol untuk nyeri dan demam diminum 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan, sucralfate sirup diminum 3 kali sehari 1 sendok makan sebelum makan, Apa ada yang di tanyakan atau kurang jela bu dari penjelasan saya ?

Pasien : sudah jelas mbak, terimakasih


Apt : terimakasih kembali bapak, semoga lekas sembuh

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
7.*	<p>Jenis Resep : resep asli                      Resep obat : non racikan                      Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (&gt;/Tidak                      Pengulangan resep :</p> <p><b>Resep obat tetes mata/telinga</b></p> 	<p>a. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1021 264 1984 895"> <tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada</td><td>Hartono</td></tr> <tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Berat Badan :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada</td><td>R/ Vitrolenta ED</td></tr> <tr><td>Kekuatan :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada</td><td>Tetes mata</td></tr> <tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada</td><td>Vitrolenta ED No.1</td></tr> <tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>R/ Vitrolenta ED S 4 DD GTT 1 ODS (4 kali 1 tetes mata kanan dan kiri)</td></tr> <tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>16 - 02 - 2024</td></tr> <tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada</td><td>Dr. Widriantari Rosyamah, Sp. M</td></tr> <tr><td>Surat ijin :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada</td><td>Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jl. KH. Kholil 88 Gresik</td></tr> </table> <p>b. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div data-bbox="1021 1002 1895 1074" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                 Vitrolenta yang dibutuhkan 1 botol             </div> <p>c. Perhitungan biaya resep</p> <div data-bbox="1021 1177 1968 1286" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                 Vitrolenta 1 → Rp. 45.000             </div> <p>d. ETIKET                      Nama Obat /warna etiket : Vitrolenta/biru</p>	Nama Pasien :	Ada	Hartono	Umur pasien :	Ada	-	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	R/ Vitrolenta ED	Kekuatan :	Tidak Ada	-	Bentuk sed. :	Ada	Tetes mata	Jumlah obat :	Ada	Vitrolenta ED No.1	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	R/ Vitrolenta ED S 4 DD GTT 1 ODS (4 kali 1 tetes mata kanan dan kiri)	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	16 - 02 - 2024	Nama dokter :	Ada	Dr. Widriantari Rosyamah, Sp. M	Surat ijin :	Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada	Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jl. KH. Kholil 88 Gresik
Nama Pasien :	Ada	Hartono																																							
Umur pasien :	Ada	-																																							
Berat Badan :	Tidak Ada	-																																							
Nama Obat :	Ada	R/ Vitrolenta ED																																							
Kekuatan :	Tidak Ada	-																																							
Bentuk sed. :	Ada	Tetes mata																																							
Jumlah obat :	Ada	Vitrolenta ED No.1																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	R/ Vitrolenta ED S 4 DD GTT 1 ODS (4 kali 1 tetes mata kanan dan kiri)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	16 - 02 - 2024																																							
Nama dokter :	Ada	Dr. Widriantari Rosyamah, Sp. M																																							
Surat ijin :	Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada	Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jl. KH. Kholil 88 Gresik																																							

		<table border="1"><tr><td data-bbox="1016 204 1144 320"></td><td data-bbox="1144 204 1765 373"><b>APOTEK BERKAH</b> JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707</td></tr><tr><td data-bbox="1016 373 1487 576">NAMA : Hartono</td><td data-bbox="1487 373 1765 576">TGL: 16 – 02 – 2024 ED: 24 – 05 – 2027 NAMA OBAT: Vitrolenta</td></tr><tr><td colspan="2" data-bbox="1016 576 1765 683">4 x SEHARI 1 TETES MATA / <del>HIDUNG</del> / <del>TELINGA</del> KANAN/KIRI</td></tr></table>		<b>APOTEK BERKAH</b> JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707	NAMA : Hartono	TGL: 16 – 02 – 2024 ED: 24 – 05 – 2027 NAMA OBAT: Vitrolenta	4 x SEHARI 1 TETES MATA / <del>HIDUNG</del> / <del>TELINGA</del> KANAN/KIRI		
	<b>APOTEK BERKAH</b> JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707								
NAMA : Hartono	TGL: 16 – 02 – 2024 ED: 24 – 05 – 2027 NAMA OBAT: Vitrolenta								
4 x SEHARI 1 TETES MATA / <del>HIDUNG</del> / <del>TELINGA</del> KANAN/KIRI									
		<p>e. <i>Product knowledge</i></p> <table border="1"><tr><td data-bbox="1016 751 1989 1310">Nama Obat : Cendro Vitrolenta Eye Drop Kandungan : Potassium Iodide 5 mg, Sodium Iodide 10 mg. Dosis lazim : <b>PENGGUNAAN OBAT INI HARUS DENGAN PETUNJUK DOKTER.</b> 1-3 X sehari 1 tetes Kegunaan : Informasi Obat Ini Hanya Untuk Kalangan Medis. Kekeruhan dan pendarahan pada vitreous body dikarenakan segala penyebabnya (faktor usia, myopia, hipertonia, diabetes) kekeruhan pada lensa sebagai gejala awal katarak sinilis. ESO potensial : belum ditemukan efek samping selama pemakaian obat ini. KI : Hipersensitif salah satu komponen obat PERHATIAN : Harus Dengan Resep Dokter. Hanya untuk obat ini Cara penyimpanan : simpan pada suhu ruangan dan terhindar dari sinar matahari langsung</td></tr></table>	Nama Obat : Cendro Vitrolenta Eye Drop Kandungan : Potassium Iodide 5 mg, Sodium Iodide 10 mg. Dosis lazim : <b>PENGGUNAAN OBAT INI HARUS DENGAN PETUNJUK DOKTER.</b> 1-3 X sehari 1 tetes Kegunaan : Informasi Obat Ini Hanya Untuk Kalangan Medis. Kekeruhan dan pendarahan pada vitreous body dikarenakan segala penyebabnya (faktor usia, myopia, hipertonia, diabetes) kekeruhan pada lensa sebagai gejala awal katarak sinilis. ESO potensial : belum ditemukan efek samping selama pemakaian obat ini. KI : Hipersensitif salah satu komponen obat PERHATIAN : Harus Dengan Resep Dokter. Hanya untuk obat ini Cara penyimpanan : simpan pada suhu ruangan dan terhindar dari sinar matahari langsung						
Nama Obat : Cendro Vitrolenta Eye Drop Kandungan : Potassium Iodide 5 mg, Sodium Iodide 10 mg. Dosis lazim : <b>PENGGUNAAN OBAT INI HARUS DENGAN PETUNJUK DOKTER.</b> 1-3 X sehari 1 tetes Kegunaan : Informasi Obat Ini Hanya Untuk Kalangan Medis. Kekeruhan dan pendarahan pada vitreous body dikarenakan segala penyebabnya (faktor usia, myopia, hipertonia, diabetes) kekeruhan pada lensa sebagai gejala awal katarak sinilis. ESO potensial : belum ditemukan efek samping selama pemakaian obat ini. KI : Hipersensitif salah satu komponen obat PERHATIAN : Harus Dengan Resep Dokter. Hanya untuk obat ini Cara penyimpanan : simpan pada suhu ruangan dan terhindar dari sinar matahari langsung									

		<p>f. Tahap pembuatan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ambil obat tetes mata pada rak obat Vitrolenta sebanyak 3 strip</li><li>2. Tempelkan etiket pada kemasan obat</li><li>3. Masukkan kedalam kemasan plastik</li><li>4. Cek kembali kesesuaian obat yang di ambil dengan resep serta etiket yang tertempel pada kemasan obat</li></ol> <p>g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p><b>P = Pasien A = Apoteker</b></p> <p>A= atas nama bapak hartono dari Klinik spesialis mata ya bapak? (dengan wajah yang ramah)</p> <p>P = iya benar mbak</p> <p>A = baik pak mohon maaf sebelumnya untuk obat vitrolenta ini diteteskan pada mata kanan dan kiri 4 kali sehari 1 tetes ya bapak</p> <p>P = baik mbak (sambil mengangguk)</p> <p>A = Apakah ada yang ditanyakan bapak</p> <p>P = tidak ada mbak</p>
--	--	--



No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep	
8.*	<p>Jenis Resep : Resep obat kulit                      Resep obat : Racikan dan non racikan                      Jumlah obat dalam resep : 4 macam obat                      Pengulangan resep :</p> <p><b>Resep obat kulit</b></p> 	A. Skrinning Administrasi	
		Nama Pasien :	Ada Segara Aabama Baihaqi
		Umur pasien :	Tidak Ada -
		Berat Badan :	Ada 11 kg
		Nama Obat :	Ada R/ Genolon cream R/ Ryvell syr 5 mg/5 ml R/ Topicare ceramide R/ Trilac tab Sporetik Saq lactis
		Kekuatan :	Ada/Tidak Ada R/ Genolon cream R/ Ryvell syr 5 mg/5 ml R/ Topicare ceramide R/ Trilac tab 2 mg Sporetik Saq lactis
		Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada R/ Genolon cream R/ Ryvell syr 5 mg/5 ml R/ Topicare ceramide R/ Trilac tab Sporetik tab Saq lactis serbuk
		Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada R/ Genolon cream No. I R/ Ryvell syr 5 mg/5 ml No. I R/ Topicare ceramide No. I R/ Trilac tab 2mg Sporetik tab 50 mg Saq lactis serbuk
		Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada -

			Aturan pakai : Tanggal penulisan resep : Nama dokter : Surat ijin : Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada Ada/Tidak Ada Tidak Ada Ada	R/ Genolon cream                      No. I S ue 3 x sehari ( untuk pemakaian luar 3 kali sehari) R/ Ryvell syr 5 mg/5 ml              No. I S 1 dd cth ½ po ( R/ Topicare ceramide                  No. I R/ Trilac tab 2mg Sporetik tab 50 mg Saq lactis serbuk
			B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi		
			Genolon cream dibutuhkan sebanyak 1 tube Ryvell syr 5 mg/5 ml dibutuhkan sebanyak 1 pcs Topicare ceramide dibutuhkan sebanyak 1 tube Trilac tab 2mg dibutuhkan sebanyak 6 Sporetik tab 50 mg dibutuhkan sebanyak 3 Saq lactis serbuk dibutuhkan secukupnya Kertas puyer sebanyak 12 lembar Cara menghitung : $Trilac\ tab\ 2\ mg = 2 \times 12 = 24 : 4\ mg = 6$		

Sporetik tab 50 mg = 50 x 12 = 600 : 200 mg = 3

C. Perhitungan biaya resep

R/ Genolon cream No. I : Rp. 60.984 x 1 tube = Rp. 61.000  
R/ Ryvell syr 5 mg/5 ml No. I = Rp. 87.000 x 1 pcs = Rp. 87.000  
R/ Topicare ceramide No. I = Rp. 100.000 x 1 tube = Rp. 100.000  
R/ Trilac tab 2mg = Rp. 500 per tablet x 6 = Rp. 3.000  
Sporetik tab 50 mg = Rp. 1.300 per tablet x 3 = 3.900  
Saq lactis serbuk –  
Kertas puyer 12 lembar = Rp. 100 per kertas puyer x 12 = 1.200  
Total semua : 256.100

D. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Genolon Cream / Biru



**APOTEK BERKAH**

JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden  
Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707

Nama : Segara Aabama Baihaqi,An

TGL: 15 – 02 - 2024

**Genolon Cream**  
**Oleskan 3 kali sehari**

~~Serahkan dokter~~ / obat luar

Nama Obat /warna etiket : Ryvell syr 5 mg / 5ml / Putih



**APOTEK BERKAH**

JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden  
Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707

Nama : Segara Aabama Baihaqi,An

TGL: 15 – 02 – 2024

ED : 25 – 11 – 2025

NAMA OBAT: Ryvell syr 5 mg/5 ml

1 x SEHARI 1/2 ~~BH~~ / ML / SENDOK TAKAR / ~~MAKAN~~  
~~SEBELUM~~ / SAAT / SESUDAH MAKAN

Nama Obat /warna etiket : Topicare Ceramide / Biru



**APOTEK BERKAH**

JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden  
Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707


Nama/ID : Segara Aabama Baihaqi,An

TGL: 15 – 02 - 2024

**Topicare Ceramide**  
**Oleskan 3 – 4 kali sehari**

~~Serahkan dokter~~ / obat luar



		<p>Nama Obat /warna etiket : Putih</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p><b>APOTEK BERKAH</b>                  JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden                  Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707</p> </div> <p>Nama : Segara Aabama Baihaqi,An <span style="float: right;">TGL: 15 – 02 – 2024</span>  <span style="float: right;">ED : 25 – 11 – 2025</span>  <span style="float: right;">NAMA OBAT : Puyer</span></p> <p style="text-align: center;"><del>2 x SEHARI 1 Bungkus /ML/ SENDOK TAKAR /MAKAN</del>                  SEBELUM / SAAT/ SESUDAH MAKAN</p>		
<p style="text-align: center;"><i>E. Product knowledge</i></p>		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="1462 786 1541 1342"> <p>Nama Obat : Genolon cream                      Kandungan : 1mg gentamicin sulfat                      dan 0,25mg fluocinolon acetoni                      Dosis lazim : oleskan 3-4 kali sehari                      Kegunaan : dermatitis atopik, eksim,                      neurodermatitis, dermatitis seboroik,                      pruritus pada anus dan vulva serta pada                      dermatitis eksfoliatif.                      ESO potensial : fotosensitif, penekanan                      adrenal, hipertrikosis, hipopigmentasi,                      dermatitis kontak alergi, iritasi, gatal,                      kulit kering, rasa terbakar, dan                      malserasi                      KI : Hipersensitif, bayi                      premature.</p> </td> <td data-bbox="1541 786 2022 1342"> <p>Nama Obat : Ryvell syr 5 mg/5 ml                      Kandungan : cetirizine dihidroklorida 5                      mg/ 5 ml                      Dosis lazim : &gt; 12 th : 1 x sehari 2                      sendok takar. Anak 6-12 th : 2 sendok                      obat per hari. Anak 2-6 th : 1 sendok                      obat per hari.                      Kegunaan : pengobatan rhinitis alergi,                      alergi musiman, dan urtikaria idiopatis                      kronis                      ESO potensial : sakit kepala, pusing,                      mengantuk, gelisah, mulut kering dan                      gangguan saluran cerna.                      KI : Hiipersensitif terhadap                      cetrizine, wanita hamil dan menyusui,</p> </td> </tr> </table>	<p>Nama Obat : Genolon cream                      Kandungan : 1mg gentamicin sulfat                      dan 0,25mg fluocinolon acetoni                      Dosis lazim : oleskan 3-4 kali sehari                      Kegunaan : dermatitis atopik, eksim,                      neurodermatitis, dermatitis seboroik,                      pruritus pada anus dan vulva serta pada                      dermatitis eksfoliatif.                      ESO potensial : fotosensitif, penekanan                      adrenal, hipertrikosis, hipopigmentasi,                      dermatitis kontak alergi, iritasi, gatal,                      kulit kering, rasa terbakar, dan                      malserasi                      KI : Hipersensitif, bayi                      premature.</p>	<p>Nama Obat : Ryvell syr 5 mg/5 ml                      Kandungan : cetirizine dihidroklorida 5                      mg/ 5 ml                      Dosis lazim : &gt; 12 th : 1 x sehari 2                      sendok takar. Anak 6-12 th : 2 sendok                      obat per hari. Anak 2-6 th : 1 sendok                      obat per hari.                      Kegunaan : pengobatan rhinitis alergi,                      alergi musiman, dan urtikaria idiopatis                      kronis                      ESO potensial : sakit kepala, pusing,                      mengantuk, gelisah, mulut kering dan                      gangguan saluran cerna.                      KI : Hiipersensitif terhadap                      cetrizine, wanita hamil dan menyusui,</p>
<p>Nama Obat : Genolon cream                      Kandungan : 1mg gentamicin sulfat                      dan 0,25mg fluocinolon acetoni                      Dosis lazim : oleskan 3-4 kali sehari                      Kegunaan : dermatitis atopik, eksim,                      neurodermatitis, dermatitis seboroik,                      pruritus pada anus dan vulva serta pada                      dermatitis eksfoliatif.                      ESO potensial : fotosensitif, penekanan                      adrenal, hipertrikosis, hipopigmentasi,                      dermatitis kontak alergi, iritasi, gatal,                      kulit kering, rasa terbakar, dan                      malserasi                      KI : Hipersensitif, bayi                      premature.</p>	<p>Nama Obat : Ryvell syr 5 mg/5 ml                      Kandungan : cetirizine dihidroklorida 5                      mg/ 5 ml                      Dosis lazim : &gt; 12 th : 1 x sehari 2                      sendok takar. Anak 6-12 th : 2 sendok                      obat per hari. Anak 2-6 th : 1 sendok                      obat per hari.                      Kegunaan : pengobatan rhinitis alergi,                      alergi musiman, dan urtikaria idiopatis                      kronis                      ESO potensial : sakit kepala, pusing,                      mengantuk, gelisah, mulut kering dan                      gangguan saluran cerna.                      KI : Hiipersensitif terhadap                      cetrizine, wanita hamil dan menyusui,</p>			

		<p>PERHATIAN : hindari kontak dengan mata, penggunaan dengan kortikosteroid lain dapat sebabkan atrofi jaringan lunak dan subkutan, penggunaan &gt;7 hari dapat sebabkan superinfeksi, ibu hamil dan menyusui serta anak                  Cara penyimpanan : Di tempat yang sejuk, terhindar dari matahari secara langsung dan jauhkan dari jangkauan anak-anak</p>	<p>bayi dan anak – anak kurang dari 2 tahun, penyakit ginjal berat                  PERHATIAN : hipersensitif komponen obat dan wanita menyusui                  Cara penyimpanan : Di tempat yang sejuk, terhindar dari matahari secara langsung dan jauhkan dari jangkauan anak-anak</p>
		<p>Nama Obat : Topicare ceramide                  Kandungan : Salix alba bark extract, Aloe barbadensis leaf extract, Hyaluronic acid                  Dosis lazim : Oleskan 2 kali sehari atau sesuai kebutuhan                  Kegunaan : Menjaga kelembaban kulit dan menyejukkan kulit yang kemerahan akibat iritasi ringan                  ESO potensial : -                  KI : -                  PERHATIAN : hanya untuk pemakaian luar                  Cara penyimpanan : Simpan pada tempat sejuk, kering dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>	<p>Nama Obat : Trilac tab 2mg                  Kandungan : triamcinolon 4 mg                  Dosis lazim : intra artikular:intra bursitis:awal 2,5-5 mg untuk sendi-sendi kecil dan 5-15 mg untuk sendi-sendi besar                  Kegunaan : arthritus reumatoid, demam reumatik, asma bronkial, rinitis vasomotor, leukimia, limfosarkoma, penyakit hodgkin, fibrosis paru, bursitis akut                  ESO potensial : tukak peptik, rasa panas &amp; kemerahan pada wajah, berkeriat, akne, vertigo, sakit kepala, lemah otot                  KI : Pasien dengan infeksi jamur sistemik dan pasien yang hipersensitif terhadap obat atau komponennya.                  PERHATIAN : tbc aktif, laten atau yang sudah sembuh, psikosis akut</p>

			<p>Cara penyimpanan : Di tempat yang sejuk, terhindar dari matahari secara langsung dan jauhkan dari jangkauan anak-anak</p>
		<p>Nama Obat : Sporetik tab 50 mg Kandungan : cefixime 50 mg Dosis lazim : berat badan : 30kg 50-100mg 2 x sehari, berat bisa dinaikkan sampai 200mg 2 x sehari Kegunaan : infeksi saluran kemih yang tidak terkomplikasi seperti sistitis, sistouretritis, pielonefritis yang tidak terkomplikasi, infeksi saluran atas seperti otitis media, faringitis dan tonsilitis, infeksi saluran nafas bawah seperti bronkitis akut dan kronik KI : pasien dengan riwayat syok atau hipersensitif terhadap beberapa bahan dari obat ini. PERHATIAN : penderita dengan riwayat shock atau hipersensitif akibat beberapa bahan dari sediaan Cara penyimpanan : Di tempat yang sejuk, terhindar dari matahari secara langsung dan jauhkan dari jangkauan anak-anak</p>	


F. Tahap pembuatan

- 1) Ambil Genolon cream pada rak Genolon cream dibutuhkan sebanyak 1 tube sebanyak 1 tube.
- 2) Ambil Ryvell syr 5 mg/5 ml pada rak Ryvell syr 5 mg/5 ml sebanyak 1 pcs
- 3) Ambil Topicare ceramide pada rak Topicare ceramide dibutuhkan sebanyak 1 tube
- 4) Ambillah lalu masukkan Trilac tab 2mg sebanyak 6, sporetik tab 50 mg sebanyak 3 dan Saq lactis secukupnya ke dalam belnder ad homogen
- 5) Setelah homogen lalu puyer di ayak dan beri etiket warna putih
- 6) Staples etiket pada kemasan obat tablet
- 7) Masukkan kedalam kemasan plastik
- 8) Cek kembali kesesuaian obat yang di ambil dengan resep serta etiket yang tertempel pada kemasan obat



G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

		<p><b>P = Pasien A = Apoteker</b></p> <p>APT : atas nama anak segera (dengan wajah yang ramah)</p> <p>Pasien : iya mbak</p> <p>Apt : dengan anak segera?</p> <p>Pasien : bukan mbak saya kakaknya.</p> <p>Apt : apa benar adiknya dari klinik spesialis kulit kak?</p> <p>Pasien : iyh benar mbak</p> <p>Apt : baik kak, saya jelaskan dulu ya obatnya</p> <p>Pasien : iya mbak</p> <p>Apt : ini kak ada 2 macam obat. Obat yang pertama yaitu genolon cream jumlahnya ada 1 tube dioleskan sebanyak 3 kali sehari, yang kedua yaitu Ryvell syr 5 mg / 5 ml jumlahnya ada 1 pcs diminum satu kali sehari setengah sendok teh biji setelah makan, yang ketiga ini obat Topicare Ceramide sebanyak 1 tube dioleskan sebanyak 3 – 4 kali sehari. Yang terakhir obat ini dihabiskan ya kak diminum sebanyak 2 kali 1 puyer. (menjelaskan dengan menunjukkan obat – obatnya )</p> <p>Pasien : iya mbak</p> <p>Apt : apa ada yang ditanyakan ibu atau kurang jelas dari penjelasan saya ibu? (sambil senyum)</p> <p>Pasien : sudah jelas mbak, terimakasih</p> <p>Apt : baik pak, terimakasih kembali. Semoga lekas sembuh</p>
--	--	--



No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep		
9.*	<p>Jenis Resep : Resep obat inhaler                      Resep obat : Non racikan                      Jumlah obat dalam resep : 2 macam obat                      Pengulangan resep : -</p> <p><b>Resep Obat Inhaler</b></p> 	a. Skrinning Administrasi		
		Nama Pasien :	Ada	Solicha
		Umur pasien :	Tidak Ada	-
		Berat Badan :	Tidak Ada	-
		Nama Obat :	Ada	R/ Seretide discus R/ Codein MP 4 Cetirizin ½
		Kekuatan :	Ada	R/ Seretide discus R/ Codein MP 4 Cetirizin ½
		Bentuk sed. :	Ada	R/ Seretide discus R/ Codein MP 4 Cetirizin ½
		Jumlah obat :	Ada	R/ Seretide discus No. 1 R/ Codein MP 4 Cetirizin ½
		Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
		Aturan pakai :	Ada	R/ Seretide discus S 2 x 1 R/ Codein MP 4 Cetirizin ½ Mfla pulv da in cap No. X

		<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>S 1 x 1</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada</td> <td>17 - 5 - 21</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada</td> <td>Dr. Achmad Nurudin, Sp. P</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jl. KH. Kholil 88 Gresik</td> </tr> </table>			S 1 x 1	Tanggal penulisan resep :	Ada	17 - 5 - 21	Nama dokter :	Ada	Dr. Achmad Nurudin, Sp. P	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jl. KH. Kholil 88 Gresik		
		S 1 x 1																	
Tanggal penulisan resep :	Ada	17 - 5 - 21																	
Nama dokter :	Ada	Dr. Achmad Nurudin, Sp. P																	
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																	
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jl. KH. Kholil 88 Gresik																	
		<p>b. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div data-bbox="1023 646 1980 871" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Seretide Discus yang dibutuhkan sebanyak 1 pcs                  Codein 10 mg yang dibutuhkan sebanyak <math>10 \times 10 : 10 = 10</math>                  MP 4 yang dibutuhkan sebanyak <math>4 \times 10 : 4 = 10</math>                  Cetrizin <math>\frac{1}{2}</math> yang dibutuhkan sebanyak <math>\frac{1}{2} \times 10 = 5</math>                  Tupe capsule yang dibutuhkan sebanyak 10</p> </div>																	
		<p>c. Perhitungan biaya resep</p> <div data-bbox="1023 981 1888 1281" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Seretide Discus = Rp. 430.000                  Codein 10 mg = Rp. 1.500 per tablet x 10 = 15.000                  MP 4 = Rp. 650 per tablet x 10 = 6.500                  Cetrizin = Rp. 500 per tablet x 5 = 2.500                  Tube capsule = Rp. 150 per tube capsule x 10 = Rp. 1.500                    Total : 455.500</p> </div>																	
		<p>d. ETIKET                  Nama Obat /warna etiket : Seretide Discus /Putih</p>																	

		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p><b>APOTEK BERKAH</b>                  JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden                  Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707</p> </div>
	<p>NAMA : NY. Solicha</p>	<p>TGL: 12 – 05 – 2024                  ED: 15 – 12 – 2028                  NAMA OBAT: Seretide Discus</p>
	<p>2 x SEHARI 1 HIRUP / <del>ML</del> / <del>SENDOK TAKAR</del> / <del>MAKAN</del>  <del>SEBELUM</del> / <del>SAAT</del> / <del>SESUDAH MAKAN</del></p>	
	<p>Nama Obat /warna etiket : Putih</p>	
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p><b>APOTEK BERKAH</b>                  JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden                  Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707</p> </div>
	<p>Nama : Ny. Solicha</p>	<p>TGL: 12 – 02 – 2021                  ED : 15 – 11 – 2028                  NAMA OBAT: Kapsul</p>
<p>1 x SEHARI 1 KAPS / <del>ML</del> / <del>SENDOK TAKAR</del> / <del>MAKAN</del>  <del>SEBELUM</del> / <del>SAAT</del> / <del>SESUDAH MAKAN</del></p>		
<p>e. <i>Product knowledge</i></p>		
	<p>Nama Obat : Seretide Discus                  Kandungan : salmeterol sinapoat 50 mg, flutikason propionat 250 mcg</p>	<p>Nama Obat : Codein 10 mg                  Kandungan : Codein 10 mg</p>

	<p>Dosis lazim : Penggunaan obat ini harus dengan resep dokter. &gt; 2 tahun, sehari 2 x 1 hirup.                  Kegunaan : untuk terapi rutin penyakit penyumbatan saluran nafas, termasuk asma                  ESO potensial : sakit kepala, jamur pada mulut, iritasi tenggorokan, tremor/gemetar, jantung berdebar, gangguan suara (serak), kram otot                  KI : Penderita yang hipersensitif terhadap komponen obat                  PERHATIAN : Harus dengan resep dokter                  Cara penyimpanan : simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>	<p>Dosis lazim : Dewasa 12 – 30 mg sebanyak 3 – 4 kali/hari                  ESO potensial : Mual, muntah, kesulitan buang air besar, mulut kering dan sakit kepala                  KI : Pasien dengan keadaan koma, pasien yang mengkonsumsi alkohol, perut kembung, gagal hati                  PERHATIAN : pasien yang memberikan tanda atau gejala yang mengarah pada kerusakan hati harus melakukan tes fungsi hati.                  Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah 30°C, terlindung dari cahaya</p>	
	<p>Nama Obat : MP 4                  Kandungan : Methylprednisolone 4 mg                  Dosis lazim : Apabila dalam sehari Anda dianjurkan mengonsumsi 12mg dalam 3 kali konsumsi, maka jenis obat tablet ini cocok untuk Anda minum sesuai anjuran dosis untuk 1 tablet 3 kali sehari.                  Kegunaan : meredakan peradangan                  ESO potensial : mual atau muntah                  KI : pada pasien dengan gagal jantung, hipertensi, dan insufisiensi ginjal</p>	<p>Nama Obat : Cetrizin                  Kandungan : Cetrizin HCl 10 mg                  Dosis lazim : 1 kaplet (10mg) 1 kali sehari. Keamanan penggunaan pada anak - anak usia &lt;2 tahun belum ditetapkan                  Kegunaan : Untuk pengobatan rinitis perennial, rinitis alergi, urtikaria idiopatik kronis.                  ESO potensial : Perasaan mengantuk, pusing – pusing, sakit kepala, gelisah, mulut kering, dan gangguan saluran pencernaan.</p>	

		<p>PERHATIAN : harus dengan resep dokter Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari</p>	<p>KI : Hipersensitivitas terhadap cetirizine, bu menyusui PERHATIAN : Wajib Dengan Resep Dokter Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah 30C</p>
		<p>f. Tahap pembuatan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ambil obat seretide discus pada rak obat seretide discus sebanyak 1 pcs</li><li>2. Ambil obat codein 10mg pada rak obat codein 10 mg sebanyak 10 tablet</li><li>3. Ambil MP 4 sebanyak 10 tablet</li><li>4. Ambil obat cetirizin pada rak obat cetirizin sebanyak 5 tablet</li><li>5. Obat codein, MP 4, Obat Cetirizin dimasukkan kedalam blender ad homogen dan setelah diblender lalu di ayak</li><li>6. Dibagi di tube capsul sebanyak 10 tube</li><li>7. Capsule sudah jadi dan dimasukkan di plastik klip dan diberi etiket putih</li><li>8. Ditempelkan etiket pada kemasan obat seretide</li><li>9. Masukkan kedalam kemasan plastik</li><li>10. Cek kembali kesesuaian obat yang di ambil dengan resep serta etiket yang tertempel pada kemasan obat</li></ol>	



g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

Apt : Atas nama ibu solicha

Pasien : iya mbak

Apt : dengan ibu solicha tanggal lahirnya berapa bu ?

Pasien : iya mba, tanggal lahir saya 10 – 9 – 1977

Apt : baik bu, saya jelaskan dulu ya bu obatnya

Pasien : iya mbak


Apt : ini bu ada 2 macam obatnya ya. Obat yang pertama Seretide Diskus digunakan 2 x 1 hirup, obat yang ke dua ini kapsul ya bu diminum 1 x sehari setelah makan

Pasien : iya mbak

Apt : apa ada yang ditanyakan ibu atau kurang jelas dari penjelasan saya ibu?

Pasien : sudah jelas mbak, terimakasih

Apt : baik bu, terimakasih kembali. Semoga lekas sembuh

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
10.*	<p>Jenis Resep : resep asli                      Resep obat : non racikan                      Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (&gt;/Tidak                      Pengulangan resep :</p> <p><b>Resep obat kb</b></p> 	<p>a. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1039 268 2000 847"> <tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada</td><td>Elen herawaty</td></tr> <tr><td>Umur pasien :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Berat Badan :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada</td><td>Diane tab</td></tr> <tr><td>Kekuatan :</td><td>Tidak ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada</td><td>Diane tab</td></tr> <tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada</td><td>Diane tab No 1</td></tr> <tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada</td><td>Diane tab No 1 S 1 x 1</td></tr> <tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada</td><td>27-01-2024</td></tr> <tr><td>Nama dokter :</td><td>Tidak ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Surat ijin :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada</td><td>Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jl. KH. Kholil 88 Gresik</td></tr> </table> <p>b. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div data-bbox="1039 951 2000 1023" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                 Diane yang dibutuhkan 1 box             </div> <p>c. Perhitungan biaya resep</p> <div data-bbox="965 1129 2018 1203" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                 Diane 1 box Rp.210.000             </div> <p>d. ETIKET                  Nama Obat /warna etiket :Diane/putih</p>	Nama Pasien :	Ada	Elen herawaty	Umur pasien :	Tidak Ada	-	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Diane tab	Kekuatan :	Tidak ada	-	Bentuk sed. :	Ada	Diane tab	Jumlah obat :	Ada	Diane tab No 1	Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada	Diane tab No 1 S 1 x 1	Tanggal penulisan resep :	Ada	27-01-2024	Nama dokter :	Tidak ada	-	Surat ijin :	Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada	Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jl. KH. Kholil 88 Gresik
Nama Pasien :	Ada	Elen herawaty																																							
Umur pasien :	Tidak Ada	-																																							
Berat Badan :	Tidak Ada	-																																							
Nama Obat :	Ada	Diane tab																																							
Kekuatan :	Tidak ada	-																																							
Bentuk sed. :	Ada	Diane tab																																							
Jumlah obat :	Ada	Diane tab No 1																																							
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada	Diane tab No 1 S 1 x 1																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada	27-01-2024																																							
Nama dokter :	Tidak ada	-																																							
Surat ijin :	Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada	Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jl. KH. Kholil 88 Gresik																																							



### APOTEK BERKAH

JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel.  
Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp  
081324097707

NAMA : Elen Herawaty

TGL: 27-01-2024

ED: 25 / 02 / 2025

NAMA OBAT: Diane

1 x SEHARI 1 TAB / ML / SENDOK TAKAR / MAKAN  
SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN

#### e. *Product knowledge*

Nama Obat : Diane tab

Kandungan : Siproteron Asetat dan Etilil  
Estradiol

Dosis lazim : PENGGUNAAN OBAT INI  
HARUS SESUAI DENGAN PETUNJUK  
DOKTER. 1 x sehari 1 tablet dimulai pada  
hari ke-1 siklus haid selama 21 hari diikuti  
masa istirahat selama 7 hari.

Kegunaan : INFORMASI OBAT INI  
HANYA UNTUK KALANGAN MEDIS.

Kontrasepsi oral, hirsutism (pertumbuhan  
rambut berlebih pada wanita di area yang  
biasanya tumbuh rambut pada pria), jerawat  
ESO potensial : Perlunakan payudara, nyeri  
pada payudara, sakit kepala, perasaan  
depresi, mual, nyeri perut, perubahan BB,  
dismenorea

		<p>KI : Hamil, laktasi, gangguan fungsi hati berat, riwayat ikterus idiopatik atau pruritus selama hamil, sindroma Dubin-Johnson, sindrom Rotor, tumor hati, tromboembolik, anemia sel sabit, dalam pengobatan kanker payudara atau endometrium, DM berat, gangguan met</p> <p>PERHATIAN : HARUS DENGAN RESEP DOKTER. Hentikan penggunaan jika terjadi migren, sakit kepala, gangguan penglihatan atau kehilangan pendengaran. Tromboflebitis atau tromboemboli, rasa nyeri dan sesak dada, 6 minggu sebelum operasi besar, jaundice, hepatitis, gatal seluruh badan, epilepsi, penin, gangguan ginjal, obesitas. Estrogen atau progestogen tidak boleh dikonsumsi selama pengobatan dengan DIANE-35.</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan pada suhu antara 15-30 derajat Celcius, dan terhindar dari cahaya.</p>	
		<p>f. Tahap pembuatan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Ambil obat Diane tab pada rak obat sebanyak 1 box yang berisi 21 tab</li><li>2 Tempelkan etiket pada kemasan obat</li><li>3 Masukkan kedalam kemasan plastik</li><li>4 Cek kembali kesesuaian obat yang di ambil dengan resep serta etiket yang tertempel pada kemasan obat</li></ol>	

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

**P = Pasien A = Apoteker**

A= Atas nama ibu elen herawaty dari poli kandungan ya bu?

P = iya benar mbak

A = baik bu mohon maaf sebelumnya untuk obat diane diminum 1 kali sehari sesudah makan, apabila terjadi nyeri dibagian payudara hal tersebut itu tidak apa-apa ya bu karena efek samping dari obat tersebut.


P = baik mbak

A= Apakah ada yang ditanyakan bu?

P = tidak ada mbak

A = Baik jika tidak ada yang ditanyakan



No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
11.*	<p>Jenis Resep : Resep obat insulin                      Resep obat : Racikan                      Jumlah obat dalam resep :                      Pengulangan resep :</p> <p><b>Resep obat insulin</b></p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1099 308 1368 344">Nama Pasien :</td> <td data-bbox="1368 308 1592 344">Ada</td> <td data-bbox="1592 308 2063 344">Yoyok anwari</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1099 344 1368 381">Umur pasien :</td> <td data-bbox="1368 344 1592 381">Ada</td> <td data-bbox="1592 344 2063 381">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1099 381 1368 418">Berat Badan :</td> <td data-bbox="1368 381 1592 418">Ada</td> <td data-bbox="1592 381 2063 418">65 kg</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1099 418 1368 571">Nama Obat :</td> <td data-bbox="1368 418 1592 571">Ada</td> <td data-bbox="1592 418 2063 571">R/ Miniaspi R/ Sansulin rapid Novofine Alkohol Suab</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1099 571 1368 608">Kekuatan :</td> <td data-bbox="1368 571 1592 608">Tidak Ada</td> <td data-bbox="1592 571 2063 608">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1099 608 1368 761">Bentuk sediaan :</td> <td data-bbox="1368 608 1592 761">Ada</td> <td data-bbox="1592 608 2063 761">R/ Miniaspi tablet R/ Sansulin rapid Novofine Alkohol Swab</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1099 761 1368 914">Jumlah obat :</td> <td data-bbox="1368 761 1592 914">Ada</td> <td data-bbox="1592 761 2063 914">R/ Miniaspi No. VI R/ Sansulin rapid No. I Novofine No. II Alkohol Suab No. IV</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1099 914 1368 951">Duplikasi terapi :</td> <td data-bbox="1368 914 1592 951">Tidak Ada</td> <td data-bbox="1592 914 2063 951">Tidak ada</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1099 951 1368 1169">Aturan pakai :</td> <td data-bbox="1368 951 1592 1169">Ada</td> <td data-bbox="1592 951 2063 1169">R/ Miniaspi No. VI S 1 dd 1 R/ Sansulin rapid No. I Novofine No. II Alkohol Suab No. IV</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1099 1169 1368 1246">Tanggal penulisan resep :</td> <td data-bbox="1368 1169 1592 1246">Ada</td> <td data-bbox="1592 1169 2063 1246">5 – 02 – 2024</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1099 1246 1368 1283">Nama dokter :</td> <td data-bbox="1368 1246 1592 1283">Ada</td> <td data-bbox="1592 1246 2063 1283">Dr. Firman Prayudi, Sp. N</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1099 1283 1368 1319">Surat ijin :</td> <td data-bbox="1368 1283 1592 1319">Tidak Ada</td> <td data-bbox="1592 1283 2063 1319">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1099 1319 1368 1396">Alamat dr. :</td> <td data-bbox="1368 1319 1592 1396">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1592 1319 2063 1396">Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Yoyok anwari	Umur pasien :	Ada	-	Berat Badan :	Ada	65 kg	Nama Obat :	Ada	R/ Miniaspi R/ Sansulin rapid Novofine Alkohol Suab	Kekuatan :	Tidak Ada	-	Bentuk sediaan :	Ada	R/ Miniaspi tablet R/ Sansulin rapid Novofine Alkohol Swab	Jumlah obat :	Ada	R/ Miniaspi No. VI R/ Sansulin rapid No. I Novofine No. II Alkohol Suab No. IV	Duplikasi terapi :	Tidak Ada	Tidak ada	Aturan pakai :	Ada	R/ Miniaspi No. VI S 1 dd 1 R/ Sansulin rapid No. I Novofine No. II Alkohol Suab No. IV	Tanggal penulisan resep :	Ada	5 – 02 – 2024	Nama dokter :	Ada	Dr. Firman Prayudi, Sp. N	Surat ijin :	Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik
Nama Pasien :	Ada	Yoyok anwari																																							
Umur pasien :	Ada	-																																							
Berat Badan :	Ada	65 kg																																							
Nama Obat :	Ada	R/ Miniaspi R/ Sansulin rapid Novofine Alkohol Suab																																							
Kekuatan :	Tidak Ada	-																																							
Bentuk sediaan :	Ada	R/ Miniaspi tablet R/ Sansulin rapid Novofine Alkohol Swab																																							
Jumlah obat :	Ada	R/ Miniaspi No. VI R/ Sansulin rapid No. I Novofine No. II Alkohol Suab No. IV																																							
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	Tidak ada																																							
Aturan pakai :	Ada	R/ Miniaspi No. VI S 1 dd 1 R/ Sansulin rapid No. I Novofine No. II Alkohol Suab No. IV																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada	5 – 02 – 2024																																							
Nama dokter :	Ada	Dr. Firman Prayudi, Sp. N																																							
Surat ijin :	Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik																																							

Jl. KH. Kholil 88 Gresik

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Miniaspi dibutuhkan sebanyak 6 tablet

Sansulin rapid dibutuhkan sebanyak 1 pen

Novofain dibutuhkan sebanyak 2 pcs

Alkohol swab sebanyak 4 pcs

C. Perhitungan biaya resep




Miniaspi No. VI = Rp. 600 per tablet x 6 tablet = Rp. 3.600

Sansulin Rapid No. I = Rp. 100.000 perpen x 1 pen = Rp. 100.000

Novofine No. II = Rp. 2.500 pcs x 2 pcs = Rp. 5.000

Alkohol swab No. IV = Rp. 250 per alkohol swab x 4 = Rp. 1000

Total semua : Rp. 109.600

	<b>D. ETIKET</b> Nama Obat /warna etiket : Miniaspi / Putih
	 <b>APOTEK BERKAH</b> JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707
	Nama : Yoyok Anwari,TN TGL: 5 – 02 – 2024 ED: 18 – 05 - 2027 NAMA OBAT: Miniaspi
	<del>1 x SEHARI 1 TAB /ML /SENDOK TAKAR /MAKAN SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN</del>
	Nama Obat /warna etiket : Griceofulvin / Putih
	 <b>APOTEK BERKAH</b> JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707
	Nama : Yoyok Anwari, TN TGL: 15 – 02 – 2024 ED: 20 – 05 - 2028 NAMA OBAT: Sansulin Rapid
	PAGI - UNIT / SIANG - UNIT/MALAM 10 UNIT DISIMPAN DILEMRI ES

		<p>E. <i>Product knowledge</i></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1084 233 1563 1369"> <p>Nama Obat : MINIASPI                      Kandungan : acetylsalicylic acid (aspirin atau asetosal) 80 mg.                      Dosis lazim : 80 mg -160 mg / hari                      Kegunaan : Sebagai pencegahan pada proses pembekuan pembuluh darah seperti pasien infark miokard, pasien angina yang stabil, atau pencegahan serangan iskemik serebral yang bersifat sementara                      ESO potensial : Iritasi lambung, mual, muntah. Pemakaian lama dapat terjadi pendarahan lambung, tukak lambung                      KI : Penderita alergi (termasuk asma), tukak lambung, pernah atau sering mengalami pendarahan di bawah kulit (konsultasikan dengan dokter)                      PERHATIAN : hati-hati penggunaan pada pasien gangguan hati, hentikan penggunaan segera bila terjadi tinitus, gangguan pendengaran atau pusing, konsultasikan ke dokter bila terjadi gangguan lambung yang persisten, asupan alkohol dapat meningkatkan pendarahan lambung                      Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah 30°C, terlindung dari</p> </td> <td data-bbox="1576 233 2056 1369"> <p>Nama Obat : Sansulin                      Kandungan : Tiap mL mengandung insulin aspart 100 U                      Dosis lazim : ATURAN PAKAI HARUS SESUAI DENGAN PETUNJUK DOKTER. Dosis obat ini harus berdasarkan rekomendasi dokter. Dosis umum: 0.4-0.5 Unit/kg BB/hari Dosis pemeliharaan: 0.4-1 Unit/kg BB/hari dalam dosis terbagi                      Pasien dengan gangguan ginjal dan hati diperlukan penyesuaian dosis sesuai anjuran dokter.                      Kegunaan : Untuk terapi diabetes mellitus tipe 1 dan 2 dengan meningkatkan kontrol glikemik pada orang dewasa dan anak-anak.                      ESO potensial : Hipoglikemia, Gangguan penglihatan sementara, Lipodistrofi, Reaksi alergi, Pembentukan antibody insulin                      KI : Sansulin Log-G tidak diperuntukan pada pasien yang hipersensitif terhadap insulin Glargine atau zat tambahan yang ada di dalam produk                      PERHATIAN : Pasien dengan penyakit penyerta (misalnya infeksi atau kondisi demam), adrenal, hipofisis, atau penyakit kelenjar tiroid. Pasien dengan riwayat gangguan ginjal dan hati. Wanita hamil dan menyusui.</p> </td> </tr> </table>	<p>Nama Obat : MINIASPI                      Kandungan : acetylsalicylic acid (aspirin atau asetosal) 80 mg.                      Dosis lazim : 80 mg -160 mg / hari                      Kegunaan : Sebagai pencegahan pada proses pembekuan pembuluh darah seperti pasien infark miokard, pasien angina yang stabil, atau pencegahan serangan iskemik serebral yang bersifat sementara                      ESO potensial : Iritasi lambung, mual, muntah. Pemakaian lama dapat terjadi pendarahan lambung, tukak lambung                      KI : Penderita alergi (termasuk asma), tukak lambung, pernah atau sering mengalami pendarahan di bawah kulit (konsultasikan dengan dokter)                      PERHATIAN : hati-hati penggunaan pada pasien gangguan hati, hentikan penggunaan segera bila terjadi tinitus, gangguan pendengaran atau pusing, konsultasikan ke dokter bila terjadi gangguan lambung yang persisten, asupan alkohol dapat meningkatkan pendarahan lambung                      Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah 30°C, terlindung dari</p>	<p>Nama Obat : Sansulin                      Kandungan : Tiap mL mengandung insulin aspart 100 U                      Dosis lazim : ATURAN PAKAI HARUS SESUAI DENGAN PETUNJUK DOKTER. Dosis obat ini harus berdasarkan rekomendasi dokter. Dosis umum: 0.4-0.5 Unit/kg BB/hari Dosis pemeliharaan: 0.4-1 Unit/kg BB/hari dalam dosis terbagi                      Pasien dengan gangguan ginjal dan hati diperlukan penyesuaian dosis sesuai anjuran dokter.                      Kegunaan : Untuk terapi diabetes mellitus tipe 1 dan 2 dengan meningkatkan kontrol glikemik pada orang dewasa dan anak-anak.                      ESO potensial : Hipoglikemia, Gangguan penglihatan sementara, Lipodistrofi, Reaksi alergi, Pembentukan antibody insulin                      KI : Sansulin Log-G tidak diperuntukan pada pasien yang hipersensitif terhadap insulin Glargine atau zat tambahan yang ada di dalam produk                      PERHATIAN : Pasien dengan penyakit penyerta (misalnya infeksi atau kondisi demam), adrenal, hipofisis, atau penyakit kelenjar tiroid. Pasien dengan riwayat gangguan ginjal dan hati. Wanita hamil dan menyusui.</p>
<p>Nama Obat : MINIASPI                      Kandungan : acetylsalicylic acid (aspirin atau asetosal) 80 mg.                      Dosis lazim : 80 mg -160 mg / hari                      Kegunaan : Sebagai pencegahan pada proses pembekuan pembuluh darah seperti pasien infark miokard, pasien angina yang stabil, atau pencegahan serangan iskemik serebral yang bersifat sementara                      ESO potensial : Iritasi lambung, mual, muntah. Pemakaian lama dapat terjadi pendarahan lambung, tukak lambung                      KI : Penderita alergi (termasuk asma), tukak lambung, pernah atau sering mengalami pendarahan di bawah kulit (konsultasikan dengan dokter)                      PERHATIAN : hati-hati penggunaan pada pasien gangguan hati, hentikan penggunaan segera bila terjadi tinitus, gangguan pendengaran atau pusing, konsultasikan ke dokter bila terjadi gangguan lambung yang persisten, asupan alkohol dapat meningkatkan pendarahan lambung                      Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah 30°C, terlindung dari</p>	<p>Nama Obat : Sansulin                      Kandungan : Tiap mL mengandung insulin aspart 100 U                      Dosis lazim : ATURAN PAKAI HARUS SESUAI DENGAN PETUNJUK DOKTER. Dosis obat ini harus berdasarkan rekomendasi dokter. Dosis umum: 0.4-0.5 Unit/kg BB/hari Dosis pemeliharaan: 0.4-1 Unit/kg BB/hari dalam dosis terbagi                      Pasien dengan gangguan ginjal dan hati diperlukan penyesuaian dosis sesuai anjuran dokter.                      Kegunaan : Untuk terapi diabetes mellitus tipe 1 dan 2 dengan meningkatkan kontrol glikemik pada orang dewasa dan anak-anak.                      ESO potensial : Hipoglikemia, Gangguan penglihatan sementara, Lipodistrofi, Reaksi alergi, Pembentukan antibody insulin                      KI : Sansulin Log-G tidak diperuntukan pada pasien yang hipersensitif terhadap insulin Glargine atau zat tambahan yang ada di dalam produk                      PERHATIAN : Pasien dengan penyakit penyerta (misalnya infeksi atau kondisi demam), adrenal, hipofisis, atau penyakit kelenjar tiroid. Pasien dengan riwayat gangguan ginjal dan hati. Wanita hamil dan menyusui.</p>			

cahaya. Jauhkan obat dari jangkauan anak – anak	Cara penyimpanan : Simpan pada suhu antara 2° dan 8°C. Jangan dibekukan. Terlindung dari cahaya.
---	--

f. Tahap pembuatan

- 1) Ambil obat minispi pada rak obat minispi sebanyak 6 tablet
- 2) Ambil sansulin rapid dilemari pendingin sebanyak 1 pen
- 3) Ambil alkohol swab sebanyak 4 pcs dan novofain sebanyak 2 dilemari alat kesehatan.
- 4) Staples etiket pada kemasan obat minispi dan sansulin rapid menggunakan etiket berwarna putih
- 5) Masukkan kedalam kemasan plastik
- 6) Cek kembali kesesuaian obat yang di ambil dengan resep serta etiket yang terempel pada kemasan obat



g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

APT : atas nama Yoyok Anwari

Pasien : iya mbak

Apt : dengan Yoyok Anwari tanggal lahirnya berapa pak ?

Pasien : iya mba, tanggal lahir saya 15 – 10 – 1956

Apt : baik pak, saya jelaskan dulu ya pak obatnya

Pasien : iya mbak


Apt : ini bapak diresepkan untuk obat miniapsinya 1 x 1 ya pak diminum saat makan, terus ini untuk sansulin rapidnya ini seperti bolpoin ya pak, ini untuk jarumnya ya pak nanti dimasukkan ke alat sansulinnya. Dan ini alcohol swabnya untuk diolesi ke bagian yang akan bapak suntik.

Pasien : iya mbak

Apt : apa ada yang ditanyakan bapak atau kurang jelas tadi penjelasan saya bapak?

Pasien : sudah jelas mbak, terimakasih

Apt : baik pak, terimakasih kembali. Semoga lekas sembuh

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																													
12.*	<p>Jenis Resep : Resep kudis / kurap                      Resep obat : Racikan dan non racikan                      Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi                      Pengulangan resep :</p> <p><b>Resep kudis / kurap</b></p> 	<p>a. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1025 308 1984 1353"> <tr> <td data-bbox="1025 308 1290 344">Nama Pasien :</td> <td data-bbox="1290 308 1518 344">Ada</td> <td data-bbox="1518 308 1984 344">Agus Irwanto</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1025 344 1290 381">Umur pasien :</td> <td data-bbox="1290 344 1518 381">Ada</td> <td data-bbox="1518 344 1984 381">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1025 381 1290 418">Berat Badan :</td> <td data-bbox="1290 381 1518 418">Ada</td> <td data-bbox="1518 381 1984 418">65 kg</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1025 418 1290 608">Nama Obat :</td> <td data-bbox="1290 418 1518 608">Ada</td> <td data-bbox="1518 418 1984 608">R/ Destavel R/ Griceofulvin R/ Ketomed cream Termisil cream Fusipar cream</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1025 608 1290 794">Kekuatan :</td> <td data-bbox="1290 608 1518 794">Ada</td> <td data-bbox="1518 608 1984 794">R/ Destavel tab 5 mg R/ Griceofulvin tab 500 mg R/ Ketomed cream 2% Termisil cream 1% Fusipar cream 2%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1025 794 1290 981">Bentuk sediaan :</td> <td data-bbox="1290 794 1518 981">Ada</td> <td data-bbox="1518 794 1984 981">R/ Destavel tablet R/ Griceofulvin tablet R/ Ketomed cream Termisil cream Fusipar cream</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1025 981 1290 1241">Jumlah obat :</td> <td data-bbox="1290 981 1518 1241">Ada</td> <td data-bbox="1518 981 1984 1241">R/ Destavel tab 5 mg No. VII R/ Griceofulvin tab 500 mg No. XXI R/ Ketomed cream 2% (1) Termisil cream 1% (1) Fusipar cream 2% (1) Mfla cream da in pot No. I</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1025 1241 1290 1278">Duplikasi terapi :</td> <td data-bbox="1290 1241 1518 1278">Tidak Ada</td> <td data-bbox="1518 1241 1984 1278">Tidak ada</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1025 1278 1290 1353">Aturan pakai :</td> <td data-bbox="1290 1278 1518 1353">Ada</td> <td data-bbox="1518 1278 1984 1353">R/ Destavel tab 5 mg No. VII S 1 dd tab I po pc</td> </tr> </table>			Nama Pasien :	Ada	Agus Irwanto	Umur pasien :	Ada	-	Berat Badan :	Ada	65 kg	Nama Obat :	Ada	R/ Destavel R/ Griceofulvin R/ Ketomed cream Termisil cream Fusipar cream	Kekuatan :	Ada	R/ Destavel tab 5 mg R/ Griceofulvin tab 500 mg R/ Ketomed cream 2% Termisil cream 1% Fusipar cream 2%	Bentuk sediaan :	Ada	R/ Destavel tablet R/ Griceofulvin tablet R/ Ketomed cream Termisil cream Fusipar cream	Jumlah obat :	Ada	R/ Destavel tab 5 mg No. VII R/ Griceofulvin tab 500 mg No. XXI R/ Ketomed cream 2% (1) Termisil cream 1% (1) Fusipar cream 2% (1) Mfla cream da in pot No. I	Duplikasi terapi :	Tidak Ada	Tidak ada	Aturan pakai :	Ada	R/ Destavel tab 5 mg No. VII S 1 dd tab I po pc
Nama Pasien :	Ada	Agus Irwanto																													
Umur pasien :	Ada	-																													
Berat Badan :	Ada	65 kg																													
Nama Obat :	Ada	R/ Destavel R/ Griceofulvin R/ Ketomed cream Termisil cream Fusipar cream																													
Kekuatan :	Ada	R/ Destavel tab 5 mg R/ Griceofulvin tab 500 mg R/ Ketomed cream 2% Termisil cream 1% Fusipar cream 2%																													
Bentuk sediaan :	Ada	R/ Destavel tablet R/ Griceofulvin tablet R/ Ketomed cream Termisil cream Fusipar cream																													
Jumlah obat :	Ada	R/ Destavel tab 5 mg No. VII R/ Griceofulvin tab 500 mg No. XXI R/ Ketomed cream 2% (1) Termisil cream 1% (1) Fusipar cream 2% (1) Mfla cream da in pot No. I																													
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	Tidak ada																													
Aturan pakai :	Ada	R/ Destavel tab 5 mg No. VII S 1 dd tab I po pc																													

				<p>R/ Griceofuluvin tab 500 mg No.XXI S 1 dd tab 1 ½ po pc R/ Ketomed cream 2% (1) Termisil cream 1% (1) Fusipar cream 2% (1) Mfla cream da in pot No.I S ue 3 x sehari <u>Oleskan area ruam gatal,</u> <u>setelah pelembab</u></p>
		Tanggal penulisan resep :	Ada	15 – 02 – 2024
		Nama dokter :	Ada	De. Ryski Meilia Novarina, Sp.KK
		Surat ijin :	Tidak Ada	-
		Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jl. KH. Kholil 88 Gresik
		b. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi		
		<p>Destavel tab 5 mg dibutuhkan sebanyak VII Griceofuluvin tab 500 mg dibutuhkan sebanyak XXI Ketomed cream 2% dibutuhkan sebanyak 1 tube Termisil cream 1% dibutuhkan sebanyak 1 tube Fusipar cream 2% (1) dibutuhkan sebanyak 1 tube Dibutuhkan 1 pot untuk racikan cream</p>		

c. Perhitungan biaya resep

R/ Destavel tab 5 mg No. VII = Rp. 10.000 per tablet x 7 tablet = Rp. 70.000

R/ Griceofuluvin tab 500 mg No.XXI = Rp. 2.500 per tablet x 21 tablet = 52.500

R/ Ketomed cream 2% (1) : 65.000

Termisil cream 1% (1) : 68.000

Fusipar cream 2% (1) : 60.000

Pot salep : 5.000

Total semua : 315.500

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Destavel / Putih



APOTEK BERKAH

JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden

Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707

Nama : Agus Irwanto, Tn.

TGL: 15 – 02 – 2024

ED: 18 – 05 - 2027

NAMA OBAT: Destavel tab 5 mg

1 x SEHARI 1 TAB / ~~ML~~ / ~~SENDOK TAKAR~~ / ~~MAKAN~~  
~~SEBELUM~~ / ~~SAAT~~ / ~~SESUDAH MAKAN~~

Nama Obat / warna etiket :Griceofulfin / Putih



**APOTEK BERKAH**

JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden  
Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707

Nama : Agus Irwanto, Tn.

TGL: 15 – 02 – 2024

ED: 20 – 05 - 2028

NAMA OBAT: Griceofuluvin tab 500 mg

1 x SEHARI 1 ½ TAB /~~ML~~ / ~~SENDOK TAKAR~~ / ~~MAKAN~~  
~~SEBELUM~~ / ~~SAAT~~ / ~~SESUDAH MAKAN~~

Nama Obat / warna etiket : Biru



**APOTEK BERKAH**

JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden  
Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707

Nama : Agus Irwanto, Tn.

TGL: 15 – 02 - 2024

Oleskan 3 kali sehari

~~Serahkan dokter~~ / obat luar

e. *Product knowledge*



		<p>Nama Obat : Destavel                  Kandungan : desloratadine 5mg                  Dosis lazim : dewasa &amp; anak &gt;12th: 1 kali sehari 5mg. anak 6-11th: 1 kali sehari 2,5mg. anak 1-5th: 1 kali sehari 1,25mg.                  Kegunaan : meringankan gejala nasal dan non nasal rinitis alergi (musiman dan parenial). terapi simptomatik pruritus, mengurangi jumlah dan besarnya lesi pada pasien urtikaria idiopatik.                  ESO potensial : faringitis, mulut kering, mialgia, somnolen, dismenore                  KI : hipersensitivitas                  PERHATIAN : HARUS DENGAN RESEP DOKTER. Hati – hati penggunaan pada wanita hamil, menyusui, penderita gangguan hati dan ginjal.                  Cara penyimpanan : Simpan pada suhu 15-30 derajat Celcius</p>	<p>Nama Obat : Griceofulvin                  Kandungan : Griceofulvin 500 mg                  Dosis lazim : dewasa = dosis tunggal 500 mg per hari, anak = 10 mg/kgBB dalam dosis tunggal atau terbagi                  Kegunaan : infeksi jamur pada kulit, kulit kepala dan kuku apabila pengobatan secara topikal gagal                  ESO potensial : ruam kulit, urtikari, edema, angioneurotik, nekrosis epidermal, ulut kering, mual, muntah, sakit kepala, rasa lelah, pusing, diare                  KI :                  PERHATIAN : HARUS DENGAN RESEP DOKTER.                  Penggunaan jangka panjang, reaksi sensitivitas silang dengan penisilin, reaksi fotosensitivitas.                  Cara penyimpanan : Simpan pada suhu kamar jauh dari cahaya dan kelembapan</p>	
		<p>Nama Obat : Ketomed cream                  Kandungan : ketoconazol 2%                  Dosis lazim : dewasa = oleskan 1 sampai 2 kali per hari pada tempat yang infeksi. Durasi Pengobatan                  Kegunaan : infeksi dermatofita pada kulit atau kuku tangan (tidak pada kuku kaki), kandidiasis mukokutan kronis yang terjadi</p>	<p>Nama Obat : Termisil cream                  Kandungan : terbinafine 1%                  Dosis lazim : oleskan krim 1 -2 x sehari. PENGGUNAAN OBAT INI HARUS SESUAI DENGAN PETUNJUK OBAT                  Kegunaan : Infeksi jamur pada kulit.</p>	

		<p>responsif terhadap nistatin dan obat – obat lain, infeksi mikosis sistemik (kandidiasis, paraksidiodomikosis, cocci dioidomycosis, hiptoplasmosis)                  ESO potensial : iritasi, gatal gatal &amp; rasa seperti terbakar                  KI : hipersensitivitas.                  Gangguan hati atau kronis. Hamil (dengan sindrom cushing) dan menyusui (oral)                  PERHATIAN : hindari kontak dengan mata                  Cara penyimpanan : Simpan Ketomed di tempat bersuhu ruangan dan terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>ESO potensial : iritasi lokal, eritemia, kulit terbakar dan kering                  KI : penderita yang hipersensitif terhadap komponen obat ini                  PERHATIAN : hentikan pengobatan jika iritasi dan sensitivitas. Tidak untuk digunakan pada mata, intra vaginal, atau perorl. Hindarkan kontak dengan hidung, mulut, membran mukosa lain. hamil                  Cara penyimpanan : simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius</p>	
		<p>Nama Obat : Fusipar cream                  Kandungan : fusidic acid                  Dosis lazim : gunakan 2-3 kali sehari, umumnya selama 7 hari.                  Kegunaan : Infeksi kulit yang disebabkan oleh Staph atau bakteri lain yang rentan terhadap asam fusidat misalnya, impetigo, folikulitis, furunkulosis, sycosis barbae, hidradenitis aksilaris, paronychia &amp; eritrasma.                  ESO potensial :-                  KI :-</p>		

PERHATIAN : HARUS  
MENGGUNAKAN RESEP  
DOKTER

Cara penyimpanan : Simpan di  
tempat yang kering dan terhindar  
dari sinar matahari langsung.

f. Tahap pembuatan

1. Ambil obat destavel 5 mg pada rak obat destavel 5 mg sebanyak 7 tablet
2. Ambil obat Griceofulvin 500 mg pada rak obat Griceofulvin 500 mg sebanyak 21 tablet
3. Ambillah ketomed cream, termisil cream, fusipar cream. Pada masing masing cream sebanyak 1 tube lalu masukkan ke dalam mortir di aduk ad homogen
4. Setelah homogen lalu dimasukkan kedalam pot No. I dan beri etiket warna biru
5. Staples etiket pada kemasan obat tablet
6. Masukkan kedalam kemasan plastik
7. Cek kembali kesesuaian obat yang di ambil dengan resep serta etiket

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

APT : atas nama TN Agus Irwanto

Pasien : iya mbak

Apt : dengan TN Agus Irwanto tanggal lahirnya berapa pak ?

Pasien : iyh mba, tanggal lahir saya 09 – 08 – 1972

Apt : baik pak, saya jelaskan dulu ya obatnya

Pasien : iya mbak


Apt : ini pak ada 3 macam obat yang dua obatnya diminum dan satunya cream ya pak. Obat yang pertama yaitu obat destavel jumlahnya ada 7 tablet diminum satu kali sehari satu biji setelah makan ya pak, yang kedua yaitu griceofulvin jumlahnya ada 21 tablet diminum 1 kali sehari 1 ½ tablet ya pak, dan ini obat yang terakhir berupa salep ya pak, digunakan 3 kali sehari cara penggunaannya dioleskan diarea ruam gatal, setelah pelembab ya pak.

Pasien : iya mbak

Apt : apa ada yang ditanyakan bapak atau kurang jelas tadi penjelasan saya bapak?

Pasien : sudah jelas mbak, terimakasih

Apt : baik pak, terimakasih kembali. Semoga lekas sembuh

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																									
13.*	<p>Jenis Resep : resep asli Resep obat : non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (&gt;/Tidak Pengulangan resep :</p> <p><b>Resep saluran cerna</b></p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1025 264 1984 1374"> <tr> <td data-bbox="1025 264 1294 296">Nama Pasien :</td> <td data-bbox="1294 264 1518 296">Ada</td> <td data-bbox="1518 264 1984 296">Muhammad nur kholis febriyanto</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1025 296 1294 328">Umur pasien :</td> <td data-bbox="1294 296 1518 328">Tidak Ada</td> <td data-bbox="1518 296 1984 328">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1025 328 1294 360">Berat Badan :</td> <td data-bbox="1294 328 1518 360">Tidak Ada</td> <td data-bbox="1518 328 1984 360">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1025 360 1294 520">Nama Obat :</td> <td data-bbox="1294 360 1518 520">Ada</td> <td data-bbox="1518 360 1984 520">Diagit Lansoprazole Ondansetron sanmol</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1025 520 1294 552">Kekuatan :</td> <td data-bbox="1294 520 1518 552">Tidak ada</td> <td data-bbox="1518 520 1984 552"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1025 552 1294 711">Bentuk sed. :</td> <td data-bbox="1294 552 1518 711">Ada</td> <td data-bbox="1518 552 1984 711">Diagit tab Lansoprazole tab Ondansetron tab Sanmol tab</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1025 711 1294 871">Jumlah obat :</td> <td data-bbox="1294 711 1518 871">Ada</td> <td data-bbox="1518 711 1984 871">Diagit tab no XX Lansoprazole tab no X Ondansetron tab no X Sanmol tab no XII</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1025 871 1294 903">Duplikasi terapi :</td> <td data-bbox="1294 871 1518 903">Tidak Ada</td> <td data-bbox="1518 871 1984 903">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1025 903 1294 1190">Aturan pakai :</td> <td data-bbox="1294 903 1518 1190">Ada</td> <td data-bbox="1518 903 1984 1190">Diagit tab no XX S 3 X 2 tab Lansoprazole tab no X S 2 X 1 AC Ondansetron tab no X S 3 X 1 K/P muntah Sanmol tab no XII S 3 X 1 K/P PC</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1025 1190 1294 1270">Tanggal penulisan resep :</td> <td data-bbox="1294 1190 1518 1270">Ada</td> <td data-bbox="1518 1190 1984 1270">15- 2 - 24</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1025 1270 1294 1302">Nama dokter :</td> <td data-bbox="1294 1270 1518 1302">Ada</td> <td data-bbox="1518 1270 1984 1302">dr.Moh fajril falakhi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1025 1302 1294 1334">Surat ijin :</td> <td data-bbox="1294 1302 1518 1334">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1518 1302 1984 1334">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1025 1334 1294 1374">Alamat dr. :</td> <td data-bbox="1294 1334 1518 1374">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1518 1334 1984 1374">Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik</td> </tr> </table>			Nama Pasien :	Ada	Muhammad nur kholis febriyanto	Umur pasien :	Tidak Ada	-	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Diagit Lansoprazole Ondansetron sanmol	Kekuatan :	Tidak ada		Bentuk sed. :	Ada	Diagit tab Lansoprazole tab Ondansetron tab Sanmol tab	Jumlah obat :	Ada	Diagit tab no XX Lansoprazole tab no X Ondansetron tab no X Sanmol tab no XII	Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada	Diagit tab no XX S 3 X 2 tab Lansoprazole tab no X S 2 X 1 AC Ondansetron tab no X S 3 X 1 K/P muntah Sanmol tab no XII S 3 X 1 K/P PC	Tanggal penulisan resep :	Ada	15- 2 - 24	Nama dokter :	Ada	dr.Moh fajril falakhi	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik
Nama Pasien :	Ada	Muhammad nur kholis febriyanto																																									
Umur pasien :	Tidak Ada	-																																									
Berat Badan :	Tidak Ada	-																																									
Nama Obat :	Ada	Diagit Lansoprazole Ondansetron sanmol																																									
Kekuatan :	Tidak ada																																										
Bentuk sed. :	Ada	Diagit tab Lansoprazole tab Ondansetron tab Sanmol tab																																									
Jumlah obat :	Ada	Diagit tab no XX Lansoprazole tab no X Ondansetron tab no X Sanmol tab no XII																																									
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-																																									
Aturan pakai :	Ada	Diagit tab no XX S 3 X 2 tab Lansoprazole tab no X S 2 X 1 AC Ondansetron tab no X S 3 X 1 K/P muntah Sanmol tab no XII S 3 X 1 K/P PC																																									
Tanggal penulisan resep :	Ada	15- 2 - 24																																									
Nama dokter :	Ada	dr.Moh fajril falakhi																																									
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																									
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik																																									



Jl. KH. Kholil 88 Gresik

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Diagit yang dibutuhkan 20 tablet  
Lanzoprazole yang dibutuhkan 10 tablet  
Ondancetron yang dibutuhkan 10 tablet  
Sanmol yang dibutuhkan 12 tablet

C. Perhitungan biaya resep

Diagit 1 tablet 4.000 x 20 tablet = Rp 80.000  
Lanzoprazole yang dibutuhkan 10 tablet 1 strip Rp 16.000  
Ondancetron yang dibutuhkan 10 tablet 1 strip Rp 30.000  
Sanmol yang dibutuhkan 12 tablet perstrip isi 4 Rp 2.500 x 3 = Rp 7.500  
Total biaya Rp. 133.500

D. ETIKET

Nama Obat /warna etiket :Diagit/putih



**APOTEK BERKAH**

JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden  
Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707

NAMA : M nur kholis f.

TGL: 15-02-2024

ED: 23 / 02 / 2027

NAMA OBAT: Diagit

~~3 x SEHARI 2 TAB / ML / SENDOK TAKAR / MAKAN  
SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN~~

Nama Obat /warna etiket :lansoprazole/putih



**APOTEK BERKAH**

JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel.  
Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp  
081324097707

NAMA : M nur kholis f.

TGL: 15-02-2024

ED: 20 / 05 / 2027

NAMA OBAT: Lansoprazole

~~2 x SEHARI 1 KAPS / ML / SENDOK TAKAR / MAKAN  
SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN~~

Nama Obat /warna etiket : Ondancetron/putih

		<p><b>APOTEK BERKAH</b>   JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707</p> <p>NAMA : M nur kholis f. TGL: 15-02-2024                  ED: 22 / 07 / 2027                  NAMA OBAT: Ondansetron</p> <p>Bila muntah                  3 x SEHARI 1 TAB / <del>ML / SENDOK TAKAR / MAKAN</del>                  SEBELUM / <del>SAAT / SESUDAH MAKAN</del></p>	
<p>Nama Obat /warna etiket : Sanmol/putih</p>		<p><b>APOTEK BERKAH</b>   JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707</p> <p>NAMA : M nur kholis f. TGL: 15-02-2024                  ED: 28 / 07 / 2027                  NAMA OBAT: Sanmol Tab</p> <p>Bila Perlu                  3 x SEHARI 1 TAB / <del>ML / SENDOK TAKAR / MAKAN</del>                  SEBELUM / <del>SAAT / SESUDAH MAKAN</del></p>	
<p>E. <i>Product knowledge</i></p>		<p>Nama Obat : ondansartan                  Kandungan : Ondansetron 4 mg                  Dosis lazim : Pencegahan mual muntah paska operasi Dewasa dan anak &gt;17 tahun:</p>	<p>Nama Obat : Lansoprazole                  Kandungan : Lansoprazole 30 mg                  Dosis lazim : Esofagitis refluks Dewasa:                  Pengobatan: 30 mg 1 kali sehari, selama 4-</p>

		<p>Awal 8 mg per oral 1-2 jam sebelum anestesi, dilanjutkan dengan 8 mg setelah 8-12 jam. Anak 4-11 tahun: 4 mg 30 menit sebelum kemoterapi. Ulangi dosis setelah 4 dan 8 jam dari dosis awal</p> <p>Mual muntah paska operasi: 16 mg dosis tunggal 1 jam sebelum anestesi. Mual dan muntah yang diinduksi terapi radiasi: 8 mg per oral 1-2 jam sebelum radioterapi</p> <p>Kegunaan : Penatalaksanaan mual dan muntah karena kemoterapi dan radioterapi, mual dan muntah paska operasi</p> <p>ESO potensial : Nyeri dada, bradikardia, hipotensi, aritmia, hipoksia, peningkatan sementara enzim hati. Jarang terjadi: kebutaan sementara, gejala ekstrapiramidal (misalnya reaksi distonik, krisis okulogirik, diskinesia), kejang, nekrolisis epidermal toksik, sindrom serotonin.</p> <p>KI : Hipersensitivitas. Sindrom QT panjang bawaan. Penggunaan bersamaan dengan apomorphine.</p> <p>PERHATIAN : Hati-hati penggunaan pada pasien dengan hipokalemia, hipomagnesemia, CHF, kelainan konduksi CV, bradiaritmia, kondisi lain yang dapat menyebabkan pemanjangan interval QT atau kelainan elektrolit, fenilketonuria, obstruksi usus subakut, dan pembedahan abdomen, dapat menutupi ileus progresif atau distensi lambung.</p> <p>Cara penyimpanan : : Simpan pada suhu dibawah 30°C</p>	<p>8 minggu. Profilaksis: 15 mg 1 kali sehari, dapat ditingkatkan hingga 30 mg jika perlu. Refluks gastro-esofagus Dewasa: 15-30 mg 1 kali sehari, selama 4 minggu. Ulserasi terkait NSAID Dewasa: 30 mg sekali sehari selama 4-8 minggu. Sindrom Zollinger-Ellison Dewasa: Awalnya, 60 mg 2 kali sehari, dapat disesuaikan hingga 180 mg setiap hari sesuai respons. Dosis harian &gt;120 mg harus diberikan dalam 2 dosis terbagi. Eradikasi H. pylori Dewasa: Sebagai terapi rangkap 3: 30 mg 2 kali sehari, selama 7-14 hari (dalam kombinasi dengan antibiotik). Sebagai terapi ganda: 30 mg tiga kali sehari selama 14 hari dalam kombinasi dengan amoksisilin. Tukak lambung/duodenum karena NSAID Dewasa: 15-30 mg 1 kali sehari. Tukak Peptik/ Peptic Ulcer Dewasa: 30 mg 1 kali sehari, selama 2-4 minggu (ulkus duodenum) atau selama 4-8 minggu (tukak lambung). Lansia: Maks: 30 mg per hari.</p> <p>Kegunaan : pengobatan tukak duodenum dan tukak lambung ringan, tukak peptik, refluks esofagitis, sindrom zollinger-ellison dan eradikasi H.pylori.</p> <p>ESO potensial : bahaya, harap konsultasikan kepada tenaga medis. Efek samping yang mungkin terjadi dalam penggunaan obat adalah: Hipomagnesemia, fraktur terkait osteoporosis, polip kelenjar fundus, karsinoma, lupus eritematosus kulit subakut, SLE, nefritis interstisial, diare terkait Clostridium difficile, infeksi saluran cerna (misalnya Salmonella,</p>
--	--	---	---

		<p>Campylobacter), defisiensi vitamin B12 (terapi jangka panjang). Gangguan sistem darah dan limfatik: Trombositopenia, leukopenia, eosinofilia. Gangguan mata: Gangguan penglihatan. Gangguan gastrointestinal: Diare, sakit perut, sembelit, mual,</p> <p>KI : Penderita yang hipersensitif terhadap lansoprazole, serta pasien yang sedang mengkonsumsi rilpivirine dan atazanavir.</p> <p>PERHATIAN : Pasien dengan keganasan lambung, faktor risiko berkurangnya penyerapan vitamin B12 atau berkurangnya simpanan tubuh; risiko osteoporosis. Gangguan hati sedang sampai berat. Tua. Kehamilan dan menyusui. metabolisme ultrarapid CYP2C19. Kategori Kehamilan : Kategori B: Mungkin dapat digunakan oleh wanita hamil. Penelitian pada hewan uji tidak memperlihatkan ada nya risiko terhadap janin, namun belum ada bukti penelitian langsung terhadap wanita hamil. Konsultasikan kepada tenaga medis apabila sedang menyusui.</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah 30°C</p>	
		<p>Nama Obat : diagit                  Kandungan : Activated Attapulgite 600 mg, Pectin 50 mg                  Dosis lazim : Dewasa dan anak-anak usia lebih dari 12 tahun : Mula-mula 2 tablet, diikuti dengan penambahan 2 tablet lagi setiap selesai buang air besar, maksimum 12 tablet selama 24 jam. Anak-anak 6-12</p>	<p>Nama Obat : Sanmol                  Kandungan : Paracetamol 500 mg                  Dosis lazim : Dewasa dan anak &gt;12 tahun: 1 tablet, 3-4 kali per hari. Anak: 1/2 - 1 tablet, 3-4 kali sehari. Atau sesuai petunjuk dokter.</p>




		<p>tahun : Mula-mula 1 tablet kemudian 1 tablet lagi, setiap selesai buang air besar, maksimum 6 tablet.</p> <p>Kegunaan : Untuk pengobatan simptomatik pada diare yang tidak diketahui penyebabnya</p> <p>ESO potensial : Pemakaian obat umumnya memiliki efek samping tertentu dan sesuai dengan masing-masing individu. Jika terjadi efek samping yang berlebih dan berbahaya, harap konsultasikan kepada tenaga medis. Efek samping yang mungkin terjadi dalam penggunaan obat adalah : Mual, pusing, konstipasi.</p> <p>KI : Jangan diberikan pada pasien di mana konstipasi harus dihindari. Hipersensitif terhadap obat ini.</p> <p>PERHATIAN : Jangan digunakan lebih dari 2 hari atau dalam keadaan demam tinggi atau untuk bayi atau anak-anak di bawah 6 tahun, kecuali atas petunjuk dokter. Penggunaan pada wanita hamil dan menyusui blum diketahui dengan pasti. Bila diare pada anak-anak menimbulkan dehidrasi maka harus diberikan oralit. Dapat mempengaruhi absorpsi saluran pencernaan dari obat-obatan, karena itu dianjurkan interval waktu 2-3 jam antara pembeian obatan-obatan lain dengan obat ini. Jika gejala-gejala masih berlangsung terus, konsultasikan ke dokter.</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah 30°C</p>	<p>Kegunaan : untuk meringankan rasa sakit pada keadaan sakit kepala, sakit gigi dan menurunkan demam.</p> <p>ESO potensial : Pemakaian obat umumnya memiliki efek samping tertentu dan sesuai dengan masing-masing individu. Jika terjadi efek samping yang berlebih dan berbahaya, harap konsultasikan kepada tenaga medis. Efek samping yang mungkin terjadi dalam penggunaan obat adalah: Hematologi, reaksi kulit, reaksi alergi lainnya, kerusakan hati (penggunaan jangka panjang dan overdosis).</p> <p>KI : Penderita gangguan fungsi hati yang berat. Hipersensitivitas terhadap Paracetamol.</p> <p>PERHATIAN : Hati-hati penggunaan obat ini pada penderita penyakit ginjal. Bila setelah 2 hari demam tidak menurun atau setelah 5 hari nyeri tidak menghilang, segera hubungi Unit Pelayanan Kesehatan. Penggunaan obat ini pada penderita yang mengkonsumsi alkohol, dapat meningkatkan risiko kerusakan fungsi hati.</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah 30°C</p>
		<p>F. Tahap pembuatan</p>	

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ambil obat diagit pada rak obat sebanyak 2 strip, lansoprazole 1 strip, ondancetron 1 strip dan sanmol 12 tab</li> <li>2. Tempelkan etiket pada kemasan obat</li> <li>3. Masukkan kedalam kemasan plastic</li> <li>4. Cek kembali kesesuaian obat yang di ambil dengan resep serta</li> </ol> <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Apt : Pasien atas nama Tn. Muhammad nur kholis febriyanto                  Pasien : iya mbak                  Apt : Baik pak saya jelaskan obatnya dulu ya pak, ini obatnya ada 4 macam pak ada diagit tablet untuk diare diminum 3 kali sehari 2 tablet sesudah makan , ondancetron diminum 3 kali sehari 1 tablet sebelum makan bila muntah, lansoprazol untuk nyeri lambung diminum sebelum makan 2 kali sehari 1 tablet dan sanmol untuk nyeri dan demam bila perlu diminum 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Apa ada yang di tanyakan atau kurang jela pak dari penjelasan saya ?                  Pasien : sudah jelas mbak, terimakasih                  Apt : terimakasih kembali bapak, semoga lekas sembuh</p>
--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep		
14.*	Jenis Resep : resep asli Resep obat : non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep :	A. Skrinning Administrasi		
		Nama Pasien :	Ada	Ati
		Umur pasien :	Tidak ada	-
		Berat Badan :	Tidak ada	-
		Nama Obat :	Ada	Meloxicam

**Resep saluran nafas**



		Onbrez
Kekuatan :	Ada	-
Bentuk sed. :	Ada	-
Jumlah obat :	Ada	Meloxicam XV Onbrez XXX
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	Tidak Ada
Aturan pakai :	Ada	Onbrez S 1 x 1
Tanggal penulisan resep :	Ada	12 - 2 - 2024
Nama dokter :	Ada	Dr. Achmad Nurdin, Sp.P
Surat ijin :	Tidak Ada	Tidak Ada
Alamat dr. :	Ada	Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jl. KH. Kholil 88 Gresik




B. Perhitungan jumlah persediaan Farmasi

Meloxicam yang dibutuhkan 15 tablet  
Onbrez yang dibutuhkan 30 tablet


C. Perhitungan biaya resep

meloxicam 1 tablet Rp. 1000 x 15 = Rp. 15.000  
Onbrez 1 box Rp. 750.000  
Total biaya Rp. 765.000

D. ETIKET

	Nama Obat /warna etiket : meloxicam/putih	
	 <b>APOTEK BERKAH</b> JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707	
	NAMA : Ati	TGL: 12-02-2024 ED: 23 / 02 / 2027 NAMA OBAT: Meloxicam
	1 x SEHARI 1 TAB / <del>ML</del> / <del>SENDOK TAKAR</del> / <del>MAKAN</del> <del>SEBELUM</del> / <del>SAAT</del> / SESUDAH MAKAN	
Nama Obat/warna etiket : onbrez/putih		
 <b>APOTEK BERKAH</b> JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707		
NAMA : Ati	TGL: 12-02-2024 ED: 23 / 02 / 2027 NAMA OBAT: Onbrez	
1 x SEHARI 1 KAPS / <del>ML</del> / <del>SENDOK TAKAR</del> / <del>MAKAN</del> <del>SEBELUM</del> / <del>SAAT</del> / SESUDAH MAKAN		
E. <i>Product knowledge</i>		
Nama Obat : Meloxicam Kandungan : Meloxicam 15mg Dosis lazim : PENGGUNAAN OBAT INI HARUS SESUAI DENGAN PETUNJUK		Nama Obat : Onbrez Kandungan : indocaterol maleate Dosis lazim : Dws Dosis anjuran: 150 mg 1 x/hr inhalasi pd saat yg sama tiap hr.



		<p>DOKTER. Dewasa: Rheumatoid Arthritis dan Ankylosing Spondylitis: 15 mg, 1 kali per hari. Dapat diturunkan menjadi 7.5 mg, 1 kali per hari berdasarkan respon terapeutik. Osteoarthritis: 7.5 mg, 1 kali per hari. Dapat ditingkatkan s/d 15 mg, 1 kali per hari. Anak &gt;60 kg: Arthritis idiopatik juvenil: 7,5 mg sekali sehari. Lansia dan pasien ginjal: 7.5 mg, 1 kali per hari.</p> <p>Kegunaan : Meredakan gejala-gejala arthritis, misalnya peradangan, pembengkakan, serta kaku dan nyeri otot.</p> <p>ESO potensial : Retensi cairan, edema, insufisiensi ginjal, gagal ginjal akut, nekrosis papiler ginjal (penggunaan jangka panjang), hiperkalemia, penglihatan kabur, anemia, jarang, agranulositosis, trombositopenia, leukopenia. Gangguan sistem darah dan limfatik: Anemia, jarang, agranulositosis, trombositopenia, leukopenia. Gangguan jantung: Gagal jantung, jarang, palpitasi.</p> <p>KI : Hipersensitif terhadap meloxicam, aspirin atau NSAID lainnya. Riwayat atau perdarahan gastrointestinal aktif, ulserasi atau perforasi yang berhubungan dengan penggunaan NSAID.</p> <p>PERHATIAN : HARUS DENGAN RESEP DOKTER. Hati-hati penggunaan pada pasien dengan asma, riwayat penyakit maag atau perdarahan gastrointestinal baru-baru ini, hipertensi, MI baru-baru ini, faktor risiko CV lainnya (misalnya hiperlipidemia, diabetes mellitus, merokok), retensi cairan dan edema,</p>	<p>Dosis dpt ditingkatkan berdasarkan saran dokter. Maks: 300 mcg 1 x/hr.</p> <p>Kegunaan : Terapi rumat bronkodilator utk mengatasi obstruksi jalan napas pada pasien dewasa</p> <p>ESO potensial : infeksi saluran napas atas, sinusitis; batuk, nyeri orofaring, rinore; spasme otot, mialgia, nyeri muskuloskeletal; edema perifer, nyeri dada; penyakit jantung iskemik; DM &amp; hiperglikemia; mulut kering</p> <p>KI : hipersensitif terhadap laktosa. Terapi episode akut bronkospasme.</p> <p>PERHATIAN : . HARUS DENGAN RESEP DOKTER. Asma; hentikan terapi jika tjd bronkospasme paradoksikal. Ggn KV seperti peny jantung koroner, infark miokard akut, aritmia jantung, hipertensi, ggn konvulsi atau tirotoksikosis; pasien yg tdk memberi respon spt biasa thd terapi 2-adrenergik; hipokalemia, hipoksia, terapi bersama dg agonis 2 adrenergik jangka panjang lainnya Pantau kadar glukosa plasma pd pasien diabetes. Anak &lt;18 thn. Pasien dlm kondisi partus/melahirkan. Hamil &amp; laktasi.</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah 25 °C</p>
--	--	--	--



hipovolemia, koagulopati. Pasien dehidrasi dan lemah. Ginjal dan gangguan hati ringan sampai sedang. Anak-anak dan orang tua. Kehamilan (trimester 1-2). Penggunaan bersama NSAID lainnya, kortikosteroid, antiplatelet, antikoagulan. Kategori kehamilan: Kategori C: Mungkin berisiko. Obat digunakan dengan hati-hati apabila besarnya manfaat yang diperoleh melebihi besarnya risiko terhadap janin. Penelitian pada hewan uji menunjukkan risiko terhadap janin dan belum terdapat penelitian langsung terhadap wanita hamil. Cara penyimpanan :Simpan pada suhu dibawah 25 °C

F. Tahap pembuatan

- 1 Ambil obat meloxicam pada rak obat sebanyak 15 tab dan onbrez 1 box yang berisi 30 tab
- 2 Tempelkan etiket pada kemasan obat
- 3 Masukkan kedalam kemasan plastic
- 4 Cek kembali kesesuaian obat yang di ambil dengan resep serta etiket yang tertempel pada kemasan obat

G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

		<p>Apt : Pasien atas nama Ny. Ati                  Pasien : iya mbak                  Apt : Baik bu, saya jelaskan obatnya dulu ya bu, ini obatnya ada 2 macam bu yaitu meloxicam tablet untuk nyeri diminum 1 kali sehari sesudah makan ada 15 tablet ya bu dan obat onbrez berisi 2 macam bentuk sediaan tablet dan inhaler ya bu tablet diminum 1 kali sehari sesudah makan dan inhalernya digunakan dengan cara dihirup 1 kali sehari Apa ada yang di tanyakan atau kurang jela bu dari penjelasan saya ?                  Pasien : sudah jelas mbak, terimakasih                  Apt : terimakasih kembali bu, semoga lekas sembuh</p>
--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep		
15.*	<b>Resep Racikan anak</b>	A. Skrinning Administrasi		
		Nama Pasien :	Ada	Muhammad Rachbini Azmatkhan
		Umur pasien :	Ada	3 tahun 1 bulan 18 hari
		Berat Badan :	Ada	12 kg
		Nama Obat :	Ada	R/ Cefixim R/ Ambroxol Salbutamol Tremenza Dextamin Cetrisin
		Kekuatan :	Ada	R/ Cefixim 40 mg R/ Ambroxol 4 mg Salbutamol 0,6 mg

TUGAS KHUSUS PKL D3 FARMASI UMG\_AZMI SABILA KISBATUL WAFI\_211105018\_APOTEK BERKAH

			Tremenza 1/5 tab Dextamin 1/3 tab Cetrizin 2 mg
	Bentuk sed. :	Ada	R/ Cefixim tablet R/ Ambroxol tablet Salbutamol tablet Tremenza tablet Dextamin tablet Cetrizin tablet
	Jumlah obat :	Ada	R/ Cefixim 40 mg M. F. Pulv. dtd No X R/ Ambroxol 4 mg Salbutamol 0,6 mg Tremenza 1/5 tab Dextamin 1/3 tab Cetrizin 2 mg M. F. Pulv. dtd No XV
	Duplikasi terapi :	Tidak Ada	Tidak Ada
	Aturan pakai :	Ada	R/ Cefixim 40 mg M. F. Pulv. dtd No X S 2 dd R/ Ambroxol 4 mg Salbutamol 0,6 mg Tremenza 1/5 tab Dextamin 1/3 tab Cetrizin 2 mg M. F. Pulv. dtd No XV S 3 dd 1
	Tanggal penulisan resep :	Ada	9/3
	Nama dokter :	Ada	Dr. Arif Fakhruddin, Sp.A
	Surat ijin :	Tidak Ada	Tidak Ada
	Alamat dr. :	Tidak Ada	Tidak Ada

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

$$R/ \text{ Cefixime} = 40 \times 15 : 100 = 6 \text{ tab}$$

$$R/ \text{ Ambroxol} = \frac{4}{30} \times 15 = 2 \text{ tab}$$

$$\text{Salbutamol} = \frac{0,6}{2} \times 15 = 4,5 \text{ tab}$$

$$\text{Tremenza} = \frac{1}{5} \times 15 = 3 \text{ tab}$$

$$\text{Dextamin} = \frac{1}{3} \times 15 = 5 \text{ tab}$$

$$\text{Cetirizine} = \frac{2 \text{ mg}}{10 \text{ mg}} \times 15 = 3 \text{ tab}$$

C. Perhitungan biaya resep

1. Cefixime = Rp. 1.500 x 6 = 9.000

2. Ambroxol = Rp 400 x 2 tab = Rp 800

3. Salbutamol = Rp 300 x 5 tab = Rp 1.500

4. Tremenza = Rp 2.000 x 3 tab = Rp 6.000

5. Dextamin = Rp 2.200 x 5 tab = Rp 11.000



6. Cetirizine = Rp 600 x 3 tab = Rp 1.800

7. TUS Kertas Puyer = 100 x 30 = 3.000

Total semua = 33.100

D. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Batuk Pilek / Putih

		 <p><b>APOTEK BERKAH</b>                  JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden                  Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707</p>	
		<p>NAMA : Muhammad Rachbini Azmatkha      TGL: 09-03-2024                  ED: 09-04-2024                  NAMA OBAT: Batuk Pilek</p> <p>3 x SEHARI 1 PCS / <del>ML</del> / <del>SENDOK TAKAR</del> / <del>MAKAN</del>  <del>SEBELUM</del> / <del>SAAT</del> / <del>SESUDAH MAKAN</del></p> <p>Nama Obat /warna etiket : Cefixime / Putih</p>	
		 <p><b>APOTEK BERKAH</b>                  JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden                  Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707</p>	
		<p>NAMA : Muhammad Rachbini Azmatkha      TGL: 09-03-2024                  ED: 09-04-2024                  NAMA OBAT: Cefixime</p> <p>HABISKAN</p> <p>2 x SEHARI 1 PCS / <del>ML</del> / <del>SENDOK TAKAR</del> / <del>MAKAN</del>  <del>SEBELUM</del> / <del>SAAT</del> / <del>SESUDAH MAKAN</del></p> <p>E. <i>Product knowledge</i></p>	
		<p>Nama Obat : ambroxol                  Kandungan : Tablet ambroxol 30 mg</p>	<p>Nama Obat : Salbutamol                  Kandungan : salbutamol 4 mg</p>




		<p>Dosis lazim : Dewasa: kapsul lepas lambat 1 kali sehari 75 mg, sesudah makan. Dewasa dan anak di atas 12 tahun: 1 tablet (30 mg) 2-3 kali sehari; Anak 6-12 tahun: 1/2 tablet 2-3 kali sehari.</p> <p>Kegunaan : digunakan sebagai pengencer dahak dan pelega saluran pernapasan</p> <p>ESO potensial : Sakit perut, heartburn, atau sakit maag.</p> <p>KI : Tidak ada kontraindikasi yang absolut terkait konsumsi Ambroxol.</p> <p><b>PERHATIAN : HARUS DENGAN RESEP DOKTER</b></p> <p>Cara penyimpanan : Simpan Ambroxol pada suhu di bawah 30 derajat Celsius, di tempat kering, dan sejuk.</p>	<p>Dosis lazim : Dewasa dan anak-anak usia &gt;12 tahun: 2–4 mg, 3–4 kali sehari</p> <p>Kegunaan : meredakan gejala asma dan gangguan pernapasan lainnya, seperti bronkitis dan chronic obstructive pulmonary disease</p> <p>ESO potensial : Efek samping yang mungkin timbul setelah menggunakan salbutamol adalah pusing, sakit kepala, batuk, gelisah, tangan dan kaki gemetar, dan nyeri otot.</p> <p>Efek samping ini umumnya ringan dan bisa hilang dengan sendirinya</p> <p>KI : Hipersensitif salbutamol</p> <p><b>PERHATIAN : Obat Wajib Apotek, Obat ini dapat dibeli dan diserahkan apoteker tanpa resep dengan maksimum 2 Strip. Pembelian melebihi batas ini WAJIB RESEP DOKTER</b></p> <p>Cara penyimpanan : simpan pada suhu ruangan dan jauhkan dari cahaya langsung dan tempat lembab.</p>
		<p>Nama Obat : tramenza</p> <p>Kandungan : Pseudoephedrine HCl dan Triprolidine HCl.</p> <p>Dosis lazim : Dewasa dan anak di atas 12 tahun: dosisnya 1 tablet digunakan 3 - 4 kali per hari.</p> <p>Kegunaan : meringankan gejala-gejala flu</p>	<p>Nama Obat : Dexamatin</p> <p>Kandungan : Dexamethasone (glukokortikoid) dan Dexchlorpheniramine Maleate</p> <p>Dosis lazim : PENGGUNAAN OBAT INI HARUS SESUAI DENGAN PETUNJUK DOKTER. Dewasa : 1 tablet, 3 kali per hari. Anak : 1/2 tablet, 3 kali per hari.</p>

		<p>ESO potensial : Kondisi hiperreaktif: takikardia, palpitasi, sakit kepala, pusing, atau mual.                  KI : Penyakit saluran napas bawah, termasuk asma. Glaukoma, hipertensi, diabetes, penyakit arteri koroner, terapi MAOI                  PERHATIAN : Awas, Obat Keras Bacalah Aturan Pakainya                  Cara penyimpanan : disimpan pada suhu ruangan, jauhkan dari cahaya langsung dan tempat yang lembap.</p>	<p>Kegunaan : antiinflamasi, antirematik, serta antialergi/antihistamin                  ESO potensial : Pemakaian obat umumnya memiliki efek samping tertentu dan sesuai dengan masingmasing individu. Jika terjadi efek samping yang berlebih dan berbahaya, harap konsultasikan kepada tenaga medis                  KI : hipersensitif PERHATIAN : HARUS DENGAN RESEP DOKTER</p>
		<p>Nama Obat : Cefixime                  Kandungan : cefixime                  Dosis lazim : Dewasa dan anak usia &gt;12 tahun dengan BB&gt;45 kg: 400 mg sebagai dosis tunggal, atau 200 mg setiap 12 jam. Lama pengobatan 10 hari. Anak usia 6 bulan hingga 12 tahun dengan BB ≤45 kg: 8 mg/kgBB per hari dibagi dalam 1–2 jadwal konsumsi dengan jeda antar dosis 12 jam                  Kegunaan : Antibiotik                  ESO potensial : Cefixime dapat menyebabkan diare, dan dalam beberapa kasus bisa parah                  KI : bila terdapat alergi atau riwayat alergi terhadap obat ini atau antibiotik golongan sefalosporin lainnya, serta pada bayi berusia di bawah 28 hari yang menerima produk kalsium</p>	<p>Nama Obat : Cetirizine                  Kandungan : mengandung cetirizine 10mg                  Dosis lazim : -anak – anak usia &gt;6 tahun : -1 kaplet (10mg) 1 kali sehari                  -Dewasa &amp; anak &gt; 12 tahun 5 mg 1 kali sehari. Gangguan hati atau ginjal awal 5 mg setiap hari. Sesudah makan                  Kegunaan : untuk pengobatan rhinitis perennial, rintis alergi, urtaria idiopatik kronis.                  ESO potensial : Perasaan mengantuk, pusing-pusing, sakit kepala, gelisah, mulut kering dan gangguan saluran pencernaan                  KI : Hipersensitivitas terhadap cetirizine, Ibu menyusui                  PERHATIAN : Obat ini dapat dibeli dan diserahkan apoteker tanpa resep dengan maksimum 1 Strip. Pembelian</p>

		<p>PERHATIAN : HARUS DENGAN RESEP DOKTER. Cara penyimpanan : simpan pada suhu 20-25 derajat celcius</p>	<p>melebihi batas ini WAJIB RESEP DOKTER. Antihistamin yang menyebabkan kantuk mempunyai aktivitas antimuskarinik yang nyata dan harus digunakan dengan hati-hati pada pasien dengan peningkatan risiko retensi urin (misalnya lesi sumsum tulang belakang, hiperplasia prostat), pasien epilepsi dan pasien dengan risiko kejang. Gangguan hati dan ginjal ringan sampai sedang. Anak dan lansia lebih mudah mendapat efek samping. Penggunaan pada anak di bawah 2 tahun tidak dianjurkan kecuali atas petunjuk dokter dan tidak boleh digunakan pada neonatus. Kategori kehamilan: Kategori B: Mungkin dapat digunakan oleh wanita hamil. Obat dapat diekskresikan melalui ASI, konsultasikan kepada tenaga medis apabila sedang menyusui. Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah 30°C</p>
		<p>F. Tahap pembuatan</p> <p>R/ - Siapkan alat dan bahan - Masukkan ambroxol, salbutamol, tremenza, dextamin, cetirizine ditambah sedikit gula kedalam blender. -keluarkan dari blender lalu di ayak. - Bagi puyer sebanyak 15 puyer diatas sendok puyer, lalu masukkan puyer kedalam kertas perkamen - puyer kemudian dipress menggunakan alat press</p>	

		<p>- menulis etiket lalu masukan kedalam plastik klip</p> <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Apt : Pasien atas nama Ikhlas Taqy Ramadhan Pasien : iya mbak Apt : Dengan pasien ikhlas taqy ramadhan Pasien : iyh mba saya ibunya Apt : Berapa tanggal lahir anaknya bu? Pasien : 18 april 2021 Apt : Baik bu, saya jelaskan obatnya dulu ya bu, ini obatnya ada 1 macam bu yaitu puyer untuk batuk pilek, ada 15 puyer ya bu diminum 3 kali sehari 1 puyer setelah makan ya bu. Apa ada yang di tanyakan atau kurang jela bu dari penjelasan saya ? Pasien : sudah jelas mbak, terimakasih Apt : terimakasih kembali bu, semoga lekas sembuh</p>
--	--	---



No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep		
16*	<p>Jenis Resep : resep asli                      Resep obat : Racikan                      Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (&gt;/Tidak                      Pengulangan resep :</p> <p><b>Resep Racikan anak</b></p> 	A. Skrinning Administrasi		
		Nama Pasien :	Ada	Azzura Alisjahbana Agma
		Umur pasien :	Ada	5 tahun 4 bulan 22 hari
		Berat Badan :	Ada	18 kg
		Nama Obat :	Ada	R/ Ambroxol Salbutamol Tremenza Dextamin Cetrizin R/ Cefixim
		Kekuatan :	Ada	R/ Ambroxol 6 mg Salbutamol 1 mg Tremenza 1/3 tab Dextamin 1/3 tab Cetrizin 2 mg R/ Cefixim 60 mg
		Bentuk sed. :	Ada	R/ Ambroxol tablet Salbutamol tablet Tremenza tablet Dextamin tablet Cetrizin tablet R/ Cefixime tablet
		Jumlah obat :	Ada	R/ Ambroxol 6 mg Salbutamol 1 mg Tremenza 1/3 tab Dextamin 1/3 tab Cetrizin 2 mg M. F. Pulv. dtd No XV R/ Cefixim 40 mg



				M. F. Pulv. dtd No X
		Duplikasi terapi :	Tidak Ada	Tidak Ada
		Aturan pakai :	Ada	R/ Ambroxol 6 mg Salbutamol 1 mg Tremenza 1/3 tab Dextamin 1/3 tab Cetirizin 2 mg M. F. Pulv. dtd No XV S 3 dd 1 R/ Cefixim 60 mg M. F. Pulv. dtd No X S 2 dd
		Tanggal penulisan resep :	Ada	9 – 2 - 2024
		Nama dokter :	Ada	Dr. Arif Fakhrudin, Sp.A
		Surat ijin :	Tidak Ada	Tidak Ada
		Alamat dr. :	Tidak Ada	Tidak Ada
		<p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> $\text{R/ Cefixime} = 60 \times 10 : 100 = 6 \text{ tab}$ $\text{R/ Ambroxol} = \frac{6}{30} \times 15 = 3 \text{ tab}$ $\text{Salbutamol} = \frac{1}{2} \times 15 = 7,5 \text{ tab}$ $\text{Tremenza} = \frac{1}{3} \times 15 = 5 \text{ tab}$ $\text{Dextamin} = \frac{1}{3} \times 15 = 5 \text{ tab}$ $\text{Cetirizine} = \frac{2 \text{ mg}}{10 \text{ mg}} \times 15 = 3 \text{ tab}$		

C. Perhitungan biaya resep

1. Ambroxol = Rp 373,3 x 3 tab = Rp 1.120
  2. Salbutamol = Rp 240 x 7,5 tab = Rp 1.800
  3. Tremenza = Rp 2.131 x 5 tab = Rp 10.655
  4. Dextamin = Rp 2.000 x 5 tab = Rp 12.090
  5. Cetirizine = Rp 412,6 x 5 tab = Rp 2.063
  6. Cefixime = Rp. 1.400 x 6 tab = 8.400
  6. TUS Kertas Puyer = 99,6 x 25 =2.490
- Total semua = Rp 38.618,00

D. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Batuk Pilek / Putih



Rumah sakit

**Muhammadiyah Gresik**

Jujur |Transparan| Kekeluargaan

Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 P: +62 31 3981275|F: +62 31 3985459


NAMA / ID: Azzura Alisjahbana Agma

TGL: 09-02-2024

ED: 09-03-2024

NAMA OBAT: Batuk Pilek

**3 x SEHARI 1 BIJI /ML / SENDOK TAKAR / MAKAN  
SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN**


		<p>Nama Obat /warna etiket :Cefixime / Putih</p> <div data-bbox="943 268 1890 408">  <p>Rumah sakit <b>Muhammadiyah Gresik</b> Jujur [Transparan] Kekeluargaan Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 P: +62 31 3981275 F: +62 31 3985459</p> </div> <div data-bbox="943 408 1890 480"> <p>NAMA / ID: Azzura Alisjahbana Agma TGL: 09-02-2024 ED: 09-03-2024</p> </div> <div data-bbox="943 480 1433 571"> <p style="color: red; text-align: center;"><b>ANTIBIOTIK, DIMINUM TERATUR SAMPAI HABIS</b></p> </div> <div data-bbox="1433 480 1890 520"> <p>NAMA OBAT: Cefixime</p> </div> <div data-bbox="943 632 1890 703"> <p style="text-align: center;"><b>2 x SEHARI 1 BIJI /ML / SENDOK TAKAR /MAKAN SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN</b></p> </div> <p style="text-align: center;"><i>E. Product knowledge</i></p> <table border="1" data-bbox="943 778 2045 1369"> <tr> <td data-bbox="943 778 1491 1369"> <p>Nama Obat : ambroxol Kandungan : Tablet ambroxol 30 mg Dosis lazim : Dewasa: kapsul lepas lambat 1 kali sehari 75 mg, sesudah makan. Dewasa dan anak di atas 12 tahun:1 tablet (30 mg) 2-3 kali sehari; Anak 6-12 tahun: 1/2 tablet 2-3 kali sehari. Kegunaan : digunakan sebagai pengencer dahak dan pelega saluran pernapasan ESO potensial : Sakit perut, heartburn, atau sakit maag. KI : Tidak ada kontraindikasi yang absolut terkait konsumsi Ambroxol.</p> </td> <td data-bbox="1491 778 2045 1369"> <p>Nama Obat : Salbutamol Kandungan : salbutamol 4 mg Dosis lazim : Dewasa dan anak-anak usia &gt;12 tahun: 2–4 mg, 3–4 kali sehari Kegunaan : meredakan gejala asma dan gangguan pernapasan lainnya, seperti bronkitis dan chronic obstructive pulmonary disease ESO potensial : Efek samping yang mungkin timbul setelah menggunakan salbutamol adalah pusing, sakit kepala, batuk, gelisah, tangan dan kaki gemetar, dan nyeri otot. Efek samping ini umumnya ringan dan bisa hilang dengan sendirinya KI : Hipersensitif salbutamol</p> </td> </tr> </table>	<p>Nama Obat : ambroxol Kandungan : Tablet ambroxol 30 mg Dosis lazim : Dewasa: kapsul lepas lambat 1 kali sehari 75 mg, sesudah makan. Dewasa dan anak di atas 12 tahun:1 tablet (30 mg) 2-3 kali sehari; Anak 6-12 tahun: 1/2 tablet 2-3 kali sehari. Kegunaan : digunakan sebagai pengencer dahak dan pelega saluran pernapasan ESO potensial : Sakit perut, heartburn, atau sakit maag. KI : Tidak ada kontraindikasi yang absolut terkait konsumsi Ambroxol.</p>	<p>Nama Obat : Salbutamol Kandungan : salbutamol 4 mg Dosis lazim : Dewasa dan anak-anak usia &gt;12 tahun: 2–4 mg, 3–4 kali sehari Kegunaan : meredakan gejala asma dan gangguan pernapasan lainnya, seperti bronkitis dan chronic obstructive pulmonary disease ESO potensial : Efek samping yang mungkin timbul setelah menggunakan salbutamol adalah pusing, sakit kepala, batuk, gelisah, tangan dan kaki gemetar, dan nyeri otot. Efek samping ini umumnya ringan dan bisa hilang dengan sendirinya KI : Hipersensitif salbutamol</p>
<p>Nama Obat : ambroxol Kandungan : Tablet ambroxol 30 mg Dosis lazim : Dewasa: kapsul lepas lambat 1 kali sehari 75 mg, sesudah makan. Dewasa dan anak di atas 12 tahun:1 tablet (30 mg) 2-3 kali sehari; Anak 6-12 tahun: 1/2 tablet 2-3 kali sehari. Kegunaan : digunakan sebagai pengencer dahak dan pelega saluran pernapasan ESO potensial : Sakit perut, heartburn, atau sakit maag. KI : Tidak ada kontraindikasi yang absolut terkait konsumsi Ambroxol.</p>	<p>Nama Obat : Salbutamol Kandungan : salbutamol 4 mg Dosis lazim : Dewasa dan anak-anak usia &gt;12 tahun: 2–4 mg, 3–4 kali sehari Kegunaan : meredakan gejala asma dan gangguan pernapasan lainnya, seperti bronkitis dan chronic obstructive pulmonary disease ESO potensial : Efek samping yang mungkin timbul setelah menggunakan salbutamol adalah pusing, sakit kepala, batuk, gelisah, tangan dan kaki gemetar, dan nyeri otot. Efek samping ini umumnya ringan dan bisa hilang dengan sendirinya KI : Hipersensitif salbutamol</p>			

		<p>PERHATIAN : HARUS DENGAN RESEP DOKTER                  Cara penyimpanan : Simpan Ambroxol pada suhu di bawah 30 derajat Celsius, di tempat kering, dan sejuk.</p>	<p>PERHATIAN : Obat Wajib Apotek, Obat ini dapat dibeli dan diserahkan apoteker tanpa resep dengan maksimum 2 Strip. Pembelian melebihi batas ini WAJIB RESEP DOKTER                  Cara penyimpanan : simpan pada suhu ruangan dan jauhkan dari cahaya langsung dan tempat lembab.</p>
		<p>Nama Obat : tramenza                  Kandungan : Pseudoephedrine HCl dan Triprolidine HCl.                  Dosis lazim : Dewasa dan anak di atas 12 tahun: dosisnya 1 tablet digunakan 3 - 4 kali per hari.                  Kegunaan : meringankan gejala-gejala flu                  ESO potensial : Kondisi hiperreaktif: takikardia, palpitasi, sakit kepala, pusing, atau mual.                  KI : Penyakit saluran napas bawah, termasuk asma. Glaukoma, hipertensi, diabetes, penyakit arteri koroner, terapi MAOI                  PERHATIAN : Awas, Obat Keras Bacalah Aturan Pakainya                  Cara penyimpanan : disimpan pada suhu ruangan, jauhkan dari cahaya langsung dan tempat yang lembap.</p>	<p>Nama Obat : Dextamin                  Kandungan : Dexamethasone (glukokortikoid) dan Dexchlorpheniramine Maleate                  Dosis lazim : PENGGUNAAN OBAT INI HARUS SESUAI DENGAN PETUNJUK DOKTER. Dewasa : 1 tablet, 3 kali per hari. Anak : 1/2 tablet, 3 kali per hari.                  Kegunaan : antiinflamasi, antirematik, serta antialergi/antihistamin                  ESO potensial : Pemakaian obat umumnya memiliki efek samping tertentu dan sesuai dengan masingmasing individu. Jika terjadi efek samping yang berlebih dan berbahaya, harap konsultasikan kepada tenaga medis                  KI : hipersensitif PERHATIAN : HARUS DENGAN RESEP DOKTER</p>
		<p>Nama Obat : Cetirizine                  Kandungan : mengandung cetirizine 10mg</p>	


		<p>Dosis lazim : -anak – anak usia &gt;6 tahun : -1 kaplet (10mg) 1 kali sehari -Dewasa &amp; anak &gt; 12 tahun 5 mg 1 kali sehari. Gangguan hati atau ginjal awal 5 mg setiap hari. Sesudah makan</p> <p>Kegunaan : untuk pengobatan rhinitis perennial, rintis alergi, urtaria idiopatik kronis.</p> <p>ESO potensial : Perasaan mengantuk, pusing-pusing, sakit kepala, gelisah, mulut kering dan gangguan saluran pencernaan</p> <p>KI : Hipersensitivitas terhadap cetirizine, Ibu menyusui</p> <p>PERHATIAN : Obat ini dapat dibeli dan diserahkan apoteker tanpa resep dengan maksimum 1 Strip. Pembelian melebihi batas ini WAJIB RESEP DOKTER. Antihistamin yang menyebabkan kantuk mempunyai aktivitas antimuskarinik yang nyata dan harus digunakan dengan hati-hati pada pasien dengan peningkatan risiko retensi urin (misalnya lesi sumsum tulang belakang, hiperplasia prostat), pasien epilepsi dan pasien dengan risiko kejang. Gangguan hati dan ginjal ringan sampai sedang. Anak dan lansia lebih mudah mendapat efek samping. Penggunaan pada anak di bawah 2 tahun tidak dianjurkan kecuali atas petunjuk dokter dan tidak boleh</p>	
--	--	---	--



		<p>digunakan pada neonatus. Kategori kehamilan: Kategori B: Mungkin dapat digunakan oleh wanita hamil. Obat dapat diekskresikan melalui ASI, konsultasikan kepada tenaga medis apabila sedang menyusui.                  Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah 30°C</p>	
		<p>F. Tahap pembuatan</p> <p>R/ - Siapkan alat dan bahan                  - Masukkan ambroxol, salbutamol, tremenza, dextamin, cetirizine ditambah sedikit gula kedalam blender.                  -keluarkan dari blender lalu di ayak.                  - Bagi puyer sebanyak 15 puyer diatas sendok puyer, lalu masukkan puyer kedalam kertas perkamen                  - puyer kemudian dipress menggunakan alat press                  - menulis etiket lalu masukan kedalam plastik klip</p>	
		<p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Apt : Pasien atas nama Ikhlas Taqy Ramadhan                  Pasien : iya mbak                  Apt : Dengan pasien ikhlas taqy ramadhan                  Pasien : iyh mba saya ibunya                  Apt : Berapa tanggal lahir anaknya bu?                  Pasien : 18 april 2021                  Apt : Baik bu, saya jelaskan obatnya dulu ya bu, ini obatnya ada 1 macam bu yaitu puyer untuk batuk pilek, ada 15 puyer ya bu diminum 3 kali sehari 1 puyer setelah makan ya bu. Apa ada yang di tanyakan atau kurang jela bu dari penjelasan saya ?                  Pasien : sudah jelas mbak, terimakasih                  Apt : terimakasih kembali bu, semoga lekas sembuh</p>	

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep		
17*	<p>Jenis Resep : Resep asli                      Resep obat : Racikan                      Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (&gt;/Tidak                      Pengulangan resep :</p> <p><b>Resep Racikan anak</b></p> 	a. Skrinning Administrasi		
		Nama Pasien :	Ada	Ikhlas Taqy Ramadhan
		Umur pasien :	Ada	2 tahun 9 bulan 7 hari
		Berat Badan :	Tidak Ada	-
		Nama Obat :	Ada	R/ Ambroxol Salbutamol Tremenza Dextamin Cetirizine
		Kekuatan :	Ada	R/ Ambroxol 4 mg Salbutamol 0,6 mg Tremenza 1/5 tab Dextamin 1/3 tab Cetirizine 2 mg
		Bentuk sed. :	Ada	R/Ambroxol tablet Salbutamol tablet Tremenza tablet Dextamin tablet Cetirizine tablet
		Jumlah obat :	Ada	R/ Ambroxol 4 Salbutamol 0,6 Tremenza 1/5 Dextamin 1/3 Cetirizine 2 M. F. Pulv. dtd No XV
		Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-
		Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	R/ Ambroxol 4 Salbutamol 0,6

				Tremenza 1/5 Dextamin 1/3 Cetirizine 2 M. F. Pulv. dtd No XV S 3 dd 1 (3 kali sehari 1 puyer)
		Tanggal penulisan resep :	Ada	04 – 02 – 2024
		Nama dokter :	Ada	
		Surat ijin :	Tidak Ada	
		Alamat dr. :	Ada	
		b. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi		
		$R/ \text{ Ambroxol} = \frac{4}{30} \times 15 = 2 \text{ tab}$ $\text{Salbutamol} = \frac{0,6}{2} \times 15 = 5 \text{ tab}$ $\text{Termenza} = \frac{1}{5} \times 15 = 3 \text{ tab}$ $\text{Dextamin} = \frac{1}{3} \times 15 = 5 \text{ tab}$ $\text{Cetirizine} = \frac{2 \text{ mg}}{10 \text{ mg}} \times 15 = 3 \text{ tab}$		
		c. Perhitungan biaya resep <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ambroxol = Rp 500 x 2 tab = Rp 1000</li> <li>2. Salbutamol = Rp 300 x 5 tab = Rp 1.500</li> <li>3. Termenza = Rp 2.100 x 3 tab = Rp 6.300</li> <li>4. Dextamin = Rp 2.200 x 5 tab = Rp 11.000</li> <li>5. Cetirizine = Rp 500 x 3 tab = Rp 1.500</li> <li>6. TUS Kertas Puyer = 100 x 15 = 1.500</li> <li>Total semua = Rp 22.800</li> </ol>		

		<p>d. ETIKET                  Nama Obat /warna etiket : Batuk pilek / Putih</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;">  <p style="text-align: center;"><b>APOTEK BERKAH</b>                      JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden                      Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707</p> </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nama : Ikhlas Taqy Ramadhan</td> <td style="width: 50%;">TGL: 04-02-2024</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ED: 04-03-2024</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">NAMA OBAT: Batuk Pilek</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>3 x SEHARI 1 PCS / ML / SENDOK TAKAR / MAKAN                  SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN</b></p> <p>e. <i>Product knowledge</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p>Nama Obat : ambroxol                      Kandungan : Tablet ambroxol 30 mg                      Dosis lazim : Dewasa: kapsul lepas lambat 1 kali sehari 75 mg, sesudah makan. Dewasa dan anak di atas 12 tahun:1 tablet (30 mg) 2-3 kali sehari; Anak 6-12 tahun: 1/2 tablet 2-3 kali sehari.                      Kegunaan : digunakan sebagai pengencer dahak dan pelega saluran pernapasan                      ESO potensial : Sakit perut, heartburn, atau sakit maag.</p> </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p>Nama Obat : Salbutamol                      Kandungan : salbutamol 4 mg                      Dosis lazim : Dewasa dan anak-anak usia &gt;12 tahun: 2–4 mg, 3–4 kali sehari                      Kegunaan : meredakan gejala asma dan gangguan pernapasan lainnya, seperti bronkitis dan chronic obstructive pulmonary disease                      ESO potensial : Efek samping yang mungkin timbul setelah menggunakan salbutamol adalah pusing, sakit kepala, batuk, gelisah, tangan dan kaki gemetar, dan nyeri otot.</p> </td> </tr> </table>	Nama : Ikhlas Taqy Ramadhan	TGL: 04-02-2024		ED: 04-03-2024	NAMA OBAT: Batuk Pilek		<p>Nama Obat : ambroxol                      Kandungan : Tablet ambroxol 30 mg                      Dosis lazim : Dewasa: kapsul lepas lambat 1 kali sehari 75 mg, sesudah makan. Dewasa dan anak di atas 12 tahun:1 tablet (30 mg) 2-3 kali sehari; Anak 6-12 tahun: 1/2 tablet 2-3 kali sehari.                      Kegunaan : digunakan sebagai pengencer dahak dan pelega saluran pernapasan                      ESO potensial : Sakit perut, heartburn, atau sakit maag.</p>	<p>Nama Obat : Salbutamol                      Kandungan : salbutamol 4 mg                      Dosis lazim : Dewasa dan anak-anak usia &gt;12 tahun: 2–4 mg, 3–4 kali sehari                      Kegunaan : meredakan gejala asma dan gangguan pernapasan lainnya, seperti bronkitis dan chronic obstructive pulmonary disease                      ESO potensial : Efek samping yang mungkin timbul setelah menggunakan salbutamol adalah pusing, sakit kepala, batuk, gelisah, tangan dan kaki gemetar, dan nyeri otot.</p>
Nama : Ikhlas Taqy Ramadhan	TGL: 04-02-2024									
	ED: 04-03-2024									
NAMA OBAT: Batuk Pilek										
<p>Nama Obat : ambroxol                      Kandungan : Tablet ambroxol 30 mg                      Dosis lazim : Dewasa: kapsul lepas lambat 1 kali sehari 75 mg, sesudah makan. Dewasa dan anak di atas 12 tahun:1 tablet (30 mg) 2-3 kali sehari; Anak 6-12 tahun: 1/2 tablet 2-3 kali sehari.                      Kegunaan : digunakan sebagai pengencer dahak dan pelega saluran pernapasan                      ESO potensial : Sakit perut, heartburn, atau sakit maag.</p>	<p>Nama Obat : Salbutamol                      Kandungan : salbutamol 4 mg                      Dosis lazim : Dewasa dan anak-anak usia &gt;12 tahun: 2–4 mg, 3–4 kali sehari                      Kegunaan : meredakan gejala asma dan gangguan pernapasan lainnya, seperti bronkitis dan chronic obstructive pulmonary disease                      ESO potensial : Efek samping yang mungkin timbul setelah menggunakan salbutamol adalah pusing, sakit kepala, batuk, gelisah, tangan dan kaki gemetar, dan nyeri otot.</p>									


		<p>KI : Tidak ada kontraindikasi yang absolut terkait konsumsi Ambroxol.  <b>PERHATIAN : HARUS DENGAN RESEP DOKTER</b>                  Cara penyimpanan : Simpan Ambroxol pada suhu di bawah 30 derajat Celsius, di tempat kering, dan sejuk.</p>	<p>Efek samping ini umumnya ringan dan bisa hilang dengan sendirinya                  KI : Hipersensitif salbutamol  <b>PERHATIAN : Obat Wajib Apotek,</b> Obat ini dapat dibeli dan diserahkan apoteker tanpa resep dengan maksimum 2 Strip. Pembelian melebihi batas ini <b>WAJIB RESEP DOKTER</b>                  Cara penyimpanan : simpan pada suhu ruangan dan jauhkan dari cahaya langsung dan tempat lembab.</p>
		<p>Nama Obat : tramenza                  Kandungan : Pseudoephedrine HCl dan Triprolidine HCl.                  Dosis lazim : Dewasa dan anak di atas 12 tahun: dosisnya 1 tablet digunakan 3 - 4 kali per hari.                  Kegunaan : meringankan gejala-gejala flu                  ESO potensial : Kondisi hiperreaktif: takikardia, palpitasi, sakit kepala, pusing, atau mual.                  KI : Penyakit saluran napas bawah, termasuk asma. Glaukoma, hipertensi, diabetes, penyakit arteri koroner, terapi MAOI  <b>PERHATIAN : Awas, Obat Keras</b>                  Bacalah Aturan Pakainya                  Cara penyimpanan : disimpan pada suhu ruangan, jauhkan dari cahaya langsung dan tempat yang lembap.</p>	<p>Nama Obat : Dextamin                  Kandungan : Dexamethasone (glukokortikoid) dan Dexchlorpheniramine Maleate                  Dosis lazim : <b>PENGGUNAAN OBAT INI HARUS SESUAI DENGAN PETUNJUK DOKTER.</b> Dewasa : 1 tablet, 3 kali per hari. Anak : 1/2 tablet, 3 kali per hari.                  Kegunaan : antiinflamasi, antirematik, serta antialergi/antihistamin                  ESO potensial : Pemakaian obat umumnya memiliki efek samping tertentu dan sesuai dengan masingmasing individu. Jika terjadi efek samping yang berlebih dan berbahaya, harap konsultasikan kepada tenaga medis                  KI : hipersensitif <b>PERHATIAN : HARUS DENGAN RESEP DOKTER</b></p>
		<p>Nama Obat : Cetirizine</p>	



		<p>Kandungan : mengandung cetirizine 10mg Dosis lazim : -anak – anak usia &gt;6 tahun : -1 kaplet (10mg) 1 kali sehari -Dewasa &amp; anak &gt; 12 tahun 5 mg 1 kali sehari. Gangguan hati atau ginjal awal 5 mg setiap hari. Sesudah makan Kegunaan : untuk pengobatan rhinitis perennial, rintis alergi, urtaria idiopatik kronis. ESO potensial : Perasaan mengantuk, pusing-pusing, sakit kepala, gelisah, mulut kering dan gangguan saluran pencernaan KI : Hipersensitivitas terhadap cetirizine, Ibu menyusui PERHATIAN : Obat ini dapat dibeli dan diserahkan apoteker tanpa resep dengan maksimum 1 Strip. Pembelian melebihi batas ini WAJIB RESEP DOKTER. Antihistamin yang menyebabkan kantuk mempunyai aktivitas antimuskarinik yang nyata dan harus digunakan dengan hati-hati pada pasien dengan peningkatan risiko retensi urin (misalnya lesi sumsum tulang belakang, hiperplasia prostat), pasien epilepsi dan pasien dengan risiko kejang. Gangguan hati dan ginjal ringan sampai sedang. Anak dan lansia lebih mudah mendapat efek samping. Penggunaan pada anak di bawah 2</p>	
--	--	--	--

		<p>tahun tidak dianjurkan kecuali atas petunjuk dokter dan tidak boleh digunakan pada neonatus. Kategori kehamilan: Kategori B: Mungkin dapat digunakan oleh wanita hamil. Obat dapat diekskresikan melalui ASI, konsultasikan kepada tenaga medis apabila sedang menyusui. Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah 30°C</p>	
		<p>f. Tahap pembuatan</p> <p>R/ - Siapkan alat dan bahan - Masukkan ambroxol, salbutamol, tremenza, dextamin, cetirizine ditambah sedikit gula kedalam blender. -keluarkan dari blender lalu di ayak. - Bagi puyer sebanyak 15 puyer diatas sendok puyer, lalu masukkan puyer kedalam kertas perkamen - puyer kemudian dipress menggunakan alat press - menulis etiket lalu masukan kedalam plastik klip</p>	
		<p>g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Apt : Pasien atas nama Ikhlas Taqy Ramadhan Pasien : iya mbak Apt : Dengan pasien ikhlas taqy ramadhan Pasien : iyh mba saya ibunya Apt : Berapa tanggal lahir anaknya bu? Pasien : 18 april 2021</p>	

		<p>Apt : Baik bu, saya jelaskan obatnya dulu ya bu, ini obatnya ada 1 macam bu yaitu puyer untuk batuk pilek, ada 15 puyer ya bu diminum 3 kali sehari 1 puyer setelah makan ya bu. Apa ada yang di tanyakan atau kurang jela bu dari penjelasan saya ?</p> <p>Pasien : sudah jelas mbak, terimakasih</p> <p>Apt : terimakasih kembali bu, semoga lekas sembuh</p>
--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
18*	<p>Jenis Resep : resep asli                      Resep obat : racikan                      Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (&gt;/Tidak                      Pengulangan resep :</p> <p><b>Resep Racikan dewasa</b></p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1014 261 1975 1262"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Sjafii</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Levocin Codein MP 4 Cetirizin</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>ada</td> <td>Codein 10 MP 4</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>Levocin No.V Codein 10 MP 4 Cetirizin 1/2</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>Levocin No.V S 1x1 Codein 10 MP 4 Cetirizin ½ Mfla pulv da in cap No XLV</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada</td> <td>05- 02 - 24</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada</td> <td>dr.Achmad Nurdin, Sp.P</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jl. KH. Kholil 88 Gresik</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p>	Nama Pasien :	Ada	Sjafii	Umur pasien :	Tidak Ada	-	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Levocin Codein MP 4 Cetirizin	Kekuatan :	ada	Codein 10 MP 4	Bentuk sed. :	Tidak ada	-	Jumlah obat :	Ada	Levocin No.V Codein 10 MP 4 Cetirizin 1/2	Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada	Levocin No.V S 1x1 Codein 10 MP 4 Cetirizin ½ Mfla pulv da in cap No XLV	Tanggal penulisan resep :	Ada	05- 02 - 24	Nama dokter :	Ada	dr.Achmad Nurdin, Sp.P	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jl. KH. Kholil 88 Gresik
Nama Pasien :	Ada	Sjafii																																							
Umur pasien :	Tidak Ada	-																																							
Berat Badan :	Tidak Ada	-																																							
Nama Obat :	Ada	Levocin Codein MP 4 Cetirizin																																							
Kekuatan :	ada	Codein 10 MP 4																																							
Bentuk sed. :	Tidak ada	-																																							
Jumlah obat :	Ada	Levocin No.V Codein 10 MP 4 Cetirizin 1/2																																							
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada	Levocin No.V S 1x1 Codein 10 MP 4 Cetirizin ½ Mfla pulv da in cap No XLV																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada	05- 02 - 24																																							
Nama dokter :	Ada	dr.Achmad Nurdin, Sp.P																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jl. KH. Kholil 88 Gresik																																							

Levocin yang dibutuhkan 10  
Codein  $10 \times 45 = 450 : 15 = 30$  Tab  
MP  $4 \times 45 = 180 : 4 = 45$   
Cetirizin  $\frac{1}{2} \times 45 = 22,5$  tab

c. Perhitungan biaya resep

Levocin 1 strip 50.000  
Codein 3 strip  $20.000 \times 3 = 60.000$   
MP 4 1 strip = 6.500  
Cetirizin 1 strip = 5000  
cangkang kapsul  $150 \times 45 = 6.750$   
Total biaya Rp. 128.250

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket :Levocin /putih



**APOTEK BERKAH**

JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel.  
Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp  
081324097707

NAMA : Sjafii

TGL: 05-02-2024

ED: 23 / 02 / 2027


NAMA OBAT: Levocin

**HABISKAN**

**1 x SEHARI 2 TAB / ML / SENDOK TAKAR / MAKAN  
SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN**

Nama Obat /warna etiket : kapsul /putih



		<p style="text-align: center;"><b>APOTEK BERKAH</b>                    JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel.                  Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp                  081324097707</p> <p>NAMA : Sjafii <span style="float: right;">TGL: 05-02-2024</span>  <span style="float: right;">ED: 05 / 03 / 2024</span>                  NAMA OBAT: Batuk berdahak</p> <p style="text-align: center;"><del>2 x SEHARI 1 KAPS / ML / SENDOK TAKAR / MAKAN</del>  <del>SEBELUM / SAAT / SESUDAH-MAKAN</del></p>	
		<p><i>e. Product knowledge</i></p> <p>Nama Obat : Codein                  Kandungan : Codein                  Dosis lazim : Untuk mengatasi nyeri ringan dan sedang pada orang dewasa, codeine 30–60 mg tiap 4 jam dapat diberikan bila perlu. Dosis maksimal adalah 240 mg/hari.                  Kegunaan : untuk meredakan nyeri ringan hingga sedang dan untuk menangani batuk kering yang disertai nyeri.                  ESO potensial : bronkospasme, laringospasme, depresi pernapasan, dyspnea, dan reaksi anafilaksis akibat obat.                  KI : Penggunaan codeine pada anak-anak berusia &lt;12 tahun dikontraindikasikan karena ada bukti surveilans tentang risiko depresi napas dan kematian.</p>	<p>Nama Obat : Metylprednisolon                  Kandungan : Metyl prednisolone 4mg                  Dosis lazim : Dosis awal : Dewasa : 4 - 80 mg/hari. Anak : 0.8 - 1.1 mg/kg BB. Dosis pemeliharaan : Dewasa : 4 - 8 mg/hari dosis ditingkatkan menjadi 16 mg/hari. Anak : 2 - 4 mg/hari, dapat ditingkatkan sampai 8 mg/hari. Dosis substitusi : 4 - 8 mg/hari, dalam keadaan stres ditingkatkan menjadi 16 mg/hari                  Kegunaan : -                  ESO potensial : miopati akut, sarkoma Kaposi, gangguan kejiwaan (misalnya depresi, euforia, insomnia, perubahan suasana hati, perubahan kepribadian), peningkatan kerentanan dan keparahan infeksi, gangguan penyembuhan, HTN, Na dan retensi cairan, kolaps CV (dosis tinggi), tukak lambung, katarak subkapsular, atrofi</p>


		<p>Perhatian: Pemakaian codeine berisiko menyebabkan penyalahgunaan maupun adiksi opiat.</p> <p>Cara penyimpanan : : Simpan pada suhu dibawah 30°C</p>	<p>kulit, jerawat, kelemahan otot, retardasi pertumbuhan, penurunan K darah; depresi kulit dermal/subdermal pada tempat inj.</p> <p>Topikal: Gatal, eritema terbakar, vesikulasi; jarang, folikulitis, hipertrikosis, dermatitis perioral, perubahan warna kulit, reaksi alergi pada kulit.</p> <p>KI : Infeksi jamur sistemik kecuali terapi antiinfeksi spesifik digunakan; Admin IM pada purpura trombositopenik idiopatik. Admin intratekal. Pemberian vaksin hidup atau hidup yang dilemahkan secara bersamaan (pada pasien yang menerima dosis immunosupresif).</p> <p>PERHATIAN : Hati-hati pada Pasien dg gagal jantung, hipertensi, DM, penyakit GI (misalnya divertikulitis, anastomosis usus, tukak lambung, kolitis ulserativa), sklerosis multipel, miastenia gravis, infark miokard akut, katarak, glaukoma, osteoporosis, riwayat gangguan kejang, penyakit tiroid. Hindari perubahan dosis mendadak. Gangguan ginjal dan hati (termasuk sirosis). Anak. Kehamilan dan menyusui. Pantau TD, glukosa darah, elektrolit, pertumbuhan pada anak. Kategori Kehamilan : Kategori C: Mungkin berisiko. Obat digunakan dengan hati-hati apabila besarnya manfaat yang diperoleh melebihi besarnya risiko terhadap janin. Penelitian pada hewan uji menunjukkan risiko terhadap janin dan belum terdapat penelitian langsung terhadap wanita hamil.</p> <p>Kontra Indikasi</p>
--	--	--	---

		<p>Nama Obat : Levocin                  Kandungan : Levofloxacin                  Dosis lazim : Dewasa: 500 mg sekali sehari selama 7-10 hari Pneumonia Dewasa: 500 mg sekali sehari selama 7-14 hari Prostatitis bakteri kronis Dewasa: 500 mg sekali sehari selama 28 hari Infeksi saluran kemih Dewasa: 500 mg sekali sehari selama 7- 14 hari Pengobatan dan profilaksis pasca pajanan antraks inhalasi Dewasa: 500 mg sekali sehari selama 8 minggu. Anak 6 bulan dengan berat &lt;50 kg: 8 mg/kg hingga maksimal 250 mg setiap 12 jam, Anak 6 bulan dengan berat 50 kg: 500 mg 24 jam. Semua dosis harus diberikan selama 60 hari.                  Kegunaan : Kegunaan Infeksi sinusitis maksilaris akut, eksaserbasi bakterial akut pada bronkitis kronik, pneumonia komunitas (community-acquired pneumonia), uncomplicated skin dan skin structure infections, infeksi saluran kemih kompleks (complicated urinary tract infection), dan pielonefritis akut karena mikroorganisme yang sensitif.                  KI : Hipersensitif terhadap levofloxacin atau kuinolon lainnya, epilepsi, riwayat gangguan tendon yang berhubungan dengan penggunaan fluoroquinolone sebelumnya.                  PERHATIAN : penggunaan pada pasien dengan riwayat interval QT yang memanjang, gangguan elektrolit yang tidak</p>	<p>Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah 30°C                  Nama Obat : Cetirizine                  Kandungan : mengandung cetirizine 10mg                  Dosis lazim : -anak – anak usia &gt;6 tahun : -1 kaplet (10mg) 1 kali sehari -Dewasa &amp; anak &gt; 12 tahun 5 mg 1 kali sehari. Gangguan hati atau ginjal awal 5 mg setiap hari. Sesudah makan                  Kegunaan : untuk pengobatan rhinitis perennial, rintis alergi, urtaria idiopatik kronis.                  ESO potensial : Perasaan mengantuk, pusing-pusing, sakit kepala, gelisah, mulut kering dan gangguan saluran pencernaan                  KI : Hipersensitivitas terhadap cetirizine, Ibu menyusui                  PERHATIAN : Obat ini dapat dibeli dan diserahkan apoteker tanpa resep dengan maksimum 1 Strip. Pembelian melebihi batas ini WAJIB RESEP DOKTER. Antihistamin yang menyebabkan kantuk mempunyai aktivitas antimuskarinik yang nyata dan harus digunakan dengan hati-hati pada pasien dengan peningkatan risiko retensi urin (misalnya lesi sumsum tulang belakang, hiperplasia prostat), pasien epilepsi dan pasien dengan risiko kejang. Gangguan hati dan ginjal ringan</p>
--	--	--	---



		<p>dikoreksi (misalnya hipokalemia), faktor risiko yang menjadi predisposisi kejang atau menurunkan ambang kejang, aneurisma dan/atau diseksi aorta yang sudah ada sebelumnya, defek laten atau aktual pada G6PD, diabetes mellitus, riwayat atau faktor risiko gangguan psikiatri, riwayat atau faktor risiko gangguan tendon, penyakit dasar yang parah (misalnya sepsis), hemoptisis (penghirupan), gangguan ginjal, anak-anak, lansia, ibu hamil dan menyusui Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah 30°C</p>	<p>sampai sedang. Anak dan lansia lebih mudah mendapat efek samping. Penggunaan pada anak di bawah 2 tahun tidak dianjurkan kecuali atas petunjuk dokter dan tidak boleh digunakan pada neonatus. Kategori kehamilan: Kategori B: Mungkin dapat digunakan oleh wanita hamil. Obat dapat diekskresikan melalui ASI, konsultasikan kepada tenaga medis apabila sedang menyusui. Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah 30°C</p>
		<p>f. Tahap pembuatan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ambil obat levocin pada rak obat sebanyak 1 strip</li><li>2. siapkan codein,mp,cetirizine lalu blender masukkan pada cangkang kapsul berjumlah 45</li><li>3. Tempelkan etiket pada kemasan obat</li><li>4. Masukkan kedalam kemasan plastic</li><li>5. Cek kembali kesesuaian obat yang di ambil dengan resep serta etiket yang tertempel pada kemasan obat</li></ol>	


	<p>g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Apt : Pasien atas nama Tn. Sjafii Pasien : iya mbak Apt : Baik bapak, saya jelaskan obatnya dulu ya bapak, ini obatnya ada 2 macam bu yaitu 1 antibiotik diminum sampai habis diminum sehari sekali, yang kedua obat batuk berdahak diminum 2 kali sehari diminum sesudah makan dua-duanya ya pak Apa ada yang di tanyakan atau kurang jelas bu dari penjelasan saya ? Pasien : sudah jelas mbak, terimakasih Apt : terimakasih kembali bapak, semoga lekas sembuh</p>
--	--



No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep		
19.*	<p>Jenis Resep : resep asli                      Resep obat : non racikan                      Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (&gt;/Tidak                      Pengulangan resep :</p> <p><b>Resep racikan dewasa</b></p> 	A. Skrinning Administrasi		
		Nama Pasien :	Ada	Sulastri
		Umur pasien :	Tidak Ada	-
		Berat Badan :	Tidak Ada	-
		Nama Obat :	Ada	Donperidone tab Omeprazole tab Paracetamol tab Diazepam tab Amitriptilin tab
		Kekuatan :	Ada	Paracetamol tab 400mg Diazepam tab 2mg Amitriptilin tab 5mg
		Bentuk sed. :	Ada	Donperidone tab Omeprazole tab Paracetamol tab Diazepam tab Amitriptilin tab
		Jumlah obat :	Ada	Donperidone tab No. X Omeprazole tab No. X Paracetamol tab 400mg Diazepam tab 2mg Amitriptilin tab 5mg
		Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
		Aturan pakai :	Ada	Donperidone tab S 3x1  Omeprazole tab S 2x1  Paracetamol tab 400mg Diazepam 2mg tab

				Amitriptilin tab 5mg <i>Mfla pulv da in cap No. X</i> S 3x1
		Tanggal penulisan resep :	Ada	11- 2 - 24
		Nama dokter :	Ada	Dr. Lailatul Inayah
		Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-
		Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jl. KH. Kholil 88 Gresik
		B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi		
		Donperidone 10 tab Omeprazole 10 tab Paracetamol tab 400mg = $400 \times 10 : 500 = 8$ tab Diazepam tab 2mg = $2 \times 10 : 2 = 10$ tab Amitriptilin tab 5mg = $5 \times 10 : 5 = 10$ tab		
		c. Perhitungan biaya resep		
		Donperidone tab = 3.000 Omeprazole tab = 6.000 Paracetamol tab = 3.000 Diazepam tab = 20.000 Amitriptilin tab = 35.000 Kertas puyer = $100 \times 10 = 1.000$ Total semua = 68.000		

	d. ETIKET Nama Obat /warna etiket :Donperidone/putih
	 <b>APOTEK BERKAH</b> JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707
	NAMA : Sulastri TGL: 12-02-2024 ED: 23 / 02 / 2027 NAMA OBAT: Donperidone  3 x SEHARI 1 TAB / <del>ML</del> / <del>SENDOK TAKAR</del> / <del>MAKAN</del> <del>SEBELUM</del> / <del>SAAT</del> / <del>SESUDAH MAKAN</del>
	Nama Obat /warna etiket :omeprazole/putih
	 <b>APOTEK BERKAH</b> JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707
	NAMA : Sulastri TGL: 11-02-2024 ED: 20 / 05 / 2027 NAMA OBAT: Omeprazole  2 x SEHARI 1 KAPS / <del>ML</del> / <del>SENDOK TAKAR</del> / <del>MAKAN</del> <del>SEBELUM</del> / <del>SAAT</del> / <del>SESUDAH MAKAN</del>
	Nama Obat /warna etiket : Amitriptylin/putih

		 <p><b>APOTEK BERKAH</b>                  JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden                  Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707</p>	
		<p>NAMA : Sulastri                  TGL: 11-02-2024                  ED: 21/ 03 / 2024                  Obat Nyeri</p> <p><u>3 x SEHARI 1 KAPS / ML / SENDOK TAKAR / MAKAN                  SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN</u></p>	
<p>e. <i>Product knowledge</i></p>			
		<p>Nama Obat : Omeprazole                  Kandungan : Omeprazole 20 mg                  Dosis lazim : Tukak                  Lambung/duodenum krn NSAID:                  Dewasa: 20 mg 1 kali sehari hingga 8 minggu Eradikasi H.Pylori: Dewasa: 20 mg 2 kali sehari/ 40 mg 1 kali sehari, selama 1 minggu (dikombinasi dengan antibiotik) Anak: &gt;4 tahun, 15-30 kg: 10 mg 2 kali sehari. &gt; 4 tahun, 31-40 kg: 20 mg 1 kali sehari. selama 1 minggu (dikombinasi dengan antibiotik)                  Tukak Peptik/ Peptic Ulcer: Dewasa: Pengobatan: 20-40 mg 1 kali sehari, selama 4 minggu (ulkus duodenum) dan 8 minggu (ulkus lambung).                  Kegunaan : Pengobatan jangka pendek untuk tukak lambung dan tukak</p>	<p>Nama Obat : Paracetamol                  Kandungan : Paracetamol 500 mg                  Dosis lazim : Dewasa dan anak &gt;12 tahun: 1 tablet, 3-4 kali per hari. Anak: 1/2 - 1 tablet, 3-4 kali sehari. Atau sesuai petunjuk dokter.                  Kegunaan : untuk meringankan rasa sakit pada keadaan sakit kepala, sakit gigi dan menurunkan demam.                  ESO potensial : Pemakaian obat umumnya memiliki efek samping tertentu dan sesuai dengan masing-masing individu. Jika terjadi efek samping yang berlebih dan berbahaya, harap konsultasikan kepada tenaga medis. Efek samping yang mungkin terjadi dalam penggunaan obat adalah: Hematologi, reaksi kulit, reaksi alergi</p>

		<p>duodenum, tukak lambung dan duodenum yang terkait dengan AINS, lesi lambung dan duodenum, regimen eradikasi H. pylori pada tukak peptik, refluks esofagitis, Sindrom Zollinger Ellison</p> <p>ESO potensial : Mual, muntah, diare, konstipasi, perut kembung, sakit perut. Gangguan umum dan kondisi tempat pemberian: Kelemahan, malaise. Gangguan hepatobilier: Peningkatan enzim hati. Gangguan sistem kekebalan: Urtikaria. Gangguan metabolisme dan nutrisi: Edema perifer</p> <p>KI : Omeprazole dikontraindikasikan untuk pasien yang diketahui hipersensitivitas terhadap obat ini atau bahan lain yang terdapat dalam formulasi. Penggunaan dengan nelfinavir.</p> <p>Perhatian: HARUS DENGAN RESEP DOKTER. Perhatian khusus pada Pasien dengan penurunan simpanan tubuh atau faktor risiko penurunan penyerapan vitamin B12; risiko osteoporosis. Gangguan hati. Anak-anak, orang tua Kategori kehamilan Kategori C: Mungkin berisiko. Obat digunakan dengan hati-hati apabila besarnya manfaat yang diperoleh melebihi besarnya risiko terhadap janin. Penelitian pada hewan uji menunjukkan</p>	<p>lainnya, kerusakan hati (penggunaan jangka panjang dan overdosis).</p> <p>KI : Penderita gangguan fungsi hati yang berat. Hipersensitivitas terhadap Paracetamol.</p> <p>PERHATIAN : Hati-hati penggunaan obat ini pada penderita penyakit ginjal. Bila setelah 2 hari demam tidak menurun atau setelah 5 hari nyeri tidak menghilang, segera hubungi Unit Pelayanan Kesehatan. Penggunaan obat ini pada penderita yang mengkonsumsi alkohol, dapat meningkatkan risiko kerusakan fungsi hati.</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah 30°C</p>
--	--	--	---



		<p>risiko terhadap janin dan belum terdapat penelitian langsung terhadap wanita hamil. Konsultasikan kepada tenaga medis apabila sedang menyusui.                  Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah 30°C</p>	
		<p>Nama Obat : Donperidone                  Kandungan : Donperidone                  Dosis lazim :  <b>PENGGUNAAN OBAT INI HARUS SESUAI DENGAN PETUNJUK DOKTER.</b> Dewasa: 10 mg, 3 kali sehari. Maks: 30 mg setiap hari. Durasi perawatan maksimal: 7 hari. Gunakan dosis efektif terendah untuk durasi sesingkat mungkin. Anak: Anak umur &lt;12 tahun &lt;35 kg: 0,25 mg/kg diberikan hingga 3 kali sehari. Maks: 0,75 mg/kg setiap hari. Anak umur 12 tahun 35 kg: Sama seperti dosis dewasa.                  Kegunaan :  <b>INFORMASI OBAT INI HANYA UNTUK KALANGAN MEDIS.</b> Mual &amp; muntah akut serta dispepsia fungsional. Pada anak diindikasikan untuk mual &amp; muntah yang disebabkan kemoterapi &amp; radioterapi untuk kanker                  ESO potensial :                  Pemakaian obat umumnya memiliki efek samping tertentu dan sesuai dengan masing-masing individu. Jika terjadi efek samping yang berlebih dan</p>	<p>Nama Obat : Amitriptilin tab                  Kandungan : Amitriptilin tab                  Dosis lazim : <b>Dewasa:</b> Dosis awal 25 mg, 2 kali sehari selama 2 minggu hingga 6 bulan. Dosis dapat ditingkatkan secara bertahap menjadi 50–150 mg per hari dalam dosis terbagi.  <b>Lansia:</b> 10–25 mg per hari, dikonsumsi pada malam hari. Dosis dapat ditingkatkan secara bertahap menjadi 100–150 mg per hari, sesuai dengan respons pasien terhadap pengobatan                  Kegunaan : Mengatasi depresi, nyeri saraf, migrain, dan kebiasaan mengompol pada anak-anak                  ESO potensial : Kantuk, Pusing, Mulut kering, Sulit buang air kecil, Kulit lebih mudah terbakar matahari (<i>sunburn</i>), Sakit perut, mual, atau muntah, Gatal atau ruam kulit, Nyeri atau bengkak pada payudara (pria maupun wanita), Penurunan libido atau gairah seksual                  KI : -  <b>PERHATIAN</b> : Laporkan gejala baru atau yang memburuk ke dokter Anda,</p>

		<p>berbahaya, harap konsultasikan kepada tenaga medis. Efek samping yang mungkin terjadi dalam penggunaan obat adalah: Signifikan: Peningkatan kadar prolaktin, reaksi hipersensitivitas (misalnya anafilaksis, angioedema). Jarang, efek samping neurologis atau ekstrapiramidal (pada anak-anak). Gangguan mata: Krisis okulogirik. Gangguan gastrointestinal: Mulut kering, diare, kram usus sementara. Gangguan umum dan kondisi situs admin: Asthenia. Gangguan sistem kekebalan: Urtikaria. Pemeriksaan penunjang: LFT abnormal. Gangguan sistem saraf: Sakit kepala, migrain, pusing, kejang-kejang. Gangguan kejiwaan: Kecemasan, agitasi, gugup, kehilangan libido, mengantuk. Gangguan ginjal dan kemih: Retensi urin. Sistem reproduksi dan gangguan payudara: Galaktorea, nyeri atau nyeri payudara, ginekomastia, amenore. Gangguan kulit dan jaringan subkutan: Ruam, pruritus. Berpotensi Fatal: Aritmia ventrikel yang serius, kematian jantung mendadak, perpanjangan interval QT, torsades de pointes.</p> <p>KI :</p> <p>Tumor hipofisis pelepas prolaktin (prolaktinoma), perpanjangan interval QTc yang ada, gangguan elektrolit yang</p>	<p>seperti: perubahan suasana hati atau perilaku, kecemasan, serangan panik, sulit tidur, atau jika Anda merasa impulsif, mudah tersinggung, gelisah, bermusuhan, agresif, gelisah, hiperaktif (secara mental atau fisik), dan sebagainya. depresi, atau mempunyai pikiran untuk bunuh diri atau melukai diri sendiri.</p> <p>Amitriptyline dapat memicu serangan glaukoma sudut tertutup pada pasien dengan sudut anatomi sempit yang tidak menjalani iridektomi paten</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah 30°C</p>
--	--	--	---


		<p>signifikan (misalnya hipokalemia, hipomagnesemia, hiperkalemia), penyakit jantung yang mendasari (misalnya CHF), perdarahan gastrointestinal, obstruksi mekanis atau perforasi. Gangguan hati sedang sampai berat. Penggunaan bersamaan dengan obat pemanjang QT, dan inhibitor CYP3A4 yang poten, mis. ketoconazole, makrolida (misalnya eritromisin), inhibitor protease, atau nefazodone</p> <p><b>PERHATIAN :</b> <b>HARUS DENGAN RESEP DOKTER.</b> Hati-hati pada pasien dengan riwayat pribadi atau keluarga kanker payudara, faktor risiko kematian jantung mendadak (misalnya riwayat keluarga penyakit arteri koroner, tekanan darah tinggi, kolesterol darah tinggi, diabetes mellitus, obesitas, merokok, konsumsi alkohol berlebihan). Gangguan ginjal dan hati ringan. Anak-anak dan lansia. Ibu hamil dan menyusui. Informasikan kpd pasien Obat ini dapat menyebabkan pusing dan mengantuk, jika terpengaruh, jangan mengemudi atau mengoperasikan mesin. Monitoring : EKG, fungsi ginjal pada awal dan secara berkala selama pengobatan. Kategori kehamilan : Kategori C: Mungkin berisiko. Obat digunakan</p>	
--	--	---	--

		<p>dengan hati-hati apabila besarnya manfaat yang diperoleh melebihi besarnya risiko terhadap janin. Penelitian pada hewan uji menunjukkan risiko terhadap janin dan belum terdapat penelitian langsung terhadap wanita hamil.</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah 30°C</p>	
		<p>Nama Obat: Kandungan: diazepam 5 mg Dosis Lazim: Dosis Dewasa: 2-10 miligram (mg), 2 sampai 4 kali sehari. Orang dewasa yang lebih tua: Awalnya, 2-2,5 mg, 1 atau 2 kali sehari. Dokter mungkin akan meningkatkan dosisnya bila perlu. Anak-anak usia 6 bulan ke atas: Awalnya, 1 hingga 2,5 mg, 3 atau 4 kali per hari. Dokter anak bisa meningkatkan dosis bila perlu Kegunaan: Mengobati gangguan kecemasan.Meredakan gejala yang terjadi akibat penarikan alkohol, seperti tremor, berkeringat atau sulit tidur. Mengatasi kejang dan kekakuan otot. Membantu pasien untuk rileks sebelum operasi atau perawatan medis atau gigi lainnya. Eso Potensial: Perubahan mental/suasana hati, seperti masalah</p>	



		<p>ingatan, agitasi, halusinasi, kebingungan, gelisah, depresi. Kesulitan berbicara. Kesulitan berjalan. Kelemahan otot. Gemetar (tremor). Kesulitan buang air kecil. Mata atau kulit menguning. Tanda-tanda infeksi, seperti sakit tenggorokan yang tidak kunjung sembuh, demam, menggigil KI : Pernah mengalami reaksi alergi terhadap diazepam atau obat lain. Memiliki masalah hati atau ginjal. Mengidap myasthenia gravis, suatu kondisi yang menyebabkan kelemahan otot. Mengidap sleep apnea, suatu kondisi yang menyebabkan masalah pernapasan saat tidur. Perhatian: bila kamu alergi terhadapnya, atau ke benzodiazepin lain (seperti oxazepam, temazepam), atau bila kamu memiliki alergi lainnya. Diazepam mungkin mengandung bahan tidak aktif, yang dapat menyebabkan reaksi alergi atau masalah Cara Penyimpanan: Simpan pada suhu dibawah 30°C</p>	
f. Tahap pembuatan			




		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ambil obat domperidone pada rak obat sebanyak 1 strip, omeprazole 1 strip dan siapkan paracetamol tab, diazepam dan amitriptylin lalu blender</li> <li>2. masukkan kedalam cangkang kapsul bagi menjadi 10 kapsul beri etiket</li> <li>3. Tempelkan etiket pada kemasan obat</li> <li>4. Masukkan kedalam kemasan plastic</li> <li>5. Cek kembali kesesuaian obat yang di ambil dengan resep serta etiket yang tertempel pada kemasan obat</li> </ol> </div> <p>g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Apt : Pasien atas nama Ny Sulastri                      Pasien : iya mbak                      Apt : Baik Ibu, saya jelaskan obatnya dulu ya ibu, ini obatnya ada 3 macam bu yaitu omeprazole untuk lambung diminum sebelum makan 2 kali sehari 1 tablet, donperidone untuk mual muntah diminum 3 kali sehari 1 tablet, dan ini kapsulnya untuk kejang diminum 3 kali sehari . Apa ada yang di tanyakan atau kurang jela bu dari penjelasan saya ?                      Pasien : sudah jelas mbak, terimakasih                      Apt : terimakasih kembali bapak, semoga lekas sembuh</p> </div>						
<p><b>No</b></p>	<p><b>Resep</b></p>	<p><b>Tahapan Pengerjaan Resep</b></p>						
<p>20*</p>	<p>Jenis Resep : resep asli                      Resep obat : non racikan</p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama Pasien :</td> <td style="width: 30%;">Ada</td> <td style="width: 40%;">Maratul Muslimah</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Maratul Muslimah	Umur pasien :	Tidak Ada	-
Nama Pasien :	Ada	Maratul Muslimah						
Umur pasien :	Tidak Ada	-						

<p>Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (&gt;/Tidak Pengulangan resep :</p> <p><b>Resep racikan dewasa</b></p> 	<p>Berat Badan :</p>	<p>Tidak Ada</p>	<p>-</p>
	<p>Nama Obat :</p>	<p>Ada</p>	<p>Glucosamine Na Diclofenak gel Meloxicam Valisanbe Eperisone</p>
	<p>Kekuatan :</p>	<p>Ada</p>	<p>Meloxicam 15mg Valisanbe 2mg Eperisone 50 mg</p>
	<p>Bentuk sed. :</p>	<p>Ada</p>	<p>Glucosamine tab Na Diclofenak gel Meloxicam tab Valisanbe tab Eperisone tab</p>
	<p>Jumlah obat :</p>	<p>Ada</p>	<p>Glucosamine tab No. X Na Diclofenak gel No. I Meloxicam 15mg Valisanbe 2mg Eperisone 50 mg</p>
	<p>Duplikasi terapi :</p>	<p>Tidak Ada</p>	<p>-</p>
	<p>Aturan pakai :</p>	<p>Ada</p>	<p>Glucosamine tab S 1x1</p> <p>Na Diclofenak gel Sue</p> <p>Meloxicam 15mg Valisanbe 2mg Eperisone 50 mg <i>Mfla pulv da in cap No. X</i> S 2x1</p>

	Tanggal penulisan resep :	Ada	15- 2 - 24	
	Nama dokter :	Ada	Dr. Yuli Indah Kurnia	
	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	
	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jl. KH. Kholil 88 Gresik	
<p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p>				
<table border="1"> <tr> <td>                     Glucosamine 10 tab                      Na Diclofenak 1 gel                      Meloxicam 10 tab                      Valisanbe 10 tab                      Eperisone 10 tab                 </td> </tr> </table>				Glucosamine 10 tab Na Diclofenak 1 gel Meloxicam 10 tab Valisanbe 10 tab Eperisone 10 tab
Glucosamine 10 tab Na Diclofenak 1 gel Meloxicam 10 tab Valisanbe 10 tab Eperisone 10 tab				
<p>C. Perhitungan biaya resep</p>				
<table border="1"> <tr> <td>                     Glucosamine = 22.000                      Na Diclofenak gel = 15.000                      Meloxicam = 10.000                      Valisanbe = 25.000                      Eperisone = 20.000                      Kertas puyer = 100 x 10 = 1.000                      Total semua = 93.000                 </td> </tr> </table>				Glucosamine = 22.000 Na Diclofenak gel = 15.000 Meloxicam = 10.000 Valisanbe = 25.000 Eperisone = 20.000 Kertas puyer = 100 x 10 = 1.000 Total semua = 93.000
Glucosamine = 22.000 Na Diclofenak gel = 15.000 Meloxicam = 10.000 Valisanbe = 25.000 Eperisone = 20.000 Kertas puyer = 100 x 10 = 1.000 Total semua = 93.000				
<p>D. ETIKET</p>				
<p>Nama Obat /warna etiket : Glucosamine/putih</p>				

	 <p><b>APOTEK BERKAH</b> JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707</p>	
	<p>NAMA : Maratul Muslimah TGL: 15-02-2024 ED: 23 / 02 / 2027 NAMA OBAT: Glucosamine</p> <p>1 x SEHARI 1 TAB / ML / <del>SENDOK TAKAR</del> / <del>MAKAN</del> <del>SEBELUM</del> / <del>SAAT</del> / <del>SESUDAH MAKAN</del></p>	
	Nama Obat /warna etiket : NA Diclofenac Cream / Biru	
	 <p><b>APOTEK BERKAH</b> JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707</p>	
	<p>NAMA : Maratus Muslimah TGL: 15 – 02 – 2024 ED: 24 – 05 – 2027 NAMA OBAT: Na diclofenac cream</p> <p>Oleskan pada bagian yang nyeri Untuk Pemakaian Luar</p>	
	Nama Obat /warna etiket : Nyeri /putih	

		<p> <b>APOTEK BERKAH</b>                  JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden                  Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707</p> <p>NAMA : Maratus Muslimah <span style="float: right;">TGL: 15-02-2024 ED: 21/ 03 / 2024 NAMA OBAT: Nyeri</span></p> <p style="text-align: center;">2 x SEHARI 1 KAPS / <del>ML</del> / <del>SENDOK TAKAR</del> / <del>MAKAN</del>  <u>SEBELUM</u> / <u>SAAT</u> / <u>SESUDAH</u> MAKAN</p>		
		<p>e. <i>Product knowledge</i></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="920 746 1462 1375"> <p>Nama Obat : Glucosamine                      Kandungan : Glucosamine                      Dosis lazim : 3 x sehari 1 kaplet                      Kegunaan : Suplemen ini digunakan untuk membantu memelihara kesehatan persendian                      ESO potensial : -                      KI : -                      Perhatian: -                      Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah 30°C</p> </td> <td data-bbox="1462 746 2004 1375"> <p>Nama Obat : Natrium diklofenac                      Kandungan : Natrium Diklofenak 50 mg                      Dosis lazim : Dewasa dan Anak diatas 14 tahun: 25 mg atau 50 mg, 2 sampai 3 kali per hari                      Kegunaan : Terapi awal untuk membantu mengobati rematik yang disertai inflamasi dan degeneratif (arthritis rematoid, ankylosing spondylitis, osteoarthritis dan spondylarthritis), sindroma nyeri dan kolumna vertebralis, rematik non-artikular, serangan akut dari gout, nyeri pascabedah.                      ESO potensial : cairan, edema, hipertensi, kelainan fungsi hati</p> </td> </tr> </table>	<p>Nama Obat : Glucosamine                      Kandungan : Glucosamine                      Dosis lazim : 3 x sehari 1 kaplet                      Kegunaan : Suplemen ini digunakan untuk membantu memelihara kesehatan persendian                      ESO potensial : -                      KI : -                      Perhatian: -                      Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah 30°C</p>	<p>Nama Obat : Natrium diklofenac                      Kandungan : Natrium Diklofenak 50 mg                      Dosis lazim : Dewasa dan Anak diatas 14 tahun: 25 mg atau 50 mg, 2 sampai 3 kali per hari                      Kegunaan : Terapi awal untuk membantu mengobati rematik yang disertai inflamasi dan degeneratif (arthritis rematoid, ankylosing spondylitis, osteoarthritis dan spondylarthritis), sindroma nyeri dan kolumna vertebralis, rematik non-artikular, serangan akut dari gout, nyeri pascabedah.                      ESO potensial : cairan, edema, hipertensi, kelainan fungsi hati</p>
<p>Nama Obat : Glucosamine                      Kandungan : Glucosamine                      Dosis lazim : 3 x sehari 1 kaplet                      Kegunaan : Suplemen ini digunakan untuk membantu memelihara kesehatan persendian                      ESO potensial : -                      KI : -                      Perhatian: -                      Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah 30°C</p>	<p>Nama Obat : Natrium diklofenac                      Kandungan : Natrium Diklofenak 50 mg                      Dosis lazim : Dewasa dan Anak diatas 14 tahun: 25 mg atau 50 mg, 2 sampai 3 kali per hari                      Kegunaan : Terapi awal untuk membantu mengobati rematik yang disertai inflamasi dan degeneratif (arthritis rematoid, ankylosing spondylitis, osteoarthritis dan spondylarthritis), sindroma nyeri dan kolumna vertebralis, rematik non-artikular, serangan akut dari gout, nyeri pascabedah.                      ESO potensial : cairan, edema, hipertensi, kelainan fungsi hati</p>			



			<p>(misalnya peningkatan hati, transaminase, kadar enzim), anemia, diskrasia darah berat yang jarang (misalnya agranulositosis, trombositopenia, anemia aplastik), risiko hiperkalemia; keratitis (oftalmik)</p> <p>KI : Hipersensitivitas terhadap diklofenak atau NSAID lainnya. Gagal jantung sedang hingga berat, penyakit jantung iskemik, penyakit arteri perifer, penyakit serebrovaskular, ulserasi gastrointestinal, perforasi atau perdarahan. Pengobatan dalam pengaturan CABG. Penggunaan bersama NSAID lainnya, antiplatelet, antikoagulan. Gangguan hati atau ginjal yang parah. Kehamilan (trimester ketiga).</p> <p>PERHATIAN : Hati-hati penggunaan pada pasien dengan riwayat perdarahan gastrointestinal atau ulkus peptikum, koagulopati, faktor risiko saat ini atau risiko penyakit KV (misalnya CHF, penyakit jantung iskemik, CVA, hipertensi, edema, hiperlipidemia, diabetes mellitus), dehidrasi, hipovolemia, asma, rinitis, PPOK, pernapasan infeksi saluran, SLE, gangguan jaringan ikat campuran, porfiria, gangguan hati dan ginjal, Anak-anak. wanita hamil (trimester 1-2)</p>
--	--	--	--

		<p>dan menyusui, perokok. Kategori kehamilan : Kategori X: Kontraindikasi (tidak boleh digunakan). Terdapat hasil penelitian terhadap hewan uji dan manusia yang memperlihatkan abnormalitas terhadap janin. Obat ini dikontraindikasikan untuk wanita hamil dan yang berkemungkinan untuk hamil                  Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah 30°C</p>	
		<p>Nama Obat : Meloxicam                  Kandungan : Meloxicam 15 mg                  Dosis lazim : Dewasa: Rheumatoid Astitris dan Ankylosing Spondylitis: 15 mg, 1 kali per hari. Dapat diturunkan menjadi 7.5 mg, 1 kali per hari berdasarkan respon terapeitik. Osteo Astitris: 7.5 mg, 1 kali per hari. Dapat ditingkankan s/d 15 mg, 1 kali per hari. Anak &gt;60 kg: Artritis idiopatik juvenil: 7,5 mg sekali sehari. Lansia dan pasien ginjal: 7.5 mg, 1 kali per hari                  Kegunaan : Meredakan gejala-gejala arthritis, misalnya peradangan, pembengkakan, serta kaku dan nyeri otot. Contoh penyakit radang persendian yang biasanya ditangani dengan meloxicam adalah osteoarthritis (jangka pendek), rheumatoid arthritis, dan ankylosing spondylitis.                  ESO potensial : Retensi cairan, edema, insufisiensi ginjal, gagal ginjal akut,</p>	<p>Nama Obat : Valisanbe                  Kandungan : Diazepam                  Dosis lazim : Dewasa : 5 - 15 mg sebelum tidur                  Lansia : Berikan setengah dosis                  Kegunaan : Obat valisanbe digunakan untuk premedikasi atau pemeliharaan dan pemulihan anestesi serta untuk memberikan efek tenang dalam prosedur bedah dan medis minor. Selain itu, manfaat valisanbe juga dapat dirasakan pasien dengan kondisi berikut:                  Kecemasan parah                  Kejang otot                  Sindrom penarikan alkohol                  Insomnia yang berhubungan dengan kecemasan                  ESO potensial : efek samping yang dapat terjadi setelah pemakaian valisanbe:</p>

		<p>nekrosis papiler ginjal (penggunaan jangka panjang), hiperkalemia, penglihatan kabur, anemia, jarang, agranulositosis, trombositopenia, leukopaenia. Gangguan sistem darah dan limfatik: Anemia, jarang, agranulositosis, trombositopenia, leukopaenia. Gangguan jantung: Gagal jantung, jarang, palpitasi. Gangguan gastrointestinal: Dispepsia, mual, muntah, sakit perut, sembelit, perut kembung, diare, melena, hematemesis, stomatitis ulserativa, jarang, gastritis. Gangguan umum dan kondisi situs admin: Malaise,</p> <p>KI : Hipersensitif terhadap meloxicam, aspirin atau NSAID lainnya. Riwayat atau perdarahan gastrointestinal aktif, ulserasi atau perforasi yang berhubungan dengan penggunaan NSAID. Penyakit radang usus aktif (misalnya penyakit Crohn pada kolitis ulserativa), gagal jantung berat. Pengobatan nyeri perioperatif dalam pengaturan operasi CABG. Kerusakan hati yang parah. Kehamilan (trimester ke-3) dan menyusui.</p> <p>PERHATIAN : Hati-hati penggunaan pada pasien dengan asma, riwayat penyakit maag atau perdarahan gastrointestinal baru-baru ini, hipertensi, MI baru-baru ini, faktor</p>	<p>Gangguan mata: penglihatan kabur, diplopia</p> <p>Gangguan pencernaan: sembelit, mual, gangguan gastrointestinal, perubahan air liur</p> <p>Gangguan umum: kelelahan, ataksia, sakit di area suntikan</p> <p>Gangguan sistem saraf: tremor, sakit kepala, vertigo</p> <p>Gangguan kejiwaan: kebingungan, depresi, bicara cadel</p> <p>Gangguan ginjal dan saluran kemih: inkontinensia urin, retensi urin</p> <p>Sistem reproduksi dan gangguan payudara: perubahan libido</p> <p>Gangguan pembuluh darah: hipotensi</p> <p>KI : -</p> <p>PERHATIAN :-</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah 30°C</p>	
--	--	--	---	--

		<p>risiko CV lainnya (misalnya hiperlipidemia, diabetes mellitus, merokok), retensi cairan dan edema, hipovolemia, koagulopati. Pasien dehidrasi dan lemah. Ginjal dan gangguan hati ringan sampai sedang. Anak-anak dan orang tua. Kehamilan (trimester 1-2). Penggunaan bersama NSAID lainnya, kortikosteroid, antiplatelet, antikoagulan. Kategori kehamilan: Kategori C: Mungkin berisiko. Obat digunakan dengan hati-hati apabila besarnya manfaat yang diperoleh melebihi besarnya risiko terhadap janin. Penelitian pada hewan uji menunjukkan risiko terhadap janin dan belum terdapat penelitian langsung terhadap wanita hamil.                  Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah 30°C</p>	
		<p>Nama Obat: Eperisone                  Kandungan: Eperisone HCl 50 mg                  Dosis Lazim: 1 tablet, diminum 3 kali per hari                  Kegunaan: Untuk pengobatan simptomatik pada kondisi yang berhubungan dengan spasme muskuloskeletal                  Eso Potensial: Lemah, pusing, insomnia, mengantuk, rasa kebas atau gemetar pada ekstremitas, gangguan fungsi hati dan ginjal, kelainan</p>	

hematologi, ruam kulit, gangguan GI, gangguan pada saluran kemih  
KI : Ibu menyusui. Myasthenia gravis (keadaan melemahnya otot tubuh akibat gangguan pada saraf dan otot).  
Cara Penyimpanan: Simpan pada suhu dibawah 30°C

f. Tahap pembuatan

1. Ambil obat natrium diklofenac gel 1 buah, glukosamin 1 strip, Siapkan meloxicam, valisane, eperisone dan blender
2. masukkan kedalam cangkang kapsul bagi menjadi 10 kapsul beri etiket
3. Tempelkan etiket pada kemasan obat
4. Masukkan kedalam kemasan plastic
5. Cek kembali kesesuaian obat yang di ambil dengan resep serta etiket yang tertempel pada kemasan obat


g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)



		<p>Apt : Pasien atas nama Ny Maratus Muslimah                  Pasien : iya mbak                  Apt : Baik Ibu, saya jelaskan obatnya dulu ya ibu, ini obatnya ada 3 macam bu yaitu glucosamine untuk Vitamin diminum sesudah makan 1 kali sehari 1 tablet, diclofenac gel untuk nyeri oleskan pada bagian yang nyeri, dan kapsul untuk nyeri diminum 2 kali sehari 1 kapsul sesudah makan . Apa ada yang di tanyakan atau kurang jelas bu dari penjelasan saya ?                  Pasien : sudah jelas mbak, terimakasih                  Apt : terimakasih kembali bapak, semoga lekas sembuh</p>
--	--	---

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																	
21.*	Jenis Resep : Resep obat dm Resep obat : non racikan Jumlah obat dalam resep : 5 macam obat Pengulangan resep : -  <b>Resep obat dm</b>	A. Skrinning Administrasi <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama Pasien :</td> <td style="width: 20%;">Ada</td> <td style="width: 50%;">Lailatun Nimah</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Acarbose R/ Gabapentin R/ Glucodex R/ Lansoprazole R/ Pioglitazole</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Acarbose 50 R/ Gabapentin 300 R/ Glucodex R/ Lansoprazole</td> </tr> </table>			Nama Pasien :	Ada	Lailatun Nimah	Umur pasien :	Tidak Ada	-	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	R/ Acarbose R/ Gabapentin R/ Glucodex R/ Lansoprazole R/ Pioglitazole	Kekuatan :	Ada	R/ Acarbose 50 R/ Gabapentin 300 R/ Glucodex R/ Lansoprazole
Nama Pasien :	Ada	Lailatun Nimah																	
Umur pasien :	Tidak Ada	-																	
Berat Badan :	Tidak Ada	-																	
Nama Obat :	Ada	R/ Acarbose R/ Gabapentin R/ Glucodex R/ Lansoprazole R/ Pioglitazole																	
Kekuatan :	Ada	R/ Acarbose 50 R/ Gabapentin 300 R/ Glucodex R/ Lansoprazole																	

TUGAS KHUSUS PKL D3 FARMASI UMG\_AZMI SABILA KISBATUL WAFI\_211105018\_APOTEK BERKAH

			R/ Pioglitazole
	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	R/ Acarbose tablet R/ Gabapentin tablet R/ Glucodex tablet R/ Lansoprazole tablet R/ Pioglitazole tablet
	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	R/ Acarbose 50 No. LX R/ Gabapentin 300 No. XXX R/ Glucodex No. LX R/ Lansoprazole No. X R/ Pioglitazole No. XXX
	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-
	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	R/ Acarbose 50 No. LX S 1 – 1 – 0 (diminum 2 kali sehari pagi dan siang) R/ Gabapentin 300 No. XXX S 1 X 1 (diminum 1 kali 1 sehari) R/ Glucodex No. LX S 2 x 1 (diminum 2 kali sehari ) R/ Lansoprazole No. X S 2 x 1 (diminum 2 kali sehari) R/ Pioglitazole No. XXX S 0-1-0

		(diminum 1 kali sehari pada siang hari)
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	04 – 03 – 2024
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Nuri Indah Hapsanti, Sp. PD
Surat ijin :	Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Ada	Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jl. KH. Kholil 88 Gresik

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

<p>Acarbose 50 mg dibutuhkan sebanyak 60 tablet                  Gabapentin 300 mg dibutuhkan sebanyak 30 tablet                  Glucodex dibutuhkan sebanyak 60 tablet                  Lansoprazole dibutuhkan sebanyak 10 tablet                  Pioglitazole dibutuhkan sebanyak 30 tablet</p>
--

C. Perhitungan biaya resep

<p>R/ Acarbose 50 No. LX = Rp. 1.500 per tablet x 60 tablet = Rp. 90.000                  R/ Gabapentin 300 No. XXX = Rp. 6.500 per tablet x 30 tablet = Rp. 195.000                  R/ Glucodex No. LX = Rp. 600 per tablet x 60 tablet = Rp. 36.000                  R/ Lansoprazole No. X = Rp. 1.500 per tablet x 10 tablet = Rp. 15.000                  R/ Pioglitazole No. XXX = Rp. 5.000 per tablet x 30 tablet = Rp. 150.000                  Jumlah 486.000</p>
---

D. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Acarbose 50 / Putih



APOTEK BERKAH

JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden  
Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707

Nama : Lailatun Nimah, Ny

TGL: 04 – 03 – 2024

ED : 25 – 11 – 2028

NAMA OBAT: Acarbose 50

~~2 x SEHARI 1 TAB / ML / SENDOK TAKAR / MAKAN  
SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN (PAGI DAN SIANG)~~

Nama Obat /warna etiket : Gabapentin 300/ Putih



APOTEK BERKAH

JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden  
Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707

Nama : Lailatun Nimah, Ny

TGL: 04 – 03 – 2024

ED : 28 – 10 – 2027

NAMA OBAT: Gabapentin 300

~~1 x SEHARI 1 TAB / ML / SENDOK TAKAR / MAKAN  
SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN~~

Nama Obat /warna etiket : Glucodex / Putih



**APOTEK BERKAH**

JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden  
Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707

Nama : Lailatun Nimah, Ny

TGL: 04 – 03 – 2024

ED : 13 – 11 – 2028

NAMA OBAT: Glucodex

2 x SEHARI 1 TAB /~~ML~~ / ~~SENDOK TAKAR~~ / ~~MAKAN~~  
~~SEBELUM~~ / ~~SAAT~~ / ~~SESUDAH MAKAN~~ (PAGI DAN MALAM)

Nama Obat /warna etiket : Lansoprazole / Putih



**APOTEK BERKAH**

JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden  
Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707

Nama : Lailatun Nimah, Ny

TGL: 04 – 03 – 2024


ED : 20 – 09 – 2028

NAMA OBAT: Lansoprazole

2 x SEHARI 1 KAPS /~~ML~~ / ~~SENDOK TAKAR~~ / ~~MAKAN~~  
~~SEBELUM~~ / ~~SAAT~~ / ~~SESUDAH MAKAN~~

Nama Obat /warna etiket : Pioglitazone /Putih



		 <p><b>APOTEK BERKAH</b>                  JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden                  Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707</p> <p>Nama : Lailatun Nimah, Ny <span style="float: right;">TGL: 04 – 03 – 2024</span>  <span style="float: right;">ED : 10 – 01 – 2029</span>  <span style="float: right;">NAMA OBAT: Pioglitazone</span></p> <p style="text-align: center;"><del>1x SEHARI 1 TAB / ML / SENDOK TAKAR / MAKAN</del>  <del>SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN (SIANG)</del></p>	
<p style="text-align: center;"><i>E. Product knowledge</i></p>		<p>Nama Obat : Acarbose 50 mg                  Kandungan : Acarbose 50 mg                  Dosis lazim : Dosis harus ditentukan oleh dokter sesuai dengan kebutuhan sesuai pasien. Kecuali ditentukan lain.                  - Dosis awal : 3x1 tab 50 mg/hari atau 3 x ½ tab acarbose 100 mg/hari                  - Dosis selanjutnya :                  3 x 2 tab acarbose 50 mg/hari atau 3 x 1 tab 100 mg/hari hingga 3 x 2 tab 100 mg/hari                  Kegunaan : Terapi tambahan yang berhubungan dengan diet pada pasien diabetes melitus                  ESO potensial : Flatulence sangat sering, diare dan nyeri abdominalnausea jarang terjadi</p>	<p>Nama Obat : Gabapentin 300 mg                  Kandungan : Gabapentin 300 mg                  Dosis lazim : dewasa awal 1 kali sehari 300mg pada hari pertama, 2 kali sehari 300mg pada hari kedua, 3 kali sehari 300mg pada hari ketiga. dosis meningkat 300mg tiap 2-3hari hingga efektifitas tercapai. maks. 4800mg/hari. anak &gt;6th awal 10-15mg/kg sehari hingga efektifitas tercapai, biasanya 25-35mg/kg dalam 3 dosis terbagi tiap 12 jam. maks. 50mg/kg/hari. Nyeri Neuropatik: dewasa awal 1 kali sehari 300mg pada hari pertama, 2 kali sehari 300mg hari kedua, 3 kali sehari 300mg hari ketiga.alternatif: 900mg sehari dalam 3 dosis terbagi. dosis ditingkatkan 300mg tiap 2-3hari. maks. 3600mg/hari. Neuralgia Postherpetic: sebagai gabapentin enarcabil: dewasa awal 600mg di pagi hari selama 3 hari. meningkat menjadi 600mg. Restless leg</p>

		<p> <b>KI</b> : Hipersensitifitas terhadap acarbose atau zat tidak aaktifnya  <b>PERHATIAN</b> : Harus dengan resep dokter. Diperlukan pemeriksaan kadar enzim hati selama 6 – 12 bulan pertama pengobatan. Pada kasus telah dievakuasi, perubahan ini bersifat reversible setelah penghentian terapi acarbose.  <b>Cara penyimpanan</b> : Simpan pada suhu di bawah 30°C. terlindung dari cahaya         </p>	<p>           syndrome sedang-berat: sebagai gabapentin enacarbil: 600mg sekali sehari pada jam 5 sore. <b>Kegunaan</b> : Terapi tambahan pada kondisi simple dan complex partial seizure, kejang tonic-clonic general lanjutan pada pasien yang tidak memberikan efek dengan pengobatan antiepilepsi  <b>ESO potensial</b> : somnolen, pusing, ataksia, lelah, nistagmus, sakit kepala, tremor, mual, muntah, diplopia (pasien melihat 2 tampilan dalam 1 objek), ambliopia (penglihatan menurun), hemodialisis.  <b>KI</b> : Pasien hipersensitif terhadap gabapentin  <b>PERHATIAN</b> : hentikan secara bertahap selama min. 1 minggu, dapat mengganggu kemampuan mengemudi atau menjalankan mesin. ibu hamil dan menyusui, anak  <b>Cara penyimpanan</b> : Simpan pada suhu ruangan         </p>
		<p> <b>Nama Obat</b> : Glucodex  <b>Kandungan</b> : Gliclazide 80mg  <b>Dosis lazim</b> : awal 40-80 mg, ditingkatkan menjadi 40-80 mg/hari sampai 320 mg sehari  <b>Kegunaan</b> : terapi diabetes untuk semua tipe diabetes melitus pada dewasa  <b>ESO potensial</b> : mual, muntah, nyeri lambung, sakit kepala, reaksi kulit  <b>KI</b> : wanita hamil. Pasien diabetes tergantung pada insulin. Pasien diabetes dengan komplikasi ketosis atau asidosis.         </p>	<p> <b>Nama Obat</b> : Lansoprazole  <b>Kandungan</b> : Lansoprazole 30 mg  <b>Dosis lazim</b> : Dewasa dan lanjut usia: 30 mg 1xsehari. Lama terapi: tukak duodenum dan refluks esofagitis 4 minggu. tukak lambung ringan 8 minggu. Pasien dengan gangguan hati dan ginjal: dosis maksimal 30 mg sehari. <b>Kegunaan</b> : Ulkus duodenum, Ulkus gaster benigna, Refluks esofagitis, Pengobatan ulkus gaster akibat penggunaan NSAID         </p>

		<p><b>PERHATIAN</b> : dm tipe 1, ketoasidosis, dm juvenil, dm menjelang pembedahan, infeksi berat, insufisiensi ginjal atau hati berat, hamil, anak  <b>Cara penyimpanan</b> : Simpan pada tempat sejuk, kering dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>	<p><b>ESO potensial</b> : Efek yang tidak diinginkan yang paling umum dilaporkan adalah: Sakit kepala, pusing, lelah dan perasaan tidak enak.  <b>KI</b> : Penderita yang diketahui hipersensitif terhadap komponen obat  <b>PERHATIAN</b> : Wanita hamil dan menyusui. Lanjut usia  <b>Cara penyimpanan</b> : Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.</p>
		<p><b>Nama Obat</b> : piglitazone  <b>Kandungan</b> : Pioglitazone 30 mg.  <b>ESO potensial</b> : Peningkatan berat badan, muntah, mual tanpa sebab yang jelas, urin berwarna gelap, nyeri perut, kelelahan, keropos dan patah tulang, sinusitis.  <b>Dosis lazim</b> : Diabetes melitus tipe 2                  Dewasa: 15 atau 30 mg 1x/hari, ditingkatkan secara bertahap jika perlu. Maksimal: 45 mg/hari.  <b>KI</b> : pasien yang hipersensitif terhadap pioglitazone atau salah satu bahan yang terdapat dalam formula obat.  <b>PERHATIAN</b> : Wanita hamil dan menyusui.  <b>Cara penyimpanan</b> : Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.</p>	

F. Tahap pembuatan

- 1) Ambil obat Acarbose pada rak obat Acarbose dibutuhkan sebanyak 60 tablet
- 2) Ambil obat gabapentin pada rak obat gabapentin sebanyak 30 tablet
- 3) Ambil obat Glucodex pada rak obat Glucodex dibutuhkan sebanyak 60 tablet
- 4) Ambil obat lansoprazole pada rak obat lansoprazole dibutuhkan sebanyak 10 tablet
- 5) Ambil obat pioglitazone pada rak obat pioglitazone dibutuhkan sebanyak 30 tablet
- 6) Staples etiket pada kemasan obat tablet
- 7) Masukkan kedalam kemasan plastik
- 8) Cek kembali kesesuaian obat yang di ambil dengan resep serta etiket yang tertempel pada kemasan obat

G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

**P = Pasien A = Apoteker**

APT : atas nama ibu Lailatun Naimah

Pasien : iya mbak

Apt : dengan ibu Lailatun Naimah ?

Pasien : iya mbak benar .

Apt : baik bu, saya jelaskan dulu ya obatnya

Pasien : iya mbak

Apt : ini bu ada 5 macam obat. Obat yang pertama yaitu acarbose jumlahnya ada 60 tablet bu diminum dua kali sehari pada pagi dan siang hari, yang kedua ini obat gabapentin jumlahnya ada 30 tablet bu diminum satu kali sehari, yang ketiga ini obat glucodex jumlahnya 30 tablet diminum 2 kali sehari pada pagi dan malam hari, yang ke empat obat lansoprazole jumlahnya 10 tablet diminum 2 kali sehari, yang ke lima obat pioglitazone sebanyak 30 tablet pada siang hari.


Pasien : iya mbak

Apt : apa ada yang ditanyakan ibu atau kurang jelas dari penjelasan saya ibu?

Pasien : sudah jelas mbak, terimakasih

Apt : baik pak, terimakasih kembali. Semoga lekas sembuh



No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
22*	<p>Jenis Resep : Resep Hipertensi                      Resep obat : Non racikan                      Jumlah obat dalam resep : 2 macam obat                      Pengulangan resep : -</p> <p><b>Resep HT</b></p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1021 331 1984 1236"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Lutfi</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Amlodipin Atorvastatin</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Amlodipin 10 mg Atorvastatin 20 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Amlodipin tablet Atorvastatin tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Amlodipin 10 mg No. XXX Atorvastatin 20 mg No. XXX</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Amlodipin 10 mg No. XXX S-0-0-1 Atorvastatin 20 mg No. XXX S-0-01</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada</td> <td>17 - 5 - 21</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada</td> <td>dr.Rachfita Chandra, Sp.JP</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jl. KH. Kholil 88 Gresik</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Lutfi	Umur pasien :	Tidak Ada	-	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	R/ Amlodipin Atorvastatin	Kekuatan :	Ada	R/ Amlodipin 10 mg Atorvastatin 20 mg	Bentuk sed. :	Ada	R/ Amlodipin tablet Atorvastatin tablet	Jumlah obat :	Ada	R/ Amlodipin 10 mg No. XXX Atorvastatin 20 mg No. XXX	Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada	R/ Amlodipin 10 mg No. XXX S-0-0-1 Atorvastatin 20 mg No. XXX S-0-01	Tanggal penulisan resep :	Ada	17 - 5 - 21	Nama dokter :	Ada	dr.Rachfita Chandra, Sp.JP	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jl. KH. Kholil 88 Gresik
Nama Pasien :	Ada	Lutfi																																							
Umur pasien :	Tidak Ada	-																																							
Berat Badan :	Tidak Ada	-																																							
Nama Obat :	Ada	R/ Amlodipin Atorvastatin																																							
Kekuatan :	Ada	R/ Amlodipin 10 mg Atorvastatin 20 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada	R/ Amlodipin tablet Atorvastatin tablet																																							
Jumlah obat :	Ada	R/ Amlodipin 10 mg No. XXX Atorvastatin 20 mg No. XXX																																							
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada	R/ Amlodipin 10 mg No. XXX S-0-0-1 Atorvastatin 20 mg No. XXX S-0-01																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada	17 - 5 - 21																																							
Nama dokter :	Ada	dr.Rachfita Chandra, Sp.JP																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jl. KH. Kholil 88 Gresik																																							

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Amlodipin 10 mg yang dibutuhkan sebanyak 30 tablet  
Atorvastatin 20 mg

C. Perhitungan biaya resep

Amlodipin 10 mg = Rp. 8.000 per strip x 3 strip = Rp. 24.000  
Atorvastatin 20 mg = Rp. 50.000 per strip x 2 strip = Rp. 100.000  
Total Semua : 124.000

D. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Amlodipin 10 mg / Putih



APOTEK BERKAH

Jl. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden  
Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707


NAMA : NY. Lutfi

TGL: 17 – 05 - 2021

ED: 23 – 10 - 2025

NAMA OBAT: Amlodipin 10 mg

1x SEHARI 1 TAB / ~~ML~~ / ~~SENDOK TAKAR~~ / ~~MAKAN~~  
~~SEBELUM~~ / ~~SAAT~~ / ~~SESUDAH MAKAN~~

		<p>Nama Obat /warna etiket : Atorvastatin 20 mg / Putih</p> <div data-bbox="936 304 2033 438" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p><b>APOTEK BERKAH</b>                  JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden                  Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707</p> </div> <div data-bbox="936 438 2033 746" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Nama : Ny. Lutfi <span style="float: right;">TGL: 17 – 05 – 2021</span>  <span style="float: right;">ED: 25 – 11 – 2025</span>  <span style="float: right;">NAMA OBAT: Atorvastatin 20 mg</span></p> <p style="text-align: center;"><del>1 x SEHARI 1 TAB /ML / SENDOK TAKAR / MAKAN                  SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN</del></p> </div> <p><i>E. Product knowledge</i></p> <table border="1" data-bbox="927 858 2018 1374" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p>Nama Obat : Amlodipin                      Kandungan : amlodipin 10 mg                      Dosis lazim : Pada hipertensi, dosis awal yang biasa diberikan adalah 5 mg sekali sehari dan dapat ditingkatkan maksimum 10 mg tergantung pada respon individu dan beratnya penyakit.                      Kebanyakan pasien yang mengidap hipertensi diberi 5 mg/hari dan tidak perlu dinaikkan dosisnya. Untuk yang memerlukan dosis yang lebih tinggi, Amlodipine dapat dinaikkan sampai 7,5 mg/hari dengan maksimum dosis 10</p> </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p>Nama Obat : Atorvastatin                      Kandungan : Atorvastatin Calcium 20 mg                      Dosis lazim : sebagai tambahan terhadap diet untuk mengurangi peningkatan kolesterol total, kolesterol LDL, apolipoprotein B dan trigliserida pada pasien dengan hypercholesterolemia primer, hyperlipidemia campuran, dan familial hypercholesterolemia (FH) heterozigot dan homozigot saat respons terhadap diet dan pengukuran non farmakologi lainnya tidak adekuat.</p> </td> </tr> </table>	<p>Nama Obat : Amlodipin                      Kandungan : amlodipin 10 mg                      Dosis lazim : Pada hipertensi, dosis awal yang biasa diberikan adalah 5 mg sekali sehari dan dapat ditingkatkan maksimum 10 mg tergantung pada respon individu dan beratnya penyakit.                      Kebanyakan pasien yang mengidap hipertensi diberi 5 mg/hari dan tidak perlu dinaikkan dosisnya. Untuk yang memerlukan dosis yang lebih tinggi, Amlodipine dapat dinaikkan sampai 7,5 mg/hari dengan maksimum dosis 10</p>	<p>Nama Obat : Atorvastatin                      Kandungan : Atorvastatin Calcium 20 mg                      Dosis lazim : sebagai tambahan terhadap diet untuk mengurangi peningkatan kolesterol total, kolesterol LDL, apolipoprotein B dan trigliserida pada pasien dengan hypercholesterolemia primer, hyperlipidemia campuran, dan familial hypercholesterolemia (FH) heterozigot dan homozigot saat respons terhadap diet dan pengukuran non farmakologi lainnya tidak adekuat.</p>
<p>Nama Obat : Amlodipin                      Kandungan : amlodipin 10 mg                      Dosis lazim : Pada hipertensi, dosis awal yang biasa diberikan adalah 5 mg sekali sehari dan dapat ditingkatkan maksimum 10 mg tergantung pada respon individu dan beratnya penyakit.                      Kebanyakan pasien yang mengidap hipertensi diberi 5 mg/hari dan tidak perlu dinaikkan dosisnya. Untuk yang memerlukan dosis yang lebih tinggi, Amlodipine dapat dinaikkan sampai 7,5 mg/hari dengan maksimum dosis 10</p>	<p>Nama Obat : Atorvastatin                      Kandungan : Atorvastatin Calcium 20 mg                      Dosis lazim : sebagai tambahan terhadap diet untuk mengurangi peningkatan kolesterol total, kolesterol LDL, apolipoprotein B dan trigliserida pada pasien dengan hypercholesterolemia primer, hyperlipidemia campuran, dan familial hypercholesterolemia (FH) heterozigot dan homozigot saat respons terhadap diet dan pengukuran non farmakologi lainnya tidak adekuat.</p>			

		<p>mg/hari. Dosis yang direkomendasikan untuk kronis yang stabil atau angina vasospastik adalah 5-10 mg, dengan dosis terendah yang disarankan untuk usia lanjut dan pasien yang mengidap insufisiensi hati.</p> <p>Tidak ada penyesuaian dosis Amlodipine sehubungan dengan pemberian bersamaan dengan diuretik tiazid, beta bloker, dan penghambat ACE.</p> <p>Penggunaan pada usia lanjut: Disarankan pemberian dosis normal.</p> <p>Penggunaan pada anak: Dosis yang disarankan untuk antihipertensi oral pada pasien usia 6-17 tahun adalah 2.5 mg sampai 5 mg satu kali sehari. Belum ada studi penggunaan dosis diatas 5 mg. Penggunaan pada pasien dengan kerusakan fungsi hati: Lihat bagian PERINGATANI PERINGATAN DAN PERHATIAN</p> <p>Kegunaan : untuk pengobatan hipertensi dan dapat digunakan sebagai obat tunggal untuk mengontrol tekanan darah pada kebanyakan pasien.</p> <p>ESO potensial : Amlodipine ditoleransi dengan baik. Pada pasien – pasien yang mengidap hipertensi atau angina, efek samping yang paling umum terobservasi adalah sakit kepala, edema, fatigue, mengantuk, mual, nyeri perut,</p>	<p>ESO potensial : KI : Hipersensitif terhadap komponen – komponen dalam obat ini, Penyakit hati aktif atau meningkatkan serum transaminase yang menetap melebihi 3 kali lipat dari batas atas normal atau pada : bu hamil, menyusui atau usia produktif yang tidak menggunakan alat kontrasepsi yang adekuat. Atorvastatin dapat diberikan untuk wanita usia produktif hanya pada saat dipastikan tidak hamil dan telah diberi informasi mengenai potensi bahaya pada janin.</p> <p>PERHATIAN : pasien yang memberikan tanda atau gejala yang mengarah pada kerusakan hati harus melakukan tes fungsi hati.</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah 30°C.</p>
--	--	--	---

		<p>kemerahan, palpitasi, dan pusing. Efek samping yang paling sedikit terobservasi secara umum yaitu asthenia, dispepsia, dyspnea, gingival hyperplasia, kejang otot, pruritis mialgia, ruam, gangguan penglihatan, dan jarang terjadi eritema multiforme.</p> <p>Seperti calcium channel blockers lainnya, efek samping berikutnya jarang dilaporkan dan tidak dapat dikenali dari penyakit dasar: infark miokardial, aritmia (termasuk takikardia ventrikuler dan fibrilasi atrial) dan nyeri dada.</p> <p>KI : Amlodipine merupakan kontraindikasi pada pasien – pasien yang diketahui sensitif terhadap dihidropiridin</p> <p><b>PERHATIAN : HARUS DENGAN RESEP DOKTER.</b> Gagal jantung, Gangguan fungsi hati. Kehamilan &amp; laktasi.</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah 30°C, terlindung dari cahaya</p>	
--	--	---	--



F. Tahap pembuatan

11. Ambil obat amlodipin 10 mg pada rak obat amlodipin 10 mg sebanyak 3 strip
12. Ambil obat atorvastatin 20 mg pada rak obat atorvastatin 20 mg sebanyak 3 strip
13. Staples etiket pada kemasan obat
14. Masukkan kedalam kemasan plastik
15. Cek kembali kesesuaian obat yang di ambil dengan resep serta etiket yang tertempel pada kemasan obat

G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

Apt : atas nama ibu lutfi

Pasien : iya mbak

Apt : dengan ibu lutfi tanggal lahirnya berapa pak ?

Pasien : iyh mba, tanggal lahir saya 12 – 10 – 1972

Apt : baik pak, saya jelaskan dulu ya obatnya

Pasien : iya mbak


Apt : ini bu ada 2 macam obat. Obat yang pertama yaitu obat amlodipin jumlahnya ada 30 tablet untuk 1 bulan ya bu diminum satu kali sehari satu biji setelah makan ya bu diminum pada malam hari , yang kedua yaitu atorvastatin jumlahnya ada 30 tablet untuk 1 bulan ya bu diminum satu kali sehari satu biji setelah makan ya bu diminum pada malam hari.

Pasien : iya mbak

Apt : apa ada yang ditanyakan ibu atau kurang jelas dari penjelasan saya ibu?

Pasien : sudah jelas mbak, terimakasih

Apt : baik pak, terimakasih kembali. Semoga lekas sembuh

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep		
23.*	<p>Jenis Resep : Resep asli Resep obat : non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (&gt;/Tidak Pengulangan resep :</p> <p><b>Resep pasien syaraf</b></p> 	A. Skrinning Administrasi		
		Nama Pasien :	Ada	A. Ridwan
		Umur pasien :	Tidak ada	-
		Berat Badan :	Tidak Ada	-
		Nama Obat :	Ada	lansoprazol sucralfate simvastatin betahistin fenofibrat analsik
		Kekuatan :	Ada	-
		Bentuk sed. :	Ada	Caps lansoprazol Syr sucralfate Tab simvastatin Tab betahistin Tab fenofibrat Tab analsik
		Jumlah obat :	Ada	Caps lansoprazol No.X Syr sucralfate No.1 Tab simvastatin No.XXX Tab betahistin No. V Tab fenofibrat No.XXX Tab analsik No.X
		Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-
		Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Caps lansoprazol No.X S 2 X 1 Syr sucralfate No.1 S 3 X 1 Tab simvastatin No.XXX S 1 X 1 Tab betahistin No. V S1 X 1 Tab fenofibrat No.XXX

				S 1 X 1 Tab analsik No.X S 2 X 1
		Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	12-02-2024
		Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. M fakhurudin fakhry, Sp. PD
		Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-
		Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jl. KH. Kholil 88 Gresik
		<p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <p>lansoprazol yang dibutuhkan 10 tablet                  Syr sucralfate yang dibutuhkan 1 botol                  Simvastatin yang dibutuhkan 30 tablet                  betahistin yang dibutuhkan 5                  fenofibrat yang dibutuhkan 30 tablet                  analsik yang dibutuhkan 10</p>		
		<p>C. Perhitungan biaya resep</p> <p>Lanzoprazole yang dibutuhkan 10 tablet 1 strip Rp 16.000                  sucralfate sirup 1 botol 21.000                  simvastatin 1 strip <math>5.000 \times 3 = 15.000</math>                  betahistin 1 tab Rp. <math>1.300 \times 5 = 6.500</math>                  fenofibrat 1 strip <math>25.000 \times 3 = 75.000</math>                  analsik 1 tab Rp. <math>2.100 \times 10 = 21.000</math>                  Total biaya Rp 154.500</p>		

D. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Lansoprazole/putih



**APOTEK BERKAH**

JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden  
Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707

NAMA : A. Ridwan

TGL: 12 -02-2024

ED: 25 / 02 / 2026

NAMA OBAT: Lansoprazole

~~2 x SEHARI 1 KAPS/ ML / SENDOK TAKAR / MAKAN  
SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN~~

Nama Obat /warna etiket : Sucralfate syr/putih



**APOTEK BERKAH**

JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden  
Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707

NAMA : A. Ridwan

TGL: 12 -02-2024







ED: 25 / 02 / 2025



NAMA OBAT: Sucralfate syr

~~3 x SEHARI 1 SDM -BH / ML / SENDOK TAKAR / MAKAN  
SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN~~

Nama Obat /warna etiket : Simvastatin/putih



		<table border="1"><tr><td data-bbox="987 199 1131 327"></td><td data-bbox="1131 199 1825 327"><b>APOTEK BERKAH</b> JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707</td></tr><tr><td data-bbox="987 327 1523 438">NAMA : A. Ridwan</td><td data-bbox="1523 327 1825 438">TGL: 12 -02-2024 ED: 18 / 02 / 2025 NAMA OBAT: Simvastatin</td></tr><tr><td colspan="2" data-bbox="987 438 1825 638" style="text-align: center;">Malam hari 1x SEHARI 1 TAB / <del>ML / SENDOK TAKAR / MAKAN</del> <del>SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN</del></td></tr><tr><td colspan="2" data-bbox="987 638 1825 805">Nama Obat /warna etiket :Fenofibrate/putih</td></tr><tr><td data-bbox="987 805 1131 933"></td><td data-bbox="1131 805 1825 933"><b>APOTEK BERKAH</b> JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707</td></tr><tr><td data-bbox="987 933 1523 1045">NAMA : A. Ridwan</td><td data-bbox="1523 933 1825 1045">TGL: 12 -02-2024 ED: 20 / 02 / 2025 NAMA OBAT Fenofibrate</td></tr><tr><td colspan="2" data-bbox="987 1045 1825 1244" style="text-align: center;">1x SEHARI 1 KAPS / <del>ML / SENDOK TAKAR / MAKAN</del> <del>SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN</del></td></tr><tr><td colspan="2" data-bbox="987 1244 1825 1348">Nama Obat /warna etiket :analsik /putih</td></tr></table>		<b>APOTEK BERKAH</b> JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707	NAMA : A. Ridwan	TGL: 12 -02-2024 ED: 18 / 02 / 2025 NAMA OBAT: Simvastatin	Malam hari 1x SEHARI 1 TAB / <del>ML / SENDOK TAKAR / MAKAN</del> <del>SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN</del>		Nama Obat /warna etiket :Fenofibrate/putih			<b>APOTEK BERKAH</b> JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707	NAMA : A. Ridwan	TGL: 12 -02-2024 ED: 20 / 02 / 2025 NAMA OBAT Fenofibrate	1x SEHARI 1 KAPS / <del>ML / SENDOK TAKAR / MAKAN</del> <del>SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN</del>		Nama Obat /warna etiket :analsik /putih	
	<b>APOTEK BERKAH</b> JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707																	
NAMA : A. Ridwan	TGL: 12 -02-2024 ED: 18 / 02 / 2025 NAMA OBAT: Simvastatin																	
Malam hari 1x SEHARI 1 TAB / <del>ML / SENDOK TAKAR / MAKAN</del> <del>SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN</del>																		
Nama Obat /warna etiket :Fenofibrate/putih																		
	<b>APOTEK BERKAH</b> JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707																	
NAMA : A. Ridwan	TGL: 12 -02-2024 ED: 20 / 02 / 2025 NAMA OBAT Fenofibrate																	
1x SEHARI 1 KAPS / <del>ML / SENDOK TAKAR / MAKAN</del> <del>SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN</del>																		
Nama Obat /warna etiket :analsik /putih																		

		 <p><b>APOTEK BERKAH</b>                  JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden                  Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707</p> <p>NAMA : A. Ridwan <span style="float: right;">TGL: 12 -02-2024</span>  <span style="float: right;">ED: 22 / 02 / 2025</span>                  NAMA OBAT : analsik</p> <p style="text-align: center;"><del>2 X SEHARI 1 TAB/ ML / SENDOK TAKAR / MAKAN</del>  <del>SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN</del></p>		
Nama Obat /warna etiket :Betahistine /putih		 <p><b>APOTEK BERKAH</b>                  JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden                  Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707</p> <p>NAMA : A. Ridwan <span style="float: right;">TGL: 12 -02-2024</span>  <span style="float: right;">ED: 22 / 02 / 2025</span>                  NAMA OBAT : betahistine</p> <p style="text-align: center;"><del>1 X SEHARI 1 TAB / ML / SENDOK TAKAR / MAKAN</del>  <del>SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN</del></p>		
<p style="text-align: center;"><i>E. Product knowledge</i></p>		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="996 1284 1534 1350">                     Nama Obat : Sucralfate syr                      Kandungan : Per 5 ml : Sucralfate 500 mg                 </td> <td data-bbox="1534 1284 2087 1350">                     Nama Obat : Fenofibrate                      Kandungan : Fenofibrate 300 mg                 </td> </tr> </table>	Nama Obat : Sucralfate syr Kandungan : Per 5 ml : Sucralfate 500 mg	Nama Obat : Fenofibrate Kandungan : Fenofibrate 300 mg
Nama Obat : Sucralfate syr Kandungan : Per 5 ml : Sucralfate 500 mg	Nama Obat : Fenofibrate Kandungan : Fenofibrate 300 mg			

		<p>Dosis lazim : PENGGUNAAN OBAT INI HARUS SESUAI DENGAN PETUNJUK DOKTER. Dewasa : 4 x sehari 1 g (2 sendok takar)</p> <p>Kegunaan : Tukak lambung dan usus, gastritis kronik dan profilaksis perdarahan gastrointestinal</p> <p>ESO potensial :hiperglikemia, aspirasi disertai komplikasi pernafasan, vertigo, Sembelit, diare, perut kembung, ketidaknyamanan lambung, mulut kering, dispepsia, mual, muntah.</p> <p>KI : hipersensitivitas</p> <p>PERHATIAN : Gangguan ginjal (misalnya gagal ginjal kronis atau mereka yang menerima dialisis). Lansia. Kehamilan dan menyusui. Kategori kehamilan : Kategori B: Mungkin dapat digunakan oleh wanita hamil. Penelitian pada hewan uji tidak memperlihatkan adanya risiko terhadap janin, namun belum ada bukti penelitian langsung terhadap wanita hamil.</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah 30°C</p>	<p>Dosis lazim : - Dewasa : 3 x sehari 100 mg atau 1 x sehari 300 mg. - Bila setelah melakukan terapi dan diet belum tercapai respons yang memuaskan, maka dosis dapat ditingkatkan menjadi 4 x 100 mg sehari.</p> <p>Kegunaan : Hiperkolesterolemia (tipe IIA), hiperlipidemia kombinasi (tipe IIB dan III), hipertrigliserida endogen (tipe IV) yang tidak memberikan respon dengan cukup terhadap diet dan tindakan lain yang sesuai.</p> <p>ESO potensial : Gangguan pencernaan, reaksi alergi kulit, nyeri otot dengan peningkatan CPK (creatine phosphokinase), peningkatan sedang transaminase serum, perubahan hematologis (pemeriksaan sel darah), alopesia (kebotakan), dan astenia seksual (turunnya performa dalam aktivitas seksual, mudah lelah</p> <p>KI : Wanita hamil dan menyusui. Penderita dengan hipersensitivitas terhadap fenofibrate. Gangguan fungsi hati yang berat. Gangguan fungsi ginjal. Penyakit kandung empedu. Anak-anak.</p> <p>PERHATIAN : - Lakukan pemantauan berkala kadar transaminase (tiap 3 bulan) selama 12 bulan pertama penggunaan. - Hentikan penggunaan untuk sementara bila terjadi peningkatan enzim hati SGPT melebihi 100 IU. - Tidak dianjurkan untuk mengombinasikan dengan obat hepatotoksik. Kategori Kehamilan : Kategori C: Mungkin berisiko. Obat</p>
--	--	--	---

		<p>digunakan dengan hati-hati apabila besarnya manfaat yang diperoleh melebihi besarnya risiko terhadap janin. Penelitian pada hewan uji menunjukkan risiko terhadap janin dan belum terdapat penelitian langsung terhadap wanita hamil. Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah 30°C</p>	
		<p>Nama Obat : Simvastatin Kandungan : Simvastatin 10 mg Dosis lazim : Awalnya, 40 mg sekali sehari. Pasien dengan hiperkolesterolemia familial homozigot: Awalnya, 40 mg sekali sehari. Semua dosis harus diminum di malam hari. Maks: 80 mg setiap hari. Sesuaikan dosis sesuai dengan respon pasien dengan interval minimal 4 minggu. Pasien harus menjalani diet penurunan kolesterol dan modifikasi gaya hidup lainnya sebelum dan selama terapi obat. Anak: Hiperkolesterolemia familial heterozigot: 10-17 tahun Awalnya, 10 mg sekali sehari. Dosis yang dianjurkan: 10-40 mg setiap hari. Sesuaikan dosis sesuai dengan tujuan terapi yang direkomendasikan dengan interval minimal 4 minggu. Semua dosis harus diminum di malam hari. Maks: 40 mg setiap hari. Pasien harus menjalani diet penurunan kolesterol dan modifikasi gaya hidup lainnya sebelum dan selama terapi obat. Kegunaan : Menurunkan kadar kolesterol total, LDL, trigliserida, dan meningkatkan kadar HDL dalam darah.</p>	<p>Nama Obat : analsik Kandungan : 500 mg methampyrone dan 2 mg diazepam Dosis lazim : Dewasa: 1 kaplet, bila nyeri berlanjut minum 1 kaplet setiap 6-8 jam sehari. Dosis maksimal adalah 4 kaplet per hari. Kegunaan : Mengurangi Nyeri Sedang hingga Berat ESO potensial : lelah, mengantuk vertigo penglihatan kabur ataksia konstipasi hipotensi jaundice (penyakit kuning) perubahan libido mual, muntah gemetar KI : TD &lt;100 mmHg, psikosis akut. Hamil, laktasi. Bayi usia 1 bln pertama PERHATIAN : Ggn fungsi hati &amp; ginjal, pasien depresi berat, pasien dg kelainan darah. Cara penyimpanan : Simpan obat Analsik pada suhu di bawah 30 derajat Celsius, di tempat kering dan sejuk</p>

		<p>ESO potensial : embelit, sakit perut, perut kembung, dispepsia, diare, mual, regurgitasi asam, muntah, pankreatitis. Gangguan hepatobilier: Hepatitis, penyakit kuning. Gangguan sistem kekebalan: Reaksi hipersensitivitas. Gangguan metabolisme dan nutrisi: Hiperglikemia. KI : Penyakit hati aktif atau peningkatan transaminase serum persisten yang tidak dapat dijelaskan, miopati sekunder akibat agen penurun lipid lainnya. Penggunaan bersamaan dengan inhibitor CYP3A4 kuat (misalnya itrakonazol, ketoconazole, posaconazole, voriconazole, klaritromisin, eritromisin, telithromycin, nefazodone, inhibitor protease HIV, produk yang mengandung cobicistat, asam fusidat), ciclosporin, danazol dan gemfibrozil. Kehamilan dan menyusui. PERHATIAN : Gangguan ginjal dan hati. Anak-anak dan orang tua. Pasien dengan polimorfisme gen SLCO1B1. Pemberian bersama niasin (=1 g) pada pasien keturunan Cina. Dosis 80 mg harus dibatasi untuk pasien yang telah menggunakan simvastatin 80 mg selama 12 bulan atau lebih. Hentikan sementara simvastatin sebelum operasi besar elektif. Kategori Kehamilan : Kategori X: Kontraindikasi (tidak boleh digunakan). Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah 30°C</p>	
		<p>Nama Obat : Lansoprazole Kandungan : Lansoprazole 30 mg</p>	<p>Nama Obat : Betahistine Kandungan : Betahistine mesylate 6mg</p>




		<p>Dosis lazim : PENGGUNAAN OBAT INI HARUS SESUAI DENGAN PETUNJUK DOKTER. Esofagitis refluks Dewasa: Pengobatan: 30 mg 1 kali sehari, selama 4-8 minggu. Profilaksis: 15 mg 1 kali sehari, dapat ditingkatkan hingga 30 mg jika perlu. Refluks gastro-esofagus Dewasa: 15-30 mg 1 kali sehari, selama 4 minggu. Ulserasi terkait NSAID Dewasa: 30 mg sekali sehari selama 4-8 minggu. Sindrom Zollinger-Ellison Dewasa: Awalnya, 60 mg 2 kali sehari, dapat disesuaikan hingga 180 mg setiap hari sesuai respons. Dosis harian &gt;120 mg harus diberikan dalam 2 dosis terbagi. Eradikasi H. pylori Dewasa: Sebagai terapi rangkap 3: 30 mg 2 kali sehari, selama 7-14 hari (dalam kombinasi dengan antibiotik). Sebagai terapi ganda: 30 mg tiga kali sehari selama 14 hari dalam kombinasi dengan amoksisilin. Tukak lambung/duodenum karena NSAID Dewasa: 15-30 mg 1 kali sehari. Tukak Peptik/ Peptic Ulcer Dewasa: 30 mg 1 kali sehari, selama 2-4 minggu (ulkus duodenum) atau selama 4-8 minggu (tukak lambung). Lansia: Maks: 30 mg per hari. Kegunaan : Pengobatan tukak duodenum dan tukak lambung ringan, tukak peptik, refluks esofagitis, sindrom Zollinger-Ellison dan eradikasi ESO potensial : Hipomagnesemia, fraktur terkait osteoporosis, polip kelenjar fundus, karsinoma, lupus eritematosus kulit subakut, SLE, nefritis interstisial, diare terkait Clostridium difficile, infeksi saluran</p>	<p>Dosis lazim : PENGGUNAAN OBAT INI HARUS SESUAI DENGAN PETUNJUK DOKTER. Dosis yang dianjurkan: 6-12 mg 3x sehari Kegunaan : vertigo, tinnitus, dan gangguan pendengaran yang terkait pada pasien dengan penyakit Meniere ESO potensial : takikardia. Gangguan gastrointestinal: Mual, dispepsia. Jarang, muntah, kembung, distensi atau nyeri perut. Gangguan umum dan kondisi situs admin: Jarang, kelelahan, KI : Hipersensitif, Mengidap feokromositoma (tumor langka pada kelenjar adrenal). PERHATIAN : penggunaan pada pasien dengan asma bronkial, riwayat penyakit tukak lambung, kerusakan hati, ibu hamil dan menyusui. Kategori kehamilan : Belum terdapat data keamanan terkait penggunaan obat ini pada wanita hamil dan/atau menyusui. Konsultasikan kepada dokter apabila Anda sedang hamil dan/atau menyusui. Cara penyimpanan : simpan pada suhu dibawah 30°C</p>
--	--	--	--

		<p>cerna (misalnya Salmonella, Campylobacter), defisiensi vitamin B12 (terapi jangka panjang). Gangguan sistem darah dan limfatik: Trombositopenia, leukopenia, eosinofilia. Gangguan mata: Gangguan penglihatan. Gangguan gastrointestinal: Diare, sakit perut, sembelit, mual, dispepsia, perut kembung, mulut atau tenggorokan kering.</p> <p>KI : Penderita yang hipersensitif terhadap lansoprazole, serta pasien yang sedang mengkonsumsi rilpivirine dan atazanavir.</p> <p>PERHATIAN : HARUS DENGAN RESEP DOKTER. Pasien dengan keganasan lambung, faktor risiko berkurangnya penyerapan vitamin B12 atau berkurangnya simpanan tubuh; risiko osteoporosis. Gangguan hati sedang sampai berat. Tua. Kehamilan dan menyusui. metabolisme ultrarapid CYP2C19. Kategori Kehamilan : Kategori B: Mungkin dapat digunakan oleh wanita hamil. Penelitian pada hewan uji tidak memperlihatkan adanya risiko terhadap janin, namun belum ada bukti penelitian langsung terhadap wanita hamil. Konsultasikan kepada tenaga medis apabila sedang menyusui.</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah 30°C</p>	
		<p>F. Tahap pembuatan</p>	

1. Ambil obat lansoprazole sebanyak 1 strip, sirup sucralfate 1 botol, simvastatin 3 strip, betahistin 5 tablet, fenofibrat 3 strip, analsik tablet 1 strip
2. Tempelkan etiket pada kemasan obat
3. Masukkan kedalam kemasan plastik
4. Cek kembali kesesuaian obat yang di ambil dengan resep serta etiket yang tertempel pada kemasan obat

		<p>G.Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>A= atas nama bapak Ridwan dari Klinik spesialis syaraf ya bapak?</p> <p>P = iya benar mbak</p> <p>A = baik pak mohon maaf sebelumnya untuk obatnya bapak dapat 6 macam ya, untuk lambungnya ada lansoprazole diminum 2 kali sehari 1 tablet sebelum makan dan sucralfat sirup diminum sebelum makan 3 kali sehari 1 sendok takar, Untuk penurun kolestrol ini ada simvastatin ya bapak diminum 1 kali sehari 1 tablet dan fenofibrate diminum 1 kali sehari 1 tablet, obat antinyeri ini ada ansik ya bapak diminum 2 kali sehari 1 tablet dan untuk obat vertigonya ini ada betahistine pak diminum 1 kali sehari 1 tablet ya bapak apakah ada yang ditanyakan?</p> <p>P= Obat yang kolestrol diminum saat kapan ya mbak?</p> <p>A = Saat malam hari ya pak simvastatinnya dan fenofibrate ini diminum diwaktu yang sama pak</p> <p>P = baik mbak</p> <p>A = Apakah ada yang ditanyakan bapak</p> <p>P = tidak ada mbak</p> <p>A = Semoga lekas sembuh bapak</p>
--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																									
24.*	<p>Jenis Resep : Salinan/<del>Resep asli</del>                      Resep obat : <del>Racikan</del>/non racikan                      Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (&gt;/Tidak                      Pengulangan resep : <del>Iter....kali</del>/Neiter                      Tempel Resep/salin resep disini!                      Copy Resep</p> <p><b>Resep yang ada pengulangan / iter *                      (Apotik Mida Farma)</b></p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1093 261 1910 1007"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Tn. Andre</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Riklona R/ Zolta</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Riklona 2 Mg R/ Zolta</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Riklona R/ Zolta</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Riklona 30 R/ Zolta30</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Riklona :1 kali sehari 1 R/tab (malam hari) Zolta :1 kali sehari 1 tab (dimalan hari)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada</td> <td>26/20/24</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada</td> <td>Dr Mefi SpKj</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <table border="1" data-bbox="1111 1086 1648 1214"> <tr> <td>Riklona dibutuhkan sebany 30 tablet</td> </tr> <tr> <td>Zolta dibutuhkan sebanyak 30 tablet</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Tn. Andre	Umur pasien :	Tidak Ada	-	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	R/ Riklona R/ Zolta	Kekuatan :	Ada	R/ Riklona 2 Mg R/ Zolta	Bentuk sed. :	Ada	R/ Riklona R/ Zolta	Jumlah obat :	Ada	R/ Riklona 30 R/ Zolta30	Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada	R/ Riklona :1 kali sehari 1 R/tab (malam hari) Zolta :1 kali sehari 1 tab (dimalan hari)	Tanggal penulisan resep :	Ada	26/20/24	Nama dokter :	Ada	Dr Mefi SpKj	Surat ijin :	Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Tidak Ada	-	Riklona dibutuhkan sebany 30 tablet	Zolta dibutuhkan sebanyak 30 tablet
Nama Pasien :	Ada	Tn. Andre																																									
Umur pasien :	Tidak Ada	-																																									
Berat Badan :	Tidak Ada	-																																									
Nama Obat :	Ada	R/ Riklona R/ Zolta																																									
Kekuatan :	Ada	R/ Riklona 2 Mg R/ Zolta																																									
Bentuk sed. :	Ada	R/ Riklona R/ Zolta																																									
Jumlah obat :	Ada	R/ Riklona 30 R/ Zolta30																																									
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-																																									
Aturan pakai :	Ada	R/ Riklona :1 kali sehari 1 R/tab (malam hari) Zolta :1 kali sehari 1 tab (dimalan hari)																																									
Tanggal penulisan resep :	Ada	26/20/24																																									
Nama dokter :	Ada	Dr Mefi SpKj																																									
Surat ijin :	Tidak Ada	-																																									
Alamat dr. :	Tidak Ada	-																																									
Riklona dibutuhkan sebany 30 tablet																																											
Zolta dibutuhkan sebanyak 30 tablet																																											



C. Perhitungan biaya resep

1. Pengambilan semua obat  
R/ Riklona 2 mg :  $3000 \times 30 = 90.000$   
R/ Zolta :  $8.500 \times 30 = 255.000$   
Total 345.000
2. Pengambilan 10 tab  
R/ Riklona 2 mg :  $3000 \times 10 = 30.000$   
R/ Zolta :  $8.500 \times 10 = 85.000$   
Total : 115.000

D. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Riklona/Putih



APOTEK BERKAH

JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden  
Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707

NAMA : Resi

TGL: 12 -02-2024

ED: 22 / 02 / 2025

NAMA OBAT : Riclona

1 X SEHARI 1 TAB / ~~ML~~ / ~~SENDOK TAKAR~~ / ~~MAKAN~~  
~~SEBELUM~~ / ~~SAAT~~ / ~~SESUDAH MAKAN~~



**APOTEK BERKAH**

JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden  
Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707

NAMA : Resi

TGL: 12 -02-2024

ED: 22 / 02 / 2025

NAMA OBAT : Zolta

**MALAM HARI**

**1 X SEHARI 1 TAB / ~~ML~~ / ~~SENDOK TAKAR~~ / ~~MAKAN~~  
~~SEBELUM~~ / ~~SAAT~~ / ~~SESUDAH MAKAN~~**

*E. Product knowledge*

Nama Obat : Riklona

Kandungan : clonazepam 2 mg

Dosis lazim :

Kegunaan : mengatasi gangguan panik dan kejang epilepsi.

ESO potensial : Kelelahan, mengantuk, letih, pusing, kepala terasa ringan, dan ataksia

Depresi pernapasan

KI : Hipersensitif

terhadap clonazepam dan obat turunan benzodiazepin lainnya, atau zat tambahan lain di

dalamnya, Ketergantungan obat,

Glaukoma sudut sempit, Myasthenia gravis

Nama Obat : Zolta

Kandungan : Zolpidem tartrate 10 mg

Dosis lazim :

Kegunaan : obat yang diindikasikan untuk menangani insomnia jangka pendek.


ESO potensial : Halusinasi, Sakit kepala, Mual muntah, Mengantuk, Badan lemas

KI : Tidak boleh diberikan kepada orang dengan gangguan hati yang berat.

PERHATIAN : nsufisiensi pernapasan; pasien anak; amnesia, depresi, toleransi, ketergantungan, insomnia 'rebound', reaksi

		<p>Gangguan hati, dan gangguan pernapasan  <b>PERHATIAN</b> : Penyakit saluran pernapasan, Gangguan hati dan ginjal berat, Kelemahan otot                  Riwayat penyalahgunaan obat, Kamu harus memberitahu dokter jika sedang hamil atau merencanakan kehamilan jika akan diterapi dengan Riklona                  Dilarang menyusui bayi selama mengonsumsi Riklona,                  Hindari minum alkohol selama terapi dengan Riklona, Riklona dapat menyebabkan ketergantungan psikologis dan fisik.                  Cara penyimpanan : disimpan pada suhu ruang</p>	<p>psikiatrik lain &amp; reaksi paradoksikal, somnabulisme &amp; perilaku yg berhubungan, Lanjut usia.                  Cara penyimpanan : disimpan pada suhu ruang</p>	
		<p>F. Tahap pembuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Skrining resep</li> <li>2) Menghitung harga obat Riklona dan Zolta</li> <li>3) Menulis etiket</li> <li>4) Mengambil obat di tempat obat (rak) Riklona dan Zolta</li> <li>5) Memasukkan kedalam plastik klip dan menempelkan etiket</li> <li>6) Dicek kembali obat dengan kesesuaian di resep</li> </ol> <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p>		

		<p>apt : Atas nama resi, ini total resep semua obatnya 345.000 rupiah, apakah mau diambil semua atau setengah ?</p> <p>Pasien : mau ambil 10 mbak</p> <p>apt : baik pak, untuk totalnya pembayarannya 115.000</p> <p>Pasien : iya mbak</p> <p>apt : Baik pak, mohon ditunggu sebentar ya untuk obatnya</p> <p>Pasien : Iya mbak</p> <p>Apt : mohon maaf pak sebelumnya saya jelaskan dulu ya?</p> <p>Pasien : baik mbak</p> <p>apt : ini tadi ada 2 obat ya pak , ini obat nya Riklona nya pak, diminum 1 kali sehari 1 tab setelah makan dimalam hari saja ya pak,dan untuk zolta nya juga car minumnya 1 kali 1 tab dimalam hari ada yang ingin ditanyakan lagi pak?</p> <p>Pasien : Untuk penyimpanan nya gimana mbak ?</p> <p>apt : Untuk penyimpanan nya disimpan pada suhu ruang dan terhindar dari sinar matahari secara langsung.</p> <p>Pasien : Baik mbak</p> <p>Apt : barangkali ada yang dipertanyakan kembali pak</p> <p>Pasien : sudah cukup mbak</p> <p>Apt : baik pak terimakasih, semoga cepat sembuh</p>	
--	--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
25*	<p>Jenis Resep : Salinan/<del>Racikan</del>/Resep asli                      Resep obat : <del>Racikan</del>/non racikan                      Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (&gt;/Tidak                      Pengulangan resep : <del>iter</del>...kali/Neiter                      Tempel Resep/salin resep disini!                      Copy Resep</p> <p><b>Resep yang ada pengulangan / iter *                      (Apotik Mida Farma)</b></p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1093 261 2002 807"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Ny Triyuni</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Merlopam</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Merlopam 2mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Merlopam 2 mg tab</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Merlopam 2 mg tab LX</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Merlopam 2 mg tab LX 1 kali sehari 1 tab (malam hari)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada</td> <td>19/02/24</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada</td> <td>Dr.Mefi SpKj</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> <p>Merlopam dibutuhkan sebanyak 60 tablet</p> </div> <p>C. Perhitungan biaya resep</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> <p>R/ Merlopam 2 mg tab LX = 20.000 perstrip x 60 tablet = 120.000</p> </div>	Nama Pasien :	Ada	Ny Triyuni	Umur pasien :	Tidak Ada	-	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	R/ Merlopam	Kekuatan :	Ada	R/ Merlopam 2mg	Bentuk sed. :	Ada	R/ Merlopam 2 mg tab	Jumlah obat :	Ada	R/ Merlopam 2 mg tab LX	Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada	R/ Merlopam 2 mg tab LX 1 kali sehari 1 tab (malam hari)	Tanggal penulisan resep :	Ada	19/02/24	Nama dokter :	Ada	Dr.Mefi SpKj	Surat ijin :	Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Tidak Ada	-
Nama Pasien :	Ada	Ny Triyuni																																							
Umur pasien :	Tidak Ada	-																																							
Berat Badan :	Tidak Ada	-																																							
Nama Obat :	Ada	R/ Merlopam																																							
Kekuatan :	Ada	R/ Merlopam 2mg																																							
Bentuk sed. :	Ada	R/ Merlopam 2 mg tab																																							
Jumlah obat :	Ada	R/ Merlopam 2 mg tab LX																																							
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada	R/ Merlopam 2 mg tab LX 1 kali sehari 1 tab (malam hari)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada	19/02/24																																							
Nama dokter :	Ada	Dr.Mefi SpKj																																							
Surat ijin :	Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Tidak Ada	-																																							



D. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Merlopam/Putih



**APOTEK BERKAH**

JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden  
Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707

NAMA : Ny Triyuni

TGL: 12 -02-2024

ED: 22 / 02 / 2025

NAMA OBAT : Merlopam

~~1 X SEHARI 1 TAB / ML / SENDOK TAKAR / MAKAN  
SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN~~

E. *Product knowledge*

Nama Obat : Merlopam

Kandungan : **Lorazepam 2mg**

Dosis lazim : 1–4 mg per hari dibagi menjadi beberapa dosis, dikonsumsi selama 2–4 minggu

Kegunaan : obat yang digunakan untuk mengatasi kecemasan kesulitan tidur, hingga depresi

ESO potensial : Menimbulkan perasaan mengantuk atau lelah di siang hari, Otot yang terasa lemah, Alami masalah terkait koordinasi atau pengendalian gerak, Perubahan mental, Kesulitan untuk bicara

KI : Meningkatkan efek kantuk dan risiko terjadinya gangguan pernapasan berat, koma, bahkan kematian jika digunakan bersama obat golongan opioid, seperti morfin, oxycodone, fentanyl, codein, atau tramadol, Meningkatkan efek kantuk jika digunakan bersama ritonavir, lopinavir, cisapride, disulfiram, atau *muscle relaxant*, seperti baclofen

PERHATIAN : Jangan mengonsumsi lorazepam jika Anda alergi terhadap obat ini atau obat benzodiazepine lain, seperti alprazolam atau diazepam. Selalu beri

tahu dokter tentang riwayat alergi yang Anda miliki, Beri tahu dokter jika Anda menderita gangguan pernapasan berat, *sleep apnea*, glaukoma, myasthenia gravis, atau gagal hati.

Cara penyimpanan : Simpan pada suhu di bawah 25 ° C dan terhindar dari sinar matahari

F. Tahap pembuatan


- 1) Skrining resep
- 2) Menghitung harga obat
- 3) Menulis etiket
- 4) Mengambil obat di tempat obat (rak)
- 5) Memasukkan kedalam plastik klip dan menempelkan etiket
- 6) Dicek kembali obat dengan kesesuaian di resep

G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

		<p>apt : Atas nama ibu triyuni...ibu, ini resepnya totalnya 72.000 rupiah, apakah mau diambil semua atau setengah ?</p> <p>Pasien : Iya mbak</p> <p>apt : ini tadi ada 1 obat ya bu, ini merlopam nya digunakan untuk mengatasi kecemasan kesulitan tidur diminum malam hari sekali ada yang ingin ditanyakan lagi bu?</p> <p>Pasien : Untuk penyimpanan nya gimana mbak ?</p> <p>apt : Untuk penyimpanan nya disimpan pada suhu di bawah 25 ° C dan terhindar dari sinar matahari secara langsung..</p> <p>Pasien : Baik mbak</p> <p>apt : baik bu, terimakasih banyak ya bu semoga cepat sembuh dan sehat selalu.</p> <p>Pasien : baik mbak terima kasih juga.</p>
--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																											
26*	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli</p> <p>Resep obat : <del>Racikan</del>/non racikan</p> <p>Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (&gt;/Tidak</p> <p>Pengulangan resep : <del>iter....kali</del>/Neiter</p> <p>Tempel Resep/salin resep disini!</p> <p>Copy Resep</p> <p><b>Resep yang ada pengulangan / iter *</b> <b>(Apotik eRDE FARMA)</b></p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Resi</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Molinta R/ Formical – B</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Molinta tablet R/ Formical – B tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Molinta No. X R/ Formical – B No. XVIII</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Molinta S 1 dd 1 R/ Formical – B S 1 dd 1</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Resi	Umur pasien :	Tidak Ada	-	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	R/ Molinta R/ Formical – B	Kekuatan :	Tidak Ada	-	Bentuk sed. :	Ada	R/ Molinta tablet R/ Formical – B tablet	Jumlah obat :	Ada	R/ Molinta No. X R/ Formical – B No. XVIII	Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada	R/ Molinta S 1 dd 1 R/ Formical – B S 1 dd 1
Nama Pasien :	Ada	Resi																											
Umur pasien :	Tidak Ada	-																											
Berat Badan :	Tidak Ada	-																											
Nama Obat :	Ada	R/ Molinta R/ Formical – B																											
Kekuatan :	Tidak Ada	-																											
Bentuk sed. :	Ada	R/ Molinta tablet R/ Formical – B tablet																											
Jumlah obat :	Ada	R/ Molinta No. X R/ Formical – B No. XVIII																											
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-																											
Aturan pakai :	Ada	R/ Molinta S 1 dd 1 R/ Formical – B S 1 dd 1																											

TUGAS KHUSUS PKL D3 FARMASI UMG\_AZMI SABILA KISBATUL WAFI\_211105018\_APOTEK BERKAH



Tanggal penulisan resep :	Ada	19/01/24
Nama dokter :	Ada	Dr. Riko Andiya SPOG
Surat ijin :	Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Tidak Ada	Jl. Dr Wahidin Sukikusumodo Randuagung 120 Gresik

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Molinda yang dibutuhkan 10 tablet  
Formical – B yang dibutuhkan 18 tablet

C. Perhitungan biaya resep

Molinda = Rp. 20.000 x 10 tab = Rp. 20.000  
Formical = Rp. 6.000 x 18 tab = Rp. 108.000  
Biaya R/ = Rp. 1.000 x 2 = Rp. 2.000  
Total semuanya Rp. 130.000

D. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Molinda/Putih



**APOTEK BERKAH**

JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden  
Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707

NAMA : Resi

TGL: 08 -02-2024

ED: 25 / 02 / 2026

NAMA OBAT : molinta

1 X SEHARI 1 TAB / ~~ML~~ / ~~SENDOK TAKAR~~ / ~~MAKAN~~  
~~SEBELUM~~ / ~~SAAT~~ / ~~SESUDAH MAKAN~~

Nama obat / warna etiket : Formical/putih



**APOTEK BERKAH**

JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden  
Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707

NAMA : Resi

TGL: 08 -02-2024

ED: 25 / 02 / 2026


NAMA OBAT : formical

1 X SEHARI 1 TAB / ~~ML~~ / ~~SENDOK TAKAR~~ / ~~MAKAN~~  
~~SEBELUM~~ / ~~SAAT~~ / ~~SESUDAH MAKAN~~



		<p>E. <i>Product knowledge</i></p> <p>Nama Obat : Molinta                  Kandungan : <b>choline, bitartrate, DNA oil, vitamin A, Vitamin B, Vitamin B12, Vitamin D3, Zn ,Fe</b>                  Dosis lazim : 1 kali sehari 1 tablet                  Kegunaan : suplemen untuk masa kehamilan dan menyusui                  ESO potensial : Mual, muntah, pusing, atau sakit kepala, timbul reaksi alergi teses berwarna agak gelap                  KI : penderitaan alergi berat terhadap salah satu kandungan dari suplemen ini                  PERHATIAN : hentikan pemakaian jika muncul reaksi yang tidak diinginkan                  Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya</p>	<p>Nama Obat : Formical -B                  Kandungan : <b>Calcium, magnesium hydroxide zinc sulphate monohydrate, vitamin D3, Boron glycinate</b>                  Dosis lazim : 2 – 3 kali sehari 1 tablet                  Kegunaan : untuk membantu absorpsi calcium. Calcium diperlukan dalam tubuh untuk pembentukan tulang dan gigi                  ESO potensial : Hiperkalsemia (dalam asupan berlebih)                  KI :penderitaan dengan hipersensivitas dengan D3 dan analognya atau dengan komponen lain dalam formula, hiperkalsenia dan liperkalsiuria, kalsium nefrolitiasis, netrokalsinosis, hipervitaniosis D, kerusakan ginjal berat dan gagal ginjal                  PERHATIAN : tidak boleh digunakan bersamaan dengan alkohol, aman digunakan selama masa kehamilan jika diresepkan                  Cara penyimpanan : simpan ditempat kering pada suhu dibawah 30°C serta terlindung dari cahaya matahari langsung</p>
		<p>F. Tahap pembuatan</p>	

		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan skrining resep</li><li>2. Mengecek ketersediaan obat diapotik</li><li>3. menghitung harga obat Molinta dan Formical</li><li>4. Menulis etiket</li><li>5. Mengambil obat di tempat obat (rak)</li><li>6. Memasukkan kedalam plastik klip dan menempelkan etiket</li><li>7. Dicek kembali obat dengan kesesuaian di resep</li></ol> <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>apt : Atas nama ibu resi, ini resepnya totalnya 130.000 rupiah, apakah obatnya diambil semua atau diambil setengah ya bu ?</p> <p>Pasien : semuanya mba</p> <p>apt : Baik ibu, mohon ditunggu sebentar ya untuk obatnya</p> <p>Pasien : Iya mbak</p> <p>apt : Resep atas nama ibu resi</p> <p>Pasien : Iya mbak betul</p> <p>apt : Baik bu, ini ada 2 obat ya bu, ini molinta nya digunakan untuk suplemen pada masa kehamilan dan menyusui nya diminum 1 kali sehari 1 tablet sesudah makan, dan ini formical – B digunakan untuk membantu absorpsi calcium diperlukan untuk pembentukan tulang dan gigi diminum 1x Sehari 1 tablet sesudah makan ada yang ingin ditanyakan lagi bu?</p> <p>Pasien : Untuk penyimpanan nya gimana mbak ?</p> <p>apt : Untuk penyimpanan nya disimpan ditempat yang sejuk dan kering dan terhindar dari sinar matahari secara langsung.</p> <p>Pasien : Baik mbak</p> <p>apt : baik bu, terimakasih banyak bu semoga lekas sembuh dan sehat selalu.</p> <p>Pasien : baik mbak terima kasih juga.</p>	
--	--	---	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
27.*	<p>Jenis Resep : Resep obat lainnya                      Resep obat : non racikan                      Jumlah obat dalam resep : 1 macam obat                      Pengulangan resep : -</p> <p><b>Resep lainnya</b></p> 	<p>a. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1003 306 2056 954"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Devi Puti Hariyono</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Sanmol drop</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Sanmol drop</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Sanmol drop No. I</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Sanmol drop S 4 x 0,3 cc prn</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada</td> <td>07 – 02 – 2024</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Dr. Lailatul Inayah</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada</td> <td>Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jl. KH. Kholil 88 Gresik</td> </tr> </table> <p>b. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div data-bbox="1070 1066 2024 1142" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Sanmol drop yang dibutuhkan sebanyak 1 pcs</p> </div> <p>c. Perhitungan biaya resep</p> <div data-bbox="1070 1254 2024 1353" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>R/ Sanmol drop No. 1 = Rp. 23.000</p> </div>	Nama Pasien :	Ada	Devi Puti Hariyono	Umur pasien :	Tidak Ada	-	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	R/ Sanmol drop	Kekuatan :	Tidak Ada	-	Bentuk sed. :	Ada	R/ Sanmol drop	Jumlah obat :	Ada	R/ Sanmol drop No. I	Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada	R/ Sanmol drop S 4 x 0,3 cc prn	Tanggal penulisan resep :	Ada	07 – 02 – 2024	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Lailatul Inayah	Surat ijin :	Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada	Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jl. KH. Kholil 88 Gresik
Nama Pasien :	Ada	Devi Puti Hariyono																																							
Umur pasien :	Tidak Ada	-																																							
Berat Badan :	Tidak Ada	-																																							
Nama Obat :	Ada	R/ Sanmol drop																																							
Kekuatan :	Tidak Ada	-																																							
Bentuk sed. :	Ada	R/ Sanmol drop																																							
Jumlah obat :	Ada	R/ Sanmol drop No. I																																							
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada	R/ Sanmol drop S 4 x 0,3 cc prn																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada	07 – 02 – 2024																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Lailatul Inayah																																							
Surat ijin :	Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada	Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jl. KH. Kholil 88 Gresik																																							

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Sanmol drop / putih



**APOTEK BERKAH**

JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden  
Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707

Nama : Devi Putri Hariyono

TGL: 07 – 02 – 2024

ED : 18 – 12 – 2028

NAMA OBAT: Sanmol drop

~~4 x SEHARI 0,3 CC BISI / ML / SENDOK TAKAR / MAKAN  
SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN (PAGI DAN SIANG)~~

e. *Product knowledge*

Nama Obat : Sanmol drop

Kandungan : setiap 0.6 ml mengandung parasetamol 60mg

ESO potensial : hematological, alergi kulit, reaksi alergi lain dan kerusakan hati untuk penggunaan jangka panjang

Dosis lazim : anak 1-2 tahun : 3-4 x sehari 0.6-1.2 mL. anak

KI : penderita gangguan fungsi hati yang berat. Hipersensitivitas terhadap Paracetamol

PERHATIAN : disfungsi hati dan ginjal

Cara penyimpanan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari

f. Tahap pembuatan

- 1) Ambil obat sanmol drop pada rak obat sanmol drop dibutuhkan sebanyak 1 pcs
- 2) ditemplei etiket pada kemasan obat tablet
- 3) Masukkan kedalam kemasan plastik
- 4) Cek kembali kesesuaian obat yang di ambil dengan resep serta etiket yang tertempel pada kemasan obat

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)



**P = Pasien A = Apoteker**

APT : atas nama anak Devi Putri Hariyono ?

Pasien : iya mbak

Apt : dengan anak Devi Putri Hariyono ?

Pasien : iya mbak benar .

Apt : baik bu, saya jelaskan dulu ya obatnya

Pasien : iya mbak


Apt : ini bu obatnya sanmol drop diminum sebanyak 3 tetes pipet tetes setelah makan ya bu

Pasien : iya mbak

Apt : apa ada yang ditanyakan ibu atau kurang jelas dari penjelasan saya ibu?

Pasien : sudah jelas mbak, terimakasih

Apt : baik pak, terimakasih kembali. Semoga lekas sembuh

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
28.*	<p>Jenis Resep : Resep lainnya                      Resep obat : Non racikan                      Jumlah obat dalam resep : 2 macam obat                      Pengulangan resep : -</p> <p><b>Resep lainnya</b></p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1003 268 1850 1139"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Nur Rotut Diniya</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ cetrizine R/ Cortidex</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada</td> <td>R/ cetrizine R/ Cortidex</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Cetrizine tab R/ Cortidex tab</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Cetrizine tab S 2 X 1 R/ Cortidex tab S 3 x 1</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada</td> <td>14 – 02 - 2024</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada</td> <td>Dr. Lailatul Inayah</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jl. KH. Kholil 88 Gresik</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Cetrizine tab yang dibutuhkan sebanyak 10 tablet                      Cortidex tab yang dibutuhkan sebanyak 10 tablet</p> </div>	Nama Pasien :	Ada	Nur Rotut Diniya	Umur pasien :	Tidak Ada	-	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	R/ cetrizine R/ Cortidex	Kekuatan :	Tidak Ada	-	Bentuk sed. :	Ada	R/ cetrizine R/ Cortidex	Jumlah obat :	Ada	R/ Cetrizine tab R/ Cortidex tab	Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada	R/ Cetrizine tab S 2 X 1 R/ Cortidex tab S 3 x 1	Tanggal penulisan resep :	Ada	14 – 02 - 2024	Nama dokter :	Ada	Dr. Lailatul Inayah	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jl. KH. Kholil 88 Gresik
Nama Pasien :	Ada	Nur Rotut Diniya																																							
Umur pasien :	Tidak Ada	-																																							
Berat Badan :	Tidak Ada	-																																							
Nama Obat :	Ada	R/ cetrizine R/ Cortidex																																							
Kekuatan :	Tidak Ada	-																																							
Bentuk sed. :	Ada	R/ cetrizine R/ Cortidex																																							
Jumlah obat :	Ada	R/ Cetrizine tab R/ Cortidex tab																																							
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada	R/ Cetrizine tab S 2 X 1 R/ Cortidex tab S 3 x 1																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada	14 – 02 - 2024																																							
Nama dokter :	Ada	Dr. Lailatul Inayah																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jl. KH. Kholil 88 Gresik																																							

C. Perhitungan biaya resep

Cetirizin = Rp. 500 per tablet x 10 = 5.000  
Cortidex = Rp. 400 per tablet x 10 = 4.000  
Total semua = 9.000

D. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : Cetirizine / Putih



APOTEK BERKAH

JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden  
Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707

NAMA : NY. Nur Rotut Diniya

TGL: 14 - 02 - 2024

ED: 15 - 12 - 2028

NAMA OBAT: Cetirizine

2 x SEHARI 1 TAB / ~~ML~~ / ~~SENDOK TAKAR~~ / ~~MAKAN~~  
~~SEBELUM~~ / ~~SAAT~~ / ~~SESUDAH MAKAN~~

Nama Obat /warna etiket : Cortidex / Putih



**APOTEK BERKAH**

JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden  
Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707

Nama : Ny. Nur Rotut Diniya

TGL: 14 – 02 – 2021

ED : 18 – 11 – 2028

NAMA OBAT: Cortidex

~~3 x SEHARI 1 TAB /ML/ SENDOK TAKAR/ MAKAN  
SEBELUM / SAAT/ SESUDAH MAKAN~~

*E. Product knowledge*

Nama Obat : Cortidex

Kandungan : dexamethasone

Dosis lazim : Dewasa 0.5-9 mg dalam dosis terbagi. Anak 6-12 tahun: 0.25-2 mg, 1-5 tahun 0.25-1 mg, < 1 tahun 0.1-0.25 mg. Diberikan 2 kali sehari

Kegunaan : Alergi, penyakit kolagen, reumatik, leukemia & limfoma, syok, penyakit pernafasan, gangguan hematologik, edematus. ESO potensial : Retensi air & garam, edema, hipertensi, amenore, hiperhidrosis, gangguan mental, pankreatitis akut, osteonekrosis, lemah otot, sindrom Cushing, peningkatan TIO, gangguan penglihatan, atrofi lokal, nafsu makan meningkat, pertumbuhan terlambat.

Nama Obat : Cetrizin

Kandungan : Cetrizin HCI 10 mg

Dosis lazim : 1 kaplet (10mg) 1 kali sehari. Keamanan penggunaan pada anak - anak usia <2 tahun belum ditetapkan


Kegunaan : Untuk pengobatan rinitis perennial, rinitis alergi, urtikaria idiopatik kronis.

ESO potensial : Perasaan mengantuk, pusing – pusing, sakit kepala, gelisah, mulut kering, dan gangguan saluran pencernaan.

		<p>KI : infeksi jamur sistemik, infeksi sistemik kecuali diobati dengan anti infeksi spesifik. Perforasi membran gendang (otic). Pemberian vaksin virus hidup.</p> <p>PERHATIAN : Hipertensi, gagal jantung kongestif, DM, penyakit infeksi, gagal ginjal kronis, uremia, usia lanjut, hamil.</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk (15 –30 derajat Celcius) dan kering, terlindung dari cahaya.</p>	<p>KI : Hipersensitivitas terhadap cetrizine, bu menyusui</p> <p>PERHATIAN : Wajib Dengan Resep Dokter</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah 30C</p>
<p>F. Tahap pembuatan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Ambil obat citriline pada rak obat citriline sebanyak 10 tablet</li><li>2) Ambil obat cortidex pada rak obat cortidex sebanyak 10 tablet</li><li>3) Diberi etiket berwarna putih pada obat cetrizine dan cortidex</li><li>4) Masukkan kedalam kemasan plastik</li><li>5) Cek kembali kesesuaian obat yang di ambil dengan resep serta etiket yang tertempel pada kemasan obat</li></ol> <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p>			



		<p>Apt : atas nama ibu nur rotut diniya</p> <p>Pasien : iya mbak</p> <p>Apt : dengan ibu nur tanggal lahirnya berapa bu ?</p> <p>Pasien : iyh mba, tanggal lahir saya 10 – 9 – 1980</p> <p>Apt : baik bu, saya jelaskan dulu ya obatnya</p> <p>Pasien : iya mbak</p> <p>Apt : ini bu ada 2 macam obatnya ya. Obat yang pertama yaitu obat cetirizine ada 10 tablet ya bu diminum dua kali sehari satu biji setelah makan ya bu, yang kedua yaitu cortidex jumlahnya ada 10 tablet diminum tiga kali sehari satu biji setelah makan ya bu</p> <p>Pasien : iya mbak</p> <p>Apt : apa ada yang ditanyakan ibu atau kurang jelas dari penjelasan saya ibu?</p> <p>Pasien : sudah jelas mbak, terimakasih</p> <p>Apt : baik pak, terimakasih kembali. Semoga lekas sembuh</p>
--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
29.*	<p>Jenis Resep : Resep obat                      Resep obat : Racikan                      Jumlah obat dalam resep :                      Pengulangan resep :</p> <p><b>Resep lainnya</b></p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1099 304 2056 1102"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>A Asyhadi Cahyadi</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Fusicom</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sediaan :</td> <td>Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Fusicom No. 1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>R/ Miniaspi No. VI S 1 dd 1 R/ Sansulin rapid No. I Novofine No. II Alkohol Suab No. IV</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada</td> <td>16 – 02 – 2024</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada</td> <td>Dr. Moh. Fajril Falakhi IGD</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jl. KH. Kholil 88 Gresik</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>Fusicom dibutuhkan sebanyak 1 pcs</p> </div>	Nama Pasien :	Ada	A Asyhadi Cahyadi	Umur pasien :	Tidak Ada	-	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	R/ Fusicom	Kekuatan :	Tidak Ada	-	Bentuk sediaan :	Ada	-	Jumlah obat :	Ada	R/ Fusicom No. 1	Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada	R/ Miniaspi No. VI S 1 dd 1 R/ Sansulin rapid No. I Novofine No. II Alkohol Suab No. IV	Tanggal penulisan resep :	Ada	16 – 02 – 2024	Nama dokter :	Ada	Dr. Moh. Fajril Falakhi IGD	Surat ijin :	Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jl. KH. Kholil 88 Gresik
Nama Pasien :	Ada	A Asyhadi Cahyadi																																							
Umur pasien :	Tidak Ada	-																																							
Berat Badan :	Tidak Ada	-																																							
Nama Obat :	Ada	R/ Fusicom																																							
Kekuatan :	Tidak Ada	-																																							
Bentuk sediaan :	Ada	-																																							
Jumlah obat :	Ada	R/ Fusicom No. 1																																							
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada	R/ Miniaspi No. VI S 1 dd 1 R/ Sansulin rapid No. I Novofine No. II Alkohol Suab No. IV																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada	16 – 02 – 2024																																							
Nama dokter :	Ada	Dr. Moh. Fajril Falakhi IGD																																							
Surat ijin :	Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jl. KH. Kholil 88 Gresik																																							

C. Perhitungan biaya resep

Fusicom No 1 = Rp. 61.000 perpcs x 1 pcs = Rp. 61.000

D. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Fusycom Cream / biru



**APOTEK BERKAH**

JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden  
Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707

Nama : A Asyhadi Cahyadi,TN

TGL: 16 – 02 - 2024

**Fusycom Cream**  
**Oleskan 3 kali sehari**

~~Serahkan dokter~~ / obat luar

E. *Product knowledge*

Nama Obat : Fusycom

Kandungan : asam fusidat 20 mg

Dosis lazim : gunakan 3 – 4 kali sehari

Kegunaan : Sebagai pengobatan infeksi kulit yang disebabkan oleh Staphyococcus dan bakteri lain yang rentan terhadap asam fusidat

ESO potensial : Reaksi hipersensitifitas kulit.

KI : Hipersensitivitas

PERHATIAN : HIndari kontak dengan mata. Hamil, menyusui.


Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah 30°C, terlindung dari cahaya. Jauhkan obat dari jangkauan anak – anak

F. Tahap pembuatan

- 1) Ambil cream fusycom pada rak cream fusycom sebanyak 1 pcs
- 2) Ditempel etiket pada kemasan cream fuscym
- 3) Masukkan kedalam kemasan plastik
- 4) Cek kembali kesesuaian obat yang di ambil dengan resep serta etiket yang tertempel pada kemasan obat

		<p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>APT : atas nama A. Asyhadi Cahyadi</p> <p>Pasien : iya mbak</p> <p>Apt : dengan A. Asyhadi Cahyadi tanggal lahirnya berapa pak ?</p> <p>Pasien : iyh mba, tanggal lahir saya 15 – 12 – 1981</p> <p>Apt : baik pak, saya jelaskan dulu ya obatnya</p> <p>Pasien : iya mbak</p> <p>Apt : ini pak ada 1 macam pak yaitu cream digunakan sebanyak 3 kali sehari untuk pemakaian luar.</p> <p>Pasien : iya mbak</p> <p>Apt : apa ada yang ditanyakan bapak atau kurang jelas tadi penjelasan saya bapak?</p> <p>Pasien : sudah jelas mbak, terimakasih</p> <p>Apt : baik pak, terimakasih kembali. Semoga lekas sembuh</p>
--	--	---



No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																								
30.*	<p>Jenis Resep : Resep obat lainnya                      Resep obat : Racikan dan non racikan                      Jumlah obat dalam resep : 4 macam obat                      Pengulangan resep :</p> <p><b>Resep obat lainnya</b></p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1093 304 2056 1177"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Taufiq Hidayat</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>R/ INH 400 R/ RIF 450</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada</td> <td>R/ INH 400 R/ RIF 450</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>R/ INH 400 No. XV R/ RIF 450 No. XV</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>R/ INH 400 No. XV S 1 x 1 R/ RIF 450 No. XV S 1 x 1</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>26 – 02 – 2024</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Dr. Achmad Nurdin, Sp.P</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada</td> <td>Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jl. KH. Kholil 88 Gresik</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <table border="1" data-bbox="1093 1289 2056 1390"> <tr> <td>INH 400 dibutuhkan sebanyak 15 tablet RIF 450 dibutuhkan sebanyak 15 tablet</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Taufiq Hidayat	Umur pasien :	Tidak Ada	-	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	R/ INH 400 R/ RIF 450	Kekuatan :	Ada	R/ INH 400 R/ RIF 450	Bentuk sed. :	Tidak Ada	-	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	R/ INH 400 No. XV R/ RIF 450 No. XV	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	R/ INH 400 No. XV S 1 x 1 R/ RIF 450 No. XV S 1 x 1	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	26 – 02 – 2024	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Achmad Nurdin, Sp.P	Surat ijin :	Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada	Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jl. KH. Kholil 88 Gresik	INH 400 dibutuhkan sebanyak 15 tablet RIF 450 dibutuhkan sebanyak 15 tablet
Nama Pasien :	Ada	Taufiq Hidayat																																								
Umur pasien :	Tidak Ada	-																																								
Berat Badan :	Tidak Ada	-																																								
Nama Obat :	Ada	R/ INH 400 R/ RIF 450																																								
Kekuatan :	Ada	R/ INH 400 R/ RIF 450																																								
Bentuk sed. :	Tidak Ada	-																																								
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	R/ INH 400 No. XV R/ RIF 450 No. XV																																								
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																								
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	R/ INH 400 No. XV S 1 x 1 R/ RIF 450 No. XV S 1 x 1																																								
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	26 – 02 – 2024																																								
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Achmad Nurdin, Sp.P																																								
Surat ijin :	Tidak Ada	-																																								
Alamat dr. :	Ada	Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jl. KH. Kholil 88 Gresik																																								
INH 400 dibutuhkan sebanyak 15 tablet RIF 450 dibutuhkan sebanyak 15 tablet																																										

C. Perhitungan biaya resep

R/ INH 400 No. XV = Rp. 800 per tablet x 15 tablet = Rp. 12.000  
R/ RIF 450 No. XV = Rp. 700 per tablet x 15 tablet = Rp. 10.500  
Total semua : Rp. 22.500

1. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : INH 400/ Putih



**APOTEK BERKAH**

Jl. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden  
Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707

Nama : Taufiq Hidayat

TGL: 15 – 02 – 2024

ED : 25 – 11 – 2025

NAMA OBAT: INH 400

1 x SEHARI 1 TAB / ~~ML~~ / ~~SENDOK TAKAR~~ / ~~MAKAN~~  
~~SEBELUM~~ / ~~SAAT~~ / ~~SESUDAH MAKAN~~

		<p>Nama Obat /warna etiket : RIF 450 / Putih</p> <div data-bbox="1003 272 2094 405" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p><b>APOTEK BERKAH</b>                  JL. Raya Peganden No. 26/1A Kel. Peganden                  Kec. Manyar Kab. Gresik, Telp 081324097707</p> </div> <p>Nama : Taufiq Hidayat <span style="float: right;">TGL: 15 – 02 – 2024</span>  <span style="float: right;">ED : 25 – 11 – 2025</span>  <span style="float: right;">NAMA OBAT : RIF 450</span></p> <p style="text-align: center;"><del>1 x SEHARI 1 TAB / ML / SENDOK TAKAR / MAKAN</del>  <del>SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN</del></p> <p><i>E. Product knowledge</i></p> <table border="1" data-bbox="1003 863 2094 1378" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p>Nama Obat : INH 400                      Kandungan : Isoniazid 400 mg dan pyridoxine (Vitamin B6)10 mg                      Dosis lazim : 1 tablet 1 kali sehari                      Kegunaan : TBC paru                      ESO potensial : Gangguan gastrointestinal, neuropati perifer, neuritis optikus, kejang, psikosis, gangguan hati, kelainan darah, reaksi kulit, hiperglikemi, asidosis, pelagra.                      KI : Hipersensitif, penderita penyakit hati yang disebabkan oleh obat-obatan lain.</p> </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p>Nama Obat : RIF 450                      Kandungan : Rifampicin 450 mg Dosis lazim : TBC dewasa 450-600 mg/hari sebagai dosis tunggal, anak 10-20 mg/kgBB 1 kali sehari. Lepra dewasa 450-600 1 kali sehari, anak 10-15 mg/kgBB 1 kali sehari. Dosis 600 mg/hari jangan dikombinasikan dengan antileprotik yang lain.                      Kegunaan : TB pulmoner dan ekstra pulmoner, lepra                      ESO potensial : Urin, sputum, air mata dan lensa kontak berwarna merah.                      Gangguan gastrointestinal, fungsi hati</p> </td> </tr> </table>	<p>Nama Obat : INH 400                      Kandungan : Isoniazid 400 mg dan pyridoxine (Vitamin B6)10 mg                      Dosis lazim : 1 tablet 1 kali sehari                      Kegunaan : TBC paru                      ESO potensial : Gangguan gastrointestinal, neuropati perifer, neuritis optikus, kejang, psikosis, gangguan hati, kelainan darah, reaksi kulit, hiperglikemi, asidosis, pelagra.                      KI : Hipersensitif, penderita penyakit hati yang disebabkan oleh obat-obatan lain.</p>	<p>Nama Obat : RIF 450                      Kandungan : Rifampicin 450 mg Dosis lazim : TBC dewasa 450-600 mg/hari sebagai dosis tunggal, anak 10-20 mg/kgBB 1 kali sehari. Lepra dewasa 450-600 1 kali sehari, anak 10-15 mg/kgBB 1 kali sehari. Dosis 600 mg/hari jangan dikombinasikan dengan antileprotik yang lain.                      Kegunaan : TB pulmoner dan ekstra pulmoner, lepra                      ESO potensial : Urin, sputum, air mata dan lensa kontak berwarna merah.                      Gangguan gastrointestinal, fungsi hati</p>
<p>Nama Obat : INH 400                      Kandungan : Isoniazid 400 mg dan pyridoxine (Vitamin B6)10 mg                      Dosis lazim : 1 tablet 1 kali sehari                      Kegunaan : TBC paru                      ESO potensial : Gangguan gastrointestinal, neuropati perifer, neuritis optikus, kejang, psikosis, gangguan hati, kelainan darah, reaksi kulit, hiperglikemi, asidosis, pelagra.                      KI : Hipersensitif, penderita penyakit hati yang disebabkan oleh obat-obatan lain.</p>	<p>Nama Obat : RIF 450                      Kandungan : Rifampicin 450 mg Dosis lazim : TBC dewasa 450-600 mg/hari sebagai dosis tunggal, anak 10-20 mg/kgBB 1 kali sehari. Lepra dewasa 450-600 1 kali sehari, anak 10-15 mg/kgBB 1 kali sehari. Dosis 600 mg/hari jangan dikombinasikan dengan antileprotik yang lain.                      Kegunaan : TB pulmoner dan ekstra pulmoner, lepra                      ESO potensial : Urin, sputum, air mata dan lensa kontak berwarna merah.                      Gangguan gastrointestinal, fungsi hati</p>			

		<p>PERHATIAN : Gangguan fungsi hati dan ginjal pada pasien yang menggunakan obat hepatotoksik lainnya, kejang, DM, alkoholik kronik, hamil, laktasi.</p> <p>Cara penyimpanan : simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>	<p>abnormal, gejala flu, perubahan fungsi ginjal dan gagal ginjal.</p> <p>KI : Hipersensitif . Ikterus</p> <p>PERHATIAN : kerusakan fungsi hati, hamil trimester 1</p> <p>Cara penyimpanan : simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>	
		<p>1. Tahap pembuatan</p> <table border="1" data-bbox="1005 579 2089 986"><tr><td data-bbox="1005 579 2089 986"><ol style="list-style-type: none"><li>1. Ambil INH 400 pada rak INH 400 dibutuhkan sebanyak 15 tablet</li><li>2. Ambil RIF 450 pada rak RIF 450 sebanyak `15 tablet</li><li>3. Staples etiket pada kemasan obat tablet</li><li>4. Masukkan kedalam kemasan plastik</li><li>5. Cek kembali kesesuaian obat yang di ambil dengan resep serta etiket yang tertempel pada kemasan obat</li></ol></td></tr></table>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ambil INH 400 pada rak INH 400 dibutuhkan sebanyak 15 tablet</li><li>2. Ambil RIF 450 pada rak RIF 450 sebanyak `15 tablet</li><li>3. Staples etiket pada kemasan obat tablet</li><li>4. Masukkan kedalam kemasan plastik</li><li>5. Cek kembali kesesuaian obat yang di ambil dengan resep serta etiket yang tertempel pada kemasan obat</li></ol>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ambil INH 400 pada rak INH 400 dibutuhkan sebanyak 15 tablet</li><li>2. Ambil RIF 450 pada rak RIF 450 sebanyak `15 tablet</li><li>3. Staples etiket pada kemasan obat tablet</li><li>4. Masukkan kedalam kemasan plastik</li><li>5. Cek kembali kesesuaian obat yang di ambil dengan resep serta etiket yang tertempel pada kemasan obat</li></ol>				

2. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

**P = Pasien A = Apoteker**

APT : atas nama Taufiq Hidayat

Pasien : iya mbak

Apt : baik pak, saya jelaskan dulu ya obatnya

Pasien : iya mbak

Apt : ini pak ada 2 macam obat. Obat yang pertama yaitu INH 400 jumlahnya ada 15 tablet diminum satu kali sehari, yang kedua yaitu RIF 450 jumlahnya ada 15 tablet diminum satu kali sehari.

Pasien : iya mbak

Apt : apa ada yang ditanyakan ibu atau kurang jelas dari penjelasan saya ibu?

Pasien : sudah jelas mbak, terimakasih

Apt : baik pak, terimakasih kembali. Semoga lekas sembuh



TUGAS KHUSUS PKL D3 FARMASI UMG\_AZMI SABILA KISBATUL WAFI\_211105018\_APOTEK BERKAH

Gresik,

Dosen Pembimbing PKL,



Apt. Siti Nur Asiyah., M. Farm, Klin.

NIDN 0711088504

Gresik,

Pembimbing Lapangan,



APOTEK  
BERKAH  
JL. RAYA PEGADAJAN NO. 26/1A  
KEC. M. KAR. - KAB. GRESIK

Apt. Ersanda Nurma Praditapuspa, S.Farm., M.Farm.

SIPA. 19961113/SIPA\_35.25/2019/22275



**B. PRODUCT KNOWLEDGE BERDASARKAN KELAS TERAPI****(1) ANALGETIK- ANTIPIRETIK- ANTIINFLAMASI**

<b>Golongan</b>	<b>Nama Obat</b>	<b>Nama Obat di Tempat PKL</b>	<b>Kontraindikasi</b>	<b>Indikasi</b>	<b>Dosis dan Cara Pakai</b>	<b>Efek Samping</b>	<b>Cara Simpan</b>
Analgetik- Antipiretik- Antiinflamasi	acetaminophen,	Sanmol tab	Penderita gangguan fungsi hati yang berat. Hipersensitivitas terhadap Paracetamol.	Meringankan rasa sakit pada keadaan sakit kepala, sakit gigi dan menurunkan demam	Dewasa dan anak >12 tahun : 1 tablet, 3-4 kali sehari Anak : ½ - 1 tablet, 3-4 kali sehari	Hematologi, reaksi kulit, reaksi alergi, kerusakan hati (penggunaan jangka panjang )	Simpan ditempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung
	metampiron,	Metamizole Sodium tab Fm	Pada pasien yang memiliki riwayat hipersensitivitas terhadap metamizole, diskrasia darah, dan gangguan fungsi susmsum tulang	Meredakan nyeri akut dan kronik berat, sakit kepala, penyakit reumatik, sakit gigi, nyeri setelah pasca operasi, nyeri otot, nyeri kolik.	Dewasa : 0,5–1 gram, 3–4 kali sehari. Dosis maksimal adalah 4 gram per hari. Durasi pengobatan selama 3–5 hari.  Anak-anak usia ≥3 bulan: 8–16 mg/kgBB sebagai dosis tunggal. Jika masih diperlukan, dosis	Pusing, Sakit kepala, Mual, Muntah, Sakit maag, Diare, Anemia, Menurunnya jumlah sel darah putih, Tekanan darah rendah	Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.

					dapat diulang hingga 3–4 kali.		
ibuprofen,	Ibuprofen 400 mg Fm	Hipersensitivitas (termasuk asma) terhadap Ibuprofen atau NSAID lainnya. Riwayat pendarahan pada saluran cerna atau ulserasi yang berhubungan dengan NSAID	Sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot, rasa sakit pada saat haid, rasa sakit/nyeri setelah operasi.	Dewasa : 3 kali sehari 1-2 tablet. Anak-anak : 20 mg/kg berat badan/hari dibagi menjadi beberapa kali pemberian.	Mual, muntah, diare, konstipasi, nyeri kambung, ruam kulit, sakit kepala, pusing.	Simpan ditempat sejuk dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung	
diklofenak,	Diclofenac Sodium tab Dexta	Tidak boleh kamu konsumsi bersama inhibitor COX-2 selektif karena meningkatkan risiko masalah kardiovaskular, seperti stroke. Obat ini juga tidak boleh kamu gunakan dalam operasi cangkok bypass arteri koroner karena bisa meningkatkan risiko stroke yang lebih tinggi.	Sebagai pengobatan jangka pendek untuk kondisi-kondisi akut sebagai berikut: • nyeri inflamasi setelah trauma, seperti karena terkilir, nyeri dan inflamasi setelah operasi seperti operasi gigi atau tulang.	Dosis maksimal 100 mg per hari (dosis awal maksimal 150 mg per hari pada hari pertama) dalam dosis terbagi dan dengan durasi sesingkat mungkin Tablet harus ditelan utuh pada waktu makan atau setelah makan	Sakit kepala, pusing, mual, muntah, vertigo, diare, dispepsia, nyeri perut, kembung, anoreksia, ruam kulit.	Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.	
asam mefenamat,	Mefinal 500 mg	Hipersensitif atau alergi pada asam mefenamat atau OAINS lainnya. Riwayat ulkus	Meredakan nyeri ringan hingga sedang pada sakit kepala, sakit gigi, dismenore primer,	Dewasa dan anak usia >14 tahun: Dosis awal 500 mg,	Gangguan GI, mengantuk, hipertensi, diare	Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari	

		peptikum/perdarahan berulang, riwayat perdarahan atau perforasi gastrointestinal (terkait dengan terapi obat anti inflamasi non steroid sebelumnya).	juga nyeri traumatik, otot, dan pasca operasi	kemudian 250 mg setiap 6 jam.		
piroxicam,	Wiros tab	Pasien yang memiliki riwayat hipersensitif pada kandungan Wiros. Pasien yang memiliki riwayat penyakit perdarahan saluran cerna, kanker saluran cerna, dan asma.	Pengobatan rheumatoid arthritis, osteoarthritis, ankilosa spondilitis, gout akut, dan gangguan muskuloskeletal.	Dewasa: 1 kali sehari 1 kapsul (20 mg) Gout akut: dosis awal 40 mg per hari.	Diare, perut kembung, mual dan muntah, gatal-gatal, sakit kepala, vertigo, sesak nafas.	Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.
indometasin, fenilbutazon,						
aspirin,	Cardio aspirin	Penderita tukak lambung, penderita yang hipersensitif terhadap salisilat, dapat juga hipersensitif terhadap aspirin, penderita yang sedang terapi dengan antikoagulan, penderita hemofilia, kehamilan 3 bulan terakhir	Mengurangi risiko trombotik koroner lebih lanjut selama fase pemulihan dari infark miokard. Kurangi risiko berulangnya serangan iskemik sepintas & stroke pada pasien, untuk meringankan rasa nyeri, seperti pada sakit kepala, sakit gigi.	Sehari 3-4 kali, usia 1-3 th 1-2 tablet, 3-6 th: 2-3 tablet, 6-12 th :3-5 tablet, diatas 12 th : 6-8 tablet untuk antiplatelet : 80-160mg/hari	Nyeri lambung, rasa panas, terbakar, mual, perdarahan GI. Hipersensitivitas, trombositopenia	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung



meloksikam,	Flasicox tab	Hipersensitivitas yang diketahui disebabkan oleh meloxicam atau komponen di dalam produk obat, termasuk riwayat reaksi anafilaksis dan reaksi kulit yang serius, seperti Steven Johnson syndrome (SJS), toxic epidermal necrolysis (TEN), dan exfoliative dermatitis.	Terapi simptomatik jangka pendek untuk eksaserbasi akut dari osteoarthritis. Terapi simptomatik jangka panjang untuk rematoid arthritis.	Dewasa usia : 7,5–15 mg per hari. Lansia: 7,5 mg per hari. Anak dengan berat badan $\geq 60$ kg: 7,5 mg per hari.	Gangguan pencernaan, edema, nyeri, peningkatan tekanan, sensasi hangat dan kemerahan pada wajah, palpitasi, pusing, sakit kepala, vertigo, tinitus, mengantuk, anemia, artralgia, nyeri punggung, insomnia, batuk, infeksi saluran pernapasan, sesak napas, pruritus, ruam, urtikaria, fotosensitisasi, peningkatan frekuensi buang air kecil, infeksi saluran kemih, peningkatan kadar urea atau kreatinin serum, peningkatan kadar transaminase dan bilirubin.	Simpan pada suhu kurang dari 30 derajat Celcius
celecoxib,	Celebrex 100 mg tab	Hipersensitif terhadap komponen, riwayat alergi thd sulfonamide, alergi terhadap golongan NSAID"s yang lain	Pengobatan nyeri dan peradangan, pengobatan dari gejala dari rematik (RA), osteoarthritis (OA), ankylosing spondylitis (AS)	OA : 200mg/hari atau 100mg 2 x sehari; RA : 100-200mg 2 x sehari; AS : 200mg/hari atau 100mg 2 x sehari	Sesak, gangguan gastrointestinal (mual, muntah), pusing, vertigo, rash, urtikaria	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung
parecoxib						



**(2) ANTIMIKROBA**

**(2.a) ANTIBIOTIK**

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Penisilin	Ampicillin,	Ampicillin nova tab	Pasi�n dengan riwayat hipersensitivitas terhadap penisilin dan derivat penisilin lainnya.	Infeksi saluran pernafasan, infeksi saluran cerna, infeksi saluran kemih dan kelamin, infeksi kulit dan jaringan lunak, septikemia, meningitis.	Infeksi saluran empedu, bronkitis, endokarditis, gastroenteritis, listeriosis, otitis media, infeksi streptokokus perinatal, peritonitis: Dewasa: 0,25-1 g tiap 6 jam. Anak: <10 tahun separuh dari dosis rutin orang dewasa. • Demam tifoid dan paratifoid: Dewasa: 1-2 g tiap 6 jam selama 2 minggu pada infeksi akut, dan 4-12 minggu pada karier. • Infeksi saluran kemih: Dewasa: 500 mg tiap 8 jam.	Mual, muntah, diare, eritematosa ruam makulopapular, sakit mulut, lidah hitam /berbulu, ruam.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung.

	amoksisilin,	Amoxicillin nova tab	Riwayat alergi atau hipersensitivitas terhadap obat ini.	Amoxicillin digunakan untuk mengobati infeksi telinga tengah, radang tenggorokan, infeksi saluran pernafasan atas, infeksi saluran kemih, saluran cerna, kulit dan jaringan lunak.	Dewasa: 250-500 mg setiap 8 jam (3x sehari), Anak-anak: 20-40mg/kg/BB/hari dalam 3 dosis terbagi.	Reaksi hipersensitivitas seperti urtikaria, demam nyeri sendi, diare, syok anafilaksis, ruam eritematosus, leukemia limfatik kronik, dan iritasi gastrointestinal.	Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.
	ticarcillin						
Cephalosporin	cefadroxil,	Cefadroxil 500 mg dexa tab	Orang yang hipersensitif pada antibiotik cephalosporin	Infeksi saluran napas, kulit, jaringan lunak, saluran cerna, saluran kemih dan infeksi lain yang berkaitan dengan organisme yang bersangkutan	Dewasa: 1-2 kali sehari 2-4 kapsul. anak: 30mg/kgBB/hari dalam 2 dosis terbagi.	Mual, muntah, diare, ruam kulit, biduran, angioedema, reaksi hipersensitif, gatal.	Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
	cefixime,	Cefixime 100 mg tab Hj	Pasien dengan riwayat syok atau hipersensitivitas yang disebabkan oleh komponen apapun dari obat ini	Pengobatan infeksi yang disebabkan oleh strain yang rentan terhadap mikroorganisme tertentu - Infeksi saluran kemih tanpa komplikasi disebabkan oleh <i>Escherichia coli</i> dan <i>Proteus mirabilis</i> - Otitis media disebabkan oleh	Dewasa dan anak-anak dengan berat badan >30 kg: 50-100 mg diberikan peroral 2 kali sehari Untuk infeksi yang lebih berat dapat dinaikkan hingga 200 mg diberikan 2x kali sehari	Hipersensitivitas, gangguan gastrointestinal & pernapasan, syok, gangguan fungsi ginjal, granulositopenia atau eosinofilia, stomatitis, kandidiasis, defisiensi vit K.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung.

				<p><i>Haemophilus influenza</i>, <i>Moraxella</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Faringitis dan tonsilitis disebabkan oleh <i>Streptococcus pyogenes</i></li> <li>- Bronkitis akut dan kronis eksaserbasi akut</li> <li>- Demam tifoid anak-anak</li> </ul> <p>Gonorrhoeae tanpa komplikasi</p>			
	cefotaxime						
Chloramphenicol	kloramfenikol,	Cloramphenicol 250 mg kf	Hipersensitif, wanita hamil, menyusui dan pasien porfiria	Demam tifoid dan paratifoid, infeksi berat yang disebabkan oleh <i>Salmonella</i> sp, H influenza, riketsia, Limfogranulomatosis, bakteri gram negatif yang menyebabkan radang selaput otak (meningitis).	<p>Dewasa, anak-anak, dan bayi 2 minggu ke atas: 50 mg/kg BB/hari dalam 3-4 dosis terbagi.</p> <p>Bayi usia dibawah 2 minggu: 25 mg/kg BB/hari dalam dosis terbagi.</p>	Gangguan pencernaan seperti mual, muntah, diare, gatal kemerahan pada kulit, hingga reaksi alergi berat (anafilaktik), gray baby syndrome pada bayi baru lahir, terutama bayi prematur.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung.
	thiamfenicol	Dionicol tab	Hipersensitif terhadap kandungan Dionicol. Gangguan fungsi hati dan ginjal yang berat	Mengobati infeksi bakteri pada saluran pernafasan, infeksi saluran pencernaan, dan infeksi saluran	Dewasa: 250-500 mg dalam 3-4 dosis terbagi	Gangguan gastrointestinal, reaksi hipersensitivitas, sakit kepala,	Simpan pada tempat sejuk dan kering,

				kemih yang peka terhadap thiamphenicol	Anak-anak: 50 mg/kgBB/hari 3-4 dosis terbagi Bayi prematur & bayi	anafilaktik, diskrasia darah.	terhindar dari cahaya matahari langsung.
Macrolides dan Lincosamide	eritromisin,	Erysanbe 500 mg tab	Jika terdapat riwayat hipersensitivitas dengan obat ini, dan peringatan penggunaan obat ini pada pasien dengan gangguan irama jantung dan gangguan fungsi hati.	Infeksi saluran nafas, kulit dan jaringan lunak, pneumonia, GO, infeksi karena kuman yang peka terhadap eritromisin	Dewasa > 20 kg : 1 - 2g 4 kali sehari.  Anak : 30 - 50 mg/kg BB/hari. Diberikan dalam dosis terbagi tiap 6 jam	Gangguan GI. Jarang, hepatotoksik, ototoksik	Simpan di tempat kering dan sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung
	azitromisin,	Azithromycin kf tab	Jangan memberikan Azithromycin pada orang yang hipersensitif terhadap antibiotik golongan makrolida dan orang dengan riwayat disfungsi hati, setelah penggunaan antibiotik sebelumnya.	Infeksi saluran pernafasan bagian atas & bawah, infeksi kulit ringan dan sedang, uretritis (radang uretra/aliran kandung kemih) non komplikasi & servisititis (radang leher rahim) non gonoreal yang disebabkan oleh Chlamydia trachomatis.	Dewasa: infeksi saluran pernapasan, Infeksi kulit dan jaringan lunak Sebagai penanggulangan / pelepasan segera: 500 mg / hari selama 3 hari, atau 500 mg sebagai dosis tunggal pada hari 1 kemudian 250 mg / hari pada hari 2-5.	Mual, muntah, kembung, sakit perut, diare, dispepsia, melena, ikterus kolestatik, palpitasi, nyeri dada, moniliasis, vaginitis, nefritis; pusing, mengantuk, vertigo, somnolen, kelelahan, ruam, fotosensitivitas, angiodema, peningkatan sementara jumlah neutrofil & enzim hati.	Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.



					Infeksi genital tanpa komplikasi karena Chlamydia trachomatis, Chancroid 1 g sebagai dosis tunggal.		
	klaritromisin, klindamisin	Clindamicyn 300mg novel	Riwayat hipersensitivitas terhadap clindamycin dan lincomycin serta adanya riwayat kolitis.	Infeksi pada saluran nafas atas dan bawah, kulit dan jaringan lunak, infeksi pada gigi, osteomielitis, otitis media akut, infeksi anaerob	Dewasa: Infeksi ringan-sedang 150-300 mg 4x sehari. Infeksi berat 300-450 mg 4x sehari.  Anak >1 bulan: Infeksi ringan-sedang 8-16 mg/KgBB/hari dibagi 3-4 dosis. Infeksi berat 16-20 mg/KgBB/hari dibagi 3-4 dosis.	Urtikaria, ruam kulit, pruritus, gangguan saluran pencernaan, ikterik, perubahan hematopietik	Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung
Aminoglikosida	neomisin, gentamisin	Gentamicyn cr kf	Tidak boleh digunakan untuk pengobatan mata	Untuk pengobatan topikal infeksi primer dan sekunder pada kulit yang disebabkan oleh bakteri yang peka terhadap gentamicin.	Krim/Salep Garamisin dioleskan tipis pada daerah yang sakit sebanyak 3 – 4	Penggunaan topikal antibiotik gentamisin dapat menyebabkan	Simpan di tempat yang kering dan sejuk. Jangan



				<p>Tidak digunakan untuk antibiotik pencegahan/profilaksis karena bakteri penyebab tidak diketahui</p>	<p>kali sehari sampai tercapai kesembuhan. Daerah yang sakit boleh ditutupi dengan perban (gauze dressing).</p>	<p>iritasi yang bersifat sementara, biasanya ditandai dengan kulit kemerahan dan gatal. Kemungkinan terjadinya fotosensitisasi pernah dilaporkan pada beberapa pasien. Penggunaan antibiotik gentamisin topikal dalam jangka panjang dapat menyebabkan jamur atau bakteri yang kebal tumbuh berlebihan.</p>	<p>menyimpan obat ini di tempat yang panas atau lembap, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak.</p>
<p>Quinolones</p>	<p>ciprofloxacin,</p>	<p>Ciprofloxacin Hj tab</p>	<p>Pasien dengan riwayat hipersensitivitas terhadap obat ini dan fluorokuinolon lain. Ciprofloxacin juga tidak digunakan pada pasien yang memiliki riwayat gangguan irama jantung dan riwayat myasthenia gravis. Selain itu ciprofloxacin juga</p>	<p>Infeksi saluran kemih, infeksi saluran pernafasan, infeksi menular seksual, infeksi pada bagian kulit dan jaringan lunak, tulang dan sendi, diare, anthraks</p>	<p>Infeksi Saluran Kemih (ISK): Ringan - sedang 250 mg 2 kali sehari, infeksi berat 500 mg 2 kali sehari. Infeksi Saluran Pernafasan, kulit dan jaringan lunak,</p>	<p>Mual, muntah, diare, dispepsia, nyeri abdomen, kembung, sakit kepala, lemah, insomnia, tremor.</p>	<p>Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung</p>

			dilarang diberikan bersamaan dengan tizanidine karena berisiko untuk menurunkan aktivitas psikomotor, tekanan darah, dan nadi.		tulang dan sendi: Ringan - sedang 250 - 500 mg 2 kali sehari, berat 500-750 mg 2 kali sehari. Prostatitis kronis, infeksi saluran cerna : 500 mg 2 kali sehari. Osteomielitis akut : 750 mg 2 kali sehari. GO akut : 250 mg dosis tunggal. ISK bagian atas dan bawah : 100 mg 2 kali sehari. Infeksi lain : 200 mg 2 kali sehari. GO akut dan sistitis akut tanpa komplikasi pada wanita : 100 mg dosis tunggal		
levofloxacin	Levofloxacin Novel tab	Tidak dianjurkan bagi pasien yang pernah mengalami reaksi alergi atau hipersensitivitas terhadap kelompok antibiotik fluoroquinolone,	Sinusitis maksilaris akut, bronkitis kronik dengan eksaserbasi akut dari bronkitis kronis, pneumonia yang didapat dari lingkungan, infeksi	Dewasa: PO Sinusitis bakteri akut 500 mg sekali sehari selama 10-14 hari.	Diare, mual, vaginitis, kembung, pruritus, ruam kulit, nyeri abdomen, moniliasis	Simpan ditempat sejuk dan terhindar dari paparan sinar	

			<p>termasuk levofloxacin. Populasi ini bisa mengalami reaksi alergi yang serius, seperti ruam generalisata, angioedema, ruam kulit, atau bahkan anafilaksis.</p>	<p>kulit &amp; struktur kulit tanpa komplikasi, ISK, pielonefritis.</p>	<p>Eksaserbasi bakteri akut bronkitis kronis; Pielonefritis 500 mg sehari sekali selama 7-10 hari.</p> <p>Sistitis tanpa komplikasi 250 mg sehari sekali selama 3 hari.</p> <p>Pneumonia yang didapat masyarakat; Infeksi kulit dan jaringan lunak yang rumit 500 mg sekali sehari atau penawaran selama 7-14 hari.</p> <p>Infeksi saluran kemih rumit 500 mg sekali sehari selama 7-14 hari.</p>	<p>genital, pusing, dispepsia, insomnia, gangguan pengecapan, muntah, anoreksia, ansietas, konstipasi, edema, lelah, sakit kepala, keringat berlebihan, leukore, tidak enak badan, gelisah, gangguan tidur, tremor, urtikaria.</p>	<p>matahari langsung.</p>
Tetrasiklin	Tetrasiklin,	Tetracycline novel	<p>Pada individu dengan hipersensitivitas terhadap antibiotik golongan tetrasiklin. Tetrasiklin</p>	<p>Infeksi karena organisme yang peka terhadap tetrasiklin</p>	<p>3-4 x sehari 1 kapsul</p>	<p>Anoreksia, mual, muntah, diare, glossitis, disfagia,</p>	<p>Simpan di tempat yang kering dan</p>

			juga dikontraindikasikan pada wanita hamil, karena berpotensi menyebabkan perubahan warna gigi secara permanen pada fetus.			enterokolitis, lesi inflamasi, ruam makulopapular dan eritematosa, fotosensitasi	terlindung dari cahaya
	doksisiklin,	Dohixat	Pada pasien dengan hipersensitivitas terhadap obat ini. Peringatan doxycycline diperlukan terkait risiko infeksi <i>Clostridium difficile</i> dan perhatian khusus pada anak, ibu hamil, serta menyusui	Infeksi bakteri, mengatasi jerawat dan mencegah malaria.	Dewasa dan anak >8 tahun dengan berat badan >45 kg: Hari pertama 100 mg 2 kali sehari, dilanjutkan dengan 100 mg per hari. Anak >8 tahun dengan berat badan <45 kg: 4,4 mg/kgBB per hari dibagi dalam 2 dosis, selanjutnya 2,2 mg/kgBB per hari.	Gangguan gastrointestinal: stomatitis, mual, muntah, diare, dispepsia, sakit perut, pankreatitis.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung.
	minosiklin						
Sulfa	sulfametoksazol-trimetoprim	Sanprima tab	Hipersensitif terhadap sulfonamide. Gangguan fungsi hati berat.	Infeksi saluran kemih seperti pielonefritis dan pielitis, saluran pencernaan, infeksi THT, spotitis media, dan infeksi lain seperti toksoplasmosis	Dewasa dan anak > 12 thn: 2 x sehari 2 tablet, maksimal 3 x sehari 2 tablet Diberikan sesudah makan	Gangguan gastrointestinal, syndrome Stevens-Johnson dan Lyell	Pada suhu antara 15-30 derajat Celsius, serta terhindar dari paparan cahaya.



## (2.b) ANTIJAMUR

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Polyenes	amphotericin B,						
	Nistatin	Kandistatin drop	Tidak digunakan pada pasien dengan riwayat alergi atau hipersensitif terhadap nystatin.	Pengobatan candidiasis pada rongga mulut	Dewasa: 4 kali sehari 1-2 ml,  Bayi dan anak-anak: 3-4 kali sehari 1 ml, profilaksis: 1 kali sehari 1 ml	Diare, mual, muntah, gangguan GI, ruam, urtikaria, dan sangat jarang steven johnson syndrome	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung
Imidazole	ketoconazol,	Ketoconazole 200 mg Hj tab	Pasien dengan risiko gangguan liver karena risiko hepatotoksitasnya yang tinggi. Peringatan untuk mewaspadai penggunaan pada anak di bawah 2 tahun atau pasien hemodialisis. Ketoconazole dikontraindikasikan jika terdapat riwayat reaksi hipersensitivitas terhadap komponen obat	Mengatasi infeksi jamur.	Infeksi Jamur Dewasa: 200 mg satu kali sehari, dapat ditingkatkan menjadi 400 mg satu kali sehari jika gejala klinis tidak membaik. Anak: Umur lebih dari 2 tahun berikan dosis per oral 3.3-6.6 mg / kg satu kali sehari.	Mual, muntah, diare, konstipasi (sulit buang air besar), sakit perut, perut kembung.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung.
	mikonazol,	Miconazole cr dexa	Hipersensitivitas terhadap miconazole	Infeksi kuku dan kulit karena dermatofita, kandida atau jamur lain dan bakteri gram positif	Oleskan 2 x sehari	Sensasi rasa terbakar, maserasi, dermatitis alergik	Simpan pada suhu antara 15-30 derajat Celcius. Terhindar dari panas,



	klotrimazol	Fungiderm cr	Sebaiknya tidak digunakan pada orang yang hipersensitif terhadap Clotrimazole	Infeksi jamur pada kulit dan kuku yang disebabkan oleh dermatofit, kandida, ragi-ragi jamur lainnya, dan memiliki khasiat antibakteri terhadap gram positif sehingga dapat digunakan pada mikosis dengan infeksi sekunder oleh bakteri	Oleskan 2-3x sehari pada bagian yang sakit selama 10-14 hari secara teratur dan tidak berhenti	Hipersensitif terhadap komponen obat	kelembaban, dan cahaya. Simpan di tempat yang kering dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak.
Triazole	flukonazol,	Fluconazole kf tab	Pada pasien dengan hipersensitivitas terhadap obat ini. Peringatan penggunaan fluconazole adalah terkait hepatotoksitas dan risiko reaksi alergi.	Mengatasi penyakit akibat infeksi jamur, termasuk infeksi jamur Candida (candidiasis). Fluconazole dapat digunakan untuk infeksi jamur di kulit, vagina, mulut, tenggorokan, kerongkongan, rongga perut, paru-paru, saluran kemih,	Dewasa: Dosis awal 200–400 mg pada hari pertama, diikuti 100–200 mg, 1 kali sehari, selama 7–21 hari. Anak usia 0–14 hari: Dosis awal 6mg/kgBB, diikuti 3 mg/kgBB tiap 72 jam. Dosis maksimal 12 mg/kgBB tiap 72 jam. Anak usia 15–27 hari: Dosis awal 6 mg/kgBB, diikuti 3 mg/kgBB setiap 48 jam.	Gangguan saluran cerna termasuk mual, nyeri abdominal, diare dan kembung, ruam, nyeri kepala	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung

				maupun aliran darah			
	Itraconazole						
Lainnya	griseofulvin	Griseofulvin 125 mg kf tab	Adanya hipersensitivitas terhadap griseofulvin, maupun komponen formulasinya. Pasien yang sedang hamil atau berencana hamil dalam satu bulan ke depan juga menjadi kontraindikasi pemberian griseofulvin.	Mengobati infeksi jamur pada kulit, rambut dan kuku	1 tablet 1 x sehari	Gangguan gastro intestinal, sakit kepala, sensitif terhadap cahaya, jarang angiodeama, lupus eritematosus sistemik dan reaksi kulit	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung

**(2.c) ANTIVIRUS**

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat HIV-AIDS	NRTI (zidovudine, abacavir), NNRTI (efavirenz, nevirapine), PI (saquinavir, indinavir)						
Herpes virus	acyclovir	Acyclovir cr IF 5%	Salep ini tidak boleh digunakan untuk membran mukosa seperti mulut, mata dan vagina	Pengobatan infeksi virus herpes simplex pada kulit dan selaput lendir, termasuk herpes genitalis yang inisial dan rekuren	5x/hr setiap 4 jam selama 5 hr. Pengobatan dapat diperpanjang hingga 10 hr.	Rasa terbakar sementara setelah menggunakan krim. Kekeringan kulit.	Disimpan pada suhu di bawah 30 derajat celcius dalam wadah tertutup dan terlindung dari cahaya

					Oleskan tipis-tipis pada bagian kulit		
Hepatitis B dan C	interferon, lamivudine						
Influenza A dan Bvirus	amantadine, rimantadine, oseltamivir						

**(2.d) ANTIPROTOZOA**

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antiamoeba	metronidazole	Metronidazole tab holli	Hipersensitivitas terhadap obat, kehamilan trimester pertama, dan penggunaan bersama disulfiram maupun alkohol. Peringatan terkait penggunaan metronidazole meliputi adanya risiko karsinogenik menurut hewan coba, serta risiko efek samping neurologis berat yang permanen	Antibiotik untuk mengobati infeksi bakteri di berbagai organ tubuh, termasuk di saluran pencernaan, paru-paru, darah, saluran kemih, hingga kelamin. Obat ini juga bisa digunakan untuk menangani infeksi parasit tertentu, seperti trikomoniasis atau amebiasis	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dewasa: 3x sehari 200 mg selama 3 hari.</li> <li>Anak usia 1-3 tahun: 50 mg, 3 kali sehari, selama 3 hari.</li> <li>Anak usia &gt; 3 - 7 tahun: 50 mg, 2 kali sehari, selama 3 hari.</li> <li>Anak usia &gt; 7 - 10 tahun: 100 mg, 3 kali sehari, selama 3 hari.</li> <li>Anak usia &gt; 10 tahun: sama dengan dosis dewasa.</li> </ol>	Mual, muntah, sakit kepala, kram perut, sembelit.	Simpan di tempat sejuk dan kering, serta hindar dari sinar matahari langsung
Antimalaria	primaquine, artemisinin,						

	doksisiklin	Doxycyclin tab kf	Pada pasien dengan hipersensitivitas terhadap obat ini.	Obat antibiotik yang di gunakan untuk infeksi saluran napas, infeksi saluran kemih, acne vulgaris, penyakit menular seksual (infeksi oleh chlamydia trachomatis), uretritis non gonococcal, chancroid sebagai alternatif untuk pengobatan gonorea dan sifilis, serta malaria.	Dewasa: 100 mg 2 kali sehari, selama 7 hari. Anak usia 8–9 tahun: 25 mg 2 kali sehari, selama 7 hari. Anak usia 10–14 tahun: 50 mg 2 kali sehari, selama 7 hari. Anak usia $\geq 15$ tahun dengan BB 45–59 kg: 75 mg 2 kali sehari, selama 7 hari	Gangguan gastrointestinal: stomatitis, mual, muntah, diare, dispepsia, sakit perut, pankreatitis.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung.
--	-------------	-------------------	---	---	---	---	---

**(2.e) ANTELMINTIK**

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antelmintik	albendazole, mebendazole,	Vermox	Pada pasien dengan riwayat hipersensitivitas terhadap obat tersebut.	Trikhuriasis, askariasis (infeksi cacing gelang), oxyuriasis (infeksi cacing kremi), ankilostomiasis/in feksi cacing	Dewasa: 1 tablet kunyah, diberikan sekali sehari. Anak di atas 5 tahun: sama dengan dosis dewasa	Sakit perut. Gatal-gatal. Ruam kulit	Disimpan pada suhu ruangan. Jauhkan dari cahaya langsung dan tempat yang lembap. Jangan disimpan di kamar mandi.



				tambang (A duodenale dan N americanus).			Jangan dibekukan.
	pirantel pamoat,	Combantrin jeruk 10 ml	Penderita hipersensitif	Pengobatan infeksi yang disebabkan oleh cacing	2-6 tahun: 5-10 ml, 6-12 tahun: 10-15 ml, > 12 tahun: 15-20 ml sebelum/sesudah makan	Anoreksia, mual, muntah, diare, sakit kepala, pusing	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung
	dietilkarbamazine (DEC), piperazine						

### (2.f) OBAT TB

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat TB	Rifampisin, etambutol, isoniazid, pirazinamid						

### (3) ANTIHISTAMIN DAN ANTIALERGI

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Generasi I	chlorpheniramine,	CTM Pim	Jika terdapat riwayat hipersensitivitas terhadap obat atau komponen obat	Meredakan gejala alergi yang bisa dipicu oleh makanan, obat-obatan, gigitan	Dewasa: 4 mg tiap 4 - 6 jam, maksimal 24 mg per hari. Anak 6-12 tahun: 2	Mulut, hidung, tenggorokan terasa kering. Mual, muntah, nyeri	Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar



			ini. Chlorpheniramine injeksi tidak boleh diberikan kepada orang dengan penurunan kesadaran	serangga, atau paparan debu, bulu binatang, maupun serbuk sari. CTM juga digunakan untuk meringankan gejala batuk pilek (common cold).	mg tiap 4 - 6 jam, maksimal 12 mg per hari. Anak 2-5 tahun: 1 mg tiap 4 - 6 jam, maksimal 6 mg per hari.	lambung. Konstipasi, atau diare.	matahari langsung.
	diphenhyramine	Otede tab	Pasien dengan hipersensitivitas terhadap diphenhydramine. Obat ini juga tidak diberikan pada pasien dengan obstruksi usus, ulkus peptikum dengan stenosis, serta dihindari pada populasi khusus bayi dan ibu menyusui.	Antiemetika, rinitis alergi, urtikaria, hay fever, membantu memudahkan tidur apabila mengalami kesulitan tidur	Dewasa & anak >12thn 1 kali sehari 1 tablet	Gangguan gastrointestinal (saluran cerna), efek antimuskarinik, sistem saraf pusat	Pada suhu ruang, di tempat yang kering dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung
Generasi II	Ketotifen,	Profilas 1 mg tab	Tidak dianjurkan untuk usia dibawah 3 tahun. Kehamilan dan menyusui: pabrik pembuatnya menganjurkan untuk tidak digunakan pada ibu hamil dan menyusui	Profilaksis jangka panjang pada asma bronkial, rinitis alergi dan dermatitis.	Dewasa : 1-2 tab 2kali/hari. Anak 0,125 ml/kgBB 2 kali/hari.  Dapat diberikan bersama atau tanpa makanan	Mengantuk, Pusing, Mulut kering	Simpan di tempat sejuk dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung

	loratadine	Loratadine novell tab	Pasien dengan gangguan fungsi hati dan penurunan fungsi ginjal (GFR < 30ml/menit)	Meredakan gejala alergi, seperti bersin, hidung meler, mata berair, ruam gatal di kulit, atau biduran. obat ini tidak lebih jarang menyebabkan kantuk.	Dewasa dan anak-anak >12 tahun: dosis awal 10 mg diminum 1 kali sehari, atau 5 mg diminum 2 kali sehari. Anak-anak 2–12 tahun dengan berat badan >30 kg: dosis awal 10 mg, diminum 1 kali sehari.	Sakit kepala. Lelah atau kantuk. Sakit perut. Muntah	Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung.
	cetirizine	Incidal	Pada seseorang yang memiliki riwayat hipersensitivitas dengan obat ini.	Rinitis perenial, rinitis alergi dan urtikaria idiopatik kronik	> 12 th: sehari 1 x 1 kapsul sebelum/sesudah makan	Sakit kepala, pusing, mengantuk, agitasi, mulut kering, rasa tidak enak pada lambung, reaksi kulit, angioedema	Sejuk dan dengan suhu kamar. Supaya obat tidak rusak, kamu tidak boleh menyimpannya di bawah paparan sinar matahari atau tempat yang lembap. Obat ini juga tidak disarankan untuk di simpan di kamar mandi.
Generasi III	Desloratadin	Aerius 5 mg tab	Hipersensitif	Rhinitis alergi (musiman dan perenial). Terapi simptomatik pruritus,	> 12 th: 5 mg 1 x sehari. Anak 6-11 th: 2.5 mg 1 x sehari. Anak	Faringitis, mulut kering, mialgia, somnolen, dismenore	Simpan pada suhu 15-30°C.

				mengurangi jumlah dan besarnya lesi pada pasien urtikaria	1-5 th: 1.25 mg 1 x sehari  sebelum / sesudah makan		
--	--	--	--	---	--	--	--

#### (4) SITOSTATISTIKA

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Sitostatika	siklofosamid, doksorubisin, 5-fluorourasil, carboplatin, metroteksat						

#### (5) OBAT SISTEM SARAF

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat hipnotik sedatif/antiansietas	benzodiazepin (alprazolam, diazepam, lorazepam, nitrazepam), barbiturat (fenobarbital), lainnya (buspiron)						
Obat analgetik sentral	fentanil, petidin, morfin, nalokson.						

Obat antidepresan	amitriptilin, imipramin, fluoksetin, setralin						
Obat anestesi lokal	bupivakain, lidokain						
Obat sistem sarafotonom (antikholinergik, kholinergik)	prostigmin, pilocarpin, atropin, pirenzepin, ipratropium, skopolamin, triheksifenidil						
Obat sistem sarafotonom (adrenergik, antiadrenergik)	klonidin, fenilefrin, noradrenalin, adrenalin, fenoterol, terbutalin, salbutamol,	Salbutamol 2 mg FM	Pada pasien yang memiliki riwayat hipersensitivitas terhadap obat salbutamol	Sebagai bronkodilator kerja cepat pada penanganan asthma dan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK).	Dewasa : 3-4 kali sehari 2-4 mg tablet. Anak-anak berusia 6-12 tahun : 2 kali sehari 2 mg. Anak berusia 2-6 tahun : 3 kali sehari 1-2 mg.	Sakit kepala. Gelisah. Tangan dan kaki gemetar. Kram otot	Simpan obat Salbutamol tablet dan sirup pada suhu dibawah 25 ° Celsius, sedangkan salbutamol sediaan cairan inhalasi disimpan pada suhu dibawah 30 ° Celsius pada tempat kering dan terhindar dari paparan sinar

							matahari langsung
	propranolol,	Propranolol dexta tab	Dapat menyebabkan hipoglikemia, sehingga penggunaannya tidak disarankan pada pasien yang tidak mampu makan atau sedang mengalami muntah. Penggunaan propranolol juga perlu dihindari pada pasien asma atau yang sedang mengalami infeksi saluran napas bawah karena dapat menyebabkan bronkospasme	Mengatasi keluhan gangguan jantung dan pembuluh darah seperti aritmia, hipertensi, gangguan pada katup dan otot jantung serta angina pectoris serta gangguan jantung lainnya.	Dewasa dan anak > 12 tahun untuk hipertensi : 20 mg, 3-4 kali sehari; aritmia : 10-20 mg, 3-4 kali sehari; angina : 10-20 mg, 3-4 kali sehari; mencegah migrain : 40 mg, 2-3 kali sehari. Anak-anak : aritmia : 0,5 mg/kgBB/hari dibagi 3-4 kali pemberian; hipertensi : 1-3 mg/kgBB/hari dibagi 3 kali pemberian.	Mual dan muntah. Kram perut, sembelit atau justru diare. Gangguan penglihatan. Gangguan tidur, mimpi yang aneh	Simpan pada suhu antara 20-25 derajat Celcius
	atenolol, prazosin						

**(6) OBAT KARDIOVASKULAR**

**(6.a) Obat antihipertensi**

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
----------	-----------	-------------------------	----------------	----------	----------------------	--------------	-------------



Diuretik	furosemid	Furosemide indofarma tab	Hipersensitivitas terhadap furosemid dan sulfonamide. Anuria. Gagal ginjal	Digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi, mencegah stroke, serangan jantung, dan gangguan ginjal. Tak hanya itu, obat ini juga dapat digunakan untuk meredakan gejala seperti sesak napas serta bengkak pada lengan, kaki, dan perut.	Dewasa: Dosis awal adalah 40 mg per hari. Jika kondisi menunjukkan perbaikan, dosis dapat dikurangi menjadi 20 mg per hari atau 40 mg setiap 2 hari sekali. Pada kasus edema berat, dosis bisa diberikan hingga 80 mg per hari. Anak-anak: 1–3 mg/kgBB per hari.	Haus, hiperurisemia, hipokalemia, hiponatremia, sakit kepala, mengantuk, kram otot, hipotensi, mulut kering, haus, lemah, lesu, gelisah, oliguria, gangguan saluran cerna, hipovolemia, dehidrasi, hiperurisemia, pustulosis eksantematosa umum akut,	Disimpan pada suhu ruangan dan dihindarkan dari sinar matahari langsung
	spironolakton,	Spironolactone 100mg dexta tab	Anuria, gangguan ginjal dan hiperkalemia	Hipertensi esensial, hipertensi berat, Edema jantung, edema karena sirosis hati, edema karena sindroma nefrotik	Hiperaldosteronisme, hipertensi, gagal jantung dengan derajat New York Heart Association (NYHA) III dan IV, sirosis hepatis, penyakit ginjal kronis dan	Sakit kepala, mengantuk, gangguan lambung, ataksia, kebingungan mental, hirsutisme, ketidakteraturan menstruasi, impotensi, ruam kulit, ginekomastia, jarang terjadi : pembesaran payudara, hiponatremia, hiperkalemia	Tersimpan di suhu ruang dan tidak terpapar sinar matahari langsung

					acne vulgaris (off label).		
	HCT, amilorid						
CCB	Amlodipine,	Amlodipine 5 mg Hj	Penggunaan pada pasien dengan hipersensitivitas terhadap obat ini. Amlodipine juga sebaiknya tidak digunakan (kontraindikasi relatif) pada pasien dengan syok kardiogenik, stenosis aorta berat, angina tidak stabil, hipotensi berat, gagal jantung, dan gangguan hepar.	Menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Obat ini juga bisa dimanfaatkan dalam pengobatan nyeri dada kronis (angina pektoris) akibat penyakit jantung koroner.	Dewasa: Hipertensi dan angina: Dosis awal 1 x sehari 5 mg, dapat ditingkatkan hingga dosis max.10 mg. Anak, usia 6-17 tahun: Dosis awal 1 x sehari 2,5 mg, dapat ditingkatkan menjadi 5 mg sekali sehari setelah interval 4 minggu sesuai dengan respons klinis.	Sakit kepala, pusing, mengantuk, debaran jantung, sakit perut, mual, edema, kelelahan.	Tersimpan di suhu ruang dan tidak terpapar sinar matahari langsung
	nifedipin,	Nifedipine kf tab	Pasien yang memiliki riwayat hipersensitivitas terhadap nifedipine, komponen penyusunnya, maupun calcium-channel blocker lainnya	Untuk pengobatan dan pencegahan insufisiensi koroner terutama angina pektoris, hipertensi kronik dan hipertensi urgensis.	Dosis tunggal 5 - 10 mg. Dosis rata-rata 5 - 10 mg, 3 x sehari. Interval tiap dua dosis paling sedikit 2 jam.	Dizziness, flushing, sakit kepala, rasa lemah, dan mual.	Tersimpan di suhu ruang dan tidak terpapar sinar matahari langsung

	verapamil, nicardipine						
ARB	Losartan, valsartan, irbesartan, telmisartan						
	candesartan,	Candesartan dexa tab	Riwayat hipersensitivitas terhadap candesartan, pasien hamil/menyusui, anak berusia kurang dari 1 tahun, dan pasien diabetes mellitus yang juga menerima aliskiren	Hipertensi, pengobatan pada pasien gagal jantung dan gangguan fungsi sistolik ventrikel kiri ketika obat penghambat ACE tidak ditolerir	Dosis awal 4mg/hari, maksimal 16mg/hari. Efek antihipertensi maksimal dicapai dalam waktu 4 minggu setelah pengobatan	Back pain, pusing, infeksi saluran pernafasan atas, faringitis, rinitis	Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
ACEI	Kaptopril,	Captopril 25 mg tab	Adanya riwayat hipersensitivitas dengan obat ini.	Hipertensi, gagal jantung, dan setelah terjadi infark miokard.	Awal : 2-3 kali sehari 12.5 mg. Ditingkatk an menjadi 25- 50 mg 2-3 hari.	Pusing. Batuk kering ( sering terjadi ) Lesu.	Simpan obat Captopril pada suhu 20-25 derajat Celsius, di tempat kering dan sejuk, serta jauh dari jangkauan anak
	lisinopril,	Lisinopril 5mg dexa tab	Memiliki riwayat angioedema. Memiliki riwayat diabetes mellitus atau gangguan ginjal. Ibu hamil.	Hipertensi esensial, nefropati diabetik, gagal jantung, dan pasca infark miokard akut.	1 kali sehari 2,5 - 20mg.	Pengguna berpotensi mengalami tekanan darah rendah (pusing, mual, muntah, pandangan kabur, sulit berkonsentrasi, sesak napas dan pingsan).	Simpan di tempat yang sejuk dan kering jauh dari panas, lembab, dan sinar matahari langsung.

						Insulin atau obat antidiabetes. Pengguna berpotensi mengalami hipoglikemia (kondisi saat kadar gula dalam darah berada di bawah normal).	
	ramipril	Rimipril tab novell	Pasien yang hipersensitif terhadap produk ini atau obat angiotensin convertng enzyme inhibitor (ACEI) lainnya. Penggunaan ramipril juga harus diperhatikan pada pasien yang memiliki gangguan ginjal.	Hipertensi. Gagal jantung kongestif. Terapi kombinasi dengan diuretik dan/tanpa glikosida. Untuk menurunkan resiko terjadinya infark miokard, stroke stage 2), kematian kardiovaskular, atau kebutuhan akan prosedur revaskularisasi pasien diabetes dan usia lanjut, perokok, atau adanya penyakit vaskular sebelumnya	Hipertensi : Awal 2,5 mg 1 kali/hari. Pemeliharaan 2,5-5 mg/hari. Maksimal 10 mg/hari. Gagal jantung kongestif : Awal 1,25 mg 1 kali/hari. Maksimal 10 mg/hari. Terapi sesudah infark miokard : Awal 2,5 mg 2 kali/hari. Maksimal 10 mg/hari.	Angioedema, ikterus kolestatik, batuk, reaksi hipersensitivitas, hipotensi, sinkop, maupun penurunan fungsi ginjal. Interaksi ramipril dengan berbagai obat lain dapat meningkatkan risiko toksisitas ataupun efek hipotensif	Simpan di tempat kering san sejuk, serta terhindar dari panas sinar matahari langsung
Beta blocker	Atenolol, propranolol,	Propranolol dexta tab	Dapat menyebabkan hipoglikemia, sehingga penggunaannya	Mengatasi keluhan gangguan jantung dan pembuluh darah seperti aritmia, hipertensi,	Dewasa dan anak > 12 tahun untuk hipertensi : 20 mg, 3-4 kali	Mual dan muntah. Kram perut, sembelit atau justru diare. Gangguan penglihatan. Ganggu	Simpan pada suhu antara 20-25 derajat Celcius



			tidak disarankan pada pasien yang tidak mampu makan atau sedang mengalami muntah.	gangguan pada katup dan otot jantung serta angina pektoris serta gangguan jantung lainnya.	sehari; aritmia : 10-20 mg, 3-4 kali sehari; angina : 10-20 mg, 3-4 kali sehari; mencegah migrain : 40 mg, 2-3 kali sehari	an tidur, mimpi yang aneh	
	bisoprolol	Bisoprolol 5 mg dexta tab	Hipersensitif terhadap Bisoprolol	Mengatasi hipertensi atau tekanan darah tinggi, angina pektoris, aritmia, dan gagal jantung	Dosis awal adalah 5 mg, sekali sehari, disesuaikan dengan respons pasien. Dosis umum adalah 10 mg, sekali sehari, maksimal 20 mg per hari.	Kram abdomen, diare, pusing, sakit kepala, mual, denyut jantung lambat, tekanan darah rendah, keadaan mati rasa, kesemutan, ekstremitas dingin, nyeri tenggorokan, dan sesak napas atau mengi, kelelahan.	Simpan Bisoprolol pada suhu 20 - 25 derajat Celsius, di tempat yang kering, dan terhindar dari cahaya matahari langsung. Hindarkan obat dari jangkauan anak-anak.
Alfa blocker	Prazosin, hidralazin						
Sentral	Metildopa, klonidin						

**(6.b) OBAT ANTIANGINA**

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
----------	-----------	-------------------------	----------------	----------	----------------------	--------------	-------------



Obat antiangina	Isosorbide dinitrate,	Isosorbide Yarindo	Pada pasien dengan gangguan jantung seperti infark ventrikel kanan jantung dan hipertrofi kardiomiopati.	Mengatasi Angina (nyeri dada) yang disebabkan oleh penyakit jantung.	Dosis awal: 5 mg, dapat ditingkatkan 10 mg pada hari ke-2 atau ke-3 sesuai anjuran dokter. Dosis pemeliharaan: 1 tablet 2 kali per hari. HARUS DENGAN RESEP DOKTER.	Sakit kepala, vasodilatasi kutaneus, hipotensi postural, ruam kulit.	Disimpan di suhu ruangan, berkisar 25°C
	nitrogliserin						

**(6.c) OBAT GAGAL JANTUNG KONGESTIF**

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat gagal jantung kongestif	Digoksin	Digoxin yarindo tab	Pada pasien dengan fibrilasi ventrikel dan riwayat hipersensitivitas terhadap digoxin atau digitalis lainnya.	Untuk penyakit gagal jantung dan atrial fibrilasi.	Dosis awal dapat diberikan dalam dosis terbagi setiap 6 jam jika kondisi tidak terlalu berbahaya. Dosis pada pasien yang mengalami gagal jantung	Aritmia (gangguan irama jantung) Gangguan konduksi jantung. Gangguan penglihatan (penglihatan kabur atau kuning)	Disimpan pada suhu ruangan, tempat kering, terlindung dari paparan cahaya langsung, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak

					ringan adalah 250–750 mcg (0,25–0,75 mg) tiap hari selama 1 minggu. Dosis pemeliharaan umumnya adalah 0,125–0,25 mg per hari	
--	--	--	--	--	--	--

**(6.d) ANTIPLATELET**

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antiplatelet	Asetosal, klopido-rel						

**(6.e) OBAT DYSLIPIDEMIA**

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat dyslipidemia	Simvastatin,	Selvim 10mg	Untuk wanita hamil dan yang berkemungkinan untuk hamil. Penyakit hati aktif atau peningkatan transaminase serum persisten yang tidak dapat dijelaskan,	Menurunkan kadar kolesterol total dan LDL pada penderita hiperkolesterolemia primer.	Dosis awal 10 mg per hari.	Sakit kepala, konstipasi, nausea, flatulen, diare, dispepsia, sakit perut, fatigue, nyeri dada dan angina. Astenia, miopathy, ruam kulit, rhabdomyolisis, hepatitis,	Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari

			miopati sekunder akibat agen penurun lipid lainnya.			angioneurotik edema terisolasi.	
atorvastatin,	Atorvastatin 20mg Pratapa	Gangguan fungsi hati, kenaikan serum transaminases/ peningkatan serum transaminases >3 kali dalam batas normal. Hamil & menyusui.	Menurunkan kolesterol total, LDL-cholesterol, apolipoprotein B & triglycerides pada hiperkolesterolemia, hiperlipidaemia.	10-80 mg perhari, tergantung kadar LDL, Trigliseirda  sebelum / sesudah makan	Gangguan GI, sakit kepala, mual, myalgia, asthenia, insomnia, kram otot, myositis, myopathy, paraesthesia, neuropatik perifer, pancreatitis, hepatitis, cholestatic jaundice, alopecia, pruritus, rash, impotence, hyper- & hypoglycemia.	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung	
fenofibrate, gemfibrozil,	Gemfibrozil 300mg tab phapros	Hipersensitif terhadap kandungan obat. punya riwayat fotosensitivitas (reaksi tubuh yang terlalu berlebihan terhadap paparan sinar ultraviolet) atau reaksi fototoksik akibat penggunaan obat golongan fibrat.	Pengobatan hiperkolesterolemia, mencegah resiko timbulnya penyakit jantung koroner dengan menurunkan LDL dan menaikkan hdl, pengobatan hipertrigliseridemia	2 kapsul 2 x sehari  sebelum makan	Nyeri abdomen, apendisitis akut, dispepsia, pusing, gangguan penglihatan, depresi, libido berkurang	Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari	
ezetimib							

(6.f) OBAT ANTIARITMIA

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat antiaritmia	Amiodaron						

## 7. OBAT SALURAN CERNA

### (7.a) Obat gastritis dan tukak lambung

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antasida	Al(OH) <sub>3</sub> , Mg(OH) <sub>2</sub> , natrium bikarbonat						
H <sub>2</sub> Bloker	Simetidin, famotidin ranitidin,	Ranitidine Hj tab	Penggunaan pada pasien dengan alergi terhadap obat ini atau sediaananya.	Pengobatan jangka pendek tukak dudenum aktif, tukak lambung aktif, mengurangi gejala refluks esofagitis, terapi pemeliharaan setelah penyembuhan tukak duodenum dan lambung.	Tukak duodenum : 2 kali sehari 150mg (pagi dan malam) selama 4-8minggu. tukak lambung aktif : 2 kali sehari 150mg (pagi dan malam) selama 2 minggu. terapi pemeliharaan tukak duodenum dan lambung : 1 kali sehari	Sakit kepala, malaise (merasa lemas dan kurang fit), pusing, mengantuk, insomnia, vertigo, agitasi (resah dan gelisah), depresi, halusinasi, gangguan gastrointestinal.	Simpan pada suhu ruangan, di tempat yang kering, terhindar dari cahaya langsung

					<p>150mg sebelum tidur. refluks gastroesofagitis : 2 kali sehari 150mg. esofagitis erosif : 4 kali sehari 150mg. terapi pemeliharaan esofagitis erosif : 2 kali sehari 150mg.</p> <p>diminum sebelum atau setelah makan</p>		
PPI	Omeprazol,	Omeprazol nova	Hipersensitivitas terhadap obat ini atau bahan lain yang terdapat dalam formulasi.	Terapi jangka pendekulkus duodenal dan lambung. Refluks esofagitis, sindroma Zollinger-Ellison	<p>&gt; 12 th : 20 mg/hari selama 2-4 minggu. Pasien yang sukar disembuhkan dengan terapi : 40 mg/hari selama 4-8 minggu</p> <p>sebelum makan</p>	Gangguan gastritis, sakit kepala, ruam kulit	Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
	lansoprazol,	Lansoprazole Hj	Jangan gunakan Lansoprazole bila Kamu memiliki riwayat alergi	Tukak duodenum dan refluks esofagus, tukak lambung ringan.	<p>Dewasa dan lanjut usia: 30 mg 1xsehari. Lama terapi:</p>	Diare, sakit kepala, mual, alergi kulit, nyeri perut,	Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari



			terhadap kandungannya. Obat tersebut juga tidak boleh digunakan bersamaan dengan rilpivirine dan atazanavir.		tukak duodenum dan refluks esofagitis 4 minggu. tukak lambung ringan 8 minggu. Pasien dengan gangguan hati dan ginjal: dosis maksimal 30 mg sehari. Harus diminum saat perut kosong.	konstipasi, kembung dan muntah.	sinar matahari langsung.
	pantoprazol						
Pelindung mukosa	Sukralfat	Sucralfate Chombiphar syr	Riwayat hipersensitivitas terhadap sukralfat atau komponennya.	Terapi jangka pendek tukak duodenum (hingga 8 minggu).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tukak lambung atau ulkus duodenum 1 gram 4 kali sehari atau 2 gram 2 kali sehari selama 4-12 minggu. Dosis pemeliharaan untuk mencegah kekambuhan adalah 1 gram 2 kali sehari. Dosis</li> </ul>	Konstipasi dan mulut kering, diare, mual, muntah, rasa tidak nyaman pada lambung, kembung, pruritus, ruam kulit, mengantuk, vertigo, nyeri punggung, sakit kepala.	Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.

					<p>maksimal adalah 8 gram per hari.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gastritis kronis 1 gram 4 kali sehari atau 2 gram 2 kali sehari selama 4–12 minggu. Dosis maksimal 8 gram per hari.</li> <li>• Pencegahan perdarahan saluran cerna 1 gram 6 kali sehari. Dosis maksimal 8 gram per hari.</li> </ul> <p>Harus diminum saat perut kosong. Ambil 1 jam sebelum atau 2 jam setelah makan.</p>		
Antiflatulen	Dimetilpolisiloksan	Disflatyl tab	Tidak diberikan pada pasien dengan riwayat alergi pada simethicone.	Mengurangi penimbunan gas dalam saluran cerna, perasaan penuh pada epigastrium, meteorismus	Dewasa : 1-2 tablet dikunyah sesudah makan dan sebelum tidur. Persiapan	Sendawa dan kentut.	Pada wadah tertutup agar terhindar dari paparan cahaya matahari langsung. Pastikan kamu

				sementara dan pasca operasi, sindrom gastrokardiak, persiapan pemeriksaan dengan sinar X dan sebelum gastroskopi	untuk pemeriksaan sinar X, 1-2 tablet 2-3 hari sebelum pemeriksaan.  Diberikan sesudah makan. Dikunyah sampai halus.		meletakkannya pada ruangan bersuhu 15-30 derajat Celsius
Analog prostaglandin	Misoprostol						

**(7.b) Obat antidiare**

<b>Golongan</b>	<b>Nama Obat</b>	<b>Nama Obat di Tempat PKL</b>	<b>Kontraindikasi</b>	<b>Indikasi</b>	<b>Dosis dan Cara Pakai</b>	<b>Efek Samping</b>	<b>Cara Simpan</b>
Antimotilitas	Loperamid	Imodium tab	Hindari penggunaan pada pasien dengan kondisi: Sembelit, distensi abdomen, ileus. Kolitis ulseratif akut, disentri akut yang ditandai dengan tinja berdarah dan demam tinggi. Enterokolitis bakterial yang disebabkan oleh Salmonella,	Diare akut dan kronik. obat diare yang bekerja dengan memperpanjang waktu transit isi saluran cerna, menurunkan volume feses, meningkatkan viskositas dan kepadatan feses dan menghentikan kehilangan cairan dan elektrolit	Diare akut dosis awal 2 tablet. Dilanjutkan dengan 1 tablet tiap diare. Diare kronik dosis awal 2 tablet. Dilanjutkan dengan 1 tablet tiap diare, tambahkan 1-2 dosis sampai dengan feses keras.	Mulut kering, mual, muntah, nyeri perut, susah buang air besar, reaksi hipersensitifitas, mengantuk, pusing, megakolon toksik	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung

			Shigella, dan Campylobacter.		Maksimal 8 tablet per hari sebelum/sesud ah makan		
Adsorben	Kaolin pektin,	Kaotin syr	Pasien dengan sembelit atau obstruksi usus	Pengobatan gejala- gejala pada diare ringan dan diare yang tidak diketahui sebabnya.	Dewasa diminum 10 ml 3-4 kali sehari sesudah buang air besar, maksimal 40 mL perhari  Anak-anak 6- 12 tahun diminum 5 ml setiap kali sesudah buang air besar, maksimal 20 ml.	Dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit dengan meningkatkan kehilangan natrium dan kalium dalam tinja, terutama pada orang tua, anak-anak dan diare berat	Simpan di tempat yang kering dan terhindar dari sinar matahari langsung.
	attapulgit	Diatab tab	Tidak boleh diberikan pada pasien dimana konstipasi harus dihindari. Hipersensitif terhadap activated attapulgit	Pengobatan simptomatik pada diare yang tidak diketahui penyebabnya	> 12 th 2 tablet setiap setelah buang air besar  sehari maximal 6 tablet	Sembelit. Mual.	Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
Antisekresi	Bismut subsalisilat						

## (7.c) Obat laksatif

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Laksatif osmotikgaram	Mg sulfat	Garam inggris	Tidak dianjurkan untuk dipakai secara rutin	Melancarkan buang air besar.	Dewasa: 1 kantong (30gram)  Anak 5-10 tahun: 1/2 kantong (15 gram)  Larutkan dalam segelas air masak dan diminum sekaligus pada pagi hari sebelum makan.	Kram perut, diare, kembung, gas dan mual mual	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung.
Laksatif osmotic alkohol/gula tdk dicerna	Gliserin, laktulosa	Lactulax syr	kandungan galaktosa dan laktosa dalam obat tersebut	Konstipasi kronik, ensefalopati portal-sistemik.	Konstipasi kronik Dosis awal untuk 3 hari pertama terapi: Dewasa 15-45 mL, anak 5-14 tahun 15 mL,	Penggunaan jangka panjang: rasa tidak enak pada perut dan lambung, diare, kram lambung, rasa haus.	Simpan pada suhu ruangan, hindarkan dari sinar matahari langsung



					anak 1-5 tahun 5-10 mL, bayi Dapat diberikan bersama atau tanpa makanan.	
Laksatif stimulan	Turunan difenilmetan (bisakodil, fenolftalein), antrakuinon					

**(7.d) Antiemetik**

<b>Golongan</b>	<b>Nama Obat</b>	<b>Nama Obat di Tempat PKL</b>	<b>Kontraindikasi</b>	<b>Indikasi</b>	<b>Dosis dan Cara Pakai</b>	<b>Efek Samping</b>	<b>Cara Simpan</b>
Antiemetik	Dimenhidrinat,	Dramamine tab	Hipersensitif terhadap kandungan dalam Dramamine. Ibu menyusui.	Mencegah & meredakan mabuk perjalanan & mengobati vertigo, mual atau muntah sehubungan dengan terapi elektrosyok, anestesi & pembedahan, gangguan sist labirin, sakit akibat radiasi.	Dewasa : 50-100 mg 3-4 kali/hari. Anak >12 tahun : 50 mg 2-3 kali/hari, 8-12 tahun 25-50 mg 2-3 kali/hari, 6-8 tahun 12.5-25 mg 2-3 kali/hari. Mencegah mabuk perjalanan: dosis awal diberikan 30	Mengantuk	Simpan obat Dramamine pada suhu 20-25° Celsius, di tempat sejuk, kering, dan terhindar dari cahaya matahari langsung. Selain itu, pastikan untuk hindarkan obat dari jangkauan anak-anak

					mnt sblm bepergian.		
ondansetron,	Ondansetron 8mg Indofarma tab	Dalam waktu bersamaan juga menggunakan apomorphine. Mengalami alergi terhadap ondansetron atau obat-obatan serupa (dolasetron, granisetron, dan palonosetron).	Penanggulangan mual dan muntah karena kemoterapi, radiotrapi, dan operasi	Dewasa: 8 mg secara injeksi intra vena lambat sebelum pengobatan. Untuk mencegah efek "delayed" emesis, dosis harus dilanjutkan secara oral 8 mg 2 kali sehari selama 5 hari. Anak: 5mg/ml dosis tungga, segera sebelum kemoterapi, lalu dilanjutkan dengan 4 mg peroral tiap 12 jam selama 5 hari. Obat ini bisa dikonsumsi dengan atau tanpa makanan. Biasanya dokter akan	Sakit kepala, konstipasi, rasa panas pada kepala dan epigastrium, sedasi dan diare.	Simpan di tempat sejuk (15 –30 derajat Celcius) dan kering, terlindung dari cahaya.	

					melarang makan sebelum kemoterapi, radioterapi, atau operasi.		
metoklorpramide,	Metoclopramide fm tab	pasien yang memiliki riwayat hipersensitivitas terhadap obat ini. Selain itu, tidak digunakan untuk pasien dengan riwayat gangguan saluran cerna, kejang, depresi, feokromositoma, dan gejala ekstrapiramidal.	Penanggulangan mual dan muntah karena kemoterapi, radiotrapi, dan operasi	Dewasa: 8 mg secara injeksi intra vena lambat sebelum pengobatan. Untuk mencegah efek "delayed" emesis, dosis harus dilanjutkan secara oral 8 mg 2 kali sehari selama 5 hari. Anak: 5mg/ml dosis tunggal, segera sebelum kemoterapi, lalu dilanjutkan dengan 4 mg peroral tiap 12 jam selama 5 hari. Obat ini bisa dikonsumsi dengan atau	Sakit kepala, konstipasi, rasa panas pada kepala dan epigastrium, sedasi dan diare.	Simpan di tempat sejuk (15 –30 derajat Celcius) dan kering, terlindung dari cahaya.	

					tanpa makanan. Biasanya dokter akan melarang makan sebelum kemoterapi, radioterapi, atau operasi.	
--	--	--	--	--	---	--

**(8) OBAT SALURAN NAPAS**

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat Batuk	codein, dekstromethorphan, amonium klorida,						
	gliseril guaikolat,	Glyceryl guaiacolate triman tab	Tidak boleh digunakan oleh pasien yang memiliki riwayat alergi atau hipersensitif terhadap komposisi obat.	Obat jenis ekspektoran yang dapat meredakan batuk dan melancarkan pengeluaran dahak di saluran napas.	Dewasa: 200-400 mg setiap 4 jam. Maksimal 2.400 mg setiap hari. Anak 6-12 tahun: 100 mg empat kali sehari. Maksimal 400 mg setiap hari.  diminum setelah makan	Diare, pusing, sakit kepala, gatal-gatal, ruam pada kulit, mual dan muntah, sakit perut	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung

bromheksin,	Bisolvon syr	Hipersensitivitas, tukak lambung, asma, gangguan hati atau ginjal yang parah.	Meredakan batuk berdahak, mengencerkan dahak dan mempermudah mengeluarkan dahak	>12 th: 3 x 10 ml, 6-12 th: 3 x 5 ml, 2-6 th: 2 x 5 ml per hari Sesudah makan	Alergi, gangguan pernafasan, gangguan saluran cerna, dapat terjadi kenaikan transaminase, sakit kepala	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung
ambroksol,	Ambroxol fm tab	Pasien dengan riwayat hipersensitivitas terhadap ambroxol atau komponen lain dalam sediaan. Penggunaan ambroxol juga tidak disarankan pada pasien dengan ulkus peptikum.	Penyakit saluran napas akut & kronik yang disertai dengan sekresi bronkus yang abnormal, terutama pada eksaserbasi bronkus kronik, bronkitis asmolitikus, asma bronkial, terapi pra & pasca operasi untuk pasien yang dirawat secara intensif guna mencegah terjadinya komplikasi pada paru	Dewasa dan anak > 12 tahun : 2-3 kali sehari 1 tablet Dapat diberikan bersama atau tanpa makanan	Gangguan GI ringan, reaksi alergi	Simpan di tempat sejuk dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung
asetilsistein	Acetylcysteine	Apabila intoksikasi paracetamol terjadi pada pasien yang memiliki riwayat hipersensitivitas	Infeksi saluran nafas dengan mukus berlebihan termasuk bronkitis, emfisema & bronkiektasis, profilaksis & terapi	Dewasa & anak >14 tahun 1 kapsul 2-3 x perhari. Anak 6-14 tahun 1 kapsul 2 x perhari.	Mual, muntah, takikardi, demam, pusing.	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung



			terhadap acetylcysteine, maka penggunaan harus berhati-hati	kompilasi bronkopulmonal dengan mukostasis, bronkial catarrh. Juga sebagai anti radikal bebas dan anti oksidan	Mukovisidosis Anak >6 tahun 1 kapsul 3 x perhari. Dapat dikonsumsi sesudah makan.		
Obat asma	terbutaline, budesonid, ipratropium bromida, teofilin, aminofilin						
	salbutamol,	Salbutamol 4 mg fm	Salbutamol dikontraindikasikan pada pasien yang memiliki riwayat hipersensitivitas terhadap obat salbutamol ataupun bahan tambahan yang ada di dalam formulasi obat	Asma bronkhial, bronkitis kronis, emfisema	Dewasa : 1-2 tablet 3-4 kali sehari, Anak-anak usia 6-12 tahun : 1 tablet sehari 3 kali, Anak usia 2-6 tahun : 1/2 tablet 3 kali sehari.  diberikan 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan	Tremor khususnya pada tangan, palpitasi, dan kram otot	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung

(9) VITAMIN, MINERAL, ENZIM

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Vitamin	Vitamin A, D, K,						

	Vitamin E	Ever e250	Pasien yang telah diketahui memiliki alergi terhadap vitamin E atau komponen formulasinya.	Memelihara kesehatan kulit	1 kapsul sehari  Sesudah makan	Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi vitamin E dalam dosis tinggi setiap hari dapat meningkatkan risiko stroke hingga 22 persen. Bahkan vitamin E dalam dosis tinggi diduga dapat meningkatkan risiko stroke yang serius, yang disebut stroke hemoragik atau pendarahan ke otak.	Simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celsius, di tempat kering
	Vitamin B1 (thiamin),	Vitamin B1 kf Tab	Jika terdapat riwayat anafilaktik dengan suplemen ini atau komponennya. Peringatan penggunaan diberikan pada ibu hamil agar tidak melebihi rekomendasi asupan harian	Vitamin yang dapat membantu sel-sel tubuh mengubah karbohidrat menjadi energi. Vitamin ini juga membantu menjaga fungsi saraf agar tetap baik. Asupan vitamin B1 harian tubuh bisa didapatkan melalui makanan atau suplemen.	Dewasa: 10–20 mg suntikan IM, 3 kali sehari, hingga 2 minggu. Dilanjutkan dengan pemberian 5–10 mg tablet vitamin B1 per hari selama sebulan. Anak-anak: 10–25 mg suntikan IV atau IM per hari atau 10–50 mg	Kesemutan. Mual atau muntah	Suhu 20-25° Celsius, di tempat sejuk, kering, dan terhindar dari cahaya matahari langsung.

					tablet vitamin B1 per hari selama 2 minggu		
B6(piridoksin),	Vitamin b6 kf tab	Riwayat hipersensitivitas dan pasien dengan hipervitaminosis B6. Pada orang yang memiliki gangguan ginjal dan hepar, pemberian vitamin B6 perlu dilakukan dengan pengawasan vitamin B6 dimetabolisme di hepar dan dieliminasi melalui ginjal	Mengobati dan mencegah defisiensi vitamin B6 dan anemia sideroblastik	1 kali sehari 1 tablet  Diberikan pagi hari bersama dengan makanan	Neuropati sensorik, nyeri kepala, gangguan fungsi hepar, mual-muntah, dan gangguan fungsi ginjal.	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung	
asam folat,	Folavit 1000mcg	Tidak boleh diberikan pada pasien dengan kondisi: anemia pernisiiosa (anemia fatal dengan peningkatan volume eritrosit) yang tidak diobati. kekurangan cobalamin yang tidak diobati	Untuk memenuhi kebutuhan asam folat terutama ibu hamil	1 x sehari 1 tablet  Sesudah makan	Mual. perut kembung.	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung	

			atau penyebab defisiensi cobalamin lainnya				
	B12	Vitamin b12 kf tab	Jika alergi terhadap kobalt atau sedang mengidap penyakit Leber. Sebab, obat ini dapat merusak pembuluh darah dan menyebabkan kebutaan pada pengidap penyakit Leber.	Memenuhi kebutuhan B12	1 x 1 tablet Dapat diberikan sebelum atau sesudah makan.	Batuk, sakit kepala, nyeri pada abdominal, perubahan berat badan.	Simpan pada tempat sejuk dan kering serta terlindung dari sinar matahari langsung.
	Vitamin C	Vitamin C 50 mg kf tab	Jika terjadi reaksi alergi terhadap vitamin C atau komponen lain dalam obat. Peringatan ketika akan dilakukan tes urine atau feses pada orang yang mendapat vitamin C dosis tinggi karena dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan.	Avitaminosis vitamin C	Pencegahan: 100mg/hari. pengobatan: 200-600mg/hari.  Diminum setelah makan	Diare, pengasaman urin oleh vitamin C dapat memudahkan kristalisasi oksalat dan sistin.	Simpan pada tempat sejuk dan kering serta terlindung dari sinar matahari langsung.
Mineral	Ca, P, K, Mg, Na, Cl, Fe, Zn, Mn, Cu, I <sub>2</sub>						

**(10) OBAT SISTEM ENDOKRIN**

<b>Golongan</b>	<b>Nama Obat</b>	<b>Nama Obat di Tempat PKL</b>	<b>Kontraindikasi</b>	<b>Indikasi</b>	<b>Dosis dan Cara Pakai</b>	<b>Efek Samping</b>	<b>Cara Simpan</b>
Obat Diabetes melitus	pioglitazone, insulin						
	glibenclamide,	Glibenclamide fm tab	Pasien diabetes melitus tipe 1. wanita hamil dan menyusui. pasien yang memiliki hipersensitivitas terhadap glibenclamide serta. pasien yang memiliki riwayat penurunan fungsi hati dan ginjal.	Non-insulin dependent diabetes melitus (NIDDM).	Awal: 5 mg/hari. Harus ditingkatkan secara bertahap 2.5 mg dengan interval 1 minggu. Maksimal 15 mg/hari.  Diberikan bersama makan	Sensitisasi kulit, gangguan gastrointestinal, leukopenia, intoleransi alkohol & ikterus.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung.
	glimepiride),	Glimepiride dexta tab	Pasien dengan hipersensitivitas terhadap obat ini atau terhadap sulfa. Pasien diabetes mellitus tipe 1. Pasien ketoasidosis diabetik dengan atau tanpa koma (kondisi ini perlu diterapi dengan insulin)	Penurun gula darah bagi penderita kencing manis (diabetes mellitus).	Diabetes melitus tipe 2 Dewasa: dosis disesuaikan dengan tingkat glukosa darah pasien. Awal: 1 mg/hari, dapat ditingkatkan dengan peningkatan 1 mg dengan jarak 1-2 minggu sesuai respon.	Sakit perut, diare, mual, muntah, dysgeusia, sakit kepala, pusing.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung.



					<p>Pemeliharaan: 4 mg setiap hari. Maksimal: 6 mg setiap hari. Lansia: awal 1 mg 1x/hari.</p> <p>Dapat dikonsumsi bersama makanan.</p>		
acarbose,	Acarbose 100mg dexta tab	Radang usus. penyakit kronis terkait dengan pencernaan.	Terapi kombinasi dengan diet untuk DM	<p>Tergantung respon individu, biasanya 3 x sehari 50mg dan dapat ditingkatkan sampai dengan 3 x sehari 100-200mg. dosis dapat ditingkatkan dengan interval 4-8 minggu atau lebih</p>	<p>Sering terjadi : kembung, bising usus meningkat. Kadang terjadi : diare dan nyeri abdomen. Gejala pada lambung dan abdomen yang tidak spesifik</p>	<p>Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung.</p>	
metformin,	Metformin 500mg Hj Tab	Asidosis, alergi terhadap komponen sediaan, ataupun gangguan fungsi ginjal yang berat.	Penurun gula darah bagi penderita kencing manis (diabetes mellitus). Metformin juga sangat cocok untuk penderita diabetes	<p>Dewasa: Dosis awal: 500 mg/hari. Dosis maksimal: 2.000 mg/hari.</p>	<p>Diare, banyak buang gas, rasa lelah, nyeri-nyeri otot, gula darah rendah (hipoglikemia), penurunan kadar vitamin B-12 dalam</p>	<p>Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung.</p>	

				dengan tubuh gemuk.	Dapat dikonsumsi bersamaan dengan makanan.	tubuh, sulit buang air besar, sakit maag.	
Obat hipertiroid dan hipotiroid	Propiltiourasil, levotiroksin.						
Kortikosteroid	hidrokortison,	Hydrocortison cr kalbe	Pada pasien dengan riwayat hipersensitivitas terhadap obat ini.	Mengobati eksim, inflamasi, kemerahan serta gatal-gatal pada kulit.	2-3 kali sehari.  Oleskan tipis-tipis pada bagian yang sakit.	Atrofi kulit, lesi, dermatitis perioral, folikulitis, gatal, perubahan pigmentasi, penekanan HPA (dengan potensi lebih tinggi yang digunakan >2 minggu).	Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung.
	betametason,	Betamethasone kg cr	pasien hipersensitivitas kortikosteroid maupun betametason serta penggunaan luar mata. Peringatan penggunaan betametason topikal terutama pada pemakaian betametason jangka panjang, karena akan meningkatkan efek samping, baik lokal maupun sistemik	Betamethasone sebagai krim topikal untuk meringankan iritasi kulit, seperti gatal-gatal dan mencreamupas dari eksim, penyakit Bullous dermatitis herpetiformis.	2 - 3 kali sehari  Dioleskan secara tipis dan merata pada bagian kulit yang meradang / sakit.	Menyebabkan penipisan kulit, kulit kering.	Wadah dan penyimpanan Dalam tube atau wadah tertutup rapat. Simpan pada suhu 25°, penyimpanan diperbolehkan antara 15° dan 30°. Lindungi dari pembekuan.

	prednison,	Prednisone triman tab	Hipersensitivitas terhadap obat ini, atau komponennya. Infeksi jamur sistemik. Wanita hamil trimester pertama	Menekan reaksi radang dan reaksi alergi.	<p>Antiinflamasi atau immunosupresif. Dewasa: 5-60 mg setiap hari. Anak-anak: 0,05-2 mg / kg setiap hari dibagi setiap 6-24 jam.</p> <p>Arthritis reumatoid. Dewasa: 5-10 mg pada waktu tidur, dapat disesuaikan sesuai dengan respons pasien, gejala klinis, dan tingkat keparahan penyakit. Dosis dapat dikurangi dengan penambahan 1 mg setiap 2-4 minggu sampai dosis pemeliharaan yang tepat tercapai. Dapat dikonsumsi</p>	Mual, anoreksia (kehilangan nafsu makan), nyeri otot, gelisah. Edema, hipernatremia, hipokalemia, iritasi lambung, hipernatremia, hiperkalemia. Gangguan tidur (pada awal terapi).	Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.
--	------------	--------------------------	---	--	--	--	--

					bersamaan dengan makan.		
	metilprednisolon	Methylprednisolone 4 mg dexta tab	Pada pasien hipersensitivitas	Asma bronkial, Gangguan pada kulit seperti dermatitis, psoriasis, sindrom Stevens-Johnson dan kelainan kulit lainnya yang responsif terhadap kortikosteroid, Gangguan kolagen : Lupus eritematosus sistemik, kelainan endokrin, penyakit rheumatik, alergi, kelainan hematologi, meningitis tuberkulosa.	Dewasa dan anak > 12 tahun : dosis awal 4-48 mg / hari sebagai dosis tunggal atau dosis terbagi. dosis pemeliharaan 4-16 mg / hari, Anak < 12 tahun : dosis awal 0,8-1,5mg/kgBB/hari, tidak boleh lebih dari 80 mg / hari.  Diberikan setelah makan	Gangguan elektrolit dan cairan tubuh, gangguan pencernaan, keringat berlebihan, urtikaria, osteoporosis, peningkatan tekanan intrakranial, gangguan siklus menstruasi, DM, gangguan pertumbuhan anak, katarak, glaukoma, anafilaksis	Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
Obat KB	levonorgestrel,	Andalan Postpil	Semakin cepat diminum, semakin tinggi tingkat keefektivasannya a. Hanya digunakan di saat darurat tanpa perlindungan kontrasepsi regular kontrasepsi	Sebagai kontrasepsi darurat untuk mencegah kehamilan	Diminum dua tablet sekaligus	Efek samping yang biasanya muncul adalah mual, sakit kepala, pusing dan payudara terasa lebih keras. Pada umumnya efek samping tidak berlangsung lebih dari 24 jam. Apabila terjadi muntah dalam waktu satu jam, maka dianjurkan	Simpan pada suhu ruang dan terhindar dari sinar matahari langsung



TUGAS KHUSUS PKL D3 FARMASI UMG\_AZMI SABILA KISBATUL WAFI\_211105018\_APOTEK BERKAH

						untuk minum satu pil terlebih dahulu dan minum pil kedua 12 jam setelah meminum tablet yang pertama.	
	etinilestradiol, lynestrenol	Andalan laktasi	Perdarahan pada vagina yang tidak terdiagnosis. Hamil dan dicurigai hamil.	Kontrasepsi oral dosis rendah untuk ibu menyusui.	Sesuai petunjuk dokter	Mual, pusing	Simpan Andalan Laktasi pada suhu di bawah 30 derajat Celsius, di tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya matahari langsung

Gresik,  
Dosen Pembimbing PKL,



Apt. Siti Nur Asiyah., M. Farm, Klin.  
NIDN 0711088504

Gresik,  
Pembimbing Lapangan



APOTEK  
BERKAH  
JL. RAYA PEGANDEN NO. 26 / 1A  
KEG. MANYAR - KAB. GRESIK

Apt. Ersanda Nurma Praditapuspa, S.Farm., M.Farm.  
SIPA. 19961113/SIPA\_35.25/2019/22275



**C. PRODUCT KNOWLEDGE ALAT KESEHATAN**

**(1) ALKES PERAWATAN**

No	Alkes perawatan	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Bandage gauze (kasa hidrofil)		Untuk menutup luka dan melindungi luka dari paparan benda asing, debu, kotoran, dan bakteri.	Gunakan Kasa Hidrofil Steril 16/16 sesuai kebutuhan. Ikuti petunjuk penggunaan yang tertera pada kemasan atau sesuai anjuran dokter. Pastikan area yang akan diperban sudah bersih dan kering.
2.	Elastic bandage		Untuk menekan area yang cedera	Balutkan elastik bandage dengan kencang namun tidak terlalu ketat di sekitar area yang terluka.
3.	Kapas pembalut		Untuk menutup atau membalut luka dan mencegah infeksi pada luka selama proses penyembuhan.	Tempatkan kapas secara langsung di atas luka dan gunakan bandage untuk menjaga kapas tetap di tempat.

TUGAS KHUSUS PKL D3 FARMASI UMG\_AZMI SABILA KISBATUL WAFI\_211105018\_APOTEK BERKAH

4.	Kasa berisi obat (sufratulle, daryantulle, bactigrass, actisorb, paronet)		Untuk membalut luka, termasuk luka bakar, luka akibat trauma, luka yang terinfeksi, dan luka bekas khitan. Daryant-Tulle Kasa Steril berbentuk seperti jaring yang dilapisi antibiotik framycetin	Gunakan Daryant-Tulle Kasa Steril pada area yang membutuhkan dengan ukuran sesuai luka yang dialami. Gunakan Daryant-Tulle Kasa Steril sesuai kebutuhan.
5.	Kasa dressing		Menyerap cairan luka dengan cepat dan efisien serta dapat menyerap dan mengikat eksudat luka, sehingga mencegah pembengkakan dan mempercepat proses penyembuhan.	Tempatkan kasa dressing secara lembut di atas luka dan pastikan tidak ada lipatan atau lipatan yang menyebabkan iritasi pada luka.
6.	Kasa steril		Untuk operasi besar/kecil, khitan, penutup luka, dan bebat pusing bayi.	Bersihkan luka dari kotoran, bakteri dan partikel untuk mencegah infeksi. Keringkan kulit sekitar luka dengan lembut. Tutup luka dari kotoran dan bakteri menggunakan Kasa Steril.
7.	Pembalut gips (gypsona)		Membantu menahan dan menjaga ujung tulang yang	Gips dibasahi terlebih dahulu,

			<p>patah tetap pada posisi yang tepat.</p>	<p>bentuk sesuai dengan area yang terluka, dan biarkan mengering untuk memberikan perlindungan.</p>
8.	Pembalut leher/cervical collar		<p>Menyangga atau menopang leher pada pasien Cerebral Palsy, pasien cedera leher, atau korban trauma kepala.</p>	<p>Cervical collar digunakan dengan memasukkan bagian yang bertekuk tepat pada dagu secara perlahan, kemudian bagian belakang Cervical collar diletakkan ke leher belakang hingga sedikit melewati leher lalu sisi Cervical collar direkatkan satu sama lain</p>

<p>9.</p>	<p>Plester Elastik (handyplas, band aid, elastikon)</p>		<p>Digunakan untuk menutup luka dan memberi bantalan bagi luka. Melindungi luka dari kotoran dan bakteri. Bersihkan dan keringkan kulit disekitar luka sebelum menempelkan plester.</p>	<p>Tempelkan plester secaralangsung di atas luka, pastikan area sekitar luka bersih dan kering sebelumnya.</p>
<p>10.</p>	<p>Plester kertas (leukopor, dermilite)</p>		<p>Untuk menutup luka yang memiliki daya rekat tinggi dan tembus udara sehingga meminimalisir terjadinya iritasi pada kulit.</p>	<p>Gunting atau sobek plester sesuai ukuran yang dibutuhkan, Pastikan area yang diaplikasikan bersih, tidak basah atau terkena minyak, Aplikasikan plesterpada area yang diinginkan dan rekatkan ke kulit, Pastikan ujung-ujung plestersudah merekat dengan baik</p>
<p>11.</p>	<p>Plester plastik (leukofix, transfor)</p>		<p>Digunakan sebagai perekat untuk plester infus, kateter, kanula dan lainnya</p>	<p>Gunting atau sobek plestersesuai ukuran yang dibutuhkan dan rekatkan</p>



TUGAS KHUSUS PKL D3 FARMASI UMG\_AZMI SABILA KISBATUL WAFI\_211105018\_APOTEK BERKAH


12.	Plester plastik waterproof (setonplast, blenderm)		Untuk menjaga luka cepat sembuh serta melindungi luka dari kuman dan kedap air	Plester ditempelkan pada bagian yang luka, sebelum ditempelkan luka dibersihkan terlebih dahulu
13.	Plester rayon (microfore, dermisel)		Membantu menempelkan perban, kasa dan alat medikal lainnya pada kulit yang luka.	Buka plester dari kemasannya, namun jangan dilepas stripnya. Tempelkan plester pada area luka, tarik stripnya, lalu tekan tepi plester ke bawah.
14.	Plester sutera (leukosilk)		Untuk merekatkan kateter, jarum pada kulit yang sensitif	Gunting sesuai ukuran yang dibutuhkan dan rekatkan.



15.	Plester ZnO (leukoplas)		Plester kain sebagai perekat penutup luka, perekat tube, catheter dan cannula pada kulit yang normal.	Gunting sesuai ukuran yang dibutuhkan dan rekatkan.
-----	-------------------------	--	---	---

**(2) PERAWATAN PASIEN**

No	Perawatan pasien	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Bedpan		Sebagai wadah feses untuk pasien yang tidak dapat/tidak bisa ke WC. Bedpan ini terbuat dari plastik yang kuat, dengan desain yang cocok dengan pasien dan sangat mudah untuk dibersihkan.	Letakkan bedpan di bawah pantat, Meyakinkan dengan tepat perletakan bedpan letakkan fraktur pan dengan bagian yang sebelum klien berguling ke posisi semula. Jika sudah maka feses dibuang dan bedpan dicuci dengan sabun
2.	Breast pump		Untuk memudahkan Bunda saat akan memompa ASI.	Siapkan alat pompa elektrik, kemudian

			<p>pasang masing-masing alat sesuai tempatnya.</p> <p>Letakkan pelindung payudara pada posisi yang tepat dan tidak terasa mengganggu atau sakit. Jika pelindung tersebut dirasa kurang pas, Anda bisa menekannya perlahan agar tidak mudah lepas nantinya.</p> <p>Colokkan pompa elektrik ke sumber listrik terdekat atau langsung digunakan saat baterai masih tersedia.</p> <p>Nyalakan tombol “on” dan atur ke intensitas pompa sesuai keinginan Anda.</p> <p>Jika Anda menggunakan pompa elektrik yang hanya</p>
--	--	--	--


			<p>memiliki satu pompa, ulangi tahapan sebelumnya di kedua sisi payudara.</p> <p>Lakukan proses memompa ASI dengan cara yang tepat sampai jumlah ASI yang diperoleh telah cukup atau payudara sudah kosong.</p> <p>Cuci bersih tangan dan semua peralatan setelah selesai digunakan.</p>
3.	Colostomy bag		<p>kantong yang digunakan untuk menampung feses pada pasien setelah menjalani operasi colon (pembedahan usus untuk membuat anus buatan melalui otot dan kulit pada perut). Kantong colostomy hanya digunakan untuk sekali pemakaian.</p>
4.	Ihsjap/eskap		<p>Untuk kompres pada bagian tubuh yang sakit, memar, saat gejala panas. Selain itu, ice Bag ini juga</p> <p>Buka penutup lalu diisi kepingan es / air es, Putar tutup eskap hingga erat</p>



			<p>bisa untuk kompres cedera saat berolahraga, karena bisa digunakan untuk es dan air panas.</p>	<p>dan kompreskan pada bagian yang diinginkan</p>
5.	Kruk		<p>Merupakan tongkat/alat bantu berjalan untuk orang yang memiliki keterbatasan fisik karena cacat atau cedera, biasanya digunakan secara berpasangan untuk mengatur keseimbangan tubuh saat berjalan.</p>	<p>Letakkan kruk sesuai tinggibadan pastikan pegangan sejajar dengan bagian atas garis panggung, siku sedikitmenekuk ketika memegang kruk dan pegang erat gagangnya</p>
6.	Pus basin/emesis basin		<p>Tempat membuang kapas bekas pakai, nanah, muntahan, dan yang lainnya, karena itu ada</p>	<p>Tempatkan pus basin di dekatpasien dan gunakan untuk menampung</p>



			<p>yang menyebutnya dengan nama pus basin atau emesis basin.</p>	<p>muntahan atau cairan pasien</p>
7.	Spalk		<p>Digunakan untuk menahan atau menjaga agar bagian tulang yang patah tidak bergerak (immobilisasi).</p>	<p>Pasang spalk di bagian posterior, medial dan lateral. Letakkan kapas dibagian tonjolan-tonjolan tulang supaya tidak lecet, kemudian balut dan rekatkan dengan perban elastis</p>
8.	Tapelhoed/nipple shield		<p>Melindungi puting yang luka dan lecet, Membantu puting yang datar atau landai</p>	<p>Menempatkan pelindung tepat pada posisinya sebelum menyusui bayi. Nipple shield dapat lebih melekat pada payudara saat basah. Jadi, bilas dengan air hangat sebelum digunakan. Selanjutnya, letakkan pelindung di payudara, pastikan puting dan areola Bunda pas</p>






				berada di dalam bagian pelindung yang terangkat. Sambil menahan pelindung pada tempatnya, dekatkan mulut bayi ke payudara agar perlekatan dapat dilakukan.
9.	Tongkat pyramide/elbow		Merupakan alat bantu jalan yang berfungsi untuk menompang tubuh waktu berdiri ataupun jalan.	Pegang tongkat dengan tangan yang berlawanan dari bagian kaki yang sakit, posisikan keluar untuk bagian bawah yang menonjol, lalu langkahkan kaki yang sakit kedepan untuk melakukan gerakan dan harus sejajar dengan tongkat pyramid sertatekan tongkat dengan posisi tubuh tegak jangan membungkuk supaya tidak terasa berat
10.	Urinal		Alat yang digunakan untuk menampung urin yang	Posisikan alat kelamin ke dalam wadah urinal dan gunakan untuk menampungurin yang

				keluar
11.	Walker		Membantu menahan beban tubuh penggunanya secara lebih baik. Alat bantu jalan lansia ini pun dapat mendukung keseimbangan tubuh bagian samping.	Posisikan walker sekitar satu langkah di depan anda. Pegang bagian atas walker dengan kedua tangan dan langkahkan kaki yang cedera ke bagian tengah walker, jangan terlalu jauh ke depan. Tekan pegangan walker saat Anda melangkahkan kaki yang sehat hingga sejajar dengan kaki


12.	Warm waterzak		<p>Botol karet yang berisi air panas untuk mengompres bagian tubuh yang sakit. Kompres hangat sering digunakan untuk mengurangi nyeri yang berhubungan dengan ketegangan otot walaupun dapat juga dipergunakan untuk mengatasi untuk mengurangi gejala nyeri lainnya dan dipadukan dengan teori keperawatan Orem</p>	<p>yang cedera/sakit. Masukkan air panas ke dalam warm waterzak dan tempelkan pada bagian tubuh yang sakit</p>
13.	Windring/air cushion		<p>Digunakan sebagai alas duduk penderita ambeien/wasir dan penderita cedera punggung agar lebih nyaman saat duduk.</p>	<p>Menaruh windring diatas tempat duduk sebagai alas duduk.</p>

**(3) ALKES TINDAKAN MEDIS**


No	Alkes tindakan medis	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Ballon/folley cathether		<p>Menjaga agar kandung kemih tetap kosong untuk menunjang penyembuhan luka,</p>	<p>Selang akan dilumuri dengan pelumas tertentu agar mudah dimasukkan ke dalam</p>




			<p>pengobatan beberapa infeksi dan operasi suatu organ dari sistem urine dimana kandung kemih tidak boleh tegang sehingga menekan unsur lain.</p>	<p>saluran kencing. Lalu pasien diberi bius lokal terlebih dahulu untuk mengurangi rasa sakit atau tidak nyaman saat dipasang kateter, kemudian dimasukkan selang kateter ke dalam saluran kencing (uretra) sedikit demi sedikit kira-kira sekitar 5 cm, hingga mencaipaleher kandung kemih</p>
2.	Condom catheter		<p>Untuk menangani pasien pria yang tidak mampu buang air kecil dengan normal akibat masalah fisik atau mental.</p>	<p>Pasang condom catheter pada pênis lalu hubungkan dengan urine bag</p>
3.	Disposable syringe		<p>Alat bantu medis yang berupa pompa piston sederhana untuk menyuntikkan atau menghisap cairan atau gas</p>	<p>Buka penutup alat suntik, dan celupkan jarum ke cairan atau obat yang akan di hisap. Tarik piston sampai obat terhisap sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.</p>



			Setelah itu, arahkan jarum ke bagian tubuh yang akan disuntikkan. pernapasan berupa ventilator agar oksigen dapat masuk ke paru-parup pasien.
4.	Endotracheal		<p>Menghilangkan hambatan pada saluran pernapasan. Membuka jalan napas agar dokter dapat menyalurkan oksigen atau obat-obatan ke dalam tubuh pasien</p> <p>1. Menyiapkan alat (Selang NGT, Jelly, Bengkok, Plester, Klem, Pinset anatomi, sthetoscope, Spuit 10 cc, handuk, perlak) 2. Menyiapkan Pasien (Informed Consent, Mengatur Posisi Pasien) 3. Persiapan Petugas (cuci tangan, memakai handscoon) 4. Pasang sampiran, pasang perlak dan handuk 5. bersihkan area sekitar hidung 6. siapkan selang NGT dan ukur terlebih dahulu ( dari ubun - ubun atau telinga ke epigastrium) 7. oleskan jelly pada selang NGT 8. masukkan selang NGT dengan</p>



				<p>menggunakan pinset sambil meminta pasien untuk menelan sampai dengan batas ukuran yang telah di tentukan 9. Validasi apakah selang benar - benar masuk ke lambung dengan cara menyemprotkan udara menggunakan spuit kemudian dengarkan dengan sthetoscope pada daerah lambung 10. Fiksasi selang NGT dengan plester di bagian hidung 11. Tutup ujung selang NGT 12. Evaluasi reaksi pasien, bereskan alat, rapikan pasien dan buat doumentasi tindakan</p>
5.	Enema syringe	 <p>Membersihkan lubang dubur sehingga saluran pengeluaran kotoran Anda lebih bersih. Enema syringe ini juga bisa digunakan untuk mengurangi konstipasi dan membantu pemakaian obat yang harus diaplikasikan</p>	Anda bisa memasukkan air atau campuran air dan garam ke dalam tabung penyimpanan, lalu Anda bisa mulai memasukkannya ke dalam dubur dan melakukan proses pembersihan.	



6.	Feeding syringe		<p>melalui dubur.</p> <p>Memberi makan atau meloloh lewat mulut. Bisa untuk segala jenis makhluk hidup untuk manusia, mamalia, unggas, dll. Hanya untuk sekali pakai jangan disterilkan ulang, Dirancang khusus utk keperluan teknis, sehingga lebih cocok, efektif dan mudah aplikasinya. Spsit/ Suntikan baru tanpa Jarum</p>	<p>Isi Feeding syringe dengan makanan yang sudah dihaluskan. Lalu masukkan kedalam mulut pasien perlahan</p>
7.	Feeding tube		<p>Untuk memberi makan pada orang yang tidak dapat makan melalui mulut dengan aman. Kesulitan yang dimaksud adalah kesulitan menelan, pasien tidak sadarkan diri, mengalami gangguan makan, atau masalah lain yang membuat pasien sulit makan</p>	<p>Dimasukkan ke dalam mulut atau hidung, turun ke tenggorokan, lalu menuju ke kerongkongan, dan ujungnya diletakkan di perut (tabung G) atau tengah usus kecil (tabung J). Umumnya tabung ini dapat bertahan di tempatnya selama sekitar 14 hari</p>
8.	Gliserin syringe		<p>Untuk menyempatkan lavement / clysmia melalui rectal atau anus.</p>	<p>Letakkan bedpan dibawah anus.lalu masukkan gliserin ke anus secara perlahan,</p>



				dengan tangan kiri dan memegang anus dan tangn kanan memasukkan gliserin kedalam anus
9.	Gloves/handschoen		Untuk mencegah terjadinya infeksi silang serta mencegah terjadinya penularan kuman.	Cuci tangan menggunakan air dengan sabun lalu keringkan dan gunakan handscoon sebelum melakukan tindakan
10.	Infusion set dewasa		Untuk memberikan cairan infus ke dalam tubuh pasien melalui intravena untuk memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit serta sebagai tindakan pengobatan dan pemberian makanan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebelum memasang infus, terlebih dahulu mencuci tangan hingga bersih.</li> <li>2. Mendekatkan peralatan ke pasien agar mudah dijangkau.</li> <li>3. Menjelaskan kepada pasien mengenai prosedur dan sensasi yang akan dirasakan.</li> <li>4. Mengatur posisi pasien dalam keadaan berbaring.</li> <li>5. Menyiapkan cairan infus dan</li> </ol>



				<p>menyambungkannya ke selang infus. Setelah itu gantungan cairan infus ke standar infus.</p> <p>6. Menentukan area vena yang akan ditusuk untuk menyalurkan infus.</p> <p>7. Memasang alas.</p> <p>8. Memasang tourniquet pembendung kurang lebih 15 cm di atas vena yang hendak ditusuk.</p> <p>9. Menggunakan sarung tangan yang steril.</p> <p>10. Memberikan desinfektan pada area yang akan ditusuk dengan diameter 5 cm hingga 10 cm.</p> <p>11. Menusukkan IV catheter ke vena menggunakan jarum</p>
--	--	--	--	--




				<p>yang menghadap ke jantung.</p> <p>12.Memastikan jarum IV telah benar-benar masuk ke vena.</p> <p>13.Menyambungkan jarum IV yang telah ditusuk ke selang infus.</p> <p>14.Menutup area insersi menggunakan kassa kering yang steril kemudian diberikan plester.</p> <p>15.Mengatur tetesan infus yang sesuai.</p> <p>16.Melepaskan sarung tangan.</p> <p>17.Memasangkan label pelaksanaan yang mencantumkan informasi mengenai nama pelaksana dan waktu pelaksanaan.</p>
--	--	--	--	--






				18. Membereskan alat-alat dan mencuci tangan.
11.	Infusion set pediatrik		Alat bantu untuk memasukkan cairan atau obat langsung melalui pembuluh darah vena dalam jumlah dan waktu tertentu.	Usap tangan pasien/bayi dengan menggunakan alkohol swab, lalu cari intra vena'nya untuk dipasangselang infus
12.	Insulin syringe		Untuk memenuhi kebutuhan insulin pada penderita diabetes.	Cubit kulit yang akan disuntik, bersihkan menggunakan alkohol swab, masukkan jarum suntik posisi 90°, kemudian dorong pompa suntik hingga semua dosis insulin masuk kedalam tubuh, saatselesai tarik jarum suntik sebelum melepas cubitan
13.	Intra vena catheter		Sebagai vena tambahan (perpanjangan vena) untuk pengobatan IV /	Tenaga medis menentukan area pembuluh darah yang

			<p>Intra Vena jangka panjang atau lebih dari 48 jam.</p>	<p>akan dipasang IV. <i>Tourniquet</i> atau tali pembendung dipasang sekitar 3–4 inci dari atas area tusukan. Petugas medis membersihkan permukaan kulit di mana infus akan dipasang dengan menggunakan alkohol <i>swab</i>. Kateter IV dimasukkan ke pembuluh darah menggunakan jarum. Setelah masuk, jarum dilepaskan dan selang dilekatkan ke lengan pasien. Selanjutnya, tenaga medis akan menyesuaikan tetesan infus sesuai kebutuhan pasien.</p>
14.	Masker oksigen		<p>Untuk membantu menyalurkan gas pernafasan oksigen dari tabung oksigen ke paru-paru.</p>	<p>Pastikan sudah terpasang selang ke sumber oksigen. Lalu pastikan kantung reservoir mengembang dan pastikan terdapat katup satu arah berfungsi baik. Ubah aliran O<sub>2</sub> menjadi 10-</p>



				15 L/ menit dan letakka masker oksigen pada wajah pasien menutupi hidung dan mulut
15.	Masker nebulizer anak-anak		Masker yang digunakan pada alat nebulizer untuk mengubah cairan obat menjadi uap atau aerosol dengan partikel yang sangat kecil dan halus sehingga dapat dengan mudah dihirup oleh pasien atau pengguna melalui pernafasan menuju paru-paru. Untuk anak-anak	Masukkan obat ke cangkir nebulizer dan pastikan dosis yang diberikan sesuai anjuran atau resep dokter. Sambungkan corong mulut atau masker ke cangkir nebulizer. Pasang selang penyambung antara mesin kompresor dan cangkir nebulizer. Saat alat sudah siap, nyalakan mesin kompresor.
16.	Masker nebulizer dewasa		Masker yang digunakan pada alat nebulizer untuk mengubah cairan obat menjadi uap atau aerosol dengan partikel yang sangat kecil dan halus sehingga dapat dengan mudah dihirup oleh pasien atau pengguna melalui pernafasan	Masukkan obat ke cangkir nebulizer dan pastikan dosis yang diberikan sesuai anjuran atau resep dokter. Sambungkan corong mulut atau masker ke cangkir nebulizer. Pasang selang penyambung




			menuju paru-paru. Untuk dewasa	antara mesin kompresor dan cangkir nebulizer. Saat alat sudah siap, nyalakan mesin kompresor.
17.	Metal cathether		Untuk mengeluarkan urine / BAK / kencing yang terbuat dari metal / besi stainless steel .	Masukkan kateter ke dalam lubang uretra, ke atas dengan sudut kira- kira 30 derajat hingga urin mulai mengalir . Mengembang balon secara perlahan menggunakan air steril hingga volume yang disarankan pada kateter.
18.	Mucus extractor		Alat penghisap lendir pada hidung bayi yang baru lahir supaya lendir pada hidung tidak mengganggu pernafasan bayi	Memasukan selang yang tidak ada tonjolannya kedalam hidung atau mulut, kemudian ditarik sambil dihisap. Digunakan pula untuk hisap lendir bayi waktu baru lahir.
19.	Nasal gastric tube		Untuk memberikan makanan dalam bentuk cair, obat, dan cairan.	Dengan menyambungkan selang dengan spuit besar lalu menarik ujung spuit






<p>20.</p>	<p>Nebulizer set</p>	 <p>Jet Nebulizer Set Complete</p>	<p>Untuk membantu melancarkan pernapasan pada seseorang yang mengalami kesulitan bernapas, tidak terkecuali anak kecil.</p>	<p>Masukkan obat ke cangkir nebulizer dan pastikan dosis yang diberikan sesuai anjuran atau resep dokter. Sambungkan corong mulut atau masker ke cangkir nebulizer. Pasang selang penyambung antara mesin kompresor dan cangkir nebulizer. Saat alat sudah siap, nyalakan mesin kompresor.</p>
<p>21.</p>	<p>Needle</p>		<p>Untuk menembus kulit agar sampai ke pembuluh darah untuk memasukkan obat cair.</p>	<p>Buka bungkus jarum suntik, lalu pasang ke dalam spuit dan siap untuk digunakan.</p>
<p>22.</p>	<p>Nelaton cathether</p>		<p>Sebagai alat bantu pengosongan kandung kemih dalam proses kateterisasi.</p>	<p>Masukkan kateter ke dalam lubang uretra, ke atas dengan sudut kira-kira 30 derajat hingga urin mulai mengalir. Mengembang balon secara perlahan.</p>



				menggunakan air steril hingga volume yang disarankan pada kateter.
23.	Oxygen nasal canula		Untuk terapi oksigen pada pasien dengan kebutuhan oksigen rendah hingga sedang (saturasi oksigen 90-95%), menggunakan laju 1-4 L/menit tanpa sistem humidifikasi dan 1-10 L/menit dengan sistem humidifikasi.	Jika ukurannya tepat, garpu harus terpasang dengan nyaman di lubang hidung Anda. Angkat tabung dan pasang di atas atau di bawah telinga Anda. Pastikan selang yang menghubungkan saluran hidung ke sistem pengiriman oksigen terpasang pas di atas atau di bawah telinga Anda dan rekatkan pada tempatnya.
24.	Rectal tube		Untuk membantu meredakan demam, nyeri gigi, sakit kepala yang bekerja sangat cepat dgn cara pemakaian secara rectal	Pasang alas pantat. Memasang plastik diujung rectal tube dan ikat dengan karet olesi dengan pelumas. Buka anus dengan tangankiri, masukkan rectal tube perlahan. Fiksasi rektal tube dengan menyilang
25.	Spinal needle		Jarum yang secara umum digunakan	Masukkan spinal needle kedalam spuit

			<p>dengan alat suntik untuk menyuntikan obat kedalam tubuh, jarum ini juga dapat digunakan untuk mengambil sampel darah dari tubuh.</p>	<p>lalu masukkan obat dan suntikan kedalam tubuh</p>
26.	Stomach tube		<p>Untuk membilas atau mencuci perut dan biasanya digunakan untuk proses pengambilan getah lambung. Stomach tube juga bermanfaat untuk pemberian nutrisi pada pasien yang tidak dapat menelan dari mulut dan sebagai ventilator mekanis.</p>	<p>Masukkan selang kedalam tubuh pasien dengan melapisi pelumas terlebih dahulu</p>
27.	Suction cathether		<p>Alat pembersih jalan nafas pada saluran sistem pernafasan, dengan cara penyedotan untuk mengeluarkan cairan berlebih khususnya pada daerah oropharyngeal dan Nasopharyngeal. (daerah rongga mulut dan rongga hidung).</p>	<p>Hidupkan mesin suction. Sambungkan catheter dengan tube suction. Masukkan suction catheter kedalam tube trakea tutup lubang catheter dengan ibu jari gulung catheter diantara ibujari dan telunjuk agar bisa mengeluarkan lendir</p>


<p>28.</p>	<p>Suction connecting</p>		<p>Alat penghubung antara suction catheter atau yankauer sucker dengan mesin penyedot. Connecting tube dapat juga digunakan sebagai connector antara kedua tabung yang terdapat pada mesin suction.</p>	<p>Selang penghubung yang dihubungkan dengan suction catheter</p>
<p>29.</p>	<p>Tranfusion set</p>		<p>Mengalirkan mengalirkan darah atau produk darah dari kantong darah ke dalam pembuluh darah pasien</p>	<p>Usap bagian tubuh dengan lakohol swab. Cari intravena pasien lalu pasang transfusion set</p>
<p>30.</p>	<p>Tuberculin syringe</p>		<p>Untuk mengetahui apakah seseorang pernah terinfeksi mycobacterium tuberculosis atau tidak</p>	<p>Diberikan dengan jarum suntik baru yang kemudian dibuang. Sejumlah kecil tuberkulin disuntikkan ke dalam lapisan teratas dari kulit bagian dalam di lengan bawah sebelah kiri. Lepuh kecil timbul, tetapi biasanya hilang</p>

31.	Urine bag		<p>Kantong penampung air seni sekali pakai yang dapat digunakan dalam kondisi darurat saat tidak menemukan kamar kecil/toilet untuk pria, wanita dan anak-anak.</p>	<p>dalam waktu 30 menit pertama.</p> <p>Pasang catheter urin pada pasien kemudian hubungkan dengan urine bag. urine bag harus digantung pada tepi tempat tidur atau kursi roda tanpa menyentuh lantai. Jangan pernah menggantungkan urine bag pada posisi lebih tinggi dari abdomen. Jika klien berjalan, klien atau perawat membawa urine bag di bawah lutut klien. pengosongan urine bag dilakukan setiap 6-8 jam sekali.</p>
32.	Wing needle	 <p>ONEMED Wing Needle 25G x 3/4"</p>	<p>Untuk memudahkan obat yang dimasukkan melalui akses intravena atau pembuluh darah.</p>	<p>Tusuk bagian vena dengan posisi lubang jarum menghadap ke atas. Masukkan tabung ke dalam holder dan dorong sehingga jarum bagian posterior tertancap pada tabung, maka darah akan mengalir</p>






			masuk ke dalam tabung. Tunggu sampai darah berhenti mengalir.
--	--	--	---





**(4) ALAT-ALAT BEDAH**




No	Alat-alat bedah	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Arterie klem/artery forceps		Untuk menjepit pembuluh darah arteri. Fungsi : untuk menjepit jaringan selaput perut.	Tekan clamp pada bagian pangkal (sama halnya memegang gunting) untuk membuka clamp tersebut, masukkan ujungnya pada objek, kemudian tekan kembali bagian pangkalnya untuk menutup atau supaya terkunci, saat membuka atau menguci clamp anda harus sedikit menekannya dengan kuat
2.	Bandage scissors		Untuk menggunting perban/pemalut dan plester. Gunting perban memiliki ujung yang tumpul. Hal tersebut	Siapkan perban dan bandage rcissors lalu gunting perban sesuai kebutuhan






			<p>didesain untuk mencegah kecelakaan saat pemindahan perban dilakukan.</p>	
3.	Benang jahit catgut chromic	 <p><b>ONEMED</b> Surgical Sutures Chromic Catgut Sterile, Absorbable Suture, 75cm</p>	<p>Untuk menjahit usus, uterus, dan vesica urinaria. Benang ini diserap tubuh lebih lama dari type A yaitu 14 hari.</p>	<p>Kaitkan benang jahit ke jarum jahit. Siap digunakan</p>
4.	Benang jahit catgut plain		<p>Untuk menjahit jaringan lunak seperti sub cutan, otot, uterus, dan usus. Benang ini diserap tubuh 3-7 hari.</p>	<p>Kaitkan benang jahit ke jarum jahit. Siap digunakan</p>




TUGAS KHUSUS PKL D3 FARMASI UMG\_AZMI SABILA KISBATUL WAFI\_211105018\_APOTEK BERKAH

5.	Benang jahit silk		Untuk jahitan bagian luar termasuk yang tingkat kesembuhannya lebih lambat	Kaitkan benang jahit ke jarum jahit. Siap digunakan
6.	Bisturi		Untuk menyayat berbagai organ atau bagian tubuh manusia.	Pegang bistur lalu sayat pad abagian yang akan di insisi
7.	Forceps/pinset anatomis		Untuk menjepit jaringan dalam operasi digunakan untuk memegang jaringan, alat dan bahan medis. Dapat juga digunakan untuk memegang kasa dan kapas pada saat membersihkan luka.	Pegang penjepit dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk lalu gunakan untuk menjepit
8.	Forceps/pinset cilia		Untuk menjepit/ mencabut rambut. Suture clip applying forcep Fungsi: untuk menjepitkan klip pada	Pegang penjepit dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk lalu gunakan untuk menjepit




			luka sehingga luka tidak terbuka.	
9.	Forceps/pinset sirugis		Untuk membentuk pola jahitan, angkat jahitan/meremove jahitan, dan fungsi-fungsi lainnya.	Menggunakan ibu jari dan dua atau tiga anak jari lainnya dalam satu tangan. Tekanan pegas muncul saat jari-jari tersebut saling menekan ke arah yang berlawanan menghasilkan kemampuan menggenggam.
10.	Forceps/pinset splinter		Untuk penjepit jaringan saat proses operasi yang digunakan untuk memegang jaringan, alat dan bahan medis dan berfungsi untuk mengadaptasi tepi-tepi luka (mencegah overlapping).	Menggunakan ibu jari dan dua atau tiga anak jari lainnya dalam satu tangan. Tekanan pegas muncul saat jari-jari tersebut saling menekan ke arah yang berlawanan menghasilkan kemampuan menggenggam.
11.	Gunting bedah mayo		Digunakan dalam pemotongan fascia gerota, uterus, payudara, dan jaringan lainnya. Digunakan untuk prosedur pembedahan	Bilah gunting harus diputar 45 derajat dan ditutup untuk memotongjahitan. Perhatian harus diberikan untuk


			<p>hewan dan podriatik. Untuk memotong jaringan tubuh di dekat permukaan luka.</p>	<p>memastikan bahwa gunting tidak memotong apa pun kecuali jahitan dan jahitan tidak tersangkut di dalam bilahnya.</p>
12.	Gunting bedah metzenbaum	 <p>ONEMED Gunting Metzenbaum Bengkok</p>	<p>Untuk menggunting benang, menggunting jaringan dan menggunting balutan .</p>	<p>Gunakan seperti gunting pada umumnya. memotong jaringan halus dan pembedahan tumpul</p>
13.	Gunting bedah runcing		<p>Untuk melakukan diseksi secara cermat dan berdasarkan bilahnya juga dibedakan menjadi bilah lengkung dan bilah lurus.</p>	<p>Gunakan seperti gunting pada umumnya.</p>
14.	Gunting tali pusat	 <p>ONEMED Gunting Tali Pusat 16cm</p>	<p>Untuk memotong tali pusat bayi baru lahir. Gunting ini berbentuk gunting yang melengkung yang memudahkan para</p>	<p>Gunakan seperti gunting pada umumnya.</p>



			dokter atau bidan untuk memotong tali pusat bayi baru lahir.	
15.	Hecting set		Untuk menjahit atau merawat luka.	Gunakan sesuai dengan alatnya
16.	Jarum jahit		Untuk menjahit goresan, sayatan, atauluka supaya tidak infeksi	Kaitkan benang jahit dengan jarumjahit lalu lakukan penjahitan luka yang merupakan sebuah metode penutupan luka.
17.	Klem mosquito		Untuk meng-klem/ menjepit jaringan tubuh maupun pembuluh darah untuk menghentikan pendarahan dalam operasi serta fungsi-fungsi lainnya.	Tekan clamp pada bagian pangkal (sama halnya memegang gunting) untuk membuka clamp tersebut, masukkan ujungnya pada objek, kemudian tekan kembali bagian pangkalnya untuk menutup atau supaya




				terkunci, saat membuka atau mengunci clamp anda harus sedikit menekannya dengan kuat.
18.	Klem tali pusat/umbilical cord clem		Untuk menjepit tali pusat yang baru dipotong dari plasenta atau ari-ari agar tidak terjadi pendarahan di pusar pada bayi yang baru lahir.	Letakkan tali pusat di tengah-tengah klem lalu tekan klem maka otomatis klem akan terkait sendiri
19.	Needle hoolders		Untuk menjepit atau memegang jarum saat menjahit luka terbuka atau luka operasi dan sekaligus memudahkan untuk membuat simpul benang operasi.	Pegang gunting seperti biasa. Jepit di salah satu ujung benang lalu benang yang menjuntai dililitkan di needle holders dengan menggunakan pinset
20.	Peritoneum forceps		Untuk menjepit jaringan selaput perut	Tekan clamp pada bagian pangkal (sama halnya memegang gunting) untuk membuka clamp tersebut, masukkan ujungnya pada objek, kemudian tekan kembali bagian

				pangkalnya untuk menutup atau supaya terkunci, saat membuka atau mengunci clamp anda harus sedikit menekannya dengan kuat
21.	Skalpel		Berfungsi menginsisi kulit dan memotong jaringan secara tajam. Skalpel juga berguna untuk mengangkat jaringan/benda asing dari bagian dalam kulit.	Skalpel dipegang dengan jari kedua sampai jari keempat, gagang diletakkan sepanjang pangkal ibu jari dengan jari telunjuk terletak sepanjang atas belakang dari pisau dan ibu jari di sepanjang sisi skalpel. Pegangan ini paling baik untuk permulaan insisi dan potongan yang besar.

**(5) Disinfektan**

No	Disinfektan	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Alkohol 70%		Sebagai antiseptik (membunuh atau menghambat pertumbuhan)	Gunakan Alkohol 70% 300 ml secukupnya sesuai kebutuhan.

TUGAS KHUSUS PKL D3 FARMASI UMG\_AZMI SABILA KISBATUL WAFI\_211105018\_APOTEK BERKAH

			mikroorganisme), untuk membersihkan luka dan pembersih alat-alat medis.	
2.	Alkohol swab		Sebagai antiseptik pre injeksi, pemasangan IV, pengambilan darah, melepas jahitan, atau tindakan lainnya yang memerlukan antisepsi	Usapkan pada tempat yang akan diinjeksi, luka bekas injeksi/pengambilan darah, juga pada alat kesehatan.
3.	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> 3%		Untuk mencegah infeksi kulit dari luka gores, luka bakar, luka potong	Bersihkan luka dengan alkohol lalu obati luka dengan hidrogenperoksida dengan kapas
4.	Povidone iodine		Membersihkan sekaligus membunuh bakteri, jamur, dan virus yang menempel pada kulit, terutama saat luka.	Bersihkan daerah yang luka, oleskan sedikit larutan povidon iodine ke luka alu tutup luka dengan perban steril





5.	Rivanol		Cairan desinfektan yang di gunakan untuk membersihkan luka.	Tuang rivanol pada kapas, kemudian usapkan pada luka. Bisa digunakan untuk membasuh luka. Hentikan pemakaian jika muncul reaksi yang tidak diinginkan.
----	---------	--	---	--

(6) APD

No	APD	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Apron		Untuk melindungi tubuh supaya baju tidak terkena percikan cairan atau darah saat melakukan aktivitas kegiatan medis.	Sebelum memasuki aboratorium /tempat yang berbahan kimia, pakai apron terlebih dahulu untuk melindungi diri
2.	Masker		Untuk memblokir tetesan cairan, dan dapat menurunkan kemungkinan terkena virus dari orang lain	Pasang masker diwajah sebelum melakukan operasi/ hal yang membutuhkan masker
3.	Masker N95 disposable		Digunakan sebagai	Pasang masker




TUGAS KHUSUS PKL D3 FARMASI UMG\_AZMI SABILA KISBATUL WAFI\_211105018\_APOTEK BERKAH


		 <p>ONEMED MASKER N95</p>	<p>perlindungan pernafasan bagi pemakai dari partikel-partikel biologis seperti bakteri dan virus dari udara, sehingga dapat membantu mencegah penularan penyakit infeksi saluran pernafasan.</p>	<p>setelah sudah memakai masker bedah</p>
4.	Non woven/surgical cap	 <p>Surgeon Cap</p>	<p>Menutup dan melindungi rambut dan mencegah jatuhnya keringat. Cocok dipakai baik untuk dokter, perawat, dokter bedah, tim medis, juga pekerja pabrik serta individual.</p>	<p>Siapkan surgical cap, pasang di kepala sebelum melakukan tindakan</p>
5.	Sarung tangan	 <p>Latex Examination Gloves</p>	<p>Menjaga tangan dari penyebaran infeksi atau penyakit selama pelaksanaan pemeriksaan atau prosedur medis</p>	<p>Siapkan gloves, pasang di kedua tangan lingkungan</p>
6.	Shoe cover	 <p>Shoe Cover</p>	<p>Untuk melindungi bagian kaki dari paparan virus atau bakteri penyebab penyakit.</p>	<p>Pastikan telah memakai sepatu sandal yang bersih, pakaikan shoecover dengan benar</p>



7.	Kaca mata google		Pelindung terhadap percikan cairan tubuh/benda lain pada saat melakukan operasi, melindungi terhadap sinar UV	Sebelum melakukan tindakan operasi pasang kaca mata googledimata dengan posisi nyaman
----	------------------	--	---	---



**(7) ALKES UNTUK DIAGNOSA**

No	Alkes untuk diagnosa	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Anaroid spygmomanometer		Untuk mengukur tekanan fluida lain selain darah seperti pada air dan minyak.	Sandarkan lengan kiri pada permukaan datar setinggi jantung dan telapak tangan menghadap ke atas. Bungkus manset di sekitar lengan atas dengan tepi bawah satu inci di atas fossa antecubital (lubang siku). Tekan perlahan bel stetoskop pada arteri brakialis tepat di bawahtepi manset. Pastikan katup udara bohlam inflasi ditutup dengan

			<p>memutar searah jarum jam. Kembangkan manset dengan cepat hingga kira-kira 180 mmHg. Putar katup sedikit berlawanan arah jarum jam, sehingga laju deflasi adalah 2 hingga 3 mmHg per detik seperti yang ditunjukkan pada pengukur. Ambil setidaknya dua bacaan, dengan selang waktu 1 menit. Catat hasilnya.</p>
2.	Electrical sphygmomanometer		<p>Untuk digunakan dalam memantau sekaligus mengukur tekanan darah pada pasien maupun individu secara manual.</p> <p>Sandarkan lengan kiri pada permukaan datar setinggi jantung dan telapak tangan menghadap ke atas</p> <p>Bungkus manset di sekitar lengan atas dengan tepi bawah satu inci di atas fossa antecubital (lubang siku)</p>

3.	Mercurial sphygmomanometer		Untuk mengukur tekanan darah.	<p>Tekan tombol on</p> <p>Sandarkan lengan kiri pada permukaan datar setinggi jantung dan telapak tangan menghadap ke atas. Bungkus manset di sekitar lengan atas dengan tepi bawah satu inci di atas fossa antecubital (lubang siku). Tekan perlahan bel stetoskop pada arteri brakialis tepat di bawah tepi manset. Pastikan katup udara bohlam inflasi ditutup dengan memutar searah jarum jam. Kembangkan manset dengan cepat hingga kira-kira 180 mmHg. Putar katup sedikit berlawanan arah jarum jam, sehingga laju deflasi adalah 2 hingga 3 mmHg per detik seperti</p>
----	----------------------------	--	-------------------------------	--




				<p>jari dan jari telunjuk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>daun telinga di jepit dengan menggunakan jaritengah dan jari manis tangan kiri</li> <li>sebaliknya di lakukan apabila ingin memeriksa telinga kiri</li> </ol>
6.	Ear thermometer		<p>Untuk mengukur suhu tubuh pada bayi dengan usia lebih dari 6 bulan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pertama-tama, tarik bagian atas daun telinga ke arah atas dan agak ke belakang.</li> <li>Masukkan ujung termometer secara perlahan ke dalam saluran telinga menuju gendang telinga</li> <li>Setelah termometer berada di posisi yang tepat, hidupkan dan tunggu sampai ada</li> </ol>



				tanda bahwa pembacaan selesai.
7.	Gelang pasien		Sebagai tanda pengenalan setiap pasien. Setidaknya ada dua informasi yang termuat di dalam gelang tersebut seperti nama pasien, tanggal lahirnya dan nomor rekam medisnya.	Lingkarkan dipergelangan pasien lalu kaitkan paten sehingga tidak bisa dibuka oleh pasien
8.	Head lamp		Memberikan pencahayaan praktis yang penting bagi petugas medis. Dengan keunggulan dalam kenyamanan, efisiensi, dan keselamatan, headlamp merupakan alat yang sangat berharga bagi perawatan yang berkualitas.	Lampu dikaitkan pada ikat kepala dan dapat berputar kesegala arah pada porosnya
9.	Hemometer		Untuk menentukan kadar hemoglobin dalam darah berdasarkan satuan warna (colorimetric)	Pertama-tama dengan menggunakan desinfektan berupa kapas alkohol 70% ujung jari pasien dibersihkan untuk menghindari kontaminasi dari mikroorganisme. Setelah itu menusuk



				<p>salahsatu ujung jari dengan menggunakan lancet atau autoklik. Langkah selanjutnya adalah mengusap darah pertama yang keluar padaujung jari dengan menggunakan tisu. Kemudian tetes darah berikutnya dihisap dengan menggunakan pipet sahli sampai batas20 mikroliter. Selanjutnya darah dimasukkan kedalam tabung sahli yang sebelumnya telah diisi dengan HCL 0,1 N sampai tanda 2. Pada proses ini pipet dibilas dengan jalan menghisap dan mengeluarkan HCL dari dalam pipet sebanyaktiga kali. Kemudian menghomogenkan darahdengan HCL menggunakan tangkai pengaduk. Selanjutnya menambahkan tetes demitetes aquades</p>
--	--	--	--	---

				<p>kedalam tabung sahli sampai warna yang ditampilkan serupa dengan standar sahli. Langkah terakhir adalah membaca hemoglobin dengan membaca tinggi permukaan cairan pada tabung pengukur atau miniskus kemudian dibandingkan dengan standar pembanding.</p>
<p>10.</p>	<p>Ishihara's test for colour blindness</p>	 <p>Ishihara color test</p>	<p>Untuk mendiagnosis buta warna parsial</p>	<p>Pada setiap kartu terdapat gambar lingkaran yang terbentuk dari titik-titik dengan warna, tingkat kecerahan, dan ukuran yang berbeda. Titik-titik tersebut dapat membentuk pola angka, huruf, simbol, atau alur. Pada saat tes, pasien harus membaca huruf atau angka yang terdapat. dalam gambar tersebut dengan satu mata tertutup. Setelah selesai dengan satu sisi mata, dokter akan meminta pasien</p>

				<p>untuk menutup sisi mata lainnya dan melakukan tes yang sama seperti sebelumnya. Selain menemukan huruf atau angka pada gambar, dokter mungkin juga akan meminta pasien mendeskripsikan tingkat kecerahan warna yang dilihat</p>
11.	Laringeal mirror		<p>Digunakan dalam pemeriksaan faring untuk mengekstraksi benda asing, atau memperoleh biopsi dari struktur jalan nafas.</p>	<p>Sesuaikan sumber cahaya eksternal. Hangatkan cermin dengan air hangat (kira-kira suhu tubuh) untuk mencegah kabut (periksa untuk memastikan cermin tidak terlalu panas). Cara lainnya, lapisi cermin dengan larutan antikabut atau alkohol. Bungkus lidah pasien dengan kain kasa dan pegang dengan tangan nondominan Anda. Kain kasa akan mencegah lidah tergelincir dan melindunginya dari</p>




				<p>cedera pada gigi seri bawah. Tarik perlahan lidahnya. Anjurkan pasien untuk bernapas dalam-dalam melalui mulut, untuk membantu mencegah tersedak. Geser cermin ke dalam orofaring tanpa menyentuh lidah atau mukosa apapun. Tempatkan bagian belakang cermin pada uvula dan masukkan lebih jauh secara perlahan hingga laring terlihat jelas. Jika terjadi tersedak, lepaskan cermin dan semprotkan orofaring posterior dengan anestetik topikal. Gerakkan cermin dengan lembut dan sesedikit mungkin untuk memeriksa pangkal lidah, valékula, epiglotis, sinus piriformis, aritenoid, pita suara palsu dan sejati, dan jika mungkin laring di</p>
--	--	--	--	---






				bawah pita suara. Putar cermin dari sisi kesisi dengan ibu jari dan telunjuk agar struktur lateral terlihat. Periksa sepenuhnya pitasuara. Anjurkan pasien untuk mengatakan "eeee", yang akan mengontraksikan pita suara, dan menilai fungsinya.
12.	Nasal speculum		Untuk memeriksa area rongga hidung pasien.	Pegang speculum dengan tangan kiri lalu masukan ke lubang hidung dengan posisi vertical. Speculum tidak boleh menempel di septum hidung. Masukkan spekulum 1 cm ke dalam vestibulum, jangan lupa leher pasien ditengadahkan. Jari kiri telunjuk digunakan untuk fiksasi letakkan di ala nasi.
13.	Pen needle		Untuk mengendalikan kadar gula dalam darah pada penderita Diabetes Tipe 1 dan 2.	Cuci tangan terlebih dahulu dengan sabun dan air mengalir. Tarik pompa pendorong




				<p>pada alat suntik hingga menyentuh angka dosis yang telah ditentukan. Bersihkan bagian atas kemasan botol insulin menggunakan tisu bersih atau <i>alcohol swab</i>. Masukkan ujung jarum suntik ke dalam botol hingga menembus lapisan karet kemasan, kemudian dorong pompa secara perlahan agar tidak meninggalkan udara di dalam tabung suntik. Posisikan botol insulin berada di atas dan jarum suntik berada di bawah. Tarik pompa hingga tabung suntik terisi dengan insulin sesuai dosis yang dibutuhkan. Jika ada gelembung udara, ketuk tabung suntik agar</p>
--	--	--	--	--

				<p>gelembung udara naik ke atas, kemudian dorong pompa suntik untuk mengeluarkan gelembung. Cubit area kulit yang akan disuntik dan bersihkan menggunakan tisu alkohol. Masukkan jarum suntik dengan posisi 90°, kemudian dorong pompa suntik hingga semua dosis insulin masuk ke dalam tubuh. Saat sudah selesai, tarik jarum suntik terlebih dahulu sebelum melepas cubitan. Hindari menggosok lokasi suntikan meski muncul sedikit darah. Jika diperlukan, tekan secara perlahan dan tutup lokasi suntikan dengan kain kasa.</p>
--	--	--	--	---





14.	Percussion hammer		<p>Untuk mengetuk rongga dada dan rongga belakang (punggung) untuk mengetahui keadaan organ di dalamnya.</p>	<p>Ketukkan Percussion hammer di daerah rongga dada dan rongga belakang</p>
15.	Pulse meter		<p>Untuk mengukur kadar oksigen di dalam darah</p>	<p>Pastikan tangan kamu hangat, rileks, dan posisinya tidak lebih tinggi dari jantung. Kemudian, letakkan perangkat oksimeter di jari, daun telinga, atau kaki. Kemudian aktifkan perangkat untuk memantau denyut nadi dan saturasi oksigen. Tahan sejenak sampai angka saturasinya muncul.</p>
16.	Rectum speculum		<p>(untuk memeriksa dubur) Vaginal speculum (untuk memeriksa alat kelamin wanita) Sebuah spekulum dubur adalah perangkat yang dimasukkan ke anus untuk menjaga anus</p>	<p>Posisikan pasien miring atau mengunggging lalu masukkan rectum speculum untuk melihat keadaan dubur</p>



			terbuka untuk melihat diagnostik rektum atau untuk operasi dubur.	
17.	Reflex hamer		Untuk memeriksa reflex tendon, refleksi bagian terpenting dari sistem neurologic untuk mendeteksi adanya ketidak normalan pada sistem saraf pusat atau sitem saraf peripheral.	Ketukkan reflek hamer kebagian lutut atau siku
18.	Spirometer		Tes untuk menilai fungsi paru.	Perasat pertama menilai jumlahudara yang dapat dihirup dan dihembus paru. Melalui corong mulut, orang yang diperiksa diinstruksikan menghirup napas dalam semaksimal mungkin, lalu mengeluarkannya hingga habis. Perasat kedua menilaialiran udara paru.
19.	Stethoscope binaural		Untuk mendeteksi, mempelajari, dan mendengar suara yang timbul dari dalam tubuh seperti detak jantung, suaru paru-paru, bising	Letakkan earpieces ke telingalalu letakkan diaphragm ke bagian tubuh yang ingin diperiksa



			usus, tekanan darah, dan denyut nadi.	
20.	Stethoscope monoaural		Untuk mendengar bunyi organ tubuh misal jantung, paru	Ujung berbentuk corong ditempelkan pada pasien dan dokter menempelkan telinganya ke ujung yang lain .
21.	Stopwatch		Alat untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan dalam suatu kegiatan	Menekan tombol start pada alat, kemudian waktu pun akan berjalan.
22.	Termometer digital		Merupakan alat pengukur suhu tubuh. Termometer ini menyatakan suhu tubuh dengan angka pada layarnya sehingga penggunaannya praktis dan mudah.	Nyalakan termometer dengan menekan atau menggeser tombol ON. Masukkan termometer secara perlahan dan hati-hati ke dalam mulut, lipatan ketiak atau liang telinga anak. Biarkan selama 3 sampai 5 menit atau tunggu sampai ada bunyi yang menunjukkan pengukuran suhu sudah selesai dilakukan.

TUGAS KHUSUS PKL D3 FARMASI UMG\_AZMI SABILA KISBATUL WAFI\_211105018\_APOTEK BERKAH

23.	Termometer oral		<p>Alat pengukur suhu jenis oral dapat orang dewasa gunakan, tapi tidak direkomendasikan untuk anak kecil. Sebab, anak kecil mungkin tidak dapat menutup mulutnya cukup lama untuk mendapatkan pembacaan suhu tubuh yang baik</p>	<p>Meletakkan ujung termometer dibagian bawah lidah dan tutup mulut hingga alat mengeluarkan bunyi tertentu.</p>
24.	Termometer rektal		<p>Merupakan alat pengukur suhu tubuh digital, yang digunakan dengan memasukkannya ke dalam anus.</p>	<p>Bersihkan termometer raksa dengan sabun dan air mengalir, kemudian goyangkan termometer hingga air raksa berada di bawah tanda 35°C. Posisikan pasien berbaring terlentang dengan lutut ditekuk.</p>
25.	Timer lab	 <p>Timer Lab</p>	<p>Pengukur waktu manual yang digunakan untuk uji laboratorium</p>	<p>Putar tuasnya sesuai dengan waktu yang diinginkan</p>
26.	Tongue depressor		<p>Untuk memeriksa lidah pasien.</p>	<p>Menekan lidah pasien ke atas atau ke bawah sehingga keadaan di dalam tenggorokan bisa terlihat dengan jelas.</p>
27.	Tourniquet		<p>Alat untuk mengerutkan</p>	<p>Tourniquet dipasangkan</p>

			<p>dan menekan aliran darah. Saat digunakan tourniquet berfungsi untuk mengontrol aliran darah pada vena atau arteri dengan cara menekan dan melepas dalam rentang waktu tertentu.</p>	<p>n pada kulit lengan atau kaki. Posisinya di bagian atas, dekat ketiak atau selangkangan. Agar dapat bekerja efektif menghentikan aliran darah, tourniquet harus dipasangkan dengan kencang dan tidak boleh terlalu longgar. Kemudian, nyalakan mesin tourniquet hingga perdarahan berhenti.</p>
<p>28.</p>	<p>Vaginal speculum</p>		<p>Sebagai alat bantu pembuka vulva dengan tujuan untuk memudahkan pemeriksaan atau tindakan medis.</p>	<p>Posisikan pasien terlentang seperti mau melahirkan lalu pasang vaginal speculum dan tekan tuas untuk membuka sehingga terlihat bagian dalam vagina</p>

Gresik,

Dosen Pembimbing PKL,



Apt. Siti Nur Asiyah, M. Farm, Klin.

NIDN 0711088504

Gresik,

Pembimbing Lapangan

APOTEK BERKAH  
 JL. RAYA ... NO. 26 / 1A

Apt. Ersahda Nurma Praditapuspita, S.Farm., M.Farm.

SIPA. 19961113/SIPA\_35.25/2019/22275

#### D. SWAMEDIKASI

Buatlah studi kasus setiap harinya dengan katagori obat yang berbeda dan wajib menyelesaikan 20 jenis Obat yang tertera dalam tabel

No	Nama obat	Kategori	Studi Kasus	Patient assesment	Pemilihan Obat dan alasannya	Pelayanan informasi obat
1.	Analgetik dan antipiretik	paracetamol; ibuprofen	Pasien datang dengan keluhan panas	W : Pasien dewasa W : Panas H : 4 jam yang lalu A : dikompres air M : tidak ada	Obat yang terpilih Paracetamol Alasannya Paracetamol sangat direkomendasikan untuk menurunkan demam karena memiliki fungsi utama sebagai obat penurun demam.	Indikasi : Digunakan untuk meringankan rasa sakit pada sakit kepala, sakit gigi, dan menurunkan demam Cara penggunaan: 3-4 kali sehari setelah makan Kapan berhenti: apabila sudah tidak demam Kapan harus ke dokter : Jika suhu tubuh mencapai 39



						derajat atau lebih, sebaiknya langsung kedokter. Terutama jika suhu tak kunjung turun meski sudah minum paracetamol ESO yang sering : mual, sakit perut Cara menyimpan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
2.	Batuk	gliseril guaiakolat (guafenisin), bromheksin, diphenhidramin, asetilsistein, noskapin	Pasien datang dengan keluhan batuk berdahak	W : Pasien dewasa W : Batuk berdahak H : 1 hari yang lalu A : tidak ada M : tidak ada	Obat yang terpilih acetylcysteine Alasannya Acetylcysteine bekerja dengan cara mengurai protein pada dahak sehingga dahak menjadi lebih encer dan lebih mudah dikeluarkan saat batuk.	Indikasi : obat yang digunakan untuk mengencerkan dahak pada beberapa kondisi, seperti asma, emfisema, bronkitis, atau cystic fibrosis. Cara penggunaan: 3 x sehari Kapan berhenti: Jika sudah tidak mengalami batuk Kapan harus ke dokter : jika muncul reaksi alergi obat atau muncul efek samping yang lebih serius, seperti: Batuk berdarah atau muntah



						<p>berdarah. Nyeri dada atau sulit bernapas. Sakit perut bagian atas yang bertambah parah.</p> <p>ESO yang sering : Mual, muntah, takikardi, demam, pusing.</p> <p>Cara menyimpan : Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.</p>
3.	Obat Flu	<p>Sediaan kombinasi parasetamol, dekstrometorfan, gliseril guaiakolat (guafenisin), CTM, dan efedrin/pseudoefedrin/fenilpropanolamin</p>	<p>Pasien datang dengan keluhan batuk flu</p>	<p>W : Pasien dewasa W : batuk flu H : 1 hari yang lalu A : tidak ada M : tidak ada</p>	<p>Obat yang terpilih paratusin tablet</p> <p>Alasannya karena paratusin tablet untuk meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat dan bersin bersin</p>	<p>Indikasi : untuk meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat dan bersin disertai batuk.</p> <p>Cara penggunaan: 3 x sehari 1 tablet</p> <p>Kapan berhenti: jika sudah tidak mengalami gejala yang dirasakan</p> <p>Kapan harus ke dokter : jika gejala flu batuk tidak kunjung mereda</p> <p>ESO yang sering :</p>

					disertai batuk.	mengantuk, gangguan pencernaan Cara menyimpan : simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung
4.	Obat Maag	Antasida, antagonis H <sub>2</sub> (ranitidine, famotidine)	Pasien datang dengan keluhan asam lambung naik karena makan sering tidak teratur	W : pasien usia 17 tahun W : asam lambung naik H : 2 jam yang lalu A : tidak ada M : tidak ada	Obat yang terpilih Ranitidine Alasannya Ranitidin adalah obat untuk mengobati gejala akibat produksi asam lambung berlebih	Indikasi : obat yang digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kelebihan produksi asam lambung, seperti sakit maag dan tukak lambung. Cara penggunaan: 2 x sehari Kapan berhenti: maksimal terapi 2-4 minggu Kapan harus ke dokter : jika Anda mengalami reaksi alergi obat atau efek samping serius setelah mengonsumsi ranitidin.

						<p>ESO yang sering : sakit kepala, malaise (merasa lemas dan kurang fit), pusing, mengantuk, insomnia, vertigo, agitasi (resah dan gelisah), depresi, halusinasi, Cara menyimpan : disimpan pada suhu 15-30°C atau suhu ruang</p>
5.	Kecacangan	Pirantel pamoat, piperazin, mebendazol	Pasien datang membeli obat cacing untuk adiknya usia 8 tahun, kalau ada obat yang ada rasa rasanya, tidak bisa minum obat syr dan tablet	<p>W : pasien usia 8 tahun W : membeli obat cacing H : 1 hari yang lalu A : tidak ada M : tidak ada</p>	Obat yang terpilih vermoz tab kunyah Alasannya karena vermoz merupakan tablet kunyah yang ada rasa buah	<p>Indikasi :mengobati trikhuriasis, askariasis (infeksi cacing gelang), oxyuriasis (infeksi cacing kremi), ankilostomiasis/infeksi cacing tambang (A duodenale dan N americanus). Cara penggunaan: 1 x sehari 1 tablet diulang setiap 6 bulan sekali Kapan berhenti: dikonsumsi setiap 6 bulan sekali Kapan harus ke</p>

						<p>dokter : -</p> <p>ESO yang sering : gangguan saluran pencernaan</p> <p>Cara menyimpan : simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>
6.	Diare	Attal pugit, kaolin pectin, oralit, Norit	Pasien dewasa datang dengan keluhan diare seperti keracunan makanan, pagi tadi sudah 2x bab	<p>W : pasien dewasa</p> <p>W : diare keracunan makanan</p> <p>H : pagi tadi sudah 2x bab</p> <p>A : tidak ada</p> <p>M : tidak ada</p>	Obat yang terpilih norit dan oralit Alasannya karena Norit obat untuk menyerap racun dan mengurangi frekuensi buang air besar pada diare, baik yang diakibatkan oleh infeksi maupun keracunan. dan oralit untuk menggantikan cairan yang hilang	<p>Indikasi : norit untuk diare. Oralit untuk mengembalikan cairan tubuh</p> <p>Cara penggunaan: norit = 5-7 tablet per dosis. Maksimal 20 tablet per hari. Oralit = 3 jam pertama max 12 gelas, selanjutnya 2 gelas tiap diare 3-4 kali sehari.</p> <p>Kapan berhenti: apabila diare sudah berhenti</p> <p>Kapan harus ke dokter : jika mengalami efek samping atau muncul reaksi alergi obat setelah</p>

						<p>mengonsumsi Norit.</p> <p>ESO yang sering : Muntah, Diare dan akan menyebabkan tinja menjadi hitam.</p> <p>Cara menyimpan : Simpan ditempat sejuk dan kering di bawah suhu 30 derajat celcius, terlindung dari cahaya matahari</p>
7.	Laksatif	Bisakodil, laktulosa, Na lauril sulfat.	Pasien datang membeli obat susah bab untuk usia 3 tahun	<p>W : anak 3 tahun</p> <p>W : susah bab</p> <p>H : sudah 6 hari</p> <p>A : tidak ada</p> <p>M : tidak ada</p>	<p>Obat yang terpilih laktulosa</p> <p>Alasannya merupakan obat yang digunakan untuk melancarkan buang air besar atau konstipasi dengan cara mengalirkan cairan ke usus sehingga mencairkan feses yang akan dikeluarkan oleh tubuh.</p>	<p>Indikasi : obat untuk mengatasi sembelit atau sulit buang air besar.</p> <p>Cara penggunaan: Awal 5 ml 2x sehari, pemeliharaan 5-10 ml sehari.</p> <p>Kapan berhenti:- Kapan harus ke dokter : jika Anda mengalami diare yang parah atau berkelanjutan</p> <p>ESO yang sering : Mual atau muntah, Rasa tidak nyaman pada perut.</p>



						Cara menyimpan : dalam suhu ruangan atau lemari pendingin, yakni suhu 15–30°C
8.	Biang keringat, pruritus, antihistamintopikal	Salisil talk dan sediaan yang mengandung kalamini; difenhidramin 2%, prometazin HCl 2%.	Pasien datang dengan keluhan anaknya usia 1 tahun mengalami biang keringat sudah 2 hari	W : anak usia 1 tahun W : biang keringat H : 2 hari A : bedak bayi biasa yang dipakai sehari hari M : tidak ada	Obat yang terpilih yaitu yang memiliki kandungan kalamini, dipenhydramin 2% yaitu caladine cair Alasannya karena usianya masih 1 tahun, kalau caladine lotion waktu diolesi ada sensasi dingin	Indikasi : Mengobati gatal karena biang keringat Cara penggunaan: oleskan 2-4 kali sehari, setelah mandi Kapan berhenti: jika biang keringat sudah hilang Kapan harus ke dokter : jika bertambah parah atau terjadi efek samping alergi ESO yang sering : iritasi, alergi Cara menyimpan : Simpan ditempat yang kering, wadah tertutup rapat
9.	Jerawat	Obat yang mengandung sulfur; resorsinol; asam salisilat; benzoil peroksida; triclosan, minosiklin 1%.	Pasien usia 20 tahun datang membeli salep untuk jerawat, jerawat muncul sudah 3 hari dan lumayan berat	W : pasien usia 20 tahun W : jerawat H : sudah 3 hari A : tidak ada M : tidak ada	Obat yang terpilih benzoil peroksida yaitu salep benzolac Alasannya karena benzolac	Indikasi : Benzolac CL digunakan untuk kondisi jerawat yang lebih berat. Cara penggunaan: Oleskan tipis 1-2 x

					dapat menangani jerawat derajat berat	sehari Kapan berhenti:jika jerawat sudah kempes Kapan harus ke dokter : jika jerawat bertambah parah ESO yang sering : Dermatitis kontak alergi, kekeringan pada kulit, reaksi hipersensitif ( kemerahan, gatal, bengkak ) Cara menyimpan : Simpan pada suhu kulkas (2-8 derajat Celcius). Setelah produk dibuka, simpan pada suhu di bawah 25 C
10.	Kadas/kurap, antifungi	Obat yang mengandung klotrimazol 1%,mikonazol nitrat 2%, ketoconazole nitrat	Pasien dewasa datang mengeluhkan sudah beberapa hari disela - sela jari kaki dan tangannya gatal	W : pasien dewasa W : gatal disela-sela kaki jari kaki dan tangan H : beberapa hari A : tidak ada M : tidak ada	Obat yang terpilih miconazole nitrat 2% Alasannya karena miconazole dapat menghentikan jamur	Indikasi : Infeksi kuku dan kulit karena dermatofita, kandida atau jamur lain dan bakteri gram positif Cara penggunaan: Oleskan 2 xsehari Kapan berhenti: jika keluhan sudah hilang Kapan harus ke dokter : jika keluhan tidak kunjung mereda

						atau malah memburuk, atau jika timbul ruam kemerahan yang baru dan pembengkakan ESO yang sering : Sensasi rasa terbakar, maserasi, dermatitis alergik Cara menyimpan : Simpan pada suhu antara 15-30 derajat Celcius. Terhindar dari panas, kelembaban, dan cahaya
11.	Ketombe	<i>Shampoo</i> yang mengandung Selenium sulfid, Zincpyrithione.	Pasien remaja datang membeli shampo ketombe. Ketombe sudah beberapa hari	W : pasien remaja W : ketombe H : beberapa hari A : shampo yang ada dirumah M :tidak ada	Obat yang terpilih shampo yang mengandung Selenium sulfid yaitu selsun yellow Alasannya karena selsun yellow merupakan sampo anti ketombe yang ringan	Indikasi : mengatasi rambut berketombe Cara penggunaan: Gunakan selsun Yellow 2 kali seminggu, untuk keramas, dibiarkan 2-3 menit saat pemakaian untuk mendapatkan hasil yang maksimal Kapan berhenti:jika ketombe sudah hilang

						<p>Kapan harus ke dokter : apabila keluhan bertambah parah sampai terdapat luka-luka di kulit kepala</p> <p>ESO yang sering :                  Gatal dan kemerahan pada kulit kepala, ·                  Kekeringan kulit kepala dan rambut,                  Peningkatan rambut rontok</p> <p>Cara menyimpan :                  simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>
12.	Kutil	obat yang mengandung asam salisilat 2 g, asam laktat 0,5 g.	Pasien dewasa datang membeli obat kutil, sudah muncul dalam 2 hari	<p>W : pasien dewasa</p> <p>W : kutil</p> <p>H : 2 hari</p> <p>A : tidak ada</p> <p>M : tidak ada</p>	<p>Obat yang terpilih kutilos karena mengandung (asam salisilat 2 g, asam laktat 0,5 g)</p> <p>Alasannya karena dapat melunakkan kulit yang mengeras akibat</p>	<p>Indikasi : merupakan obat kutil dengan sediaan cairan obat luar</p> <p>Cara penggunaan: 2 x sehari</p> <p>Kapan berhenti: jika kutil sudah hilang</p> <p>Kapan harus ke dokter : Jika terjadi iritasi segera hentikan pemakaian dan</p>

					mata ikan, kutil.	konsultasikan dengan dokter ESO yang sering :- Cara menyimpan : Simpan pada suhu dibawah 30 derajat Celcius.
13.	Luka bakar	Obat yang mengandung perak sulfadiazin; oleum iecoris aselli (minyak ikan,"levertraan").	Pasien dewasa datang membeli salep untuk luka bakar kena kenalpot, baru saja	W : Pasien dewasa W : luka bakar H : baru saja A : tidak ada M :tidak ada	Obat yang terpilih salep dengan kandungan perak sulfadiazin yaitu burnazin Alasannya bisa digunakan untuk mengobati atau mencegah infeksi pada luka bakar yang rentan terhadap infeksi sekunder.	Indikasi : Obat antimikroba topikal yang diindikasikan untuk pencegahan dan pengobatan sepsis luka pada pasien tingkat luka bakar ke dua dan ke tiga Cara penggunaan: 2-3kali sehari, Dioleskan tipis pada kulit yang sakit. Kapan berhenti: jika luka sudah sembuh Kapan harus ke dokter : jika luka tidak kunjung sembuh dan semakin parah ESO yang sering : Iritasi dan gatal pada kulit Cara menyimpan : Simpan Burnazin pada suhu ruang, di tempat yang kering, dan



						terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan krim ini dari jangkauan anak-anak.
14.	Luka iris	Povidon iodine	Pasien wanita datang membeli obat karena tangannya barusan keiris pisau saat memotong sayuran	W : pasien wanita W : keiris pisau H : barusan A : tidak ada M : tidak ada	Obat yang terpilih betadine antiseptic sol dengan kandungan povidon iodine Alasannya karena produk antiseptik yang bermanfaat untuk mencegah pertumbuhan dan kuman penyebab infeksi	Indikasi : antiseptic luka Cara penggunaan: oleskan pada bagaian yang luka, sesuai kebutuhan Kapan berhenti: jika luka sudah sembuh Kapan harus ke dokter :jika terjadi infeksi ESO yang sering :- Cara menyimpan : Simpan di tempat sejuk (15-25derajat celcius) dan kering.
15.	Alergi	Klorfeniramin maleat, prometazine, diphenhidramine, dekslorfeniramin maleat, loratadine, cetirizine.	Pasien usia 13 tahun datang membeli obat gatal biduran, sudah 1 hari belum sembuh	W : pasien usia 13 tahun W : gatal biduran H : 1 hari A : tidak ada M : tidak ada	Obat yang terpilih incidal dengan kandungan cetirizine tab Alasannya cetirizine yang bekerja	Indikasi : mengobati alergi, biduran Cara penggunaan: 1x sehari Kapan berhenti: jika keluhan sudah sembuh Kapan harus ke

					<p>menghambat kerja dan produksi histamin. Dengan cara kerja tersebut, Incidal-OD dapat meredakan gejala biduran</p>	<p>dokter : Apabila gatal bertambah parah ESO yang sering : Gangguan jantung: Takikardia. Gangguan gastrointestinal: Sakit perut, mulut kering, mual, diare, muntah. Gangguan umum dan kondisi tempat pemberian: Kelelahan, asthenia, malaise, edema. Gangguan sistem saraf: Pusing, sakit kepala, kejang, agitasi. Cara menyimpan : simpan di tempat yang kering dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>
16.	Vitamin dan mineral	Vit C, Vit A, Vit B1, Vit B6, Vit B12, Vitamin D, Asam folat, Mn, Zn, Fe, dll	Pasien dewasa datang membeli vitamin untuk diri sendiri karena kerjaan lagi banyak dan sibuk	W : pasien dewasa W : vitamin H : vitamin untuk diri sendiri karena kerjaan lagi	Obat yang terpilih becom zet Alasannya karena termasuk obat	Indikasi : multivitamin bisa untuk daya tahan tubuh Cara penggunaan: 1x sehari setelah makan Kapan berhenti: tidak

				<p>banyak dan sibuk                  A : tidak ada                  M :tidak ada</p>	<p>multivitamin yang lengkap</p>	<p>apa-apa jika diminum setiap hari                  Kapan harus ke dokter : jika timbul efek samping yang tidak diinginkan                  ESO yang sering : jika dikonsumsi dalam jumlah tinggi bahan-bahan di dalam suplemen ini dapat menyebabkan urine menjadi lebih kuning, kantuk, mual, muntah, diare, sakit perut, atau sakit kepala.                  Cara menyimpan : simpan pada suhu di bawah 25 derajat Celsius, di tempat kering, dan juga sejuk.</p>
17.	Antiseptik dan disinfektan	Alkohol 70%, povidone iodine 10%, klorheksidin, setrimida 0,5%, serbuk PK.	Pasien dewasa membeli cairan untuk membersihkan gunting untuk menggunting kasa yang ada dirumahnya	<p>W : pasien dewasa                  W : cairan untuk membersihkan alkes                  H : -                  A : tidak ada                  M :tidak ada</p>	<p>Obat yang terpilih alcohol 70%                  Alasannya karena alcohol 70% bisa sebagai antiseptik (membunuh atau menghambat</p>	<p>Indikasi : cairan antiseptik untuk membersihkan luka, dan membersihkan alat-alat medis.                  Cara penggunaan: Dituang langsung atau dituang pada kassa steril lalu</p>

					<p>pertumbuhan mikroorganisme)</p> <p>diusapkan pada alat medis</p> <p>Kapan berhenti: jika sudah selesai menggunakannya</p> <p>Kapan harus ke dokter :-</p> <p>ESO yang sering :-</p> <p>Cara menyimpan : simpan di tempat yang kering dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>	
18.	<p>Antiinflamasi topikal</p>	<p>sediaan topikal yang mengandung flusinolon asetonida; hidrokortison asetat 1%; desoksimetason 2,5 mg.</p>	<p>Pasien dewasa datang menunjukkan tangannya dengan keluhan gatal kemerahan pada tangan, sudah 1 hari</p>	<p>W : pasien dewasa</p> <p>W : gatal kemerahan</p> <p>H : sudah 1 hari</p> <p>A : minyak tawon</p> <p>M :tidak ada</p>	<p>Obat yang terpilih desoximetason</p> <p>Alasannya karena bisa untuk kondisi peradangan kulit yang berat, seperti pada psoriasis, eksim, atau alergi.</p>	<p>Indikasi : Meredakan gejala peradangan dan gatal pada dermatitis yang responsif terhadap kortikosteroid.</p> <p>Cara penggunaan: 1-2 kali sehari pada area kulit yang terinfeksi. Oleskan tipis pada area yang membutuhkan.</p> <p>Kapan berhenti: jika keluhan sudah sembuh</p> <p>Kapan harus ke dokter : jika gejala</p>

						<p>yang dialami tidak membaik dalam 2 minggu setelah menggunakan obat ini, terjadi reaksi alergi obat, efek samping yang serius setelah menggunakan desoximetasone.</p> <p>ESO yang sering :                  Sensasi perih, terbakar, dan gatal pada kulit, kulit kering, iritasi, pertumbuhan rambut yang tidak diinginkan, pembengkakan.</p> <p>Cara menyimpan :                  Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.</p>
19.	Obat topikal penghilang rasa sakit	sediaan yang mengandung mentol, campor, metil salisilat, oleum mentae; kayu putih; lotion lidokain HCl 3%, natrium diklofenak 1% gel.	Pasien dewasa datang membeli obat nyeri karena terkilir untuk temannya habis futsal barusan dan minta yang spray	W : pasien dewasa W : nyeri karena terkilir habis futsal H : barusan A : tidak ada M :tidak ada	Obat yang terpilih yaitu salonpas jet spray yang mengandung methyl salisilat dan menthol Alasannya	<p>Indikasi : Meredakan sakit dan nyeri otot akibat : terkilir, keseleo, memar dan pegal-pegal.</p> <p>Cara penggunaan:                  Gunakan pada area yang sakit tidak lebih</p>




					salonpas jet spray yang memiliki bentuk sediaan spray dan bisa untuk mengurangi nyeri	dari 3-4 kali sehari. Kapan berhenti: jika sudah tidak merasakan nyeri Kapan harus ke dokter : jika Anda mengalami reaksi alergi ESO yang sering : dapat menyebabkan kulit kemerahan, iritasi, atau kulit terasa gatal. Cara menyimpan : Simpan pada suhu <30C, hindarkan dari sinar matahari langsung.
20	Terapi komplementer / obat tradisional	Jamu, OHT, Fitofarmaka	Pasien dewasa membeli obat suplemen makanan yang sekaligus bisa untuk daya tahan tubuh untuk anaknya yang mengandung madu dan ekstrak ikannya	W : anak dari pasien dewasa W : suplemen makanan yang sekaligus bisa untuk daya tahan tubuh H : - A : tidak ada M : tidak ada	Obat yang terpilih yaitu vitamin B12 karena vitamin B12 mengandung madu sekaligus ada ekstrak ikannya	Indikasi : suplemen makanan yang sekaligus bisa untuk daya tahan tubuh Cara penggunaan: Anak usia 1-3 tahun 2 sendok teh 2 kali sehari, usia 3-12 tahun 2 sendok makan 3 kali sehari Kapan berhenti: bisa dikonsumsi setiap hari Kapan harus ke

TUGAS KHUSUS PKL D3 FARMASI UMG\_AZMI SABILA KISBATUL WAFI\_211105018\_APOTEK BERKAH


						dokter : jika terjadi reaksi alergi setelah mengkonsumsi vitabumin ESO yang sering : - Cara menyimpan : Simpan di tempat kering dan sejuk, serta terhindar dari panas dan sinar matahari langsung
--	--	--	--	--	--	--

Gresik,  
Dosen Pembimbing PKL,

  
Apt. Siti Nur Asiyah., M. Farm, Klin.  
NIDN 0711088504

Gresik,  
Pembimbing Lapangan,  
  
Apt. Ersanda Nurma Praditapuspa,S.Farm.,M.Farm.  
SIPA. 19961113/SIPA\_35.25/2019/22275

APOTEK  
**BERKAH**  
JL. BAKIYAH NO. 26 / 1A  
KEC. MANYAR - KAB. GRESIK





**LEMBAR BIMBINGAN PKL**  
**DOSEN PEMBIMBING PKL (DPP)\***

TAHUN AKADEMIK : 2023/2024

Nama Mahasiswa : AZMI SABILA KISBATUL WAFI  
NIM : 211105018  
Nama instansi PKL : APOTEK BERKAH  
Nama Dosen Pembimbing PKL : Apt. Siti Nur A, M. Farm., klin., Spb

No.	Tanggal	Bimbingan dan Saran	Paraf Pembimbing
1.	11 Februari 2024	Logbook	f
2.	18 Februari 2024	Tugas khusus	f
3.	25 Februari 2024	logbook	f
4.	3 Maret 2024	Tugas khusus	f
5.	9 Maret 2024	logbook	f
6.	11 Maret 2024	Laporan	f

**\*)MINIMAL BIMBINGAN 6 KALI**





Lembar ke :

**LEMBAR BIMBINGAN PKL\***  
**PEMBIMBING PKL (PL)**

TAHUN AKADEMIK : 2023/2024

Nama Mahasiswa : AZMI SABILA KISBATUL WAFI  
NIM : 24105018  
Nama instansi PKL : APOTEK BERKAH  
Nama Pembimbing Lapangan : Apt. Ersanda Nurma Praditupipa, S. Farm., M. Farm

No.	Tanggal	Bimbingan dan Saran	Paraf Pembimbing
1	11 Februari 2024	logbook	
2	18 Februari 2024	Tugas khusus	
3	25 Februari 2024	log book	
4	3 Maret 2024	Tugas khusus	
5	9 Maret 2024	logbook & tugas khusus	
6	11 Maret 2024	Laporan PKL	
7	7 Juni 2024	cek semua kelengkapan tugas, laporan, logbook	

\*)MINIMAL BIMBINGAN 6 KALI