

**AGENDA HARIAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
DI APOTEK BANJAR BARU**



1x0

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 1 (satu)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Senin, 05 Februari 2024 (09.00 - 17.00)	<p>1.) Menyerahkan dokumen Pelaksanaan PKL kepada Pembimbing Lahan apotek Banjar Baru</p> <p>2.) mengenal profil apotek Banjar baru.</p> <p>- Bertanya dan bertukar tentang Struktur Organisasi dan tugasnya di apotek banjar baru dan Uji suli di Apotek banjar baru.</p>	<p>10 Mahasiswa menyerahkan berkas kelengkapan dari kampus kepada Pembimbing Lahan apotek Banjar Baru.</p> <p>10 Apotek banjar baru memiliki 15 karyawan dengan tugasnya yaitu :</p> <p>1. Apoteker : Indah Farida S. FARU., Apt</p> <p>2. TUK (Tenaga Ulahi Kefarmasian) : 1. Ibu Maya 2. bu susi 3. Mbak Linda 4. Mbak Fenny</p> <p>3. Penghuni Obat : Pak Hudi.</p> <p>10 Visi Menjadi apotek yang menerapkan pelayanan kefarmasian yang bermutu, berkualitas dan terpercaya serta mengutamakan bagi pasien dan karyawan.</p> <p>10 Misi a. Menjamin ketersediaan obat, alat kesehatan dan perlengkapan kefarmasian lainnya yang bermutu berkualitas. b. Melaksanakan pelayanan kefarmasian yang tepat, cepat, ramah, informatif dengan menerapkan konsep pharmaceutical care secara profesional.</p>

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke :

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			<p>c. Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan memberikan kemungkinan bagi keluarga.</p> 

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 1 (satu)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
2.	Selasa, 06 Februari 2024 (09.00 - 17.00)	<p>1.) Membantu TUK (Keraga Uobasi Kefarmasian) Menata obat sesuai tempat.</p> <p>2.) Membantu TUK Mengambil obat yang akan di racik.</p>	<p>→ menyusun obat dan merapikan obat-obatan yang berada di Apotek bangor baru.</p> <p>→ Untuk obat kortikoid dan Psikotropik berada di dalam lemari double yang ada di bagian dalam.</p> <p>→ Obat seperti insulin dan supsa disimpan di kulkas.</p> <p>→ Ujutan di letakkan di area yang tidak terpapar sinar matahari</p> <p>→ Obat lainnya di tata sesuai abjad dan golongan di Gaku Ruangan.</p>

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)


Minggu ke : 1 (satu)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
2.	Rabu, 07 Februari 2024 (09.00 - 17.00)	Mengetahui berbagai macam etiket di Apotek banjar baru.	<p>Mampu membedakan Mawani - Mawani etiket untuk Sediaan cair, Padat, Pendaftaran dalam maupun Pendaftaran luar.</p> <p>1. etiket sediaan padat (Tablet, kapsul, sediaan)</p> <p>2. etiket sediaan luar (Salep, Cream)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p style="text-align: center;">APOTEK "BANJAR BARU" Jl. Banjar Baru No. 2 GKB Gresik HP: 082244640064 Indah Faridah, S.Farm., Apt 19870327/SIPA_35.25/2021/2208</p> <p>No. Resep: _____ Tgl. _____</p> <p>..... x sehari tablet/kapsul/bungkus sebelum / sesudah makan</p> <p style="text-align: center;">KOCOK DAHULU</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%; background-color: #e0f2f7;"> <p style="text-align: center;">APOTEK "BANJAR BARU" Jl. Banjar Baru No. 2 GKB Gresik Telp. (031) 3957233 Indah Faridah, S.Farm., Apt 19870327/SIPA 35.25/2016/2717</p> <p>No. Resep: _____ Tgl. _____</p> <p style="text-align: center;">OBAT LUAR</p> </div> </div> <p>..... x sehari (syring) .</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p style="text-align: center;">APOTEK "BANJAR BARU" Jl. Banjar Baru No. 2 GKB Gresik Telp. (031) 3957233 Indah Faridah, S.Farm., Apt 19870327/SIPA 35.25/2016/2717</p> <p>No. Resep: _____ Tgl. _____</p> <p>..... x sehari sendok makan/tel. sebelum / sesudah makan KOCOK DAHULU</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p style="text-align: center;">APOTEK BANJAR BARU Jl. Banjar Baru No. 02 GKB - Gresik HP : 082244640064</p> <p>Nama Pasien : _____</p> <p>Nama Karyawan : _____</p> <p>Lokasi Pengiriman : _____</p> </div> </div>

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 1 (satu)


No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
4.	Kamis, 08 Februari 2024	Libur	Libur
5.	Jumat, 09 Februari 2024		
6.	Sabtu, 10 Februari 2024		



AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 2 (dua)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
7. ↓ 14	Senin, 12 Februari 2024 Sabtu Rabu, 21 Februari 2024	Ambil curi	Ambil curi



AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 3 (tiga)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
15.	Kamis, 22 Februari 2024 (09.00 - 17.00)	<p>1. Membantu membuat Sediaan puyer dari resep yang didapat.</p> <p>2. Membantu membuat Sediaan caput dari resep yang didapat.</p>	<p>► Membuat puyer di apothek banjar baru sudah tidak menggunakan teknik seperti dilipat melainkan di press.</p> <p>► Membuat caput di apothek banjar baru sekarang lebih mudah dengan teknik menggunakan kertas lalu dijepit agar lebih apat.</p>

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 3 (tiga)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuai pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
16.	Juni'24, 23 Februari 2024 (09.00 - 17.00).	1) Mengetahui Proses Perencanaan di Apotek banjar baru 2) Metode Perhitungan apotik banjar baru. 3) Membantu Meracik Obat Sejenis Capsul dan Puyer	▶ Pada Proses Perencanaan Obat yang akan habis dicatat di buku defecta terlebih dahulu baru dipesan. • Buku defecta yaitu buku pencatatan Obat yang harus dipesan untuk memenuhi kebutuhan dan ketersediaan Obat yang ada di apotik. ▶ Metode Perhitungan di apotik banjar baru konsisten sesuai dengan kebutuhan agar tidak terjadi Obat yang kadaluarsa di apotik.

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 3 (loga)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
17.	Sabtu, 24 Februari 2024 (09.00 - 17.00)	1) Mengetahui macam SP di apotek barang baru.	<p>→ SP ada 5 macam yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pesanan reguler digunakan untuk memesan sediaan yang tidak termasuk OOT dan regulator prekursor. Komponen yang ada pada SP reguler yaitu nama dan jumlah barang yang akan dipesan. 2. Surat pesanan OOT (obat-obatan tertentu). Untuk pemesanan obat-obatan tertentu. Komponen yang ada pada SP OOT adalah Nama obat, zat aktif, bentuk dan kekuatan sediaan satuan, jumlah dan keterangan. 3. SP prekursor untuk memesan sediaan yang mengandung prekursor seperti ephedrine, pseudoephedrine, norephedrine dll. Komponen yang ada dalam SP adalah Nama obat, zat aktif farmasi, bentuk dan kekuatan sediaan satuan, jumlah dan keterangan.

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 3 (tiga)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			<p>4. Sp Psikotropika Untuk memesan obat Psikotropika, komponen yang ada dalam Sp adalah nama distributor, Alamat distributor, Jenis Psikotropika yang ingin dipesan.</p> <p>5. Sp Narkotika Untuk memesan obat yang mengandung Narkotika. Komponen yang ada dalam Sp adalah Nama, Jabatan Apoteker, Alamat Apoteker yang memesan. Nama, Alamat dan nomor telepon distributor dan keperluan obat narkotika.</p>

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke: 4 (meat)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
18	Senin, 26 Februari 2024 (0900 - 1700)	1. Mengamati dan Memahami Faktur Perubatan Obat.	<p>→ Mampu mengetahui isi yang berada di dalam Faktur yaitu. Nama Pbf, alamat Pbf, nama apotik pemesan, alamat apotik pemesan, harga dan tanda tangan penerima, dan mengetahui apa yang perlu dicocokkan antara Rp dan Faktur, komponen di dalam Faktur antara lain, nama obat, jumlah barang yang datang, No-barita, tanggal exp dan Muthi Fiskal obat.</p> <p>→ ada 2 Macam Faktur yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Faktur yang sudah ada PPN 2. Faktur yang belum ada PPN.

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 4 (akhir)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
19	Selasa, 27 Februari 2024 (09.00 - 13.00)	1. Mengetahui dan mampu menghitung laba penjualan di apotek bangor baru.	<p>→ Perhitungan Harga jual satuan diturangi (-)</p> $HNA + PPN + \text{Laba} + \frac{Nb \rightarrow \text{Diskon}}$ <p>• Laba</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obat keras : 20 % 2. Obat bebas Terbatas : 15 % - 17 % 3. Obat bebas : 12 % - 15 % 4. Obat keras bagian war : 17 %

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 4 (lanjut)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
20	Rabu, 28 Februari 2024 (09.00 - 17.00)	<p>1. Melakukan pemesanan Obat dapat melalui Carex atau APK.</p> <p>2. Membantu kerabat Puger dan Carbul.</p>	<p>→ APK yang digunakan Arben buyer baru untuk memesan Obat antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) ERNOS MARKETPLACE 2.) IROS AAM 3.) APL eZR x 4.) PPGOS

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)


Minggu ke : 4 (empat)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
21.	Kamis, 29 Februari 2024 (09.00 - 13.00)	<p>1) Membantu TUK melakukan pencatatan Penguatan di buku obat</p> <p>2. Membantu meracik Buyer dan kapsul.</p>	<p>→ Mengetahui apa yang harus ditulis di buku penguatan obat. yang pertama yaitu ditulis di buku yaitu tanggal, bulan, tahun, Nama Obat yang terjual dan harga Obat satuan dan jumlah. Setelah itu baru dicatat / dimasukkan ke dalam komputer untuk di cetak lebih lanjut sesuai dengan tanggal dan bulan.</p>

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 4 (empat)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
22.	Juni'at, 01 Maret 2024 (09.00 - 17.00)	Mengetahui form Stok Obat yang ada di aptek banjar baru.	<p>▶ Stok Obat Merupakan kartu yang digunakan untuk mencatat keluar masuknya obat meliputi penerimaan, pengeluaran atau kadaluarsa setiap obat. Untuk 1 obat hanya menggunakan 1 lembar kartu stok.</p>



AGENDA HARIAN (LOG BOOK)


Minggu ke : 4 (empat)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
22.	Sabtu, 02 Maret 2024 (09.00 - 12.00)	1. Menanyakan tentang Perusnahan obat sesuai kriteria Sediaan Farmasi.	<p>► Mengetahui Cara Merusnakan Obat Sediaan Farmasi yang sudah kadaluarsa atau tidak layak pakai</p> <p>► di Apotek barang baru perusnahan obat sediaan Farmasi antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) Padat (Pil, Tablet, Kapsul) yaitu digerus terlebih dahulu kemudian dibuang ke saluran pembuangan. 2.) Cair (Sirup) yaitu dibuang ke saluran pembuangan.

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 5 (ma)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
29.	Senin, 04 Maret 2024 (09.00 - 17.00)	1.) Mengetahui cara Penusnahan Resep 2.) Mengetahui cara Penusnahan Faktur	▶ Pada Apotik banjar baru penusnahan resep dilakukan selama 5-7 tahun sekali dengan cara diomong kecil-kecil lelu dibayar. ▶ Pada Apotik banjar baru penusnahan faktur dilakukan dengan cara dibuang seperti biasa dan dilakukan 5-7 tahun sekali.



AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke: 5 (usia)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
25.	Selasa, 05 Maret 2024 (09.00-17.00)	1) Merocek resep Kapsul dan Puyer sesuai dengan resep 2) Penealatan dan Reaperan, Pengiriman Faktur dan resep, narkoba Psikotropika dan prekursor di arsipet bangor baru.	→ Pengiriman Rp, Faktur, resep narkoba, Psikotropika dan Prekursor di bangor untuk cetak tahun.

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)


Minggu ke : 5 (Lima)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuai pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
26.	Rabu, 06 Maret 2024 (09.00-17.00) Sampai Jumat, 08 Maret 2024	1) Membantu TUK menyusun stok obat di gudang. 2) Membantu membuat Merata obat yang baru datang. 3) Membantu mengantar Obat ke rumah Rasien.	▶ Merata obat golongan generik. ▶ Merata stok obat di gudang Penyisipan. ▶ Merata obat bedaan tetes mata, salep, tetes telinga dan sirup.

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 5 (lima)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuai pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
27.	Kamis 07 Maret 2024 (09.00 - 17.00)	1) Membantu membuat kapsul dan Puyer 2) Menanyakan tentang Penyimpanan obat-obatan tertentu.	▶ Obat-obatan tertentu disimpan di lemari suhu ruang. berada di sebelah Utasirin.



AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 5 (lima)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
28	9/3 2024 Sabtu.	→ Melatukan pengamatan dalam komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dengan pasien AROKE Banjar baru	← Cara komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) <ol style="list-style-type: none"> 1. Menangani pasien 2. Menastikan nama, usia, alamat pasien yang sudah ada di resep. 3. Menanyakan apakah ada riwayat alergi obat. 4. Menjelaskan obat dan dosis yang diberikan. 5. Menjelaskan Indikasi obat. 6. Memberi jadwal penggunaan obat. 7. Memberitahu cara penggunaan obat. 8. Memberitahu efek samping obat. 9. Memberitahu cara penyimpanan obat. 10. Menjelaskan kepada pasien lama penggunaan obat.

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke :

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
		<p>→ Dapat melakukan KIE di apotek Banjar baru.</p>	<p>UNIVERSITAS HAMMA GRESIK</p> <p>Alamat Praktek : Apotek Banjar Baru Jl. Banjar Baru No 02 GKB, Gresik 082244640064</p> <p>Jadwal Praktek : Senin - Jum'at 16.00 - 18.00 WIB</p> <p>Gresik, 14/3/2021</p> <p>R. Suciyo diap 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3</p>
			<p>Pro : Bu Badriyah Umur : Alamat : Ciri Ah Semoga Lulus Sembuh</p>

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 6

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
29	13 / 2024 / 3 Rabu	Pelayanan swamedikasi	<p>A : Ibu kabiriyah .</p> <p>P : Iya mbak</p> <p>A : Ini obat untuk Obatnya, ini untuk nyeri diminum 3x sehari Setelah makan , lalu yang ke dua untuk bergak nyai diminum 2x sehari setelah makan , dan yang terakhir ini buat lambung obat diminum 2x sehari sebelum makan .</p> <p>P : Iya mbak , totalnya berapa ya mbak ?</p> <p>A : total semuanya 75 ribu rupiah obat .</p> <p>P : ini ya mbak</p> <p>A : baik Ibu ini kembalinya 25 ribu rupiah . semoga lekas sembuh Ibu .</p>

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)



Minggu ke : 6

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
30	14/3 2024 Kanis .	Menganalisa resep di apotik bangor baru .	<ol style="list-style-type: none"> 1. nama , alamat dan nomor izin praktik dokter 2. tanggal penulisan resep 3. tanda R/ 4. nama obat dan jumlahnya 5. Cara pembuatannya . 6. aturan pemakaian obat . 7. nama pasien

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke :

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
		<p>Dapat menganalisis resep.</p>	<p>4/02 Feb '24</p> <p>APOTEK "BANJAR BARU" Jl. Banjar Baru No. 2 Gresik Kota Baru HP. 0822 4464 0064 Gresik IPA : Indah Faridah, S.Farm., Apt SIPA : 19870327/SIPA. 35.25/2016/2717 SLA : 442 / 217 / 437.52 / 2015</p> <p>TURUNAN RESEP</p> <p>Dari Dokter : Frans O. H Sp. 06 Tertulis tanggal : 23 / 12 / 23 Dibuat tanggal : 02 / 01 / 24 No.R/ : 02 Untuk : Ny. Nia Tri E. Umur : ③ K / 22 / No. I ⑦ Her 2x Siddi ⑤+6 det orig</p> <p>1. Inscriptio - Nama Dokter : Ada - No. SIK : Ada - Alamat praktek : Ada - Tempat penulisan : Ada - tanggal penulisan : Ada - tanda p/ : Ada</p> <p>2. Prescriptio - Nama obat : Ada - jumlah obat : Ada - bentuk sediaan : Ada - kekuatan sediaan : Ada</p> <p>3. Signatura - Nama pasien : Ada - umur pasien : tidak ada - ss pasien : tidak ada - aturan pakai : Ada - Her / perintah lain : Ada</p> <p>4. Subscriptio - Paraf / ttd dokter : tidak ada → resep yang diminta dokter adalah 1</p>



AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke :

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuai pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
		1. Dapat menganalisis Resep	<div style="text-align: center;">  <p>INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT SEMEN GRESIK</p> <p>Jln. R.A. Kartini No. 280 Gresik Telp. (031) 3937841 psw 60016129</p> <p>012/3170/2013</p> <p>Apoteker : Suhartoyo, S.Si,Apt No. SIPA : 19690321/SIPA_35.25/2021/17748</p> <hr/> <p>COPY RESEP</p> <p>Resep Dokter : <u>Wahyu Eko</u> Tgl. <u>19/2/2024</u></p> <p>Dibuat tgl : <u>19/2/2024</u> No. <u>1902412</u></p> <p>Untuk : <u>Suharti</u></p> <p><u>Ri Artrioda</u> No. <u>KX</u></p> <p><u>Szadi Lulut</u></p> <p><u>mek</u></p> <p>180573</p> <p>Gresik, 19/2/2024</p> </div> <p>Kulengkapan resep :</p> <ol style="list-style-type: none"> Inscriptio <ul style="list-style-type: none"> - Nama Dokter : Ada - No. SIPA : Ada - Alamat praktik : Ada - Tempat praktik : Ada - Tanggal praktik : Ada - Tanda P/ : Ada Prescriptio <ul style="list-style-type: none"> - Nama obat : Ada - Jumlah obat : Ada - Bentuk kendora : Ada - Ketentuan sesiaan : Ada Signature <ul style="list-style-type: none"> - Nama pasien : Ada - umur pasien : tidak ada - BB pasien : tidak ada - Alamat pasien : tidak ada - Ikr / Perintah lain : tidak ada Subscriptio <ul style="list-style-type: none"> - Paraf / tanda dokter : tidak ada <p>⇒ resep yang diminta adalah adalah = 20 → X</p>

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke :

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
	14/2024 /3		<p>* Artrodar digunakan untuk mengatasi osteoarthritis (perataan kranis pada sendi akibat kerusakan pada tulang lawan).</p> <ul style="list-style-type: none"> → kandungan : Diclofenac 50 mg yang berfungsi untuk menghilangkan gejala pada pengobatan jangka panjang osteoarthritis. → golongan obat keras dan harus menggunakan resep dokter. → bentuk kapsul. <p>* Yae tablet adalah obat untuk mencegah kehamilan yang terdiri dari 2 hormon, Estrogen dan Progesterin.</p> <ul style="list-style-type: none"> → kandungan : Drospirenone 2 mg + Ethinylestradiol 0,02 mg. yang berfungsi untuk mencegah ovulasi serta terjadinya pembuahan. → golongan obat keras dan harus menggunakan resep dokter → bentuk sediaan : tablet.

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 6

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
30	15/3 2024 Jumat	Darat menghitung laba penguatan di apotek banjar baru.	<p>1. Sarnobol botol HNA 55.000 100 tablet. 2. Asam mefenamat HNA 42.000 100 tablet. 3. Arilis Syrup HNA 45.000 4. Cefadroxil tablet 98.000 100 tablet.</p> <p>Hitunglah harga jual per tablet / botol jika diberikan per 11% dan laba yang diberikan 20%.</p> <p>1. 73.260 → 723 → 800 / tab 2. 47.552 → 475 → 500 / tab 3. 59.940 → 60.000 4. 130.532 → 130.000 → 1.400</p> <p>1) p/ Sarnobol 250 mg³ Asam mefenamat 50 mg² Nfla Pulv No. 20 S.2 ddi (Paras)</p> <p>2) Cefadroxil 300 mg⁶ Nfla Pulv No. 10 S.2 ddi (Antibiotik)</p> <p>3) Arilis Syrup 50 ml S.1 ddi ctn (Vitamin)</p> <p>2) Hitung berapa yang harus dibayar pasien dengan biaya 500 perbungkusnya dan 100 untuk obat jadi.</p> <p>1. 6.400 + 1000 + 5.000 = 17.400 2. 8.400 + 8.000 = 13.400 3. 60.000 + 1.000 = 61.000 total pembelian resep atas nama An. Bara yaitu sebesar 79.700.</p>

An. Bara

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke :

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
32	16/3/2024 Sabtu	Dapat melakukan Swamedikasi di Apotek bangor baru.	<p>A - Selain obat apa ada yang bisa gaya bantu ?</p> <p>P = Iya mbak, saya lagi mencari vitamin untuk anak saya. kira-kira vitamin apa yang cocok untuk anak saya ya mbak ?</p> <p>A = Untuk vitamin buat anak disini kami menyediakan 3 vitamin buat anak mbak, yang pertama ada salkatonik abc tabs, Fitkom Hi-C dan cerebrofort marine gummy.</p> <p>P = menurut mbak yang rekomen dari ketiga vitamin tadi yang mana mbak ya ?</p> <p>A = kalo dari saya rekomendasikan yang cerebrofort marine gummy obat soalnya bisa dikunyah-kunyah karena kenyal, sedangkan untuk kedua vitamin yang lain berbentuk tablet.</p> <p>P = Untuk harganya masing-masing berapa ya mbak ?</p> <p>A = Untuk salkatonik abc harganya 18.000, untuk yang fitkom hi-c harganya 17.000 sedangkan yang cerebrofort marine gummy harganya 20.000 mbak.</p>


AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke :

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			<p>P = baik mbak saya mau yang warine guany nya 1, untuk rasanya ada apa aja mbak ?</p> <p>A = Untuk varian rasa ada 2 mbak yaitu rasa strawberry dan campuran aneka buah mbak.</p> <p>P = saya beli yang campuran kenyah buah itu aja mbak ya. berapa harganya tadi mbak ?</p> <p>A = baik mbak, untuk harganya 20.000</p> <p>P = ini ya mbak wangnya.</p> <p>A = baik mbak saya terima wangnya pas 20.000 ya mbak terimakasih.</p> <p>P = iya mbak sama - sama. nah mbak</p> <p>A = iya mbak.</p>



AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke :

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
33	18 / 3 / 2024 Senin	Dapat mengetahui SPO (Standar Prosedur Operasional) yang berada di apotek barajar baru.	 <p>1) SPO Perencanaan Sediaan Farmasi dan alat kesehatan</p> <p>2) SPO Pengadaan Sediaan Farmasi dan alat kesehatan</p>



AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke :

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>3) SPO pengadaan obat Narkotika</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>4) SPO Pengadaan obat Psikotropik</p> </div> </div>



AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke :

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>⇒ SOP penyimpanan obat narkotik dan psikotropik</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>⇒ SOP penyimpanan obat prekursor</p> </div> </div>



AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke :

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>→ SPO Penyusunan Obat</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>→ SPO Penerimaan Obat</p> </div> </div>



AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke :

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
		 <p>⇒ SPO Pemeriksaan tanggal kadaluarsa</p>	 <p>⇒ SPO Pelayanan sediaan farmasi alat kesehatan tanpa resep (swamedikasi)</p>


AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke :

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>⇒ SPO Pelayanan Layanan Farmasi dan alat kesehatan dengan resep</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>⇒ SPO Pelayanan Layanan Farmasi dan alat kesehatan dengan resep.</p> </div> </div>


AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke :

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			 <p>* SPO Pelayanan Obat Narkotik dan Psikotropik .</p>

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke :

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			 <p>→ SPO Pengelolaan Chat ED</p>

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)


Minggu ke :

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
		<p>Dapat Mengetahui Cara Pencatatan Penggunaan narkotika dan Psikotropika elektronik di Apotik banjar baru.</p>	<div style="text-align: center;"> </div> <p>⇒ Pencatatan Penggunaan narkotika dan Psikotropika yang ada di Apotik banjar baru.</p>

- * Komponen yang berada di pencatatan penggunaan narkotika dan Psikotropika adalah :
- 1) Nama Obat
 - 2) Bulan
 - 3) Tahun
 - 4) Nama pasien
 - 5) Alamat pasien
 - 6) tanggal resep
 - 7) No resep
 - 8) Dokter penulrs resep
 - 9) Awal
 - 10) Keluar
 - 11) Gisa .

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)


Minggu ke :

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
39.	19/3/2024 Selasa	<p>↳ Mengetahui PMR (Patient Medication Record) di apotek banjar baru.</p>	 <p>↳ Nama, tgl lahir, alamat lengkap. ↳ Jenis kelamin, pekerjaan, no tele / hp</p> <p>↳ Riwayat Pemeriksaan Laboratorium</p> <p>↳ Riwayat alergi.</p> <p>↳ Berikut Contoh PMR yang berada di apotek banjar baru gresik yaitu Catatan penggunaan obat dan pelayanan ke farmasian yang diberikan apoteker.</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuai pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)

Gresik,

Dosen Pembimbing,



Siti Nur Asiyah, M.Farm., Klin., Apt
NIDN. 0711088504


Gresik,

Pembimbing Lapangan (Apotek Banjar Baru)



Indah Faridah, S.Farm., APT
SIPA. 19870327/SIPA_35.25/2021/2208

A. TUGAS KHUSUS RESEP

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
1.		<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="958 325 2110 791"> <tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Surat ijin :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosogan 30mg 10 Tab 2. Disfatyl 10 Tab 	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Ada	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							

C. Perhitungan biaya resep

1. Prosogan 30mg = 24.290 x 10 = 242.900

2. Disfatyl = 747 x 10 = 7.470

D. ETIKET

Prosogan 30mg /Putih:

APOTEK BANJAR BARU GRESIK	
Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK HP. 082244640064	
Indah Faridah, S.Farm, Apt 19870327/SIPA 35.25/2021/2208	
No.Resep :923	Tgl. 29/02/24
Ny. Unlamah	
1 x sehari sebelum makan	

Disfatyl/ Putih:

APOTEK BANJAR BARU GRESIK	
Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK HP. 082244640064	
Indah Faridah, S.Farm, Apt 19870327/SIPA 35.25/2021/2208	
No.Resep :923	Tgl. 29/02/24
Ny. Unlamah	
1 x sehari sebelum makan	

E. *Product knowledge*

Nama Obat : Prosogan 30mg

Kandungan : Lansoprazole

Dosis lazim : 1x sehari 1 kapsul selama 4 minggu,
tukak lambung tidak berbahaya : 1x sehari 1 kapsul

Nama Obat : Disfatyl


Kandungan : Dimetilpolisiloksan

Dosis lazim : Dewasa : 1-2 tablet dikunyah
sesudah makan dan sebelum tidur. Persiapan

		<p>selama 8 minggu, refluks esofagitis : 1x sehari 1 kapsul selama 4 minggu</p> <p>Kegunaan : ulkus duodenum, tukak lambung tidak berbahaya, refluks esofagitis.</p> <p>ESO potensial : sakit kepala, diare, asthenia, candidiasis, nyeri dada, edema, demam, flu sindrom</p> <p>KI : Penderita yang hipersensitif terhadap lansoprazole, serta pasien yang sedang mengkonsumsi rilpivirine dan atazanavir.</p> <p>PERHATIAN : hipersensitif terhadap lansoprazol</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>untuk pemeriksaan sinar X, 1-2 tablet 2-3 hari sebelum pemeriksaan.</p> <p>Kegunaan : Mengurangi penimbunan gas dalam saluran cerna, perasaan penuh pada epigastrium, meteorismus sementara dan pasca operasi, sindrom gastrokardiak, persiapan pemeriksaan dengan sinar X dan sebelum gastroskopi</p> <p>ESO potensial : faringitis, ruam kulit, dan angiodema. Interaksi Obat : Meningkatkan absorpsi pada gangguan bersama dengan cimetidin dan ranitidine.</p> <p>KI : Hipersensitivitas, aritmia, hipokalemia, hipomagnesia, CHF, jantung iskemik.</p> <p>PERHATIAN : Konsultasikan ke dokter sebelum menggunakan Disfatyl untuk ibu hamil dan menyusui</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>
		<p>F. Tahap pembuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Prosogan 30mg 10 tablet dan beri etiket 2. Ambil Disfatyl 30 tablet dan beri etiket 3. Masukkan semua obat kedalam plastik, beri alamat pengiriman obat 	

		<p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Informasi obat sudah tertera pada kemasan,lalu diserahkan kepada kurir untuk diserahkan ke pasien. Jika pasien masih bingung untuk cara penggunaan bisa menghubungi pihak klinik di nomer yang tertera</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep
----	-------	--------------------------

2.		<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Ada	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada
		Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																					
		Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																					
		Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																					
		Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																					
		Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Ada																																					
		Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																					
		Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																					
		Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																					
		Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada																																					
		Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada																																					
		Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada																																					
		Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada																																					
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
<p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p>																																									

1. Lasgan 30mg 10 Tab

C. Perhitungan biaya resep

$$1. \text{ Lasgan 30mg} = 21.312 \times 10 = 213.120$$

Total 213.120

D. ETIKET


Lasgan 30mg /Putih:

APOTEK BANJAR BARU GRESIK	
Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK	
HP. 082244640064	
Indah Faridah, S.Farm, Apt 19870327/SIPA 35.25/2021/2208	
No.Resep :928	Tgl. 29/02/24
Ny. Unlamah	
1 x sehari sesudah makan	

		<div data-bbox="958 193 1393 231" style="border: 1px solid black; width: 194px; height: 24px; margin-bottom: 10px;"></div> <p data-bbox="913 304 1193 331"><i>E. Product knowledge</i></p> <p data-bbox="913 341 1238 368">Nama Obat : Lasgan 30mg</p> <p data-bbox="913 408 1238 435">Kandungan : Lansoprazole</p> <p data-bbox="913 475 1491 539">Dosis lazim : Dyspepsia : 15-30 mg 1 kali sehari di pagi hari selama 2-4 minggu</p> <p data-bbox="913 579 1491 707">Kegunaan : mengobati dan mencegah ulkus lambung dan usus, erosif esofagitis, dan kondisi lain yang melibatkan asam lambung yang berlebihan.</p> <p data-bbox="913 746 1509 906">ESO potensial : Diare, gatal-gatal, Meningkatkan atau menurunkan nafsu makan, nyeri sendi, mual, sakit perut, muntah, kegelisahan, pilek, sembelit, batuk, depresi mental, nyeri otot, perdarahan dubur, pendarahan atau memar yang tidak biasa.</p> <p data-bbox="913 946 1491 1042">KI : Penderita yang hipersensitif terhadap lansoprazole, serta pasien yang sedang mengkonsumsi rilpivirine dan atazanavir.</p> <p data-bbox="913 1082 1491 1209">PERHATIAN : Jangan dikunyah, minum secara utuh, konsultasikan dengan dokter untuk penggunaan pada ibu hamil dan ibu menyusui, jangan berikan pada anak dibawah 1 tahun.</p> <p data-bbox="913 1249 1491 1313">Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p> <p data-bbox="913 1425 1189 1452"><i>F. Tahap pembuatan</i></p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>1. Ambil Lasgan 30mg 10 tablet dan beri etiket 2. Masukkan semua obat kedalam plastik, beri alamat pengiriman obat</p> <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Informasi obat sudah tertera pada kemasan,lalu diserahkan kepada kurir untuk diserahkan ke pasien. Jika pasien masih bingung untuk cara penggunaan bisa menghubungi pihak klinik di nomer yang tertera</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep
-----------	--------------	---------------------------------

3.		<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Ada	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																	
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																	
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																	
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																	
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Ada																																	
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																	
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																	
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																	
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada																																	
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada																																	
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada																																	

		Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada		
		Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada		
		<p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p>				
		<p>1. Orinox 90mg 10 Tab</p>				
		<p>C. Perhitungan biaya resep</p>				
		<p>Orinox 90mg = $11.722 \times 10 = 117.220$ Total 117.220</p>				
		<p>D. ETIKET Orinox 90mg /Putih:</p>				
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> APOTEK BANJAR BARU GRESIK Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK HP. 082244640064 Indah Faridah, S.Farm. Apt 19870327/SIPA 35.25/2021/2208 No.Resep :944Tel. 01/03/24 </td> </tr> </table>			APOTEK BANJAR BARU GRESIK Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK HP. 082244640064 Indah Faridah, S.Farm. Apt 19870327/SIPA 35.25/2021/2208 No.Resep :944 Tel. 01/03/24	
APOTEK BANJAR BARU GRESIK Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK HP. 082244640064 Indah Faridah, S.Farm. Apt 19870327/SIPA 35.25/2021/2208 No.Resep :944 Tel. 01/03/24						

Tn. Dendy W

1 x sehari sesudah makan (antinyeri)

E. Product knowledge

Nama obat : Orinox 90mg

Kandungan : Entoricoxib

Dosis Lazim : Osteoarthritis, nyeri muskuloskeletal
60 mg, 1 kali sehari.

Kegunaan : Meredakan rasa nyeri akut yang berhubungan dengan bedah mulut (operasi gigi), nyeri dan peradangan pada sendi dan otot penderita osteoarthritis (OA) dan rheumatoid arthritis.

KI : Hipersensitif terhadap komponen obat, radang usus, hipertensi yang tidak terkontrol.

PERHATIAN :

Pasien dehidrasi. Edema yang sudah ada sebelumnya, hipertensi atau gagal jantung. Riwayat KV atau efek trombotik lainnya, perforasi GI, ulkus & perdarahan (PUB) & pasien >65 thn. Pasien yang dirawat karena infeksi. Pasien yang sebelumnya mengalami serangan asma akut, urtikaria atau rinitis. Kategori kehamilan: Kategori C: Mungkin berisiko. Obat digunakan dengan hati-hati apabila besarnya manfaat yang diperoleh melebihi besarnya risiko terhadap janin. Penelitian pada hewan uji menunjukkan risiko terhadap janin dan belum terdapat penelitian langsung terhadap wanita hamil. Obat dapat diekskresikan melalui


		<p>ASI, konsultasikan kepada tenaga medis apabila sedang menyusui.</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	
	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep	

F. Tahap pembuatan

1. Ambil Orinox 90mg 10 tablet dan beri etiket
2. Masukkan semua obat kedalam plastik, beri alamat pengiriman obat

G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

Informasi obat sudah tertera pada kemasan, lalu diserahkan kepada kurir untuk diserahkan ke pasien. Jika pasien masih bingung untuk cara penggunaan bisa menghubungi pihak klinik di nomer yang tertera

4.		<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="958 1236 2110 1449"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Ada	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada	
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																			
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																			
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																			
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																			
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Ada																			
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada																			



Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Ada
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada

		Jumlah obat : Duplikasi terapi : Aturan pakai : Tanggal penulisan resep : Nama dokter : Surat ijin : Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada Ada/Tidak Ada Ada/Tidak Ada Ada/Tidak Ada Ada/Tidak Ada Ada/Tidak Ada Ada/Tidak Ada	Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada
		B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi 2. Irvell 150mg 30 Tab		
		C. Perhitungan biaya resep 1. Irvell 150mg = 11.322 x 30 = 339.660 Total 339.660		

D. ETIKET

Irvel 150mg /Putih:

APOTEK BANJAR BARU GRESIK	
Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK	
HP. 082244640064	
Indah Faridah, S.Farm., Apt 19870327/SIPA 35.25/2021/2208	
No.Resep :973	Tgl. 04/03/24
Tn. Cholik	
1 x sehari (HIPERTENSI) MALAM	

E. *Product knowledge*

Nama obat : Irvell 150mg

Kandungan : irbesartan 150 mg

Dosis Lazim : dosis awal 75 mg. Dosis pemeliharaan 150 mg x sehari, dapat ditingkatkan sampai 300 mg perhari.


Kegunaan : hipertensi esensial, untuk menurunkan mikro dan makro albuminurea pada pasien hipertensi dengan diabetik nefropati yang disebabkan oleh non insulin dependent diabetic mellitus (niddm)

Eso potensial : sakit kepala, pusing, takikardia, hipotensi, batuk, mual/mutah, diare, heartburn, disfungsi seksual, lelah, nyeri dada, nyeri otot, ruam kulit, hiperkalemia, hepatitis, kelainan pada telinga (tinnitus)

KI : Hipertensi

PERHATIAN : hipersensitif terhadap irbesartan, kehamilan trimester ke-2 dan ke-3, ibu menyusui.

		<div data-bbox="898 193 1534 231" style="border: 1px solid black; width: 284px; height: 24px; margin-bottom: 10px;"></div> <p data-bbox="920 268 1189 300">F. Tahap pembuatan</p> <div data-bbox="958 300 2123 491" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><ol data-bbox="1086 339 1937 403" style="list-style-type: none">1. Ambil Irvel 150mg 30 tablet dan beri etiket2. Masukkan semua obat kedalam plastik, beri alamat pengiriman obat</div> <p data-bbox="913 531 2123 595">G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <div data-bbox="958 595 2123 751" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p data-bbox="1066 600 2063 735">Informasi obat sudah tertera pada kemasan,lalu diserahkan kepada kurir untuk diserahkan ke pasien. Jika pasien masih bingung untuk cara penggunaan bisa menghubungi pihak klinik di nomer yang tertera</p></div>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																												
5.		<p data-bbox="907 236 1249 268">A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="958 268 2107 730"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> </table> <p data-bbox="907 770 1462 802">B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <table border="1" data-bbox="958 802 2107 970"> <tr> <td>1. Rhinos SR Caps 10 Tab</td> </tr> <tr> <td>2. Imbooster Force 7 Tab</td> </tr> </table> <p data-bbox="907 1078 1263 1110">C. Perhitungan biaya resep</p> <table border="1" data-bbox="958 1110 2107 1265"> <tr> <td>1. Rhinos SR Caps = $8.423 \times 10 = 84.230$</td> </tr> <tr> <td>2. Imbooster Force = $14.652 \times 7 = 102.564$</td> </tr> <tr> <td>Total = 186.794</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Ada	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada	1. Rhinos SR Caps 10 Tab	2. Imbooster Force 7 Tab	1. Rhinos SR Caps = $8.423 \times 10 = 84.230$	2. Imbooster Force = $14.652 \times 7 = 102.564$	Total = 186.794
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																												
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																												
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																												
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																												
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Ada																																												
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																												
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																												
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																												
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada																																												
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada																																												
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada																																												
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada																																												
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																												
1. Rhinos SR Caps 10 Tab																																														
2. Imbooster Force 7 Tab																																														
1. Rhinos SR Caps = $8.423 \times 10 = 84.230$																																														
2. Imbooster Force = $14.652 \times 7 = 102.564$																																														
Total = 186.794																																														

D. ETIKET

Rhinos SR Caps /Putih:

APOTEK BANJAR BARU GRESIK	
Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK HP. 082244640064	
Indah Faridah, S.Farm., Apt 19870327/SIPA 35.25/2021/2208	
No.Resep :977	Tgl. 04/03/24
Tn. Rahman A	
2 x sehari (PILEK)	


Imbooster Force /Putih:

APOTEK BANJAR BARU GRESIK	
Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK HP. 082244640064	
Indah Faridah, S.Farm., Apt 19870327/SIPA 35.25/2021/2208	
No.Resep :977	Tgl. 04/03/24
Tn. Rahman A	
1 x sehari (VITAMIN)	

E. *Product knowledge*

<p>Nama Obat : Rhinos SR Caps</p> <p>Kandungan : :loratadine 5mg dan pseudoefedrin 60mg</p> <p>Dosis lazim : >12 tahun : 1 kapsul tiap 12 jam</p> <p>Kegunaan : hidung tersumbat, bersin</p> <p>ESO potensial : Mual, muntah, kehilangan nafsu makan</p> <p>KI : rhinitis vasomotor</p>	<p>Nama obat : imboost Force</p> <p>Kandungan : echinacea dry extr 250 mg, zn picolinate 10 mg, black elderberry dry extr 400 mg</p> <p>Dosis Lazim : dewasa: 3 x1 kaplet/hari</p> <p>Kegunaan :Meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap infeksi bakteri pada saluran pernapasan atas dan urogenital (kandidiasis dan vaginitis) yang berulang.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>PERHATIAN : hipertensi berat, penyakit arteri koroner</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.</p>	<p>Eso potensial : gangguan saluran cerna ringan dan reaksi alergi</p> <p>KI : tidak boleh digunakan oleh penderita sclerosis</p> <p>PERHATIAN : tidak dianjurkan pemakaian lebih dari 8 minggu</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p> <p>F. Tahap pembuatan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ambil Rhinos SR Caps 10 tablet dan beri etiket2. Ambil Immunos plus 7 tablet dan beri etiket3. Masukkan semua obat kedalam plastik, beri alamat pengiriman obat <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Informasi obat sudah tertera pada kemasan,lalu diserahkan kepada kurir untuk diserahkan ke pasien. Jika pasien masih bingung untuk cara penggunaan bisa menghubungi pihak klinik di nomer yang tertera</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																									
6.		<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="958 475 2110 943"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <table border="1" data-bbox="958 1011 2110 1177"> <tr> <td>3. Esola 20mg 10 Tab</td> </tr> <tr> <td>4. Episan Syr 1 Botol</td> </tr> </table> <p>C. Perhitungan biaya resep</p>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Ada	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada	3. Esola 20mg 10 Tab	4. Episan Syr 1 Botol
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																									
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																									
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																									
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																									
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Ada																																									
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																									
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																									
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																									
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada																																									
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada																																									
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada																																									
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada																																									
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																									
3. Esola 20mg 10 Tab																																											
4. Episan Syr 1 Botol																																											

1. Esola 20mg = $14.562 \times 10 = 145.620$
 2. Episan syr = $70.130 \times 1 = 70.130$
- Total = 215.750

D. ETIKET

Esola 20mg/Putih:

APOTEK BANJAR BARU GRESIK	
Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK	
HP. 082244640064	
Indah Faridah, S.Farm., Apt 19870327/SIPA. 35.25/2021/2208	
No.Resep :928	Tgl. 29/02/24
Ny. Maharani G	
1 x sehari sebelum makan	

Episan syr/Putih:

APOTEK BANJAR BARU GRESIK	
Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK	
HP. 082244640064	
Indah Faridah, S.Farm., Apt 19870327/SIPA. 35.25/2021/2208	
No.Resep :928	Tgl. 29/02/24
Ny. Maharani G	
3 x sehari satu sendok makan (sebelum makan)	

E. *Product knowledge*

Nama Obat : Esola 20mg


Kandungan : Esomeprazole Sodium 40 mg


Nama Obat : Episan syr

Kandungan : Sucralfate.

		<p>Dosis lazim : Dewasa: 20 mg diberikan sekali sehari selama 4-8 minggu. Untuk pencegahan gejala dapat mengonsumsi 20 mg atau 40 mg per hari selama 6 bulan.</p> <p>Kegunaan : Pencegahan perdarahan kambuhan tukak duodenum</p> <p>KI : Riwayat penyakit jantung atau stroke</p> <p>PERHATIAN : Esola dapat terserap ke dalam ASI, jangan menggunakan obat sebelum berkonsultasi dengan dokter.</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>Dosis lazim : 2 sendok takar (10 mL) 4 kali perhari.</p> <p>Kegunaan : Terapi jangka pendek tukak duodenum (hingga 8 minggu).</p> <p>ESO potensial : Konstipasi & mulut kering; diare, mual, muntah, rasa tidak nyaman pada lambung, kembung, pruritus, ruam kulit, mengantuk, vertigo, nyeri punggung, & sakit kepala.</p> <p>KI : Jangan mengonsumsi Episan jika memiliki alergi terhadap kandungan di dalam obat ini. Beri tahu dokter mengenai semua riwayat alergi Anda. Beri tahu dokter jika Anda pernah atau sedang menderita diabetes, penyakit ginjal, atau sedang menjalani cuci darah.</p> <p>PERHATIAN : Pasien yang mengalami gangguan ginjal & menjalani dialisis. Berikan selang waktu ½ jam dengan pemberian antasid. Anak. Hamil & laktasi.</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>
		<p>F. Tahap pembuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Esola 20mg 10 tablet dan beri etiket 2. Ambil Episan syr dan beri etiket 3. Masukkan semua obat ke dalam plastik, beri alamat pengiriman obat 	

		<p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Informasi obat sudah tertera pada kemasan,lalu diserahkan kepada kurir untuk diserahkan ke pasien. Jika pasien masih bingung untuk cara penggunaan bisa menghubungi pihak klinik di nomer yang tertera</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
7.		<p data-bbox="1003 236 1339 268">A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="958 268 2107 730"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> </table> <p data-bbox="1003 770 1563 802">B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div data-bbox="958 802 2107 970" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p data-bbox="1070 810 1317 842">1. Yasmin 1 Strip</p> </div> <p data-bbox="1003 1082 1361 1114">C. Perhitungan biaya resep</p> <div data-bbox="958 1114 2107 1265" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p data-bbox="1070 1121 1608 1153">1. Yasmin tab strip = 258.647 x 1 = 258.647</p> <p data-bbox="1070 1169 1272 1201">Total = 258.647</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							

D. ETIKET

Yasmin tab strip/Putih:

APOTEK BANJAR BARU GRESIK	
Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK	
HP. 082244640064	
Indah Faridah, S.Farm, Apt 19870327/SIPA 35.25/2021/2208	
No.Resep :001	Tgl. 05/04/24
Ny. Yeti eva	
1 x sehari (haid)	

E. *Product knowledge*

Nama obat : yasmin tabs strip

Kandungan : Drospirenon 3 mg dan ethinyl estradiol 0,03 mg

Dosis Lazim : 1 x sehari 1 tablet

Kegunaan : mencegah kehamilan

Eso potensial : mual, muntah, sakit kepala

KI : hipersensitivitas

PERHATIAN : harus dengan resep dokter

Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung

F. Tahap pembuatan


1. Ambil Yasmin 1 Strip dan beri etiket
2. Masukkan semua obat kedalam plastik, beri alamat pengiriman obat

G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

Informasi obat sudah tertera pada kemasan,lalu diserahkan kepada kurir untuk diserahkan ke pasien. Jika pasien masih bingung untuk cara penggunaan bisa menghubungi pihak klinik di nomer yang tertera

--	--	--



No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
8.		<p style="text-align: center;">A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="958 263 2107 730"> <tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Surat ijin :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>1. Exforge 10/160mg 30 Tab</p> <p>2. Bisovel 5mg 30 Tab</p> </div> <p style="text-align: center;">C. Perhitungan biaya resep</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>1. Exforge 10/160mg = 17.258 x 30 = 517.740</p> <p>2. Bisovel 5mg = 6.600 x 30 = 198.000</p> <p>Total = 715.740</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Ada	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							

D. ETIKET
Exforge 10/160mg /Putih:

APOTEK BANJAR BARU GRESIK	
Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK HP. 082244640064	
Indah Faridah, S.Farm., Apt 19870327/SIPA_35.25/2021/2208	
No.Resep :018	Tgl. 06/03/24
Tn. Susprpto s	
1 x sehari (pagi) hipertensi	

Bisovel 5mg /Putih:


APOTEK BANJAR BARU GRESIK	
Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK HP. 082244640064	
Indah Faridah, S.Farm., Apt 19870327/SIPA_35.25/2021/2208	
No.Resep :018	Tgl. 06/03/24
Tn. Susprpto s	
1 x sehari (malam) hipertensi	

E. *Product knowledge*

<p>Nama obat : exforge</p> <p>Kandungan : amlodipin besylate 10 mg valsartan 160 mg</p> <p>Dosis Lazim : 1 x sehari 1 tablet</p> <p>Kegunaan : hipertensi essensial pada pasien dg tekanan darah</p> <p>Eso potensial : radang tenggorokan, influenza, sakit kepala</p>	<p>Nama obat : bisovel 5mg</p> <p>Kandungan : bisoprolol hemifumarat 5 mg</p> <p>Dosis Lazim : Gagal jantung kongestif: Peningkatan dosis dilakukan secara bertahap, mulai dr 1.25 mg selama 1 minggu, lalu 2.5 mg selama 1 minggu berikutnya, 3.75 mg 1 minggu berikutnya, 5 mg untuk 4 minggu berikutnya, 7.5 mg untuk 4 minggu berikutnya. Dosis rumat: 10 mg. Hipertensi & angina pektoris 1 tab, dapat ditingkatkan s/d 2-4 tab/hari. Semua dosis diberikan 1 x/hari.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>KI : hipersensitif</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>Stadium akhir gangguan fungsi ginjal & gangguan fungsi hati berat Maks: 2 tab/hari.</p> <p>Kegunaan : Sebagai monoterapi atau kombinasi terapi untuk Hipertensi</p> <p>Eso potensial : Rasa dingin atau kebas pada kaki</p> <p>KI : obat ini tidak boleh diberikan pada Pasien yang mempunyai sakit gagal jantung</p> <p>PERHATIAN : Pemberian anastesi melalui inhalasi. Hamil & laktasi.</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>
		<p>F. Tahap pembuatan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ambil Exforge 10/160mg 30 Tab dan beri etiket2. Ambil Bisovel 5mg 30 Tab dan beri etiket3. Masukkan semua obat kedalam plastik, beri alamat pengiriman obat	
		<p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p>	

		<p>Informasi obat sudah tertera pada kemasan,lalu diserahkan kepada kurir untuk diserahkan ke pasien. Jika pasien masih bingung untuk cara penggunaan bisa menghubungi pihak klinik di nomer yang tertera</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																									
9.		<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Surat ijin :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Cefal 10 tab</td> </tr> <tr> <td>2. Cataflam 10 tab</td> </tr> </table> <p>C. Perhitungan biaya resep</p>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada	1. Cefal 10 tab	2. Cataflam 10 tab
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																									
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																									
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																									
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																									
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																									
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																									
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																									
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																									
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada																																									
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada																																									
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada																																									
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada																																									
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																									
1. Cefal 10 tab																																											
2. Cataflam 10 tab																																											

1. Cefat tab = 14.519 x 10 = 145.519
 2. Cataflam tab = 7.981 x 10 = 79.810
- Total = 225.000

D. ETIKET
Cefat tab /Putih:

APOTEK BANJAR BARU GRESIK	
Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK HP. 082244640064	
Indah Faridah, S.Farm. Apt 19870327/SIPA 35.25/2021/2208	
No.Resep :042	Tgl. 07/03/24
Ny. Lie lie aswat	
2 x sehari (dihabiskan)	

Cataflam tab / Putih :

APOTEK BANJAR BARU GRESIK	
Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK HP. 082244640064	
Indah Faridah, S.Farm. Apt 19870327/SIPA 35.25/2021/2208	
No.Resep :042	Tgl. 07/03/24
Ny. Lie lie aswat	
2 x sehari (nyeri)	

E. *Product knowledge*

Nama obat : cefat

Kandungan : cefadroxil 500mg

Dosis Lazim : 2 x sehari 1 kapsul


Nama obat : cataflam

Dosis Lazim : Meredakan nyeri: 50–100 mg 3 kali sehari

		<p>Kegunaan : infeksi saluran pernafasan, Eso potensial : mual, muntah, diare KI : hipersensitif terhadap centradrovil PERHATIAN : hipersensitifitas terhadap cephalosporin. Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>Kegunaan : obat sakit gigi, obat sakit kepala Eso potensial : Bengkak di kaki atau tangan yang tidak biasa dan Mudah memar KI : hipersensitif terhadap centradrovil PERHATIAN : Batasi konsumsi minuman beralkohol selama menjalani pengobatan. Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>
		<p>F. Tahap pembuatan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ambil Cefat 10 tab dan beri etiket2. Cataflam 10 tab 10 tablet dan beri etiket3. Masukkan semua obat kedalam plastik, beri alamat pengiriman obat	
		<p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Informasi obat sudah tertera pada kemasan, lalu diserahkan kepada kurir untuk diserahkan ke pasien. Jika pasien masih bingung untuk cara penggunaan bisa menghubungi pihak klinik di nomer yang tertera</p>	

--	--	--



No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																												
10.		<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="972 245 2125 711"> <tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Surat ijin :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> </table> <p>B. Perhitngn jumlah perbekalan Farmasi</p> <table border="1" data-bbox="972 783 2125 951"> <tr><td>1. Ultracet tab</td></tr> <tr><td>2. Cefila 100mg 10 tab</td></tr> </table> <p>C. Perhitungan biaya resep</p> <table border="1" data-bbox="972 1091 2125 1294"> <tr><td>1. Ultracet tab= 10.238 x 10 = 102.380</td></tr> <tr><td>2. Cefila 100mg = 27.972 x 10 = 279.720</td></tr> <tr><td>Total = 382.100</td></tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada	1. Ultracet tab	2. Cefila 100mg 10 tab	1. Ultracet tab= 10.238 x 10 = 102.380	2. Cefila 100mg = 27.972 x 10 = 279.720	Total = 382.100
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																												
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																												
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																												
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																												
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																												
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																												
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																												
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																												
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada																																												
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada																																												
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada																																												
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada																																												
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																												
1. Ultracet tab																																														
2. Cefila 100mg 10 tab																																														
1. Ultracet tab= 10.238 x 10 = 102.380																																														
2. Cefila 100mg = 27.972 x 10 = 279.720																																														
Total = 382.100																																														

D. ETIKET

Ultracet tab /Putih:

APOTEK BANJAR BARU GRESIK	
Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK HP. 082244640064	
Indah Faridah, S.Farm., Apt 19870327/SIPA 35.25/2021/2208	
No.Resep :042	Tgl. 07/03/24
Tn. Achmad Z	
3 x sehari sesudah makan	

Cefila 100mg/ Putih:

APOTEK BANJAR BARU GRESIK	
Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK HP. 082244640064	
Indah Faridah, S.Farm., Apt 19870327/SIPA 35.25/2021/2208	
No.Resep :042	Tgl. 07/03/24
Tn. Achmad Z	
2 x sehari sesudah makan (antibiotik) Habiskan	

E. *Product knowledge*

Nama obat : Ultra cet

Dosis Lazim : 8 tablet per hari

Kegunaan : mengatasi nyeri akut

Eso potensial :mual, muntah, pusing

KI : Hipersensitif

PERHATIAN : Ultracet tidak boleh diberikan pada anak usia di bawah 12 tahun

Nama obat :Cefila 100mg

Kandungan : Cefixime Trihydrate 100 mg.


Dosis Lazim : Dewasa dan anak dengan BB lebih dari 30kg : 50-100 mg, oral dua kali sehari. Bisa ditingkatkan hingga 200mg 2x/hari untuk kondisi parah atau infeksi yang sulit disembuhkan. - Anak : 10-15 mg/kg bb/hari selama 2 pekan

		<p>Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>Kegunaan : Cefila 100 MG bisa mengobati infeksi saluran kencing tak terkomplikasi, otitis media, faringitis, tonsilitis, bronkitis akut, dan eksaserbasi akut dari bronkitis kronik.</p> <p>Eso potensial : Hipersensitivitas, gangguan Gastrointestinal & pernapasan, syok, gangguan fungsi ginjal, granulositopenia atau eosinofilia, stomatitis, kandidiasis, defisiensi vit K.</p> <p>KI : Wanita hamil dan menyusui, anak-anak, bayi baru lahir.</p> <p>PERHATIAN : Antibiotik harus dihabiskan</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>
		<p>F. Tahap pembuatan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ambil Cefat 10 tab dan beri etiket2. Cataflam 10 tab 10 tablet dan beri etiket3. Masukkan semua obat kedalam plastik, beri alamat pengiriman obat <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p>	

		<p>Informasi obat sudah tertera pada kemasan,lalu diserahkan kepada kurir untuk diserahkan ke pasien. Jika pasien masih bingung untuk cara penggunaan bisa menghubungi pihak klinik di nomer yang tertera</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep
----	-------	--------------------------

11.



A. Skrinning Administrasi

Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada

B. Perhitngn jumlah perbekalan Farmasi

1. Proris tab 10 tab
2. Becomzet 10 tab
3. Codipront 10 tab

C. Perhitungan biaya resep

1. Proris tab = $1.026 \times 10 = 10.260$
 2. Becomzet = $2.930 \times 10 = 29.300$
 3. Codipront = $9.622 \times 10 = 96.220$
- Total = 135.780

D. ETIKET

Proris tab/Putih :

APOTEK BANJAR BARU GRESIK Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK HP. 082244640064 Indah Faridah, S.Farm., Apt 19870327/SIPA 35.25/2021/2208	
No.Resep :051	Tgl. 08/03/24
Ny. mahmudah	
3 x sehari sesudah makan (demam)	

Becomzet/Putih :

APOTEK BANJAR BARU GRESIK Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK HP. 082244640064 Indah Faridah, S.Farm., Apt 19870327/SIPA 35.25/2021/2208	
No.Resep :051	Tgl. 08/03/24
Ny. mahmudah	
1 x sehari sesudah makan (vitamin)	

Codipront /Putih :

APOTEK BANJAR BARU GRESIK Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK HP. 082244640064 Indah Faridah, S.Farm., Apt 19870327/SIPA 35.25/2021/2208	
No.Resep :051	Tgl. 08/03/24
Ny. mahmudah	


2 x sehari sesudah makan (batuk)


E. *Product knowledge*

<p>Nama obat : proris tab</p> <p>Kandungan : ibuprofen 200 mg</p> <p>Dosis Lazim : 200 mg 3-4 kali sehari. Menurunkan nyeri pada anak 1-2 tahun: 50 mg 3-4 kali sehari, usia 3-7 tahun: 100 mg 3-4 kali sehari, usia 8-12 tahun: 200 mg 3-4 kali sehari. Untuk menurunkan demam: anak usia 1-12 tahun: dengan temperatur >39 derajat celsius: 10 mg/kgBB/hari, dengan temperatur</p> <p>Kegunaan : meredakan nyeri & demam</p> <p>Eso potensial :mual, muntah, diare</p> <p>KI : Hipersensitif</p> <p>PERHATIAN : gangguan fungsi ginjal, gagal jantung, hipertensi</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>Nama obat : becomzet</p> <p>Kandungan : itamin E 30 IU, Vitamin B1 15mg, Vit B2 15mg, Vit B6 20 mg, Vit B12 mcg, Asam Pantotenate 20mg, Niasin 100 mg, Vit C 750 mg, Zinc 22,5mg.</p> <p>Dosis Lazim : 1 x sehari 1 tablet</p> <p>Kegunaan : defisiensi vitamin B kompleks, Vitamin C, Vitamin E, Zinc.</p> <p>Eso potensial :mual, muntah, kantuk</p> <p>KI : Hipersensitif</p> <p>PERHATIAN : Hindari merokok atau mengonsumsi minuman beralkohol selama mengonsumsi Becom-Zet</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>
<p>Nama obat : Codipront Tab</p> <p>Kandungan : 30 mg codeine, 10 mg phenyltoloxamine, dan 100 mg guaifenesin.</p>	

		<p>Dosis Lazim : Dewasa dan anak usia >14 tahun: 3 sendok takar (15 ml), 2 kali sehari. Anak-anak usia 6–14 tahun: 2 sendok takar (10 ml), 2 kali sehari. Anak-anak usia 4–6 tahun: 1 sendok takar (5 ml), 2 kali sehari. Anak-anak usia 2–4 tahun: ½ sendok takar (2,5 ml), 2 kali sehari.</p> <p>Kegunaan : meredakan gejala batuk.</p> <p>ESO potensial : Mulut kering. Konstipasi. Tinnitus. Rasa gatal (pruritus) dangangguan kulit lainnya</p> <p>KI : Pasien menderita pembesaran kelenjar prostat, glaukoma, sembelit kronis atau asma &/atau insufisiensi paru-paru. Laktasi. Sesaat sebelum atau selama persalinan. Bayi <1 tahun.</p> <p>PERHATIAN : Harus dengan resep dokter</p> <p>Cara Penyimpanan : disimpan di lemari khusus karna termasuk narkotika</p>	
		<p>F. Tahap pembuatan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ambil Proris tab 10 tab dan beri etiket2. Ambil Becomzet 10 tab dan beri etiket3. Ambil Codipront 10 tab dan beri etiket4. Masukkan semua obat kedalam plastik, beri alamat pengiriman obat	
		<p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p>	

		<p>Informasi obat sudah tertera pada kemasan,lalu diserahkan kepada kurir untuk diserahkan ke pasien. Jika pasien masih bingung untuk cara penggunaan bisa menghubungi pihak klinik di nomer yang tertera</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
12.	 <p> dr. YENI TRI PUSPITANINGRUM NO.SIP 445/12/SIP/408.36/2022 Tgl. 24/2/2024 Feburic 80 mg. p. X siddp 160717 Pro : Dwi Hanjanih Umur : Alamat : CS Dipindai dengan CamScanner </p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Surat ijin :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> </table> <p>B. Perhitugn jumlah perbekalan Farmasi</p> <p>1. Feburic 80mg 10 tab</p> <p>C. Perhitungan biaya resep</p> <p>1. Feburic 80mg = 28.000 x 10 = 280.000</p>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							

D. ETIKET

Feburic 80mg/Putih:

APOTEK BANJAR BARU GRESIK	
Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK	
HP. 082244640064	
Indah Faridah, S.Farm., Apt 19870327/SIPA. 35.25/2021/2208	
No.Resep :717	Tgl. 12/02/24
Ny. Dwi hariyanti	
1 x sehari sesudah makan	

E. *Product knowledge*

Nama obat : feburic 80mg

Kandungan : Febuxostat 80 mg

Dosis Lazim : 40mg sehari

Kegunaan : Hyperuricaemia kronis dalam kondisi di mana deposisi urat telah terjadi (termasuk riwayat, atau adanya, tophus, artritis gout & / atau nefrolitiasis urat).

Eso potensial : mual, muntah, diare

KI : Hipersensitif

PERHATIAN : Hentikan terapi jika terjadi alergi


Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung

F. Tahap pembuatan

1. Ambil Feburic 10 tab dan beri etiket
2. Masukkan semua obat kedalam plastik, beri alamat pengiriman obat

G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

Informasi obat sudah tertera pada kemasan,lalu diserahkan kepada kurir untuk diserahkan ke pasien. Jika pasien masih bingung untuk cara penggunaan bisa menghubungi pihak klinik di nomer yang tertera

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																									
13.		<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Surat ijin :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <table border="1"> <tr> <td>1. Celebrex 200mg 30 tab</td> </tr> </table> <p>C. Perhitungan biaya resep</p> <table border="1"> <tr> <td>1. Celebrex 200mg = 21.500 x 30= 645.000</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada	1. Celebrex 200mg 30 tab	1. Celebrex 200mg = 21.500 x 30= 645.000
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																									
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																									
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																									
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																									
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																									
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																									
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																									
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																									
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada																																									
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada																																									
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada																																									
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada																																									
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																									
1. Celebrex 200mg 30 tab																																											
1. Celebrex 200mg = 21.500 x 30= 645.000																																											

D. ETIKET

Celebrex 200mg / putih:

APOTEK BANJAR BARU GRESIK	
Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK	
HP. 082244640064	
Indah Faridah, S.Farm., Apt 19870327/SIPA 35.25/2021/2208	
No.Resep :001	Tgl. 25/02/24
Ny. Rintis Putri	
1 x sehari sesudah makan	

E. *Product knowledge*

Nama obat : celebrex 200mg

Kandungan : celecoxib 200mg

Dosis Lazim : OA : 200mg/hari atau 100mg 2 x sehari; RA : 100-200mg 2 x sehari; AS : 200mg/hari atau 100mg 2 x sehari

Kegunaan : pengobatan nyeri dan peradangan

Eso potensial : sesak, vertigo, pusing

KI : Hipersensitif

PERHATIAN : Hipersensitif


Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung

F. Tahap pembuatan

1. Ambil Celebrex 200mg 30 tablet dan beri etiket
2. Masukkan semua obat kedalam plastik, beri alamat pengiriman obat

G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

Informasi obat sudah tertera pada kemasan,lalu diserahkan kepada kurir untuk diserahkan ke pasien. Jika pasien masih bingung untuk cara penggunaan bisa menghubungi pihak klinik di nomer yang tertera

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																										
14.		<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1003 544 2152 1010"> <tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Surat ijin :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <table border="1" data-bbox="1003 1082 2152 1246"> <tr><td>1. Mertigo 10 Tab</td></tr> <tr><td>2. Neurochol 10 Tab</td></tr> <tr><td>3. Unalium 5mg 5 Tab</td></tr> </table> <p>C. Perhitungan biaya resep</p>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada	1. Mertigo 10 Tab	2. Neurochol 10 Tab	3. Unalium 5mg 5 Tab
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																										
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																										
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																										
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																										
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																										
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																										
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																										
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																										
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada																																										
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada																																										
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada																																										
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada																																										
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																										
1. Mertigo 10 Tab																																												
2. Neurochol 10 Tab																																												
3. Unalium 5mg 5 Tab																																												

1. Mertigo = $4,795 \times 10 = 47,950$
 2. Neurochol = $19,321 \times 10 = 193,210$
 3. Unalium 5mg = $8,059 \times 5 = 40,295$
- Total = 281,455

D. ETIKET

Mertigo / putih:

APOTEK BANJAR BARU GRESIK	
Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK	
HP. 082244640064	
Indah Faridah, S.Farm., Apt 19870327/SIPA 35.25/2021/2208	
No.Resep :024	Tgl. 06/03/24
Tn. Koko Nurdiono	
3 x sehari sesudah makan (pusing)	

Neurochol / putih:

APOTEK BANJAR BARU GRESIK	
Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK	
HP. 082244640064	
Indah Faridah, S.Farm., Apt 19870327/SIPA 35.25/2021/2208	
No.Resep :024	Tgl. 06/03/24
Tn. Koko Nurdiono	
1 x sehari sesudah makan	

Unalium 5mg / putih:

APOTEK BANJAR BARU GRESIK	
Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK	
HP. 082244640064	
Indah Faridah, S.Farm., Apt 19870327/SIPA 35.25/2021/2208	
No.Resep :024	Tgl. 06/03/24
Tn. Koko Nurdiono	


1 x sehari sesudah makan

			<p>E. <i>Product knowledge</i></p>
		<p>Nama obat : mertigo Kandungan : betahistine mesylate 6 mg Dosis Lazim : 3 x sehari 1-2 tablet Kegunaan : mengurangi vertigo Eso potensial : mual, muntah KI : Hipersensitif PERHATIAN : pasien yang menderita feokromositoma. Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>Nama obat : neurochol Kandungan : pure lecithin (PPC 95%) 400 mg, vitamin E 30 mg, vitamin B1 100 mg, vitamin B6 100 mg, vitamin B12 200 mg Dosis Lazim : 1-3 kapsul lunak perhari Kegunaan : Suplementasi fungsi otak Eso potensial : - KI : Hipersensitif PERHATIAN : - Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>
		<p>Nama obat : unalium Kandungan : flunarizine 5 mg Dosis Lazim : 1 tablet 1 kali/hari atau ½ tablet pada pagi hari dan ½ tablet sebelum tidur Kegunaan : gangguan vestibular seperti pusing, vertigo, kurang konsentrasi, gangguan ingatan, sifat lekas marah, gangguan ritme tidur, telinga berdengung, migren.</p>	

		<p>Eso potensial : somnolen dan letih, jarang ; keletihan dapat jadi apatis atau inersia, depresi atau reaksi ekstrapiramidal dapat terjadi, hanya pada kondisi laten</p> <p>KI : Hipersensitif</p> <p>PERHATIAN : penderita yang sedang menjalani pengobatan dengan obat beta bloker,hamil,laktasi</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	
		<p>F. Tahap pembuatan</p>	
		<p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p>	

1. Ambil Mertigo10 tab dan beri etiket
2. Ambil Neurochol 10 tablet dan beri etiket
3. Ambil Unalium 5mg 5 Tab dan beri etiket
4. Masukkan semua obat kedalam plastik, beri alamat pengiriman obat

Informasi obat sudah tertera pada kemasan,lalu diserahkan kepada kurir untuk diserahkan ke pasien. Jika pasien masih bingung untuk cara penggunaan bisa menghubungi pihak klinik di nomer yang tertera

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
15.		<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> </tbody> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							

1. Rostin 10mg 30 Tab

C. Perhitungan biaya resep

1. Rostin 10mg = 17.200 x 30 =344.000

D. ETIKET

Rostin 10mg / putih:

APOTEK BANJAR BARU GRESIK	
Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK	
HP. 082244640064	
Indah Faridah, S.Farm., Apt 19870327/SIPA 35.25/2021/2208	
No.Resep :367	Tgl. 29/02/24
Tn. Risdianto	
1 x sehari malam sesudah makan (kolestrol)	


E. *Product knowledge*

Nama obat : Rostin 10mg

Kandungan : rosuvastatin Calcium

Dosis Lazim : 1x sehari 1 tablet

		<p>Kegunaan : terapi tambahan terhadap diet dan olahraga</p> <p>Eso potensial : pusing,mual,nyeri perut</p> <p>KI : penyakit hati aktif</p> <p>PERHATIAN : harus dengan resep dokter</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>F. Tahap pembuatan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ambil Rostin tab dan beri etiket2. Masukkan semua obat kedalam plastik, beri alamat pengiriman obat <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Informasi obat sudah tertera pada kemasan,lalu diserahkan kepada kurir untuk diserahkan ke pasien. Jika pasien masih bingung untuk cara penggunaan bisa menghubungi pihak klinik di nomer yang tertera</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>No</p>	<p>Resep</p>	<p>Tahapan Pengerjaan Resep</p>																														
<p>16.</p>		<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																														
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																														
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																														
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																														
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																														
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada																														
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																														
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																														
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada																														
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada																														

Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada

B. Perhitungn jumlah perbekalan Farmasi

1. Canderin 8 mg = 30
2. Nistrol 10 mg = 30

C. Perhitungan biaya resep

Canderin 8 mg (30) x 9.990 = 299.700
 Nistrol 10 mg (30) x 9.576 = 287.280
 Total = Rp. 586.980

D. ETIKET

Canderin 8 mg /putih:

APOTEK BANJAR BARU GRESIK	
Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK	
HP. 082244640064	
Indah Faridah, S.Farm., Apt 19870327/SIPA. 35.25/2021/2208	
No.Resep :087	Tgl. 13/03/24
Ny. Heresminingtyas	
1 x sehari pagi sesudah makan (hipertensi)	

Nistrol 10 mg/putih:

APOTEK BANJAR BARU GRESIK
 Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK
 HP. 082244640064
 Indah Faridah, S.Farm, Apt 19870327/SIPA 35.25/2021/2208
 No.Resep :087 Tgl. 13/03/24
 Ny. Heresminingtyas
 1 x sehari malam sesudah makan (kolestrol)

E. *Product knowledge*


Nama Obat : Canderin 8 mg	Nama Obat : Nistrol 10 mg
Kandungan : candesartan 8mg	Kandungan : Rosuvastatin Ca
Dosis lazim : 4mg – 14mg perhari	Dosis lazim : 10mg – 20mg perhari
Kegunaan : hipertensi, gagal jantung	Kegunaan : Mengontrol kadar lemak
ESO potensial : pusing, infeksi saluran pernafasan	ESO potensial : Rhabdomiolisis
KI : Hipersensitivitas	KI :
PERHATIAN : Informasikan dokter jika sedang hamil/ menyusui	PERHATIAN : Tidak boleh digunakan untuk ibu hamil dan menyusui.
Cara penyimpanan : Suhu di bawah 30 ° C	Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung
Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung	


F. Tahap pembuatan

1. Ambil Canderin 8 mg 30 tablet dan beri etiket
2. Ambil Nistrol 10 mg 30 tablet dan beri etiket
3. Masukkan semua obat kedalam plastik, beri alamat pengiriman obat

G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

Informasi obat sudah tertera pada kemasan,lalu diserahkan kepada kurir untuk diserahkan ke pasien. Jika pasien masih bingung untuk cara penggunaan bisa menghubungi pihak klinik di nomer yang tertera



No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																										
17.		<p data-bbox="965 209 1310 240">A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1010 240 2161 715"> <tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Surat ijin :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> </table> <p data-bbox="965 746 1489 778">B. Perhitungn jumlah perbekalan Farmasi</p> <table border="1" data-bbox="1010 778 2161 949"> <tr><td>Inerson Salp (1)</td></tr> </table> <p data-bbox="965 1050 1310 1082">C. Perhitungan biaya resep</p> <table border="1" data-bbox="1010 1082 2161 1241"> <tr><td>Inerson Salp (1) = 125.874</td></tr> <tr><td>Total = Rp. 125.874</td></tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada	Inerson Salp (1)	Inerson Salp (1) = 125.874	Total = Rp. 125.874
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																										
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																										
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																										
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																										
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																										
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																										
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																										
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																										
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada																																										
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada																																										
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada																																										
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada																																										
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																										
Inerson Salp (1)																																												
Inerson Salp (1) = 125.874																																												
Total = Rp. 125.874																																												

D. ETIKET

Inerson Salp / biru :

APOTEK BANJAR BARU GRESIK	
Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK	
HP. 082244640064	
Indah Faridah, S.Farm. Apt 19870327/SIPA. 35.25/2021/2208	
No.Resep :099	Tgl. 13/03/24
Ny. Heresminingtyas	
2 x sehari oles tipis	

E. Product knowledge

Nama Obat : inerson salp

Kandungan : desoksimeson 2,5 mg/g

Dosis lazim : 1-2x sehari bila perlu 3x sehari

Kegunaan : peradangan dan segala jenis gatal

ESO potensial : iritasi kulit seperti gatal dan rasa panas

KI : hipersensitif

PERHATIAN : penyakit kulit karena virus C

Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung

F. Tahap pembuatan


1. Ambil inersan salp dan beri etiket
2. Masukkan semua obat kedalam plastik, beri alamat pengiriman obat

G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

Informasi obat sudah tertera pada kemasan,lalu diserahkan kepada kurir untuk diserahkan ke pasien. Jika pasien masih bingung untuk cara penggunaan bisa menghubungi pihak klinik di nomer yang tertera

--	--	--



No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
18.		<p data-bbox="949 213 1290 240">A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1010 245 2163 703"> <tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Surat ijin :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> </table> <p data-bbox="949 743 1491 770">B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div data-bbox="1010 775 2163 943" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>1. Lapicel 500mg (14)</p> <p>2. Fusycom salp 5g + dermovel salp 5g (1 pot salp)</p> </div> <p data-bbox="949 1046 1317 1074">C. Perhitungan biaya resep</p> <div data-bbox="1010 1078 2163 1230" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Lapicel 500mg (14) = 15.318 x 14 = 214.452</p> <p>Fusycom salp 5g + dermovel salp 5g (1 pot salp) = 124.552</p> <p>Total = Rp. 339.004</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							

D. ETIKET

Lapicel 500mg /putih:

APOTEK BANJAR BARU GRESIK Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK HP. 082244640064 Indah Faridah, S.Farm., Apt 19870327/SIPA_35.25/2021/2208	
No.Resep : 168	Tgl. 15/03/24
Ny. sulistyowati	
2 x sehari 1 tablet (habiskan) sesudah makan	

Nistrol 10 mg/

APOTEK BANJAR BARU GRESIK Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK HP. 082244640064 Indah Faridah, S.Farm., Apt 19870327/SIPA_35.25/2021/2208	
No.Resep : 168	Tgl. 15/03/24
Ny. sulistyowati	
3 x sehari 1 oles tipis setelah mandi	

E. *Product knowledge*

Nama Obat : Lapicel 500mg Kandungan : Cefadroxil monohydrate. Dosis lazim : 1-2 g 2 kali/hari Kegunaan : infeksi kulit ESO potensial : Mual, muntah, diare. KI : Infeksi saluran napas atas & bawah.	Nama Obat : fusycom 5g Kandungan : Asam Fusidat. Dosis lazim : 3-4 X selama 7 hari. Kegunaan : infeksi kulit yang disebabkan oleh Staphylococcus ESO potensial : Reaksi hipersensitifitas kulit. KI : infeksi kulit
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>PERHATIAN : hipersensitif terhadap penisilin</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>PERHATIAN : Hindari kontak dengan mata. Hamil, menyusui.</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>
		<p>Nama Obat : dermovel 5g</p> <p>Kandungan : Mometasone furoate 1 mg.</p> <p>Dosis lazim : Gunakan 1 X sehari.</p> <p>Kegunaan : Meringankan manifestasi inflamasi</p> <p>ESO potensial : Rasa terbakar, pruritus dan atrofi kulit</p> <p>KI : pruritus pada corticosteroid-responsive dermatoses.</p> <p>PERHATIAN : Tidak boleh digunakan dengan pembalut/ perban/ plester, kecuali atas petunjuk dokter.</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan pada suhu 20-25°C</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	
		<p>F. Tahap pembuatan</p>	


1. Ambil Lapicel 500mg 40 kapsul dan beri etiket
2. Ambil Fusycom 5g dan dermovel 5g
3. Masukkan dalam pot kedua cream tersebut dan beri etiket
4. Masukkan semua obat kedalam plastik, beri alamat pengiriman obat

G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

Informasi obat sudah tertera pada kemasan,lalu diserahkan kepada kurir untuk diserahkan ke pasien. Jika pasien masih bingung untuk cara penggunaan bisa menghubungi pihak klinik di nomer yang tertera

--	--	--



No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
19.		<p data-bbox="987 209 1330 240">A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1048 244 2197 703"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> </table> <p data-bbox="987 738 1532 770">B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div data-bbox="1048 774 2197 938" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Rhinos SR Caps = 10 kapsul Codipront Cum = 10 tablet Benovit C = 10 tablet</p> </div> <p data-bbox="987 1042 1352 1074">C. Perhitungan biaya resep</p> <div data-bbox="1048 1077 2197 1230" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Rhinos SR Caps (10) = 8.924 x 10 = 89.240 Codipront Cum (10) = 12.171 x 10 = 121.710 Benovit C (10) = 2.809 x 10 = 28.090 Total = Rp. 244.500</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							

D. ETIKET

Rhinos SR Caps /putih:

APOTEK BANJAR BARU GRESIK Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK HP. 082244640064 Indah Faridah, S.Farm.,Apt 19870327/SIPA_35.25/2021/2208	
No.Resep :161	Tgl. 15/03/24
Tn. Achmat Zaeni Setiyono	
2 x sehari 1 tablet (pilek) sesudah makan	

Codipront Cum / putih:

APOTEK BANJAR BARU GRESIK Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK HP. 082244640064 Indah Faridah, S.Farm.,Apt 19870327/SIPA_35.25/2021/2208	
No.Resep :161	Tgl. 15/03/24
Tn. Achmat Zaeni Setiyono	
2 x sehari 1 tablet (batuk) sesudah makan	

Benovit C / putih :

APOTEK BANJAR BARU GRESIK Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK HP. 082244640064 Indah Faridah, S.Farm.,Apt 19870327/SIPA_35.25/2021/2208	
No.Resep :161	Tgl. 15/03/24
Tn. Achmat Zaeni Setiyono	
1 x sehari 1 tablet sesudah makan	

E. *Product knowledge*

Nama Obat : Rhinos SR Caps	Nama Obat : Codipront Cum
Kandungan : :loratadine 5mg dan pseudoefedrin 60mg	Kandungan : 30 mg codeine dan 10 mg phenyltoloxamine.


		<p>Dosis lazim : >12 tahun : 1 kapsul tiap 12 jam</p> <p>Kegunaan : hidung tersumbat, bersin</p> <p>ESO potensial : Mual, muntah, kehilangan nafsu makan</p> <p>KI : rhinitis vasomotor</p> <p>PERHATIAN : hipertensi berat, penyakit arteri koroner</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.</p>	<p>Dosis lazim : 1-2x sehari</p> <p>Kegunaan : Meredakan batuk</p> <p>ESO potensial : Mual dan muntah, mulut kering</p> <p>KI : Peningkatan efek obat tidur</p> <p>PERHATIAN : Beri tahu dokter jika Anda sedang hamil, menyusui, atau merencanakan kehamilan.</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.</p>
		<p>Nama Obat : Benovit C</p> <p>Kandungan : Vitamin B1 50 mg, vitamin B2 25 mg, vitamin B6 10 mg, vitamin B12 5 mcg, vitamin C 500 mg, niacinamide 50 mg, Ca pantothenate 20 mg</p> <p>Dosis lazim : 1 kali sehari 1 tablet</p> <p>Kegunaan : pertumbuhan dan perkembangan,</p> <p>Cara penyimpanan : simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan</p> <p>Cara penyimpanan : simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>	

F. Tahap pembuatan

1. Ambil Rhinos SR Caps 10 Tablet dan beri etiket
2. Ambil Codipront Cum 10 Tablet dan beri etiket
3. Ambil Benovit C 10 Tablet dan beri etiket
4. Masukkan semua obat kedalam plastik, beri alamat pengiriman obat

G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

Informasi obat sudah tertera pada kemasan, lalu diserahkan kepada kurir untuk diserahkan ke pasien. Jika pasien masih bingung untuk cara penggunaan bisa menghubungi pihak klinik di nomer yang tertera

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																									
20.		<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1048 475 2199 933"> <tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Surat ijin :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> </table> <p>B. Perhitungn jumlah perbekalan Farmasi</p> <table border="1" data-bbox="1048 1002 2199 1173"> <tr><td>fluimucil dry syrup = 1 botol</td></tr> <tr><td>bicorsan syr = 1 botol</td></tr> </table> <p>C. Perhitungan biaya resep</p>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada	fluimucil dry syrup = 1 botol	bicorsan syr = 1 botol
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																									
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																									
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																									
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																									
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																									
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																									
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																									
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																									
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada																																									
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada																																									
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada																																									
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada																																									
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																									
fluimucil dry syrup = 1 botol																																											
bicorsan syr = 1 botol																																											

flumucil dry syrup = 87.900
bicorsan syr = 20.200
Total = 158.100

D. ETIKET

Fluimucil dry syrup /putih:

APOTEK BANJAR BARU GRESIK	
Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK	
HP. 082244640064	
Indah Faridah, S.Farm. Apt 19870327/SIPA 35.25/2021/2208	
No.Resep :097	Tgl. 13/03/24
Tn. Arrazka Ardayasha	
2 x sehari 5ml (batuk) sesudah makan	

Bicorsan syr /putih:

APOTEK BANJAR BARU GRESIK	
Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK	
HP. 082244640064	
Indah Faridah, S.Farm. Apt 19870327/SIPA 35.25/2021/2208	
No.Resep :097	Tgl. 13/03/24
Tn. Arrazka Ardayasha	
2 x sehari 3 ml sesudah makan	


E. Product knowledge

		<p>Nama Obat : Flumucil dry syrup</p> <p>Kandungan : N-acetylcysteine</p> <p>Dosis Lazim : Dewasa : 10 ml setara dengan N-acetylcysteine 200 mg, diminum 2-3 x sehari ; Anak : 5 ml setara dengan N-acetylcystein 100 mg, diminum 2-4 x sehari ; Anak < 2th : 100 mg / hari ; Anak 2-4 th : 200 mg / hari ; Anak > 4 th : 300 mg / hari</p> <p>Kegunaan : Infeksi saluran nafas dengan sekresi mukus berlebih termasuk bronkitis</p> <p>Eso potensial : Bronkospasme, gangguan lambung</p> <p>KI : hipersensitif</p> <p>PERHATIAN : Hati-hati penggunaan pada penderita asma, jangan melebihi dosis yang dianjurkan</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.</p>	<p>Nama Obat : Bicorsan syr</p> <p>Kandungan : N-acetylcysteine</p> <p>Dosis Lazim : <6 tahun : 0,20-0,25mg 1-2 kali sehari, >6 tahun 1-2 sendok takar sehari.</p> <p>Kegunaan : bronkitis akut dan kronik</p> <p>Eso potensial : mual, pusing, ruam kulit</p> <p>KI : hipersensitivitas</p> <p>PERHATIAN : hamil, usia lanjut, anak</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.</p>
F. Tahap pembuatan			

1. Ambil Fluimucil dry syrup 1 Botol dan beri etiket
2. Ambil Bicorsan syr 1 botol dan beri etiket
3. Masukkan semua obat kedalam plastik, beri alamat pengiriman obat

G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

Informasi obat sudah tertera pada kemasan, lalu diserahkan kepada kurir untuk diserahkan ke pasien. Jika pasien masih bingung untuk cara penggunaan bisa menghubungi pihak klinik di nomer yang tertera

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																						
21.		<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> </tbody> </table>			Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																						
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																						
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																						
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																						
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																						
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																						
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																						
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																						
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada																																						
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada																																						
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada																																						
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada																																						

141121

Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada
--------------	---------------	-----

B. Perhitungn jumlah perbekalan Farmasi

Cefila100mg 10 Tab

C. Perhitungan biaya resep

Cefila tab = 27.972 x 10

Total = 279.720

D. ETIKET

Cefila tab /putih:

APOTEK BANJAR BARU GRESIK	
Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK	
HP. 082244640064	
Indah Faridah, S.Farm. Apt 19870327/SIPA. 35.25/2021/2208	
No.Resep :121	Tgl. 14/03/24
Ny. Pronika Yulianti	
2 x sehari 1 tablet (habiskan) sesudah makan	

E. Product knowledge

Nama obat : cefila tab 100mg

Kandungan : Cefixime Trihydrate 100 mg

Dosis Lazim : Dewasa dan anak dengan BB lebih dari 30kg : 50-100 mg, oral dua kali sehari. Bisa ditingkatkan hingga 200mg 2x/hari untuk kondisi parah atau infeksi yang sulit disembuhkan. - Anak : 10-15 mg/kg bb/hari selama 2 pekan

Kegunaan : mengobati infeksi saluran kencing tak terkomplikasi

Eso potensial : gangguan Gastrointestinal

KI : hipersensitivitas

PERHATIAN : Wanita hamil dan menyusui,anak-anak

Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.

F. Tahap pembuatan

1. Ambil Cefila 10 tab dan beri etiket
2. Masukkan semua obat kedalam plastik, beri alamat pengiriman obat

G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

Informasi obat sudah tertera pada kemasan,lalu diserahkan kepada kurir untuk diserahkan ke pasien. Jika pasien masih bingung untuk cara penggunaan bisa menghubungi pihak klinik di nomer yang tertera

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep
-----------	--------------	---------------------------------

22.		<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Nama Pasien :</td> <td style="width:20%;">Ada/Tidak Ada</td> <td style="width:30%;">Ada</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tidak Ada</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada															
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada															
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada															
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada															
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada															

Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Rhinos neo drop Tempra syr jeruk Imedco kid D3 drop

C. Perhitungan biaya resep

Rhinos neo drop = 75.924 Tempra syr jeruk = 56.743 Imedco kid D3 drop = 118.000 Total = 250.662

D. ETIKET

Rhinos neo drop /putih:

APOTEK BANJAR BARU GRESIK Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK HP. 082244640064 Indah Faridah, S.Farm. Apt 19870327/SIPA. 35.25/2021/2208	
No.Resep :166	Tgl. 15/03/24

Th. Arrazka Ardayasha

3 x sehari 0,8 ml (pilek) sesudah makan

Tempra syr jeruk / putih :

APOTEK BANJAR BARU GRESIK Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK HP. 082244640064 Indah Faridah, S.Farm. Apt 19870327/SIPA_35.25/2021/2208	
No.Resep :166	Tgl. 15/03/24
Tn. Arrazka Ardayasha	
3 x sehari 1 sendok makan (demam)	
sesudah makan	


Imedco kid D3 drop / putih :

APOTEK BANJAR BARU GRESIK Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK HP. 082244640064 Indah Faridah, S.Farm. Apt 19870327/SIPA_35.25/2021/2208	
No.Resep :166	Tgl. 15/03/24
Tn. Arrazka Ardayasha	
x sehari 1 ml sesudah makan	

E. Product knowledge

Nama obat : Rhinos Neo drop Kandungan : pseudoephedrin HCl 7,5 mg/ 0,8 ml Dosis Lazim : anak 2-5 tahun : 3 x sehari 0,8 ml Kegunaan : meredakan gejala hidung tersumbat karena flu Eso potensial : insomnia, sakit kepala KI : hipersensitivitas	Nama obat : tempra Syrup jeruk Kandungan : paracetamol 250 mg Dosis Lazim : 6-8 tahun : 5ml diminum bila perlu satu dosis tiap 4 jam, tidak lebih dari 5 x/hari Kegunaan : meredakan demam, rasa sakit dan nyeri ringan, sakit kepala dan sakit gigi, demam setelah imunisasi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>PERHATIAN : Anak usia < 2 tahun</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.</p>	<p>Eso potensial : penggunaan dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan hati, reaksi hipersensitif</p> <p>KI : jangan digunakan untuk penderita sakit hati</p> <p>PERHATIAN : penderita kerusakan hati, alergi terhadap paracetamol</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.</p>
		<p>Nama obat : Kid D3 drop</p> <p>Kandungan : Vitamin D3</p> <p>Dosis Lazim : Dewasa dan anak usia lebih dari 1 tahun: 1 kali 1 ml.</p> <p>Kegunaan : Meningkatkan daya tahan tubuh serta dapat menjaga kesehatan tulang.</p> <p>Eso potensial : mual, sembelit</p> <p>KI : hipersensitivitas</p> <p>PERHATIAN : harus dengan resep dokter</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.</p>	
		<p>F. Tahap pembuatan</p>	

		<p>1. Ambil Rhinos neo drop dan beri etiket 2. Ambil Tempra syr jeruk dan beri etiket 3. Ambil Imedco kid D3 drop dan beri etiket 4. Masukkan semua obat kedalam plastik, beri alamat pengiriman obat</p> <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Informasi obat sudah tertera pada kemasan, lalu diserahkan kepada kurir untuk diserahkan ke pasien. Jika pasien masih bingung untuk cara penggunaan bisa menghubungi pihak klinik di nomer yang tertera</p>									
<p>No</p>	<p>Resep</p>	<p>Tahapan Pengerjaan Resep</p>									
<p>23.</p>		<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tidak Ada</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada									
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada									
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada									

Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Cerini 10 Tab Besanmag 10 Tab

C. Perhitungan biaya resep

Cerini tab = $5.062 \times 10 = 50.620$ Besanmag = $1.232 \times 10 = 12.320$ Total = 62.940

D. ETIKET

Cerini /putih:

APOTEK BANJAR BARU GRESIK Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK HP. 082244640064

Indah Faridah, S.Farm., Apt 19870327/SIPA_35.25/2021/2208
 No.Resep :100 Tgl. 13/03/24
 Ny. Suharijani
 1 x sehari 1 (gatal) sesudah makan


Besanmag / putih :

APOTEK BANJAR BARU GRESIK
 Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK
 HP. 082244640064
 Indah Faridah, S.Farm., Apt 19870327/SIPA_35.25/2021/2208
 No.Resep :100 Tgl. 13/03/24
 Ny. Suharijani
 3 x sehari 1 sesudah makan

E. Product knowledge

<p>Nama obat : cerini tab 10mg</p> <p>Kandungan : Cetirizine HCl.</p> <p>Dosis Lazim : Dewasa & anak > 6 tahun : 1 kaplet, 1 kali sehari.</p> <p>Kegunaan : Pengobatan rinitis parenial, rinitis alergi, urtikaria idiopatik kronis.</p> <p>Eso potensial : Mengantuk, pusing, sakit kepala</p> <p>KI : hipersensitivitas, gangguan ginjal berat</p> <p>PERHATIAN : Wanita hamil, laktasi.</p>	<p>Nama obat : besanmag</p> <p>Kandungan : Mg trisilicate 325 mg Al(OH)₃ colloidal 325 mg, Papaverine HCl 30 mg, Chlordiazepoxide HCl 5 mg, Vitamin B1 2 mg, Vitamin B2 1 mg, Vitamin B6 0.5 mg, Vitamin B12 1 mcg, Niacinamide 5 mg, Ca pantothenate 1 mg</p> <p>Dosis Lazim : 1-2 tablet perhari</p> <p>Kegunaan : Pengobatan rinitis parenial, rinitis alergi, urtikaria idiopatik kronis.</p> <p>Eso potensial : Mengantuk, pusing, sakit kepala</p> <p>KI : hipersensitivitas, gangguan ginjal berat</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.</p>	<p>PERHATIAN : penderita gangguan ginjal dan diet rendah fospat. Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.</p>
		<p>F. Tahap pembuatan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ambil cerini tab dan beri etiket2. Ambil besanmag dan beri etiket3. Masukkan semua obat kedalam plastik, beri alamat pengiriman obat	
		<p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Informasi obat sudah tertera pada kemasan,lalu diserahkan kepada kurir untuk diserahkan ke pasien. Jika pasien masih bingung untuk cara penggunaan bisa menghubungi pihak klinik di nomer yang tertera</p>	

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
24.		<p data-bbox="996 231 1339 263">A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1048 263 2197 726"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada</td> </tr> </table> <p data-bbox="996 758 1534 790">B. Perhitungn jumlah perbekalan Farmasi</p> <div data-bbox="1048 790 2197 965" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Canderin 16mg 30 Tab</p> </div> <p data-bbox="996 997 1355 1029">C. Perhitungan biaya resep</p> <div data-bbox="1048 1029 2197 1189" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Canderin 16mg = 12.654x30 Total = 379.620</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							

D. ETIKET

Canderin 16mg / putih:

APOTEK BANJAR BARU GRESIK	
Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK	
HP. 082244640064	
Indah Faridah, S.Farm. Apt 19870327/SIPA. 35.25/2021/2208	
No.Resep :090	Tgl. 13/03/24
Ny. Suharijani	
1 x sehari 1 pagi (hipertensi) sesudah makan	

E. *Product knowledge*

Nama obat : Canderin 16mg

Kandungan : candesartan 16mg

Dosis Lazim : dosis awal 4mg/hari, maksimal 16mg/hari. Efek antihipertensi maksimal dicapai dalam waktu 4 minggu setelah pengobatan

Kegunaan : hipertensi, pengobatan pada pasien gagal jantung dan gangguan fungsi sistolik ventrikel kiri ketika obat penghambat ACE tidak ditolerir

Eso potensial : pusing, infeksi saluran pernafasan atas, faringitis, rinitis

KI : hipersensitivitas

PERHATIAN : hipersensitif terhadap komponen, wanita hamil


Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.

F. Tahap pembuatan

1. Ambil Canderin 16mg 30 Tab dan beri etiket
2. Masukkan semua obat kedalam plastik, beri alamat pengiriman obat

G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

Informasi obat sudah tertera pada kemasan,lalu diserahkan kepada kurir untuk diserahkan ke pasien. Jika pasien masih bingung untuk cara penggunaan bisa menghubungi pihak klinik di nomer yang tertera

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
25.		<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1048 507 2197 970"> <tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Surat ijin :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> </table> <p>B. Perhitungn jumlah perbekalan Farmasi</p> <div data-bbox="1048 1038 2197 1206" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Lodia 10 Tab Interlac 6 Tab</p> </div> <p>C. Perhitungan biaya resep</p>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							

Lodia = $1.465 \times 10 = 14.650$
Interlac = $13.990 \times 6 = 83.940$
Total = 98.590

D. ETIKET
Lodia /putih:

APOTEK BANJAR BARU GRESIK	
Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK	
HP. 082244640064	
Indah Faridah, S.Farm. Apt 19870327/SIPA 35.25/2021/2208	
No.Resep :125	Tgl. 14/03/24
Tn. Tukiman	
2 x sehari 2 (sehabis BAI) sesudah makan	

Interlac / putih :

APOTEK BANJAR BARU GRESIK	
Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK	
HP. 082244640064	
Indah Faridah, S.Farm. Apt 19870327/SIPA 35.25/2021/2208	
No.Resep :125	Tgl. 14/03/24
Tn. Tukiman	
1 x sehari 1 (dikunyah) sesudah makan	

E. *Product knowledge*

Nama obat : lodia tab

Kandungan : Loperamide HCL


Nama obat : interlac tab

Kandungan : bulking agent (isomalt), pemanis (xylitol), L. reuteri DSM 17938, minyak sawit,

		<p>Dosis Lazim : Diare akut non spesifik Dosis awal 2 tablet, selanjutnya dapat dikonsumsi setiap setelah BAB 1-2 tablet 1-2 x/hari. Maksimal 8 tablet per hari. Diare kronik Dosis awal 2 tablet, lalu dapat dikonsumsi kembali setiap setelah BAB 2-4 tablet /hari dalam dosis terbagi. Maksimal 8 tablet/ hari. Bila setelah 48 jam tdk ada perbaikan, hentikan terapi. Kegunaan : Diare akut non spesifik dan diare kronik</p> <p>Eso potensial : Nyeri abdomen, megakolon toksik, pusing, lelah, ruam kulit</p> <p>KI : hipersensitivitas</p> <p>PERHATIAN : Hentikan setelah 48 jam jika tdk ada perbaikan. Kolitis akut. Infeksi bakteri atau parasit. Anak kurang dari 2 Tahun. Ggn fungsi hati.</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.</p>	<p>penyedap rasa stroberi dan penambah rasa (asam sitrat).</p> <p>Dosis Lazim : 1-2x sehari Diare akut non spesifik Dosis awal 2 tablet, selanjutnya dapat dikonsumsi setiap setelah BAB 1-2 tablet 1-2 x/hari. Maksimal 8 tablet per hari. Diare kronik Dosis awal 2 tablet, lalu dapat dikonsumsi kembali setiap setelah BAB 2-4 tablet /hari dalam dosis terbagi. Maksimal 8 tablet/ hari. Bila setelah 48 jam tdk ada perbaikan, hentikan terapi.</p> <p>Kegunaan : memelihara kesehatan fungsi pencernaan pd neonatur</p> <p>Eso potensial : Nyeri abdomen, megakolon toksik, pusing, lelj</p> <p>KI : hipersensitivitas</p> <p>PERHATIAN : jangan gunakan melebihi aturan pakai</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.</p>
		<p>F. Tahap pembuatan</p>	

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Lodia 10 Tab dan beri etiket 2. Ambil Interlac 6 Tab dan beri etiket 3. Masukkan semua obat kedalam plastik, beri alamat pengiriman obat <p>G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>Informasi obat sudah tertera pada kemasan,lalu diserahkan kepada kurir untuk diserahkan ke pasien. Jika pasien masih bingung untuk cara penggunaan bisa menghubungi pihak klinik di nomer yang tertera</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep
-----------	--------------	---------------------------------

26.		<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Surat ijin :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> </table> <p>B. Perhitungn jumlah perbekalan Farmasi</p>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							

Irvel 150mg 30 tab
Bisovel 2,5mg 30 tab
Nistrol 20mg 30 tab

C. Perhitungan biaya resep

Irvel 150mg = 30 x 11.322 = 339.660
Bisovel 2,5mg = 30 x 2.940 = 88.200
Nistrol 20mg = 30 x 11.988 = 359.640
Total = 787.500

D. ETIKET

Irvel 150mg /putih:

APOTEK BANJAR BARU GRESIK	
Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK	
HP. 082244640064	
Indah Faridah, S.Farm. Apt 19870327/SIPA_35.25/2021/2208	
No.Resep :088	Tgl. 13/03/24
Ny. Ngateman	
1 x sehari 1 pagi (hipertensi) sesudah makan	

Bisovel 2,5mg / putih :

APOTEK BANJAR BARU GRESIK	
Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK	
HP. 082244640064	
Indah Faridah, S.Farm. Apt 19870327/SIPA_35.25/2021/2208	
No.Resep :088	Tgl. 13/03/24
Ny. Ngateman	
1 x sehari 1 siang (hipertensi) sesudah makan	

Nistrol 20mg / putih :

APOTEK BANJAR BARU GRESIK Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK HP. 082244640064 Indah Faridah, S.Farm., Apt 19870327/SIPA_35.25/2021/2208	
No.Resep :088	Tgl. 13/03/24
Ny. Ngateman	
1 x sehari 1 malam (kolestrol) sesudah makan	

E. *Product knowledge*

Nama obat : Irvell 150mg

Kandungan : irbesartan 150 mg

Dosis Lazim : dosis awal 75 mg. Dosis pemeliharaan 150 mg x sehari, dapat ditingkatkan sampai 300 mg perhari.

Kegunaan : hipertensi esensial, untuk menurunkan mikro dan makro albuminurea pada pasien hipertensi dengan diabetik nefropati yang disebabkan oleh non insulin dependent diabetic mellitus (niddm)

Eso potensial : sakit kepala, pusing, takikardia, hipotensi, batuk, mual/mutah, diare, heartburn, disfungsi seksual, lelah, nyeri dada, nyeri otot, ruam kulit, hiperkalemia, hepatitis, kelainan pada telinga (tinnitus)

KI :hipersentivitas

Nama obat : bisovel 2,5mg

Kandungan : bisoprolol hemifumarat 5 mg

Dosis Lazim : Gagal jantung kongestif: Peningkatan dosis dilakukan secara bertahap, mulai dr 1.25 mg selama 1 minggu, lalu 2.5 mg selama 1 minggu berikutnya, 3.75 mg 1 minggu berikutnya, 5 mg untuk 4 minggu berikutnya, 7.5 mg untuk 4 minggu berikutnya. Dosis rumat: 10 mg. Hipertensi & angina pektoris 1 tab, dapat ditingkatkan s/d 2-4 tab/hari. Semua dosis diberikan 1 x/hari. Stadium akhir gangguan fungsi ginjal & gangguan fungsi hati berat Maks: 2 tab/hari.

Kegunaan : Sebagai monoterapi atau kombinasi terapi untuk Hipertensi

Eso potensial : Rasa dingin atau kebas pada kaki


		<p>PERHATIAN : hipersensitif terhadap irbesartan, kehamilan trimester ke-2 dan ke-3, ibu menyusui</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.</p>	<p>KI : obat ini tidak boleh diberikan pada Pasien yang mempunyai sakit gagal jantung</p> <p>PERHATIAN : Pemberian anastesi melalui inhalasi. Hamil & laktasi.</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.</p>
		<p>Nama Obat : Nistrol 10 mg</p> <p>Kandungan : Rosuvastatin Ca</p> <p>Dosis lazim : 10mg – 20mg perhari</p> <p>Kegunaan : Mengontrol kadar lemak</p> <p>ESO potensial : Rhabdomyolisis</p> <p>KI : Hipersentivitas</p> <p>PERHATIAN : Tidak boleh digunakan untuk ibu hamil dan menyusui.</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung</p>	

F. Tahap pembuatan

1. Ambil Irvell 150mg 30 tab dan beri etiket
2. Ambil bisovel 2,5mg 30 tab dan beri etiket
3. Ambil Nistrol 10 mg 30 tab dan beri etiket
4. Masukkan semua obat kedalam plastik, beri alamat pengiriman obat

G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

Informasi obat sudah tertera pada kemasan,lalu diserahkan kepada kurir untuk diserahkan ke pasien. Jika pasien masih bingung untuk cara penggunaan bisa menghubungi pihak klinik di nomer yang tertera

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
27.		<p data-bbox="987 213 1328 240">A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1037 245 2190 703"> <tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Surat ijin :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> </table> <p data-bbox="981 743 1518 770">B. Perhitungn jumlah perbekalan Farmasi</p> <div data-bbox="1037 775 2190 943" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Tensivaks 5mg 30 tabs</p> </div> <p data-bbox="987 979 1346 1007">C. Perhitungan biaya resep</p> <div data-bbox="1037 1011 2190 1166" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Tensivaks 5mg = 30 x 7.793 = 233.790 Total = Rp. 233.790</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							

D. ETIKET

Tensivaks 5mg /putih:

APOTEK BANJAR BARU GRESIK	
Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK	
HP. 082244640064	
Indah Faridah, S.Farm, Apt 19870327/SIPA_35.25/2021/2208	
No.Resep :126	Tgl. 14/03/24
Ny. I Putu Gede	
1 x sehari 1 pagi (hipertensi) sesudah makan	

E. *Product knowledge*

Nama obat : tensivaks 5mg

Kandungan : amlodipine 5 mg

Dosis Lazim : 1 x sehari 1 tablet

Kegunaan : mengontrol tekanan darah,hipert

Eso potensial : sakit kepala, edema,

KI : -

PERHATIAN : penderita yang sensitif terhadap dihidropiridin

Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.

F. Tahap pembuatan


1. Ambil tensivaks 5mg 30 Tab dan beri etiket
2. Masukkan semua obat kedalam plastik, beri alamat pengiriman obat

G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

Informasi obat sudah tertera pada kemasan,lalu diserahkan kepada kurir untuk diserahkan ke pasien. Jika pasien masih bingung untuk cara penggunaan bisa menghubungi pihak klinik di nomer yang tertera

--	--	--



No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
28.		<p data-bbox="987 213 1328 240">A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1037 245 2190 703"> <tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Surat ijin :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> </table> <p data-bbox="987 743 1518 770">B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div data-bbox="1037 775 2190 943" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p data-bbox="1144 780 1373 807">Baquinor F 15 tabs</p> </div> <p data-bbox="987 1046 1346 1074">C. Perhitungan biaya resep</p> <div data-bbox="1037 1078 2190 1230" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p data-bbox="1144 1086 1581 1114">Baquinor F = 15 X 18.515 = 277.725</p> <p data-bbox="1144 1118 1384 1145">Total = Rp. 277.725</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							

D. ETIKET

Baquinor F 15 tabs /putih:

APOTEK BANJAR BARU GRESIK	
Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK	
HP. 082244640064	
Indah Faridah, S.Farm. Apt 19870327/SIPA 35.25/2021/2208	
No.Resep :124	Tgl. 14/03/24
Ny. Sri Darbeni	
2 x sehari 1 (Habiskan) sesudah makan	

E. *Product knowledge*

Nama obat : Baquinor F

Kandungan : Ciprofloxacin

Dosis Lazim : Infeksi ringan : 250 mg 2 kali sehari. Infeksi berat : 500 -750 mg 2 kali sehari

Kegunaan : infeksi sal nafas bawah, pneumonia, infeksi kulit

Eso potensial : Reaksi GI

KI : hamil dan menyusui

PERHATIAN : gangguan ginjal dan hati

Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.

F. Tahap pembuatan


1. Ambil Baquinor F 15 Tab dan beri etiket
2. Masukkan semua obat kedalam plastik, beri alamat pengiriman obat

G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

Informasi obat sudah tertera pada kemasan,lalu diserahkan kepada kurir untuk diserahkan ke pasien. Jika pasien masih bingung untuk cara penggunaan bisa menghubungi pihak klinik di nomer yang tertera

--	--	--



No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
29.		<p data-bbox="987 213 1328 240">A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1037 245 2190 703"> <tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Surat ijin :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> </table> <p data-bbox="987 743 1525 770">B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div data-bbox="1037 775 2190 943" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p data-bbox="1144 780 1442 807">Burnazin Cr 10gr 1 botol</p> </div> <p data-bbox="987 983 1346 1010">C. Perhitungan biaya resep</p> <div data-bbox="1037 1015 2190 1166" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p data-bbox="1144 1019 1469 1046">Bumazin Cr 10gr = 86.620</p> <p data-bbox="1144 1051 1368 1078">Total = Rp. 86.620</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							

D. ETIKET

Bumazin Cr 10gr / biru:

APOTEK BANJAR BARU GRESIK	
Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK	
HP. 082244640064	
Indah Faridah, S.Farm, Apt 19870327/SIPA.35.25/2021/2208	
No.Resep :129	Tgl. 14/03/24
Ny. Sri Wahyuni	
2 x sehari (pemakaian luar)	

E. *Product knowledge*

Nama obat : Bumazin cr 10g

Kandungan : silver sulfadiazine

Dosis Lazim : Setelah luka dibersihkan, gunakan krim dengan kasa steril pada permukaan kulit yang terbakar 1-2 kali sehari dengan ketebalan 2 mm. Terapi dilanjutkan sampai sembuh betul atau sampai bagian yang terbakar siap untuk pencangkokan kulit.

Kegunaan : Semua stadium luka bakar.

Eso potensial : rasa terbakar dan gatal

KI : hamil dan menyusui

PERHATIAN : gangguan ginjal dan hati

Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung

F. Tahap pembuatan


1. Ambil Bumazin Cr 10gr 1 botol dan beri etiket
2. Masukkan semua obat ke dalam plastik, beri alamat pengiriman obat

G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

Informasi obat sudah tertera pada kemasan, lalu diserahkan kepada kurir untuk diserahkan ke pasien. Jika pasien masih bingung untuk cara penggunaan bisa menghubungi pihak klinik di nomor yang tertera

--	--	--



No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
30.		<p data-bbox="965 212 1310 240">A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1037 244 2190 703"> <tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tidak Ada</td></tr> <tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Surat ijin :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> <tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td></tr> </table> <p data-bbox="983 738 1529 767">B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div data-bbox="1037 770 2190 943" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p data-bbox="1144 774 1332 802">Braxidin 10 tab</p> </div> <p data-bbox="983 1042 1346 1070">C. Perhitungan biaya resep</p> <div data-bbox="1037 1074 2190 1230" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p data-bbox="1144 1077 1518 1106">Braxidin = 10 x 1.665 = 16.650</p> <p data-bbox="1144 1109 1373 1137">Total = Rp. 16.650</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada																																							

D. ETIKET

Braxidin /putih:

APOTEK BANJAR BARU GRESIK	
Jl. Banjar Baru NO.02 GKB GRESIK	
HP. 082244640064	
Indah Faridah, S.Farm, Apt 19870327/SIPA_35.25/2021/2208	
No.Resep :136	Tgl. 14/03/24
Ny. Sri Wahyuni	
2 x sehari 1 (sesudah makan)	

E. *Product knowledge*

Nama obat : Braxidin tabs

Kandungan : silver sulfadiazine

Dosis Lazim : Setelah luka dibersihkan, gunakan krim dengan kasa steril pada permukaan kulit yang terbakar 1-2 kali sehari dengan ketebalan 2 mm. Terapi dilanjutkan sampai sembuh betul atau sampai bagian yang terbakar siap untuk pencang

Kegunaan : mengurang gejala

Eso potensial : Jangan langsung mengemudi atau melakukan aktivitas lain

KI : hamil dan menyusui

PERHATIAN : pembelian melebihi batas ini wajib menggunakan resep dokter

Cara penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.

F. Tahap pembuatan

1. Ambil Braxidin 10 Tab dan beri etiket
2. Masukkan semua obat kedalam plastik, beri alamat pengiriman obat

G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

Informasi obat sudah tertera pada kemasan,lalu diserahkan kepada kurir untuk diserahkan ke pasien. Jika pasien masih bingung untuk cara penggunaan bisa menghubungi pihak klinik di nomer yang tertera

--	--	--



B. PRODUCT KNOWLEDGE BERDASARKAN KELAS TERAPI


(1) ANALGETIK- ANTIPIRETIK- ANTIINFLAMASI

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Analgetik- Antipiretik- Antiinflama si	Acetaminophe n	pamol	Penderita gangguan fungsi hati berat dan hipersensitif	Meredakan sakit kepala, sakit gigi,nyeri otot dan menurunkan demam dan nyeri	Dewasa : 1 - 2 tab 3 - 4 kali / hari. Max 8 tab / hari. Anak 6 - 12 tahun : 1/2 - 1 tab, 3 - 4 kali / hari. Max 4 tab / hari	Dosis yang besar dan pemakaian jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati. Reaksi alergi. Mual, muntah, diare, diaforesis, wajah pucat dan nyeri perut	Disimpan di suhu ruang. Ditempat yang kering dan terlindung dari cahaya matahari langsung
	Metampiron	Neuralgin	Ulkus peptikum. Bronkospasme, alergi rinitis, urtikaria,	Meringankan rasa nyeri seperti sakit	Dewasa : 3 - 4 x sehari , 1 - 2 tab.	Efek samping yang mungkin terjadi dalam penggunaan obat adalah:	. Disimpan di suhu

			hipersensitif metampiron	kepala, sakit gigi, kram perut (dysminorrhea), nyeri pasca operasi, nyeri saraf seperti neuritis dan neuralgia	Anak 3 - 4 x sehari, 1/2 - 1 tab	Gangguan saluran cerna, gangguan pembekuan darah, gangguan kardiovaskuler, reaksi hipersensitif, gangguan fungsi ginjal	ruang. Ditempat yang kering dan terlindung dari cahaya matahari langsung
--	--	--	--------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------


Ibuprofen	1. Ibuprofen 2. Rhelafen syrup	Penderita dengan ulkus peptikum (tukak lambung dan duodenum) yang berat dan aktif. Penderita dengan riwayat hipersensitif terhadap Ibuprofen dan obat anti inflamasi non steroid lain. Penderita sindroma polip hidung, angioedema dan penderita dimana bila menggunakan aspirin atau obat anti inflamasi non steroid akan timbul gejala asma, rinitis atau urtikaria. Kehamilan tiga bulan terakhir.	Nyeri ringan sampai sedang antara lain nyeri pada penyakit gigi atau pencabutan gigi, nyeri pasca bedah, sakit kepala, gejala artritis reumatoid, gejala osteoarthritis, gejala juvenile artritis reumatoid, menurunkan demam pada anak.	Dewasa : 3 kali sehari 1-2 tablet. Anak-anak : 20 mg/kg berat badan/hari dibagi menjadi beberapa kali pemberian. Dikonsumsi Bersama dengan makan	Mual, muntah, diare, konstipasi, nyeri kambung, ruam kulit, sakit kepala, pusing	Simpan ditempat sejuk dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung
Asam Mefenamat	1. Mefinal 2. Asam mefenamat	Hipersensitivitas. Pasien dengan aktif atau riwayat tukak/perdarahan peptikum berulang, riwayat perdarahan gastrointestinal atau perforasi (terkait dengan terapi NSAID sebelumnya), penyakit radang usus, gagal jantung berat, riwayat asma, bronkospasme, rinitis, angioedema, urtikaria, atau tipe	Meredakan nyeri ringan hingga sedang pada sakit kepala, sakit gigi, dismenore primer, juga nyeri traumatik, otot, dan pasca operasi	dewasa : awal 500 mg, dilanjutkan 250 mg/6 jam. Segera sesudah makan	Gangguan GI, mengantuk, hipertensi, diare	Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari

			<p>alergi reaksi setelah minum aspirin atau NSAID lainnya. Pengobatan nyeri peri-operatif dalam pengaturan operasi CABG.</p>			
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



Piroxicam	Tidak tersedia	Wanita hamil, menyusui, dan mengalami masalah kesuburan.	Osteo arthrits, ankilosa spondilitis, gangguan muskuloskeleta l akut, gout akut, nyeri persendian	AR, OA, ankilosa spondilitis : 1 x sehari 20mg ; Gangguan muskoloskeletal akut : 40 mg/hari dalam dosis tunggal atau terbagi selama 2 hari,	Gangguan lambung, sakit kepala, iritasi dan ulkus gaster (dosis > 20mg /hari)	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung	

Fenilbutazon	Tidak tersedia	-	Penyakit radang dan rematik	Dosis awal 100-200 mg 3 perhari. Dikonsumsi bersamaan dengan makan	Sakit perut atau muntah, <i>Heartburn</i> , Diare atau konstipasi, kembung, pusing, kantuk dan lemas.	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung
Aspirin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cardio aspirin 2. Aspilet 3. Proxime 4. Aptor 	<p>Sebaiknya hindari penggunaan apabila kamu memiliki kondisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hipersensitif pada kandungan dari Aptor • Riwayat asma bronkial • Bronkospasme • Tukak lambung dan usus • Riwayat pendarahan pada saluran cerna • Gangguan pembekuan darah • Hamil dan menyusui 	Pengobatan dan pencegahan angina pectoris dan infark miokard, demam, nyeri pasca vaksinasi, sakit gigi, nyeri otot dan nyeri sara	Pengobatan dan pencegahan angina pectoris dan infark miokard : 1 x sehari 1 tablet ; Untuk keluhan Demam, flu, pusing dan nyeri pada pasien dewasa : 4-6 x sehari 1 tablet, Anak 5-12 tahun : 2-3 x sehari 1 tablet, Anak 1-4 tahun : 3-4 x sehari 1/4 tablet. Berikan sesudah makan	Gangguan lambung, pusing, hipersensitif reaksi	Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari



	Meloksikam		Hipersensitif terhadap meloxicam, aspirin atau NSAID lainnya. Riwayat atau	Meredakan gejala-gejala arthritis, misalnya	Dewasa: Rheumatoid Astritis dan Ankylosing	Efek samping yang mungkin terjadi dalam penggunaan obat adalah:	Simpan ditempat sejuk dan, terlindung

			<p>perdarahan gastrointestinal aktif, ulserasi atau perforasi yang berhubungan dengan penggunaan NSAID. Penyakit radang usus aktif (misalnya penyakit Crohn pada kolitis ulserativa), gagal jantung berat.</p> <p>Pengobatan nyeri perioperatif dalam pengaturan operasi CABG. Kerusakan hati yang parah. Kehamilan (trimester ke-3) dan menyusui</p>	<p>peradangan, pembengkakan, serta kaku dan nyeri otot. Contoh penyakit radang persendian yang biasanya ditangani dengan meloxicam adalah osteoarthritis (jangka pendek), rheumatoid arthritis, dan ankylosing spondylitis.</p>	<p>Spondylitis: 15 mg, 1 kali per hari. Dapat diturunkan menjadi 7.5 mg, 1 kali per hari</p>	<p>Signifikan: Retensi cairan, edema, insufisiensi ginjal, gagal ginjal akut, nekrosis papiler ginjal (penggunaan jangka panjang), hiperkalemia, penglihatan kabur,</p>	<p>dari cahaya matahari</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Celecoxib	Celebrex 200 mg	<p>Hindari penggunaan Celebrex pada pasien dengan kondisi berikut ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> Riwayat alergi atau hipersensitif terhadap Celecoxib 	<p>Pengobatan nyeri dan peradangan, pengobatan dari gejala rematik (R A),</p>	<p>OA : 200mg/hari atau 100mg 2 x sehari; RA : 100-200mg 2 x sehari; AS : 200mg/hari atau 100mg 2 x sehari. Sesudah makan</p>	<p>Sesak, gangguan gastrointestinal (mual, muntah), pusing, vertigo, rash, urtikaria</p>	<p>Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>

			<p>dan sulfonamid</p> <ul style="list-style-type: none">• punya riwayat penyakit asma, urtikaria, atau reaksi alergi	<p>osteoarthritis (OA), ankylosing spondylitis (AS)</p>		
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--	--



	Parexocib	Dynastat injeksi	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien yang memiliki riwayat sensitif/ alergi pada obat yang mengandung Sulfonamid. • Pasien yang memiliki riwayat asma/ kesulitan dalam bernafas. • Gangguan penyakit hati berat. • Riwayat penyakit pada usus besar. 	Meringankan rasa sakit/ nyeri dan meringankan peradangan/ pembengkakan pasca operasi pada orang dewasa.	<ul style="list-style-type: none"> • Dosis awal penggunaan: di berikan dosis 1 vial 40 mg di suntikan melalui pembuluh vena (pembuluh darah). <p>Dosis selanjutnya: di berikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menyebabkan hipertensi. • Tekanandarah redah. • Nyeri punggung. • Berkurangn ya fungsi pencernaan . • Kembung. • Gangguan susah tidur. • Sesak nafas. 	Simpan pada suhu di bawah 30derajat Celcius dan terlindung dari cahaya. Jangan didinginkan atau dibekukan larutan yangtelah dilarutkan. Setelah serbuk injeksi dilarutkan,
--	-----------	------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2.a) ANTIBIOTIK

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Penisilin	Ampicillin, amoksisilin	<ol style="list-style-type: none"> Amoxan 500 mg Intermoxil syrup Amoxan drop 	Hipersensitivitas atau riwayat reaksi alergi berat (misalnya anafilaksis, sindrom Stevens-Johnson) terhadap amoksisilin atau -laktam lainnya (misalnya penisilin, sefalosporin, karbapenem, monobaktam).	Untuk terapi infeksi gram positif dan negatif, seperti pada saluran nafas atas dan bawah, saluran kemih dan kelamin. Kulit & jaringan lunak, infeksi tulang, GO, abses gigi	Dewasa & anak-anak dengan berat badan 20 kg atau lebih : 250-500 mg tiap 8 jam. Anak-anak dengan berat badan lebih dari 8 kg : 125-250 mg tiap 8 jam. Tifoid & paratifoid : dewasa : 4 gram/hari dalam	Reaksi hipersensitivitas dan gangguan GI.	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari
	Ticarsiclin	Tetrasanbe	Hipersensitif, gangguan ginjal berat, Hamil, dan anak < 12 tahun.	Infeksi saluran pernafasan, saluran pencernaan, saluran kencing, alat kelamin	Dosis umum: 250 mg tiap 6 jam. Pada infeksi berat dapat ditingkatkan sampai 500 mg tiap 6-8 jam. Sifilis primer, sekunder dan laten: 500 mg tiap 6-8 jam selama 15 hari. Uretritis non gonokokus: 500 mg	Anoreksia, mual, muntah, diare, glossitis, disfagia, enterokolitis, lesi inflamasi, ruam makulopapular dan eritematosa, fotosensitasi	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung

					tiap 6 jam selama 7-14 hari (21 hari bila pengobatan pertama gagal atau bila kambuh).		
Cephalosporin	cefadroxil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cefadroxil kapsul 500 mg 2. Cefat kapsul 500 mg 3. Cefat syrup 4. Cefadroxyl syrup 5. Lapice f drop 	Tidak boleh diberikan pada pasien yang hipersensitif terhadap sefalosporin.	Infeksi saluran pernafasan, infeksi kulit dan jaringan lunak, infeksi saluran kemih, osteomielitis dan septik arthritis	2 kali sehari 1 kapsul, atau bisa dosis tunggal 1000mg sekali minum per hari. Sebelum atau sesudah makan dihabiskan	Mual, muntah, diare, ruam urtikaria, pruritis, genital pruritus, genital moniliasis, vaginitis	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung
	Cefixime	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lanfix tab 2. Cefspan Syrup 	Tidak boleh diberikan pada pasien yang memiliki riwayat hipersensitif (reaksi alergi) terhadap sefalosporin	Otitis media, faringitis, tonsilitis, bronkitis akut & bronkitis kronik dengan eksaserbasi akut, Infeksi Saluran Kemih tak terkomplikasi, GO	<p>Dewasa & anak lebih dari 30 kg 50-100 mg 2 x perhari.</p> <p>Infeksi berat: 200 mg 2 x perhari.</p> <p>Anak kurang dari 30 kg 1.5-3 mg/kg BB 2 x perhari.</p> <p>Infeksi berat: 6 mg/kg BB 2 x perhari.</p>	Reaksi alergi, perubahan parameter hematologi, gangguan Gastro Intestinal, defisiensi vit K.	Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindungi dari cahaya matahari

	Cefotaxime	Cefotaxime	<p>Tidak dapat digunakan untuk pasien yang memiliki hipersensitif terhadap antibiotik cephalosporin (antibiotik untuk membunuh bakteri dengan cara menghambat pembentukan dinding sel bakteri).</p>	<p>Untuk membantu mengobati infeksi pada saluran nafas bagian bawah, sistem saluran kemih dan saluran kelamin, infeksi alat kelamin, infeksi saluran cerna, infeksi tulang dan sendi, infeksi sistem syaraf, serta infeksi sel darah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Infeksi bakteri yang peka terhadap Cefotaxime: dosis 1-2 g diberikan tiap 8-12 jam. Maksimal dosis: 12 g / hari. • Septikemia: diberikan dosis sampai 6-8 g/ hari dalam 3-4 dosis terbagi. • Mencegah infeksi bedah: dosis 1 g diberikan 30-90 menit 	<ul style="list-style-type: none"> • Gangguan saluran pencernaan: colitis (peradangan pada usus besar), diare, mual, muntah, nyeri perut. <p>Susunan saraf pusat: sakit kepala, pusing.</p>	<p>Simpan pada suhu 15-30 derajat Celcius, di tempat kering dan sejuk.</p>
--	------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

					sebelum		
Chloramphenicol	kloramfenikol	Tidak Tersedia	hipersensitivitas, ibu hamil, menyusui, porfiria	Bruselosis, pneumonia bakteri, pertusis, meningitis non- TBC, demam tifus dan paratifus, skrub tipus, tifus epidemik, limfogranuloma inguinale, gastroenteritis pada bayi, laringotrakeobronkitis, disentri basil, demam Q, ornitosis, sifilis,	Dewasa, anak dan bayi > 2 minggu: sehari 50 mg/kgBB dalam 3-4 dosis. Bayi < 2 minggu & bayi prematur 25 mg/kgBB/hari dibagi 4 dosis.	Depresi sum-sum tulang, anemia aplastik, sindroma gray pada bayi, ruam kulit, urtikaria, gangguan pencernaan, enterokolitis	Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindungi dari cahaya matahari
	thiamfenikol	Thiamfenikol	Hindari penggunaan Thiamphenicol pada pasien yang memiliki indikasi: <ul style="list-style-type: none"> • Hipersensitivitas atau reaksi alergi terhadap antibiotik kloramfenikol. • Depresi 	Infeksi saluran kemih dan kelamin, gonore (GO), infeksi saluran pencernaan, infeksi tifus dan paratifus, infeksi saluran pernafasan.	Dewasa : 4 kali sehari 250-500 mg. Anak-anak atau bayi berusia lebih dari 2 minggu : 50 mg/kg berat badan/hari dibagi menjadi 3-4 kali pemberian. Bayi berusia kurang dari 2 minggu : 25 mg/kg berat badan/hari	Reaksi hipersensitivitas/alergi, gangguan saluran pencernaan (mual, muntah, diare), sariawan, glositis, ensefalopati, depresi mental, sakit kepala,	Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindungi dari cahaya matahari

			<p>sumsum tulang yang sudah ada sebelumnya (diskrasia darah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imunisasi aktif. • Wanita hamil dan menyusui. 		<p>dibagi menjadi 4-6 kali pemberian. Bayi prematur : 25 mg/kg berat badan/hari dibagi menjadi 2 kali pemberian.</p>	<p>dan ototoksisitas. Anemia hemolitik. Reaksi Jarish-herxheimer. Pemakaian jangka panjang dapat menyebabkan perdarahan, neuritis optik dan perifer. Efek Samping yang potensial fatal : depresi sumsum tulang, grey baby syndrome, anafilaktik.</p>	
Macrolides dan Lincosamide	eritromisin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erysanbe syrup 2. Erysanbe kaplet 	Hipersensitif	Infeksi saluran nafas, kulit dan jaringan lunak, pneumonia, GO, infeksi karena kuman yang peka terhadap eritromisin	<p>Dewasa > 20 kg : 1 - 2g 4 kali sehari. Anak : 30 - 50 mg/kg BB/hari. Diberikan dalam dosis terbagi tiap 6 jam. Berikan sebelum makan.</p>	<p>Gangguan Gl. Jarang, hepatotoksik, ototoksik</p>	<p>Simpan di tempat kering dan sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung</p>

Azitromicy n	Azitromycin	Hipersensitif, pasien dengan kerusakan hati.	Infeksi saluran napas atas & bawah, kulit & struktur kulit, uretritis & servisititis non GO krn Chlamydia trachomatis	Dewasa : 1 g dosis tunggal oral. Semua indikasi lainnya 500 mg 1 x/hari selama 3 hari. Anak 10 mg/kg BB/hari dosis tunggal selama 3 hari.	Mual, rasa tidak nyaman di perut, muntah, kembung, diare, gangguan pendengaran, nefritis interstisial, gangguan ginjal akut, fungsi hati abnormal, pusing/ vertigo, kejang, sakit kepala, somnolen, pemanjangan interval QT.	Simpan di tempat kering dan sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung
Klaritomici n	Bicolid	-	Faringitis atau tonsilitis, sinusitis maksilaris akut, bronkitis kronis eksaserbasi akut, infeksi kulit dan strukturnya tanpa komplikasi	Faringitis dan tonsilitis : 2 kali sehari 250 mg 10 hari. Sinusitis maksilaris akut : 2 kali sehari 500 mgselama 14 hari. Bronkitis kronis eksaserbasi akut : 2 kali sehari 250-500 mg selama 7-14 hari. Infeksi kulit dan strukturnya	Diare, mual, gangguan rasa, nyeri abdomen, sakit kepala	Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindungi dari cahaya matahari

					tanpa komplikasi : 2 kali sehari 250 mg selama 7-14 hari		
	Klindamicin	Clinmas 300 mg Clindamicin 300 mg	Superinfeksi, bayi prematur, diare. Gangguan fungsi hati & ginjal	Infeksi saluran nafas bawah, kulit & jaringan lunak, tulang & sendi, intra abdominal, ginekologi, septikemia	Dewasa 150-450 mg 4 x sehari; anak > 1 bulan 8-25 mg/kgBB/hari; anak < 10 kg awal 37.5 mg. Infeksi strep hemolitik, lama terapi dianjurkan 5-10 hari	Gangguan pencernaan	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung
Aminoglikosida	neomisin	Bioplasenton Apolar- N	Herpes simplex, varicella, TB kulit, dermatitis yang disebabkan oleh syphilis & luka pada kulit. Pengobatan pada mata. Hipersensitivitas terhadap neomycin.	Infeksi dermatitis, atopik & seborrheic dermatitis, pruritus & vulvae, otitis externa.	2-3 x sehari	-	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung
	gentamisin	Genoint Cendo Gentamycin	-	Untuk pengobatan infeksi topikal baik infeksi kulit primer maupun sekunder yang	3-4 kali sehari.	Dapat mengakibatkan iritasi ringan (eritema dan pruritis).	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar

				disebabkan oleh bakteri yang peka			matahari langsung
Quinolones	ciprofloxacin	Ciprofloxacin tablet 500 mg Ciprofloxacin infus Baquinor kapsul 500 mg	Hipersensitivitas	infeksi saluran kencing termasuk prostatitis, urethritis dan cervicitis gonorrhea, infeksi saluran pencernaan, demam tifus karena bakteri Salmonella typhosa, infeksi saluran pernafasan karena bakteri Streptococcus, infeksi kulit dan jaringan lunak	infeksi saluran kencing ringan-sedang 2x250mg perhari; infeksi berat 2x500mg perhari; prostat kronis 2x 500 mg; akut gonorrhea 250 mg dosis tunggal; infeksi saluran pencernaan 2x500 mg perhari; infeksi saluran pernafasan, kulit dan jaringan lunak	Mual muntah, diare, dispesia, nyeri abdominal, flatulence, anoreksia, pusing, sakit kepala, kelelahan, insomnia, tremor, gatal.	simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung
	Levofloxacin	Levofloxacin tablet 500 mg Levofloxacin tablet 500 mg Levofloxacin infus 500 mg Lexa infus 750 mg	Hipersensitivitas	Terapi sinusitis maksilaris akut, bronkitis kronik eksaserbasi akut, pneumonia yang didapat dari komunitas, Infeksi saluran	Sinusitis maksilaris akut: 500 mg/hari untuk 10-14 hari. Bronkitis kronik eksaserbasi akut: 500 mg/hari untuk 7 hari. Pneumonia yang didapat dari masyarakat: 500	Reaksi hipersensitif, insomnia, sakit kepala, anemia, mual, rasa tidak nyaman pada abdomen.	simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari

				kemih, infeksi kulit dan jaringan lunak tanpa komplikasi.	mg/hari untuk 7-14 hari.		
Tetrasiklin	Tetrasiklin	Tetrasiklin	Tetrasanbe	Hipersensitivitas	Infeksi saluran pernafasan, saluran pencernaan, saluran kencing, alat kelamin	2 x sehari 1 tablet	Anoreksia, mual, muntah, diare, glossitis, disfagia, enterokolitis, lesi inflamasi, ruam makulopapular dan eritematosa, fotosensitasi
	Doksisiklin	Doksisiklin Doxicor	Hipersensitivitas	Infeksi saluran napas, saluran pencernaan, saluran empedu, saluran kemih dan kelamin, kulit dan jaringan lunak	Dewasa dan anak-anak dengan berat badan lebih dari 50 kg : dosis awal 200 mg, pemeliharaan 100 mg sehari	-	simpan di tempat sejuk dan kering,
	Minosiklin	Nomika	Hipersensitivitas	Infeksi yang disebabkan oleh organisme yang sensitif atau resisten terhadap tetrasiklin lain, terapi tambahan untuk amubiasis	Dewasa: awal 2 kali sehari setiap 12 jam 200mg kemudian 100mg. anak >8 tahun: awal 2 kali sehari setiap 12 jam	Gangguan saluran cerna, ruam makulopapular dan eritema, reaksi hipersensitif, pusing, vertigo, mual, tinitus,	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung

				<p>intestinal akut, akne berat.</p>	<p>4mg/kgBB kemudian 2mg/kgBB. Gonore pada pasien yang sensitif terhadap penisilin: awal 2 kali sehari setiap 12 jam 200mg kemudian 100mg. minimal 4 hari dengan 2-3 hari kultur pasca terapi. karier meningokokus: 2 kali sehari setiap 12 jam 100mg selama 5 hari. infeksi Mycobacterium marinum 2 kali sehari 100mg selama 5 hari.</p>	<p>anemia hemolitik, trombositopenia, neutropenia dan eosinofilia.</p>	
Sulfa	sulfametoksazol-trimetoprim	Sanprima forte Sanprima syrup	Hipersensitivitas	<p>Infeksi saluran napas, kulit, saluran kemih dan kelamin, gastrointestinal, infeksi THT</p>	<p>Dewasa & Anak >12tahun : 1 kaplet forte 2x sehari. Infeksi berat : 1,5 kaplet forte 2x sehari. Infeksi akut berikan sampai dengan minimal</p>	<p>Gangguan gastrointestinal, sindroma Steven-Johnson&Lyell, JARANG : hepatitis, gangguan hematologi, kolitis,</p>	<p>Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>

					<p>5 hari atau sampai 2 hari bebas gejala. Pneumocytis carinii pneumonitis : 20mg/kg/hr TM & 100mg/kg/hr SMZ dalam dosis terbagi tiap 6 jam selama 14 hari. GO tanpa komplikasi : 2 kaplet Forte 2x sehari selama 2 hari, dilanjutkan dengan 2,5 kaplet 8 hari kemudian. Anak 6-12 tahun: 1/4-1/2 dosis dewasa. Anak 2-6 tahun : 1/4 dosis dewasa.</p>	pseudomembrano s a.	
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	--

(2.b) ANTIJAMUR

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
----------	-----------	-------------------------	----------------	----------	----------------------	--------------	-------------

Polyenes	amphotericin B, Nistatin	Nymiko drop	Hamil dan laktasi	Pengobatan kandidiasis pada rongga mulut, esofagus, dan intestinal	Dewasa : 4 kali sehari 5 mL Bayi dan anak : 4 kali sehari 1 mL. infeksi pada rongga mulut karena candida albicans : kumur-kumur suspensi sebelum di telan	Gangguan gastrointestinal, diare, mual, dan muntah	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung
Imidazole	ketoconazol	Ketokonazole tablet 200 mg Formyco salep	Hipersensitivitas	Infeksi Jamur Sistemik, seperti: 1. Kandidiasis 2. Blastomikosis (infeksi dari Blastomyces dermatitis, terutama menyerang paru-paru) 3. Histoplasmosis (infeksi jamur pada paru-paru yang disebabkan karena menghirup spora jamur) 4. Koksidiomukosis / Demam lembah 5. Parakoksidiomukosis 6. Kandidiasis mukokutan kronis	Dewasa : 1 tablet sekali sehari. Pada infeksi berat atau bila respon klinis kurang memadai dalam waktu yang diharapkan : dosis dapat ditingkatkan sampai 2 tablet sekali sehari. Anak-anak > 2 tahun : 5 mg/kg BB/hari.	Mual dan muntah biasa terjadi, tetapi berkurang bila obat diberikan bersama makanan. Efek samping lain jarang terjadi, yaitu: sakit kepala, pusing, nyeri abdominal, konstipasi, diare, demam dan menggigil, fotofobia. parestesia, gusi berdarah, trombositopenia, ginekomastia dan Impoten. Reaksi hipersensitivitas	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung

				yang tidak responsif terhadap nistatin dan obat-obat lainnya		seperti urtikaria, pruritus. Insiden dari gangguan fungsi hati yang spontan berpotensi menjadi toksisitas hati yang serius sangat rendah	
Miconazole	Myconazole salep	Hipersensitivitas	Infeksi kuku dan kulit karena dermatofita, kandida atau jamur lain dan bakteri gram positif	Oleskan 2 x sehari	Sensasi rasa terbakar, maserasi, dermatitis alergik	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung	
Klotrimazol	Tidak tersedia*						

Triazole	flukonazol	Diflucan 50 mg Fluconazole infus	Gangguan fungsi hati, < 16 tahun, hipersensitif terhadap fluconazole, golongan azole, terfenadin, sisaprid, astemizol,	Meningitis kriptokokal, kandidemia, kandidiasis diseminata dan infeksi kandidal invasif, kandidiasis orofaringeal, kandidiasis esofageal,	1 x sehari 1 tablet	Gangguan saluran cerna termasuk mual, nyeri abdominal, diare dan kembung, ruam, nyeri kepala, hepatotoksitas	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung

			pimozid, dan kuinidin	kandidiasis vaginal, pencegahan kandidiasis, tinea pedis, korporis, kruris, infeksi kandida awal, infeksi kandida superfisial pada anak			
	Itraconazole	Spyrocon kapsul 200 mg	Pasien dengan riwayat penyakit hati atau hepatotoksitas karena obat lainnya. Fungsi ginjal abnormal. Hentikan penggunaan obat ini jika terjadi	Terapi jangka pendek: Kandidosis vulvovaginitis, pitiriasis versikolor, dermatomikosis, keratitis karena jamur, kandidosis oral. Terapi jangka panjang untuk Aspergillosis, Kandidosis	Kandidosis vulvovaginitis 2 kapsul 2 kali sehari selama 1 hari atau 2 kapsul 1 kali sehari selama 3 hari. Pitiriasis versikolor 2 kapsul 1 kali sehari selama 7 hari. Dermatomikosis 1 kapsul 1 kali sehari	Terapi jangka pendek: mual, nyeri abdomen, sakit kepala, pusing, dispepsia, pruritus, ruam kulit, urtikaria, angioedema, peningkatan reversible enzim hati, sindrom	simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung

(2.c) ANTIVIRUS

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat HIV-AIDS	NRTI (zidovudine, abacavir),	*Tidak tersedia	Hipersensitivitas.	Digunakan untuk mengatasi penyakit human	Dewasa: Dikombinasikan dengan obat	Signifikan: Sindrom pemulihan	Simpan pada suhu 25°C.

	<p>NNRTI (efavirenz, nevirapine), PI (saquinavir, indinavir)</p>			<p>immunodeficiency virus (HIV), pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak pada wanita hamil.</p>	<p>antiretroviral lain: Awalnya, 200 mg sekali sehari selama 14 hari. Pemeliharaan: Sebagai tab konvensional: tawaran 200 mg. Sebagai tab rilis diperpanjang: 400 mg sekali sehari. Anak: Sebagai tablet konvensional atau suspensi dalam kombinasi dengan obat antiretroviral lainnya: Awalnya, 150 mg/m² sekali sehari selama 14 hari. Pemeliharaan: 150 mg/m² tawaran atau</p>	<p>kekebalan, redistribusi lemak (misalnya obesitas sentral, punuk kerbau, pengecilan perifer, pengecilan wajah, pembesaran payudara, penampilan cushingoid), rhabdomyolysis, peningkatan transaminase. Gangguan sistem darah dan limfatik: Granulositopenia, neutropenia. Gangguan</p>	
Herpes virus	acyclovir	Acyclovir 400 mg	Hipersensitivitas	<p>Pengobatan infeksi yang disebabkan oleh herpes simplex pada kulit dan membrane mukosa, termasuk herpes genital awal dan kambuhan,</p>	200 mg , 5 kali sehari selama 5 hari	Gatal- gatal, gangguan gastrointestinal	Simapan pada suhu di bawah

				prevention of herpes simplex infection in immunocompromised patients			
Hepatitis B dan C	interferon, lamivudine	*Tidak tersedia	Hipersensitivitas	Treatment of Hepatitis and HIV	<ul style="list-style-type: none"> Dewasa: 100 mg, once daily. Especially for patients who suffer from hepatitis B along with HIV 	Sakit kepala, mual, diare	
	amantadine, rimantadine, oseltamivir	*Tidak tersedia	Memiliki riwayat alergi dengan obat ini, pasien dengan riwayat penyakit jantung, penyakit liver, gangguan fungsi ginjal, gangguan saluran pernapasan, penyakit paru-paru kronis.	Mengatasi infeksi virus seperti virus influenza tipe A dan tipe B.	Sesuai petunjuk dokter atau 1. Pencegahan virus influenza tipe A dan B, Dewasa: 75 mg/hari, 2. Pengobatan influenza A dan B, Dewasa: 75 mg 2x/hari.	Sakit kepala, diare, mual, muntah, sulit tidur.	Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.

(2.d) ANTIPROTOZOA

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
----------	-----------	-------------------------	----------------	----------	----------------------	--------------	-------------

Antiamoeba	metronidazole	Trichodazole tablet 500 Metronidazole infus 500 mg	Hipersensitivitas	Trikomonas, Saluran kemih, kelamin	3x 1 tablet	Sakit kepala mengantuk , Pusing	Suhu ruang terlindung cahaya
Antimalaria	primaquine, artemisinin, doksisisiklin	Doxicor	Hipersensitivitas terhadap tetrasiklin	Infeksi saluran nafas, urogenital, jaringan kulit dan lunak	> 8 th 45 kg 100 mg / 12 jam sesudah makan	Mual, muntah, diare	Suhu ruang terlindung cahaya

(2.e) ANTELMINTIK

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antelmintik	albendazole	Albendazole 500 mg Vermox (Mebendazole)	Hipersensitivitas terhadap albendazole	Infeksi tunggal/ campuran	Dewasa dan anak > 2 th 1 kaplet/ 10 mg sebagai dosis tunggal sebelum / sesudah makan	Gatal, mual- muntah	Pada suhu kamar terlindung panas dan cahaya
	Mebendazole	Vermox	Tidak untuk ibu hamil, anak dibawah usia 5 tahun	Infeksi cacing tunggal dan campuran	Dewasa 1 tablet 1 x / hari . Anak > 5 tahun sama dengan dosis dewasa. Sebelum atau sesudah makan	Nyeri perut, diare akut	Suhu Ruang terlindung cahaya

(2.f) OBAT TB

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat TB	Rifampisin	Rifampicin 600 mg, Rifampicin 450 mg	Hipersensitivitas, gangguan saluran empedu, kehamilan tri semester 1	Tuberkulosis dan lepra	Dewasa= 450-600 mg sebagai dosis tunggal , 1 jam sebelum / 2 jam sesudah makan	Fungsi hati abnormal, Gangguan GI tract	Suhu ruang terlindung cahaya
	Ethambutol	Ethambutol 500 mg	Neuritis optic, anak usia kurang dari 13 tahun	TB Paru yang resistensi	15- 25 mg per Kg BB/ hari	Gangguan GI, SSP, Hiperurisemia	Suhu ruang terlindung
	Isoniazid	Inoxin 400 mg	Penyakit hati yang diinduksi obat	Tuberkulosis paru	1 Tablet per hari, 1 jam sebelum makan/ 2 jam sesudah makan	Remam, demam	Suhu ruang terlindung cahaya
	Pyrazinamide	Pyrazinamide 500 mg	Hipersensitivitas, gangguan fungsi hati yang parah	TB Paru dan TB luar paru	20-35 mg/ Kg BB/ hari. Maksimal 3 gram / hari	Hepatotoksik	Suhu ruang terlindung cahaya

(3) ANTIHISTAMIN DAN ANTIALERGI

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
----------	-----------	-------------------------	----------------	----------	----------------------	--------------	-------------

Generasi I	chlorpheniramine	CTM 4 mg	Anak di bawah 2 tahun	Mengatasi gatal dan alergi	Dewasa 1 tablet 3-4 kali/ hari	Mengantuk, pusing	Suhu ruang terlindung cahaya
	diphenhyramine	Dramamine	Hipersensitivitas	Mengatasi gatal dan alergi	Dewasa 3x 1 tablet / hari	Mengantuk, pusing	Suhu ruang terlindung cahaya
Generasi II	Ketotifen, loratadine	Alloris, Loratadine 10 mg	Hipersensitivitas terhadap cetirizine	Meredakan gejala alergi	Dewasa dan anak lebih dari 12 tablet , 1 tablet per hari	Mengantuk, sakit kepala	Suhu ruang terlindung cahaya
	Cetirizene	Cerini 10 mg. Cetirizine 10 mg	Wanita hamil dan lakatsi	Pengobatan rhinitis alergi, urtikaria	Dewasa 1 tablet / hari sesudah makan	Mengantuk, pusing	Suhu ruang terlindung cahaya
Generasi III	Desloratadin	Destavel	Hipersensitivitas, ibu hamil dan menyusui	Mengobati gejala alergi	1 tablet sehari sesudah makan	Detak jantung cepat	Tempat sejuk dan kering,

(4) SITOSTATISTIKA

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Sitostatika	siklofosamid, 5-fluorourasil, carboplatin, metroteksat	*Tidak tersedia Cyclospamide	Depresi berat fungsi sumsum tulang belakang	Lymphoma maligna, Karsinoma payudara	40-50 mg/Kg BB secara IV diberikan dalam dosis terbagi selama 2- 5 hari	Toksistas jantung, mual muntah	Suhu di bawah 25° C, ditempat kering dan sejuk
	Doxorubicin	*Tidak tersedia Doxorubicin	Mielosupresi, penyakit jantung	Terapi kanker payudara, kanker ovarium	60-75 mg dosis tunggal diberikan secara iv selama 21 hari	Kulit terasa sakit, terbakar	Dilemari pendingin suhu 2-8 °C, Jangan dibekukan

(5) OBAT SISTEM SARAF

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat hipnotik sedatif/antiansietas	benzodiazepin (alprazolam, nitrazepam), barbiturat (fenobarbital), lainnya (buspiron)	Alprazolam 0,5 mg, Atarax 0,5 mg	Pasien yang sensitive benzodiazepine, glaucoma sudut sempit akut	Gangguan ansietas	0,25- 0,5 mg , 3 kali/ hari dapat diberikan sebelum atau sesudah makan	Mengantuk, lemah otot	Suhu ruang terlindung dari cahaya
	Diazepam	Valisanbe 2 mg, Valisanbe 5 mg. Valdimex injeksi	Psikosis berat, glaucoma sudut sempit	Neurotik, Psikosomatik, Reumatik dan gangguan otot	Dewasa 2- 5 mg	Gangguan mental, mengantuk	Suhu ruang terlindung dari cahaya
	Lorazepam	Merlopan 2	Hipersensitivitas	Pengobatan jangka	2-6 mg / hari	Sedasi diikuti pusing	Suhu ruang
Obat analgetik sentral	fentanil, petidin, nalokson.	Ethanyl injeksi	Depresi, Cidera kepala	Suplemen analgesic pada anaestesi regional / general	100 mg i.m , 30-60 menit sebelum operasi	Kekauan otot, hipotensi	Suhu ruang terlindung dari cahaya
	Morphin	Morphin injeksi, Mst Continous 10 mg	Depresi pernapasan, penyakit hati akut	Penatalaksanaan nyeri pada pasien yang perlu analgesik opioid	Awal 10- 15 mg , tiap 12 jam dapat diberikan sebelum / sesudah makan	Mual, muntah, konstipasi	Suhu ruang terlindung dari cahaya
Obat antidepresan	amitriptilin, imipramin,	Amitriptilin 25 mg	Glaukoma	Depresi termasuk gangguan yang disertai cemas	1-4 tablet / hari maksimal 12 tablet/ hari sesudah makan	Keringat berlebihan, mulut kering	Suhu ruang terlindung cahaya dan kelembaban
Obat anestesi lokal	bupivakain	Regivel injeksi	Hipersensitivitas terhadap anaestesi lokal jenis amida	Anaestesi spinal untuk bedah, bedah abdomen	7,5 mg- 15 mg diinjeksi pada posisi duduk	Hipotensia, bradikardia	Simpan pada suhu ruang terlindung

	Lidokain	Lidokain injeksi	Hipertensi berat, penyakit jantung	Anaestesi lokal	0,5- 10 mg secara infiltrasi	Sedasi, kedutan	Simpan pada suhu ruang terlindung cahaya
Obat sistem sarafotonom (antikolinergik, kolinergik)	prostigmin, pilokarpin, pirenzepin, ipratropium, skopolamin	Neostigmin injeksi	Hipersensitivitas terhadap komponen obat ini	Mengontrol gejala myasthenia gravis	0,5- 2 mg secara i.v	Pusing, sakit kepala	Suhu antara 20-25 °C
	Atropin	Atropin sulfat injeksi	Hipersensitivitas, glaucoma sudut tertutup, ileus paralitik	Bradikardia dan beberapa jenis keracunan	0,5 mg setiap 3-5 menit maksimal 3 mg	Detak jantung tidak teratur	Suhu ruang terlindung cahaya
	Trihexifenidil	Trihexipenidil 2 mg, Heximer 2 mg	Hipersensitivitas	Parkinson, gangguan Ekstrapiramidal yang disebabkan obat SSP	2 mg diberikan 2-3 kali/ hari selama 3 – 5 5 hari sesudah makan	Mulut kering, mual	Suhu ruang terlindung cahaya
Obat sistem sarafotonom (adrenergik, antiadrenergik)	klonidin, fenilefrin, adrenalin, fenoterol, atenolol, prazosin	Catapres injeksi, Clonidin tablet	Hipersensitivitas	Hipertensi	75-150 mg perhari sesudah makan	Mulut kering, mual muntah	Suhu ruang terlindung cahaya
	Noradrenalin	Norpion injeksi	Hipertensi, wanita hamil	Meningkatkan tekanan darah rendah akut	0,4-0,8 mg/jam diberikan melalui infus	Sesak nafas, kecemasan, darah tinggi	Suhu dibawah 25 °C , terhindar dari cahaya
	Terbutalin	Lasmalin tablet	Tirotaksikosis	Asma bronkial, bronchitis kronik	Dewasa= 2-3 kali/ hari 1- 2 tablet	Tremor, palpitasi	Suhu ruang terlindung cahaya
	Salbutamol	Salbutamol 4 mg, Astharol 4 mg, Velutine neb	Hipersensitivitas	Bronkospasme pada semua jenis asma bronkial,	Dewasa= 3-4 kali/ hari 1-2 tablet	Tremor halus, palpitasi	Suhu ruang terlindung cahaya

				bronkritis kronik dan efisema			
--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--

(6) OBAT KARDIOVASKULAR**(6.a) Obat antihipertensi**

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Diuretik	furosemid, amilorid	Lasix 40 mg, Farsix injeksi, Furosemida 40 mg	gagal ginjal akut, hepatic koma, hipokalemi a, hiponatremia	edema jantung, ginjal dan hati. Edema perifer karena obstruksi mekanis atau insufisiensi vena dan hipertensi	dewasa: dosis awal 20-80 mg sebagai dosis harian tunggal. Anak-anak: 1-2 mg/kg bb sebagai dosis tunggal. Maksimum 40 mg. Hipertensi: awal 80 mg/hari	Gangguan ringan pada saluran cerna, kehabisan calsium, kalium, natrium	Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
	HCT	HCT 25 mg	Hipersensitivitas	Anti hipertensi	25- 100 mg/hari sesudah makan	Mual muntah	Suhu ruang terlindung cahaya
	Spirolactone	Spirola 100 mg, Spirola 25 mg, Spironolacton 100 mg, Spironolacton 25 mg	Gangguan ginjal	Hipertensi	3-4 tablet perhari sesudah makan	Sakit kepala	Suhu ruang terlindung cahaya

CCB	Amlodipine, verapamil	Stamoten 5 mg, Norvask 10 mg	Hipersensitivitas	Pengobatan lini pertama hipertensi	2-4 tablet perhari , sesudah makan	Sakit kepala	Suhu ruang terlindun g cahaya
	Nifedipine	Adalat oros 30 mg, Nifedipine 10 mg	Hamil, laktasi	Terapi dan profilaksis hipertensi kronis	5- 10 mg / hari . Sebelum / sesudah makan	Sakit kepala	Suhu ruang terlindung cahaya
	Nicardipin	Anhisan injeksi	Hemostatis, kerusakan hati	Hipertensi	4 mg 1x / hari maksimal 16 mg/ hari	Nyeri punggung, pusing	Suhu ruang terlindung cahaya
ARB	valsartan, telmisartan	Valsartan 80 mg	Hamil dan laktasi, kerusakan hati	Pengobatan hipertensi, terapi gagal jantung	80 mg 1x per hari dapat ditingkatka n sampai 160 mg/ hari. Sebelum/ sesudah makan	Sakit kepala, pusing	Suhu ruang terlindung cahaya
	Candensartan	Canderin 8 mg, Candensartan 8 mg	Hamil trimester 2 dan 3, gangguan hati berat	Hipertensi	4 mg 1x sehari maksimal 16 mg / hari	Nyeri punggung, pusing	Suhu ruang terlindung cahaya
	Irbesartan	Irvel 150 mg, Tensira 300 mg, Irbesartan 300 mg	Hamil dan laktasi	Hipertensi , sebagai terapi tunggal maupun kombinasi	150 mg 1x per hari dapat ditingkatkan hingga 300 mg	Sakit kepala, pusing	Suhu ruang terlindung cahaya
	Lorsartan	*Tidak tersedia Insaar	Hipersensitivitas	Pengobatan hipertensi	50 mg 1x / hari selama 3-6 minggu,	Pusing	Suhu ruang terlindung cahaya

					dapat ditingkatkan sampai 100 mg/ hari. Sebelum/ sesudah makan		
ACEI	Kaptopril	Captopril 25 mg	Hipersensitivitas terhadap ACE Inhibitor	Terapi tunggal/ kombinasi anti hipertensi	12,5 – 25 mg, 3 x / hari. Dapat dinaikkan hingga 50 mg 2-3 kali/ hari, saat perut kosong	Ruam, anemia, trombositopenia	Suhu ruang terlindung cahaya
	Lisinopril	Lisinopril 10 mg, Intepiril 5 mg	Riwayat angio edema yang berhubungan dengan terapi ACE Inhibitor sebelumnya	Gagal jantung kongestiv, Hipertensi	10 mg 1 kali / hari sebelum / sesudah makan	Pusing , Sakit kepala, batuk	Suhu ruang terlindung cahaya
	Ramipril	Ramipril 5 mg	Hipersensitivitas, Riwayat angioedema	Hipertensi, gagal jantung kongestiv	2,5 mg 1x / hari sesudah makan	Gangguan kulit	Suhu ruang terlindung cahaya
Beta blocker	Atenolol	*Tidak tersedia	Gagal jantung, Bradikardia	Hipertensi, angina, aritmia, pencegahan migrain	50 mg/ hari sebagai dosis tunggal /	Gangguan GI, Bradikardia, pusing	Suhu ruang terlindung cahaya

					dengan diuretic · Diberikan sesudah / sebelum makan		
	Propanolol	Propanolol 10 mg, Propanolol 40 mg	Sinus, bradikardia dan asma	Hipertensi, angina, aritmia	Dewasa dan anak > 12 tahun 20 mg , 3-4 kali/ hari	Lemah lesu, mual	Suhu ruang terlindung cahaya
	Bisoprolol	Concor 10 mg, Beta- one 2,5 mg	Gagal jantung akut, bradikardia	Gagal jantung sedang- berat, pengobatan hipertensi	5- 10 mg/ hari, dosis dapat dinaikkan hingga 20 mg/ hari. Sebelum/ sesudah makan	Gagal jantung, Dispnoea, pusing	Suhu ruang terlindung cahaya
Alfa blocker	Prazosin, hidralazin	*Tidak tersedia Minipress	Pasien yang diketahui hipersensitivitas terhadap zat aktif, untuk quinazolines lainnya (misalnya prazosin, doxazosin)	Pengobatan hipertensi ringan sampai sedang. Pengobatan simptomatik obstruksi urin yang disebabkan oleh benign prostatic hyperplasia (BPH).	5- 10 mg , 1 x sehari	Mual muntah	Suhu ruang terlindung cahaya

Sentral	Metildopa	Dopamet 250 mg	Sirosis hati	Hipertensi essensial, termasuk hipertensi berat	½ tablet- 1 tablet/ hari, ditingkatkan bertahap. Sesudah makan	Lesu, mulut kering	Suhu ruang terlindung cahaya
	Klonidin	Clonidin tablet	Hipersensitivitas	Hipertensi	75-150 mg/ hari . Sesudah makan	Mulut kering, mual muntah, pusing	Suhu ruang terlindung cahaya

(6.b) OBAT ANTIANGINA

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat antiangina	Isosorbide dinitrate	Fasorbid 5 mg	Glaukoma, anemia	Terapi dan profilaksis angina pektoris	Dewasa 1- 2 mg/ hari dapat ditingkatkan hingga 10 mg	Hipotensi	Suhu ruang terlindung cahaya
	Nitrogliserin	Nitrokaf 2, 5 mg, NTG injeksi	Hamil dan laktasi. Alkoholisme. Dapat mengganggu kemampuan mengemudi atau menjalankan mesin.	Pencegahan dan terapi jangka panjang angina pektoris.	2.5 mg 2-3 kali/hari. Kasus berat : 5 mg 2-3 kali/hari. Obat harus ditelan utuh dengan segelas air.	Sakit kepala, hipotensi ortostatik, takikardi, kolaps yang disertai dengan aritmia bradikardi, mengantuk. Jarang : kolaps, kemerahan pada kulit.	Simpan di tempat yang kering dan terhindar dari sinar matahari.

(6.c) OBAT GAGAL JANTUNG KONGESTIF

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
----------	-----------	-------------------------	----------------	----------	----------------------	--------------	-------------

Obat gagal jantung kongestif	Digoksin	Fargoxin 0,25 mg, Fargoxin injeksi	Takikardia, Ventikular dan fibrilasi	Gagal jantung Kongestif	3-4 kali/hari. Sebelum / sesudah makan	Gangguan SSP dan GI	Suhu ruangan terlindung cahaya
------------------------------	----------	------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	----------------------------------------	---------------------	--------------------------------

(6.d) ANTIPLATELET

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antiplatelet	Asetosal	Proxime 100 mg, Aptor 100 mg	Pendarahan, asma	Pengobatan dan pencegahan angina pectoris dan infark miokard, demam, nyeri pasca vaksinasi, sakit gigi, nyeri otot dan nyeri saraf	Pengobatan dan pencegahan angina pectoris dan infark miokard : 1 x sehari 1 tablet ; Untuk keluhan Demam, flu, pusing dan nyeri pada pasien dewasa : 4-6 x sehari 1 tablet, Anak 5-12 tahun : 2-3 x sehari 1 tablet, Anak 1-	Gangguan lambung, pusing, reaksi hipersensitif	Suhu ruangan terlindung cahaya

					4 tahun : 3-4 x sehari 1/4 tablet		
	Klopidogrel	Pendarahan patologi aktif	hipersensitif komponen obat, gangguan liver, tukak lambung, perdarahan intrakranial, ibu menyusui	untuk pencegahan antithrombosis pada pasien infark miokard, stroke iskemik, penderita sindrom jantung akut	dewasa: 1x sehari 1 tablet	perdarahan gastrointestinal, pusing, vertigo, dispepsia	simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung

(6.e) OBAT DYSLIPIDEMIA

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat dyslipidemia	Simvastatin, ezetimib	Simvastatin 20 mg, Valemia 10 mg	Penyakit hati aktif	Menurunkan jumlah kolesterol total dan LDL pada	10 mg/ hari, dosis tunggal pada malam	Nyeri abdomen, konstipasi	Suhu ruang terlindung cahaya
	Atorvastatin	Atorvastatin 20 mg, Lipitor 40 mg	Penyakit hati aktif, hamil dan laktasi	Tambahan diet untuk menurunkan kadar kolesterol total	10-80 mg / hari sesudah makan	Konstipasi, kembung	Suhu ruang terlindung cahaya
	Fenofibrate	Fenofibrate 300 mg, Evothyl 300 mg	Hipersensitivitas, gangguan ginjal dan hati	Hiperkolesterolemi a, hipertrigliserida	300 mg/ hari dapat ditingkatkan hingga 400 mg/ hari. Diminum Bersama makan	Gangguan GI, Sakit kepala	Suhu ruang terlindung cahaya

	Gemfibrozil	*Tidak tersedia Gemfibrozil	Penyakit kandung empedu dan hati berat, disfungsi ginjal	Hiperkolesterolemi a,Hipertrigliserida, Dislipidemia	900-1500 terbagi dalam 2 dosis sebelum makan	Gangguan GI, Mual muntah	Suhu ruang terlindung cahaya
--	-------------	--------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------	------------------------------

(6.f) OBAT ANTIARITMIA

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat antiaritmia	Amiodaron	Amiodaron 200 mg, Amiodaron injeksi	Hindari mengonsumsi amiodarone jika memiliki riwayat gangguan kelenjar tiroid, hipotensi berat, bradikardia, syok kardiogenik, dan gangguan pernapasan	mengatasi irama jantung yang tidak stabil.	- Dewasa: Dosis awal adalah 300 mg atau 5 mg/kgBB, dengan injeksi cepat.Dosis lanjutan adalah 150 mg atau 2.5 mg/kgBB.	Hipotensi, pusing	Suhu ruang terlindung cahaya

7. OBAT SALURAN CERNA**(7.a) Obat gastritis dan tukak lambung**

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antasida	Al(OH) ₃ , Mg(OH) ₂ , natrium bikarbonat	Acitral , Sanmag syrup	Gangguan fungsi ginjal, diet rendah fosfat.	Ulkus peptik, hiperasiditas, gastritis, flatulen, dispepsia, hiatus hernia.	1-2 tablet dikunyah. Diberikan diantara waktu makan & sebelum tidur.	Gangguan GI.	Simpan di tempat yang sejuk dan kering, serta terlindung dari panas dan sinar

							matahari langsung
H ₂ Bloker	Simetidin, ranitidin, famotidin	Ranitidin 150 mg, Ranitidin 50 mg injeksi	-	Tukak lambung, ulkus gaster akut	150 mg 2 kali/hari. Sebelum makan	Mengantuk	Suhu ruang terlindung cahaya
PPI	Omeprazole	Omeprazole 20 mg	Hamil, laktasi	Terapi jangka Panjang ulkus duodenum, Terapi jangka pendek ulkus gaster	20-40 mg 1kali/hari. Segera sebelum makan	Gangguan GI, Sakit kepala	Suhu ruang terlindung cahaya
	Lansoprazole	Lanzoprazole 20 mg, Lapraz 20 mg	Hipersensitivitas terhadap lansoprazole	Tukak duodenum, Refluk oseofagus	30 mg 1 kali/hari sebelum makan	Konstipasi, diare	Suhu ruang terlindung cahaya
	Pantoprazole	Pantoprazole 40 mg	Kerusakan fungsi hati, kehamilan	Tukak duodenum dan tukak lambung, inflamasi oseofagitis	1 vial per hari, maksimal 2 vial per hari	Nyeri perut, konstipasi	Suhu ruang terlindung cahaya
Pelindung mukosa	Sukralfat	Sulkrafat syrup, Lanpepsa syrup	-	Terapi gastritis, tukak lambung	2 sendok takar 4 kali/hari	Sakit kepala, diare, kembung	Suhu ruang terlindung cahaya
Antiflatulen	Dimetilpolisiloksan	Disflatil	Aritmia, hipokalsemia	Mengurangi penimbunan gas dalam saluran cerna	1-2 tablet dikunyah. Sesudah makan dan sebelum tidur	Faringitis, ruam kulit	Suhu ruang terlindung cahaya
Analog prostaglandin	Misoprostol	Cytotex, Cytostol	Hamil dan laktasi	Mencegah tukak lambung	100-200 mg 4 kali/hari	Diare, pendarahan per vagina	Suhu ruang terlindung cahaya

(7.b) Obat antidiare

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antimotilitas	Loperamid	Lodia	Konstipasi, kehamilan dan menyusui	Diare akut non spesifik dan diare kronik	Awal 2 tablet kemudian 1 tablet	Mulut kering, nyeri perut	Suhu ruang terlindung cahaya
Adsorben	Kaolin pektin, attapulgit	Diagit tablet, Neokalana Syrup	Stenosis saluran cerna	Terapi simptomatik untuk diare non spesifik	Dewasa dan anak > 12 tahun 2 tablet sesudah BAB, maksimal 12 tablet per hari	Konstipasi	Suhu ruang terlindung cahaya
Antisekresi	Bismut subsalisilat	*Tidak tersedia	-	-	-	-	-

(7.c) Obat laksatif

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Laksatif osmotikgaram	Mg sulfat	*Tidak tersedia	-	-	-	-	-
		Constipen	-	Mengatasi konstipasi	Dewasa 15-45 ml/ hari. Bersama makan	Diare, kram lambung	Suhu ruang terlindung cahaya
Laksatif osmotik alkohol/gula tdk dicerna	Gliserin, laktulosa	syrup					
Laksatif stimulan	Turunan difenilmetan (bisakodil, fenolftalein),	Dulcolax tablet, Stolax suppositoria	Obstruksi usus, Hipersensitivitas	Konstipasi	Dewasa 2-3 tablet / hari. Sebelum / sesudah makan	Diare	Suhu ruang terlindung cahaya

	antrakuinon						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

(7.d) Antiemetik

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antiemetik	Dimenhidrinat,	Dramamine 50 mg	Hipersensitivitas	Mencegah / meredakan mual/ muntah akibat mabuk perjalanan, vertigo	Dewasa 3 x 1 tablet sebelum/ sesudah makan	Mengantuk, gangguan penglihatan	Suhu ruang terlindung cahaya
	Ondancetron	Dansefion 8 mg, Ondansentron 8 mg, Ondansentron 8 mg injeksi	Hipersensitivitas	Mual/ muntah	8 mg , 2 kali sehari. Sebelum makan	Sakit kepala, konstipasi	Suhu ruang terlindung cahaya
	Metoklopramide	Damaben 10 mg, Metoklopramide injeksi	Pendarahan GI, Epilepsi	Pencegahan mual dan muntah	Dewasa 5- 10 mg 3 kali/ hari terbagi dalam 3 dosis	Pusing, rasa Lelah, mengantuk	Suhu ruang terlindung cahaya

(8) OBAT SALURAN NAPAS

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat Batuk	codein,	Codein 10 mg,	Asma Bronkial, efisema paru	Antitusif, analgesik	10-20 mg tiap 4- 6 jam. Sesudah makan	Ketergantungan obat, mual, konstipasi	Suhu ruang terlindung cahaya
	dekstromethorphan, amonium klorida, asetilsistein	Codein 15 mg, Codein 20 mg, Codipront kapsul, Coditam,					

		Codikaf 10 mg, Codikaf 15 mg, Codikaf 20 mg					
	Gliseril guaiakolat	Gliseril guaiakolat 100 g	Hipersensitiv, diabetes	Meringankan batuk produktif (sebagai ekspektoran)	2-4 tablet tiap 4-6 jam. Sesudah makan	Mual muntah	Suhu ruang terlindung cahaya
	Bromhexin	Mucohexin 8 mg	Hipersensitivitas	Batuk yang memerlukan ekspektoran	Dewasa dan anak > 10 tahun 1 tablet 3 kali sehari . Sesudah makan	Gangguan GI	Suhu ruang terlindung cahaya
	Ambroxol	Epexol 30 mg, Epexol sirup	Hipersensitivitas	Terapi skretolitik pada bronkopulmonal akut	Dewasa 2-3 kali/ hari. Sesudah makan	Reaksi alergi	Suhu ruang terlindung cahaya
Obat asma	terbutaline, aminofilin	Lasmalin 2,5 mg	Hipersensitivitas	Asma bronkial, Bronkitis akut	1-2 tab 2-3 mg / hari. Sesudah makan	Sakit kepala, Takikardia	Suhu ruang terlindung cahaya
	Salbutamol	Salbutamol 4 mg, Astharol 4 mg, Velutine 2 mg	Hipersensitivitas	Asma bronkial, Brobkospasme	2-3 mg/ hari. Sesudah makan	Tremor halus, takikardia	Suhu ruang terlindung cahaya
	Ipratropium Bromida	Combivent	Hipersensitivitas	Bronkodilator pada bronchitis akut	Dewasa 2 semprot 2 kali/ hari	Gangguan GI, Sakit kepala	Suhu ruang terlindung cahaya
	Theofilin	Theobron 130 mg	Tukak lambung, diabetes	Asma bronkial	Dewasa 1 tablet 2 kali/hari	Mual, muntah, sakit kepala	Suhu ruang terlindung cahaya

	Budesonide	Pulmicort,Bud esma	Hipersensitivitas	Asma bronkial	1-2 mg, 2 kali/hari untuk respshule	Iritasi ringan pada tenggorokan	Suhu ruang terlindung cahaya
	Aminophyllin	Aminophyllin 200 mg, Aminophyllin injeksi	Hipersensitivitas terhadap derivate zanthin	Pengobatan dan pencegahan bronkospasma dan inflamasi yang berhubungan dengan asma, emfisema dan bronchitis akut	Dewasa 1 tablet 2x/ hari. Diberikan saat perut kosong	Mual, muntah, nyeri perut, diare , sakit kepala	Suhu ruang terlindung cahaya

(9) VITAMIN, MINERAL, ENZIM

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Vitamin	Vitamin A, D, E, K, B1 (thiamin), B6(piridoksin), B12, C	Neurosanbe tablet, Neurosanbe injeksi	-	Pencegahan dan pengobatan defisiensiB1,B6, B1 2 pada kanker beri-beri , neuritis perifer	Dewasa 1 tablet / hari. Sesudah makan	-	Suhu ruang terlindung cahaya
Mineral	Ca, P, K, Mg, Na, Cl, Fe, Zn, Mn, Cu, I ₂	Prenamia	-	Vitamin dan mineral pencegahan defisiensi zat besi	1 kali per hari. Sesudah makan	Warna BAB gelap	Suhu ruang terlindung cahaya


(10) OBAT SISTEM ENDOKRIN

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
----------	-----------	-------------------------	----------------	----------	----------------------	--------------	-------------

Obat Diabetes melitus	Sulfonilurea (glibenclamide, glimepiride), pioglitazone,	Glimepirid e 2 mg, Glimepirid e 3 mg, Metrix 3 mg, Amaglu 2 mg	DM Type 1, gangguan fungsi hati dan ginjal, hamil dan laktasi	DM type 2	1-8 mg/ hari. Sebelum makan	Hypoglikemia, ruam kulit, urtikaria	Suhu ruang terlindung cahaya
	Metformin	Metformin 500 mg, Reglus 500 mg	Gangguan fungsi ginjal, kerusakan hati, hamil dan laktasi	Terapi DM onset dewasa dengan obesitas/ BB normal	1 tablet 500 mg/ hari. Sebelum makan	Nyeri abdomen, diare. Ruam kulit, urtikaria	Suhu ruang terlindung cahaya
	Akarbose	Acarbose 100 mg	Hipersensitivitas terhadap acarbose, Gangguan GI	Terapi pasien diabetes yang tidak terkontrol dengan diet	50-100 mg 3 kali/ hari. Bersama makan / setelah suapan pertama	Diare, nyeri abdomen	Suhu ruang terlindung cahaya
	Insulin	Apidra, Humalog, S insulin, glaritus	Hipersensitivitas	Pengobatan DM	Bersifat individual, injeksi subkutan	Hipoglikemia	Sebelum dibuka simpan pada lemari es suhu 2-8°C
Obat hipertiroid dan hipotiroid	Propiltiourasil,	Propiltiourasil 100 mg	Wanita hamil trisemester 3	Hipertiroidsm	100-150 mg tiap 8 jam. Sebelum/ sesudah makan	Nyeri, kaku sendi	Suhu ruang terlindung cahaya
	levotiroksin.	Eutyrox 50	Hipertiroidsm	Hipotiroidsm	75-200 mcg 1	Tremor pada jari tangan, Palpitasi, aritmia, Penurunan BB, Diare	Suhu ruang terlindung cahaya
Kortikosteroid	hidrokortison, metilprednisolon	Hidrokortison	Hipersensitivitas, herpes simplex	Dermatitis atopik dan kontak	2- 3 kali / hari dioleskan	Rasa terbakar, gatal, kulit kering	Suhu ruang terlindung cahaya



					pada kulit yang bermasalah		
	Bethametason	Apolar -N	Hipersensitivitas, infeksi primer oleh virus	Meringankan inflamasi dari dermatitis yang responsive terhadap kortikosteroid	Dioleskan 2 kali sehari pada bagian kulit yang bermasalah	Perubahan atopic lokal pada kulit, iritasi kulit kering	Suhu ruang terlindung cahaya
	Prednison	Prednison	Penderita penyakit TBC aktif, infeksi akut, infeksi jamur, herpes simplek	Arthritis rheumatoid, Asma bronkial, SLE	1-4 tablet maksimal 5 mg dalam 3-4 dosis terbagi. Setelah makan	Mual, anoreksia, nyeri otot, iritasi lambung	Suhu ruang terlindung cahaya
	Metyl prednisolon	Metyl prednisolone 16 mg, Methyl prednisolone 4 mg, Sanexon 16 mg, Lameson 125 mg injeksi	TB, Infeksi jamur sistemik, DM, Osteoporosis berat	Penyakit kulit dan saluran nafas, penyakit autoimmune, syndrome nefrotik	Awal 4-48 mg kemudian dapat diturunkan secara bertahap sampai dengan dosis efektif. Diminum sesudah makan	Gangguan penyembuhan luka, gangguan metabolisme karbohidrat, lemah otot	Suhu ruang terlindung cahaya
Obat KB	levonorgestrel, etinilestradiol, lynestrenol	*Tidak tersedia Cyclogynon	DM Berat, pasien dengan gangguan tromboflebitis	Kontrasepsi oral	1 x sehari 1 tablet mulai pada haid hari pertama,	Gangguan fungsi ginjal, jerawat, perubahan libido	Suhu ruang terlindung cahaya




					sebelum 21 hari tanpa putus diikuti 7		
--	--	--	--	--	---------------------------------------------	--	--







A. PRODUCT KNOWLEDGE ALAT KESEHATAN

(1) ALKES PERAWATAN

No	Alkes perawatan	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Bandage gauze (kasa hidrofil) (sumber dari : halodoc)		Kasa steril ini digunakan untuk operasi besar dan kecil, khitan, penutup luka, dan bebal pusar bayi	Bersihkan luka dan kotoran, bakteri dan partikel untuk mencegah infeksi. Keringkan kulit sekitar luka dengan lembut. Tutup luka dari kotoran dan bakteri menggunakan Kasa Steril.
2.	Elastic bandage (sumber dari : halodoc)		Menutup luka dan menyangga cedera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahan pergelangan kaki di kemiringan 90 derajat 2. Mulai pasang perban dimulai dari bantalan telapak kaki 3. Ulang hingga dua kali 4. Posisikan perban ada di atas kaki. kemudian lingkarkan ke sekitar pergelangan kaki dan menyilang ke arah berlawanan 5. Pasang dengan pola seperti angka "8" 6. Setelah pergelangan kaki tertutup. amankan bagian ujung di manapuna yang tidak menggesek kulit 7. Pastikan perban terpasang dengan kencang namun tidak

				terlalu rapat
3.	Kapas pembalut (sumber dari : halodoc)		Digunakan untuk membersihkan dan menutupi luka agar tidak mudah terinfeksi serta dapat digunakan untuk lapisan perban	Bersihkan luka dari kotoran, keringkan kulit sekitar luka, tutup luka
4.	Kasa berisi obat (sufra tulle, daryant tulle, bacti grass, actisorb, paronet) (sumber dari : alodokter)		Untuk melindungi luka sekaligus membantu penyembuhan luka. Seperti luka bakar dan infeksi bakteri sekunder	Potong Daryant-Tulle seluas daerah luka, dan tempelkan pada luka.
5.	Kasa dressing		Untuk menutupi luka bakar	Potong kain kasa sesuai ukuran dan lekatkan pada luka





6.	Kasa steril	 <p>Kasa Steril 16x16cm (KS B10)</p>	Untuk operasi besar atau kecil, khitan, penutup luka, dan bbebal pusar bayi	Bersihkan luka dan kotoran, bakteri dan partikel untuk mencegah nfeksi. Keringkan kulit sekitar luka dengan lembut. Tutup luka dari kotoran dan bakteri menggunakan Kasa Steril.
7.	Pembalut gips (gypsona)		Untuk membalut bagian tubuh setelah di beri lap kapas/ saat patah tulang	Anggota tubuh seperti lengan / kaki yang mengalami cedera di balut dengan gypsona (tidak boleh terkena air)
8.	Pembalut leher/cervical collar		Menopang kepala dan membatasi gerak dari cevital vertebrae	Penopang kepala pasien. Masukkan cervical collar secara perlahan lalu rekatkan kedua sisi
9.	Plester Elastik (handyplas, band aid, elastikon)		Menutup luka dan memberi bantalan bagi luka	Buka dan pasang lalu posisikan kasa yang ada ditengah plaster pada luka




10.	Plester kertas (leukopor, dermilite)		Untuk menutup luka yang memiliki daya rekat tinggi dan tembus udara sehingga meminimalisir terjadinya iritasi pada kulit	Tutup luka dengan menggunakan plester kertas dengan daya rekat yang tinggi dan terhindar dari air (waterproof)
11.	Plester plastik (leukofix, transfor)		Digunakan sebagai perekat untuk plester infus, kateter, kanula, dan lainnya	Sebagai isolasi yang melekatkan perban
12.	Plester plastik waterprof (setonplast, blenderm)		Plester luka kedap air, plester ini digunakan untuk membantu menjaga luka cepat sembuh, serta melindungi luka dari kuman dan kotoran	Plester ditempelkan pada luka. Plaster ini melindungi luka dari air agar tidak perih
13.	Plester rayon (microfore, dermisel)		Untuk menutup luka	Rekatkan bersamaan dengan kasa untuk menutupi bagian yang luka





14.	Plester sutera (leukosilk)		Menutup luka menggunakan manodiamon ke dalam sutra	Luka dibersihkaj dengan alkohol / antiseptik lainnya, tempel plaster pada luka, plaster ini lebih cepat memulihkan luka karena mengandung nano diamon
15.	Plester ZnO (leukoplast)		Digunakan sebagai perekat penutup luka, perekat tube, catheter, dan cannulae	Leukoplast digunakan seperlunya untuk pengobatan pada luka



(2) PERAWATAN PASIEN

No	Perawatan pasien	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Bedpan		Untuk mengandung feses pada pasien yang tidak boleh/bisa ke wc	Letakkan bedpan yang nyaman, pasien dibantu untuk berdiri/ diangkat atau posisinya diatas bedpan, jika sudah buang feses lalu cuci
2.	Breast pump		Membantu mempompa air susu	Jika anda memilih menggunakan alat pemerah ASI yang lebih mudah, cukup meletakkan alat isapnya di payudara anda. Alat pemerah asi akan menekan payudara adnda dan menyimpan ASI dalam botol yang terpasang. Supaya lebih jelas, berikut panduan cara menggunakan alat pompaASI manual dan elektrik




3.	Colostomy bag		Untuk menampung feses pada pasien setelah menjalani operasi calon (pembedahan usus untuk membuat anus buatan melalui otot dan kulit pada perut).	Dokter akan membuat sayatan lalu menanamkan cincin di dinding perut untuk menyangga agar ujung usus besar sapat berada dilokasi tepat pada dinding perut
4.	Ihsjap/eskap		Kompres dikepala apabila demam, untuk kompres dingin (sedera)	Isi eskap dengan esbatu yang sudah hancur ¾ volume, kompres pada area yang diinginkan, jika sudah selesai gantung eskap dengan posisi tutup dibawah untuk dikeringkan.
5.	Kruk		Tongkat untuk alat bantu jalan	Sesuaikan ukuran tongkat kruk, bangun dari duduk menggunakan tongkat kruk, berjalan dengan tongkat penyangga
6.	Pus basin/emesis basin		Menampung muntah, nanah, kapas, dll	Pada saat melakukan operasi dokter akan menggunakan pus basin sebagai tempat pembuangan kapas bekas.





7.	Spalk		Untuk menahan atau menjaga agar bagian tulang yang patah tidak bergerak	Lepaskan area yang menutupi area tubuh yang mengalami patah tulang, ratakan area patah tulang dengan bidal / splak lalu sepotong kain bila tidak ada
8.	Tapelhoed/nipple shield		Melindungi puting susu saat menyusui	Tempelkan nipple shield pada puting sebelum menyusui. Biarkan bayi menyusui, melewati nipple shield
9.	Tongkat pyramide/elbow		Alat bantu jalan untuk jalan untuk menopang tubuh waktu berdiri	Pasang tongkat dengan tangan berlawanan pastikan tongkat sedikit ke samping. Gerakan tongkat kedepan pada saat yang sama maju dengan kaki yang sakit dan pegang tongkat secara stabil





10.	Urinal		Penampung urine khusus pria	Posisikan alat kelamin kedalam wadah, gunakan untuk menampung urin
11.	Walker		Alat bantu jalan dengan membantu keseimbangan	Pegang tongkay dengan tangan yang berlawanan dengan sisi yang sakit. Posisikan tongkat sedikit ke samping gerakkan tongkat kedepan pada saat yang sama maju dengan kaki yang sakit dan pegang tongkat secara stabil
12.	Warm waterzak		Untuk menghangatkan bagian tubuh	Masukkan air panas kedalam warm water zak, dan tempelkan pada bagian tubuh yang sakit
13.	Windring/air cusion		Membantu penderita ambeien atau pasien yang memerlukan bantalan untuk duduk	Meletakkan bantgal windring sebagai alas untuk duduk





No	Alkes tindakan medis	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Ballon/foley catheter		<p>Digunakan untuk membantu mengeluarkan urine serta mengosongkan kandung kemih pada pasien yang mengalami kesulitan buang air kecil (retensi urine).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencuci tangan dan membuka alat kateter. 2. Letakkan perlek dibawah anus pasien setelah pakaian bawah pasien dibuka. 3. Daerah vulva akan dibersihkan dengan kapas dan cairan antiseptik. 4. Selang karakter diberikan pelumas agar mudah dimasukan ke saluran uretra 5. Selang kateter dimasukan hingga mencapai leher kandung kemih sekitar 5 cm. 6. Bernapas hingga urine keluar. 7. Kosongkan kantung urine yang terhubung dengan karter setiap 6-7 jam sekali.
2.	Condom catheter		<p>Alat drainase urine eksternal yang mudah untuk digunakan dan aman untuk mengalirkan urine pada kelamin pria</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gunakan sabun dan air hangat, cuci tangan dan penis. Bersihkan kepala penis, tarik kembali melewati kepala. 2. Bilas penis, lalu biarkan hingga benar-benar kering. 3. Periksa penis anda apakah ada yang iritasi atau luka terbakar. 4. Jika menggunakan sealant, oleskan pada kulit penis dan sekitar area kemaluandan biarkan mengering, seharusnya tersasa halus dan licin saat kering. 5. Letakkan kondom diujung penis dan buka gulunganya secara perlahan hingga mencapai pangkalnya.





				<p>Sisakan ruang yang cukup pada ujungnya (1 sampai 2 inci) agar tidak bergesekan dengan kondom</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Jika kondom mengansung perekat, tempelkan pada penis anda sekitar 15 detik 7. Tempatkan penahan sarung di sekitar penis anda dipangkalnya, jaga agar sedikit longgar agar tidak menghentikan aliran darah. 8. Hubungkan selang pada tas pengumpul ke kondom. 9. Ikat tas pengumpul ke kaki anda (dibawah lutut) unntuk drainase yang baik. 10. Jika ingin melepas kondom lama dengan mengulungnya, bukan menariknya.
3.	Disposable syringe		<p>Alat bantu medis yang berupa pompa piston sederhana untuk menyuntikkan atau menghisap cairan atau gas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buka penutup alat suntik, 2. Celupkan ujung jarum ke cairan atau obat yang akan dihisap, 3. Tarik piston sampai obat atau cairan terhisap dengan sesuai yang dibutuhkan, 4. Kemudian, arahkan jarum ke bagian tubuh yang akan disuntikkan.




4.	Endotracheal		<p>Untuk menjaga jalan napas tetap terbuka pada pasien yang tidak mampu bernapas sendiri atau mempertahankan jalan napasnya sendiri.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dibius terlebih dahulu, 2. Masukkan tabung endotrakeal ke batang tenggorokan dengan ventilator
5.	Enema syringe		<p>Untuk membersihkan lubang anal sehingga saluran pengeluaran kotoran menjadi bersih.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berbaring miring kearah kiri pada alas 2. Kedua kaki ditekuk dan lutut ditempelkan ke dada, 3. Masukkan selang enema secara perlahan melalui dubur kira-kira sampai kedalaman 10 cm.
6.	Feeding syringe		<p>Digunakan untuk membantu memberikan susu atau makanan</p>	<p>Masukan makanan yang sudah dihaluskan atau susu ke dalam Feeding syringe, lalu dimasukkan kedalam mulut.</p>



7.	Feeding tube		Memasukkan cairan makanan melalui hidung atau mulut	Masukkan selang melalui hidung / mulut. Makanan spuit kedalam lubang bawah untuk memasukkan makanan kedalam tubuh
8.	Gliserin syringe		Menyemprotkan clysmo melalui anus	Letakkan bedpan dibawah anus, lalu masukkan gliserin ke anus secara perlahan dengan tangan kiri memegang anus dan tangan kanan memasukkan gliserin ke dalam anus
9.	Gloves/handschoen (sumber dari: halodoc)		Untuk mencegah penularan kuman, dan untuk oprasi atau bedah.	Cuci tangan terlebih dahulu lalu pasang gloves sebelum melakukan tindakan
10.	Infusion set dewasa (sumber dari: halodoc)		Selang pemberian saluran infus untuk orang dewasa	Usap tangan pasien dengan alkohol swab, lalu cari intravenanya untuk dipasang selang infus



11.	Infusion set pediatrik (sumber dari: halodoc)		Selang pemberian infus pada anak / bayi	Usap tangan pasien anak / bayi dengan menggunakan alkohol swab, lalu cari intravena nya untuk dipasang selang infus.
12.	Insulin syringe (sumber dari: halodoc)		Untuk suntik insulin (diabetes)	Cubit kulit yang akan di suntik, bersihkan menggunakan tisu alkohol, masukkan jarum suntik dengan posisi 90°, kemudian dorong pompa suntik hingga semua dosis insulin masuk kedalam tubuh, lalu saat selesai tarik jarum suntik sebelum melepas cubitan.
13.	Intra vena catheter (sumber dari: halodoc)		Sebagai vena tambahan dalam pengobatan jangka panjang (48 jam)	Masukkan jarum infus ke pembuluh darah di siapkan tabung IV, pilih IV kateter yang sesuai
14.	Masker oksigen (sumber dari: halodoc)		Memberikan O2 dengan kadar sedang	Pastikan sudah terpasang selang ke sumber oksigen, pastikan kantung reservoir mengembang, dan pastikan terdapat katup satu arah berfungsi baik, ubah aliran O2 menjadi 10-15 L/menit dan letakkan masker oksigen pada wadah pasien menutupi hidung dan




				mulut
15.	Masker nebulizer anak-anak (sumber dari: halodoc)		Meletakkan saluran nafas untuk anak-anak	Masukkan obat ke cangkir nebulzer sesuai aturan dokter, sambungkan corong mulut ke cangkir nebulizer pasang selaang penyambung antara mesin kompressor dan cangkir nebulizer, nyalakan mesin, letakkan corong mulut ke mulut dan pastikan tidak celah, biasanya membutuhkan waktu 15-20 menit
16.	Masker nebulizer dewasa (sumber dari: halodoc)		Melegakan saluran nafas untuk orang dewasa	Masukkan obat ke cangkir nebulzer sesuai aturan dokter, sambungkan corong mulut ke cangkir nebulizer pasang selaang penyambung antara mesin kompressor dan cangkir nebulizer, nyalakan mesin, letakkan corong mulut ke mulut dan pastikan tidak celah, biasanya membutuhkan waktu 15-20 menit
17.	Metal cathether (sumber dari: halodoc)		Mengeluarkan kencing	Alat ini biasanya untuk mengeluarkan kencing, dengan memasukkan metal cateter kedalam kelamin lalu tariki ujung bulat metal cateter agar bisa mengeluarkan kencing
18.	Mucus extractor (sumber dari: halodoc)		Menghisap lendir pada hidung bayi	Masukkan selang yang tidak ada tonjolan ke dalam hidung / mulut, kemudian di tarik sambil di hisap

19.	Nasal gastric tube (sumber dari: halodoc)		Menyuplai makanan dan minuman pada pasien yang tidak normal	Memasukkan selang melalui lubang hidung, melewati tenggorokan hingga masuk ke lambung. Setelah itu masukkan makanan, minuman dan obat.
20.	Nebulizer set		Alat untuk mengubah cairan menjadi uap yang dihirup	Masukkan obat ke cangkir nebulizer dengan anjuran dokter, sambungkan corong ke cangkir nebulizer, pasang selang penyambung antara mesin kompersor, nyalakan mesin, letakkan corong ke mulut dan pastikan tidak ada celah, prosedur ini membutuhkan waktu 15-20 menit
21.	Needle		Alat menembus kulit agar obat / sediaan cair masuk kedalam pembuluh darah	Buka jarum suntik. Masukkan ke dalam spuit, dan siap digunakan
22.	Nelaton cathether		digunakan untuk drainase urine jangka pendek atau alat bantu pengosongan kandung kemih dalam proses kateterisasi.	Selang kateter diberi pelumas untuk memudahkan ketika dimasukkan ke dalam sel uretra, dimasukkan hingga mencapai kandung kemih, setelah itu pasien sudah bisa kencing menggunakan selang kateter

<p>23.</p>	<p>Oxygen nasal canula</p>		<p>digunakan untuk memberikan oksigen pada orang dewasa dengan kebutuhan oksigen rendah atau pada bayi dan anak dengan nares paten yang membutuhkan oksigen tambahan tingkat rendah.</p>	<p>Posisikan pasien untuk duduk, hubungkan selang kanul ke sumber O2, nyalakan aliran oksigen sesuai dosis yang dibutuhkan pasien.</p>
<p>24.</p>	<p>Rectal tube</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengeluarkan udara dari usus atau menghilangkan ketegangan perut 2. Mengeluarkan faeses yang berbentuk cair terutama pada pasien diare 	<p>Pasang alas bokong, memasang plastik diujung rectal tube dan ikat dengan karet, olesi dengan pelumas, buka anus dengan tangan kiri, masukkan rectal tube perlahan, memfiksasi rectal tube dengan menghilang.</p>
<p>25.</p>	<p>Spinal needle</p>		<p>Digunakan sebagai alat untuk menstabilkan penempatan jarum berukuran kecil selama anestesi tulang belakang.</p>	<p>Masukkan spinal needle ke dalam spuit lalu masukkan obat / cairan, suntikkan ke dalam tubuh</p>




26.	Stomach tube		Untuk pengambilan getah lambung atau membilas atau mencuci perut	Masukkan selang ke dalam tubuh, dengan melapisi pelumas dulu, pasang selang dengan stomach tube digunakan untuk membilas isi perut
27.	Suction cathether		Untuk mengeluarkan cairan berlebih khususnya pada daerah oropharyngeal dan Nasopharyngeal. (daerah rongga mulut dan rongga hidung).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan cuci tangan dan Identifikasi pasien 2. Siapkan dan dekatkan alat ke pasien <ol style="list-style-type: none"> a. Alat penghisap lendir b. botol berisi larutan desinfektan c. Kateter penghisap lendir steril d. Pinset steril e. Sarung tangan steril 3. Tempatkan pasien pada posisi terlentang atau kepala miring ke arah perawat (Pakai sarung tangan) 4. Hubungkan kateter penghisap dengan slang alat penghisap 5. Hidupkan mesin penghisap 6. Lakukan penghisapan lendir dengan memasukkan kateter penghisap kedalam kom berisi aquades atau NaCl 0,9% untuk mempertahankan tingkat kesterilan (asepsis) 7. Masukkan kateter penghisap dalam keadaan tidak menghisap 8. Gunakan alat penghisap dengan tekanan 110 - 150 mmHg untuk dewasa, 95 - 110 mmHg untuk anak-anak dan 50 - 95 mmHg

			<p>untuk bayi (Potter & Perry,1995)</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Lakukan penghisapan dengan tarik memutar kateter penghisap tidak lebih dari 10. detik, bisa dilakukan 3 – 5 kali jika masih kotor 11. Bilas kateter dengan aquades atau NaCl 0,9% 12. Apabila pasien mengalami distress pernafasan, biarkan istirahat 20 - 30 detik sebelum melakukan penghisapan berikutnya. 13. Setelah selesai, kaji jumlah, konsistensi, warna, bau sekret dan respons pasien terhadap prosedur yang dilakukan
28.	Suction connecting		<p>Selang penghubung antara chateter dengan mesin penyedot.</p> <p>Selang penghubung yang dihubungkan dengan suction chateter.</p>
29.	Tranfusion set		<p>Alat steril yang berfungsi mengalirkan mengalirkan darah atau produk darah dari kantong darah ke dalam pembuluh darah pasien.</p> <p>Pasang selang ketangan pasien, sebelumnya diusap dengan alkohol swab, cari intravena pasien lalu pasang tranfusi set.</p>




30.	Tuberculin syringe		untuk pasien penderita TBC / suntik vaksinasi	Masukkan cairan ke alat suntik, pastikan gelembung udara di alas suntik tidak ada, suntikan dengan tegakan lurus mendorong pelan stik di tabung ke dalam.
31.	Urine bag		Menampung air kencing	Pasang kondom chateter lalu pasang urine bag pada pasien.
32.	Wing needle		Sebagai vena tambahan	Tentukan vena pasien, masukkan cairan kedalam spuit, pasang wing needle, tusuk bagian yang akan diambil darahnya.

(4) ALAT-ALAT BEDAH




No	Alat-alat bedah	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
----	-----------------	--------	----------	------------------



1.	Arterie klem/artery forceps		Alat untuk menjepit suatu benda	Pegang arteri klem dengan jari lalu capit benda yang akan dipakai.
2.	Bandage scissors		Alat untuk menggunting perban tanpa mencungkil kulit	Siapkan perban dan bandage scissors lalu gunting perban dengan bandage scissors sesuai kebutuhan.
3.	Benang jahit catgut chromic		Benang jahit unuk penjahitan luka yang dianggap bekam rapat dalam waktu 10 hari	Masukkan benang jahit ke jarum bedah, bius pasien dahulu sebelum melakukan operasi.




<p>4.</p>	<p>Benang jahit catgut plain</p>		<p>Menjahit jaringan lunak seperti otot, usus dan uterus. Dapat diserap 3-7 hari</p>	<p>Masukkan benang jahit ke jarum bedah, bius pasien terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan.</p>
<p>5.</p>	<p>Benang jahit silk</p>		<p>Menjahit luka yang ada dikulit dan sering bergerak</p>	<p>Masukkan benang jahit ke jarum bedah, bius pasien dahulu sebelum melakukan tindakan.</p>



<p>6.</p>	<p>Bisturi</p>		<p>Pisau operasi untuk prmbedahan</p>	<p>Pegang bisturi dengan menggenggam bagian bawah, pastikan pisau bisturi sudah disterilisasi, lalu arahkan ke tempat yang akan disayat.</p>
<p>7.</p>	<p>Forceps/pinset anatomis</p>		<p>Penjepit jaringan dalam proses operasi</p>	<p>Tekan pada bagian tengah (bagian yang berisi-garis) dengan menggunakan jari.</p>
<p>8.</p>	<p>Forceps/pinset cilia</p>		<p>Untuk mencabut rambut, untuk membantu proses melahirkan normal</p>	<p>Pasien akan dianstesi dulu, lalu pasang kateter urine untuk mengosongkan kandung kemih. Dokter akan membuat sayatan dijalan lahir untuk mempermudah proses mengeluarkan bayi dengan forceps.</p>

9.	Forceps/pinset sirugis		Untuk menjepit jaringan pada waktu diseksi membentuk pola jahitan	Genggam pinset dengan ibu jari dan dua atau tiga jari lain dalam satu tangan, lalu gunakan untuk menggenggam objek kecil dengan cepat dan mudah.
10.	Forceps/pinset splinter		Mencabut pecahan yang menancap dipermukaan kulit	Jika ada pasien yang mengalami kecelakaan seperti terkena pecahan kecil, bisa diambil dengan alat tersebut.

11.	Gunting bedah mayo		Memotong jaringan dan menggantung balutan	Selama pembedahan bila ada jaringan atau balutan yang tidak sesuai maka bisa dipotong dengan gunting bedah mayo
12.	Gunting bedah metzenbaum		Untuk memotong jaringan halus dan diseksi tumpul untuk menggantung jaringan	Pegang gunting dengan tangan kanan. lalu gunting perban atau bagian tubuh yang akan dilakukan pembedahan.
13.	Gunting bedah runcing		Untuk mencukur, memotong atau membedah (usus, jantung)	Memegang gunting dengan ibu jari dan jari telunjuk untuk memotong organ tubuh.

14.	Gunting tali pusar		Memotong tali pusar bayi baru lahir	Genggam alat dengan tangan kanan lalu potong tali pusar pada bayi yang baru lahir.
15.	Hecting set		Alat bedah minor untuk menjahit luka	Membantu saat benang jahit keluar dan masuk ke dalam kulit.

16.	Jarum jahit		Menutupi goresan, luka dan sayatan	Anestesi dulu, pembersihan luka, jahit luka dengan jarum jahit yang sesuai yang akan digunakan.
17.	Klem mosquito		Menjepit jaringan tubuh maupun pembuluh darah untuk menghentikan pendarahan	Jepit jaringan dengan memegang klem dengan tangan kanan (dominan).
18.	Klem tali pusat/umbilical cordclem		Menjepit tali pusat yang baru dipotong dari plasenta	Jepit tali pusar dengan klemtasi pusar pada bayi yang baru lahir.



19.	Needle holders		Menjepit jarum jahit serta menjahit luka tertentu	Memotong benang dengan alat ini selama pembedahan.
20.	Peritoneum forceps		Menjepit jaringan selaput perut	Genggam peritoneum dengan tangan kanan, jepit jaringan dengan peritoneum

21.	Skalpel		Pisau untuk pembedahan	Tentukan lokasi tubuh bagian yang akan dilakukan pembedahan bedak bagian atau dengan skalpel.
-----	---------	------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------



(5) Disinfektan



No	Disinfektan	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Alkohol 70%		Untuk antiseptik, membersihkan luka dan membersihkan alat-alat medis	Basuh luka dengan alkohol 70% dan lakukan dengan hati-hati.

<p>2.</p>	<p>Alkohol swab</p>		<p>alat kesehatan berupa kapas atau tisu alkohol antiseptik yang digunakan untuk membersihkan luka dan pembersih alat-alat kesehatan</p>	<p>siapkan alat yang akan dibersihkan sebelum digunakan, lap dengan alkohol swab dan sebelum disuntik biasanya kulit dilap dengan alkohol swab agar bersih dari kuman.</p>
<p>3.</p>	<p>H₂O₂ 3%</p>		<p>Antiseptik untuk mencuci luka berfungsi untuk mencegah infeksi kulit dari luka gores, luka bakar, luka potong</p>	<p>Bersihkan luka dengan alkohol terlebih dahulu, lalu obati luka dengan hidrogen peroksida dengan kapas.</p>

4.	Povidone iodine		Agen antiseptik yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi pada luka	Bersihkan daerah yang luka, oleskan sedikit larutan povidon iodine ke luka lalu tutup luka dengan perban steril.
5.	Rivanol		Cairan desinfektan yang di gunakan untuk membersihkan luka.	Tuang rivanol pada kapas, kemudian usapkan pada luka.

(6) APD

No	APD	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Apron		<p>pelindung tubuh untuk melapisi luar gaun yang digunakan oleh petugas kesehatan dari penetrasi cairan infeksius pasien dan melindungi diri dari suhu panas dan percikan bahan kimia berbahaya</p>	<p>Sebelum memasuki laboratorium atau tempat yang berbau kimia, pakai apron terlebih dahulu untuk melindungi diri.</p>
2.	Masker		<p>suatu benda yang fungsinya digunakan untuk melindungi serta menutup hidung dan mulut agar terhindar dari paparan virus</p>	<p>Pasang masker diwajah sebelum melakukan aktifitas yang membutuhkan masker.</p>



3.	Masker N95 disposable	 <p>The image shows a blue and white box of CHEKED N95 Disposable Surgical Mask. Two white, pleated surgical masks with yellow elastic straps are shown in front of the box. The box has the brand name 'CHEKED' and 'N95 Disposable Surgical Mask' printed on it. A small logo for 'Galeri Medika' is visible at the bottom right of the image.</p>	Pelindung wajah dengan penyaring partikel	Pasang masker setelah memakai masker bedah.
4.	Non woven/surgical cap	 <p>The image shows a brown cardboard box labeled 'Surgeon Cap'. A teal-colored surgical cap is placed on top of the box. The box has the text 'Surgeon Cap' in a blue banner. Below the banner, there are some smaller text details: '• Tanpa filter', '• Bahan non woven', '• Iyemex', and '100 pcs'. At the bottom, it says 'Made in Indonesia'.</p>	Menutup dan melindungi rambut dan mencegah terjadinya jatuhnya keringat atau rambut	Siapkan surgeon cap, pasang di kepala sebelum melakukan tindakan.

5.	Sarung tangan		pelindung tangan dari pengaruh lingkungan	Siapkan gloves, pasang di kedua tangan.
6.	Shoe cover		pelindung bagian kaki dari paparan virus/bakteri penyebab penyakit	Pastikan telah memakai sepatu atau sandal yang bersih, pakailah shoe cover dengan benar.



7.	Kaca mata google		Pelindung terhadap paercikan cairan tubuh /benda lain pada saat melakukan operas, melindungi terhadap sinar UV	Sebelum melakukan tindakan operasi pasang kaca mata google di mata dengan posisi yang nyaman.
----	------------------	------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

(7) ALKES UNTUK DIAGNOSA



No	Alkes untuk diagnosa	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Anaroid spygmomanometer		Untuk mengukur tekanan darah	Sipkan spygmomanometer, pasang manset tempatkan stetoskop, pompa manset.periksa tekanan darah sistolik dan diastolik, baca hasil tekanan darah.

2.	Electrical sphygmomanometer		Untuk mengukur tekanan darah	Gunakan manset pada lengan atas pastikan ujung selang berada di tengah lengan, kencangkan manset, saat pengukuran duduk tegak dan kaki merapat dilantai.
3.	Mercurial sphygmomanometer		Untuk mengukur tekanan darah (lebih akurat, bebas air raksa)	Lengan pasien diminta untuk lurus lalu pasang manset di kengan pompa sampai selesai.



<p>4.</p>	<p>Chart vision Snellen</p>		<p>Untuk mengetahui kesehatan mata pasien</p>	<p>Pasien diminta duduk/berdiri dengan jarak 6 meter dari kartu snellen, tutup salah satu mata pasien, pasien akan membaca dari garis paling atas ke bawah dan petugas kesehatan akan memeriksa.</p>
<p>5.</p>	<p>Ear speculum</p>		<p>Memeriksa rongga telinga</p>	<p>Spekulum di fixasi dengan ibu jari dan jari telunjuk, daun telinga dijepit menggunakan jari tengah & jari manis tangan kiri, sebaliknya dilakukan apabila ingin memeriksa telinga kiri.</p>

6.	Ear thermometer		Mengukur suhu dalam saluran telinga menggunakan inframerah	Tekan tombol ON masukkan perlahan termometer kedalam telinga belakang, ukur suhu tubuh hingga terdengar bunyi yang sebagai penanda pengukuran sudah selesai, lihat hasil di layar termometer dan tekan tombol OFF untuk mematikan.
7.	Gelang pasien		Tanda pengenal atau penanda pasien	Kuning: pasien dengan pengawasan Merah: alergi obat Biru pasien laki-laki Pink: pasien perempuan Abu-abu: pasien kemoterapi



8.	Head lamp		Lampu senter kepala untuk periksa pasien, biasanya digunakan dibagian THT. IGD, ruang bedah	Memasang di kepala sebelum memulai tindakan.
9.	Hemometer		Untuk menentukan kadar hemoglobin dalam darah berdasarkan saluran warna	Mengisi tabung degan HCl 0,01N sampai garis batas, mengambil darah dengan sanli sebanyak 0,02 ml. memasukkan darah ke tabung suhu dan aduk, mengencerkan dengan aquades sedikit demi sedikit hingga didapatkan warna yang sama dengan warna standar hemometer.



10.	Ishihara's test for colour blindness	 The image shows an Ishihara color blindness test chart. It consists of five circular patterns of small colored dots. The top-left circle contains the number '12' in red. The other circles contain various patterns of colored dots in shades of green, yellow, and brown.	Untuk menentukan kelainan buta warna	Pasien disuruh membaca huruf/angka yang ada di buku, ada pula pola untuk pasien ikuti dengan perbedaan warna yang ada.
11.	Laringeal mirror	 The image shows four laryngeal mirrors of different sizes. Each mirror has a circular head and a long, thin handle. They are arranged vertically, with the largest mirror at the top and the smallest at the bottom.	Memeriksa keadaan dalam mulut	Cermin dimasukkan ke belakang rongga mulut dengan permukaan cermin menghadap keatas.



12.	Nasal speculum		Memeriksa rongga hidung	Masukan alat ke rongga hidung dengan posisi vertikal, masukkan specukulum I cm ke dalam vesti bulum.
13.	Pen needle		Untuk penggunaan insulin, untuk mengendalikan kadar gula dalam darah	Siapkan insulin pen dan pen needle pasang pen needle dibawah lalu insulin pen siap digunakan.



14.	Percussion hammer		Mengetuk permukaan tubuh untuk menghasilkan suara dengan tujuan diagnostik	Pegang pada gagang pegangan oleh dokter, kemudian ayunkan alat ke arah bagian tubuh yang sakit/berkelainan.
15.	Pulse meter		Memeriksa lubang anus/rectal	Cuci tangan, masukkan bagian anoskop ke dalam anus, sisipan itu melebarkan anus hingga diameter tabung.



16.	Rectum speculum	 A rectum speculum, a medical instrument used for examining the rectum. It consists of a long, thin metal shaft with a black handle at the top and a small, circular speculum at the bottom.	Memancing reaksi untuk mendeteksi kelaian fisik	dipegang pada bagian gagang pegangan oleh dokter yang bersangkutan. Kemudian palu tersebut akan di ayunkan mengarah ke bagian dari tendon yang disinyalir memiliki kelainan.
17.	Reflex hamer	 A reflex hammer, a medical instrument used for testing reflexes. It has a long, thin metal shaft with a curved handle at the top and a small, circular head at the bottom.	Memeriksa lubang anus/rectal	Cuci tangan, masukkan bagian anoskop ke dalam anus, sisipan itu melebarkan anus hingga diameter tabung.


<p>18.</p>	<p>Spirometer</p>		<p>Mengukur aliran udara masuk dan keluar dari paru-paru</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Duduklah dengan posisi paling nyaman. 2. Kemudian, dokter akan menutup hidung Anda menggunakan alat semacam klip tepat di atas hidung. 3. Tarik napas dalam-dalam dan tahanlah selama beberapa detik. 4. Embuskan ke dalam mouthpiece pada spirometer sekuat dan secepat yang Anda bisa
<p>19.</p>	<p>Stethoscope binaural</p>		<p>Untuk mendengar bunyi /detak organ tubuh</p>	<ul style="list-style-type: none"> *Pastikan alat pendengar menghadap ke depan. Jika Anda memakainya menghadap ke belakang. Anda tidak akan bisa mendengar bunyi apa pun. *Pastikan alat pendengar memiliki bantalan yang ukurannya pas dan dapat mengunci" dengan baik di telinga Anda untuk menghindari suara-suara dari lingkungan sekitar. Jika ukurannya tidak pas, biasanya bantalan tersebut dapat dilepas. Kunjungi toko penyedia alat medis untuk membeli bantalan barua *Pada beberapa jenis stetoskop. Anda juga dapat memiringkan atau menekuk gagang alat pendengar ke depan untuk membuatnya pas di telinga


20.	Stethoscope monoaural		Untuk mendengar suara organ dakim tubuh detak jantung bayi	Tempelkan bulat besar diperut ibu lalu gunakan untuk mendengar detak jantung bayi dengan bulatan kecil.
21.	Stopwatch		Untuk menghitung waktu	Stopwatch sesuai yang diinginkan, lalu letakan stopwatch di tempat aman.

22.	Termometer digital		<p>Untuk mengukur suhu tubuh digital melalui mulut, ketiak dan rektal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nyalakan termometer dengan menekan atau menggeser tombol ON. 2. Masukkan termometer secara perlahan dan hati-hati ke dalam mulut, lipatan ketiak atau liang telinga anak. 3. Biarkan selama 3 sampai 5 menit atau tunggu sampai ada bunyi yang menunjukkan pengukuran suhu sudah selesai dilakukan.
23.	Termometer oral	 <p>hellery1</p>	<p>Mengukur suhu tubuh melalui oral</p>	<p>meletakkan ujung termometer di bagian bawah lidah dan tutup mulut hingga alat mengeluarkan bunyi tertentu.</p>

24.	Termometer rektal		Mengukur suhu tubuh melalui rektal	<ol style="list-style-type: none">1. Mencuci Tangan.2. Siapkan Termometer.3. Posisikan Tubuh dalam Keadaan Nyaman.4. Masukkan Termometer ke Anus. Cabut Termometer dari Anus.5. Catat Hasilnya dan Bersihkan Termometer
25.	Timer lab		Untuk pengingat waktu medis	Searah jarum jam hingga ke-angka 55 Kemudian diputar balik ke arah waktu sesuai yang diinginkan.

<p>26.</p>	<p>Tongue depressor</p>		<p>Untuk menekan lidah agar dapat melihat lebih jelas keadaan tenggorokan</p>	<p>Pasien diminta untuk membuka mulut, lalu tekan lidah dengan Tongue depressor</p>
<p>27.</p>	<p>Tourniquet</p>		<p>Untuk menghentikan pendarahan pada luka terbuka di lengan dan kaki</p>	<p>tourniquet dipasang pada 3-4 inci di atas tempat tusukan. Jika terlalu dekat dari tempat tusukan, vena dapat kolaps ketika darah terisap ke dalam tabung dan jika terlalu jauh dari tempat tusukan pengambilan darah tidak akan efektif.</p>

28.	Vaginal speculum		Untuk memeriksa lubang vagina	Dikedalam vagina selama opearsi langsung dan memeriksa vagina didalamnya.
-----	------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------------------------------------------



B. SWAMEDIKASI

Buatlah studi kasus setiap harinya dengan katagori obat yang berbeda dan wajib menyelesaikan 20 jenis Obat yang tertera dalam tabel

No	Nama obat	Kategori	Studi Kasus	Patient assesment	Pemilihan Obat dan alasannya	Pelayanan informasi obat
1.	Analgetik dan antipiretik	paracetamol; ibuprofen	Seorang ibu membawa anaknya ke Apotek dengan membawa hasil laboratorium yang menunjukkan NS1 positif, Anaknya sudah mengalami demam selama 1 hari dengan berat badan 10 kg dan berumur 12 bulan. belum minum obat sama sekali, hanya di kompres	W : Anak umur 12 bulan, BB 10 kg W :Demam, Riwayat NS1 positif H :1 hari A :Dikompres M : Belum diminumi obat sama sekali	Obat yang terpilih Paracetamol Alasannya karena hasil laboratorium menunjukka n NS1 Positif, menandakan pasien dengan DHF, rentan terjadi pendarahan jika diberikan ibu profen	Indikasi : Meredakan nyeri termasuk sakit kepala, sakit gigi, demam yang menyertai flu dan setelah imunisasi Cara penggunaan: Dosis paracetamol 10 mg/Kg BB= 10X 10 KG= 100/ PER cth paracetamol mengandung 120 mg x 5 ml= 4,1 ~5 ml bila demam, maksimal 4 kali sehari selang 6 jam sesudah makan Kapan berhenti: jika mual semakin meningkat Kapan harus ke dokter : 5 hari setelah gejala muncul ESO yang sering : mual muntah, gangguan hati Cara menyimpan : Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
2.	Batuk	gliseril guaiakolat (guaifenesin), bromheksin,	Pasien ibu- ibu dengan usia 60 tahun datang mengeluhkan batuk selama 2 hari terakhir, ngekel, dahak sulit keluar. Baru diminumi air garam namun keluhan tidak	W : Ibu- ibu, usia 60 tahun W : Batuk ngekel, dahak sulit keluar	Obat yang terpilih Asetil sistein Alasannya	Indikasi : terapi pengencer dahak pada penyakit bronkial dan paru akut dan kronik dengan dahak yang

		diphenhidramin, asetilsistein, noskapin	berkurang, dan sudah dibelikan konimex oleh anaknya di toko	H :2 hari A : Minum air garam M : Konimex	karena mempunyai efek yang baik untuk mengencerkan dahak	tebal, seperti bronkhitis akut, bronkhitis kronik dan akut berulang, emfisema paru Cara penggunaan: 3 kali sehari sesudah makan Kapan berhenti: jika terjadi reaksi hipersensitivitas Kapan harus ke dokter : jika selama 5 hari keluhan belum berkurang ESO yang sering : mual, muntah, Cara menyimpan : simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung
3.	Obat Flu	Sediaan kombinasi parasetamol, dekstrometorf an, gliseril guaiakolat (guaafenisin), CTM, dan efedrin/pseudo efedrin/ fenilpropanolamin	Seorang ibu- ibu berusia 30 tahun datang mengeluhkan meriang 1 hari ini, tenggorokan gatal seperti mau batuk, dan sering bersin- bersin. Sudah mandi pakai air hangat dan minum jahe hangat belum berkurang	W : Ibu- ibu berusia 30 tahun W :tenggorokan gatal seperti mau batuk, dan sering bersin- bersin. H :1 hari A : Mandi menggunakan air hangat M :Minum jahe hangat	Obat yang terpilih kombinasi parasetamol, dekstrometorf an, gliseril guaiakolat (guaafenisin), CTM, dan efedrin/pseudo efedrin/ fenilpropanolamin seperti Tuzalos Alasannya karena pasien juga	Indikasi : Gejala flu : batuk, demam, pilek karena alergi. Cara penggunaan:3 kali sehari sesudah makan Kapan berhenti: Jika terjadi reaksi hipersensitivitas Kapan harus ke dokter : Setelah 5 hari gejala belum berkurang ESO yang sering : Mengantuk, Takikardia Cara menyimpan : Simpan ditempat sejuk dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung

					Merasakan meriang, batuk serta sering bersin- bersin	
4.	Obat Maag	Antasida, antagonis H ₂ (ranitidine, famotidine)	Wanita berusia 25 tahun mengeluhkan nyeri perut atas disertai mual selama 2 hari ini, sudah diminumi Antasida, tapi keluhan tidak berkurang dan perut diberi minyak kayuputih juga tidak berkurang	W : Wanita berusia 25 tahun W :mengeluhkan nyeri perut atas disertai mual H : 2 hari A : diberi minyak kayuputih juga tidak berkurang M : sudah diminumi Antasida	Obat yang terpilih Ranitidine Alasannya.Karena dapat mengatasi tukak lambung, seperti nyeri di bagian perut atas	Indikasi : ulkus duodenum aktif, ulkus gaster benigna aktif, refluks esofagitis, pencegahan relaps ulkus peptikum, hipersekresi patologi Cara penggunaan:2 kali sehari 30 menit sebelum makan Kapan berhenti: Jika terjadi reaksi yang merugikan Kapan harus ke dokter : Jika selama 5 hari keluhan tidak berkurang ESO yang sering :Konstipasi Cara menyimpan : simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari
5.	Kecacingan	Pirantel pamoat, piperazin, mebendazol	Seorang ibu datang ke apotek mengeluhkan bahwa anaknya yang berusia 8 tahun sudah 1 minggu mengalami nafsu makan yang menurun, sering terlihat lemas, dan mengeluh gatal di bagian duburnya tiap malam hari, BB nya pun kian menurun. Dikasih vitamin penambah nafsu makan juga tetap sama saja	W :Anaka usia 8 tahun W : mengalami nafsu makan yang menurun, sering terlihat lemas, dan mengeluh gatal di bagian duburnya tiap malam hari, BB nya pun kian menurun H : 1 minggu A :	Obat yang terpilih Pirantel pamoat Alasannya karena dapat membasmi cacing (cacing kremi, cacing tambang, cacing gelang, cacing cambuk) di	Indikasi : Cara penggunaan:Dimin um 1 kali sehari 2-3 sendok takar sebelum tidur, hanya sekali selama 6 bulan kedepan Kapan berhenti: Kapan harus ke dokter : ESO yang sering : Sakit perut, demam dan sakit kepala Cara menyimpan

				Tidak dilakukan M : Dikasih vitamin penambah nafsu makan	dalam tubuh.	:Dikotak obat dan terhindar dari sinar matahari secara langsung
6.	Diare	Attal pugit, kaolin pectin, oralit, Norit	Selfi berumur 20 tahun mengeluh hari ini BAB cair lebih dari 4 kali, sedikit lemas dan perut terasa seperti diremas-remas setelah tanpa sengaja meminum cairan pembersih lantai. Karena di rumah terdapat oralit, diminumi oralit dan minum air lebih banyak dari biasanya untuk menghindari dehidrasi	W :Selfi berumur 20 tahun W : BAB cair lebih dari 4 kali, sedikit lemas dan perut terasa seperti diremas- remas setelah tanpa sengaja meminum cairan pembersih lantai H : 1 hari A : Minum air putih yang banyak M :Minum oralit	Obat yang terpilih Antal pugit Alasannya karena pasien keracunan cairan pembersih maka diberikan obat tersebut agar dapat menyerap racun nya	Indikasi : Untuk pengobatan simptomatik pada diare yang tidak diketahui penyebabnya. Cara penggunaan:Tiap BAB 2 tablet, maksimal 12 tablet per hari, diminum selang 2 jam dengan obat lain Kapanberhenti:Jik a diare sudah reda Kapan harus ke dokter : Saat kondisi semakin lemas ESO yang sering :Konstipasi Cara menyimpan : Simpan di bawah 30°C terlindung cahaya
7.	Laksatif	Bisakodil, laktulosa, Nalauril sulfat.	Aya berumur 24 tahun mengalami sembelit sudah 5 hari, belum minum obat hanya minum air putih yang banyak. Pasien mengaku sedang hamil usia 3 bulan	W :Aya 24 tahun, hamil 3 bulan W : Sembelit H :5 hari A : Minum air putih yang banyak M :Belum minum obat sama sekali	Obat yang terpilih Laktulose Alasannya aman untuk ibu hamil dan bersifat pencahar	Indikasi : Konstipasi kronis, ensefalopati portal sistemik Cara penggunaan: Diminum 3 kali sehari 1 sendok takar Kapan berhenti: Jika BAB sudah lancar Kapan harus ke dokter : Jika 5 hari setelah minum obat belum ada Perbaikan ESO yang sering :Diare, kram perut Cara menyimpan : Simpan di

						bawah 30°C terlindung cahaya
8.	Biang keringat, pruritus, antihistamin topikal	Salisil talk dan sediaan yang mengandung kalamina; difenhidramin 2%, prometazin HCl 2%.	Reky usia 32 tahun mengeluh gatal- gatal 1 hari ini sehabis olah raga di area leher dan lipatan siku. Belum di beri obat, hanya di kompres dengan air dingin	W : Reky usia 32 tahun W : gatal- gatal sehabis olah raga di area leher dan lipatan siku. Belum di beri obat H : 1 hari A : hanya di kompres dengan air dingin M : Belum ada	Obat yang terpilih Calamin Alasannya dapat mengatasi rasa gatal karena biang keringat	Indikasi : anti alergi, antiseptik, penyejuk kulit Cara penggunaan: oleskan 2-4 kali sehari, setelah mandi Kapan berhenti: Jika keluhan sudah berhenti Kapan harus ke dokter : Jika dalam waktu 5 hari keluhan belum membaik ESO yang sering : iritasi Cara menyimpan : Simpan ditempat yang kering, wadah tertutup rapat
9.	Jerawat	Obat yang mengandung sulfur; resorsinol; asam salisilat; benzoil peroksida; triclosan, minosiklin 1%.	Dinda usia 24 tahun mengeluhkan jerawat tidak hilang- hilang sudah berlangsung selama 10 hari dan gatal dan meradang serta ada yang membekas, belum diperiksa ke dokter, yang dilakukan hanya sering cuci muka dengan sabun muka	W : Dinda usia 24 tahun W : jerawat tidak hilang- hilang sudah berlangsung selama 10 hari dan gatal dan meradang serta ada yang membekas hitam H : A : M :	Obat yang terpilih sulfur Alasannya karena dapat mengurangi peradangan dan membantu menghilangkan jerawat serta menghilangkan bekas noda jerawat	Indikasi : Merawat bekas jerawat, melembutkan kulit kasar, serta menyamarkan noda hitam Cara penggunaan: 2-3 x sehari dioleskan pada bagian jerawat Kapan berhenti: Jika terjadi reaksi hipersensitivitas Kapan harus ke dokter : Jika keluhan belum berkurang dalam 5 hari setelah menggunakan cream acne ESO yang sering : iritasi Cara menyimpan : Simpan ditempat yang kering, wadah tertutup rapat

10.	Kadas/kurap, antifungi	Obat yang mengandung klotrimazol 1%,mikonasol nitrat 2%, ketoconazole nitrat	Feny umur 22 tahun, mengeluhkan ada bercak putih agak bersisik dan gatal di leher 2 hari ini, baru dikasih bedak tabur dingin untuk mengatasi gatalnya	W :Feny umur 22 tahun W : ada bercak putih agak bersisik dan gatal H : 2 hari A :belum ada M : baru dikasih bedak tabur dingin untuk mengatasi gatalnya,k	Obat yang terpilih miconazole Alasannya karena dapat mengatasi jamur	Indikasi : Anti fungi Cara penggunaan: dioleskan 2 kali sehari Kapan berhenti: Iritasi Kapan harus ke dokter : jika dalam waktu 6 minggu keluhan belum berkurang ESO yang sering : hipersensitif Cara menyimpan : Simpan ditempat yang kering, wadah tertutup Rapat
11.	Ketombe	<i>Shampoo</i> yang mengandung Selenium sulfid, Zinc pyrithione.	Nabila usia 21 tahun mengeluh ketombe dan terasa gatal, bersisik dan berminyak sudah berlangsung selama 1 minggu. Sudah memakai sampho anti ketombe , namun masih belum berkurang	W : Nabila usia 21 tahun W : ketombe dan terasa gatal, bersisik dan berminyak H : 1 minggu A : Memakai shampoo anti ketombe M : Memakai shampoo anti ketombe	Obat yang terpilih selenium Alasannya karena dapat mengatasi ketombe yang tergolong berat, Riwayat pasien mengatakan sudah memakai shampoo anti ketombe namun keluhan belum berkurang	Indikasi : mengatasi rambut berketombe Cara penggunaan: untuk keramas, dibiarkan 2-3 menit saat pemakaian untuk mendapatkan hasil yang maksimal, digunakan 2 minggu sekali Kapan berhenti: Bila mengiritasi kulit / mata Kapan harus ke dokter : Jika selama pemakaian berlangsung keluhan belum Berkurang ESO yang sering :Iritasi Cara menyimpan : Simpan ditempat yang kering, wadah tertutup rapat
12.	Kutil	obat yang	Ny Nur (23 tahun) datang ke Apotek untuk membeli obat,mengeluhkan rasa	W : Ny Nur (23 tahun) W :	Obat yang terpilih obat	Indikasi : mata ikan, kapalan, kutil, kulit

		<p>mengandung asam salisilat 2 g, asam laktat 0,5 g.</p>	<p>tidak nyaman pada bagian jari tangan karena terdapat benjolan kecil / daging tumbuh bertekstur kasar dengan warna kecoklatan, tidak sakit dan tidak gatal juga. Gejala ini telah dirasakan sekitar 3 minggu yang lalu, pasien mengatakan sesekali malas mencuci tangan habis makan. Belum diberi obat apa- apa, hanya terkadang mengikis benjolan dengan menggunakan pemotong kuku.</p>	<p>mengeluhkan rasa tidak nyaman pada bagian jari tangan karena terdapat benjolan kecil / daging tumbuh bertekstur kasar dengan warna kecoklatan, tidak sakit dan tidak gatal juga H : sekitar 3 minggu yang lalu A : terkadang mengikis benjolan dengan menggunakan pemotong kuku. M : Belum diberi obat</p>	<p>yang mengandung asam salisilat 2 g, asam laktat 0,5 g. Seperti Calusol Alasannya karena dapat melunakkan kulit yang mengeras akibat mata ikan, kutil, atau kapalan, sehingga mempercepat proses pengelupasan dan pergantian sel kulit.</p>	<p>mengeras Cara penggunaan: digunakan malam hari selama tidur, callusol dituangkan ke kapas/kasa, ditempelkan di bagian yang luka selama semalam Kapan berhenti: Jika terjadi reaksi hipersensitivitas Kapan harus ke dokter : Bila keluhan belum hilang sampai obat habis ESO yang sering :Iritasi Cara menyimpan : Simpan ditempat yang kering, wadah tertutup rapat</p>
13.	Luka bakar	<p>Obat yang mengandung perak sulfadiazin; oleumiecoris aselli (minyak ikan, "levertran").</p>	<p>Ambiya (22 tahun) datang ke apotek, ingin membeli obat untuk luka bakar karena tersiram kopi panas 5 menit yang lalu, merasakan punggung tangan terasa perih dan panas. Setelah terkena kopi panas di siram air dan diberi pasta gigi</p>	<p>W : Ambiya (22 tahun) W : luka bakar karena tersiram kopi panas, merasakan punggung tangan terasa perih dan panas. H : 5 menit yang lalu A : Dialiri air M :Diberi pasta gigi</p>	<p>Obat yang terpilih oleumiecoris aselli Alasannya karena luka bakarnya masih tergolong ringan, dan dapat membantu mempercepat penyembuhan luka</p>	<p>Indikasi : Membantu proses penyembuhan luka dan luka bakar Cara penggunaan: dioleskan pada bagian yang sakit Kapan berhenti:Jika terjadi reaksi hipersensitivitas Kapan harus ke dokter : Jika 1 minggu belum ada perbaikan ESO yang sering :- Cara menyimpan : Simpan ditempat yang kering, wadah tertutup rapat</p>
14.	Luka iris	<p>Povidon iodine</p>	<p>Seorang ibu ingin membeli obat untuk anaknya Meti (5 tahun)yang terkena pisau saat bermain masak- masakan dengan temannya.</p>	<p>W : Meti(5 tahun) W : terkena pisau saat bermain masak- masakan dengan</p>	<p>Obat yang terpilih povidone iodine Alasannya karena dapat</p>	<p>Indikasi : mencegah infeksi pada luka lecet, luka bakar, luka khitan, luka ringan, melindungi luka setelah</p>

			Kejadian berlangsung 15 menit yang lalu, luka tidak terlalu lebar, namun anaknya mengeluhkan perih. Sementara baru dibersihkan menggunakan rivanol.	temannya, luka tidak terlalu lebar, namun anaknya mengeluhkan perih. H : 15 menit yang lalu A : dibersihkan menggunakan rivanol. M : dibersihkan menggunakan rivanol.	mencegah infeksi pada luka	operasi dari kemungkinan terkena infeksi Cara penggunaan: D bersihkan dulu lukanya, baru di oleskan pada bagian yang sakit Kapan berhenti: Terjadi reaksi hipersensitivitas Kapan harus ke dokter : Bila luka semakin memburuk ESO yang sering : Perih Cara menyimpan : Simpan ditempat yang kering, wadah tertutup rapat
15.	Alergi	Klorfeniram in maleat, prometazine, diphenhidramine, deksklorfeniramin maleat, loratadine, cetirizine.	Seorang ibu datang ke apotek, mengeluhkan anaknya selalu bersin-bersin tiap pagi hari, apalagi saat musim dingin seperti ini. Anaknya bernama sela (2 tahun). Gejala ini sudah berlangsung selama 2 hari, sudah berusaha memakai pakaian tebal dan diberi viks valproate namun belum membaik	W : Sela (2 tahun) W : bersin- bersin tiap pagi hari, apalagi saat musim dingin H : 2 hari A : Memakai pakaian tebal M : Viks valproat	Obat yang terpilih Cetirizin Drop Alasannya karena dapat bekerja cepat mengatasi alergi tanpa menyebabkan kantuk	Indikasi : Pengobatan rinitis musiman atau tahunan, urtikaria idiopatik kronik Cara penggunaan: Diminum 1 x sehari 0,25 ml Kapan berhenti: Jika terjadi reaksi hipersensitivitas Kapan harus ke dokter : Jika dalam waktu 5 hari keluhan belum berkurang ESO yang sering : Sakit kepala Cara menyimpan : Simpan ditempat yang kering, wadah tertutup rapat
16.	Vitamin dan mineral	Vit C, Vit A,	Seorang wanita muda, baru menikah datang ke Apotek, mengeluh telat	W : Bunga W : Hamil H : Telat	Obat yang terpilih Asam	Indikasi : untuk memenuhi kebutuhan asam folat terutama

		Vit B1, Vit B6, Vit B12, Vitamin D, Asam folat, Mn, Zn, Fe, dll	menstruasi 1 bulan, hasil test pack menunjukkan garis 2. Sebut saja Namanya Bunga (24 tahun) , ingin membeli vitamin untuk kehamilannya. Sebelumnya belum pernah diperiksa ke dokter, nunggu suaminya pulang dari Maumere dulu.	menstruasi 1 bulan A :- M :-	folas 400 mcg Alasannya karena baru telat 1 bulan, kemungkinannya kehamilan baru berusia semester awal, jadi sangat bagus pemberian asam folat untuk membantu Pembentukan tabung syaraf dan organ penting lain	ibu hamil Cara penggunaan: 1 x 1 tablet Kapan berhenti:- Kapan harus ke dokter : Segera control jika ada keluhan ESO yang sering :- Cara menyimpan : Simpan ditempat yang kering, wadah tertutup rapat
17.	Antiseptik dan disinfektan	Alkohol 70%, povidone iodine 10%, klorheksidin, setrimida 0,5%, serbuk PK.	Risa(30 tahun) datang ke Apotek, mengeluh habis operasi ambeyen, berlangsung selama 2 hari yang lalu. Area dubur terasa panas, Baru diminumi anadium 1 kali sehari dari rumah sakit, tapi area dubur masih sakit. Ingin control, namun dokter yang merawat masih cuti.	W : Risa 30 tahun W : Habis operasi ambeyen, dubur masih berasa sakit H : 2 hari yang lalu A :- M : Anadium 1 kali	Obat yang terpilih serbuk PK Alasannya dapat sebagai anaestesi lokal, sekaligus antiseptic untuk meringankan gejalanya	Indikasi : Sebagai antiseptik, membersihkan luka, dan membersihkan alat-alat medis. Cara penggunaan: Dituang pada kassa steril atau kapas, lalu diusapkan pada luka atau alat medis Kapan berhenti:- Kapan harus ke dokter :- ESO yang sering : Cara menyimpan : Simpan pada suhu ruangan (25 - 27 C)
18.	Antiinflamasi topikal	sediaan topikal yang mengandung	Anita (30 tahun) datang ke apotek mengeluhkan tangannya meradang terasa panas, habis terkena hewan tomcat. Kejadian sudah berlangsung 1	W : Anita (30 tahun) W : mengeluhkan tangannya	Obat yang terpilih Hidrocortison Alasannya	Indikasi : Dermatitis atopik, kontak, alergi; pruritus anogenital,

		ung flusinolo n desoksim etaso n 2,5 mg.aseto nida; hidrokort ison asetat 1%;	hari ini, sudah di beri minyak bangleng namun masih belum berkurang	meradang terasa panas, habis terkena hewan tomcat H : 1 hari A :- M :Diberi minyak bangleng	karena dapat mencegah infeksi sekunder	neurodermatitis Cara penggunaan: Oleskan 3-4x sehari pada bagian yang sakit atau gatal Kapan berhenti: Jika terjadi reaksi hipersensitivitas Kapan harus ke dokter : Jika keluhan belum membaik ESO yang sering : Hilangnya jaringan kolagen kulit. Cara menyimpan : Simpan pada suhu kamar
19.	Obat topikal penghilang rasa sakit	sediaan yang mengandu ng mentol, campor, metil salisilat, oleum mentae; kayu puti; lotion lidokain HCl 3 %, natrium diklofenak 1% gel.	Tn Rully (27 tahun) mengeluhkan nyeri otot di bagian betis nya sehabis main futsal, belum ke dokter dan mengonsumsi obat nyeri otot, hanya di beri balsam, namun keluhan belum berkurang 1 hari ini	W : Tn Rully (27 tahun) W : nyeri otot di bagian betis nya sehabis main futsal H : 1 hari A :- M : Diberi balsam	Obat yang terpilih Natrium diklofenak 1 % gel Alasannya karena merupakan obat golongan AINS (Anti Inflamasi Non- Steroid), sehingga natrium diklofenak dapat digunakan untuk pengobatan nyeri sendi dan mengatasi peradangan	Indikasi : inflamasi karena trauma pada tendon, ligamen, otot dan persendian seperti yang disebabkan oleh salah urat, terkilir dan memar, reumatik jaringan lunak, dan penyakit-penyakit reumatik yang terlokalisir seperti osteoarthritis pada sendi perifer dan kolumna Cara penggunaan: 3 - 4 x sehari, digosokkan perlahan pada bagian tubuh yang sakit Kapan berhenti:Jika terjadi reaksi hipersensitivitas Kapan harus ke dokter : Jika keluhan belum membaik ESO yang sering :Iritasi lokal

						Cara menyimpan : Simpan pada suhu kamar
20	Terapi komplementer / obat tradisional	Jamu, OHT, Fitofarmaka	Risma(32 tahun) mengeluhkan matanya tegang 2 hari ini, Riwayat menderita glaucoma namun sudah 1 bulan ini tidak control, ingin control kartu BPJS nya bermasalah. Sementara Risma hanya menggunakan kacamata anti radiasi untuk menghalang sinar yang terlalu terang di layar HP.	W : Risma(32 tahun) W : Mata tegang, Riwayat punya glaucoma H : 2 hari A : hanya menggunakan kacamata anti radiasi untuk menghalang sinar yang terlalu terang di layar HP. M : Belum ada	Obat yang terpilih Jamu (Optimax for G) Alasannya karena merupakan Suplemen untuk memelihara Kesehatan mata pada penderita glaukoma	Indikasi : uplemen untuk memelihara kesehatan fungsi mata dan memperbaiki mikrosirkulasi retina Cara penggunaan: 2 kali sehari 1 kapsul, diminum Bersama dengan makan Kapan berhenti:- Kapan harus ke dokter :Segera ke dokter ESO yang sering :- Cara menyimpan : simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung