LAMPIRAN

Lampiran 1. Form Bimbingan Dosen Pembimbing PKL





LEMBAR BIMBINGAN PKL DOSEN PEMBIMBING PKL (DPP)*

		10-22-2	
TAHUN	AKADEMIK	: 2023	/2024

Nama Mahasiswa	:	Karisma Cahyaningrum
NIM	:	211105005
Nama instansi PKL	:	Apotek 424 PPS Grecik
Nama Dosen Pembimbing PKL	:	Diah Ratnosari S. Fam, Apt, M.T

No.	Tanggal	Bimbingan dan Saran	Paraf Pembimbing
1.	30/5 24	Bembingan Caporan PKL	of
2.	30/1529	Bimbingan Laporan PKL	of
3.	6/24	Bimbingan Loogbook	Of
4.	6/6 24	Bimbingan Longbook	A
5.	7/629	Bimbingan Tugas Khusus	P
6.	7/629	Bimbingan Tugas Khusus.	of

*)MINIMAL BIMBINGAN 6 KALI

data Mala nan

The Power of Eslamic Entirepreneurship

Ji. Sumatera 101 Gresik Kota Baru (GKB) Gresik, 61121 Telp: (031) 3951414, Fax (031) 3952585 Website: http://www.umg.ac.id, Email_info@umg.ac.id

Lampiran 2. Form Bimbingan Pembimbing Lahan PKL





Lembar ke:

LEMBAR BIMBINGAN PKL* PEMBIMBING PKL (PL)

TAHUN	AKADEMII	(. 2023/2	0024

Nama Mahasiswa

NIM

Nama instansi PKL

Nama Pembimbing Lapangan

Cahyaningrum

A potek PPS

Endri Fahmi

No.	Tanggal	Bimbingan dan Saran	Paraf Pembimbing
1.	12/2 24	Belajar tentang pengendalian stok obet	6
2.	13/2 24	Belajar tentam penedatan Lan pelaporan	1
93.	19/229	Bulajar tentang Penerimaan barang	4,
1.	16/2 24	Belgiar frateing Poniusmahan lan pronaritar	1/1
2.	9/3 29	Bimbirgan tugas thusus san (oogbook	1
	11/3 24	Bolajar tentang alur pengadaan	1
	·	Pan paron canoan kabutuhan obat	
		sokaligus panulupan PKL Langan	
		apotelar	
		BBEATA	

^{*)}MINIMAL BIMBINGAN 6 KALI

A REPORT SHOWING


The Power of Islamic Entrepreneurship

Ji. Sumalera 101 Gresik Kota Baru (GKB) Gresik, 61121 Telp: (031) 3951414, Fax: (031) 3952585 Website: http://www.umg.ac.id, Email: info@umg.ac.id

Lampiran 3. Dokumentasi Waktu PKL







AGENDA HARIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) DI (APOTEK K-24 PPS GRESIK)



KARISMA CAHYANINGRUM 211105005


PROGRAM STUDI DIPLOMA III FARMASI **FAKULTAS KESEHATAN** UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK 2024

NO.	Hari, tgl (waktu)	Aktivitas	Catatan (Panialagan langkan digartai bukti bukti dukung → danat beruna foto/scan dokumen)
	Senin 05-02-2029.		Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen) Visi 1/24 ! 1- Menjao't merik nasional yang menjaos penimpin pasar birnis Apofek os negara Republik pasar birnis Apofek os negara Republik pasar birnis Apofek os negara waralaba Indonesia, melalui apofek jarmgan waralaba Indonesia, melalui apofek jarmgan waralaba kang menye siakan ragam obat yang komplet, buka yang menye siakan pasaraka hari libur, yang fersebar 3- seleluruh Indonesia. 2. Menjaos morek nasional kebanggaan bangsa Indonesia yang menjaos berket dan berman faot hagi masparakai kangawan - karyawat dan pambi hagi masparakai kangawan - karyawat dan pambi 1. Menre siakan pilihan obat yang leomplet, setiap sawat, dangan harga sama pagi si ang - malam di sawat, dangan harga sama pagi si ang - malam di hari libur: Apotek 1/24 melayani masparakat selam hari libur: Apotek 1/24 melayani masparakat selam member lakutan kebijaikan harga yang totap sama pada pagi hari, siang hari, malam hani maupun hari libur.

Ḥari, tgl (waktu)	Aktivitas	Catatan (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
		Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa toto/scan dokumen - Mangasialian kualitas polayanan prima: Apotok 1c-za Banantasa mampelajari den mangusahalan paningkatan kualitas polayanan untuk momalanmallan olan mangusahala kualitas polayanan untuk momalanmallan olan mangusahala peningkatan kualitas pelayanan untuk memak simalkan peningkatan kualitas pelayanan untuk memak simalkan tingkat kapuasan para palanggan dan panarima waralah
		Visi Apotek K-24 Mentana merek hastonal yang menyadi pemimpin pasar bisas Aposek es tengara
		Papalatik Indonesia, melatur apotek jaringan waralaba yang menyediakan rayang disat yang kompit, buka 24 jam termasuk hari libur, yang tersebar di selaruh indonesia. *** ******************************
		Misì Apotek K-24
		Menyediakan pilihan obat yang komplit, setiap saat, dengan harga sama pagi-siang-malam dan hari libur: Apotek K-24 melayani masyarakat salama 24 jam perhari 7 hari permanggu dengan memberlakukan kebijakan harga yang tetap sama pada pagi hari, siang hari, malam hari maupun hari libur. Menyediakan kualitas pelayanan yang prima: Apolek K-24 sahartusa mempunjan iku menguahakan peningkalan kualitas pelayanan untuk memakan bigkat kepuasan para pelanggim dan penerima waraleba.

NO.	Hari, tgl (waktu)	Aktivitas	Catatan
30.52.1			(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen) - kut molakulcan kanjiatan palayanan & apo fok, Salah
			- cut molalculan conjuran prinquien os sipo for / salar
			- Moderna adat possion dongan (celuhan batuk pilot.
	1 49 100		songan percapapan saya dengan pasien sebagai
			schurja adat possion dengan Coluban batuk pilet. dengan percakapan saya dengan pasion sebagai berikut: bisa dibantu?
			parifect: 1. Mari ibre, ada yang bisa dibantu? 2. Mari ibre, ada yang bisa dibantu? cowde batule.
	1		P. Mari ibre, ada jang bisa dibantu! P. Mari ibre, ada jang bisa dibantu! P. Ini mbak anak saya jang cowde bafuk bahaks, Trus batuka itu janil mbak gak lerhear dahaks,
			Trees batiles me 1
	1.6		Diwohi opo yo mbat? Diwohi opo yo mbat? P. Mohon maaf bu, usa berapa nogah bu anatnya P. Mohon maaf bu, usa berapa nogah bu anatnya
			2: Mohon maat but to
			I CO CO VEDE
			P: New Compactor bu ? P: As piloknya for bu ? P: As piloknya for bu ? P : As piloknya for bu ?
	waxaon waxaon		R: 15 moor moder avoke their
	Actifed		P: Ala piloknya ta bu ? P: Ala piloknya ta bu ? P: Ala mbak wong mbolor avoke trues fonggordan P: geafel mbak. P: Ini bu ya caya rekomen dasilcan Actifod morah de P: Ini bu ya caya rekomen dasilcan ihi luntuk batuk pilok
	Actile		nuclei ilican ilicii
	Prus Carolidine HCI HCI		P: Ini bu ya caya recomen dasitus untuk batuk pilek Alerhis tab. Actifed merah iti untuk batuk pilek
	Pseudoephedrine HBr	2 4	Alerhis tab. Actifed merah IIII Union to taken your Siminum 3 x school of merah IIII union to taken your Siminum 3 x school of the tentu
	Devices and a control of the control		Dissipare 3 x Schari 5 ml stace (School
		TO THE	Siminum 3 x schari s'mi state Alerhis tudet centu ada di dalam sini - Trus ini Alerhis tudet centu
	4.1	Alexandra Alexandra	
1	6 盤	100	mongo bati godal à tonggoro kannya a minum
	Sym	O	Schari 1x se nggeh bu. Obat batuknya efeknya
1			rgantule bu -
1			
			P = Baile pubak.

NO.	Hari, tgl (waktu)	Aktivitas	Catatan (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
2.	Sclasa 06-02-2024	Pangenalan Profil Apolet.	- Mandengarkan penjalocan tentang struktur Organisasi Apotok becarta tugasnya. PSA (Pemilik Sarana Apotok) Dr. Welly Screun M.MB.
		E V	ApA (Apoteker Pongelola Apotek) Apt Endri Zulfkur Farmi S. Farm Apt Nathifa Pendamping) Apt Nathifa Pinda Firmuna S. Farm
		7	AA (Asistan Apotakar Caldangan Caldang



NO.	Hari, tgl (waktu)	Aktivitas	Catatan
			(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			- kut modakukan kogtatan pelayanan si apotet, salah sahunya orda pasion dengan koluhan gatal jamur. dengan percakapan saya dengan pasion sebagai berikut p: Kalam Schat, ada yang bisa dibantu jibu.) p: Kalam Schat, ada yang bisa dibantu jibu.) p: Lya mbak, Ini mbak fangan saya ejatal trus fambah banyak libu itu sepertinya gatal jamur. Apolah
			prenebal iby? prenebal iby? p: I ga mbak rasanya itu nebel, kasi salep aja ya mbak. p: I ga mbak rasanya itu nebel, kasi salep aja ya mbak. p: Sudah Silatukan tindakan sebelumnya ibu? R: Sudah Silatukan tindakan sebelumnya ibu? P: Baik bu · Ini Asa salep Desoki methason ibu, Nanti Soleskan 2 x sehari ya ibu.
		/ *	DESOXIMETASONE & CONTROLLED SONE & CONTROLLED SO

NO.	Hari, tgl (waktu)	Aktivitas	Catatan (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
3-	Rabu 07-02-2029.	N. S. W.	- Ikut mombantu menata barang Datang sari PBF Yaitu Sari PT- PDE. Yaitu Sari PT- PDE. Panataan obat jang sisplay dirak depan silakulan Panataan obat jang sisplay dirak depan silakulan Enataan obat jang sisplay dirak depan silakulan Scecura PEFO (First expired First Out) dan FIFO Scecura PEFO (First expired First Out) dan FIFO Scecura PEFO (First expired First Out) dan Aculu. Dilakukan partama ladi dibih lama, malaa Icalau yang satang expired nya labih lama, malaa Icalau yang satang expired nya labih lama, malaa Icalau yang satang expired nya labau gang datang Obat ditata dipalakang, fotapi kalau gang datang Expirednya (Chih sakat maka difata dipalang Expirednya (Chih sakat maka difata dipalang Obat dipan. Cibat di falompokkan serceai olongan Farma laologima.
2 1			The state of the s








NO.	Hari, tgl (waktu)	Aktivitas	Catatan
			(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
4.	Kamrs, 08-02-2029.	Pengadoan.	Bolatar borbagai macam list PBF.
	08-02-2029.	1	- PBF BSP (Bina Scen Perima) monegang produk samble - PBF AMS (Antar Mitra Sembada) memogang produk novel - PBF Enseval memogang produk flexpharm PBF Enseval memogang produk flexpharm PBF AAM (Anugrah Argon Medska) memogang produk - PBF AAM (Anugrah Argon Medska) memogang produk
		A SALVEY A S	2. Bolajar Komponen Faktur. Komponenan Faktur terdiri dari: - Mama PBF - Alamat san no. Telepon BBF - NO. ijin PBF pasat. - Alama Apotek yang dityu - Alamat san no. NPWP Apotek yang astyu. - Tanggal Cefak Faktur - No. Faktur. - No. Faktur payak - Tempo pembayaran berapa hari - Tanggal jatuh tempo

NO. Hari, tgl (waktu)	Aktivitas	Catatan (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
		Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen - No. ifom obot - City cerit - Nama barang - No. batch - Expirat Scate - Hargu HNA - Discon - Sub fotal - Total flarga jual - Bi ara kerin - DP - PPN - Total nilai Fakfur - Najna, siP, ttol APJ - Temport, acan fanggal catak Falchu. - Magna fanggan - Magna fanggan - Tapaa fanggan an nco. siPA/sipiTK



No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
No. 6		Aktivitas	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen) Rayon fokultura dapat berupa foto/scan dokumen) No. S.P. SURAT PESANAN PSIKOTROPIKA Yang bertunka sangan dokumba ba Mangalakan genam patungah atapah Alama Rayon fokultura dapat kangan dokumba ba Mangalakan genam patungah atapah Non depat bertunka sangan dokumba ba Mangalakan genam patungah atapah Non depat bertunka sangan dokumba ba Mangalakan genam patungah atapah Non depat bertunka sangan dokumba ba Mangalakan genam patungah atapah ba tapah ba ta

NO.	Hari, tgl (waktu)	Aktivitas	Catatan (Panialagan langkan disartai bukti bukti dukung a danat barung foto/saan dakuman)
6.	Salotu. 10-02-2024.	Ponorimaan. San Polayanan	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen) - Membantuk monerima barang Datang dari PBF - Membantu barang fotosbut untuk ds. - Membantu barang datang torosbut untuk ds. - S-splay s. Lopan.
		Swamooskasi	- Plet Melakukan polograman saparti savamedskasi sangan. Pasian safang sangan kolcehan susah kar BAB. Sangan Navasi sahagai berileut:
0 10	4 - 2 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20		L: Solamat siaro cak, ada yaro susah BAB tak tangari katar P: Ini mbak adak gaya susah BAB tak tangari katar erk e kercus susah keluar. erk e kercus susah keluar. P: Mohor Mant kale adaknya usia barapa? P: Clara g tahun mba. P: clara g tahun mba.
			susah busang out besar dan juga sehingga mudah untur meltunakkan fesses atau koforan sehingga mudah untur dikaluarkan .
			P: Our iya kak, kalalu cyrupnya gudah dibuka masa P: Our iya kak, kalalu cyrupnya gudah dibuka masa

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian
7	Mengge	DI	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
		Pelayanan	- I feet membernte polaganan non resup, dengan narasi
	11-02-2029	Swamers (casi	p: Salam Schat , Asa yang bisa sthanty pale?
110.			p. Mbak beli Biomega (stry
		-	Cohorter Barpak sayar cook abela 1998h,
			Mohan many Bapak confek biomeganyon habis, Icalan
			Mohan many Bapat control story scan (composis)-
			Bapale bookenas ini ada morte lain yang (composis)-
		一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	Ma sama. Maranga Marosanho plat pak
			p: Bener podo ta mbalo ite ?
<i>(</i>)		PARTITION OF THE PARTIT	marchi Biomega,
			P: Majgeh Bopak mi sama superti Biomega,
45,000		V-langue B, Maria (Prince) V-langue B, Maria (Pr	(composici dan professoran Startoga j'aga sana
		Prince and two on 100 mg gaxax Ciral-lamon	Bapak
		NEUROSANBE // Viamia 3, Margaritha, Vitanaia Bia Margaritha, Vitanaia Bia Margaritha, Vitanaia Bia	p: Yours what his yatpapa 1 strop
		Mataminolo Sadio Pilm-restad caniet 10 mg Ilio mg: 100 mag 200 Thy	1: Yawos Made in gail


Grosuk, 7-6-2024

Dosen Pembimbing,


Diah Ratrasari S. Farm., Apt., M.T.

NIDN #721/900/


NO.	Hari, tgl (waktu)	Aktivitas	Catatan
8.	Senin 12-02-2024	Pengendalian.	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen) - Stok Opname melalvi mobile-> Mang hitung fisik -> Sinosuklan lee Salam mobile -> fe kapannya
	12-02-1		Sicek oleh Apoteker - Kalau ada obat yang minus - Si couri dule - + Mungken saja ada obat yang beken safang.
			- Progendation obot kadalvairsa. 1. Distukan promo -t kemusian osijual terlebih sebula. 1. Distukan promo -t kemusian osijual terlebih sebula. 2. Dicoba centuk siretur apabila bisa siretur. 3. Kalau tislak bisa siretur ya sijual olahuku. 3. Kalau tislak bisa siretur ya sijual olahuku. Siretat FD nya teupan. Sicetat FD nya teupan. Principal of forjaci recall latuk alurnya sebagai barika. Principal of confermasi ka APA -t obat yang situalkanya ifu namanya apa, nomor batch nya barapa san jumlahnya ifu namanya apa, nomor batch nya barapa san jumlahnya ifu namanya apa, nomor batch nya barapa san jumlahnya ifu namanya serat tanva kerima o kermusian olasinya shawa membawa serat tanva kerima o kermusian olasinya shawa prinsipal / sales -b kamusian paorti fergantung kersepakatan. prinsipal / sales -b kamusian celau siganti barang.



NO.	Hari, tgl (waktu)	Aktivitas	Catatan (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
9-	Salasa 13-02-2029	Pencatalan. San Palaporan	- Poncatatan kartu stok: 1. Kartu Stok Sicatat crewai sangan pama chatrya 1. Kartu Stok Sicatat crewai sangan pama chatrya 2. Cara prengirinya -o bila asa pengelwaran sicatat 2. Cara prengirinya -o bila asa pengelwaran sicatat 3. Kolom Kelwar terus Si tules sisanya barapa dan parat 3. Bila asa pemasukan sari PSF -o Stules fanggal 3. Bila asa pemasukan sari PSF nama -o sifules nomor puasuk berapa -o sari PSF nama -o sifules nomor batch nya berapa -o situles masuk berapa -o batch nya berapa -o situles masuk berapa -o sifules sisanya barapa kanusian parat
			- Polaporan sipnap - o login altun apoti - p Masuk akun sipnap - o login altun apoti - p Masuk ke laporan -> input laporan masuk san pilih masuk ke laporan -> input laporan masuk san pilih narkotika atau psikotropika -> masukkan juwlah nya. narkotika atau psikotropika -> masukkan juwlah nya. > pilih periodenya -> periodenya asu = : pelapora > pilih periodenya -> periodenya asu = : pelapora periodik / barkala setiap bulan setiap tanggal co dhn. periodik / barkala setiap bulan setiap tanggal co dhn. pelaporan nihil yang obataya kosong tetapi bares pelaporan -> inputrya ada = : (ewat web itu men silaporkan -> inputrya ada = : (ewat web itu men langsung siwebnya san upplaas = filo exerlaya.



Hari, tgl (waktu)	Aktivitas	Catatan
		(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
Dabu. 14-02-20	Ponorimaan	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung > dapat berupa foto/scan dokumen) - Dalam (cogialan Pencrimaan Barang Dafang + Sicople centera fallifur Dan SP -> Sicople centera fallifur Dan SP -> Sicople centera fallifur Dan SP -> Sicople (P) nya. - Discople jumlah oloatnya getew loapangma. - Dicople fishlonga apalah rusak cefau fishalt -> - Dicople fishlonga apalah rusak cefau fishalt -> cepabila bila famasan rusak meminta untuk tukar loarang.
		SISTAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A
		Hari, tgl (waktu) Aktivitas Pabu. 121-02-20



NO.	Howi tal (14)		
110.	Hari, tgl (waktu)	Aktivitas	Cotata
			(Penjelasan lengkan disartai bukti bukti dala
11.	Kamis 15-02-2029	P	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
	1	1 angim sanan	- Pada panyimpanan obort Nartohik lan Deskofropijk.
	15-02-2029		langi langi
			- Pada panyimpanan Obof Martofit Lun Profeofropije. Sisimpan Salam (mari Langan y pintu gandi.
	1.7	10.00	h (1=4 0- >
	1/		- Pasa penginpavan Mut (ASA disimpan dangun
	1.7.7		
		V2 / F	diberi jorak
		A 7 8 7 7	diberi jarak - Layout tempat pengimpanan obat dengan logo biru - Layout tempat pengimpanan obat dengan logo biru dan hijau afau obat bebas terbatas dan obat dan hijau afau obat bebas terbatas dan obat bebas Stempatkan cefau ditata di depan servai dengan Farma kologinya.
			a voice temport parifilms
			fau obert behas ferbutas dan obat
			dan Mijar strug Stata & Lopan
			babas Stampatium
		3 19	Farma Cologinga.
			Editar Studen
- 1			
		PRO	ALING LARIS
			AGINO CONTRACTOR OF THE PARTY O
- 1			
		THE CHEE	
		000	BRANCE BENEFIT
1	10.74	HEER STATES	AMPICILIM AMPRICIAL ST. AMPICIAL ST. AMPICIA
		- TA	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
		THE WAY	CHIEF CHIEF CHIEF CHIEF CHIEF CHIEF
		45	LAAA BEED -
		6	
		12	and the control prompts to
			THE SECOND SECON



NO.	Hari, tgl (waktu)	Aktivitas	Catatan
			(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
7-	Jum'at 16-02-2029	Pemusnahan. Jan Penarikan.	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung > dapat berupa foto/scan dokumen) ** Selama walche plet bolum mahakukan pomusnahan Obat FD, schingga mandangarkan penjelasan dari Obat FD, schingga mandangarkan penjelasan dari APA alar / proses pomusnahan Obat kadaluarsa. **Porfamor os:kuthpulkan obest perdesarban bontuk - Porfamor os:kuthpulkan obest perdesarban bontuk **Contribution peda sacaraan salap isi selap dikuluarkan **Contribution peda sacaraan salap isi selap dikuluarkan **Contribution pemusnahan obat Mewfotika & Psikotropika. - Untuk pemusnahan obat Mewfotika & Psikotropika - Untuk pemarikan obat Marketika & Paleotropika - Untuk pemarikan obat Marketika & Paleotropika - Untuk pemarikan obat oleh PBF (recall) kurlah - Untuk pencerikan obat oleh PBF (recall) kurlah - Untuk pencerikan obat oleh PBF (recall)

NO.	Hari, tgl (waktu)	Aktivitas	Catatan
12	0.11		(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
19-	Sabtu.	Produk	- Produk Obat
	(7-02-2029	produce knowlodge	- Produk Obat 1. Colosgis tablet - Composisi: Sofiap tablet manopundung: - Betamethoson vizs ny Deschlor phoniramine Maloute 2 mg Neschlor phoniramine Maloute 2 mg - Indikasi: Alorgi kang membutuh kan terapi sangan kortilosteroid - Contra Indikasi: Bazi baru lahir dan promoutur - Contra Indikasi: Bazi baru lahir dan promoutur - Dosis dan Cara Pomakaian: - Dosis dan Cara danakaian: - Dewasa dan othak > 12 tabur: I tablet sefap 4-6 jam - Mak 6-12 tahun: I tablet sofiap 4-6 jam - Anak 2-6 tahun: I fablet sofiap 4-6 jam
		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	- Felt Scarping : Morng out the

NO.	Hari, tgl (waktu)	Aktivitas	Catatan (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
14. Minggu	Menggu. 18-02-2024.	Produk Chowledge.	- Produk Obat: Parafuson tah: Parafuson tah: Bakerja sebagai akalgetik - antipiretik, - Cara lenga Obat: Bakerja sebagai akalgetik - antipiretik, akspektoran, antihis tamin dan dekongatan
			history. - Indikari : centuk meringankan gejala - gojala flu separti - Indikari : centuk meringankan gejala - gojala flu separti - Bemam , sakit kepala , history forsumbod . Dan - Bersin-bersin yang disertai batut . - Posologi : Dewasa 3 x sebari I tablet , anak G - p tahun - Posologi : Dewasa 3 x sebari I tablet . - Resingatar gan perhabar: Selama menum obat ini fidak. - Peringatar gan perhabar: Selama menum obat ini fidak. - Dolch mengendarahi kendaraan
			- Efet samping: Mengantik Penyimpanan: Storpan pada suhu Sibawah 30°C.
			GRESIV

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian
7			(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen) Comparison Comparison
			PARATUSIN® tablet Paracetamol, Guaifenesin, Noscapine, Phenylpropanolamine HCI, Chlorphenamine maleate 1 strip © 10 tablet Komposisi : Tup tublet mempandung: Paracetamol Guaifenesin


Gresile, 7-6-2029 Dosen Pembimbing,


Apt Drah Ratnasari S. Farm y Apt, M.T.
NIDN Q721119001

6 coale, 28-5-2029 Pembimbing Lapangan/(Instansi PKL)

NIK/SIPA.....

NO.	Hari, tgl (waktu)	Aktivitas	Catatan (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
(2-	Sentr. 19-02-2024	Pencatatan dan Pelaparan.	- Cara penjartipan resep: 1. Perap disempan salama s tahun. 2. Dengan dihendal sahap bulan. 3. Deprahkun centara Recep Markofika, Perkopopika, Tosap biosa. 4. Demouthan dalam kapans sahap tahunya. - Cara Pengartipan Fethur: - Dilakukan sakap fethur. - Dilakukan sakap fethur. - Fakhur dipinah - pisah sasuar dengan PBF ya. - Fakhur dipinah direk di map - Satalah itu odi taruh di map - Fakhur depat disimpen salama s fahun.







NO.	Hari, tgl (waktu)	Aktivitas	Catatan (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
17-	Daba. 21-02-2024.	Pengkajian Journ Pelayanan Perep	Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen) - Detunian Palayanan Pasap: 1. Copy Pasap tarasiri dani: Mana Apotok, Maria APA, Neo-CIPA, Alamot apotok, No-pasap, Maria Pottar, Poo, Ex copy, Tgl panulican resap, tgl pacap Slayani, tarasipl, parat Api, stanpal apotok. Slayani, tarasipl, parat Api, Maria Panin, 2. Étikot tarasiri dani: Neo-resap; tgl, Maria Panin, Etikot puhih cuntuk paranal Etikot biru untuk obat luer.
	APOTEK K-24 PPS J. Raya Permita Sulfield (K.22) J. Raya Permita		OBAT LUAR Proportion of Control

NO.	Hari, tgl (waktu)	Aktivitas	Catatan (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
l8.	Kants. 22-02-2029.	Dispensing.	- Melarenni resep non racikoun. - Alur penerimaan reccyp sampai menerima obat. 1. Menerima recep sari parien. 2. Dilakukan sekkining resep cocara alminstratif berupa sata purien. 3. Cok keterseosiaan obat. 4. Memberikan harga recep be pasion. pasir. 5. Menojkon firmosi heirga recep be pasion. pasir. 5. Menojkon firmosi heirga recep be pasion. pasir. 5. Menojkon firmosi heirga recep be pasion. 6. Menojkon firmosi heirga recep be pasion. 6. Menojkon firmosi heirga recep be pasion obat aliah pasion firmosi heirga recep be pasion obat aliah pasion. 6. Menojapken obat sen promberi otikot san Copp porep bila porlu. 7. Menograhkan obat ke pasion alongan parojkonfir mosi utano tentung sata pasion. 8. Melakukan kit papada pasion.

NO.	Hari, tgl (waktu)	Aktivitas	Catatan (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
19-	Jan'at.	Produk Knowledge.	Promo eyr: - Komposi'si: Ti'ap sandok fakar (sa) mangandang: Promotharin HCl smy Potassium Quaia Col Sulfanate aday.
			Core Kerja Obat: 1- Poomothazire tici merupakan antihistamin penghambat 1- Poomothazire tici merupakan cara menghambat 1- Pofassium Guara (competitif 2- Pofassium Guara acolsul fanode merupakan ekspekturan yeun 1- Poomothazire Guara acolsul fanode pala salurar hapas sahinggar 1- Pofassium Guara acolsul fanode pala salurar hapas sahinggar 1- Pofassium Guara acolsul fanode pala salurar hapas sahinggar 1- Pofassium Guara pengaluaran dahak yang ossobakkan oleh along 1- Pofassium Guara inglikani inglikani pala salura pada men hid 1- Poomothazire tici merupakan pada men hid 1- Poomothazire tici merupakan pada pada pada pada pada pada pada pa
	۶. پ		Anak-Anak: Diatos 4 fahun: 1-4 feati schari I condok takar 2-9 tahun: 1-9 kali schari 2 conok takar.



Aktivitas	Catatan (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
Aktivitas Produk Cnowledge	Catatan (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen) - Ifcut Mancta Garang Ratang Ratan's PBF. - Produkt Know leavys - Zorakin tablet. - Komposisi : Scheep forblet manganolung (cataconarole 200mg - Kotocorarole bekirja Rangan manghambat cytochrom P450 Kotocorarole bekirja Rangan manghambat cytochrom P450 - Kotocorarole bekirja Rangan sangan sangan tomponen penting sani numbran-cal jamur. - Insikan penting sani numbran-cal jamur. - Kontru insilcan : wanta hamil. - Contru insilcan : wanta hamil. - Rata fordi (200mg) sekali sahari paner watta - Pored Sana Cara Pamakaian : paner paner sangan sosis - Paner fordi (200mg) sekali acaa raalan sangan sosis - Paner fordi (200mg) sekali sahari paner watta nalan - Rata fordi badan kewang dawi is ky : 200mg s x seberi watta nalan - Barat badan is - 30 lg : 10 mmg kalani calan watta nalan
	Produk



Catatan
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
- Mempelajari alur pengadaan obert years akan
Sortorkan Ge PBF.
Sontentan le PBF. Alumpa sabagai borilant. - Samua doton obat bosong marpun obat dongan - Calc los sales - o calc stole - Bula alban - Cosong pala Obat the , SM, MM o Kanuadan - Cosong pala Obat the , SM, MM o Kanuadan - Cosong pala Obat the , SM, MM o Kanuadan - Cosong pala Obat the , SM, MM o Kanuadan - Cosong pala Obat the , SM, MM o Kanuadan - Cosong pala Obat the , SM, MM o Kanuadan - Cosong pala Obat the , SM, MM o Kanuadan
online - Apabila 8: EPE stok posono, i bisa stalaselaan. - Apabila 8: EPE stok posono, i bisa stalaselaan. ordor obat ke toin PBF seperti lee TIMP. prekviening teetiap b
September

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
7			Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen] - Fretuensi penga daan: - Penga daan esi lakukam sofrap hari selesa san tamis dan - Penga daan esi lakukam sofrap hari rabu dan sahtu. barang clatang si hari rabu dan sahtu. barang clatang si hari rabu dan sahtu. - Tetupi untuk memeruhi lephuhihan crestomer ataupun - Tetupi untuk memeruhi lephuhihan sefrap hari memeruhi stok maka pengadaan silatukan sefrap hari afaue sefrap saat.
		NEW YEAR	

Greate , 7-6-2019

Dosen Pembimbing,

Pembimbing Lapangan (Instansi PKL)

NIK/SIPA.....


NO.	Hari, tgl (waktu)	Aktivitas	Catatan (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
22	Sonin 26-02-2029	Pongawasan	- Ontak 1300M sen Drekes extempet bolum pornal. dortung untuk melakukeun sissele.
			- Produce knowledge: Scamite cr Komposici: Pormethirin 5%.
			- Farmakologi: 1. Permakhin merupakan anti parasit spektrum luos terhadup 2. Permakhin belearja dongan cara menggangu pularisasi 2. Permakhin belearja dongan cara menggangu pelarisasi 2. Permakhin belearja dongan cara menggangu pelarisasi
			- Indicasi: Terapi Investasi Sarcopters scabiai (seabias) - Indicasi: Terapi Investasi Sarcopters scabiai (seabias) - Icontra indicasi: flipersonsi fif terhadap Permethrin , Pirethrin - Icontra indicasi: Olerkan
			- Cora Pemakaian: Scabinite er sigunakan untuk cekali pemakaian. Olerkan Scabinite er purata poda seduruh permukaan leulit pudai Scabinite er purata poda seduruh permukaan leulit pudai Scabinite er purata poda seduruh permukaan daerah Sari leopala seunp ai le jari-jari kaki terutama daerah Sari leopala seduru leokong dan seda-seda jari Lama pemakaian seduru leokong dan seda-seda jari Lama pemakaian seduru leona leona Dianjurkan pengolesan poda malam hari leonadian dieuci pada leogokan harinya.

NO.	Hari, tgl (waktu)	Aktivitas	Catatan
-			Catatan (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
- 1	1		- Peringatan san Porhatian :
- 1			Scapios biasaryo si Berfai rasa gotal, pritoma dan urtika.
-			
	1		Sololah pomakarar scobinife loom ada lomung fernan sejala-
- 1			pojala itu tidak langsung hilang.
1			Pangunaan pada cuanita bamil dan nanyuni balum ditata
1			comanagnya. Aman sigunakan peda bayi usia z bula atau lobih. Sodang keun penggunaan pada bayi keuran dari
1		/ 2	aface labor. Sordang learn promotion productions
		0-	abulan balum dikatahui Kaamanannya.
		1.17	Efole Samping:
1	1		- I Total Scamping:
1			Dapat timbul rasa panais separti terbaliar yang ringan Efek camping ini bereifat sementara dan akan bitang sandiri.
			Efek camping ini persiful sementara der alcan Whang stradici.
1			
		N 400	- Pangimpanan: fimpan pada suhu sibawah 30 °C alan
1		11 1	for lindung savi cahaya matahari.
	1	11/1/17	
		1/1/	
		1.7	
	1		


Capaian

(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen) Aktivitas Hari, Tgl (Waktu) No. 6 SCABIMITE Kilm PERMETHRIN 5%

NO.	Hari, tgl (waktu)	Aktivitas	Catatan (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
<i>д</i> 3	Selasa 27-02-2029.		- Molihat - Cihat Alat Cocchafan. - Infreston sort Dowasa 20 hotos /ml. - Mabulizar Mark. - Clifon fine BD januar insulin.
			- Produk Know known. Sanciscon a my 1- Komposisi: Moethyl prochaisolon almy 1- Komposisi: Moethyl prochaisolon almy 2. (ns leasi: prints alongi; arthitis remators, elescona. 2. (ns leasi: prints alongi; architis remators, osteoporosis untule 3. tontra Insileasi: Ulkus (amburg, osteoporosis untule 3. tontra Insileasi: Jangla panjang.
			21. Downs : 4-8 ny ratari, doris dapat stropta Hoan Dewas a: 4-8 ny ratari, doris dapat stroptation hingga 16 ny schari, doris dapat stroptation hingga 8 ny shari 5- Efek Sumping: Moon face








NO.	Hari, tgl (waktu)	Aktivitas	Catatan
			(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
14.	Rabu.		- Kut manata barang clatang dari PBF.
	28-07.5054		Molakukan stok opname skala leevil. ö 1- Sahap havi minimul 10 item obat silakukan
			1- Schap havi prinimal 15 190 m
			mandam note.
			2. Concession de la leuleaux pargo colour sentara stole fisile dang an etok di sistem.
			stole fisile dang an etole as signam.
			fulls hasil penyeuko
		- 1	

NO.	Hari, tgl (waktu)	Aktivitas	(Dominio	ısan lengkap disertai bukti-	Catatan	σ → danat l	berupa foto/scan dokumen)
		i 202.77	- Ha	usil Rengecakan rand	som stole	;	\$ 8 2
			10-	Nama obot	Stok F185¢	Stok	Keterangan
			1.	Vitablemin made	3	3	V (Pas)
	41		2.	Imanped egrap	2	2	(pas)
			3 .:	Made Antaritia	3	3	(pas)
		// 2		Becefort per	1	1	(pcu)
		0	5-	Butafort of Cariplex of	3	3	(pus)
	D-4	1 777 1		Cariplex Mr	3	3	(pas)
			7.	Apialys eyr	1	/	(pas)
		-	8,	Apialys doop	2	3	(-1) -> Caribular
4 10	.		9	Forlin by	2	2	(ام)
		Si.	10	Forlin Irop			d. >> === 6
	Ham Obal food	Sirte Stronger					Asa so guesas po
7	A Book of The	3 V (pr)		BUKU EMPOM			V
	Capter of 3	3 (F)	72	" PISMA"			
	B Friender	1 7 (5)	36				
		Server					
			1 27 3				
			0 5	The May the			

NO.	Ḥari, tgl (waktu)	Aktivitas	Catatan
			(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
25.	Kamis	Palaganan.	- Ikut melakukan polayanan parian umum dengan narasi
	29-02-2024	1	sthagai paritait:
	29-02-2024		P: Salam schoot, and young bita stantu. P: lea whale race a obest centule many hilangton P: lea whale race a obest centule many hilangton P: lea whale race apar saja love? L: suchah palcai apa saja love? P: saya coba ganti sampo mbale (tapi sama caya. P: saya coba ganti sampo mbale (tapi sama caya. P: saya coba ganti sampo mbale (tapi sama caya. P: saya coba ganti sampo mbale (tapi sama caya. P: bita palcai ini "Selvun scenpho", aparkach P: bolum mbale " P: bolum mbale " P: bolum mbale " Non jibu suleun ini bica mongungo dan menyembulcan Non jibu suleun ini bica mongungo dan menyembulcan
	PRODUCTION OF THE PROPERTY OF	TUO LUS	Cotombo : Marti Carti Cencemnya bie. koremois paela cencemnya bie. paela tali ooka mi elelu. p.: yawas misali tali ooka mi elelu.

NO.	Ḥari, tgl (waktu)	Aktivitas	Catatan (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen
		1	Catatan (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung > dapat berupa foto/scan dokumen - Molakukan cepa-te stok & akun presisana untuk. panjualan online molalui halodac. panjualan online molalui halodac. Selakukan dengan courn: 2- Meunik akun halodac apotok. 2- Meunik thuontary 3- Meunik stok obad com akun supelate. 3- West stok obad com akun
			APOTE LOS DESCRIPCION DE COMPANS
		(= 1	CAN DEPAIL PAGES Q FILTER
1			EVALABLE IN INVESTORY CO FEMALE)
			House 4 Type Use Guesty North
		1/ 3	Encount July Notice G Stephine Am Bloom G S No 18 1800
			make source store (3) Medicine Heritation (6) No. 500 No. 500
		7/7/	Les Constitute Constit
			Description of the Control of the Co
			Tax 30 47 00 5 Fisher 22 Unique Fer final g () Re-43 665
			Herm sum page 20 ▼ 1.30 5

NO.	Ḥari, tgl (waktu)	Aktivitas	Catatan (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
26.	Jum'at 01-03-2024		Penjelasan lengkap disertal built-built distributions Nompolicy or product (cnowlood) Premperan tablet Longorici: Motoclo pramode of (Cl rong Scholan madan Longorici: Motoclo pramode of (Cl rong Longorici: Motoclo pramode of (Cl r
		1	THE WAY OF



o. Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
		- Kut membantu pengin putan falchur barang gatang lee sistem Ole soft. 1. Seferlah barang letang leterina son Bitata 8. raknya masing - masing 2. Selanjut nya pengin putan faktur lee sistem Ok - soft 2. Selanjut nya pengin putan
	The state of the s	See a service of the control of the
•		Broikert Hasil panginperson factories Bi Ok- soft. Dalam I father torsin da Destar lain 1 Hansaplat plaster Kain 1 Hansaplas plaster Mickel Mouse

NO.	Hari, tgl (waktu)	Aktivitas	
28-	Mongge.	1	Catatan - (cut pelayanon posien PESCO No.
	03-03-2024		racilcan.
			- Molakulean KIE torkou's resep torsolat Posep mengoending Anti-brotik, schingga persien portu.
		1 1	Oforifale fortung informasi Obort.
	//		A phintle Amorgadin young tablet Sininun schan
	16	64.1	
		177 174	1 stroppe haves osmand
	*	2 17	fishe for joes resistansi terhalap obat.
		- 1/6	- Cataflam tablet somiacion 3xshari sesudal
		ZW	makan, keven kafaflam promisliki efok sempong
			Dapat monginitasi (ambieng.
		-de-	
		1	
	and a second		

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
7			Prahed B. R. Percenta and No. 11 Proton Fondal Proton Soci Great Greath. 3/3 -2004
			By catafla My wx
			Nama Tn. Ari Jose walvyo 11mm 39 M

Dosen Pembimbing,


Coesit 28-5- 2014 Pembimbing Lapangan (Instansi PKL) NIK/SIPA.....

NO.	Hari, tgl (waktu)	Aktivitas	Catatan (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
29.	Senin, 04-03-2024		- (leut membantu cak stule Obat. - (leut membantu cak stule Obat. - (leut membantu cak stule Obat. - (leut palayanan panggunan Landolin spray / inhalar naggunan Landolin spray / inhalar naggunalcan 1. Desalk afau barari tagak saat manggunalcan 1. Desalk afau barari tagak saat manggunalcan 1. Cesuk afau basuksan (aag uni) taark na fas 3. Talan tahan halfas (abeth. 3. Jaan tahan halfas (abeth. 3. Jaan tahan halfas (abeth. 3. Jaan tahan buan nayas parlahan saantara 4. Turik san buan nayas parlahan saantara Safrap isagan. Ventolin Inhalar CFC Free Salbutamol Salbutamol EP 0.1 mg per dase = 200 doses

NO.	Ḥari, tgl (waktu)	Aktivitas	Catatan (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
30 .	Selasa 05-03-2019		- Melalculcan lægistan Bernt-bersih apotok targ Stalculcan rufin i bulan selahi getau osrabit.
			Big Cloaning Day:
			- Produkt (crow ledge. Foobetes soo my toublet. [composition: Methornia soung. [composition: Methornia soung. [n.S. Kousi: Lentuk toropi pada posien asabetes yang [n.S. Kousi: Lentuk toropi pada posien. [insulia.
			Contra (nesteasi: 1 be havil sun menyesui Efole sampting: med san mentah Doors san asteran paleai: Doors san asteran paleai: Soong 3 xichai diminum loorsama Doors awal: soong 3 xichai diminum loorsama
			- Bila skombinasi sengar obait sabetes golongan Sulfonil area, maka saysit sminum 1 x satari sou uy.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokum
6			PORDSTESS 500 Medicarries system to control to the control of the
			See


NO.	Hari, tgl (waktu)	Aktivitas	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
	Dahu. 6-3-2029 Experimental Texperimental Company of the Company	### ##################################	- (cut manifelajuri prosa clas refur parjudan. - (cut manifelajuri prosa clas sind chall sampludan. - (cut manifelajuri prosa clas sind chall baran sind can sind companitation sind companitation. - (cut manifelajuri prosa clas refur parjudan. - (cut manifelajuri) parjudan. - (cut



NO.	Hari, tgl (waktu)	Aktivitas	Catatan (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
73.	8-3-5029 Drawnt		Ci bur
			GRESIVE /

NO.	Ḥari, tgl (waktu)	Aktivitas	Catatan (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen
79	Sabtu 7-3-2029		Cipur
		1//	GRESIV

Aktivitas	Catatan (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
	- Produk Knowledge.
	Compositi : 1. Phonol phtalein ss my 2. Pavafin Veguer 1-200 mg 3. Coly corn 3+0 mg [No:lean : Porbailean ponsotative dan politin jalannya fesses. [No:lean : Porbailean ponsotative dan politin jalannya fesses. Donos : - Dowasa : 3-6 sonsok falear (ts-30 ml) - Hock 6-12 fabre : £ doris vouvosa. (Diminum solcali sobori pada pralam bevi monjelany troser) (Diminum solcali sobori pada pralam bevi monjelany troser) tfole Samping : Colilargan cariram dar save tfole Samping : Colilargan cariram dar save [contra l'orsicari : hiporsonsitivitas ferbedap 2at aktif den [contra l'orsicari : hiporsonsitivitas ferbedap 2at aktif den [componen lain salam lawarir comulsi. Pongim panar : Simpan pada puhu es-bacu de 30 g dan forlin dung dari sincur mataban
	N. E. S.





No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	
6	(wanta)		Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			- Until perencana annya menggienalcan metode konsumtif dengan menganalisa data konsunsi seesaan farmasi alat keschatan
			periode subolumen vitambah stok pringanga (buffer stok), stok tunggu (lead time) seen numper hatilan sisa ctok.
	1		Dilakukan dengen fahat sebagai berikut:
			1. Dangan Malihat relapan es sistem, pula, don't torsabut
			termacule obot fact moving, slow moving, medium
	3		moving all & stok forcing aface stok manipies.
			2. Settelah itu untuk stok gang manipis delehat cisa Stoknya berapa.
1	1		
			3. Komudian diorderlan la PBF, until about your urgo
			afour obort yang fast moving dan harus fersousin si
			apotel water bison di orderkan te PBF yang pengirima
			Corport

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			- Clotek Dafacto, manggunakan sestem loss solos cetare
			lan celer.
			- Until stok kosong actau barang baru, associate akan melakukan klek loss sedes as komputer son buntuk. stok yang menipis bisa blik loss beles.
			- Javi, Associate request to apotator parihal borang lessons of au manipis songan telise loss sales atom less seles forsabut
			- Catalah itu Apotokar satrap havi mangacak as sistem
		$\mathbb{I} = \mathbb{I}$	Komputer rekapon deri arsociode, setelah itu baru Sorderkan Ice PAT.
		© ~ 127661277	A Marine - MUNIC DESCRIPTIVE AND ADMINISTRATIVE ADMINISTRATI
			April Apri
	17.	\\ *	LOTI MALE ALL TOPS AND
			19 STORAGE OF THE STO
		O D	
		Klik	loss soles / barang kosong Klik less seles / barang menip

lo.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dok
6		_3/	- Tabel Nama - Name Obert Bosorton PBF nya.
			NO Nama PBF Darter Obot
			1- AAM (Amanah - Mamagang prosek Argon Massea) Dera: 1. Voltades tob
			2. Stimueno tab don eyr 3. Alerba Asimor
			4. Obat-Obat generik Dongan poebrit Dona
		1 31	2. AMS (Antour - Mamagang produk Mitro Sambowa) 1. Obout - Obout generale angun pabrik nour/ 2. Plera less inholan
			2. Pleas loss inhalan
			3. S-omeod tub 4. Ransval err. 5. Rével err.

	1 1.	bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
	No. Noma PBF	Daffar Obert -
	3. APL	- Obat - Obat Dorgan pobrele combipher; 1. OBH combi anak sandowron 2. Ostoopor 3. Maltufor 4. Combusi of san tablet. 5. Fortibus spr san tablet.
N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S	4. Ensoval	- Obat-Obat generale dengan perbuile til (tiexpherom Jaya) - Obat-Obat davi taisho: 1- Kanda) in oral base 2. Coventerpain or 4. Myco-Z 5. Tampro yer 6. Thrombopub gal, ount.
		9. Ensoval






No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	(Popiolage L. L. Capaian
6			(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen) - Pengimpanan di lemari, pendingin, santaranga Obat-obatan Suppo sitoria, seperti Albayl ovula, Barragin - N suppo, Profession prostis suppo, dulcolas suppo - Centuk pengimpanan Obat LASA beluan terlaksana
			TO STATE OF THE PROPERTY OF TH
			GRESIV

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen
7			(Fenjerasan lengkap disertal bukti-bukti dukung -> dapat berupa loto/scan dokumen
- 25			
			- Miller State
	,		
			Jack W K //

Crest, 7-6 Dosen Pembimbing,* Diah Ratnasari F. Farm, Apt, M.T.
NIDN: 07911 9001 Coverte, 28-5-2024 Pembimbing Lapangan*(Instansi PKL)

A. TUGAS KHUSUS RESEP

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus**: resep berasal dari salinan resep (3), resep polifarmasi (3), resep obat mata/telinga (1), resep obat kulit (1), resep mengandung sediaan inhaler (1), resep obat KB (1), Resep mengandung insulin (1), resep kudis/kurap (1), Resep obat saluran cerna (1), Resep saluran nafas (1), resep racikan anak (3), Resep racikan dewasa (3), resep pasien DM (1), Resep pasien HT (1), Resep pasien syaraf (1), resep yang ada pengulangan /iter (3), dan resep lainnya (4)
Total: 30 Resep



Nama Obat /warna etiket:



E. Product knowledge

Nama Obat : rhinos kapsul

Kandungan: loratadine 5mg dan pseudoefedrin 120mg.

Dosis lazim: dewasa dan anak >12 tahun: 2xsehri 1 kapsul tiap 12 jam Kegunaan: meredakan gejala rinitis alergi seperti bersin-bersin, hidung

tersumbat

ESO potensial: mengantuk

KI : hipersensitifitas terhadap agen adrenergik

PERHATIAN: hipertensi, kehamilan dan laktasi

Cara penyimpanan : simpan di tempat yang kering dan sejuk yang terhindar

dari sinar matahari

F. Tahap pembuatan

- 1. saat menerima resep dari pasien dilakukan skrining administrasi berupa ditanyakan usia pasien, berat badan pasien, alamat pasien.
- 2. dilakukan pengecekan stok obat, kemudian dilakukan pemberian harga resep
- 3. menginfokan harga resep ke pasien, kemudian menyiapkan obat dan memberi etiket pada obat
- 4. menyerahkan obat kepada pasien dengan mengkonfirmasi ulang data pasien dan meminta no.telepon pasien.
- 5. melakukan KIE pada pasien
- G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

resep yang berisi obat rhinos ini digunakan untuk meringankan gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat. Diminum sehari 2x 1 kapsul sesudah makan, diminum setiap 12 jam sekali. Obat ini memiliki efek samping mengantuk sehingga setelah minum obat ini disarankan untuk tidak berkendara.

Komunikasi verbal maupun non verbal:


AA: Selamat siang ibu, atas nama ibu iis nur dengan alamat perum harmoni pps 2.

Bu Iis: iya mbak benar ini saya bu iis

AA: Baik ibu ini saya jelaskan obatnya ya. Obatnya ini ada 1 macam ya bu.

Nama obatnya rhinos kapsul. Keluhan ibu ini pilek ya bu

Bu iis: iya mbak AA: baik bu, ini obatnya untuk flu bisa mengurangi hidung tersumbat, nanti diminum 2xsehari 1 kapsul bu sesudah makan ya bu dan diminum setiap 12 jam. Kalau sudah minum obat ini jangan berkendara ya bu karena obat menyebabkan ngantuk Bu iis: 000.. iya mbak, terimakasih mbak AA: oo iya bu, apakah boleh untuk meminta no.telfonnya ibu yang bisa dihubungi, ini sebagai pendataan di apotek kami ibu Bu iis: oo iya mbak, 0877xxxxxxxx. Terimakasih ya mbak AA: terimakasih kembali bu, semoga sehat selalu



Nama Pasien:	Ada/ Tidak Ad a	An. Azara	
Umur pasien:	Ada/ Tidak Ad a	5 tahun	
Berat Badan:	Ada/ Tidak Ad a	20 kg	
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ad a	Amoxicillin syr	
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-	
Bentuk sed.:	Ada/ Tidak Ad a	Syrup	
Jumlah obat:	Ada/ Tidak Ad a	No.I	
Duplikasi terapi:	Ada/Tidak Ada	-	
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	S 3dd cth I	
Tanggal	Ada/ Tidak Ad a	03/03/2024	
penulisan resep:	77.	11	
Nama dokter:	Ada/T idak Ad a	Dr. Vino Sp.A	
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada		
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ad a	RSUD IBNU SINA	
1000		Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo	

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Amoxycillin syr yang diambil sebanyak 1 botol sesuai dengan Nomero

C. Perhitungan biaya resep

 $HJA \times jumlah \ obat : 5800 \times 1 \ botol = 5.800$

D. ETIKET Nama Obat /warna etiket: LABEL: KOCOK DAHULU No. 01461 03/03/2024 An Azara 3x sehari 1 sendok teh (5ml)Sesudah makan E. Product knowledge Nama Obat : Bintamox syr Kandungan: Amoxicillin 125mg/5ml Dosis lazim: anak-anak: 20-50mg/kg BB/hari dalam terbagi dam 3 dosis Kegunaan: antibiotik ESO potensial: reaksi alergi : hipersensitifitas terhadap penicillin PERHATIAN: hipersensitif terhadap sefalosporin Cara penyimpanan : simpan di tempat yang kering dan sejuk yang terhindar dari sinar matahari. Syrup hanya bisa disimpan sampai 7 hari setelah dilarutkan F. Tahap pembuatan 1. saat menerima resep dari pasien dilakukan skrining administrasi berupa ditanyakan alamat pasien. 2. dilakukan pengecekan stok obat, kemudian dilakukan pemberian harga resep 3. menginfokan harga resep ke pasien, kemudian menyiapkan obat dan memberi etiket pada obat

- 4. menyerahkan obat kepada pasien dengan mengkonfirmasi ulang data pasien dan meminta no.telepon pasien.
- 5. melakukan KIE pada pasien
- G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

Resep yang berisi amoxycillin syrup ini merupakan obat yang digunakan sebagai antibiotik, sehingga penggunaaannya harus dihabiskan agar tidak terjadi resisten dan untuk penyimpanannya tempat yang kering dan sejuk atau di suhu kamar yang terhindar dari sinar matahari. Syrup hanya bisa disimpan sampai 7 hari setelah dilarutkan. Untuk pemakaiannya, diminum 3xsehri 1 sendok teh (5ml) sesudah makan

Komunikasi verbal maupun non verbal:

AA : Selamat siang ibu, resep atas nama an. Azara dengan alamat gardenia ya bu.

Ibu an.azara: iya mbak benar ini saya ibunya an.azara

AA: Baik ibu ini saya jelaskan obtanya ya. Obatnya ini ada 1 macam ya bu. Obatnya ini amoxycillin syrup ya bu ini antibiotik bu, nanti minumnya 3xsehari 1 sendok teh (5ml) diminum sesudah makan ya bu. Syrupnya ini harus habis dalam 1 minggu (7 hari), jadi setelah 7 hari sudah tidak bisa dipakai lagi. Dan syrupnya ini jangan disimpan dikulkas ya bu. Disimpan saja di suhu kamar, pokoknya terlindung dari sinar matahari ya bu

Ibu an.azara : iya mbak, terimakasih ya mbak AA: oo iya bu, apakah boleh untuk meminta no.telfonnya ibu yang bisa dihubungi, ini sebagai pendataan di apotek kami ibu Bu an.azara : oo iya mbak, 0815xxxxxxxx. Terimakasih ya mbak AA: terimakasih kembali bu, semoga sehat selalu



Nama Pasien:	Ada/ Tidak Ada	Tn. Autin
Umur pasien:	Ada/Tidak Ada	-
Berat Badan:	Ada/Tidak Ada	_
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Urinter
Kekuatan :	-Ada/Tidak Ada	-
Bentuk sed.:	Ada/Tidak Ada	
Jumlah obat:	Ada/ Tidak Ada	No.X
Duplikasi terapi:	Ada/Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	S 2dd1
Tanggal	Ada/ Tidak Ada	22-4-2024
penulisan resep:		V 11
Nama dokter:	Ada/ Tidak Ada	Dr.Djati
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Urinter kapsul yang diambil sebanyak 10 kapsul sesuai dengan Nomero

C. Perhitungan biaya resep

HJA x jumlah obat : 8980 x 10 kapsul = 89.800

Nama Obat /warna etiket:



E. Product knowledge

Nama Obat: urinter kapsul

Kandungan: pipemidic acid 400mg

Dosis lazim : 1 kapsul tiap 12 jam. Terapi haris dilanjutkan selama ≥ 10 hari

mencegah kemungkinan kambuh

Kegunaan : untuk infeksi saluran kemih kelamin yang disebabkan oleh bakteri

ESO potensial: mual dan nyeri perut

KI : hipersensitifitas terhadap pipemidic acid dan pada penderita asma

PERHATIAN: wanita hamil dan menyusui

Cara penyimpanan : simpan di tempat yang kering dan sejuk atau pada suhu kamar yang terhindar dari sinar matahari.

F. Tahap pembuatan

- 1. saat menerima resep dari pasien dilakukan skrining administrasi berupa ditanyakan usia pasien, berat badan pasien, alamat pasien.
- 2. dilakukan pengecekan stok obat, kemudian dilakukan pemberian harga resep
- 3. menginfokan harga resep ke pasien, kemudian menyiapkan obat dan memberi etiket pada obat

- 4. menyerahkan obat kepada pasien dengan mengkonfirmasi ulang data pasien dan meminta no.telepon pasien.
- 5. melakukan KIE pada pasien
- G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

Resep yang berisi pipemidic acid ini merupakan obat yang digunakan sebagai infeksi saluran kemih dan penggunaannya 1 kapsul tiap 12 jam dan harus diminum dalam ≥ 10 hari untuk mencegah kemungkinan kambuh.


Komunikasi verbal maupun non verbal:

AA: Selamat siang bapak, resep atas nama Tn. Autin dengan alamat jalan intan ya bapak.

Bapak Autin: iya mbak benar ini saya bapak Autin sendiri

AA: Baik bapak ini saya jelaskan obatnya ya. Obatnya ini ada 1 macam bapak namanya Urinter kapsul ya bapak. Tadi kan keluhan bapak nyeri saat pipis, Iha obatnya ini digunakan untuk infeksi saluran kemih jadi selaras dengan keluhan bapak. Nanti minumnya 2xsehari 1 kapsul diminum tiap 12 jam dan diminum sesudah makan ya pak. Diresepnya ini jumlah obatnya 10 kapsul dan obat ini Seharusnya diminum terus paling tidak 10 hari jadi seharusnya 20 kapsul jumlah obatnya, tetapi ini diresepkan oleh dokter sebanyak 10 kapsul. Kalau 10 kapsul kan berarti obat ini habis dalam 5 hari. Jadi nanti setelah obatnya habis, bapak periksa lagi ke dokter meskipun sudah tidak merasakan sakit. Nanti biar diperiksa oleh dokter apakah masih perlu minum obat ini atau tidak ya bapak

Bapak Autin: iya mbak, terimakasih penjelasannya mbak AA: oo iya pak, apakah boleh untuk meminta no.telfonnya bapak yang bisa dihubungi, ini sebagai pendataan di apotek kami ibu Bapak Autin : waduh mbak saya gak bawa hp dan saya gak hafal no.telpon AA: baiklah kalau begitu pak, terimakasih bapak, semoga sehat selalu



Nama Pasien:	Ada/Tidak Ada	Diko
Umur pasien:	Ada/Tidak Ada	_
Berat Badan:	-Ada/Tidak Ada	-
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Cendo Timol 0,5% ed
Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	0,5%
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ed (eye drop)
Jumlah obat:	Ada/ Tidak Ad a	No.I
Duplikasi terapi :	-Ada/Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ad a	S 2dd gtt I OS
Tanggal	Ada/T idak Ad a	02 Januari 2024
penulisan resep:		
Nama dokter:	Ada/ Tidak Ad a	Dr.Wimbo Sasono, SP.M(K)
Surat ijin :	Ada/ Tidak Ad a	SIP:
750 6	1,01	503.446/0554/III/IP.DS/436.7
		.2/2020
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ad a	JL. Bawean No.28 Surabaya

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Cendo Timol 0,5% eye drop yang diambil sebanyak 1 botol s**esuai dengan** Nomero

C. Perhitungan biaya resep

HJA x jumlah obat : 67.300 x 1 botol = 67.300

Nama Obat /warna etiket :

Warna etiket biru



E. Product knowledge

Nama Obat : Cendo Timol 0,5% eye drop

Kandungan : setiap ml mengandung timolol maleat setara dengan timolol 5mg

Dosis lazim: 1 tetes 2xsehari

Kegunaan : untuk menurunkan tekanan intraokular pada penderita hipertensi

okular, glaukoma dan pasien afakia dengan glaukoma.

ESO potensial: mual dan sakit kepala

KI : hipersensitifitas terhadap timolol 5mg dan pada penderita asma

PERHATIAN : wanita hamil dan menyusui

Cara penyimpanan : simpan di tempat yang kering dan sejuk atau pada suhu

kamar yang terhindar dari sinar matahari.

F. Tahap pembuatan

- 1. saat menerima resep dari pasien dilakukan skrining administrasi berupa ditanyakan usia pasien, berat badan pasien dan alamat pasien.
- 2. dilakukan pengecekan stok obat, kemudian dilakukan pemberian harga resep
- 3. menginfokan harga resep ke pasien, kemudian menyiapkan obat dan memberi etiket pada obat
- 4. menyerahkan obat kepada pasien dengan mengkonfirmasi ulang data pasien dan meminta no.telepon pasien.
- 5. melakukan KIE pada pasien
- G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)


Resep yang berisi Timolol 5mg ini merupakan obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan intraokular dan penggunaannya diteteskan pada mata kiri sebanyak 1 tetes 2xsehari tiap 12 jam. Obat ini memiliki efek samping mual dan sakit kepala

Komunikasi verbal maupun non verbal:

AA : Selamat siang bapak, resep atas nama Sdr.Diko dengan alamat jalan mutiara

Bapak Sdr.Diko: iya mbak itu resep anak saya

AA: baik bapak, akan saya jelaskan terkait obatnya. Obatnya ini tetes mata ya bapak dipakai sehari 2x1 tetes pada mata kiri. Apabila dalam 3 hari tidak ada perubahan maka harus kembali ke dokter lagi ya bapak dan obta ini hanya bisa disimpan selama 1 bulan setelah kemasan dibukaBapak Sdr.Diko : baik mbak AA: Oooya bapak, apakah boleh untuk meminta no.telfonnya yang bisa dihubungi, ini sebagai pendataan di apotek kami bapak Bapak Sdr.Diko: iya mbak, 0818xxxxxxxx AA: Terimakasih bapak semoga sehat selalu



Nama Pasien:	Ada/ Tidak Ad a	An. azara
Umur pasien:	Ada/ Tidak Ad a	1 bulan 6 hari
Berat Badan:	Ada/ Tidak Ad a	5 kg
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ad a	Digenta cream
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ad a	Cream 10 gr
Jumlah obat:	Ada/Tidak Ada	No.I
Duplikasi terapi	Ada/Tidak Ada	
:		
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ad a	S2dd1
Tanggal	Ada/ Tidak Ad a	29-04-2024
penulisan resep:		
Nama dokter:	Ada/Tidak Ada	Dr.Hartantyo Kusuma, Sp.A.,M.I
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ad a	Jl. Permata Boulevard Kav. Bv 6-8
	ASSET N	Pondok Permata Suci

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Digenta cream 10gr yang diambil sebanyak 1 tube sesuai dengan Nomero

C. Perhitungan biaya resep

HJA x jumlah obat : 146.500 x 1 tube = 146.500

Nama Obat /warna etiket:



E. Product knowledge

Nama Obat : Digenta cream

Kandungan: Betamethason propionate 0,5% dan Gentamycin sulfate 0,1%

Dosis lazim: oleskan, 3-4xsehari

Kegunaan : meredakan manifestasi peradangan dari dermatoses dengan komplikasi infeksi sekunder yang memberi respon terhadap kostikosteroid

ESO potensial: iritasi kulit

KI : hipersensitifitas terhadap Betamethason propionate dan

Gentamycin sulfate

PERHATIAN : hentikan penggunaan bila terjadi iritasi, pada wanita hamil dan

anak-anak

Cara penyimpanan : simpan di tempat yang kering dan sejuk atau pada suhu

kamar yang terhindar dari sinar matahari.

F. Tahap pembuatan

- 1. saat menerima resep dari pasien dilakukan skrining administrasi berupa ditanyakan alamat pasien.
- 2. dilakukan pengecekan stok obat, kemudian dilakukan pemberian harga resep
- 3. menginfokan harga resep ke pasien, kemudian menyiapkan obat dan memberi etiket pada obat
- 4. menyerahkan obat kepada pasien dengan mengkonfirmasi ulang data pasien dan meminta no.telepon pasien.
- 5. melakukan KIE pada pasien
- G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)


Resep yang berisi Digenta Cream ini merupakan obat yang digunakan untuk meredakan peradangan dari dermatitis dan penggunaannya dioleskan tipistipis sehari 2x

Komunikasi verbal maupun non verbal:

AA : Selamat siang ibu, resep atas nama bayi Jenantari dengan alamat jalan purnawarman gang H.Mardjuki

Ibu bayi Jennatari : iya mbak itu resep anak saya

AA: baik ibu, akan saya jelaskan terkait obatnya. Obatnya ini cream ya ibu untuk meredakan gatal dan peradangan atau kemerahan di kulit , dioleskan tipis-tipis sehari 2x. Apabila dalam 3 hari tidak ada perubahan maka harus kembali ke dokter lagi ya ibu Ibu bayi Jennatari : baik mbak AA: Oooya ibu, apakah boleh untuk meminta no.telfonnya yang bisa dihubungi, ini sebagai pendataan di apotek kami bapak Ibu bayi Jennatari : iya mbak, 0859xxxxxxx AA: Terimakasih ibu semoga sehat selalu



Ada/T idak Ad a	ADI
Ada/Tidak Ada	-
Ada/Tidak Ada	-
Ada/ Tidak Ad a	Ventolin Inhaler
Ada/Tidak Ada	-
Ada/ Tidak Ad a	Inhaler
Ada/Tidak Ada	No.I
Ada/Tidak Ada	3/
Ada/ Tidak Ad a	S inhaler
Ada/ Tidak Ad a	04-03-2024
Ada/Tidak Ada	Dr. Yoyok
Ada/Tidak Ada	- 1
Ada/ Tidak Ad a	Desa Roomo Kecamatan Manyar
	Gresik
	Ada/Tidak Ada

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Ventolin Inhaler yang diambil sebanyak 1 pcs sesuai dengan Nomero

C. Perhitungan biaya resep

HJA x jumlah obat : 188.400 x 1 pcs = 188.400

Nama Obat /warna etiket:



E. Product knowledge

Nama Obat : Ventolin Inhaler

Kandungan: salbutamol sulfat 0,1 mg

Dosis lazim: dewasa:1-2 puff dosis 3-4 kali/hari anak: 1 puff 3-4 kali/hari Kegunaan : untuk terapi rutin penyakit penyumbatan saluran nafas, termasuk

asma

ESO potensial: sakit kepala dan kram otot

: hipersensitifitas terhadap salbutamol

PERHATIAN: pada wanita hamil dengan kehamilan trisemester 1 atau 2 dan

anak-anak

Cara penyimpanan : simpan di tempat yang kering dan sejuk atau pada suhu

kamar yang terhindar dari sinar matahari.

F. Tahap pembuatan

- 1. saat menerima resep dari pasien dilakukan skrining administrasi berupa ditanyakan usia pasien, berat badan pasien, alamat pasien.
- 2. dilakukan pengecekan stok obat, kemudian dilakukan pemberian harga resep
- 3. menginfokan harga resep ke pasien, kemudian menyiapkan obat dan memberi etiket pada obat
- 4. menyerahkan obat kepada pasien dengan mengkonfirmasi ulang data pasien dan meminta no.telepon pasien.
- 5. melakukan KIE pada pasien
- G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

Resep yang berisi Ventolin Inhaler ini merupakan obat yang digunakan untuk meredakan asma ringan, sedang dan berat dan penggunaannya disemprotkan


Komunikasi verbal maupun non verbal:

AA: Selamat siang bapak, resep atas nama bapak adi dahanrejo

Bapak Adi: iya mbak itu resep saya

AA: baik bapak, akan saya jelaskan terkait obatnya. Obatnya ini bentuknya inhaler atau disemprotkan untuk meredakan asma. Mohon maaf bapak, untuk cara pemakaiannya apakah sudah tau atau sudah dijelaskan oleh dokter

Bapak Adi: sudah dijelaskan dokter mbak tapi saya lupa AA: baik pak saya jelaskan. Pertama dalam posisi duduk atau berdiri tegak ya pak, kemudian kocok dulu ventolinnya sebelum digunakan. Masukkan inhalernya diantara gigi dan mulut, tekan inhaler kemudian langsung tarik nafas dan tahan 10 detik. Tarik dan buang napas perlahan diantara setiap isapan. Bapak Adi: iya mbak, terimakasih ya mbak AA: ooo ya bapak, apakh boleh untuk meminta no.telfonnya yang bisa dihubungi pak, ini sebagai pendataan di apotek kami. Bapak Adi: iya mbak. 0821xxxxxxxx AA: Terimakasih bapak semoga sehat selalu



Nama Pasien:	Ada/T idak Ad a	Ny. Aisyah M	
Umur pasien:	Ada/ Tidak Ad a	44 tahun	
Berat Badan:	Ada/Tidak Ada	-	
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ad a	Postinor 2 tablet	
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-	
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	-	
Jumlah obat:	Ada/Tidak Ada	No.I	
Duplikasi terapi	Ada/Tidak Ada	57 11	
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	-	
Tanggal	Ada/ Tidak Ad a	30-03-2024	
penulisan resep:			
Nama dokter:	Ada/ Tidak Ad a	Dr.Faridah Yan Pratiwi K	
Surat ijin :	Ada/ Tidak Ad a	NIP: 199301032022032006	
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ad a	Jalan Sunan Giri No.31. Kebomas	

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Postinor 2 tablet yang diambil sebanyak 1 kotak sesuai dengan Nomero

C. Perhitungan biaya resep

HJA x jumlah obat : 30.000 x 1 kotak = 30.000

Nama Obat /warna etiket:



E. Product knowledge

Nama Obat: Postinor 2 tablet

Kandungan: Levonorgestrel 0,75mg

Dosis lazim: tablet diminum 2 kali, dosis yang pertama diminum sesegera mungkin sedangkan dosis yang ke dua diminum 12 jam setelah dosis pertama Kegunaan: alat kontrasensi darurat yang waktu hubungan seksual tidak

Kegunaan : alat kontrasepsi darurat yang waktu hubungan seksual tidak

memakai pengaman

ESO potensial: mual, diare dan sakit perut

KI : pada wanita hamil

PERHATIAN : pada wanita hamil dan menyusui

Cara penyimpanan : simpan di tempat yang kering dan sejuk atau pada suhu

kamar yang terhindar dari sinar matahari.

F. Tahap pembuatan

- 1. saat menerima resep dari pasien dilakukan skrining administrasi berupa ditanyakan berat badan pasien, alamat pasien.
- 2. menelfon dokter tentang keakuratan resep dan cara pemakaiannya
- 3.. dilakukan pengecekan stok obat, kemudian dilakukan pemberian harga resep
- 4. menginfokan harga resep ke pasien, kemudian menyiapkan obat dan memberi etiket pada obat
- 5. menyerahkan obat kepada pasien dengan mengkonfirmasi ulang data pasien dan meminta no.telepon pasien.
- G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

Resep yang berisi Postinor 2 tablet ini merupakan obat yang digunakan sebagai alat kontrasepsi darurat secara oral, untuk wanita yang baru saja melakukan hubungan seksual tanpa pengaman.


Komunikasi verbal maupun non verbal:

AA: Selamat pagi ibu, resep atas nama ibu Aisyah alamat di Giri

Ibu Aisyah: iya mbak itu resep saya

AA: baik ibu, akan saya jelaskan terkait obatnya. Mohon maaf ibu, untuk cara pemakaiannya apakah sudah tau atau sudah dijelaskan oleh dokter

Ibu Aisyah : iya mbak tadi sudah dijelaskan sama dokternya. Kata dokternya tablet pertama diminum saat ini juga dan satu tablet yang lain ada selang waktu 12 jam setelah tablet yang pertama AA: baik bu, berarti sudah paham ya bu tentang cara minumnya. Apakah boleh untuk meminta no.telfonnya yang bisa dihubungi bu, ini sebagai pendataan di apotek kami. Ibu Aisyah: iya mbak, 0818xxxxxxxx. Terimakasih ya mbak AA: Terimakasih kembali bu semoga sehat selalu



Nama Pasien:	Ada/T idak Ad a	Tn. Jarwoto
Umur pasien:	Ada/ Tidak Ad a	55 tahun
Berat Badan:	-Ada/Tidak Ada	-
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ad a	Microlac gel
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ad a	Gel
Jumlah obat:	Ada/T idak Ad a	No.I
Duplikasi terapi	Ada/Tidak Ada	3/
:		
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ad a	Sue
Tanggal	Ada/ Tidak Ad a	04-04-2024
penulisan resep:		
Nama dokter:	Ada/ Tidak Ad a	Ada, tetapi tidak jelas
Surat ijin :	Ada/ Tidak Ad a	446/116/43752/xxxx
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jalan KH.Syafi'i no.100 desa suci
		manyar

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Microlac gel yang diambil sebanyak 1 tube sesuai dengan Nomero

C. Perhitungan biaya resep

HJA x jumlah obat : 25.000 x 1 tube = 25.000

Nama Obat /warna etiket:



E. Product knowledge

Nama Obat : microlax gel

Kandungan: Na lauryl sulfoacetate 45 mg, Na citrate 450 mg, sorbic acid

5 mg, sorbitol 4,465 mg, PEG-400 625 mg

Dosis lazim : dewasa dan ana-anak 3 tahun keatas 1 tube, anak-anak

<3tahun ½ tube

Kegunaan : sebagai pencahar untuk mengatasi susah buang air besar

ESO potensial: mual, diare dan sakit perut

KI : pada wanita hamil

PERHATIAN : Ketika mengalami sembelit, disarankan untuk

memperbanyak konsumsi makanan kaya serat dan minum air putih untuk

mempercepat penyembuhan

Cara penyimpanan : simpan di tempat yang kering dan sejuk atau pada suhu kamar yang terhindar dari sinar matahari.

F. Tahap pembuatan

- 1. saat menerima resep dari pasien dilakukan skrining administrasi berupa ditanyakan berat badan pasien, alamat pasien.
- 2. dilakukan pengecekan stok obat, kemudian dilakukan pemberian harga resep
- 3. menginfokan harga resep ke pasien, kemudian menyiapkan obat dan memberi etiket pada obat
- 4. menyerahkan obat kepada pasien dengan mengkonfirmasi ulang data pasien dan meminta no.telepon pasien.
- 5. melakukan KIE pada pasien
- G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

Resep yang berisi Microlax gel ini merupakan obat pencahar yang digunakan untuk mengatasi susah buang air besar (BAB) dan penggunaannya dimasukkan ke dubur karena berbentuk enema


Komunikasi verbal maupun non verbal:

AA : Selamat siang bapak, resep atas nama bapak Jarwoto alamat di dahan rejo

Bapak Jarwoto: iya mbak, benar itu resep saya

AA: baik bapak, akan saya jelaskan terkait obatnya. Mohon maaf bapak, untuk cara pemakaiannya apakah sudah tau atau sudah dijelaskan oleh dokter

Bapak Jarwoto: belum mbak AA: baik bapak, saya akan jelaskan cara pemakaiannya. Obatnya ini cara pemakaiannya dimasukkan ke dubur ya bapak, pertama-tama microlaxnya ini di tekan sedikit kemudian dioleskan diujungnya microlax. Setelah itu dimasukkan ke dalam dubur lalu ditekan seluruhnya. Bapak Jarwoto: oo iya mbak AA: Mohon maaf bapak, apakah boleh untuk meminta no.telfonnya yang bisa dihubungi, ini sebagai pendataan di apotek kami pak. Bapak Jarwoto: iya mbak, 0821xxxxxxxx. Terimakasih ya mbak AA: Terimakasih kembali pak semoga sehat selalu



Nama Pasien:	Ada/ Tidak Ad a	Nadyah
Umur pasien:	Ada/ Tidak Ad a	28 tahun
Berat Badan:	Ada/Tidak Ada	-
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ad a	Fluimucil tablet
Kekuatan :	Ada/ Tidak Ad a	200mg
Bentuk sed.:	Ada/ Tidak Ad a	Tablet
Jumlah obat:	Ada/ Tidak Ad a	No.X
Duplikasi terapi	Ada/Tidak Ada	
: (18.0x1111/15.	77 1	37 / / /
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ad a	S 3dd tab1 pc
Tanggal	Ada/ Tidak Ad a	12-01-2024
penulisan resep:		
Nama dokter:	Ada/ Tidak Ad a	Dr. Ahmad AZ
Surat ijin :	Ada/ Tidak Ad a	SIP.446/2303/437.52/2023
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ad a	Jalan raya manyar KM 11 Manyar
		Gresik

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Fluimucil kapsul 200mg yang diambil sebanyak 10 kapsul sesuai dengan Nomero

C. Perhitungan biaya resep

HJA x jumlah obat : 8.850 x 10 kapsul = 88.500

Nama Obat /warna etiket :



E. Product knowledge

Nama Obat : fluimucil kapsul 200mg Kandungan : n-acetylsistein 200 mg

Dosis lazim: 14 th ke atas: 2-3x sehari 1 kapsul, 6-14 thn: 2x sehari 1

kapsul

Kegunaan : terapi pengencer dahak pada penyakit bronkial dan paru akut dan kronik dengan dahak yang tebal, seperti bronkhitis akut, bronkhitis

kronik dan akut berulang, emfisema paru.

ESO potensial: mual, muntah, diare dan radang tenggorokan

KI : hipersensitif terhadap n-acetyl sistein

PERHATIAN : gunakan fluimucil dengan hati-hati pada kondisi pasien

yang menderita asma bronkhial, bila kesulitan bernapas karena

bronkospasme setelah penggunaan obta maka segera hentikan **penggunaan** obat ini.

Cara penyimpanan : simpan di tempat yang kering dan sejuk atau pada suhu kamar yang terhindar dari sinar matahari.

F. Tahap pembuatan

- 1. saat menerima resep dari pasien dilakukan skrining administrasi berupa ditanyakan berat badan pasien, alamat pasien.
- 2. dilakukan pengecekan stok obat, kemudian dilakukan pemberian harga resep
- 3. menginfokan harga resep ke pasien, kemudian menyiapkan obat dan memberi etiket pada obat
- 4. menyerahkan obat kepada pasien dengan mengkonfirmasi ulang data pasien dan meminta no.telepon pasien.
- 5. melakukan KIE pada pasien
- G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)


Resep yang berisi Fluimucil kapsul ini merupakan obat yang digunakan untuk mengencerkan dahak pada kondisi batuk berdahak kental seperti bronkitis, emfisema paru, pneumonia, maupun tuberkulosis dan penggunaannya sehari 3x1kapsul sesudah makan

Komunikasi verbal maupun non verbal:

AA : Selamat siang ibu, resep atas nama ibu Nadyah alamat di perum harmoni no.10

Ibu Nadyah: iya mbak, benar itu resep saya

AA: baik ibu, akan saya jelaskan terkait obatnya. Obatnya ini untuk pengencer dahak ya ibu nanti minumnya 3xsehari 1 kapsul sesudah makan. Bila dalam 3 hari tidak ada perubahan, maka harus kembali lagi ke dokter ya ibu Ibu Nadyah: oo iya mbak AA: Mohon maaf ibu, apakah boleh untuk meminta no.telfonnya yang bisa dihubungi, ini sebagai pendataan di apotek kami. Ibu Nadyah : iya mbak, 0878xxxxxxxx. Terimakasih ya mbak AA: Terimakasih kembali bu semoga sehat selalu



A. Skrinning Administrasi

Nama Pasien:	Ada/T idak Ad a	An. Muh Rayyan
Umur pasien:	Ada/Tidak Ada	-
Berat Badan:	Ada/Tidak Ada	-
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ad a	Mezatrin
Kekuatan :	Ada/ Tidak Ad a	125mg
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ad a	Pulveres
Jumlah obat:	Ada/ Tidak Ad a	No.V
Duplikasi terapi	Ada/Tidak Ada	
: Observability	77 1	3/ //
Aturan pakai :	Ada/T idak Ad a	S 2dd1
Tanggal	Ada/ Tidak Ad a	10-01-2024
penulisan resep:		
Nama dokter:	Ada/ Tidak Ad a	Dr. Tri
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	1-15-17

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Mezatrin kapsul : 125mg x V : 250mg : 2,5 kapsul

C. Perhitungan biaya resep

HJA x jumlah obat :

Mezatrin kapsul : $19.300 \times 3 \text{ kapsul} = 57.900$ Kertas puyer berlogo K-24 : $70 \times 5 = 350$

Totalnya: 57.900 + 350 = 58.250

D. ETIKET

Nama Obat /warna etiket :



E. Product knowledge

Nama Obat : mezatrin kapsul 250mg Kandungan : azithromycin 250mg

Dosis lazim: Dewasa dan anak > 16 tahun: Infeksi saluran nafas dan

infeksi kulit: hari 1: 500 mg/hari, hari 2-5: 250 mg/hari

Kegunaan : antibiotik yang digunakan untuk Infeksi saluran nafas atas dan

bawah, infeksi kulit dan untuk terapi pneumonia

ESO potensial: mual, muntah dan diare

KI : hipersensitif terhadap azithromycin dan erithromycin

PERHATIAN : hati-hati pada wanita hamil dan menyusui

Cara penyimpanan : simpan di tempat yang kering dan sejuk atau pada suhu

kamar yang terhindar dari sinar matahari.

F. Tahap pembuatan

- 1. saat menerima resep dari pasien dilakukan skrining administrasi berupa ditanyakan berat badan pasien, usia pasien dan alamat pasien.
- 2. dilakukan pengecekan stok obat, kemudian dilakukan perhitungan jumlah obat yang diambil sekaligus pemberian harga resep
- 3. menginfokan harga resep ke pasien, kemudian menyiapkan obat, meracik obat dan memberi etiket pada obat
- 4. menyerahkan obat kepada pasien dengan mengkonfirmasi ulang data pasien dan meminta no.telepon pasien.
- 5. melakukan KIE pada pasien
- G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)


Resep yang berisi mezatrin ini merupakan obat antibiotik yang digunakan untuk Infeksi saluran nafas atas dan bawah, infeksi kulit dan untuk terapi pneumonia dan penggunaannya sehari 2x1 bungkus sesudah makan dan dihabiskan.

Komunikasi verbal maupun non verbal:

AA : Selamat siang ibu, resep atas nama An. Muh Rayyan alamat di jalan safir II

Ibu An. Muh Rayyan: iya mbak, benar itu resep untuk anak saya

AA: baik ibu, akan saya jelaskan terkait obatnya. Obatnya ini hanya 1 macam ya bu, minumnya 2xsehari 1 bungkus sesudah makan, dihabiskan ya bu karena obat ini antibiotik, jadi meskipun sakitnya sudah mendingan atau sudah sembuh tetap dihabiskan ya bu. Ibu An. Muh Rayyan: oo iya mbak AA: Mohon maaf ibu, apakah boleh untuk meminta no.telfonnya yang bisa dihubungi, ini sebagai pendataan di apotek kami. Ibu An. Muh Rayyan : iya mbak, 0812xxxxxxxx. Terimakasih ya mbak AA: Terimakasih kembali bu semoga sehat selalu



A. Skrinning Administrasi

Ada/T idak Ad a	AN Muh Alif
Ada/Tidak Ada	-
Ada/Tidak Ada	-
Ada/ Tidak Ad a	Acyclovir 200mg
Ada/ Tidak Ad a	200mg
Ada/ Tidak Ad a	Pulveres
Ada/T idak Ad a	No.X
Ada/Tidak Ada	-
77 3 14	
Ada/T idak Ada	S 3dd1
Ada/ Tidak Ad a	06-01-2024
Ada/ Tidak Ad a	Dr. Iqbal Razif
Ada/Tidak Ada	-
Ada/ Tidak Ad a	Jalan kalimantan no.29-31 GKB
	Gresik
	Ada/Tidak Ada

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Dalam racikan tersebut tidak ada dtd, jadi Acyclovir 200mg tablet yang diambil sebanyak 5 tablet

C. Perhitungan biaya resep

HJA x jumlah obat :

Acyclovir 200mg tablet : 900 x 5 tablet = 4.500 Kertas puyer berlogo K-24 : 70 x 10 bungkus = 700 Totalnya: 4.500 + 700 = 5.200

D. ETIKET

Nama Obat /warna etiket :



E. Product knowledge

Nama Obat : acifar 200mg tablet Kandungan : acyclovir 200mg

Dosis lazim: Dewasa dan anak diatas 2 tahun:

 $200~\rm mg$ 5 x sehari dengan selang waktu 4 jam selama 5 hari. Dapat ditingkatkan sampai dengan 400 mg perhari. Untuk anak 2 tahun ke bawah :

setengah dosis dewasa

Kegunaan : untuk pengobatan infeksi herpes simpleks pada kulit & membran mukosa, termasuk infeksi herpes genitalis inisial & rekurens.

ESO potensial: ruam pada kulit

KI : hipersensitif terhadap acyclovir

PERHATIAN : hati-hati pada wanita hamil dan menyusui

Cara penyimpanan : simpan di tempat yang kering dan sejuk atau pada suhu

kamar yang terhindar dari sinar matahari.

F. Tahap pembuatan

- 1. saat menerima resep dari pasien dilakukan skrining administrasi berupa ditanyakan berat badan pasien, usia pasien dan alamat pasien.
- 2. dilakukan pengecekan stok obat, kemudian dilakukan perhitungan jumlah obat yang diambil sekaligus pemberian harga resep
- 3. menginfokan harga resep ke pasien, kemudian menyiapkan obat, meracik obat dan memberi etiket pada obat
- 4. menyerahkan obat kepada pasien dengan mengkonfirmasi ulang data pasien dan meminta no.telepon pasien.
- 5. melakukan KIE pada pasien
- G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)


Resep yang berisi acyclovir ini merupakan obat antivirus yang digunakan untuk pengobatan infeksi herpes simpleks, herpes zoster pada kulit & membran mukosa dan penggunaannya sehari 3x sehari 1 bungkus sesudah makan.

Komunikasi verbal maupun non verbal:

AA : Selamat siang ibu, resep atas nama An. Muh Alif alamat di perumahan ruby pps ya bu

Ibu An. Muh Alif: iya mbak, benar itu resep untuk anak saya

AA: baik ibu, akan saya jelaskan terkait obatnya. Obatnya ini hanya 1 macam ya bu, minumnya 3xsehari 1 bungkus sesudah makan diminum tiap 8 jam, obatnya ini untuk gatalnya karna virus ya bu Ibu An. Muh Alif: oo iya mbak AA: Mohon maaf ibu, apakah boleh untuk meminta no.telfonnya yang bisa dihubungi, ini sebagai pendataan di apotek kami. Ibu An. Muh Alif: iya mbak, 0859xxxxxxxx. Terimakasih ya mbak AA: Terimakasih kembali bu semoga sehat selalu



A. Skrinning Administrasi

Nama Pasien:	Ada/T idak Ad a	An. Askara
Umur pasien:	Ada/ Tidak Ad a	5 tahun
Berat Badan:	Ada/ Tidak Ad a	15 kg
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ad a	Epexol tablet, tremenza tablet,
	Sec. 1964	cortidex tablet, salbutamol 2mg tablet,
		amoxsan syrup
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-9
Bentuk sed.:	Ada/ Tidak Ad a	Pulveres dan syrup
Jumlah obat:	Ada/ Tidak Ad a	Pulveres 10 bungkus dan syrup 1 botol
Duplikasi terapi	Ada/Tidak Ada	1.00
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ad a	Untuk pulveres : S 3dd pulv I
		Untuk syrup : S 3dd 5ml habiskan
Tanggal	Ada/T idak Ad a	16-03-2024
penulisan resep:	100 E	
Nama dokter:	Ada/ Tidak Ad a	Dr. A'la Illiyine J
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	- Tr / / /
Alamat dr. :	Ada/T idak Ada	Jalan RA. Kartini no.280 Gresik

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Untuk pulveres:

Dalam resep tidak ada dtd maka, pengambilan obatnya:

Epexol tablet : 2 tablet Tremenza tablet : 2 tablet Cortidex tablet : 2 tablet

Salbutamol 2mg tablet : 2 tablet

Untuk syrupnya:

Amoxsan syrup 125mg/5ml sebanyak 1 botol sesuai dengan Nomero

C. Perhitungan biaya resep

HJA x jumlah obat Untuk pulveres :

Epexol tablet : 1.240 x 2 tablet = 2.480 Tremenza tablet : 2.200 x 2 tablet = 4.400 Cortidex tablet : 450 x 2 tablet = 900

Salbutamol 2mg tablet : 180 x 2 tablet = 360 Puyer berlogo K-24 : 70 x 10 bungkus = 700

Total biaya racikan : 2.480 + 4.400 + 900 + 360 + 700 = 8.840

Untuk syrupnya:

Amoxsan syrup $125 \text{mg/5ml} : 32.500 \times 1 \text{ botol} = 32.500$

Totalnya: 8.840 + 32.500 = 41.340

D. ETIKET

Nama Obat /warna etiket:





LABEL:

KOCOK DAHULU

E. Product knowledge

Nama Obat : epexol tablet Kandungan : ambroxol 30mg

Dosis lazim: Dewasa dan anak diatas 12 tahun: 30mg. 2-3xsehari bisa

ditingkatkan 60mg, maksimal 120mg/hari.

Kegunaan : sebagai sekretolitik pada gangguan pernapasan akut dan kronis, terutama pada eksaserbasi bronkitis kronis, bronkitis kronik dan asma bronkial

ESO potensial: efek gastrointestinal ringan, reaksi alergi

KI : hipersensitif terhadap ambroxol

PERHATIAN : hati-hati penggunaan pada pasien tukak lambung, pada

wanita hamil dan menyusui

Cara penyimpanan : simpan di tempat yang kering dan sejuk atau pada suhu kamar yang terhindar dari sinar matahari.

Nama Obat : tremenza tablet

Kandungan: pseudoephedrine 60 mg, 2,5 mg triprolidine HCl

Dosis lazim: dewasa dan anak >12 tahun: 3-4 x sehari 1 tablet, 6-12 tahun:

3-4 x sehari 1-2 tablet

Kegunaan : flu karena alergi pada saluran nafas atas atau yang memerlukan dekongestan dan antihistamin.

ESO potensial: mengantuk

KI : penyakit pada saluran pernapasan termasuk asma dan pada pasien hipertensi

PERHATIAN : hati-hati pada pasien penderita asma, pada wanita hamil dan

menyusui

Cara penyimpanan : simpan di tempat yang kering dan sejuk atau pada suhu kamar yang terhindar dari sinar matahari.

Nama Obat : cortidex tablet

Kandungan: dexamethasone 0,5mg

Dosis lazim: Dewasa 0.5-9 mg dalam dosis terbagi. Anak 6-12 tahun: 0.25-2 mg, 1-5 tahun 0.25-1 mg, < 1 tahun 0.1-0.25 mg. Diberikan 2 kali sehari Kegunaan: sebagai anti inflamasi golongan kortikosteroid yang berperan dalam mengurangi atau menekan proses peradangan dan alergi yang terjadi dalam tubuh

ESO potensial: edema, hipertensi, nafsu makan meningkat

KI : infeksi jamur sistemik

PERHATIAN : hati-hati penggunaan pada pasien hipertensi, pada wanita

hamil dan menyusui

Cara penyimpanan : simpan di tempat yang kering dan sejuk atau pada suhu

kamar yang terhindar dari sinar matahari.

Nama Obat : grafalin 2mg tablet Kandungan : salbutamol 2mg

Dosis lazim: Dewasa dan anak > 12 tahun: 1-2 tablet 3-4 kali/hari. Anak 6-

12 tahun : 1 tablet 3-4 kali/hari. Anak 2-6 tahun : ½ tablet 3-4 kali/hari. Kegunaan : bronkospasme pada asma bronkial, bronkitis kronik, dan

emfisema.

ESO potensial : tremor, sakit kepala dan kram otot KI : hipersensitif terhadap salbutamol

PERHATIAN: hati-hati penggunaan pada wanita hamil dan menyusui Cara penyimpanan: simpan di tempat yang kering dan sejuk atau pada suhu kamar yang terhindar dari sinar matahari.

Nama Obat : amoxsan syrup

Kandungan: amoxycillin 125mg/5ml

Dosis lazim: anak-anak berat badan 8 kg 125-250 mg tiap 8 jam 3xsehari. Kegunaan: sebagai antibiotik untuk terapi infeksi gram positif dan negatif,

seperti pada saluran nafas atas dan bawah, saluran kemih dan kelamin

ESO potensial : gangguan gastrointestinal

KI : hipersensitif terhadap antibiotik golongan penicillin PERHATIAN : hati-hati penggunaan pada wanita hamil dan menyusui Cara penyimpanan : simpan di tempat yang kering dan sejuk atau pada suhu kamar yang terhindar dari sinar matahari.

F. Tahap pembuatan

- 1. saat menerima resep dari pasien dilakukan skrining administrasi berupa ditanyakan alamat pasien.
- 2. dilakukan pengecekan stok obat, kemudian dilakukan perhitungan jumlah obat yang diambil sekaligus pemberian harga resep
- 3. menginfokan harga resep ke pasien, kemudian menyiapkan obat, meracik obat, melarutkan sediaan syrup kering dan memberi etiket pada obat
- 4. menyerahkan obat kepada pasien dengan mengkonfirmasi ulang data pasien dan meminta no telepon pasien.
- 5. melakukan KIE pada pasien
- G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

Resep ini berisi 2 macam sediaan obat. Obat yang pertama racikan pulveres untuk batuk, pilek disertai sesak dengan 4 macam obat dalam 1 racikan pulveres diantaranya epexol tablet, ambroxol tablet, salbutamol tablet dan tremenza tablet. Untuk obat racikan pulveres diminum 3x sehari 2 bungkus sesudah makan.

Resep yang kedua ada antibiotik amoxsan syrup dan penggunaannya sehari 3x 5ml sesudah makan. Antibiotik syrup kering batas penyimpanannya hanya 5-7 hari setelah syrup dilarutkan, sehingga dalam waktu tersebut harus dihabiskan. Penyimpanan untuk racikan pulveres maupun untuk syrup antibiotiknya yaitu pada tempat yang kering di suhu kamar dan terlindung dari sinar matahari. Untuk efek sampingnya mengantuk.

Komunikasi verbal maupun non verbal:

AA : Selamat malam ibu, resep atas nama An. Askara alamat di perumahan natuna pps ya bu

Ibu An. Askara: iya mbak, benar itu resep untuk anak saya

AA: baik ibu, akan saya jelaskan terkait obatnya. Obatnya ini ada 2 macam ya bu, pertama ini ada racikan puyer bu untuk batuk dan pileknya diminum 3xsehari 1 bungkus, efek sampingnya ngantuk ya bu. Obat yang ke2 ini ada syrup antibiotik bu minumnya 3xsehari 5ml sesudah makan, sebelum diminumkan kocok terlebih dahulu ya bu. Syrup antibiotiknya ini harus dihabiskan maksimal dalam 7 hari bu, karena syrupnya ini penyimpanannya hanya bertahan sampai 7 hari, jadi setelah 7 hari sudah tidak bisa diminumkan lagi. Untuk penyimpanan ke dua obta ini hanya di suhu kamar dan terlindung dari sinar matahari ya bu, jangan disimpan dikulkas ya bu.

Ibu An. Askara: oo iya mbak

AA: Mohon maaf ibu, apakah boleh untuk meminta no.telfonnya yang bisa dihubungi, ini sebagai pendataan di apotek kami.

Ibu An. Askara: iya mbak, 0878xxxxxxxx. Terimakasih ya mbak

AA: Terimakasih kembali bu semoga sehat selalu



Nama Pasien:	Ada/ Tidak Ada	Dian Setiawan		
Umur pasien:	Ada/ Tidak Ada	39 tahun		
Berat Badan:	Ada/Tidak Ada	-		
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Amlodipine 10mg		
Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	10mg		
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ad a	Tablet		
Jumlah obat:	Ada/ Tidak Ada	No.X		
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-		
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	S 0-0-1		
Tanggal	Ada/Tidak Ada	-		
penulisan resep:				
Nama dokter:	Ada/ Tidak Ad a	Dr. Hariani		
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	SIP.13/B.15A/31.75.03.1007/xxx		
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Dinoyo No.81 Kec.Tegalsari		
1/4/6		Surabaya		

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Amlodipine 10mg tablet yang diambil sebanyak 10 tablet sesuai dengan Nomero

C. Perhitungan biaya resep

HJA x jumlah obat : 1.170 x 10 tablet = 11.700

D. ETIKET Nama Obat /warna etiket: No. 01490 29/04/2024 Tn. Dian Setiawan Malam 1 tablet Sesudah makan E. Product knowledge Nama Obat : Cardisan 10mg tablet Kandungan: amlodipine 10mg Dosis lazim: 5mg 1 x perhari maksimal 10mg/hari Kegunaan : untuk hipertensi dan angina. ESO potensial: sakit kepala dan edema : hipersensitif terhadap amlodipine PERHATIAN : hati-hati pada wanita hamil dan menyusui Cara penyimpanan : simpan di tempat yang kering dan sejuk atau pada suhu kamar yang terhindar dari sinar matahari.

- F. Tahap pembuatan
- 1. saat menerima resep dari pasien dilakukan skrining administrasi berupa ditanyakan berat badan pasien dan alamat pasien.
- 2. dilakukan pengecekan stok obat, kemudian dilakukan perhitungan jumlah obat yang diambil sekaligus pemberian harga resep
- 3. menginfokan harga resep ke pasien, kemudian menyiapkan obat dan memberi etiket pada obat
- 4. menyerahkan obat kepada pasien dengan mengkonfirmasi ulang data pasien dan meminta no.telepon pasien.
- 5. melakukan KIE pada pasien
- G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)


Resep yang berisi amlodipine 10mg ini merupakan obat antihipertensi yang digunakan untuk pengobatan lini pertama hipertensi dan dapat digunakan untuk mengontrol tekanan darah pada sebagian besar pasien dan penggunaannya diminum pada malam hari 1 tablet. Obat ini memiliki efel samping berupa pembengkakan di kaki

Komunikasi verbal maupun non verbal:

AA : Selamat siang bapak, resep atas nama bapak Dian Setiawan alamat di pegandan

Bapak Dian S: iya mbak, benar itu resep atas nama saya

AA: baik pak, saya akan jelaskan obatnya ya. Obatnya ini hanya satu macam pak nanti diminum pada malam hari 1 tablet. Obat ini digunakan untuk mengontrol tekanan darah dan untuk efek sampingnya ini berupa pembengkakan di kaki pak jadi jangan panik pak cukup di kompres pakai air hangat. Kalau bengkaknya sampai 3 hari tidak reda atau tidak sembuh, bapak kembali lagi ke dokternya ya pak biar dikasih obat sesuai dengan keluhan bapak Bapak Dian S: iya mbak, terimakasih penjelasannya AA: Oooo ya bapak, apakah boleh meminta no.telephon bapak yang bisa dihubungi, ini untuk pendataan di apotek kami bapak Bapak Dian S: maaf mbak saya gak bawa hp AA: baiklah kalau begitu, terimakasih bapak semoga sehat selalu



A. Skrinning Administrasi

Ada/Tidak Ada	An. Sachio Alhamdi
-Ada/Tidak Ada	-
Ada/Tidak Ada	-
Ada/ Tidak Ada	Sirplus syrup dan vaporin kapsul
Ada/Tidak Ada	- 1
-Ada/Tidak Ada	- 1
Ada/ Tidak Ada	Sirplus 1 botol dan vaporin 10
7 10 1 6	kapsul
Ada/Tidak Ada	
Ada/ Tidak Ada	Sirplus syrup : S 3dd1cth
	Vaporin kapsul : S ue
Ada/ Tidak Ada	05-02-2024
Ada/ Tidak Ad a	Dr. Natali Erica Sp.A
Ada/Tidak Ada	-
Ada/Tidak Ada	- 12
	Ada/Tidak Ada

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Sirplus syrup diambil sebanyak 1 botol sesuai dengan Nomero Vaporin diambil sebanyak 10 kapsul

C. Perhitungan biaya resep


HJA x jumlah obat :

Sirplus syr: 19.400 x 1 botol = 19.400 Vaporin kapsul: 8.370 x 10 kapsul = 83.700

Totalnya: 19.400 + 83.700 = 103.100

D. ETIKET

Nama Obat /warna etiket:





E. Product knowledge

Nama Obat : Sirplus syrup

Kandungan: sucralose (bubuk) dan gula alami

Dosis lazim: sesuai kebutuhan

Kegunaan : pelarut obat atau pemanis obat

ESO potensial: -

KI : hipersensitif terhadap sucralose

PERHATIAN: hati-hati untuk campurn obatnya sesuai dengan resep

dokter atau sesuai dengan kebutuhan saja

Cara penyimpanan : simpan di tempat yang kering dan sejuk atau pada suhu

kamar yang terhindar dari sinar matahari.

Nama Obat : Vaporin kapsul

Kandungan: tiap kapsul lunak mengandung: eucalyptus oil 44,315 mg, cajuput oil 23, 125 mg, clove oil 0,125 mg, juniper oil 3,375 mg, peppermint

oil 44,315 mg, levomenthol 5,125 mg, methyl salicylate 4,625 mg Dosis lazim: sesuai kebutuhan anak usia 3-8 tahun 8-12 tetes

Kegunaan : membantu meringankan gejala flu dan pilek

ESO potensial: reaksi hipersensitifitas terhadao komponen vaporin : hipersensitif terhadap komponen vaporin PERHATIAN: Hanya untuk pemakaian luar. Hindari kontak langsung dengan mata dan kulit Cara penyimpanan : simpan di tempat yang kering dan sejuk atau pada suhu kamar yang terhindar dari sinar matahari. F. Tahap pembuatan 1. saat menerima resep dari pasien dilakukan skrining administrasi berupa ditanyakan usia pasien, berat badan pasien dan alamat pasien. 2. dilakukan pengecekan stok obat, kemudian dilakukan perhitungan jumlah obat yang diambil sekaligus pemberian harga resep 3. menginfokan harga resep ke pasien, kemudian menyiapkan obat dan memberi etiket pada obat 4. menyerahkan obat kepada pasien dengan mengkonfirmasi ulang data pasien dan meminta no.telepon pasien. 5. melakukan KIE pada pasien

G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal) Dalam satu resep ini berisi 2 macam obat, yaitu sirplus syrup sebagai pemanis untuk sediaan puyer agar tidak pahit, digunakan sehari 3x 1 sendok teh (5ml) dan vaporin kapsul yang digunakan untuk meringankan gejala flu dan pilek. Cara penggunaan vaporin bisa diteteskan di sawal bantal, baju atau di teteskan di air panas dan dihirup aromanya. Hindari kontak langsung dengan mata Komunikasi verbal maupun non verbal: AA: Selamat malam bapak, resep atas nama An. Sochi Alhamdi alamat di perum natuna Bapak An. Alhamdi : iya mbak, benar itu resep atas nama anak saya AA: baik pak, saya akan jelaskan obatnya ya. Obatnya ini ada 2 macam pertama ada sirplus sebagai pemanis untuk puyer agar tidak pahit bapak diminum sehari 3x 1 sendok teh (5ml). Untuk obat yang kedua ini vaporin kapsul pak ini untuk membantu meringankan gejala flu atau pilek, jadi kalau malam adeknya enak tidurnya. Cara penggunaannya diteteskan di sawal bantal, di baju atau diteteskan di air panas, setelah itu dihirup aromanya. Bapak Dian S: ooo iya mbak, terimakasih penjelasannya AA: Oooo ya bapak, apakah boleh meminta no.telephon bapak yang bisa dihubungi, ini untuk pendataan di apotek kami bapak Bapak Dian S: iya mbak, 0898xxxxxxxx AA: terimakasih bapak semoga sehat selalu



Gresik, 06 Juni 2024 Dosen Pembimbing PKL

Diah Ratnasari, S.Farm., Apt,. M.T

NIDN. 0721119001.

Gresik, 06 Juni 2024 Pembimbing Lapangan Apotek K24 PPS Gresik

Apt Edri Zulfikar Fahmi, S. Farm No. SIPA: 19940830/SIPA_35.25/2020/11767

A. PRODUCT KNOWLEDGE BERDASARKAN KELAS TERAPI

(1) ANALGETIK- ANTIPIRETIK- ANTIINFLAMASI

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Analgetik- Antipiretik- Antiinflamasi	acetaminophen,	Sanmol tablet 500mg	Penderita dengan gangguan fungsi hati yang berat dan penderita yang sensitif terhadap paracetamol	Meringankan rasa sakit seperti sakit kepala, sakit gigi dan sebagai penurun demam	- dewasa : 1-2 kaplet 3-4 kali sehari - anak 6-12 tahun : ½ kaplet 3-4 kali sehari	Nyeri di lambung, mual atau muntah	Simpan pada suhu di bawah 30°C dalam wadah tertutup rapat dan hindarkan dari cahaya matahari
	metampiron,	Neuralgin Rx	Penderita alergi metamizole, anak dibawah 3 bulan atau dengan berat badan dibawah 5 kg, kehamilan	Nyeri kepala, nyeri gigi atau tumor, nyeri setelah operasi, kolik pada saluran pencernaan	- Dewasa dan remaja 15 tahun keatas : Dosis harian maksimum : 4x1tablet, Tidak boleh dikunyah, dianjurkan ditelan dalam bentuk utuh.	Gangguan saluran cerna	Simpan pada suhu di bawah 30°C, hindari dari suhu dan kelembapan tinggi serta lindungi dari cahaya matahari.
	ibuprofen,	Proris 200mg tablet	Penderita hipersensitif dengan ibuprofen, penderita tukak lambung dan kehabilan 3 bulan terakhir	Meringankan nyeri ringan sampai sedang, seperti nyeri haid, nyeri pada sakit gigi, nyeri kepala dan dapat menurunkan demam	Dewasa: 1-2 kaplet 3-4 kali sehari	Gangguan pencernaan seperti mual, muntah, nyeri lambung, diare, kemerahan pada kulit	Simpan pada suhu di bawah 30°C dalam wadah tertutup rapat dan hindarkan dari cahaya matahari

	X-flam 50mg cablet	Hipersensitif pada diklofenak potasium dan tukak lambung	Nyeri inflamasi setelah trauma seperti terkilir, nyeri dan inflamasi setelah operasi	- Dosis maksimal 100mg per hari (dosis awal maksimal 150mg sehari pada hari pertama) Dosis anak-anak diatas usia 14 tahun: 75-100mg sehari - Dosis harian harus	Gangguan saluran cerna seperti mual, muntah, diare, nyeri tukak lambung, terkadang ruam pada kulit	Simpan pada suhu di bawah 30°C
	Renadinac 50mg tablet	Penderita yang hipersensitif diklofenak sodium, penderita tukak lambung dan penderita asma	Pengobatan akut dan kronis gejala- gejala rematoid athritis, osteoartritis.	diberikan dengan dosis terbagi 2-3 kali - Dewasa: Dosis maksimal 100mg per hari (dosis awal maksimal 150mg sehari pada hari pertama) dalam dosis terbagi.	Nyeri/kram perut, sakit kepala, diare, mual, konstipasi	Simpan pada suhu di bawah 30°C
	Mefinal 500mg ablet	Penderitan hipersensitifitas terhapdan asam mefenamat, penderita tukak lambung dan usus	Meredakan nyeri ringan smapai sedang seperti sakit kepala, sakit gigi, nyeri haid, nyeri otot dan nyeri setelah operasi	Dewasa dan anak-anak diatas 14 tahun : Dosis awal 500mg, kemudian dilanjutkan 250mg tiap 6 jam sesuai dengan kebutuhan	Gangguan saluran pencernaan seperti mual, muntah, diare, nyeri tukak lambung,	Simpan pada suhu di bawah 30°C dalam wadah tertutup rapat dan hindarkan dari cahaya matahari
1 '	wiros 20mg	Pemderita hopersensitifitas terhadap	Pengobatan akut dan kronis gejala- gejala rematoid	Dosis pada umumnya 20mg sehari dalam dosis tunggal atau	Nyeri kepala, gangguan pencernaan,	Simpan pada suhu di bawah

		piroxicam dan		terbagi, tidak boleh		30°C, terlindung
		ulkus peptikus	osteoartritis.	untuk jangka waktu lama	diare, konstipasi	dari cahaya.
		11		- rematoid athritis, osteoartritis : 20mg		
			3.81 ()	sehari sekali		
indometasin,	indocid	Peningkatan kadar	Meredakan nyeri	Dewasa 25 mg 2-3 kali	Sakit perut,	Simpan obat
		methotrexate atau probenecid dalam darah peningkatan resiko terjadinya pendarahan saluran cerna jika digunakan dengan obat antikoagulan, seperti warfarin, peningkatan resiko terjadinya kerusakan ginjal akibat efek kerja yang berlawanan jika digunakan bersama oleh ACE	penyakit asam urat, radang tendon atau nyeri haid	seharu. Dosis dapat ditingkatkan menjadi 150-200mg per hari	mual, muntah diare penyakit asam lambung, dispepsia sakit kepala atau pusing sangat mengantuk	dalam wadahnya, tertutup rapat, dan jauh dari jangkauan anak - anak untuk mencegah keracunan pada anak. Simpan pada suhu kamar yang jauh dari panas dan kelembapan.
	- 1.1	inhibitor, seperti captopril, enapril		· * /	/-	
		atau lisinopril. Peningkatan resiko		J. //		
		terjadinya	4 E S 1	V //		
		hiperkalemia jika digunakan		//		
		bersama suplemen				
		vitamin K atau				
		diuretik hemat				
		kalium				

fenilbutazon,	Irgapan	Pendarahan GI, penyakit ulkus, hamil	Mengobati inflamasi dan nyeri dari berbagai jenis atritis seperti arthritis dan anykylosing spondylytis	Dosis awal 200 mg 2-3 kali sehari, selama 2 hari dengan atau setelah makan	Sensasi panas seperti terbakar pada lambung, tukak lambung, kram	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
aspirin,	Thrombo Aspilet 80mg tablet	Penderita alergi, penderita tukak lambung, anak- anak berusia kurang dari 12 tahun dan ibu menyusui	Pencegahan proses pembekuan darah dalam pembuluh darah pada pasien angina tidak stabil, pasien infark miokard	1-2 tablet setiap hari	Iritasi lambung, mual, muntah	Simpan pada suhu di bawah 25°C, terlindung dari cahaya
meloksikam,	Ostelox 15mg tablet	Penderita hipersensitif terhadap meloxicam, anak- anak dan remaja <15 tahun, ibu hamil dan menyusui, gngguan saluran cerna	Pengobatan jangka pendek untuk osteoarthritis, pengobatan jangka panjang untuk rhematoid arthritis	- rhematoid arthritis: 15mg satu kali sehari. Dosis dapat diturunkan hingga 7,5mg satu kali sehari - osteoarthritis: 7,5mg satu kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan hingga 15mg satu kali sehari.	Gangguan saluran pencernaan seperti mual, muntah, diare, nyeri tukak lambung,	Simpan pada suhu di bawah 30°C
celecoxib,	Celebrex 100mg kapsul	Reaksi alergi terhadap sulfonilamid,	Meredakan gejala dan tanda-tanda osteoarthritis dan rhematoid arthritis,	spondilitis ankilosa : 200mg 1xsehari atau	Mual, kembung, diare, ruam pada kulit	Simpan pada suhu di bawah 25°C, terlindung dari cahaya

		aspirin dan	spondilitis ankilosa	- Rhematoid arthritis :		
		-	paska pembedahan			
		golongan AINS		100-200mg 2xsehari.		
			atau kecelakaan	- Nyeri akut awal		
		11/		400mg yang kemudian		
		and I		akan ditambahkan		
				200mg, apabila		
	- // .	/	1111/07/19	diperlukan pada hari		
	11	12 124		pertama. Pada hari		
	3.7			berikutnya, 200mg	N	
	11	12/2/11/20		2xsehari. Maksimal		
	111	V3 185		penggunaan 7 hari.		
*1	D	M : 1 :1	14 11	D 1 1	D .	G: 1
parecoxib	Dynastat	Meningkatkan	Meredakan nyeri			Simpan pada
	111 /	resiko terjadinya	pasca operasi	40mg dapat dianjurkan		suhu di bawah 20
		efek samping yang		dengan dosis 20-40mg		derajat celcius
		berbahaya, berupa		tiap 6-8 jam apabila		dan terhindar
		luka dan		diperlukan. Dosis		dari cahaya
		pendarahan di		maksimal 80 mg per	malam hari,	
	10.0	saluran cerna jika	500 100 100	hari. Lansia dengan	gelisah, mual,	
	13.3. 4	digunakan		berat badan <50 kg.	muntah sakit	
		bersama aspirin	2277/11/11/19/55	Dosis awal 20 mg.	maag, perut	
		peningkatan resiko	200	dosis maksimal 40mg		
		terjadinya		per hari . parecoxib	1 00 0	
		terjadinya		dapat disuntikan		
		pendarahan jika		langsung ke dalam	tangan atau kaki	
		digunakan bersama warfarin		pembuluh darah atau dalam otot tergantung	faringitis atau radang	
		atau obat		kondisi pasien	tenggorokan	
		antikoogulan ,		Kuliulsi pasieli	tenggorokan	
		seperti apixaban		//		
		1 1				
		dan dabigatran				

(2) ANTIMIKROBA

(2.a) ANTIBIOTIK

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Penisilin	Ampicillin,	Ampicillin 500mg kaplet	Pasien hipersensitif terhadap penicillin	Infeksi saluran pernafasan, infeksi saluran kemih, gonore yang terkomplikasi	- Dewasa dn anak- anak >20kg : 3-4 kali sehari 250- 500mg perhari - Anak-anak <20kg : 50-100mg /kg bb/hari, dibagi dalam 4 dosis tiap 6 jam	Reaksi alergi pada kulit, mual, muntah dan diare	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya.
	amoksisilin,	Yusimox 500mg tablet dan Yusimox 125mg/5ml syrup kering	Pasien hipersensitif terhadap penicillin	Infeksi saluran pernafasan, gonore yang terkomplikasi	- Dewasa dn anak- anak >20kg: 3-4 kali sehari 250- 500mg tiap 8 jam Anak-anak <20kg: 20-40mg/kg bb/hari dalam dosis bagi tiap 8 jam	Gangguan saluran pencernaan seperti mual, muntah, diare	Simpan pada suhu di bawah 30°C dalam wadah tertutup rapat dan hindarkan dari cahaya matahari
	ticarcillin	timentin	Hipersensitivitas terhadap penisilin	Infeksi bakteri psedomonas dan proteus	Malalui infus intravena 3,2 gram setiap 6-8 jam Ditingkatkan tiap 4 jam pada infeksi berat ; anak 80 mg /kg tiap 6-8 jam (tiap 12 jam pada bayi baru lahir)	Mual, muntah reaksi pada tempat suntikan, sisitis hemoragika (turtama pada anak) hipokalemia eosinofilia, sindrom steven	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya

						johnson, toksik epidermal nekrolisis	
Cephalosporin	cefadroxil,	Lapicef 500mg kapsul dan Lapicef 125mg/5ml syrup kering	Pasien hipersensitif terhadap cephalosporin	Infeksi saluran pernafasan, infeksi saluran kemih dan infeksi kulit	Dewasa: - infeksi saluran kemih : 1-2g sehari, dibagi dalam 1-2 kali pemberian - infeksi kulit : 1g sehari, dibagi dalam 1-2 kali pemberian - infeksi faringitis dan tongsilitis : 1g sehari, sebagai dosis tunggal atau 2 kali sehari diberikan minimal 10 hari. Anak-anak : - infeksi saluran dan infeksi kulit : 30mg/kg BB/hari dalam dosis terbagi tiap 12 jam - infeksi faringitis dan tongsilitis : 30mg/kg BB/hari dalam dosis tunggal atau dosis terbagi dua	Gangguan saluran pencernaan seperti mual, muntah, diare dan ruam pada kulit	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya.
	cefixime,	Cefila 200mg kapsul dan	Pasien hipersensitif	- infeksi saluran kemih yang	- Dewasa dan anak- anak dengan berat	Diare serta gangguan	- Untuk kapsul simpan pada
		Cefila	terhadap cefixime	disebabkan oleh	>30kg:	saluran cerna	Simpun pudu

	100mg/5ml		Escherichia coli	50-100mg 2 kali	yang lainnya	suhu di bawah
	syyo kering		dan Preteus	sehari. Untuk infeksi	seperti pusing	30°C
			mirabilis	berat dosis dapat	dan sakit	- Untuk syrup
			- infeksi faringitis	ditingkatkan menjadi	kepala	kering simpan
		37	dan tongsilitis	200mg		pada suhu di
			yang disebabkan	- Anak-anak :		bawah 30°C.
	100		oleh Streptococcus	1,5-3mg/kg BB, 2 kali		Setelah menjadi
	11	THE DAME OF THE PARTY OF THE PA	pyegenes	sehari. Untuk infeksi		suspensi,
	1//		- pengobatan	berat, dosis dapat		simpan dalam
	///	N. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	demam tifoid pada	ditingkatkan menjadi		lemari es (2-
	// 6		anak-anak	6mg/kg BB, 2 kali		8°C) dalam
				sehari		keadaan tertutup
	1 44	1000	Vestille 195			rapat. Suspensi
	1117	114	Market Investigation	- 100 Lane		hanya dapat
	144.2	100		the second		dipakai selama 7 hari.
	100	100				Hall.
cefotaxime	Biocef	Cefotaxime dapat	Menangani infeksi	Infeksi tulang dan otot	Nyeri atau	Disimpan dalam
		menimbulkan	bakteri dan	sistem saraf pusat area	bengkak di area	ruangan dengan
	V 72	interaksi obat	mencegah infeksi	kelamin, panggul,	yang disuntik	suhu di bawah
		berupa	luka operasi	perut saluran	Diare mual	30°C
		peningkatan efek		pernapasan atau	muntah, sakit	
		toksik pada ginjal		infeksi kulit	atau kram perut	
		jika digunakan			yang berat	
		bersama obat		Dewasa 1-2 gram tiap	denyut jantung	
		golongan		8-12 jam tergantung	cepat atau tidak	
		aminoglikosida		dari tingkat keparahan	teratur mudah	
	74.74	atau diuretik.	- A 1 Y	infeksi. Suntikan	memar mual	
		Selain itu kadar		dapat diberikan IM	atau muntah	
		cefotaxime dalam		atau IV dengan	yang berat,	
		darah juga dapat		suntikan perlahan	penyakit	
		meningkat jika		selama 3-5 atau	kuning, atau	
		digunakan		melaui infus selama	hilang nafsu	
		bersama		20-60 menit. Dosis	makan, kejang,	
		probenecid			lelah yang	

					malsimal adalah 12 gram per hari	tidak biasa, kebingunggan	
Chloramphenicol	kloramfenikol,	Colsancetin 250mg kapsul dan Colsancetin syrup 125mg/5ml	Pasien hipersensitif terhadap chloramphenicol	Demam tifoid, pneumonia, infeksi saluran kemih.	- Dewasa: 1-2 kapsul 3-4xsehari atau 3 sendok teh 3- 6xsehari - Anak-anak 5-15 tahun: 2 sendok teh 3- 4xsehari - Anak-anak 1-5 tahun: 1 sendok teh 3- 4xsehari - Bayi: ½ sendok teh 3xsehari	Anemia	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya. Untuk syrup tidak boleh disimpan lebih dari 7 hari setelah menjadi suspensi.
	thiamfenicol	Thiamycin 500mg kaplet dan Dionicol 125mg/5ml syrup kering	Pasien hipersensitif terhadap Thiamphenicol	Untuk infeksi yang disebabkan oleh : Salmonella sp, bakteri gram negatif, H.influenzae terutama infeksi meningeal	Dewasa, anak-anak, bayi berumur di atas 2 minggu: 50.kg BB sehari dalam dosis terbagi 3-4 kali sehari - Bayi prematur: 25mg/kg BB sehari dalam dosis terbagi 4 kali sehari - Bayi berumur di bawah 2 minggu: 25mg/kg BB sehari dalam dosis terbagi 4 kali sehari.	Gangguan saluran pencernaan seperti mual, muntah, diare.	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya. Untuk syrup tidak boleh disimpan lebih dari 7 hari setelah menjadi suspensi

Macrolides dan Lincosamide	eritromisin,	Erysanbe 500 kapsul, Erysanbe syrup 200mg/5ml	Pasien hipersensitif terhadap erythromycin	Infeksi saluran pernapasan, infeksi kulit	- Dewasa dan anakanak >20kg: 1 kapsul (250mg) 4xsehari, 1 kaplet (500mg) 2xsehari, 2 tablet kunyah (200mg) 4xsehari, syr 10ml 4xsehari - Anakanak dengan BB 20kg ke bawah: 30-50mg/kg BB/hari dalam 4 dosis terbagi	Gangguan pencernaan dan reaksi alergi	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya. Untuk syrup tidak boleh disimpan lebih dari 7 hari setelah menjadi suspensi.
	azitromisin,	Mezatrin 250mg kapsul	Pasien hipersensitif terhadap azithromycin dan erythromycin	Infeksi ringan sampai sedang pada saluran napas	Dewasa dan anak- anak >16 tahun : Pada hari ke-1 : 500mg/hari, pada hari ke2-5 : 250mg/hari	Mual, muntah, kembung, nyeri perut dan diare	Simpan pada suhu di bawah 30°C,
	klaritromisin,	Bicrolid	GR	Faringitis atau tonsilitis, sinusitis,maksilaris akut, bronkitis kronis, akserbasi akut,infeksi kulit dan strukturnya tanpa komplikasi	Faringitis dan tonsilitis: 2 kali sehari 250 mg 10 hari. Sinusitis maksilaris akut: 2 kali sehari 500mg selama 14 hari. Bronkitis kronis ekserbasi akut: 2 kali sehari 250 – 500mg selama 7-14 hari. Infeksi kulit dan strukturnya tanpa komplikasi: 2 kali sehari 250mg selama 7-14 hari	Diare, mual, gangguan rasa nyeri abdomen, sakit kepala	Simpan ditempat sejuk dan kering serta terhindar dari sinar matahari dan jauhkan dari jangkauan anak

	klindamisin	Cindala gel	Pasien hipersensitif terhadap Clindamycin atau Lincomycin	Untuk pengobatan acne vulgaris	Oleskan tipis-tipis pada kulit berjerawat, sehari 2-3 kali	Iritasi pada kulit	Simpan pada suhu di bawah 30°C,
Aminoglikosida	neomisin,	Cinolon-N cr	Pasien hipersensitif terhadap neomycin dan wanita hamil	Dermatitis terinfeksi	Oleskan 2-4xsehari	Iritas, rasa terbakar pada kulit dan rasa gatal	Simpan pada suhu di bawah 30°C
	gentamisin	Sagestam	Pasien hipersensitif terhadap gentamycin	Infeksi kulit sekunder seperti folikulitis superfisial dan infeksi kulit sekunder seperti dermatitis eksematus dan acne pustular	Oleskan 3-4xsehari	Terkadang iritasi pada kulit	Simpan pada suhu di bawah 30°C
Quinolones	ciprofloxacin,	Novaflox 500mg kaplet	Pasien hipersensitif terhadap Ciprofloxacin, wanita hamil dan menyusui, anak- anak dibawah usia 12 tahun	Untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang sensitif terhadap Ciprofloxacin: - infeksi daluran kemih - infeksi saluran cerna - infeksi saluran nafas - infeksi kulit	Dewasa: - infeksi ringan /sedang pada saluran kemih : 2x250mg sehari, infeksi berat pada saluran kemih: 2x500mh sehari - infeksi saluran cerna: 2x500mg sehari - infeksi ringan /sedang pada saluran nafas: 2 x 250-500mg sehari, infeksi berat	Gangguan saluran pencernaan seperti mual, muntah, diare	Simpan pada suhu di bawah 30°C dalam wadah tertutup rapat dan hindarkan dari cahaya matahari

	Levofloxacin	Cravox 500mg kaplet	Pasien hipersensitif terhadap levofloxacin, wanita hamil dan menyusui, anak- anak usia <18 tahun	Infeksi saluran kemih terkomplikasi,	pada saluran nafas : 2x 500-750mg sehari - Gonore akut : 250mg dosis tunggal - Dosis lazim dewasa : 250-750mg 1xsehari - beonkitis akut : 500mg/hari 1 kali sehari diminum selama 7 hri	Mual, muntah, diare, kembung, nyeri perut dan konstipasi	Simpan pada suhu di bawah 30°C dalam wadah tertutup rapat dan hindarkan dari cahaya matahari
Tetrasiklin	Tetrasiklin,	Supertetra 250mg kapsul	Pasien hipersensitif terhadap golongan tetracycline	Untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri Vibrio Cholerae, Vibrio fetus	- Dosis lazim dewasa: 1-2 kapsul setiap 6 jam - Dosis lazim ana-anak >8 tahun: 25-50mg/kg BB/hari dalam dosis terbagi setiap 6 jam - Pemberian dilakukan 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan.	Mual, muntah, ruam pada kulit dan nyeri pada ulu hati	Simpan pada suhu di bawah 30°C
	doksisiklin,	Dohixat 100mg kalsul	Pasien hipersensitif terhadap golongan tetrasiklin	Infeksi saluran pernapasan, infeksi saluran kemih, infeksi saluran cerna	- Dewasa dan anak- anak >8 tahun dengan BB >45kg: Pada hari pertama: 100mg, 2 kali sehari, dilanjutkan dengan 100mg/hari	Mual, muntah, diare dan kulit memerah.	Simpan pada suhu di bawah 30°C

	minosiklin	Nomika	Hipersensitivitas terhadap	Infeksi yang disebabkan oleh	- Anak-anak >8 tahun dengan BB <45kg: Pada hari ke-1: 4,4mg/kg BB/hari terbagi dalam 2 dosis. Bila infeksi berat: 2,2mg/kg BB/12 jam Dewasa awal 2 kali sehari setiap 12 jam	Pemakaian obat umumnya	Simpan di tempat sejuk
		N ESS	tetracycline	organisme yang sensitif atau resisten terhadap tetrasiklin lain, terapi tambahan unutk amubiasis intestinal akut akne berat	200mg kemudian 100 mg. Aanak usia lebih dari 8 tahun awal 2 kali sehari setiap 12 jam 4mg /kg BB kemudian 2mg /kg bb. Gonore pada pasien	memiliki efek samping tertentu dan sesuai dengan masing masing individu. Jika terjadi efek samping yang berlebih dan berbahaya , harap konsultasikan kepada tenaga medis. Gangguan saluran cerna, reaksi hipersensitif vertigo, pusing mual	dan kering di bawah suhu °C serta terhindar dari sinar matahari dan jauhkan dari jangkauan anak
Sulfa	sulfametoksazol- trimetoprim	Primadex Forte kaplet 960mg	Pasien hipersensitif	- infeksi traktus urinarius seperti	- Dewasa dan anak- anak diatas 12 tahun :	Mual, muntah, ruam pada kulit	Simpan pada suhu di bawah
	y y y		terhadap golongan sulfonamid atau	piyelonefritis, pielitis yang	1 kaplet 2 kali sehari	- John Pater Hell	30°C, terlindung dari cahaya

trimethoprim, bayi	disebabkan oleh	- Untuk gonorrhoae	
berumur <2 bulan,	kuman seperti	yang tidak	
wanita hamil dan	E.coli, Klebsiela	terkomplikasi:	
menyusui	- infeksi traktus	2 kaplet 2 kali sehari	
377	gastrointestinal,	selama 2 hari	
	terutama yang		
	disebabkan oleh		
1000	kuman Salmonella		
AT	Shigella seperti	172.4	
10.7	demam tifoid	- 17 A N	
C 1 1 1 1 1 1 1 1	- infeksi THT	5 77 m	

(2.b) ANTIJAMUR

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek	Cara Simpan
		Tempat PKL		1000	No. I'm I	Samping	
Polyenes	amphotericin B,	Tempat PKL Fungicid	Peningkatan resiko terjadinya efek samping pada ginjal jika digunakan bersama amikacin, cidofovir, iodinated, ciclosporine, ioversol, neomycin PO, streptozocin, tacrolimus dab	Mengobati infeksi jamur yang tergolong serius dan sejumlah infeksi protozoa	Candidiasis 100 mg, 4 kali sehari dosis bisa ditingkatkan sampai maksimal 200 mg 4 kali sehari	Mual dan muntah sakit kepala sakit perut, diare, nyeri otot, dan sendi memar dan bengkak pada lokasi	Simpan di tempat yang seju dan kering atau di bawah suhu 30°C
			telcoplanin.peningkatan efektivitas eisatracurium peningkatan terjadinya hipokalemia gangguan pernapasan jika digunkan bersama			penyuntikan tidak nafsu makan penurunan berat badan	

	Nistatin	Kandistatin 100.000 IU	corticotropin dan digoxin Pasien hipersensitif terhadap golongan nystatin	Suspensi orang ditujukan untuk pengobatan kandidiasis pada rongga mulut	Suspensi oral pada: - bayi : 1-2ml 4kali sehari - anak-anak dan dewasa: 1-6ml 4xsehari	Diare, mual, muntah	Simpan pada suhu di bawah 30°C
Imidazole	ketoconazol,	Zoraline 200mg tablet	Pasien hipersensitif terhadap ketoconazole dan wanita hanil		- Dewasa; 1 tablet (200mg) sehari sekali pada waktu makan. Apabila tidak ada reaksi pada dosis ini, maka dosis ditingkatkan menjadi 2 tablet sehari (400mg) - Anak-anak BB <15kg: 20mg 3kali sehari pada waktu makan - Anak-anak BB 15-30kg: 100mg sekali sehari pada waktu makan - Anak BB >30kg dosis sama dengan dosis dewasa.	Sakit kepala, sakit perut, diare	Simpan pada suhu di bawah 30°C

	mikonazol,	Daktarin cream	Pasien hipersensitif terhadap miconazole	Infeksi jamur pada kulit dan kuku, tinea korporis, tinea kruris	Oleskan pada kulit yang terinfeksi 2xsehari. Lama terapi : 2-6 minggu	Iritasi lokal, muncul rasa panas terbakar	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya. Baik digunakan hingga 3 bulan setelah kemasan dibuka
	klotrimazol	Fungiderm cream	Pasien hipersensitif terhadap clotrimazole	Terapi lokal untuk infeksi kulit yang disebabkan oleh dermatophytes, Malassasezia furfur dan Candida albicans	Oleskan pada kulit yang terinfeksi 2- 3xsehari selama 3-4 minggu	Rasa menyengat, gatal, iritasi umum pada kulit	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
Triazole	flukonazol,	Fluconazole tablet	Pasien hipersensitif terhadap triazol	Kriptokokosis, kandidiasis mukosal, kandidiasis vaginal dan kandidiasis orofaringeal	- Kriptokokosis: awal 400mg, kemudian 200-400 1xsehari selama 6-8 minggu - Kandidiasis mukosal: 50mg/hari selama 14 hari - Kandidiasis vaginal: Dosis tunggal 150mg - Kandidiasis orofaringeal: 50-100mg 1xsehri selama 7-14 hari	Mual, muntah, kembung, diare dan nyeri perut	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya

	Itraconazole	Itzol 100mg kapsul	terhadap triazol dan wanita hamil	Kandidiasis vulvo-vaginal, kandidiasis oral, dermatomikosis, infeksi jamur sistemik	Kandidiasis vulvo- vaginal : 2 kapsul 2xsehari selama 1 hari atau 2 kapsul/hari selama 3 hari - Kandidiasis oral : 1 kapsul sehari selama 15 hari - Dermatomikosis : 1 kapsul sehari selama 15 hari - Infeksi jamur sistemik : 2 kapsul 1xsehari, dapat ditingkatkan sampai dengan 4 kapsul/hari	Sakit kepala, gangguan pencernaan seperti mual, sakit perut dan timbul ruam pada kulit.	suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
Lainnya	griseofulvin	Grivin forte tablet 500mg	Porfiria atau gangguan fungsi hati dan wanita hamil	Infeksi jamur pada kulit, rambut dan kuku	- Dewasa : Dosis awal 500mg/hari, - Anak-anak : 10mg/kg BB/hari dalam dosis terbagi	Gangguan pencernaan, sakit kepala dan ruam pada kulit	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya

(2.c) ANTIVIRUS

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
		Tempat PKL			~ / /		
	NRTI	Zidovudine	Neutropenia atau	Terapi infeksi	Dewasa dan anak –	Sulit tidur,	Simpan di
Obat HIV-AIDS	(zidovudine,		anemia berat,	HIV, profilaksis	anak dengan BB diatas	mual ringan,	tempat sejuk
	abacavir)		neonatus dengan	transmisi HIV	30 kg 250 mg atau 300	sembelit, nyeri	dan kering serta
			hiper	daru ibu ke janin	mg, diminum dua kali	sendi, sakit	terhindar dari
			bilirubinemia yang	selama kehamilan	sehari dalam kombinasi	kepala, dan	sinar matahari
			memerlukan terapi	dan kelahiran,	dengan agen	perubahan	dan jauhkan
			selain fototerapi	serta profilaksis	antiretroviral lainnya	lemak di tubuh	

		atau dengan	infeksi HIV pada	Anak – Anak dengan	terutama pada	dari jangkauan
		peningkatan	neonatus	BB 8-13 kg. 100 mg	bagian lengan,	anak
		transminase		diminum dua kali	kaki,wajah,	
				sehari	leher dan dada	
		37		Anak -Anak dengan		
			N. H. J. J. A. L.	BB 14-21 kg 100 mg		
				diminum pagi haru 200		
	4/	1 / D. W.		mg diminum malam		
	1//	A. F.		hari		
	11	N. 1		Anak dengan BB 22 –		
	11/6	0 100		30 jg 200 mg diminum		
	TV A			dua kali sehari		
NNRTI	Efavirenz	Riwayat alergi	Mencegah	Dewasa dan anak –	Mual,muntah	
(efavirer		terhadap efavirenz	bertambahnya	anak dengan berat	Ruam kulit,	Simpan
nevirapi	1	Riwayat reaksi	jumlah virus HIV	badan >40 kg : 600 mg	tubuh terasa	ditempat sejuk
110 1111 111	,	kulit parah	yang dapat	1 kali sehari.	lelah, sakit	dan kering serta
		riwayat keluaraga	melemahkan	Anak – Anak dengan	kepala, pusing,	terhindar dari
		kematian	sistem kekebalan	berat badan 5-7, 4,9 kg	kantuk, sulit	sinar matahari
	10.1	mendadak	tubuh	: 100 mg 1 kali sehari	berkonsentrasi,	dan jauhkan
		Gangguan hati		Anak – Anak dengan	Insomnia,	dari jangkauan
		berat, Gangguan	74111111111111111111111111111111111111	berat badan 5-7, 4 kg	mimpi yang	anak
		keseimbangan		150 mg 1 kali sehari	aneh,	
		elektrolit, seperti		Anak – Anak dengan	perubahan	
	1.1.1	kadar kalium		berat badan 15- 19,9kg	lokasi atau	
		rendah dalam tubuh		250 mg 1 kali sehari	lemak tubuh	
		(hipokalemia) atau		Anak – Anak dengan berat badan 20-24,9 kg		
		kadar magnesium	F C 1 1	: 300 mg 1 kali sehari		
		rendah dalam		Anak -Anak dengan		
		tubuh		berat badan 25 – 324		
		(hipomagnesemia)		kg: 350 mg 1 kali		
		kehamilan		sehari		
		trimester pertama		Anak – Anak dengan		
				berat badan 32,5 – 40		

	PI (saquinavir, indinavir)	Indinavir	Peningkatan resiko terjadinya hipotensi jika digunakan dengan alfuzosin peningkatan resiko terjadinya aritmia jika digunakan dengan amiodarone, pimozide atau cisapride	Infeksi HIV dalam kombinasi dengan penghambat reverse transkriptase nukleosida	kg: 400 mg 1 kali sehari. Dewasa 800 mg tiap 8 jam jika pengobatan digabung dengan ritnovir menjadi 800 mg tiap 12 jam, sedangkan ritonavir 100-200 mg tiap 12 jam anak – anak usia 4 – 17 thn 500 mg tiap 8 jam dosis maksimal 800 mg tiap 8 jam	Sakit kepala sakit punggung indera perasa berubah, diare	Simpan ditempat sejuk dan kering serta terhindar dari sinar matahari dan jauhkan dari jangkauan anak
Herpes virus	acyclovir	Zovirax tablet dan Zovirax cream	Pasien hipersensitif terhadap acyclovir dan valacyclovir	Infeksi virus hepes simpleks	- Dewasa dan anak-anak lebih dari 2 tahun : 200mg 5xsehari diberikan tiap 4 jam, dilanjutkan terapi selama 5 hari - Cream : Oleskan 5xsehari tiap 4 jam. Dilanjutykan terpi selama 5 hari dan terpi bisa dilanjutkan hingga 10 hari bila belum terjadi penyembuhan	Mual, muntah, diare dan sakit kepala serta terkadang timbul iritasi pada kulit	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
Hepatitis B dan C	interferon,	Peginterveron Alfa -2b		sebagai terapi tambahan unutk mencegah kekambuhan melanoma setelah dilakukan operasi	dewasa sebagai monoterapi mcg/kgBB seminggu sekali selama 24 -48 minggu. Jika dikombinasikan dengan ribavirin dosisnya	Gejala flu, demam, mengigil, lemas atau lelah, mulut kering atau	Simpan ditempat sejuk dan kering serta terhindar dari sinar matahari dan jauhkan

		1		pengangkatan jaringan tumor	adalah 1,5 mcg/kgBB seminggu sekalu selama 24 minggu Anak – Anak usia 3 – 18 thn jika dikombinasikan dengan ribavirin dosisnya adalah 60 mcg/m2 luas tubuh seminggu sekali selama 24 -48 minggu lama pengobatan dan perubahan dosis disesuaikan dengan respons dan kondisi pasien	muncul rasa tidak enak di mulut, keringat yang berlebihan hilang, nafsu makan atau berat badan yang turun, kulit memerah, iritasi atau pembekakan disekitar area suntik gangguan tidur, sakit kepala atau pusing	dari jangkauan anak
	lamivudine	Lamivudin	GR	Mengatasi infeksi virus hepatitis B dan HIV	Dewasa 100 mg sekali sehari. Khusus pasien yang menderita hepatitis B bersamaan dengan HIV diberikan dosis 150 mg 2 kali sehari atau 300 mg 1 kali sehari. Anak — anak usia 2-17 tahun 3 mg/kgBB 1 kali sehari dosis maksimal adalah 100 mg per hari	Batuk pilek, hidung tersumbat, sakit kepala, mual, diare, gangguan tidur	Simpan ditempat sejuk dan kering serta terhindar dari sinar matahari dan jauhkan dari jangkauan anak
Influenza A dan Bvirus	amantadine,	amantadine	-	Digunakan sebagai antuvirus dan antiparkinson. Obat ini	Sebanyak 200 mg/hari atau sebanyak 100 mg/hari 2 kali sehari dosis bagi pasien yang	Mual, muntah sakit kepala, rasa mengantuk	Simpan di bawah suhu 30°C wadah tertutup, rapat

				diindikasikan	mengalami CNS dapat	insomnia,	,kering dan
				untuk beberapa	diturunkan sampai	mulut kering,	terlindung dari
				penyakit seperti	dengan 100mg/hari	depresi,	cahaya dan
				pengobatan dan	pengobatan amantadine	kegelisahan,	kelembapan
				terapi penyakit	harus dilakukan	sulit	
				parkinson serta	sesegera mungkin	berkonsentrasi	
		100		beberapa jenis	(sebaiknya dalam kurun		
		11		influenza A	waktu 24 jam – 48 jam		
		11			setelah timbulnya gejala		
		///			Pengobatan dilakukan		
		// 6			terus menerus sampai		
		/ N			dengan 5 hari atau 24 -		
		4.7"		Section 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	48 jam setelah gejala	7.1	
		11.7		MANUAL PROPERTY.	hilang		
nin-	mantadine,	Rimatadine	11/1	Mencegah atau	100 mg diminum 2 kali	Mual, muntah,	Simpan di
	mantaume,	Killiataullie		mengobati jenis	sehari selama 7 hari	diare	bawah suhu
		100		virus flu tertentu	Dosis untuk pasien	kehilangan	30°C wadah
				yaitu influenza A	diatas 65 tahun	nafsu makan,	tertutup, rapat
		1 7		yarta mmacmza 11	pengurangan dosis	sakit perut	,kering dan
		400			hingga 100 mg	mulut kering	terlindung dari
					diminum 1 kali sehari	gangguan tidur	cahaya dan
		31 0			direkomendasikan	(insomnia)	kelembapan
						pusing sakit	more ap an
						kepala,	
		N.A.			- TK //	kecemasan	
		1.1				sulit	
					L //	berkonsentrasi	
					- //		
OS	seltamivir	Oseltamivir	Pasien	Infeksi virus	Dewasa: 75mg 2xsehari	Sakit perut,	Simpan pada
			hipersensitif	influenza tipe A		sakit kepala,	suhu di bawah
			terhadap	dan B		mual dan	30°C, terlindung
			oseltamivir			muntah	dari cahaya

(2.d) ANTIPROTOZOA

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antiamoeba	metronidazole	Flagyl 500mg tablet	Pasien hipersensitif terhadap metronidazole	Uretritis dan vaginitis, amubiasis	-Dewasa amubiasis: 500-750mg 3xsrhari selama 5-10 hari terus menerus - Anak-anak amubiasis: 35-50mg/kg BB/haridalam 3 dosis terbagi selama 7-10 hari	Mual, muntah dan diare	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
Antimalaria	primaquine,	Primaquine	Peningkatan resiko terjadinya efek samping dari primaquine jika digunakan dengan mepacrine peningkatan resiko terjadinya gannguan irama jantung, jika digunakan dengan dolasetron procanamide., fingolimod atau qunindine, peningkatan resiko gangguan sumsum tulang yang bisa menurunkan produksi sel darah jika digunakan dengan deferipone atau obat yang memiliki efek	Mencegah dan mengobati malaria	Dewasa 15 mg per hari selama 14 hari. Pengobatan akan dikombinasikan dengan obat antimalaria lain. Dosis dapat ditingkatkan atau durasi pengobatan dapat diperpanjang sesuai kondisi pasien. Anak – anak 250 mg/kg 1 kali sehari selama 14 hari dosis mekasimal 15 mg per hari	Mual atau muntah pusing sakit perut dan kram perut	Simpan di tempat sejuk dan kering serta terhindar dari sinar matahari dan jangkauan anak

artemisinin,	Artemisin	menekan kerja sumsum tulang belakang. Riwayat alergi artemisin. Malaria berat atau disertai komplikasi riwayat aretmia (gangguan irama jantung) atau bradikardia (denyut jantungyang lambat di bawah normal) riwayat keluarga mengalami serangan jantung	Pengobatan malaria tanpa komplikasi yang disebabkan oleh infeksi parasit plasmodium falciparum dan atau plasmodium vivax	5 kg (usia 0-1 bulan)1/4 tablet per hari 6- 10 kg usia 2-11 bulan 1/2 tablet /hari 11-17 kg usia 1-4 thn 1 tabletb per hari 18 – 30 kg usia 5-9 thn 1 1/2 tablet / hari 31-40 kg usia 10-14 thn 2 tablet / hari 41-59 kg usia . 15 thn 3 tablet/ hari 60 kg usia .25 thn 3 tablet per hari	Anemia (kuranf darah) sakit kepala pemanjangan interval QT, takikardia (denyut jantung yang cepat diatas normal) kelelahan / lemah demam konjungtivitis (peradangan selaput yang melapisi mata	Simpan di tempat sejuk dan kering serta terhindar dari sinar matahari dan jangkauan anak
doksisiklin	Dohixat 100mg kapsul	Alergi terhadap tetrasiklin	Infeksi saluran pernapasan, infeksi saluran kemih, infeksisaluran cerna	- Dewasa dan anak-anak >8tahun denan BB >45kg: Pada hari ke-1:100mg 2xsehari. Dianjutkan 100mh/hari - Anak-anak >8tahun dengan BB <45kg: Pada hari ke-1: 4,4mg/kg BB/hari dalam terbagi 2 dosis, selanjutnya 2,2mg/kg BB/hari	Mual, muntah, diare, terkadang ruam pada kulit	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya

(2.e) ANTELMINTIK

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antelmintik	albendazole,	Albendazole tablet chew 400mg	Pasien hipersensitif terhadap albendazole	Mengobati infeksi yang disebabkan oleh infeksi larva cacing	- Echinococcosis Dewasa BB <60kg: 15mg/kg BB/hari, 2xsehari maksimal 800mg per hari Dewasa BB 60kg keatas: 400mg 2xsehari dalam waktu 28 hari - Infeksi cacing tambang dan cacing kremi: Dewasa dan anak-anak diatas 2 tahun: 400mg sekali sehari Anak-anak <2tahun: 200mg/hari. Dosis maksimal 200mg sehari	Mual, muntah, sakit perut	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
	mebendazole,	Vermox 500mg tablet chew	Pasien hipersensitif terhadap mebendazole	trikhuriasis, askariasis (infeksi cacing gelang), oxyuriasis (infeksi cacing kremi), ankilostomiasis/in feksi cacing tambang	Dewasa dan ana-anak diatas 5 tahun : 1xsehari 1 tablet dikunyah	Gangguan saluran pencernaan, mual, muntah, sakit perut	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
	pirantel pamoat,	Combantrin	Pasien	Untuk mengatasi	Untuk sekali		Simpan ditempat
	dietilkarbamazine	tablet	hipersensitif	infeksi yang	pengobatan :		yang kering pada

(DEC),		terhadap	pirantel	disebabkan	oleh	- usia 2-6tahun	: 1/2	Nafsu	makan	suhu di ba	wah
piperazine		pamoat		cacing	kremi,	tablet-1tablet		hilang,	mual,	30°C, terlind	lung
				cacing	gelang,	- usia 6-12tahun	: 1-1	muntah,	, diare	dari cahaya	
		11.11		cacing tam	bang	½ tablet					
						- usia >12tahun;					
				10.70 1 1		1 ½ tablet-2tablet					
				rvi cu			ъ.				
	- 11.7										
	1//	A. II				7.77.2	\				
	11/					107	- 74				

(2.f) OBAT TB

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat TB	Rifampisin,	Rifampicin tablet	Pasien hipersensitif terhadap rifampicin	Terapi TB dan lepra	- TB Dewasa 50kg ke atas: 600mg 1xsehari Dewasa <50kg: 450mg 1xsehari. Diberikan dosis tunggal selama 4 minggu. Untuk 5 bulan selanjutnya 600mg 2xseminggu Anak-anak: 10-20mg/kg BB/hari. Maksimal 600mg/hari dosis tunggal - Lepra: Dewasa: 600-900mg/hari	Urin berwarna merah	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya

eta	ambutol,	Ethambutol 500mg tablet	Neuritis optik dan ana-anak <13tahun	Terapi TB paru yang resisten	15-25mg/kg BB/hari dosis tunggal tiap 24 jam	Penurunan daya penglihatan dan ruam alergi	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
iso	oniazid,	Isoniazid 400mg tablet	Pasien hipersensitif terhadap INH	Terapi TB paru	- Dewasa : 4-5mg/kg BB/hari dosisi tunggal atau dosis perhari. Maksimal 300mg/hari - Anak-anak : 10- 20mg/kg BB/hari dosis tunggal atau dosis terbagi	Insomnia, kedutan pada otot dan kejang	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
pir		Pyrazinamide 500mg tablet	Kerusakan hati berat	Terapi TB paru	- Dewasa >60kg: 1500mg/hari 3xsehari - Dewasa 40-60kg: 1000mg/hari 3xsehari - Dewasa <40kg: 750mg/hari 3xsehari	Hepatotoksik dan hiperutisemia	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya

(3) ANTIHISTAMIN DAN ANTIALERGI

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
		Tempat PKL					
Generasi I	chlorpheniramine,	Alleron tablet	Pasien	Antihistamin	- Dewasa : 3-4xsehari 1	Mengantuk	Simpan pada
			hipersensitif	untuk keadaan	tablet		suhu di bawah
		74.74	terhadap	alergi seperti	- Anak-anak 6-12tahun:		30°C, terlindung
		7.7	chlorpheniramin	urtikaria, rinitis	3-4xsehari ½ tablet		dari cahaya
		1	maleat				
	diphenhyramine	Allerin syrup	Pasien	Antialergi	- Dewasa dan	Mengantuk	Simpan pada
			hipersensitif		anak usia 12tahun		suhu di bawah
			terhadap		keatas : 25–50 mg, 3–4		30°C, terlindung
			diphenhyramine		kali sehari. Dosis		dari cahaya

Generasi II	Ketotifen,	Intifen	Hipersensitif penggunaan	Pencegahan jangka panjang		Pusing.	Simpan di tempat sejuk
			bersama atidiabetik oral	unutk asma bronkial	ditingkatkan hingga 2 x sehari 2 tablet anak . 3 tahun 2x sehari 0,5 sesudah makan	mengantuk	dan kering serta terhindar dari sinar matahari dan jangkauan anak
	loratadine,	Alloris tablet dan Alloris syr	Pasien hipersensitif terhadap loratadine	Rinitis alergi alergi kulit	- Dewasa dan anak-anak >12tahun : 1 tablet 1xsehari atau 2sendok teh (10ml) /hari - Anak-anak 6-12tahun dengan BB>30kg : 2 sendok teh (10ml)/hari - Anak-anak 6-12tahun dengan BB <30kg : 1 sendok teh (5ml)/hari	Mual dan sakit kepala	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
	cetirizine	Cerini	Hipersensitif gangguan ginjal berat	Rinitis menahung alerg seasonal, konjungtuvitas, pruritus, urtikaria, indiopatu kronis	Dewasa dan anak umur . 12 tahun 10 mg sekali sehari. Anak umur 2-6thn: 2,5 mg 2 kali sehari lansia belum ada data unutk menurunkan dosis pada pasien pasien lansia. Insufisiensi ginjal dosis ½ kali dosis yang dianjurkan	Gangguan jantung takikardia, gangguan gastrointestinal: sakit perut, mulut kering mual diare muntah , gangguan umum dan kondisi tempat pemberian	Simpan di tempat sejuk dan kering serta terhindar dari sinar matahari dan jangkauan anak

			15	MUH		kelelahan asthenia, malaise, edema, gangguan sisitem saraf, pusing, sakit kepala, kejang, agitasi	
Generasi III	Desloratadin	Aerius tablet	Pasien	Meringankan	- Dewasa dan anak-anak		Simpan pada
		//	hipersensitif	gejala rinitis	>12 tahun :		suhu di bawah
		/// (terhadap	alergi	5mg 1xsehari		30°C, terlindung
			desloratadine				dari cahaya

(4) SITOSTATISTIKA

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Sitostatika	siklofosfamid,	Cyclophosphamide	Pasien dengan riwayat hipersensitivitas terhadap obat siklofosfamid	digunakan dalam pengobatan sindrom nefrotik	Kodisi: kanker Dewasa: dosisnya 40-50 mg/kgBB yang dibagi pemberiannya selama 2-5 hari dan akan diulang setelah 2-5 minggu pengobatan. Kondisi: kanker payudara dewasa dosisnya 600mg luas permukaan tubuh (LPT) bisa dikombinasikan dengan obat antikanker lain	Mual, muntah, diare, sakit perut, kulit dan kuku berwarna merah, menjadi lebih gelap, rambut rontok	Disimpan pada suhu ruangan. Pastikan untuk tidak menyimpannya tempat yang lempab dan jauhkan dari cahaya matahari

doksorubisin, 5-	Doxorubicin	Riwayat alergi hipersensitifitas	Terapi pengobatan leukimia akut, tumor wilm, nueroblastoma, sarkoma jaringan lunak dan tulang. Kanker payudara,	Kondisi: limfona non hodgkin dewasa dosis nya 600 -1.500 mg/(LPT) kondisi sindrom nefrotuk dewasa dosis 2-3 mg/kgBB bisa diberikan sampai 12 minggu ketika pengobatan dengan kortikosteroid tidak berhasil Dosis alternatif 1: 60 – 75 mg tiap 21 hari sakali dosis alternatif 2: 60mg tiap 14 hari sekali dosis alternatif 3: 40-60 tiap 21-28	Mual muntah diare, kehilangan selera makan, rambut rontol, selama pengobatan, infeksi jamur dan kuku	Disimpan pada kulkas dengan suhu 2-8°C
doksorubisin, 5-	Doxorubicin		pengobatan leukimia akut, tumor wilm, nueroblastoma, sarkoma jaringan lunak dan tulang.	60 – 75 mg tiap 21 hari sakali dosis alternatif 2 : 60mg tiap 14 hari sekali dosis alternatif 3 :	kehilangan selera makan, rambut rontol, selama pengobatan, infeksi	kulkas dengan
			limfoma (kanker mengobati berbagai jenis penyakit kanker sepetu, seperti			

			kanker usus besar (kolorektal, kanker lambung dan kanker payudara			
fluorourasil,	Fluorouracil	Reaksi hipersensitivitas	Mengobati berbagai jenis penyakit kanker, seperti kanker usus besar, (kolorektal), kanker lambung dan kanker payudara	Dosis fluorourasil yang direkkomendasikan Ialah 200mg m2 LPT. Obat diberikan melalui infus IV secara terus menerus dalam tiga minggu yang terhitung sebagai satu siklus	Mual, muntah, nafsu makan menurun, diare dan sembelit	Simpan di suhu 20 - 25°C
carboplatin,	Caboplatin	Jangan digunakan unutk pasien yang mempunyai riwayat hipersensitif	Mengobati kanker tertenu seperti kanker ovarium	Dewasa untuk pasien dewasa yang belum pernah mendapatkan pengobatan sebelumnya, dosisnya adalah 400 mg/m2 LPT	Sakit perut, nyeri atau rasa tidak enak badan, mual dan muntah nyeri otot sendi atau tulang	Simpan pada suhu ruang 15°C
metroteksat	Rheu trex	Gangguan ginjal hati berat	Mengatasi kaner, seperti kanker payudara, chriocarcinoma, leukimia, kanker tulang, limfoma	Dosis 15-30mg per hari selama 5 hari. Dosis kembali diberikan setelah jeda minimal 1 minggu pengulangan dosis	Sakit kepala, kantuk, pusing, gusi terasa sakit dan bengkak	Simpan dalam wadah tertutup di tempat yang sejuk dan kering hindarkan obat

		atau mycosis fungoides	dapat dilakukan 3- 5kali	dari paparan sinar matahari
	/ _ 1	Alter	1	
//	P2	" OHY	. 11	

(5) OBAT SISTEM SARAF

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat hipnotik sedatif/antiansie tas	benzodiazepin (alprazolam, diazepam, lorazepam, nitrazepam),	Alprazolam tablet	Pasien hipersensitif terhadap golongan benzodiazepin	Gangguan ansietas	- Pasien ansietas : 0,25mg-0,5mg 3xsehari - Pasien geriatrik atau dalam keadaam lemah : 0,25mg 2-3xsehari	Mengantuk, kepala terasa ringan	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
		Valisanbe tablet	Psikosis berat, bayi baru lahir atau prematur, wanita hamil trimester 1	Gangguan otot akibat trauma, status epileptikus, reumatik	- Dewasa : 2-5mg 3xsehari - Anak 6-14 tahun: 2-4mg 3xsehari	Gangguan mental, mengantuk	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
	barbiturat (fenobarbital),	Amobarbital	Obstruksi saluran peernapasan porfiria, sleep apnea, depresi sistem saraf pusat kambuhan atau orang yang koma	Digunakan dalam pengobatan insomnia berat	Dewasa awal : 3 x sehari 5 mg dapat ditingkatkan menjadi 5 mg interval 2-3 hari sampai efek teraupetik optimal diperoleh	Kantuk, pusing, muntah, konstipasi, vertigo	Simpan dalam wafah yang kering dan suhu sejuk. Jauhkan obat ini dari jangkauan anak- anak

_							
	lainnya (buspiron)	Xiety	Hipersensitif	Gangguan ansietas umum dan gejala ansietas ninspesifik dengan atau tanpa depresi	Total dosis harian 20-30 mg sehari dalam 2-3 dosis terbagi	Sedasi ketidaknyama nan lambung, kesulitan tidur, pusing, gelisah, pusing gugup	Sipan pada suhu dibawah 30°C
Obat analgetik sentral	fentanil,	Fentanyl	Hipersensitivitas yang diketahui terhadap fentanil atau komponen lain dari formulasi	Nyeri tiba tiba pada pasien yang sudah dalam terapi opioid unutk nyeri kanker kronik, nyeri kronik yang sukar ditangani indikasi lain	Dewasa dan anak usia . 2 tahun 25-100 mcg/jam diberikan setiap 72 jam	Rasa panas, gatal, perih bengkak, kesemutan, perubahan warna kulit, muntah, berkeringat	simpan pada suhu 20-25°C terhindar dari cahaya
	petidin,	Petidin	Hipersensitivitas terhadap obat ini	Untuk manajeman nyeri derajat sedang, berat misalnya akibat persalinan, pankreatiitis atau kolelitiasis	Dewasa dosisnya sekitar 25-150 mg melalui injeksi IM atau SC setiap 4 jam sesuai kebutuhan juga dapat diberikan melalui injeksi IV lambat dengan dosis 25-50 mg diulang setiap 4 jam sesuai kebutuhan	Sesak nafas, nafas menjadi lebih lamabt, depresi disertai tubuh kelelahan	simpan pada suhu 20-25°C terhindar dari cahaya
	morfin,	Morfin	Hipersensitivitas terhadap obat dan pasien dengan gejala depresi pernafasan	Untuk meredakan nyeri yang tidak bisa diatasi fdengan analgesik	Dewasa 5-20mg tiap 4 jam. Anak usida 1-5 tahun 5 mg tiap 4 jam dosis maksimal 30 mg anak usia 6-12 thn 5-10 mg tiap 4 jam	Sistem saraf pusat termasuk gangguan autonom dan depresi napas	simpan pada suhu 20-25°C terhindar dari cahaya

	nalokson.	nalokson	Hipersensitivitas terhadap obat	nonnarkotik. Hal ini mencakup kondisi pre dan pasaca operasi infark miokard dan nyeri pada pasien kanker Reversal pernapasan pasca pemberian obat opioid terapeutik dan pasca operasi maupun mengurangi efek samping	Orang dewasa, nalokson hidroklorida 100-299mcg Pemberian tambahan 100 mcg bila pasien memerlukan dengan interval 2-3menit. Dokter akan melakukan penggulangan dosis dalam 1-2 jam tergantung jenis dan interval waktu	Hipotensi, takikardia ventrikel hingga henti jantung	simpan pada suhu 20-25°C terhindar dari cahaya
Obat antidepresan	amitriptilin,	Amitriptilin tablet	Pasien hipersensitif terhadap amitriptilin	dari pemberian opioid secara epidural Untuk mengobati depresi dan nyeri saraf	pemberian opioid terakhir Dosis awal 25mg 2xsehari selama 2 minggu hingga 6 bulan	Mengantuk	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
	imipramin,	Imipiramin	Infark miokard akut	Deperesi	Dosis anjuran untuk pasien depresi 75-150mg per hari	Sering : antikolinergik Jarang : gangguan fungsi hati, Gangguan kardiovaskuler	Simpan obat pada suhu ruang ,30°C ditempat yang sejuk dan kering.tertutup rapat dan jauhkan dari

	fluoksetin,	Fluoxetin	Hipersensitif, gagal ginjal berat	Depersi, bulimia nervosa, gangguan obsesif komplusif	Dosis anjuran untuk depresi 20-40mg perhari	Diare, m,muntah dispepsia, sakit kepala insomnia,anor eksia,kelelaha n,tremor,gang guan cemas, hiponaltremia	jangkauan anakanak Simpan obat pada suhu ruang ,30°C ditempat yang sejuk dan kering.tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anakanak
	setralin	Setralin	hioersensitivitas	Depresi, kelainan obaesitas komplusif, gangguan stres pasca trauma	Dosis anjuran unutk depresi 50-100 mg perhari	Mual, diare, gangguan fungsi seks pria, tremor, mulut kering,jumlah keringat meningkat,dip epsia,anorekia, insomnia,pusi ng	Simpan obat pada suhu ruang ,30°C ditempat yang sejuk dan kering.tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anakanak
Obat anestesi lokal	bupivakain, lidokain	Topsy cr	Penderita yang hipersensitif	Anestesi lokal untuk bedah kulit superfisial, kebocoran vena pada anak- anak mengikis moluskum kontagiosum (penyakit kulit karena virus yang	Gunakan dengan lapisan tebal (2,5 – 5gram atau ½ tube) untuk setiap pemakaian area/lebar kulit maksimal pada pemakaian sebanyak 1 gram : 10cm persegi	Eritmia, edema, sensasi abnormal pucat, urtikaria, angiodema, bronkospasme, syok	Simpan obat pada suhu ruang ,30°C ditempat yang sejuk dan kering.tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anak- anak

Obat sistem	prostigmin,	Mestinon	Hipersensitif	menimbulkan bintil keputihan dengan cekungan di tengahnya, berisi sesuatu yang menyerupai butir nasi) pada anak – anak kauteri kondiloma akuminata, biopsi vulva/pukas Miastenia	Miastenia gravis dewasa	Mual,	Simpan pada
sarafotonom (antikholinergik , kholinergik)	prostiginin,	Mestinon	terhadap bromida.obstruksi GI atau sel kemih, asma bronkial	gravis, ileus paralitik dan retensi urin pasca operasi	30-120mg/haru. Anak 6- 12 thn 60mg/hari,6 tahung : 30mg/hari sesudah makan	muntah,hipers elivasi, diare,jram abdomen	suhu ruang danjangkauan daru jangkauan anak – anak
	pilokarpin,	Cendo carpine 2% eye drops 5 ml	Hipersensitif	Anti glaukoma simplek kronis	Diteteskan pada mata yang sakit	Sakit kepala, mata terasa gatal dan perih pengelihatan kabur	Simpan pada suhu ruang danjangkauan daru jangkauan anak – anak
	atropin,	Atropin sulfat	Glaukoma sudut tertutup, sudut sempit antara iris dan kornea, blok AV derajat 2 atau 3, akalasia kerongkongan, ileus paralitik,	Mengurangi air liur, lendir, atau sekresi lain di saluran napas selama operasi	Diberikan dosis 500 mcg, setiap 3-5 menit. Dosis total 3mcg disuntikan melalui pembuluh darah (intravena)	Sakit kepala, penghlihatan kabur,kelopak mata membengkak dan mata sensitif terhadap	Simpan pada suhu 15-30°C ditempat kering dan sejuk

		kolitis ulserativa berat, antonia usus, megakolon toksik,stenosis pilonik, hipertrofi prostat, urat obstruktif,uropati obstruktik, miastenia gravis	MUA	4,4	cahaya, mulut dan tenggorokan terasa kering gangguan indra pengecap (lidah)	
pirenzepin,	Pirenzepin	Alergi terhadap pirenzepin atau zat lain yang terkading di dalam obat	Menurunkan produksi asam lambung dan pepsin	Dewasa 50mg dikonsumsi 2-3 kali sehari selama 4-6minggu	Mulut kering, penglihatan kabur	Simpan pada suhu 15-30°C ditempat kering dan sejuk
ipratropium,	Aerorol	G R	Meredakan dan mencegah gejala karena penyempitan saluran pernafasan (bronkopasme) seperti mengi atau sesak napas akibat penyakit paru obstruktif kronik (ppok)	Dewasa dan anak – anak usia .12 thn 20mcg. 3-4 kali sehari Anak – anak usia 6-12thn 20-40mcg 3 kali sehari Cara penggunaan ipatropium aerosol (inhaler) buka kunci pengaman kemasan inhlaer. Buang napas terlebih dahulu sebelum menghiruo dari inhaler. Letakkan moncong inhaler di dalam mulut. Tutup bibir rapat – rapat lalu tariknapas dalamcdalam jangan mengigit moncong inhaler	Gejala flu seperti hidung tersumbat bersin atau sakit tenggorokan, pusing atau sakit kepala, mual sakit perut mulut kring konstipasi atau sembelit	Simpan pada suhu 15-30°C ditempat kering dan sejuk

	skopolamin,	Skopolamain	Alergi terhadap alkaolid belladona lainnya dan glaukoma sudut tertutup	Mengatasi kram perut, usus atau saluran kemih	Dewasa: 20mg 4 kali sehari Anak-anak usia 6-11 tahun 10 mg 3 kali sehari	Mulut kering gangguan saluran cerna, pusing, penglihatan kabur	Simpan pada suhu 15-30°C ditempat kering dan sejuk
	triheksifenidil	Arkine	Retensi urine, glaukoma, obstruksi saluran cerna	parkinson	2mg diberikan 2-3 kali sehari. Rentang dosis 10- 20 mg per hari tergantung respon pasien	377	Simpan pada suhu 15-30°C ditempat kering dan sejuk
Obat sistem sarafotonom (adrenergik, antiadrenergik)	klonidin,	Catapres	Riwayat sensitsasi atau reaksi alergi terhadap clonidine	Pengobatan hipertensi baik tunggal maupun kombinasi dengan obat hippertensi yang lain	75-150 mg per hari	Mulut kering dan sedasi mual muntah, pusing,impote n, penurunan libido	Simpan pada suhu 15-30°C di tempat kering dan sejuk
	fenilefrin,	Nipe drop	Asma, diabetes, hipertensi	Untuk meredakan gejala hidung tersumbat Aritmia	- Anak >6tahun : 10ml 3- 4xsehari - Anak 2-6tahun : 5ml 3- 4xsehari	Mual dan dapat mengiritasi lambung	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
	noradrenalin,	Noradrenalin		hipovolemia	Hipotensi akut : dosis awal 8-12 mcg permenit melalui infus dan dapat ditingkatkan untuk mendapatkan efektivitasnya dosis :	dingin pada tubuh, bibir atau kuku yang membiru. Kesulitan bernafas,	Simpan pada suhu 15-30°C di tempat kering dan sejuk

adrenalin,	epinephrine	Hipertensi, jantung koroner	Syok anafilasi, alergi berat, bronkospasme	perawatan 2-4 mcg per menit melalui infus Gelisah palpitasi, tremor, sakit kepala, aritmia, stroke hemoragik	buang air kecil hanya sedikit atau tidak ada sekali Gejala simpatis seperti palpitasi, angina, gelisah, berkeringat, ekstrenitas, dingin/pucat dan tremor	Simpan pada suhu 15-30°C di tempat kering dan sejuk
fenoterol,	berotec	kardiomiopati obstruktif, hipertrofik, takiaritmia	Episode asma akut, pencegahan asma yang timbul akibat aktifitas fisik. Asma brokial & kondisi lain dimana terjadi penyempitan saluran pernafasan yang bersifat reversibel	Episode asma akut 1: puff/semprot jika pernapasan tidak tampak membaik sesudah 5 menit dapat diberikan semprotan/puff ke 2 pencegahan asma akibat aktivitas fisik asma bronkial dan kondisi lain	Gemetar halus Otot rangka, gugup, takikardia, pusing, berdebar atau sakit kepala iritasi lokal mual, muntah, berkeringat, otot lemah, mialgia,kram otot	Simpan pada suhu 15-30°C di tempat kering dan sejuk
terbutalin,	Terasma tablet	Penderita gangguan fungsi hati yang berat	melegakan sesak napas pada asma bronkial,	- Dewasa dan anak >12tahun : 1-2 tablet 2- 3xsehari	Tremor dan kram	Simpan pada suhu di bawah

				bronkitis kronis,			30°C, terlindung dari cahaya
salt	butamol,	Lasal kapsul	Pasien hipersensitif terhadap salbutamol, kehamilan trimester 1 dan 2	kejang bronkus pada semua jenis asma bronchial, bronchitis kronis	- Dewasa dan anak >12tahun : 3-4xsehari 2-4mg - Anak 8-12tahun : 3- 4xsehari 1-2mg	Tremor dan kejang otot	Simpan pada suhu di bawah 30°C
pro	opanolol,	Propranolol tablet	Riwayat bronko plasme	terapi antihipertensi, angona pectoris	- Dewasa dan anak >12tahun angina pectoris : 20mg 304xsehari - Dewasa dan anak >12tahun hipertensi : 20mf 3xsehari	Kelemahan otot	Simpan pada suhu di bawah 30°C,
ater	enolol,	Farnormin 50mg tablet	Gagal jantung berat dan asma bronkial	terapi antihipertensi, angona pectoris	Hipertensi : 50mg/hari dapat ditingkatkan sampai dengan 100mg/hari Angina pectoris : 100mg/hari	Sakit kepala dan vertigo	Simpan pada suhu di bawah 30°C,
pra	nzosin	Prazosin tablet	Pasien hipersensitif terhadap prozosin	Pengobatan hipertensi	Dosis awal 0,5mg 2-3xsehari, dosis dapat ditingkatkan 1mg 2-3xsehari	Mual, muntah dan diare	Simpan pada suhu di bawah 30°C,

(6) OBAT KARDIOVASKULAR

(6.a) Obat antihipertensi

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Diuretik	furosemid,	Lasix tablet	Gagal ginjal akut	Sebagai diuretik, edema jantung, ginjal dan hati	Dosis awal 20-80mg dosis tunggal	Dehidrasi	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
	нст,	Hydrochlortiaz ide tablet	Pasien hipersensitif terhadap hydrochlortiazide	Sebagai diuretik, edema jantung, ginjal dan hati	- Edema: dosis awal 5- 10 mg sehari - Hipertensi: 12,5 – 25 mg perhari dosis tunggal pada pagi hari	Dehidrasi	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
	spironolakton,	Spironolacton tablet	Wanita hamil dan menyusui	Hipertensi dan edema jantung	- Hipertensi : 100/hari - Edema jantung : 50- 100mg/hari dalam dosis tunggal atau terbagi	Kram, diare, meengantuk	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
	amilorid	Lorinid mite	Sensitif terhadap tiazid, sulfonamid,amilor id, Hiperkalemia terpau dengan diuretik hemat, k lain dan suplemen k anuria, gagal ginjal akut, anak	Hipertensi esensial, edemia akibat CHF/ gagal jantung kongesif, sirosris hepatik disertai asites	1 tablet perhari sesudah makan	Imbalans elektrolit, anoreksia, gangguan GI, parestesia, haus, pusing, hiperurisemi a, hipotensi postural, ruam kulit,	Simpan di tempat sejuk dan kerinh serta terhindar dari sinar matahari dan jangkauan anak

			/ 15 5 / 12 5 / 12	MUH		pruiritus, lemah kram otot, prubahan psikiatrik atau visual ringan meingkatkan konsentrasi BUN jarang: kolestatik pankreat	
ССВ	Amlodipine,	Cardisan tablet	Pasien hipersensitif terhadap amlodipine	Untuk pengobatan hipertensi	Dosis awal diberikan 5mg/hari maksimum 10mg/hari	Edema dan sakit kepala	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
	nifedipin,	Farmalat tablet	Pasien hipersensitif terhadap nifedipine	Untuk terapi hipertensi dan pengobatan insufisiensi kosoner terutama angina pectoris	- Dosis tunggal: 5- 10mg/ hari - Dosis rata-rata: 5-10mg 3xsehari	Sakit kepala	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
	Verapamil	Isoptin SR tablet	Pasien hipersensitif terhadap verapamil	Untuk pengobatan hipertensi dan angina pectoris	1 kaplet pada pagi hari	Sakit kepala dan pusing	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
	nicardipine	Nidaven inj	Pasien hipersensitif terhadap nicardipine	Untuk terapi kegawat daruratan krisis hipertensi akut selama pembedahan	2-10mcg/kg BB/menit hingga nilai TD yang diinginkan tercapai	Rasa panas dan kemerahan pada wajah	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya

ARB	Losartan,	Losartan tablet	Pasien	Sebagai	Dosis awal 50mg	Edema dan	Simpan pada
			hipersensitif terhadap losartan	antihipertensi	1xsehari, dapat ditingkatkan sampai dengan 100mg/hari. Diberikan 1-2xsehari	sakit k epala	suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
	valsartan,	Diovan tablet	Pasien hipersensitif terhadap valsartan	Pengobatan hipertensi	Dosis awal 80mg 1xsehari, dpaat ditingkatkan sampai dengan 160mg/hari	Sakit kepala, diare, infeksi saluran napas	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
	candesartan,	Candesartan tablet	Pasien hipersensitif terhadap candesartan	Pengobatan hipertensi	Dosis awal 4mg 1xsehari, dosis dapat ditingkatkan sampai dengan 14mg/hari	Back pain, pusing	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
	irbesartan,	Irvask tablet	Pasien hipersensitif terhadap irbesartan, kehamila trimester 2 dan 3, ibu menyusui	Pengobatan hipertensi	Dosis awal 150mg/hari, dapat ditingkatkan sampai dengan 300mg/hari. Diminum bersama makan atau sesudah makan.	Mual dan muntah, diare, pusing	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
	telmisartan	Termisartan tablet	Pasien hipersensitif terhadap telmisartan	Pengobatan hipertensi	Dosis awal 60mg/hari	Mual dan munta, diare	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
ACEI	Kaptropil,	Farmoten tablet	Pasien hipersensitif terhadap captopril, wanita	Untuk pengobatan hipertensi	Dosis awal 12,5mf 2xsehari. Dosis pemeliharaan 25mg 2xsehari dapat	Batuk kering, terkadang ruam	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya

			hamil dan menyusui		ditingkatkan bertahap 2-4minggu. Dosis maksimum 50mg 2xsehari		
	lisinopril,	Interpril tablet	Pasien hipersensitif terhadap lisinopril	Untuk pengobatan hipertensi	Dosis awal 5mg 1xsehari, dapat ditingkatkan sampai dengan 10mg 1xsehari	Mual, muntah, pusing	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
	ramipril	Ramipril tablet	Pasien hipersensitif terhadap ramipril	Untuk pengobatan hipertensi	Dosis awal 2,5mg/hari, dosis pemeliharaan 2,5-5mg/hari, dosis maksimum 10mg/hari	Mual, muntah, pusing	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
Beta blocker	Atenolol,	Farnormin 50mg tablet	Gagal jantung berat dan asma brobkial	terapi antihipertensi, angona pectoris	Hipertensi: 50mg/hari dapat ditingkatkan sampai dengan 100mg/hari Angina pectoris: 100mg/hari	Sakit kepala, vertigo	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
	propanolol,	Propranolol tablet	Riwayat bronko plasme	terapi antihipertensi, angona pectoris	- Dewasa dan anak >12tahun angina pectoris : 20mg 304xsehari - Dewasa dan anak >12tahun hipertensi : 20mg 3xsehari	Kelemahan otot	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
	bisoprolol	Concor tablet	Gagal jantung akut	terapi antihipertensi, angona pectoris	Dosis awal 5mg/hari, dapat ditingkatkan 10mg/hari	Mual, muntah, diare, pusing	Simpan pada suhu di bawah

							30°C, terlindung dari cahaya
Alfa blocker	Prazosin, hidralazin	Prazosin tablet	Pasien hipersensitif terhadap prazosin	Pengobatan antihipertensi	Dosis awal 0,5mg 2-3xsehari, dosis dapat ditingkatkan 1mg 2-3xsehari	Mual, muntah, diare	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
Sentral	Metildopa,	Dopamed 250mg tablet	Pasien hipersensitif terhadap Metildopa	Pengobatan antihipertensi	Dosis awal 250mg 2- 3xsehari selama 3 hari	Pusing, sakit kepala	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
	klonidin	Catapres 75mcg tablet	Sindrom sick- sinus	Pengobatan antihipertensi	Dosis awal 0,075mg- 0,15mg/hari, dapat ditingkatkan setelah 2- 4minggu	Mulut kering dan sedasi	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya

(6.b) OBAT ANTIANGINA

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di	Kontraindikasi	Indikasi	Indikasi Dosis dan Cara Pakai		Cara Simpan
		Tempat PKL				Samping	
Obat antiangina	Isosorbide	Cedocard	Pasien	Untuk pengobatan	- Untuk serangan angina	Nyeri	Simpan pada
	dinitrate,	tablet	hipersensitif	dan pencegahan	pectoris, 1 tablet	kepala yang	suhu di bawah
			terhadap isosorbid	serangan angina	diletakkan di dalam	bersfat	30°C, terlindung
			dinitrate	pectoris	mulut atau dibawah	sementara	dari cahaya
					lidah		

nitrog		,5mg kapsul	Pasien hipersensitif terhadap nitrogliserin	Untuk pengobatan dan pencegahan serangan angina pectoris	 Untuk pengobatan angina pectoris 1-2 tablet 3-4xsehari 1 kapsul 2-3xsehari, telan utuh 	Kolaps mengantuk,	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
--------	--	-------------	--	---	---	----------------------	---

(6.c) OBAT GAGAL JANTUNG KONGESTIF

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek	Cara Simpan
		Tempat PKL				Samping	
Obat gagal	Digoksin	Fargoxin tablet	Pasien	Untuk pengobatan	Dosis awal 0,75-1,5mg	Mual,	Simpan pada
jantung			hipersensitif	gagal jantung	dalam 24 jam	muntah, sakit	suhu di bawah
kongestif			terhadap digoxin	100	diberikan dosis tunggal	kepala	30°C, terlindung
			1.73	1-1-2	1000		dari cahaya
			W V	- W. W C. S	the The		

(6.d) ANTIPLATELET

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek	Cara Simpan
		Tempat PKL				Samping	
Antiplatelet	Asetosal,	Aspilet	Pasien	Pencegahan proses	80-160mg/hari dapat	Iritasi	Simpan pada
		1.1	hipersensitif	pembekuan darah	ditelan utuh atau	lambung,	suhu di bawah
		1000	terhadap aspirin	dalam pembuluh	dikunyah	mual, muntah	30°C, terlindung
		7.7.	100	darah pada pasien	- //		dari cahaya
		74.74		angina tidak stabil,	1.0		
		1 1		pasien infark	and I		
				miokard			
							Simpan pada
	klopidogrel	CPG tablet	Pasien	Untuk menurunkan	75mg 1xsehari		suhu di bawah
		75mg	hipersensitif	aterotrombosis			

terhadap	yang menyertai	Lemah,	30°C, terlindung
clopidogrel	serangan infark	demam,	dari cahaya
	miokard	hernia	-
3/			

(6.e) OBAT DYSLIPIDEMIA

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek	Cara Simpan
Obat dyslipidemia	Simvastatin,	Tempat PKL Cholestat tablet	Pasien hipersensitif terhadap simvastatin	Untuk menurunkan kadar kolesterol	Dosis awal 5-10mg 1xsehari diminum pada malam hari. Dosis maksimum 40mg/hari	Samping Konstipasi, mual, muntah	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
	atorvastatin,	Lipitor tablet	Pasien hipersensitif terhadap atorvastatin	Untuk menurunkan kadar kolesterol	Dosis awal 10mg/hari	Insomnia, mual muntah dan sakit kepala	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
	fenofibrate,	Trolip kapsul	Pasien hipersensitif terhadap fenofibrate, wanita hamil dan menyusui	Untuk hiperkolesterolemia , hipertrigliseridemia , hiperlipidemia	Dosis awal terapi 3xsehari 100mg atau 300mg/hari diberikan sebagai dosis tunggal. Dosis dapat ditingkatkan sampai dengan 4xsehari 100mg	Gangguan gastrointestin al, sakit kepala dan kram otot	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
	gemfibrozil,	Hypofil 300mg kapsul	Pasien hipersensitif terhadap genfibrozil, gangguan ginjal	Untuk hiperkolesterolemia , hipertrigliseridemia	2 kapsul 2xsehari, diberikan ½ jam sebelum makan	Diare, mual dan kembung	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya

	ezetimib	Enzetrol	Hipersensitif	LDL, apoliprotein	1 kai sehari 1 tablet dinkonsumsi dengan atau tanpa makanan dan konsumsi dengan waktu yang sama	nyeri perut,	
--	----------	----------	---------------	-------------------	---	--------------	--

(6.f) OBAT ANTIARITMIA

Golongan	Nama Obat	Nama	Obat di	Kontraindikasi	Indikasi		Dosis dan Cara Pakai		Pakai	Efek	Cara S	impan
		Tempa	at PKL							Samping		
Obat antiaritmia	Amiodaron	Tiaryt tablet	200mg	Disgungsi tiroid, wanita hamil dan menyusui	mencegah	dan aritmia		awal /hari selam	800- na 1-3	1	Simpan suhu di 30°C, ter dari caha	rlindung

7. OBAT SALURAN CERNA

(7.a) Obat gastritis dan tukak lambung

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek	Cara Simpan
		Tempat PKL			/ /	Samping	
Antasida	Al(OH) ₃ ,	Lagesil tablet	Disfungsi ginjal	Untuk terapi	- Dewasa dan anak	Diare,	Simpan pada
	$Mg(OH)_2$,			hiperasiditas	>12tahun:	konstipasi	suhu di bawah
	natrium			lambung, kembung,	1 tablet dikunyah 4-		30°C, terlindung
	bikarbonat			nyeri ulu hati, tukak	4xsehari atau 1-2		dari cahaya
				lambung	sendok teh (5-10ml) 3-		
					4xsehari		
					- Anak-anak <12		
					tahun: ½ -1tablet 3-		

			1	MUH	4xsehari atau 2,5-5ml 3-4xsehari - Diberikan 1-3 jam sesudah makan dan sebelum tidur malam		
H ₂ Bloker	Simetidin,	Disflatyl tablet	Pasien hipersensitif terhadap simethicon	Meredakan kembung dan rasa tidak nyaman di perut karena gas yang berlebih	- Dewasa : 3xsehari 2tablet , dikunyah sesudah makan dan sebelum tidur sesuai kebutuhan	Sendawa	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
	ranitidin,	Rantin 150mg tablet	Pasien hipersensitif terhadap ranitidine	Pengobatan jangka pendek tukak usus 12 jari, tukak lambung	2xsehari 150mg pada pagi dan malam atau 300mg sekali sehari. Diminum sesudah makan malam atau sebelum tidur	Sakit kepala	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
	famotidin	Famocid tablet	Pasien hipersensitif terhadap famotidine	Ulkus duodenum, tukak lambung	40mg 1xsehari sebelum tidur atau 20mg 2xsehari	Kadang- kadang demam dan sakit kepala	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
PPI	Omeprazol,	Pumpitor kapsul	Pasien hipersensitif terhadap omeorazole	Sebagai penghambat sekresi asam lambung, pengobatan jangka pendek tukak duodenum, tukak lambung	20-40mg sekali sehari ditelan utuh dengan air	Sakit kepala, diare	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya

	lansoprazol,	Lapraz kapsul	Pasien hipersensitif terhadap lansoprazole	Sebagai penghambat sekresi asam lambung, pengobatan jangka pendek tukak duodenum, tukak lambung	30mg 1xsehari ditelan utuh dengan air	Sakit kepala, diare	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
	pantoprazol	Pantozol tablet	Pasien hipersensitif terhadap pantoprazole	Sebagai penghambat sekresi asam lambung, pengobatan jangka pendek tukak duodenum, tukak lambung	40mg 1xsehari atau 2xsehari 20mg ditelan utuh dengan air	Sakit kepala, diare	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
Pelindung mukosa	Sukralfat	Ulsafate syrup	Pasien hipersensitif terhadap sucralfate	Sebagai lapisan penghalang terhadap difusi asam, sebagai gastritis	4xsehari 2 sendok takar (10ml) diminum sewaktu lambung kosong(1jam sebelum makan dan sebelum tidur)	Konstipasi	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
Antiflatulen	Dimetilpolisiloks an	Disflatyl tablet	Pasien hipersensitif terhadap dimetilpolisiloksa n	Meredakan kembung dan rasa tidak nyaman di perut karena gas yang berlebih	Dewasa : 3xsehari 2tablet , dikunyah sesudah makan dan sebelum tidur sesuai kebutuhan	Sendawa	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
Analog prostaglandin	Misoprostol	Gastrul tablet	Wanita hamil dan menyusui serta wanita usia subur	Pencegahan tukak lambung yang dipicu oleh obat AINS	200mcg 4xsehari	Keluhan pada ginekologi/k andungan	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya

(7.b) Obat antidiare

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antimotilitas	Loperamid	Lodia tablet	Pasien hipersensitif terhadap loperamide, anak- anak dibawah usia 12 tahun	Untuk diare akut yang tidak diketahui penyebabnya	Dosis awal 4mg, diikuti 2mg setiap selesai buang air besar. Dosis tidak boleh melebihi 16mg/hari	Kembung, mual dan muntah	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
Adsorben	Kaolin pektin,	Neo kaolana	Pasien yang harus menghindari diare	Terapi simtomatik pada diare non spesifik	- Dewasa dan anak >12tahun : 2 sendok makan (30ml) setiap habis buang air besar - Anak 6-12 tahun : 1 sendok makan (15ml) setiap buang air besar - Dewasa dan anak >12tahun :	Konstipasi	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
	attapulgit	Coro-sorb tablet	Pasien hipersensitif terhadap attapulgit	Dapat mengasorbsi racun dk bakteri penyebab diare serta dapat memperbaiki kosistensi faces yang encer	2 tablet setiap buang air besar. Maksimum 12 tablet dalam 24 jam - Anak-anak 6-12 tahun: 1 tablet setiap buang air besar. Maksimum 6 tablet dalam 24 jam	Konstipasi yang biasanya bersifat ringan dan sementara	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
Antisekresi	Bismut subsalisilat	Scantoma	Penurunan efek teraupetik dari sulfinpyrazone,do xycycline,tetracyc line atau probenecid peningkatan kadar methotrecate	Mengatasi diare,mulas dan sakit perut	Dewasa dan anak usia 12 thn ke atas 524 mg tiap 30-60 menit jangan melebihi 8 kali minum dalam 24 jam	Muntah berwarna hitam BAB berdarah atau berwarna hitam sakit perut yang parah, telinga	Simpan pada suhu 15-30°C di tempat kering dan sejuk

	dalam darah	berdenging
	peningkatan	atau tuli
	resiko terjadinya	mendadak
	pendaraham jika	
	digunakan dengan	
	obat pengencer	
	darah, seperti	
	clopidogrel atau	
	warfarin	5-1 N.N.
	peningkatan	*/ L
	resiko terjadinya	
	efek samping jika	
1.1	digunakan dengan	
	obat pereda nyeri	JA 77 [] []
	seperti ibuprofen	
	atau paroxen	

(7.c) Obat laksatif

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek	Cara Simpan
		Tempat PKL				Samping	
Laksatif osmotikgaram	Mg sulfat	Garam Inggris	Pasien hipersensitif terhadap magnesium sulfat	Untuk melancarkan buar air besar dan mengatasi sembelit	Dewasa dan anak >10 tahun : 1 kantong (30gr) Anak 5-10 tahun : ½ kantong (15gr) Larutkan dalam segelas air masak dan diminum sekaligus pada pagi hari sebelum makan	Kram perut, diare	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya

Laksatif		Laxadin syrup	Pasien	untuk mengatasi	Dewasa : 3-6 sendok	Diare, mual	Simpan pada
osmotic	Gliserin,		hipersensitif	konstipasi dengan	takar (15-30ml)	dan muntah	suhu di bawah
alkohol/gula tdk			terhadap gliserin	cara melicinkan	Anak 6-12 : ½ dosis		30°C, terlindung
dicerna				jalannya feses dan	dewasa.		dari cahaya
			37	penambahan	Diminum sekali sehari		
				volume feses secara	pada malam hari		
		100		sistematis sehingga	menjelang tidur		
		111	1 / De W. 1	feses mudah			
		1/		dikeluarkan	1724 NA		
			D 1			D: 1	G: 1
	laktulosa	Lactulac syrup	Pasien yang diet	untuk mengatasi	Dosis awal pada		Simpan pada
		(A.	galaktose dan	konstipasi dengan	dewasa 15-30ml, anak	dan muntah	suhu di bawah
		4.2	galaktosemia	melunakkan feses	6-14tahun 15ml, anak		30°C, terlindung
		1.67	Maria and the	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	1-5 tahun 4-10ml, bayi		dari cahaya
					<1tahun 5ml, pada 3		Kemasan setelah
		The second second	333	100	hari pertama		dibuka tidak
				100	Add Total		boleh lebig dari
I -14:£	Т	D-114-1-1-4	Darian dansan	II	D 11-> 10	NI	2 bulan
Laksatif	Turunan	Dulcolax tablet	Pasien dengan	Untuk mengatasi	Dewasa dan anak >12		Simpan pada
stimulan	difenilmetan	A 45 m.	diagnoso usus	konstipasi	tahun : 2 tablet dosis	dan diare	suhu di bawah
	(bisakodil,		buntu, radang	Street, Street	tunggal.		30°C, terlindung
	fenolftalein),		usus dan nyeri		Anak 6-12 tahun : 1		dari cahaya
	antrakuinon		perut yang hebat		tablet/hari		
					Diminum sebelum		
					tidur malam		

(7.d) Antiemetik

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek	Cara Simpan
		Tempat PKL				Samping	
Antiemetik	Dimenhidrinat,	Omedrinat tablet	Pasien hipersensitif terhadap dimenhidrinat	Mengatasi pusing, mual dan muntah akibat mabuk perjalanan	tahun: 1-2 tablet 3-	Mengantuk	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya

TUGAS KHUSUS PKL D3 FARMASI UMG_KARISMA CAHYANINGRUM_211105005_APOTEK K-24 PPS GRESIK

ondansetron,	Ondansentron tablet	Pasien hipersensitif terhadap ondansentron	Penanggulangan mual dan muntah karena kemoterapi dan radioterapi serta operasi	Dosis pertama 8mg, tablet diberikan 1 jam sebelum pembiusan dilanjutkan 2 dosis berikutnya 8mg	Sakit kepala konstipasi, diare dan mengantuk	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
metoklorpramide,	Primperan tablet dan primperan syup 5mg/5ml	Pasien hipersensitif terhadap metoklorpramide dan penderita epilepsi	Menggulangi mual dan muntah	Dewasa: Tablet: 3xsehari 5- 10mg Syrup: 3xsehari 1-2 sendok teh (5-10ml) (5-10mg) Diberikan 30 menit sebelum makan dan waktu sebelum tidur malam Anak-anak: 0,1mg/kg BB/hari, dalam dosis terbagi. Diberikan 30 menit sebelum makan dan waktu sebelum tidur malam	Pusing dan lelah	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya

(8) OBAT SALURAN NAPAS

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat Batuk	codein,	Codein tablet	Asma bronkial	Antitusif dan analgetik	Dewasa: 10-20mg tiap 4-6 jam Anak 6-12 tahun: 5- 10mg tiap 4-6jam, Anak 2-6 tahun: 1mg/kg BB/hari tiap 4- 6jam	Dapat menyebabkan ketergantunga n obat dan sedasi	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya Disimpan di lemari khusus dengan 2 pintu ganda dan terkunci
	dekstromethorpha n,	Woods ATT syrup	Pasien hipersensitif terhadap dekstromethorpha n	Meringankan batuk tidak berdahak (Antitusif) dengan menekan produksi batuk	Dewasa dan anak >12 tahun : 5-10 ml 3xsehari Anak 6-12 tahun : 5ml 3xsehari	penenang, dan stimulan	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
	gliseril guaikolat,	Guanifenesin tablet	Pasien hipersensitif terhadap gliseril guaikolat	Digunakan untuk batuk berdahak (ekspektoran) dengan mengencerkan dahak disaluran pernapasan	Dewasa: 2-4xsehari 2-4 tablet, maksimum 24 tablet dalam sehari Anak diatas 12tahun: 1-3xsehari 1-2tablet	Mengantuk, mual dan muntah	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
	amonium klorida,	Ikadryl syup	Serangan asma akut	Untuk meredakan batuk yang bekerja sebagai elspektoran (pengencer dahak)	Dewasa: 1-2 sendok takar (5-10ml), 3-4 kali sehari Anak-anak: ½ -1 sendok takar (2,5ml-5ml), 3-4 kali sehari	Sedatif dan sakit kepala	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya

	bromheksin,	Bronkris tablet	Pasien hipersensitif terhadap bromhexin	Sebagai mukolitik yang mengencerkan dahar di saluran pernapasan dan meredakan batuk berdahak	Dewasa dan anak >10 tahun : 1 tablet sehari 3x Anak 5-10tahun : ½ tablet 3xsehari Anak 2-5 tahun : ½ tablet 2xsehari	Mual dan diare	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
	ambroksol,	Epexol tablet dan epexol syr	Pasien hipersensitif terhadap ambroxol	Sebagai sekretolitik yang mempermudah pengeluaran dahak yang kental dan lengket di dalam saluran pernapasan	Dewasa dan anak >12 tahun : 1 tablet 2- 3xsehari Anak 6-12tahun : ½ tablet 2-3xsehari Anak 6-12 tahun : 5ml 2-3xsehari Anak 2-6tahun : 2,5ml 2-3xsehari Anak <2tahun : 2,5ml 2xsehari	Gangguan gastrointestina l ringan dan reaksi alergi	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
	asetilsistein	Fluimucil 200mg kapsul	Pasien hipersensitif terhadap asetilsistein	Mukolitik terapi akut dan kronik penyakit bronkial dan paru	Dewasa dan anak >14 tahun : 400-600mg sehari dalam dosis terbagi Anak 6-14 tahun : 400mg/hari dalam dosis terbagi	Mual dan muntah, pusing	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
Obat asma	terbutaline,	Terasma tablet	Penderita gangguan fungsi hati yang berat	melegakan sesak napas pada asma bronkial, bronkitis kronis,	- Dewasa dan anak	Tremor dan kram otot	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
	salbutamol,	Lasal kapsul	Pasien hipersensitif terhadap	kejang bronkus pada semua jenis	- Dewasa dan anak >12tahun : 3-4xsehari 2-4mg	Tremor dan kejang otot	Simpan pada suhu di bawah

		k	salbutamol, kehamilan crimester 1 dan 2	asma bronchial, bronchitis kronis	- Anak 8-12tahun : 3- 4xsehari 1-2mg		30°C, terlindung dari cahaya
bude		5mg/ml h	Pasien nipersensitif erhadap oudesonide	asma bronkial	Dewasa dan anak >12tahun : 1-2mg 2xsehari pada pagi dan malam hari Anak 3 bulan-12tahun :	Iritasi pada tenggorokan dan batuk	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
	tropium Com mida, nebu	ul h to ij	Pasien nipersensitif erhadap pratropium oromida	Bronkopasme	0,5-1mg 2xsehari 1 unit vial dosis dapat ditingkatkan menjadi 2 unit vial dosis pada kondisi yang berat/parah. Pemeliharaan: 1 unit vial dosis 3-4xsehari	Iritasi pada tenggorokan dan batuk	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
teofi	· ·	mg kapsul h	Pasien hipersensitif terhadap heophylline	Asma bronkial	Dewasa 3xsehari 1 kapsul	Mual, munta dan sakit kepala	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
amir		mg tablet b	Penggunaan persamaan dengan efedrin	Asma	2xsehari 1 tablet	Tukak lambung	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya

(9) VITAMIN, MINERAL, ENZIM

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara	Efek Samping	Cara Simpan
		Tempat PKL			Pakai		
Vitamin	Vitamin A, D, E,	Provital tablet	Pasien	Suplemen vitamin	Sehari 1x1tablet	mual dan	Simpan pada
	K, B1 (thiamin),		hipersensitif	untuk memelihara		muntah	suhu di bawah
	B6(piridoksin),		terhadap	kesehatan tubuh			30°C, terlindung
	asam folat, B12,	11.7	komponen	1.0			dari cahaya
	C		vitamin tersebut		177.4		
Mineral	Ca, P, K, Mg, Na,	Hemobion	Pasien	Suplemen vitamin	Sehari 1x1tablet	Mual dan	Simpan pada
	Cl, Fe, Zn, Mn,	kapsul	hipersensitif	untuk memelihara	h 172-m	muntah	suhu di bawah
	Cu, I ₂		terhadap	kesehatan tubuh			30°C, terlindung
		1.3-	komponen	william.			dari cahaya
			vitamin tersebut				

(10) OBAT SISTEM ENDOKRIN

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat Diabetes melitus	Sulfonilurea (glibenclamide, glimepiride),	Renabetic tablet (glibenclamide)	Pasien diabetes militus tipe insulin	Sebagai antidiabetik oral pada diabetes militus tipe non insulin	Dosis awal 2,5-5mg sehari 1x. Dosis dapat ditingkatkan tidak lebih dari 2,5mg dalam interval mingguan Diminum sebelum makan	Mual	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
		Amaryl tablet (glimepiride)	Pasien diabetes militus tipe insulin	Sebagai terapi tambahan dari diet dan olahraga untuk menurunkan kadar gula darah pada pasien dengan diabetes tipe II	Dosis awal 1mg sekali sehari, jika diperlukan dosis dapat ditingkatkan. Diminum segera sebelum sarapan atau segera sebelum	Mual, muntah sakit kepala	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya

		I			1		
					makanan yang pertama kali dimakan.		
	netformin,	Forbetes 500mg	Pasien	Untuk tarani nada	kan dimakan.	Congguen	Simpan pada
	letioriiii,	tablet	hipersensitif	Untuk terapi pada pasien diabetes	Dosis awal 500mg	Gangguan gastrointestin	Simpan pada suhu di bawah
		tablet	terhadap	1	3xsehari dapat		30°C, terlindung
			metformin	yang tidak tergantung dengan	diberikan bersama	al yang bersifat	dari cahaya
			metroriiii	insulin. Metformin	makan atau setelah	sementara	dari canaya
				dapat menurunkan	makan atau setelah makan	sementara	
		11		kadar gula darah	makan		
		11		namun tidak	197 \ \ \		
				meningkatkan	V 172 V		
		/ 2		sekresi insulin			
	1.1	13-1				7.7	
pi	ioglitazone,	Pioglitazone	Pasien	Sebagai		Anemia dan	Simpan pada
		15mg tablet	hipersensitif	antidiabetes yang	Dosis awal 15-30mg	sakit kepala	suhu di bawah
			terhadap	digunakan untuk	sekali sehari dalam		30°C, terlindung
			pioglitazone	terapi kompinasi	kombinasi dengan	111	dari cahaya
				dengan golongan	metformin atau		
				sulfonilurea atau	sulfonilurea		
		A		dengan metformin			
				untuk diabetes tipe			
				II yang tidak cukup dikendalikan			
				dengan pengobatan			
				tunggal			
		NN 3		sulfonilurea atau			
		1.1		metformin saja			
				metromini saja	_ //		
ac	carbose,	Acarbose 50ng	Pasien	Sebagai terapi	- //	Sering kentut	Simpan pada
		tablet	hipersensitif	tambahan dari diet	Dosis awal 3xsehari 1	C	suhu di bawah
			terhadap	dan olahraga untuk	tablet (50mg), dosis		30°C, terlindung
			acarbose	menurunkan kadar	selanjutnya 3xsehari 2		dari cahaya
				gula darah	tablet (100mg). Dosis		
					dapat ditingkatkan		
					setelah 4-8minggu		

TUGAS KHUSUS PKL D3 FARMASI UMG_KARISMA CAHYANINGRUM_211105005_APOTEK K-24 PPS GRESIK

Obat hipertiroid	insulin Propiltiourasil,	Novorapide Propyltiourasil	Pasien hipersensitif terhadap komponen novorapid Pasien	Untuk diabetes militus Untuk penyakit	Dosis bersifat individual dan diberikan secara subkutan. Dosis lazim: 0,5-1mg u/kg Dosis awal 100-150mg	Hipoglikemi a Nyeri dan	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
danhipotiroid		tablet	hipersensitif terhadap propyltiourasil	hipertiroid	tiap 8 jam. Dapat diminum sebelum atau sesudah makan	kaku sendi	suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
	levotiroksin.	Levothyroxine 50mcg tablet	Pasien hipersensitif terhadap Levothyroxine	untuk mengobati hipotiroidisme atau kondisi ketika kelenjar tiroid hanya mampu menghasilkan sedikit hormon tiroid sehingga dapat menyebabkan terganggunya proses metabolisme tubuh	Dosis awal 50-100mcg 1xsehari	Tremor dan kram	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
Kortikosteroid	hidrokortison,	Hydrocortisone 1% cream	Pasien yang menderita infeksi jamur	Untuk pengobatan eksim, inflamasi dan dermatitis alergi	Oleskan tipis sebanyak 2-3 x sehari	Rasa terbakar dan gatal pada kulit	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya. Disimpan selama 3 bulan setelah kemasan dibuka
	betametason,	Benoson cream	Penderita jerawat dan infeksi virus	Untuk peradangan kulit yang disebabkan oleh	Dioleskan pada daerah radang sebanyak 2-3 x sehari hingga terjadi	Rasa terbakar dan gatal pada kulit	Simpan pada suhu di bawah

prednison,	Eltazon 5mg tablet	Pasien hipersensitif terhadap prednison	mikroorganisme, trauma atau alergi, eksema dan psoriasis Sebagai terapi tambahan rematoid artritis, asma bronkhial dengan inflamasi akut, penyakit kulit dan mata karena alergi dan inflamasi	perbaikan, kemudian dapat diberikan sehari sekali. Dosis awal 1-6 tablet sehari dalam dosis terbagi, kurangi dosis secara bertahap sampai dosis perawatan terendah. Dosis perawatan terendah : 4 tablet sehari dibagi menjadi 4 dosis, diminum sesudah makan dan sebelum tidur	Osteoporosis, tukak lambung, kembung dan moon face	30°C, terlindung dari cahaya. Disimpan selama 30 hari setelah kemasan dibuka Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
metilprednisolon	Lameson 4mg tablet	Pasien hipersensitif terhadap methylprednisol on	Untuk mengobati keadaan sebagai berikut: Asma bronkhial (dimana pengobatan dengan simpatomimetik atau teopilin, gagal mencapai hasil yang diinginkan), rinitis alergi, eksema atau dermatitis, demam rematoik akut	Dosis awal Dewasa : 4-80mg sehari Anak-anak : 0,8- 1,1mg/kg BB/hari Dosis pemeliharaan : Dewasa : 4-8mg sehari, maksimum 16mg sehari Anak-anak : 2-4mg sehari, maksimum 8mg sehari	Sakit kepala, kejang dan moon face	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya

Obat KB	levonorgestrel,	Andalan pil KB	Pasien	Sebagai kontrasepsi	Mulailah minum	Perubahan	Simpan pada
	etinilestradiol,	warna biru 28	hipersensitif	oral untuk	andalan pada hari	nafsu makan,	suhu di bawah
		tablet	terhadap	mencegah	pertama siklus haid	sakit kepala	30°C, terlindung
			komponen obat	kehamilan	(hari pertama	dan rambut	dari cahaya
			ini		pendarahan) dari	rontok	Ĭ
			/	NAME OF STREET	bagian silver berwarna		
				IVI L.I 744	kuning (tablet plasebo)		
		1//			sesuai dengan		
		11	AT		dimulainya haid.		
		11			Kemudian lanjutkan		
		11 6			minum tablet tiap hari		
	- 47	/			mengikuti tanda anak		
	1.1	(3-4	100		panah. Hendaklah	77.7	
			A 717	80.00111.0000	diminum pada waktu		
		1.1-1.	THE PARTY	1000	yang sama setiap hari		
			1.0		, , ,		
	lynestrenol	Andalan laktasi	Pasien	Sebagai kontrasepsi	Mulailah minum	Sakit kepala,	Simpan pada
		tablet	hipersensitif	oral untuk	andalan pada hari	mual dan	suhu di bawah
			terhadap	mencegah	pertama siklus haid	muntah	30°C, terlindung
		V 72.1	lynestrenol	kehamilan pada ibu	(hari pertama		dari cahaya
				menyusui	pendarahan) dari		·
		11 5	ALC: 1	72 million 1988	bagian silver berwarna		
					kuning (tablet plasebo)		
					sesuai dengan		
					dimulainya haid.		
		AA 7			Kemudian lanjutkan		
		1.1			minum tablet tiap hari		
			100	- N	mengikuti tanda anak		
		74.74	N 10		panah. Hendaklah		
					diminum pada waktu		
					yang sama setiap hari		



TUGAS KHUSUS PKL D3 FARMASI UMG_KARISMA CAHYANINGRUM_211105005_APOTEK K-24 PPS GRESIK

lynestrenol	Andalan laktasi tablet	Pasien hipersensitif terhadap lynestrenol	Sebagai kontrasepsi oral untuk mencegah kehamilan pada ibu menyusui	andalan pada hari pertama siklus haid (hari pertama pendarahan) dari bagian silver berwarna kuning (tablet plasebo) sesuai dengan dimulainya haid. Kemudian lanjutkan minum tablet tiap hari mengikuti tanda anak panah. Hendaklah diminum pada waktu	Sakit kepala, mual dan muntah	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
	3		38.2	mengikuti tanda anak panah. Hendaklah		

Gresik,

Dosen Pembimbing PKL

Diah Ratnasari, S.Farm., Apt,. M.T

NIDN. 0721119001

Gresik,

Pembimbung Lapangan Apotek K24 PPS Gresik

Apt. Endri Zulfikar Fahmi, S.Farm

No. SIPA: 19940830/SIPA_35.25/2020/11767


CT KNOWLEDGE ALAT KESEHATAN

(1) ALKES PERAWATAN

No	Alkes perawatan	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Bandage gauze (kasa hidrofil)		Kain kasa dalam gulungan kecil, untuk membalut luka yang telah diberi obat.	 Cuci tangan sebelum menggunakan perban Pastikan ukuran perban telah sesuai dengan bagian tubuh atau luka yang akan dibalut Tempelkan perban, tetapi jangan terlalu ketat untuk menjaga sirkulasi udara dan aliran darah tetap lancar di sekitar bagian tubuh yang mengalami luka atau cedera Ikatlah ujung balutan terakhir dengan ikat simpul, serta gunakan klip perban atau perekat untuk mengamankan balutan Setelah luka dibalut oleh perban, jangan lupa untuk mengganti perban secara rutin setiap hari atau ketika sudah basah dan kotor, agar luka tetap kering dan bersih
2.	Elastic bandage			Cara pakai yang mudah yaitu balutkan FM Crepe atau Policrepe dengan teknik

		RENSOCIATE SELLA A, SIM market The sell market in the sell marke	Digunakan untuk menutup luka dan menyangga cedera.	balut sesuai keperluan dan setelah itu pasang pengait yang tersedia di dalam kemasan dengan sebelumnya permukaan kulit yang akan di balut dan di bersihkan dahulu.
3.	Kapas pembalut	KAPAS PEMBAUT WAS ARRANGE TO THE STATE OF T	Digunakan untuk membersihkan dan menutupi luka agar tidak mudah terinfeksi serta dapat digunakan untuk lapisan perban.	Ambil kapas secukupnya dan bersihkan area tubuh yang mengalami luka dapat juga dijadikan sebagai alas perban sebelum luka ditutup plester perekat.
4.	Kasa berisi obat (sufra tulle, daryant tulle, bacti grass, actisorb,paronet)*	DATVANT-TULE flampetin sulfate What it is What i	Untuk menutup luka yang terinfeksi, infeksi kulit sekunder, dermatitis, dan herpes zoster atau cacar air.	 Bersihkan luka terlebih dahulu sebelum ditutup dengan Bactigras. Kemudian balut kasa Bactigras pada daerah yang sakit. Bactigras dapat dipotong sebatas ukuran luka sebelum ditempelkan. Sebaiknya Bactigras tidak digunakan untuk luka > 10% dari luas permukaan tubuh
5.	Kasa dressing	V G. B	Untuk menutup luka yang terinfeksi, infeksi kulit sekunder, dermatitis, dan herpes zoster atau cacar air.	 membersihkan dan mengeringkan luka dan kulit di sekitarnya

	Cuticell* Classic 10cmx 10cm Formation and Control of		 pegang perban di kedua sisi pembalut letakkan pembalut langsung pada luka gulung ujung pendeknya satu kali di sekitar dahan dan bantalan (biarkan ujungnya menggantung) gulung ujung lainnya di sekeliling dahan untuk menutupi seluruh bantalan ikat kedua ujungnya di atas bantalan untuk mengencangkannya, dan berikan sedikit tekanan pada luka jika ada darah yang keluar dari balutan, keluarkan dan berikan tekanan menggunakan pembalut baru – bila pendarahan sudah terkendali, kencangkan pembalut di tempatnya dengan pembalut baru.
6. Kasa steril	CNEMED Kasa Steril Foreigner investigant (nog) - foreigner under - Organization der beforden den 10 pouch	Untuk menutup luka yang sebelumnya diberi obat agar terhindar dari kontaminasi. Kasa kemudian difiksasi dengan plester atau dibalut perban	Bersihkan luka dari kotoran, bakteri dan partikel untuk mencegah infeksi. Keringkan kulit sekitar luka dengan lembut. Tutupi luka dari kotoran menggunakan kasa steril.



1	T		1	
8.	Pembalut leher/cervical collar		Untuk menopang kepala dan membatasi gerak tulang leher (cervical vertebrae).	 Tempatkan pembalut leher di sekitar leher pasien dengan bagian yang berbulu menghadap ke atas dan kait atau pengikatnya di bagian belakang. Pastikan pembalut leher tidak terlalu ketat atau terlalu longgar, sehingga pasien masih bisa bernapas dengan nyaman. Sesuaikan pembalut leher sesuai dengan ukuran leher pasien untuk memberikan dukungan yang optimal
9.	Plester Elastik (handyplas, band aid, elastikon)	Hansaplast KAIN ELASTIS ELAS	Untuk menutup luka yang elastis dan tidak melekat pada luka, steril dan mencegah infeksi pada luka.	Bersihkan dan keringkan kulit di sekitar luka sebelum menempelkan plester. Tutup luka dengan plester tanpa direnggangkan. Gantilah plester secara teratur.
10.	Plester kertas (leukopor, dermilite)*	Eukopor 2 2 cm 8 2 m. 2 C C usus 2 m. 3 m. 4 m. 5 m. 6 m. 6 m. 7 m.	Plester untuk menutup luka yang memiliki daya rekat tinggi dan tembus udara sehingga meminimalisir terjadinya iritasi pada kulit	 Gunting atau sobek Leukopor sesuai ukuran yang dibutuhkan. Pastikan area yang diaplikasikan bersih, tidak basah atau terkena minyak. Aplikasikan Leukopor pada area yang diinginkan dan rekatkan ke kulit atau alat dengan hati-hati.

				Pastikan ujung-ujung plester merekat dengan baik.
11.	Plester plastik (leukofix, transfor)	Transpore 10. Since I are a final production for the control of t	Plaster yang digunakan sebagai perekat verban	 Gunting atau sobek Leukofix sesuai ukuran yang dibutuhkan. Pastikan area yang diaplikasikan bersih, tidak basah atau terkena minyak. Aplikasikan Leukopor pada area yang diinginkan dan rekatkan ke kulit atau alat dengan hati-hati. Pastikan ujung-ujung plester sudah merekat dengan baik.
12.	Plester plastik waterprof (setonplast, blenderm)	demalix E	Plaster penutup luka untuk mencegah infeksi pada luka selama proses penyembuhan	Bersihkan dan keringkan bagian yang sakit, lepaskan plester dari lapisan filmnya dan tempelkan pada daerah yang sakit.
13.	Plester rayon (microfore,		Plester berdaya rekat kuat, anti	➤ Gunting atau sobek microfore

	dermisel)*	Micropore* **********************************	alergi digunakan untuk menutup luka	sesuai ukuran yang dibutuhkan. Pastikan area yang diaplikasikan bersih, tidak basah atau terkena minyak. Aplikasikan Leukopor pada area yang diinginkan dan rekatkan ke kulit atau alat dengan hati-hati. Pastikan ujung-ujung plester sudah merekat dengan baik.
14.	Plester sutera (leukosilk)*		Plester berdaya rekat kuat, anti alergi digunakan untuk menutup luka	 Gunting atau sobek Leukosilk sesuai ukuran yang dibutuhkan. Pastikan area yang diaplikasikan bersih, tidak basah atau terkena minyak. Aplikasikan Leukopor pada area yang diinginkan dan rekatkan ke kulit atau alat dengan hati-hati. Pastikan ujung-ujung plester sudah merekat dengan baik.
15.	Plester ZnO (leukoplas)*	Leukoplast	Plester berdaya rekat kuat, anti alergi digunakan untuk menutup luka	 Gunting atau sobek Leukoplas sesuai ukuran yang dibutuhkan. Pastikan area yang diaplikasikan bersih, tidak basah atau terkena minyak. Aplikasikan Leukopor pada area yang diinginkan dan rekatkan ke kulit atau alat dengan hati-hati. Pastikan ujung-ujung plester sudah merekat dengan baik.

(2) PERAWATAN PASIEN

No	Perawatan pasien	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Bedpan		Sebagai wadah fases untuk pasien yang tidak dapat/tidak bisa ke WC	Letakkan bedpan dibawah pantat, meyakinkan dengan tepat perletakan bedpan lettakan fraktur pan dengan bagian yang belum klien berguling ke posisi semula. Rendah dekat regio penggung bawah klien, large bedpan bagian yang terbuka berada di dekat paha klien.
2.	Breast pump*	BREATTPUAN	Alat pemompa yang dapat membantu mengeluarkan ASI	 Siapkan alat pompa elektrik, kemudian pasang masing-masing alat sesuai tempatnya. Letakkan pelindung payudara pada posisi yang tepat dan tidak terasa mengganggu atau sakit. Jika pelindung tersebut dirasa kurang pas, Anda bisa menekannya perlahan agar tidak mudah lepas nantinya. Colokkan pompa elektrik ke sumber listrik terdekat atau langsung digunakan saat baterai masih tersedia. Nyalakan tombol "on" dan atur ke intensitas pompa sesuai keinginan Anda. Jika Anda menggunakan pompa elektrik yang hanya memiliki satu pompa, ulangi tahapan

		7/ N.S.	MUHA	sebelumnya di kedua sisi payudara. Lakukan proses memompa ASI dengan cara yang tepat sampai jumlah ASI yang diperoleh telah cukup atau payudara sudah kosong. Cuci bersih tangan dan semua peralatan setelah selesai digunakan.
3.	Colostomy bag*		Kantong penampung feses pada pasien setelah operasi colon (pembedahan usus untuk membuat anus buatan melalui otot dan kulit perut)	 Dekatkan alat-alat ke klien, pasang selimut mandi, dekatkan bengkok ke klien, pasang sarung tangan. Lepas dan angkat kantong stoma yang lama lalu buang ke kantong sampah Observasi kondisi stoma dan kulit peristomal (pantau tanda komplikasi, seperti infeksi, prolaps, nekrosis, iskemik, dan lain-lain). Bersihkan stoma dan kulit sekitar stoma dengan sabun atau air hangat Bilas sabun dengan air dan keringkan kulit sekitar stoma dengan tissue basah atau kassa Lindungi stoma dengan tissue atau kassa agar feses yang keluar lagi tidak

		mengotori kulit yang sudah dibersihkan Setelah kering, ukur stoma kembali dengan guide size untuk memilih kantong stoma yang sesuai (membuat pola) Siapkan kantong stoma dengan pelindung kulit. Buat pola sesuai ukuran stoma, kemudian tandai pelindung kulit dengan spidol sesuai dengan ukuran pola, kemudian lubangi pelindung kulit pada kantong stoma. Lepaskan pelapis kertas dari lempengan kantong Tempelkan pelindung kulit pada kantong stoma (dimulai dari arah jam 6 pada jarum jam) tekan secara lembut dan pelan. Pasang kantong stoma Pasang plester hipoalergik. Pastikan kantong stoma merekat dengan baik dan tidak bocor. Lipat ujung bagian bawah kantong ke arah atas. Amankan dengan klem/ penjepit kantong stoma. Buka sarung tangan, bereskan alat-alat cuci tangan
\ Gp	EGIKX	

4.	Ihsjap/eskap*	ICE BAG dameter 9inch	Kantong karet yang diisi kepingan es/air es untuk mengompres dingin bagian tubuh yang demam biasanya pada bagian kepala.	 Tidak diperbolehkan memasukkan air panas kedalam botol dalam keadaan mendidih Masukkan air maksimal 2/3 dari kapasitas botol Keluarkan udara dengan hati-hati hingga air muncul pada permukaan botol Tutup botol dengan rapat Pastikan botol tidak terjadi kebocoran dengan memegangnya dalam posisi terbalik
5.	Kruk*		Tongat penyangga tubuh pasien yang mengalami cedera pada tungkai kaki	 Berdiri tegak dengan sepatu Anda. Pastikan sepatu Anda memiliki hak rendah dan penyangga yang baik. Letakkan kruk di bawah lengan Anda. Relakskan lengan Anda dan biarkan menggantung di atas kruk. Harus ada jarak dua inci antara ketiak dan bagian atas kruk dengan tangan digantung santai. Pegangan tangan harus setinggi pergelangan tangan Anda saat memegang pegangan tangan. Siku Anda harus sedikit ditekuk hingga sekitar tiga puluh derajat.

6.	Pus basin/emesis basin*		Tempat menampung/membuang kapas bekas pakai, nanah, muntah	Letakkan pus basin pada tempat yang digunakan sesuai dengan kondisi pada saat itu.
7.	Spalk	SUMMODIFICATION AND PROPERTY OF THE PROPERTY O	Untuk pertolongan pertama pada kecelakaan patah tulang tangan dan kaki	 Pastikan area sekitar patah tulang bersih dari kotoran atau benda asing. Stabilkan patah tulang dengan posisi yang tepat sebelum menggunakan spalk. Tempatkan spalk di sepanjang sisi yang cedera, menggunakan bantuan yang memadai untuk menjaga tulang tetap dalam posisi yang benar. Pastikan spalk terikat secara aman tetapi tidak terlalu ketat sehingga membatasi aliran darah atau menyebabkan ketidaknyamanan yang berlebihan Setelah mengaplikasikan spalk, periksa kembali sirkulasi darah, sensasi, dan gerakan pada bagian yang cedera. Pastikan tidak ada komplikasi yang muncul.

8.	Tapelhoed/nipple shield*	(I)	Untuk melindungi puting ibu menyusui yang terluka atau sakit agar anaka tetap dapat menghisap asi	 Pastikan puting susu dan nipple shield bersih. Letakkan nipple shield di atas puting susu. Tekan bagian pinggiran nipple shield secara lembut ke payudara untuk memastikan penyatuan yang baik. Pastikan bayi dapat mengisap dengan nyaman dan efektif.
9.	Tongkat pyramide/elbow*		Sebagai tongkat untuk menyangga tubuh pasien yang mengalami cedera pada tungkai kaki	 Jauhkan dari apa pun yang dapat menghalangi jalan Anda, seperti kabel listrik, furniture, dan hewan peliharaan. Pegang tongkat Anda di tangan yang berlawanan dengan sisi yang membutuhkan dukungan. Posisikan tongkat sedikit ke samping dan sekitar 2 inci ke depan. Hindari memposisikan tongkat Anda terlalu jauh ke depan, karena bisa tergelincir. Gerakkan tongkat Anda ke depan pada saat yang sama saat Anda melangkah maju dengan kaki Anda yang sakit. Pegang tongkat dengan stabil di tempatnya saat Anda berjalan ke

			A	depan dengan kaki yang sehat. Minta seseorang untuk mengawasi Anda dan mungkin membantu mendukung atau menstabilkan Anda ketika Anda pertama kali merasa nyaman berjalan dengan tongkat Anda. Pastikan Anda merasa sepenuhnya percaya diri sebelum Anda berani keluar sendiri. Bicaralah jika Anda merasa membutuhkan bantuan saat menggunakan tongkat Anda. Buatlah rencana untuk apa yang akan Anda lakukan jika Anda berada dalam situasi ini.
10.	Urinal	Tempat buang air kecil	A	Minta pasien tersebut untuk memposisikan urinoir agar urin dapat mengalir ke dalamnya. Jika diperlukan, bantu mereka melebarkan kaki dan mengatur posisi urinoir. Jika memungkinkan, tutupi orang tersebut dengan seprai atau selimut untuk privasi. Jika Anda dapat meninggalkan mereka sendirian dengan aman, tinggalkan ruangan untuk memberikan privasi lebih. Jika orang tersebut membutuhkan bantuan, tahan urinoir di

			tempatnya saat ia buang air kecil. Ketika orang tersebut selesai buang air kecil, keluarkan urinoir dengan hati-hati.
11.	Walker*	Alat bantu jalan merupakan salah satu alat bantu jalan yang dikhususkan untuk lanjut usia, yang mengalami gangguan dalam berjalan ataupun patah kaki	 Jauhkan dari apa pun yang dapat menghalangi jalan Anda, seperti kabel listrik, furniture, dan hewan peliharaan. Pegang tongkat Anda di tangan yang berlawanan dengan sisi yang membutuhkan dukungan. Posisikan tongkat sedikit ke samping dan sekitar 2 inci ke depan. Hindari memposisikan tongkat Anda terlalu jauh ke depan, karena bisa tergelincir. Gerakkan tongkat Anda ke depan pada saat yang sama saat Anda melangkah maju dengan kaki Anda yang sakit. Pegang tongkat dengan stabil di tempatnya saat Anda berjalan ke depan dengan kaki yang sehat. Minta seseorang untuk mengawasi Anda dan mungkin membantu mendukung atau menstabilkan Anda ketika Anda pertama kali merasa nyaman berjalan dengan tongkat Anda. Pastikan Anda merasa sepenuhnya percaya diri sebelum


			Anda berani keluar sendiri. Bicaralah jika Anda merasa membutuhkan bantuan saat menggunakan tongkat Anda. Buatlah rencana untuk apa yang akan Anda lakukan jika Anda berada dalam situasi ini.
12.	Warm waterzak*	Masukkan air panas kedalam warm waterzak, dan tempelkan pada bagian tubuh yang sakit	 Tidak diperbolehkan masukkan air panas dalam botol keadaan mendidih Masukkan air maksimal 2/3 dari kapasitas botol Keluarkan udara dengan hati-hati hingga air muncul pada permukaan botol Tutup botol dengan rapat Pastikan penutup botol tidak terjadi kebocoran dengan memegangnya dalam posisi terbalik

13.	Windring/air cusion*	Ponut Air Cushion With Pump 1 If figure from beaut same that 1 Inspecting from the first same around	Alat ini digunakan sebagai alas duduk penderita ambeien/ wasir dan penderita cedera punggung agar lebih nyaman saat duduk.	Meletakkan bantal windring diatas tempat duduk sebagai alas duduk.
-----	----------------------	---	--	--

(3) ALKES TINDAKAN MEDIS

No	Alkes tindakan medis	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Ballon/folley cathether		 Menjaga agar kandung kemih tetap kosong untuk menunjang penyembuhan luka, pengobatan beberapa infeksi dan operasi suatu organ dari sistem urine dimana kandung kemih tidak boleh tegang sehingga menekan unsur lain. keperluan pemeriksaan klinis Untuk mengambil air kencing dalam sistim tertutup, 	 Menyiapkan penderita : untuk penderita laki-laki dengan posisi terlentang sedang wanita dengan posisi dorsal recumbent atau posisi Sim Aturlah cahaya lampu sehingga didapatkan visualisasi yang baik Siapkan deppers dan cucing , tuangkan betadine secukupnya Kenakan handschoen dan pasang doek lubang pada

genitalia penderita bebas dari udra dan polusi di sekitarny. (biasanya dihubungkan > Mengambil deppers dengan dengan urinovolumeter pinset dan mencelupkan pada sebuah urine bag). larutan betadine. keperluan di kamar operasi Melakukan desinfeksi sebagai berikut: Untuk pasien yang sedang dibedah bila kencing tidak > Pada penderita laki-laki : Penis mengganggu suasana. dipegang dan diarahkan ke atas -keperluan perawatan atau hampir tegak lurus dengan Untuk pasien yang tidak bisa tubuh untuk meluruskan urethra mengendalikan keinginan untuk yang panjang dan berkelok agar kencing (incontinentia urinae) kateter mudah dimasukkan. Desinfeksi dimulai dari meatus termasuk glans penis dan memutar sampai pangkal, diulang sekali lagi dan dilanjutkan dengan alkohol. Pada saat melaksanakan tangan kiri memegang penis sedang tangan kanan memegang pinset dan dipertahankan tetap steril. Pada penderita wanita : Jari tangan kiri membuka labia minora, desinfeksi dimulai dari atas (clitoris), meatus lalu ke arah bawah menuju rektum. Hal ini diulang 3 kali. Deppers terakhir ditinggalkan diantara labia minora dekat clitoris untuk mempertahankan penampakan meatus urethra. Lumuri kateter dengan jelly dari ujung merata sampai sepanjang 10 cm untuk penderita laki-laki



			memasukkan kateter pelanpelan dengan disertai penderita menarik nafas dalam. Kaji kelancaran pemasukan kateter, jika ada hambatan kateterisasi dihentikan. Menaruh nierbecken di bawah pangkal kateter sebelum urine keluar. Masukkan kateter sampai urine keluar sedalam 18 – 23 cm dan selanjutnya dimasukkan lagi +/- 3 cm. Mengambil spesimen urine kalau perlu Mengembangkan balon kateter dengan aquadest steril sesuai volume yang tertera pada label spesifikasi kateter yang dipakai Memfiksasi kateter: Pada penderita laki-laki kateter difiksasi dengan plester pada abdomen Pada penderita wanita kateter difiksasi dengan plester pada pangkal paha Menempatkan urobag ditempat tidur pada posisi yang lebih rendah dari kandung kemih.
2.	Condom cathether	Alat disarungkan pada ujung tubenya dil dengan urine bag, terut pasien yang suka buan	nubungkan penis kemudian buka gulungan ama untuk condom kearah pangkal penis,

		Condon Capacitor Condon Capac	dengan tidak sadar (incontinentia urinae)	 Gunakan perekat dibagian atas condom untuk menahan condom agar tidak terlepas Pasang ujung distal kepipa drainase
3.	Disposible syringe	On-HEATH DAYS CANADA STATES OF THE STATES OF	Untuk pemberian secara iv / im / sub cutan dengan volume tertentu. Spuit 3 cc ini digunakan untuk intra dermal,intr a muscular dan intra vena.	 Bersihkan area penyuntikan dengan alkohol. Pastikan jarum dan silinder disambungkan dengan benar. Tarik piston untuk mengisi silinder dengan cairan yang akan disuntikkan. Setelah menyuntikkan cairan, tarik kembali plunger untuk memeriksa apakah ada darah yang masuk ke dalam syringe (jika perlu).Buang syringe dengan benar setelah digunakan.
4.	Endotracheal	FOR SCAL ARTICLEAN REGISTERS OF THE PROPERTY	Alat yang digunakan di dunia medis untuk menjamin saluran napas tetap bebas	 Posisikan pasien telentang dengan kepala ekstensi Petugas mencuci tangan Petugas memakai masker dan sarung tangan Lakukan suction jika diperlukan Lakukan intubasia. Buka blade, pegang tangkai laringoskop dengan tenangb. Buka mulut pasienc. Masukkan blade pelanpelan menyusuri dasar lidah, ujung blade sudah di pangkal lidah, geser lidah pelan-pelan kea rah kirid. Angkat tangkai

				laringoskop ke depan sehingga menyangkut ke seluruh lidah ke depan sehingga rona glottis terlihate. Ambil pipa ETT sesuai ukuran yang sudah ditentukan sebelumnyaf. Masukkan dari sudut mulut kanan arahkan ujung ETT menyusur ke rima glottis masuk ke celah pita suarag. Dorong pelan sehingga seluruh balon STT di bawah pita suarah. Cabut styleti. Tiup balon ETT sesuai volumenyaj. Cek dengan stetoskop dan dengarkan aliran udara yang masuk lewat ETT apakah sama antara paru kanan dan kirik. Fiksasi ETT dengan plesterl. Hubungkan ETT dengan konektor sumber oksigenm. Cuci tangan sesudah melakukan intubasi
5.	Enema syringe*	organid anama spinara (Ball)	Untuk mencegah infeksi silang, model syringe logam/metal yang reusable. Ujung tubing berbentuk curve, sehingga tidak menyebabkan trauma pada mukosa rectum, sudah melalui uji klinis.	 Lepaskan tutup dari ujung nosel enema. Oleskan sedikit petroleum jelly atau pelumas ke anus Anda untuk memudahkan penyisipan. Berbaringlah di lantai di sisi kiri Anda. Tekuk lutut kanan Anda dan letakkan handuk yang digulung di bawahnya. (Jika Anda kidal, balikkan petunjuk ini.) Dengan tangan dominan Anda,

			masukkan perlahan ujung nosel enema ke dalam rektum Anda. Ini mungkin tidak nyaman tetapi tidak menyakitkan. Jika ada rasa sakit, hentikan dan hubungi penyedia layanan kesehatan Anda. Setelah dimasukkan, peras wadah enema untuk mendorong cairan ke dalam rektum. Peras dari bawah ke atas dan kosongkan wadahnya. Tarik nosel secara perlahan. Atur alarm sesuai jumlah waktu yang disarankan sebelum pergi ke kamar mandi. (Lihat bagan di bawah.) Saat alarm berbunyi, gunakan toilet. Kemudian tetap dekat dengan toilet selama 30 hingga 60 menit berikutnya, karena Anda mungkin perlu ke toilet beberapa kali lagi.
6.	Feeding syringe	Alat suntik untuk memberikan / memasukkan makanan kepada pasien yang penggunannya disambungkan dengan selang kateter	 Cuci tangan Anda. Jika Anda memiliki selang pengisi yang low profile, pasang pipa ekstensi untuk menghilangkan udara sebelum memasangkannya ke selang pengisi. Melapisi selang membantu mencegah udara masuk ke perut Anda dan menyebabkan

	Izotadolznyomones
	ketidaknyamanan.
	> Jepit set ekstensi.
	➤ Lepaskan pendorong dari
	semprit dan pasang semprit ke
	pipa ekstensi.
	> Tuangkan sekitar 15 mL susu
	formula ke dalam semprit.
	➤ Buka klem set ekstensi, biarkan
	formula mengalir tepat ke ujung
	pipa dan klem set ekstensi.
	> Pasang set ekstensi ke selang
	pengisi.
	> Jika Anda memiliki selang
	gastrostomi biasa, bilas selang
	Anda dengan air.
	► Lepaskan pendorong dari
	semprit.
	Pasang jarum suntik ke selang
	makanan Anda
	Tuangkan 10-15 mL air ke
	dalam semprit dan biarkan
13.3.1	mengalir melalui tabung Anda.
	➤ Bersihkan bagian luar wadah
	susu formula dengan handuk
	bersih dan buka.
	➤ Angkat tabung dan semprit
	dengan satu tangan.
1.1	> Tuangkan susu formula secara
	perlahan ke dalam semprit
	dengan tangan Anda yang lain.
	Biarkan mengalir secara
	gravitasi ke dalam perut Anda.
	Diperlukan waktu sekitar 15

			menit untuk menghasilkan 8 ons susu formula. Beri makan lebih lambat atau lebih cepat tergantung toleransi Anda. Anda dapat membuat susu formula mengalir lebih cepat dengan menaikkan alat suntik lebih tinggi dari perut Anda atau dengan menggunakan alat pendorong untuk mendorong susu formula masuk. Anda dapat membuat formula mengalir lebih lambat dengan menurunkan jarum suntik ke arah perut Anda atau dengan mengambil hanya ¼ atau ½ kaleng sekaligus dengan jeda satu atau dua menit. Siram selang makanan Anda dengan jumlah air yang disarankan. Tutup lubang pengumpan dan lepaskan pipa ekstensi (jika ada). Cuci dan keringkan semua peralatan dan perlengkapan. Dinginkan sisa formula dan gunakan dalam waktu 24 jam.
7.	Feeding tube	untuk memberikan nutrisi dan obat-obatan kepada seseorang yang tidak mampu untuk	Kenakan gaun, sarung tangan, dan pelindung wajah.

	mengkomsu msi makanan,ca iran dan obat-obatan	 Periksa patensi setiap lubang hidung dengan menutup salah satu lubang hidung dan meminta pasien bernapas melalui lubang hidung lainnya. Tanyakan pasien mana yang memberikan aliran udara lebih baik. Lihat ke dalam hidung apakah ada penghalang yang terlihat jelas. Letakkan handuk atau pembalut berwarna biru di atas dada pasien agar tetap bersih. Pilih sisi untuk pemasangan selang dan semprotkan anestesi topikal pada lubang hidung dan faring setidaknya 5 menit sebelum pemasangan selang. Jika waktu memungkinkan, berikan 4 mL lidokain 10% melalui nebulizer atau masukkan 5 mL gel lidokain 2% ke dalam lubang hidung. Jika tersedia semprotkan
* GR	ESIV	<u> </u>

posterior; namun, langkal dapat diabaikan. Perkirakan kedala penyisipan yang tepat-kira jarak ke daun telinga sudut mandibula dan kemu ke xiphoid, ditambah 6 perhatikan tanda hitam n pada tabung yang sesuai de jarak ini. Lumasi ujung se nasogastrik. Masukkan ujung selang se perlahan ke dalam hidung geser sepanjang dasar ro hidung. Arahkan ke bela lalu ke bawah agar tetap be di bawah turbinat hidung. Diperkirakan akan meras resistensi ringan saat se melewati nasofaring poster	ini
Perkirakan kedala penyisipan yang tepat—kira jarak ke daun telinga sudut mandibula dan kemu ke xiphoid, ditambah 6 perhatikan tanda hitam napada tabung yang sesuai de jarak ini. Lumasi ujung senasogastrik. Masukkan ujung selang senasogastrik.	
kira jarak ke daun telinga sudut mandibula dan kemu ke xiphoid, ditambah 6 perhatikan tanda hitam nada tabung yang sesuai de jarak ini. Lumasi ujung se nasogastrik. Masukkan ujung selang se perlahan ke dalam hidung geser sepanjang dasar ro hidung. Arahkan ke bela lalu ke bawah agar tetap be di bawah turbinat hidung. Diperkirakan akan meras resistensi ringan saat se	man
kira jarak ke daun telinga sudut mandibula dan kemu ke xiphoid, ditambah 6 perhatikan tanda hitam nada tabung yang sesuai de jarak ini. Lumasi ujung se nasogastrik. Masukkan ujung selang se perlahan ke dalam hidung geser sepanjang dasar ro hidung. Arahkan ke bela lalu ke bawah agar tetap be di bawah turbinat hidung. Diperkirakan akan meras resistensi ringan saat se	cira-
ke xiphoid, ditambah 6 perhatikan tanda hitam n pada tabung yang sesuai de jarak ini. Lumasi ujung se nasogastrik. Masukkan ujung selang se perlahan ke dalam hidung geser sepanjang dasar ro hidung. Arahkan ke bela lalu ke bawah agar tetap be di bawah turbinat hidung. Diperkirakan akan meras resistensi ringan saat se	
perhatikan tanda hitam apada tabung yang sesuai de jarak ini. Lumasi ujung se nasogastrik. Masukkan ujung selang se perlahan ke dalam hidung geser sepanjang dasar ro hidung. Arahkan ke bela lalu ke bawah agar tetap be di bawah turbinat hidung. Diperkirakan akan meras resistensi ringan saat se	dian
pada tabung yang sesuai de jarak ini. Lumasi ujung se nasogastrik. Masukkan ujung selang se perlahan ke dalam hidung geser sepanjang dasar ro hidung. Arahkan ke bela lalu ke bawah agar tetap be di bawah turbinat hidung. Diperkirakan akan meras resistensi ringan saat se	nci;
jarak ini. Lumasi ujung se nasogastrik. Masukkan ujung selang se perlahan ke dalam hidung geser sepanjang dasar ro hidung. Arahkan ke bela lalu ke bawah agar tetap be di bawah turbinat hidung. Diperkirakan akan meras resistensi ringan saat se	ıana
 ▶ Lumasi ujung selang senasogastrik. ▶ Masukkan ujung selang sengerlahan ke dalam hidung geser sepanjang dasar rohidung. Arahkan ke belah lalu ke bawah agar tetap bedi bawah turbinat hidung. ▶ Diperkirakan akan merasar resistensi ringan saat selangan saat	igan
nasogastrik. Masukkan ujung selang se perlahan ke dalam hidung geser sepanjang dasar ro hidung. Arahkan ke bela lalu ke bawah agar tetap be di bawah turbinat hidung. Diperkirakan akan meras resistensi ringan saat se	
 ▶ Masukkan ujung selang seperlahan ke dalam hidung geser sepanjang dasar rohidung. Arahkan ke bela lalu ke bawah agar tetap bedi bawah turbinat hidung. ▶ Diperkirakan akan meras resistensi ringan saat se 	lang
perlahan ke dalam hidung geser sepanjang dasar ro hidung. Arahkan ke bela lalu ke bawah agar tetap be di bawah turbinat hidung. Diperkirakan akan meras resistensi ringan saat se	
geser sepanjang dasar ro hidung. Arahkan ke bela lalu ke bawah agar tetap be di bawah turbinat hidung. Diperkirakan akan meras resistensi ringan saat se	
hidung. Arahkan ke bela lalu ke bawah agar tetap be di bawah turbinat hidung. ➤ Diperkirakan akan meras resistensi ringan saat se	
lalu ke bawah agar tetap be di bawah turbinat hidung. Diperkirakan akan meras resistensi ringan saat se	
di bawah turbinat hidung. ➤ Diperkirakan akan meras resistensi ringan saat se	
Diperkirakan akan meras resistensi ringan saat se	rada
resistensi ringan saat se	
melewan nasotaring poster	
➤ Minta pasien untuk men air melalui sedotan	dan
memajukan selang	saat
menelan. Pasien akan mer	
	igga
memudahkan jalan masu	
kerongkongan. Lanju	
	ama
menelan hingga kedala	
yang telah ditentukan de	

		menggunakan tanda hitam pada selang sebagai panduan. Kaji penempatan selang yang tepat dengan meminta pasien berbicara. Jika pasien tidak dapat berbicara, suaranya serak, tersedak hebat, atau mengalami
		gangguan pernapasan, selang tersebut mungkin berada di trakea dan harus segera dilepas. Suntikkan 20 hingga 30 mL udara dan dengarkan dengan stetoskop di bawah daerah subkostal kiri. Suara aliran udara membantu memastikan lokasi selang di perut.
		Aspirasi isi lambung untuk lebih memastikan penempatannya di dalam lambung (terkadang tidak ada isi lambung yang dapat diaspirasi meskipun selang telah diposisikan dengan benar di dalam lambung).
GR	ESIV	Terkadang rontgen dada diperlukan untuk memastikan secara pasti lokasi selang di perut. Jika tabung akan digunakan untuk memasukkan zat apa pun, seperti zat kontras

				radiopak atau makanan cair, rontgen dada sangat dianjurkan.
			MUHAN	Kencangkan selang ke hidung pasien. Oleskan benzoin ke kulit jika tersedia. Gunakan pita perekat berukuran 4 hingga 5 inci yang disobek secara vertikal hingga separuh panjangnya dan tempelkan separuh lebarnya ke hidung pasien. Kemudian lilitkan ujung selotip ke arah yang berlawanan di sekitar tabung.
		EV.		Pasang selang nasogastrik ke alat penghisap dan setel ke pengisapan rendah (pengisapan intermiten jika memungkinkan).
8.	Gliserin syringe*		Untuk menyemprotkan lavemen atau clysme melalui anus. Juga untuk menyemprotkan air sabun, dsb. Pada pasien opsitipasi	 Gunakan persis seperti yang diarahkan pada label, atau sesuai anjuran dokter Anda. Jangan gunakan obat ini lebih sering dari yang ditentukan. Kebutuhan dosis Anda mungkin berubah jika Anda beralih ke merek atau bentuk obat lain. Hindari kesalahan pengobatan dengan menggunakan obat

			sesuai petunjuk pada label, atau
			sesuai anjuran dokter.
		,	Gliserin dubur umumnya
	400		digunakan sekali sehari. Ikuti
			instruksi dokter Anda.
	100		Jangan meminumnya melalui
		AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	mulut. Obat rektal hanya untuk
		WILLIAM	digunakan pada rektum Anda.
			Cuci tangan sebelum dan
	Y A.C.	177.4	sesudah menggunakan obat
100	/ 10.7		dubur.
	The state of the s		Lepaskan pembungkusnya
The same of the sa			sebelum memasukkan
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	/A- 11/2- 1		supositoria.
	AC TALL		Berbaring telentang dengan
	111 0 M		lutut ditekuk. Masukkan
			supositoria secara perlahan ke
	- IVII		dalam rektum sekitar 1 inci,
	17	All I have been a second or the second of the second or th	dengan ujung runcing terlebih
	- 1/4		dahulu.
	- The State of the		Tetap berbaring selama
1.1.1.	ASS TO B. 2000		beberapa menit. Anda mungkin
	The State of the S	Commence of the Commence of th	merasakan ketidaknyamanan
		V. 1111.000	atau sensasi terbakar saat
			supositoria meleleh. Supositoria
	1000		tidak perlu meleleh seluruhnya
	The second second		untuk menghasilkan efek
			pencahar.
			Untuk menggunakan supositoria
	10 12 2		cair, berbaring miring ke kiri
		ECIV //	dengan kaki kiri lurus dan kaki
	7.1		kanan ditekuk. Lepaskan tutup
		and the	dari ujung aplikator dan
, ,			<i>y y</i> 1

				masukkan ujungnya secara perlahan ke dalam rektum Anda. Peras botol secara perlahan hingga kosong. Tetap berbaring miring selama beberapa menit. Pastikan untuk tetap berbaring sampai Anda merasakan keinginan untuk buang air besar. Obat ini akan menghasilkan buang air besar dalam waktu 15 hingga 60 menit. Jangan gunakan gliserin dubur lebih dari sekali dalam jangka waktu 24 jam. Hubungi dokter Anda jika gejala Anda tidak membaik, atau semakin parah. Simpan obat ini dalam keadaan tertutup rapat pada suhu ruangan, jauh dari tempat lembab dan panas.
9.	Gloves/handschoen	MAXTER Ranks	Alat yang disarungkan pada tangan dengan objek yang disentuh	Cuci tangan terlebih dahulu lalu pasang gloves sebelum melakukan tindakan
10.	Infusion set dewasa	V_ GR	Untuk memberikan cairan infus ke dalam tubuh pasien melalui intravena untuk memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit	Mencuci tangan, kemudian mengenakan sarung tangan steril

		TERUMO IEMUFERIOR OCENTYO 2000 SOLUTION Administration Set OCENTY COLUMN OCE	serta sebagai tindakan pengobatan dan pemberian makanan.	 Meraba tangan pasien, untuk menentukan area pembuluh darah yang akan dipasangi infus Memasang tali pembendung (tourniquet) di atas pembuluh darah yang akan ditusuk jarum Membersihkan area kulit yang akan dipasang infus menggunakan kapas beralkohol Memasukkan jarum infus ke pembuluh darah yang sudah ditentukan Melepaskan jarum, kemudian menghubungkan selang ke cairan infus, obat, atau kantong darah Merekatkan plester pada selang infus ke lengan agar tidak bergeser jika pasien bergerak
11.	Infusion set pediatrik	KI-Fred Market M	Untuk memberikan cairan infus kedalam tubuh bayi atau balita	 Alat-alat yang sudah disiapkan dibawa ke dekat penderita di tempat yang mudah dijangkau oleh dokter/ petugas Perlak dipasang di bawah anggota tubuh yang akan dipasang infus Memasang infus set pada kantung infuse Buka tutup botol cairan infus. Tusukkan pipa saluran udara, kemudian masukkan pipa saluran infus.

	- Tutup jarum dibuka, cairan dialirkan keluar dengan membuka kran selang sehingga tidak ada udara pada saluran infus, lalu dijepit dan jarum ditutup kembali. Tabung tetesan diisi sampai ½ penuh. - Gantungkan kantung infus beserta salurannya pada tiang infus - Cucilah tangan dengan seksama menggunakan sabun dan air mengalir, keringkan dengan handuk bersih dan kering. > Lengan penderita bagian proksimal dibendung dengan torniket. > Kenakan sarung tangan steril, kemudian lakukan desinfeksi daerah tempat suntikan
MEM	daerah tempat suntikan Jarum diinsersikan ke dalam vena dengan bevel jarum menghadap ke atas, membentuk sudut 30-400 terhadap permukaan kulit.
(\ ×	➤ Bila jarum berhasil masuk ke dalam lumen vena, akan terlihat darah mengalir keluar
	Turunkan kateter sejajar kulit. Tarik jarum tajam dalam kateter
1/1	vena (stylet) kira-kira 1 cm ke arah luar untuk membebaskan
	ujung kateter vena dari jarum

			agar jarum tidak melukai
			dinding vena bagian dalam.
			Dorong kateter vena sejauh 0.5
			 1 cm untuk menstabilkannya
	and the same	>	Tarik stylet keluar sampai ½
	- 1/		panjang stylet. Lepaskan ujung
		AND THE STREET	jari yang memfiksasi bagian
		MIUN -	proksimal vena. Dorong seluruh
	La Division	1.0	bagian kateter vena yang
			berwarna putih ke dalam vena
	1000000		Torniket dilepaskan. Angkat keseluruhan stylet dari dalam
	U3 / //		kateter vena.
	A.T. B.C.	>	Pasang infus set atau blood set
1.1	ALC: A SHEET OF		yang telah terhubung ujungnya
	117 04		dengan kantung infus atau
			kantung darah
		>	Penjepit selang infus
	- V	AN A SHEET AND A	dilonggarkan untuk melihat
	- L/A		kelancaran tetesan.
	TO THE SECOND	The second secon	Bila tetesan lancar, pangkal
	the state of the s		jarum direkatkan pada kulit menggunakan plester.
			Tetesan diatur sesuai dengan
1.11			kebutuhan.
		>	Jarum dan tempat suntikan
111	The second		ditutup dengan kasa steril dan
			fiksasi dengan plester.
	N. Property		Pada anak, anggota gerak yang
	V 6 0	ECITE //	dipasang infus dipasang bidai
		F31' //	(spalk) supaya jarum tidak
			mudah bergeser Buanglah sampah ke dalam
			Duangian Sampan Ke dalam

		- 1 - S	MUH4	tempat sampah medis, jarum dibuang ke dalam sharp disposal (jarum tidak perlu ditutup kembali). Bereskan alat-alat yang digunakan. Cara melepas infus: bila infus sudah selesai diberikan, plester dilepas, jarum dicabut dengan menekan lokasi masuknya jarum dengan kapas alkohol, kemudian diplester.
12.	Insulin syringe*		alat untuk menyemprotkan enema / clysima pada dubur	 Cuci tangan terlebih dahulu dengan sabun dan air mengalir. Tarik pompa pendorong pada alat suntik hingga menyentuh angka dosis yang telah ditentukan. Bersihkan bagian atas kemasan botol insulin menggunakan tisu bersih atau alcohol swab. Masukkan ujung jarum suntik ke dalam botol hingga menembus lapisan karet kemasan, kemudian dorong pompa secara perlahan agar tidak meninggalkan udara di dalam tabung suntik. Posisikan botol insulin berada di atas dan jarum suntik berada di bawah. Tarik pompa hingga tabung

			suntik terisi dengan insulin sesuai dosis yang dibutuhkan. Jika ada gelembung udara, ketuk tabung suntik agar gelembung udara naik ke atas, kemudian dorong pompa suntik untuk mengeluarkan gelembung. Cubit area kulit yang akan disuntik dan bersihkan menggunakan tisu alkohol. Masukkan jarum suntik dengan posisi 900, kemudian dorong pompa suntik hingga semua dosis insulin masuk ke dalam tubuh. Saat sudah selesai, tarik jarum suntik terlebih dahulu sebelum melepas cubitan. Hindari menggosok lokasi suntikan meski muncul sedikit darah. Jika diperlukan, tekan secara perlahan dan tutup lokasi suntikan dengan kain kasa. Perlu diingat bahwa jarum suntik hanya boleh sekali pakai dan setelah digunakan harus segera dibuang di wadah khusus sampah medis.
13.	Intra vena catheter	Sebagai perpanjangan vena dimana alat dihubungkan dengan selang transfuse/infuse, dapat	pembuluh darah yang akan

		digunakan >48 jam	 Tourniquet atau tali pembendung dipasang sekitar 3–4 inci dari atas area tusukan Petugas medis membersihkan permukaan kulit di mana infus akan dipasang dengan menggunakan alkohol swab Kateter IV dimasukkan ke pembuluh darah menggunakan jarum Setelah masuk, jarum dilepaskan dan selang dilekatkan ke lengan pasien
14.	Masker oksigen	Alat bantu pernafasan yang dipasangkan di hidung dan mulut dengan bentuk seperti masker pada umumnya. Masker khusus ini dipakai sebagai pendukung dalam penyaluran oksigen dari dalam tabung oksigen ke saluran pernafasan	 Pasang selang oksigen ke sumber oksigen dan atur oksigen sesuai dengan anjuran Periksa aliran gas di seluruh perangkat Pasang masker pada wajah pasien, dengan kepusat pada bagian hidung dan mulut. Strip elastis harus berada dibawah telinga dan dileher Secara perlahan, sesuaikan slide plastik sampai kanul aman. Bentuk logam metal pada masker sesuai dengan batang hidung
15.	Masker nebulizer anak-anak	untuk melegakan saluran napas yang menyempit pada anak-anak. Alat ini terdiri dari mesin	Sambungkan konektor tubing pada alat nebulizer dan konektor tubing lainya pada bagian bawah

		Rebultzen MASS and	kompresor udara, wadah kecil untuk obat cair, dan selang elastis yang menghubungkan kompresor udara ke wadah obat	botol Buka botol dan masukkan cairan obat kemudian tutup kembali hingga rapat Sambungkan botol dengan masker Pasang masker pada wajah, atur posisi agar lebih rapat dan nyaman Nyalakan alat nebulizer dan siap digunakan
16.	Masker nebulizer dewasa	Modifier MASK dewasa	untuk melegakan saluran napas yang menyempit pada orang dewasa. Alat ini terdiri dari mesin kompresor udara, wadah kecil untuk obat cair, dan selang elastis yang menghubungkan kompresor udara ke wadah obat	 Sambungkan konektor tubing pada alat nebulizer dan konektor tubing lainya pada bagian bawah botol Buka botol dan masukkan cairan obat kemudian tutup kembali hingga rapat Sambungkan botol dengan masker. Pasang masker pada wajah, atur posisi agar lebih rapat dan nyaman Nyalakan alat nebulizer dan siap digunakan
17.	Metal cathether*	000	alat untuk mengeluarkan urine/BAK/kencing yang terbuat dari metal/besi stainless steel. Metal kateter biasa digunakan di bidan Obsgyn, untuk	 Pastikan sterilisasi alat dan area sekitarnya. Bersihkan area sekitar uretra. Oleskan lubrikan pada ujung catheter.

			mengosongkan kandung kemih baik saat distensi, ketidaksadaran, mengukur residu urine	 Perlahan-lahan sisipkan catheter melalui uretra ke dalam kandung kemih hingga urin mulai mengalir. Setelah selesai, pastikan catheter dikeluarkan dengan hati-hati.
18.	Mucus extractor*	Mucus Extractor osposials [FR]	alat penghisap lendir pada hidung bayi yang baru lahir supaya lendir pada hidung tidak menggangu pernafasan bayi	 Pastikan sterilisasi alat dan area sekitarnya. Pasang ujung alat ke dalam hidung bayi. Gunakan hisapan untuk menarik lendir keluar dari saluran pernapasan bayi. Hindari menarik dengan terlalu keras untuk menghindari cedera.
19.	Nasal gastric tube	14 STORM AND	Untuk menyuplai makanan dan minuman pada pasien yang tidak memungkinkan untuk menelan, akibat kondisi medis tertentu	Langkah pertama yang dilakukan dokter, perawat, atau petugas kesehatan saat memasukkan nasogastric tube adalah meminta pasien untuk berbaring di tempat tidur dengan kepala diangkat atau duduk di kursi. Mereka mungkin akan meminta pasien untuk menekuk kepala, leher, dan tubuh pada berbagai sudut saat mereka memasang tabung melalui lubang hidung, ke kerongkongan dan ke dalam perut.
20.	Nebulizer set		alat yang mengubah obat cair menjadi uap untuk dihirup ke	 Siapkan nebulizer dan alat lainnya yang terdapat dalam set.

			dalam paru- paru. Fungsi nebulizer yakni untuk melegakan saluran napas yang menyempit	 Tuangkan obat yang diresepkan ke dalam tabung nebulizer. Pasang tabung ke bagian bawah nebulizer. Tempatkan masker atau mulut penghirup di mulut pasien. Nyalakan nebulizer dan hirup obat secara perlahan-lahan hingga habis. Setelah selesai, matikan nebulizer dan bersihkan alatnya.
21.	Needle	OTENLING OTENLI	untuk memindahkan sejumlah cairan sebagai alat untuk menembus kulit agar obat dalam sediaan cair dapat dimasukkan ke dalam pembuluh darah atau jaringan kulit tersebut	 Persiapkan area yang akan disuntik dengan alkohol atau larutan antiseptik. Tentukan titik suntikan. Tusukkan jarum dengan tegas dan cepat ke dalam kulit dengan sudut yang tepat. Setelah selesai, buang jarum dengan aman sesuai dengan prosedur yang ditentukan.
22.	Nelaton cathether		Untuk katerisasi melalui urethra ke bladder, penggunaan jangka waktu singkat	 Persiapkan alat dan sterilisasi area sekitarnya. Oleskan lubricant pada ujung catheter. Perlahan-lahan sisipkan catheter melalui uretra ke dalam kandung kemih hingga urin mulai mengalir. Pastikan catheter dikeluarkan dengan hati-hati setelah selesai.

23.	Oxygen nasal canula	untuk mendukung kebutuhan oksigen pada pasien yang dapat bernafas spontan tapi membutuhkan dukungan oksigen tambahan misalnya pada kondisi hipoksia ringan sampai sedang	 Identifikasi pasien dengan tepat Pastikan sumber oksigen telah tersedia dan terpasang dengan regulator, flowmeter, dan humidifier Pastikan humidifier sudah terisi air sesuai takaran yang diperlukan Jelaskan kembali prosedur pemasangan pada pasien Cuci tangan Posisikan pasien untuk duduk atau setengah duduk bila memungkinkan Hubungkan selang kanul ke sumber oksigen Nyalakan aliran oksigen sesuai dosis yang dibutuhkan pasien, pastikan ada aliran oksigen yang keluar melalui ujung kanul dengan meletakkan tangan pemeriksa di depan prong Posisikan prong dari kanul hidung agar melengkung ke bawah, kemudian

	insersi prong ke dalam rongga hidung (Lihat gambar di bawah) Posisikan kedua sisi selang di atas dan belakang telinga Fiksasi nasal kanul pada bagian bawah dagu pasien dengan mengencangkan klip agar tidak mudah terlepas Fiksasi juga dapat dilakukan di belakang kepala dengan memposisikan klip di belakang kepala kemudian dikencangkan sesuai kenyamanan pasien Lakukan pemantauan respon klinis pasien, saturasi oksigen dan kontinuitas aliran oksigen secara rutin
24. Rectal tube	Untuk membersihkan rectum dengan mengeluarkan gas-gas dari usus Pastikan tube bersih dan terlumasi dengan baik. Lubrikasikan ujung tube. Masukkan ujung tube ke dalam mulut atau hidung dan dorong perlahan ke arah lambung. Sambungkan bagian lain tube ke sumber cairan atau obat-obatan. Berikan cairan atau obat-obatan dengan hati-hati dan sesuai

				dengan petunjuk medis
25.	Spinal needle		Alat suntik spinal	 Persiapkan pasien dalam posisi yang tepat dan lingkungan steril. Identifikasi titik masuk yang sesuai di punggung pasien. Gunakan teknik aseptik untuk memasukkan jarum spinal ke dalam ruang subarakhnoid di sekitar sumsum tulang belakang. Setelah penggunaan, buang jarum dengan benar sesuai prosedur medis.
26.	Stomach tube	FOR STATE OF	Mengumpulkan getah lambung - membilas atau mencuci isi perut - pemberian obat-obatan.	 Pastikan tube bersih dan terlumasi dengan baik. Lubrikasikan ujung tube. Masukkan ujung tube ke dalam mulut atau hidung dan dorong perlahan ke arah lambung. Sambungkan bagian lain tube ke sumber cairan atau obat-obatan. Berikan cairan atau obat-obatan dengan hati-hati dan sesuai dengan petunjuk medis
27.	Suction cathether	GR	Untuk mengeluarkan lender atau cairan amniotic dari trachea bayi yang baru lahir dengan cara menyedot.	 Persiapkan alat dan sterilisasi area sekitarnya. Oleskan lubricant pada ujung catheter.

		Garasan W. I.		 Perlahan-lahan sisipkan catheter melalui uretra ke dalam kandung kemih hingga urin mulai mengalir. Pastikan catheter dikeluarkan dengan hati-hati setelah selesai.
28.	Suction connecting	ACCON PENNECTI/IL	untuk tindakan pengeluaran cairan tubuh yang dihubungkan dari alat Suction Pump ataupun dari Regulator Outlet Vacuum Central	 Sambungkan satu ujung selang vakum ke mesin penghisap dan ujung lainnya ke saluran pencernaan atau luka pasien yang memerlukan penyedotan. Pastikan semua sambungan rapat agar tidak terjadi kebocoran udara atau cairan. Atur kekuatan penghisap sesuai dengan kebutuhan pasien dan instruksi medis yang diberikan.
29.	Tranfusion set	TENTUSION' Solution Administration Set TO THE PROPERTY OF THE	untuk membantu pemberian transfusi darah untuk memenuhi volume sirkulasi darah, memperbaiki kadar hemoglobin dan protein serum	 Bersihkan area penyuntikan dengan alkohol dan biarkan kering. Hubungkan bagian atas transfusi set dengan kantong darah atau cairan intravena yang akan disuntikkan. Sambungkan bagian bawah transfusi set dengan jarum atau kateter yang akan dimasukkan ke dalam pembuluh darah pasien. Atur kecepatan aliran transfusi

				sesuai dengan instruksi medis yang diberikan untuk menghindari kelebihan atau kekurangan aliran cairan.
30.	Tuberculin syringe	Contract Management of the second	Untuk menyuntikkan tuberculine guna mengetahuil pernah atau tidaknya seseorang terinfeksi penyakit TBC	Tes ini dilakukan dengan cara memberikan suntikan 0,1 ml cairan yang mengandung 5 TU (tuberculin unit) PPD ke lapisan kulit paling atas di bawah permukaan kulit lengan bawah.
31.	Urine bag	Urobag 2000	Alat berupa kantong yang dihubungkan dengan catheter untuk menampung air kencing pasien yang sedang berbaring. Selain keperluan drainase (secara umum), juga untuk memeriksa (mengukur volume urin).	 Mencuci tangan dan memakai sarung tangan, menanggalkan pakaian bagian bawah pasien, memasang selimut mandi, perlak dan pengalas bokong Memegang alat kelamin dengan tangan kiri Menarik preputium sedikit kepangkalnya, kemudian membersihkanya dengan kapas Kateter yang telah terpasang pada urine bag ujungnya diberi vaselin 20 cm Masukkan kateter perlahan – lahan kedalam utera 20 cm, jika kateter tertahan jangan dipaksakan. Pasien dianjurkan menarik nafas panjang dan masukkan kateter sampai urine

			MUN	keluar, kemudian menampung urine. Bila urine sudah keluar semua, anjurkan untuk menarik nafas panjang. Kateter dicabut pelanpelan dimasukkan kedalam botol berisi larutan klorin.
32.	Wing needle*	The same of the sa	Sebagai perpanjangan vena untuk transfuse i.v. (intra vena) jangka lama atau yang terputus putus (tidak boleh digunakan. 48 jam).	Dengan wing needle atau tabung vakum: tusuk bagian vena dengan posisi lubang jarum menghadap ke atas. Masukkan tabung ke dalam holder dan dorong sehingga jarum bagian posterior tertancap pada tabung, maka darah akan mengalir masuk ke dalam tabung. Tunggu sampai darah berhenti mengalir

(4) ALAT-ALAT BEDAH

No	Alat-alat bedah	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Arterie klem/artery forceps*	4	alat untuk menjepit (memegang/menekan) sesuatu benda. Biasanya klem ini digunakan untuk memasang karet behel oleh dokter gigi atau ahli gigi	Pegang arteri klem dengan jari lalu cepit benda yang akan dipakai
2.	Bandage scissors*	-8	Untuk menggunting perban, kain kasa	Siapkan perban dan bandage scissors lalu guntig perban dengan bandage scissors sesuai kebutuhan

3.	Benang jahit catgut chromic	CHROMIC CATOUT 3.00 Addressed Bernstein Constitution 7.5cm 2.15.15.15.36 2.15.15.36 2.15.	benang jahit untuk penjahitan luka yang dianggap belum rapat dalam waktu 10 hari	Masukkan benang jahit kejarum bedah, bius pasien terlebih dahulu sebelum melakukan operasi
4.	Benang jahit catgut plain	One Med PLAN CATOUT 20 Associates lavor (f. fr.) Associ	Menjahit jaringan lunak seperti otot, usus dan uterus. Dapat diserap 3- 7 hari	Masukkan benang jahit kejarum bedah, bius pasien terlebih dahulu sebelum melakukan
5.	Benang jahit silk*		Menjahit luka yang ada dikulit dan sering bergerak	Masukkan benang jahit kejarum bedah, bius pasien terlebih dahulu sebelum melakukan
6.	Bisturi		Pisau oprasi untuk pembedahan	Pegang bisturi dengan menggenggam

		Sterile Surgical Blades Sterile Surgical Blades Sterile Surgical Blades Many Mark Market Sterile Many		bagian bawah, pastikan pisau bisturi sudah disterilisasi, lalu arahkan ke tempat yang akan disayat
7.	Forceps/pinset anatomis*		untuk menjepit benda- benda kecil (termasuk keperluan praktek)	Tekan pada bagian tengah (bagian yang berisi garis) dengan menggunakan jari
8.	Forceps/pinset cilia*		Untuk menjapit dan mencabut rambut alis mata atau janggut pasien atau untuk mencabut rambut, untuk membantu proses melahirkan normal	Pasien akan dianstesi dulu, lalu pasang kateter urine untuk mengosongkan kandung kemih. Dokter akan membuat sayatan dijalan lahir untuk mempermudah proses mengeluarkan bayi dengan froceps
9.	Forceps/pinset sirugis*	J persons	untuk menjepit jaringan pada waktu diseksi dan penjahitan luka dan memberi tanda pada kulit sebelum memulai insisi	Genggam pinset dengan ibu jari dan dua / tiga jari lain dalam satu tangan, lalu gunakan untuk menggenggam objek / jaringan kecil dengan cepat dan mudah

10.	Forceps/pinset splinter*		Untuk mencabut pecahan dan kepingan benda- benda halus yang menancap pada kulit, seperti kesububan bambu	Jika ada pasien yang mengalami kecelakaan seperti terkena pecahan kecil, bisa diambil dengan alat ini (forceps)
11.	Gunting bedah mayo*		 Digunakan dalam pemotongan fasia gerota, uterus, payudara, dan jaringan lainnya Digunakan untuk prosedur hewan dan podriatik Untuk jaringan tubuh di dekat permukaan luka 	Selama pembedahan bila ada jaringan atau balutan yang tidak sesuai maka bisa dipotong dengan gunting bedah mayo
12.	Gunting bedah metzenbaum*	20	Gunting yang digunakan dalam instrument bedah (khitan, bersihkan luka dll) / obgyn yang digunakan untuk untuk menggunting benang, menggunting jaringan dan menggunting balutan	Pegang gunting dengan tangan kanan, lalu gunting perban atau bagian tubuh yang akan dilakukan pembedahan
13.	Gunting bedah runcing*		untuk memotong organ, membedah jaringan, mengangkat jaringan, memotong perban, melepaskan gips, dan memotong jahitan	Memegang gunting dengan ibu jari dan jari telunjuk untuk memotong organ tubuh

TUGAS KHUSUS PKL D3 FARMASI UMG_KARISMA CAHYANINGRUM_211105005_APOTEK K24 PPS GRESIK

14.	Gunting tali pusar*		Alat untuk memotong pusar bayi yang baru lahir	Genggam alat dengan tangan kanan lalu potong tali pusar pada bayi yang baru lahir
15.	Hecting set*	Heating Set	Untuk menjahit atau merawat luka	Membantu saat benang jahit keluar dan masuk kedalam kulit
16.	Jarum jahit	The second secon	untuk menjahit kulit yang terluka	Anestasi dulu, pembersihan luka, jahit luka dengan jarum jahit yang sesuai yang akan digunakan
17.	Klem mosquito*	4	meng-klem/ menjepit jaringan tubuh maupun pembuluh darah untuk menghentikan pendarahan dalam operasi serta fungsi- fungsi lainnya	Jepit jaringan dengan memegang klem dengan tangan kanan (dominan)

18.	Klem tali pusat/umbilical cordclem	Umbilical Cord Klem bahan NYLON STERILE (0) ② 50 pcs	Untuk menjepit dan memotong tali pusar bayi yang baru lahir	 Cuci tangan sesuai dengan prosedur cuci tangan Pakai sarung tangan Masukan karet dan henang pengikat tali pusat kedalam arteri klem Klem tali pusat bayi pada jarak + 4-5 cm dari pusat bayi Lakukan sedikit pengurutan kearah bayi Pegang dengan tangan kiri (telunjuk dan jari tengah) diantara kedua arteri klem lalu guntinglah tali pusat bayi Diantara kedua arteri klem tersebut dilakukan pengikatan dengan benang pengikat atau karet Bungkus tali pusat bayi dengan kassa steril Kemudian bayi ditolong lebih lanjut Setelah selesai tindakan mencuci tangan sesuai prosedur cuci tangan Dokumentasikan hasil tindakan
19.	Needle hoolders*	8	Untuk Memegang Jarum Jahit Untuk Menjahit Luka Bekas Sayatan, Atau Luka Robek Trauma Pada Kulit, Otot, Organ, Serta Jaringan Tubuh Lainnya.	Memotong benang dengan alat ini selama pembedahan

20.	Peritoneum forceps*	8	Untuk menjepit selaput perut	Genggam peritoneum dengan tangan kanan, jepit jaringan dengan peritoneum
21.	Skalpel*		Gagang pisau operasi	 Scalpel yang akan digunakan dalam keadaan steril dan tajam. Scalpel dipegang dengan erat. Batang scalpel harus membentuk sudut 30-40° dari garis irisan yang akan dibuat. Ibu jari ditempatkan di sebelah lateral batang scalpel, jari tengah dan jari manis ditempatkan di sebelah lateral dan ventri batang scalpel, sedangkan jari telunjuk ditempatkan di punggung pisau scalpel untuk dapat mengendalikan arah irisan dan memperkirakan dalamnya irisan. Pola irisan yakni dari atas ke bawah. Setiap selesai digunakan, Scalpel disimpan dalam keadaan bersih dan steril.

(5) Disinfektan

No	Disinfektan	Gambar	Kegunaan	Cara menggunak an
1.	Alkohol 70%	one 12	Sebagai antiseptik, membersihkan luka, dan membersihkan alat-alat medis	Dituang pada kassa steril atau kapas, lalu diusapkan pada luka atau alat medis.
2.	Alkohol swab	OTIES MABS White the design of the control of the	tissue alkohol yang dapat digunakan saat preinjection seperti suntikan insulin, pengambilan darah, sterilisasi alat kesehatan.	usapkan pada bagian tubuh sebelum dilakukan injeksi/ pengambilan darah, luka bekas injeksi/pengambilan darah, dan juga alat kesehatan
3.	H2O2 3%	Hydrogen Peroxide 3*	Sebagai desinfektan atau pembersih luka	Untuk penggunaan luar, digunakan secukupnya
4.	Povidone iodine		Membunuh kuman penyebab infeksi pada luka dan sariawan, mencegah timbulnya infeksi pada luka seperti: lecet, terkelupas, tergores, terpotong, terkoyak dan	dioleskan pada bagian yang sakit

TUGAS KHUSUS PKL D3 FARMASI UMG_KARISMA CAHYANINGRUM_211105005_APOTEK K24 PPS GRESIK

			juga sariawan.	
5.	Rivanol	New Color Co	Untuk membersihkan luka	Bubuhkan rivanol pada kapas, kemudian usapkan pada luka. bisa untuk membasuh luka

(6) APD


No	APD	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Apron	APRON ONE Alar proteksi dari percikan darah dan caran lan	Untuk Melindungi pengguna atau tenaga kesehatan terhadap penyebaran infeksi atau penyakit.	 ➤ Langkah-langkah Pemasangan: Tutupi badan sepenuhnya dari leher hingga lutut, lengan hingga bagian pergelangan tangan dan selubungkan ke belakang punggung Ikat di bagian belakang leher dan pinggang ➤ Langkah – langkah melepaskan : Bagian depan gaun dan lengan gaun pelindung telah terkontaminasi Lepas tali Tarik dari leher dan bahu dengan memegang bagian dalam gaun


				pelindung saja Balik gaun pelindung Lipat atau gulung menjadi gulungan dan letakkan di wadah yang telah di sediakan untuk diproses ulang atau buang di tempat limbah infeksius
2.	Masker	Masker Bedah Karet Washington Bedah Waret Sopes Sopes	Alat penutup hidung dan mulut untuk mencegh atau mengurangi hirupan udara / gas/zat berbahaya	 Sebelum menggunakan masker, lakukan hand hygiene/cuci tangan menggunakan sabun atau handrub. Gunakan masker bedah atau surgical mask dengan sisi yang berwarna di sisi luar. Pastikan bagian sisi masker yang terdapat kawat berada di sebelah atas. Posisikan masker menutupi seluruh bagian hidung, tarik bagian bawah hingga menutupi dagu. Tekuk kawat di bagian atas masker hingga mengikuti lekuk tulang hidung. Pastikan tidak ada celak antara masker dan wajah. Hindari menyentuh masker, terutama bagian luar, selama pemakaian. Jika tidak sengaja menyentuh masker, cuci tangan menggunakan sabun atau handrub.

			A A	Lepas dengan menarik tali belakang masker. Hindari menyentuh bagian luar masker. Ganti masker setiap terkontaminasi atau terasa lembap. Segera buang masker ke tempat sampah yang tertutup setelah masker dilepas. Jangan gunakan masker berulang kali. Kembali lakukan hand hygiene/cuci tangan menggunakan sabun atau handrub setelah melepas masker.
3.	Masker N95 disposible N95 Parkulate	Untuk melindungi pengguna atau tenaga kesehatan dengan menyaring atau menahan cairan darah, aerosol (partikel padat di udara), bakteri atau virus	A	Cara Pemasangan: Pastikan karet bagian atas dan bawah cukup elastis sebelum diaplikasikan ke wajah. Pegang bagian luar masker dan letakkan di bawah dagu, dengan bagian nosepiece/logam berada di bagian hidung. Selanjutnya, tarik karet atas ke bagian kepala atas dan karet bagian bawah ditarik ke arah belakang kepala. Sesuaikan nosepiece sesuai bentuk hidung Anda dengan cara menekan bagian logam. Cara melepas masker: Tarik karet bawah ke atas kepala dengan satu tangan dan tangan lainnya tetap

		1/5	MUH		memegang bagian luar penutup hidung dan mulut agar tetap di posisinya. Kemudian tarik bagian karet atas ke atas kepala. Selanjutnya, Anda dapat melepas bagian penutup hidung dan wajah. Masker ini hanya dapat digunakan sekali pakai.
4.	Non woven/surgical cap	Disposable Medical Nurse Caps * Ushravight, cost, confetable * Sine elastic leadment * One stor fits all * Kreep hair our of face and eyes	Sebagai penutup kepala atau rambut pada saat melakukan operasi untuk mencegah jatuhnya rambut pada tempat- tempat yang harusnya steril dari benda apapun	A A	Ikat rambut Anda dengan benar menjadi ekor kuda atau sanggul. Buka tutup yang terlipat, perluas elastisitasnya, dan letakkan di kepala Anda, menutupi semua rambut. Untuk topi scrub kuda poni, ikat pitanya untuk membuat kantong. Tempatkan topi di dahi Anda dengan kantong di bagian belakang. Jika topinya elastis, letakkan di dahi Anda. Dorong kuncir kuda Anda ke dalam kantong atau area elastis di bagian belakang. Ikat pita pada tutup kepala kuda poni dan silangkan di bawah sanggul Anda lalu ikat lagi. Potongan pas dibuat di bagian belakang kepala Anda dengan rambut di dalamnya.

			A	Selipkan rambut kecil yang menjuntai dari topi agar terlihat lebih rapi.
5.	Sarung tangan	Alat yang disarungkan pada tangan dengan objek yang disentuh	ke da bi da da	Buka kemasan sarung tangan steril. Periksa kemasan untuk memastikan tidak ada bagian yang sobek, mengalami diskolorasi, atau basah. Buang sarung tangan yang kemasannya sudah rusak. Bukanlah penutup luar kemasan. Pastikan Anda membukanya dari bagian atas, bawah, lalu samping. Ingat, Anda hanya memiliki margin sebesar 2,5 cm yang boleh disentuh. Cara ini membuat Anda bisa mengeluarkan kemasan steril berisi sarung tangan di bagian dalam. Ingat, sarung tangan steril memiliki batas kedaluwarsa dalam kemasan. Sebelum mengenakannya, pastikan sarung tangan belum kedaluwarsa. Step 2 Keluarkan bungkusan di dalam kemasan. eluarkan bungkusan di dalam kemasan. Keluarkan bungkusan di dalam kemasan dan letakkan di atas dang yang bersih. Pastikan Anda pat melihat kedua sarung tangan di dalamnya untuk memastikan emasan tersebut dibuka dengan





		MUH	sobekan. Periksa sarung tangan untuk memastikan tidak ada sobekan. Amati kedua sarung tangan secara saksama. Jika ada robekan, lubang, atau kerusakan lainnya, cuci lagi tangan Anda dan kenakan sarung tangan baru.
6.	Shoe cover*	Melindungi sepatu pengguna/tenaga kesehatan dar percikan cairan/darah	 Pegang bukaan penutupnya. Tempatkan bagian depan alas kaki ke dalam penutupnya. Tarik karet penutup ke bagian belakang sepatu dan masukkan tumit sepatu ke dalam penutup. Pastikan alas kaki tertutup dengan benar. Jika penutup sepatu menggunakan strip ESD, pastikan strip tersebut dimasukkan ke dalam kaus kaki atau sepatu Anda agar tidak menjuntai.
7.	Kaca mata google*	Melindungi mata dan area di sekitar mata pengguna atau tenaga medis dari percikan cairan atau darah atau droplet	 Kaca mata yang dipakai bersih dan sesuai dengan ukuran pekerja. Bingkai kaca mata di pakai yang benar (pada daun telinga). Kaca mata harus menutupi dan melindungi mata. Bila kaca mata sudah kotor harus segera dibersihkan agar tidak mengganggu pandangan. Setelah kaca mata dipakai harus


		dibersihkan	dan	diletakkan
		kembali pada	tempatr	nya

(7) ALKES UNTUK DIAGNOSA

No	Alkes untuk diagnosa	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Anaroid spygmomanometer*	CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR	Untuk mengetahui tekanan darah, mengetahui angka systole dan diastole jantung	 ▶ Mempersiapkan pengukuran . Orang yang akan diukur harus duduk dengan nyaman, kaki rata dan punggung ditopang. Bersantailah selama 5 menit dan jangan bicara. Sandarkan lengan kiri pada permukaan datar setinggi jantung dan telapak tangan menghadap ke atas. ▶ Gunakan Manset . Gunakan manset dengan ukuran yang tepat. Panjang kandung kemih harus sekitar 80% dari lingkar lengan atas dan lebarnya sekitar 40% dari lingkar. Bungkus manset di sekitar lengan atas dengan tepi bawah satu inci di atas fossa antecubital (lubang siku) seperti

yang ditunjukkan di bawah ini. Ini harus nyaman. > Tempatkan Lonceng Stetoskop. Harap diperhatikan bahwa stetoskop sering kali dijual terpisah. Tekan perlahan bel stetoskop pada arteri brakialis tepat di bawah tepi manset seperti yang ditunjukkan di bawah ini.. Mengembang Manset/Kandung Kemih . Pastikan katup udara bohlam inflasi ditutup dengan memutar searah jarum jam. Kembangkan manset dengan cepat hingga kirakira 180 mmHg. > Keluarkan Udara dan Dengarkan melalui Stetoskop. Putar katup sedikit berlawanan arah jarum jam, sehingga laju deflasi adalah 2 hingga 3 mmHg per detik seperti yang ditunjukkan pada pengukur. Secara bersamaan, dengarkan melalui stetoskop untuk mengetahui bunyi ketukan pertama (Korotkoff). Ini adalah pembacaan tekanan darah **sistolik** . Lanjutkan mendengarkan sampai suara berhenti. Ini ketukan adalah pembacaan tekanan diastolik.


		MILIA	Catat Hasil. Ambil setidaknya dua bacaan, dengan selang waktu 1 menit. Catat hasilnya. Jika tekanan darah terusmenerus tampak meningkat (di atas sekitar 120/80), hubungi ahli kesehatan untuk meminta nasihat.
2.	Electrical sphygmomanometer*	untuk mengetahui detak jantung dan tekanan darah manusia	 Usahakan pasien dalam keadaan tenang dan istirahatkan pasien dari seluruh aktivitas selama kurang lebih 15 menit sebelum dilakukan pengukuran Gunakan digital sphygmomanometer yang telah teruji validitasnya Posisikan pasien dalam kondisi berbaring atau duduk dengan posisi kaki tidak menyilang dan kedua telapak kaki menapak pada lantai Komunikasikan pada pasien untuk menyingsingkan pakaian yang menutupi lengan kanan hingga sekitar 2 cm di atas garis siku. Pastikan lengan pasien tidak terjerat oleh lengan pakaian yang telah disingsingkan sebelumnya



		➤ Tekan tombol "START/STOP"
		untuk mengaktifkan alat pengukur
		tekanan darah
		Biarkan alat pengukur tekanan
		darah melakukan proses
	- ENUM-	pengukuran tekanan darah hingga
		seluruh parameter yang ingin
1/		diukur (tekanan darah sistolik,
	- 2 - 1 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	tekanan darah diastolik, <i>mean</i>
		arterial pressure, dan nadi) terbaca
		pada monitor
		Lakukan pengukuran dengan
		langkah-langkah tersebut sebanyak
		2 kali, dengan memberikan jeda
	NA 1271 5- 188	antar pengukuran selama 2-5 menit
1.1	P NY S. VY SS W	dan pastikan lengan pasien terbebas
16.7		dari manset saat jeda
		Pastikan pasien tetap rileks hingga
		proses pengukuran berikutnya
		Bila didapati selisih antar
111		pengukuran melebihi 10 mmHg,
1/		maka lakukan pengukuran ketiga
	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	dengan memberikan jeda 10 menit
	7 - M - 2 1 1 1	terhitung sejak selesainya proses
		pengukuran tekanan darah yang
		kedua

				Catat hasil pengukuran dengan merata-rata nilai yang diperoleh dari seluruh pengukuran
3.	Mercurial sphygmomanometer*		Untuk mengukur tekanan darah, beberapa angka systole (jantung menguncup) dan diastole (jantung mengembang kembali) atau mengukur tekanan darah (lebih akurat, bebas air raksa)	Lengan pasien diminta untuk lurus lalu padang manset dilengan, pompa sampai selesai.
4.	Chart vision Snellen*	CB DLN FZBDE OFLCTG NERTYZBDFHKO	Alat bertuliskan huruf-huruf dengan ukuran besar tertentu misalnya huruf E harus jelas terlihat pada jarak 200 feet.	 Anda diminta duduk atau berdiri berjarak 6 meter dari bagan Snellen Tutup salah satu mata dengan tangan Pemeriksaan dimulai dari mata yang lebih buram Dengan satu mata tertutup, Anda diminta membaca huruf dari baris paling atas ke bawah Jika tes mata tidak mencapai barisan dengan angka 20/20 atau 6/6 maka pemeriksaan akan dilanjutkan dengan menggunakan kacamata pinhole Pemeriksaan akan diulang dengan mata lainnya
5.	Ear speculum*		Untuk memperlebar lubang	Spekulum di fixasi dengan ibu jari dan

			telinga, sehingga dapat melihat dan memeriksa keadaan ronggga didalamnya.	jari telunjuk, daun telinga di jepit dengan menggunakan jari tengah dam jari manis tangan kiri, sebaliknya di lakukan apabila ingin memeriksa telinga kiri
6.	Ear thermometer*	ThurseOne One One One One One One One One One	Termometer digital yang berfungsi mengukur suhu tubuh melalui telinga pada pasien dewasa, anak-anak dan neonatus.	Tarik bagian atas daun telinga ke atas dan ke belakang. Masukkan perlahan ujung termometer ke dalam liang telinga menuju gendang telinga.
7.	Gelang pasien		untuk membantu mengidentifikasi pasien	 Pastikan setiap pasien sudah mendapatkan identifikasi secara benar, sebelum pemberian obatobatan, pengambilan darah dan sebagainya terkait dengan penanganan medis. Kenakan gelang identifikasi pada pergelangan tangan secara tepat agar tidak mudah terlepas. Kemudian jelaskan kepada pasien untuk selalu menjaganya agar data yang tercantum tidak hilang. Bagi pasien homodialisis jangan pasangkan gelang pada bagian lengan yang ada fistulanya.



		Dengan begitu, mereka juga turut menjaganya dan tidak melepasnya sendiri. Pastikan sebelum memasang gelang pasien, untuk mengecek ulang data yang tertulis minimal tiga kali agar tidak terjadi kesalahan. Verifikasi data harus valid, kalau ternyata pasien tidak bisa memberikan informasi akuratnya dikarenakan sedang tidak sadarkan diri, masih bayi, menderita gangguan jiwa, dan sebagainya, maka petugas medis harus menanyakannya kepada pengantar atau keluarganya. Setiap pergantian perawat maka harus dilakukan pengecekan terhadap data dari gelang pasien tersebut.
8.	Head lamp*	Untuk memeriksa rongga telinga, hidung, tenggorokan dan mata (sama dengan head mirror and head band), tetapi melalui sinar langsung Pasang lampu kepala shg tabung lampu berada di antara kedua mata. Letakkan telapak tangan kanan pd jarak 30 cm di depan mata kanan Mata kiri ditutup Proyeksi tabung harus tampak terletak medial dari proyeksi cahaya & saling bersinggungan

9.	Hemometer*	Untuk menentukan kadar hemoglobin darah	 Pertama-tama dengan menggunakan desinfektan berupa kapas alkohol 70% ujung jari pasien dibersihkan untuk menghindari kontaminan dari mikroorganisme. Setelah itu menusuk salah satu ujung jari dengan menggunakan lancet atau autoklik. Langkah selanjutnya adalah mengusap darah pertama yang keluar pada ujung jari dengan menggunakan tisu. Kemudian tetes darah berikutnya dihisap dengan menggunakan pipet sahli sampai batas 20 mikroliter. Selanjutnya darah dimasukkan kedalam tabung sahli yang sebelumnya telah diisi dengan HCL 0,1 N sampai tanda 2. Pada proses ini pipet dibilas dengan jalan menghisap dan mengeluarkan HCL dari dalam pipet sebanyak tiga kali. Kemudian menghomogenkan darah dengan HCL menggunakan tangkai pengaduk. Selanjutnya menambahkan tetes demi tetes aquades kedalam tabung sahli sampai warna yang ditampilkan serupa dengan standar sahli.

			8. Langkah terakhir adalah membaca hemoglobin dengan membaca tinggi permukaan cairan pada tabung pengukur atau miniskus kemudian dibandingkan dengan standar pembanding.
10.	Ishihara's test for coulourblindnesss*	Buku tes untuk mengetaui apakah mengetaui apakah seseorang mengala buta warna	Tes buta warna ini dilakukan dengan menggunakan lingkaran yang terdiri dari banyak titik dengan warna dan ukuran yang berbeda. Beberapa titik akan membentuk angka yang harus ditebak.
11.	Laringeal mirror*	Untuk melihat dan keadaan dalam mu kerongkongan apal kelainan	lut dan mulut dengan permukaan cermin
12.	Nasal speculum*	Untuk memperleba hidung, sehinngga dan memeriksa kea didalamnya	dapat melihat masukan ke lubang hidung dengan posisi

13.	Pen needle	jarum suntik untuk penggunaan pena insulin yang digunakan untuk mengendalikan kadar gula dalam darah pada penderita Diabetes Tipe 1 dan 2	 Tab pelindung . Ini membantu menjaga jarum tetap bersih. Anda harus melepasnya sebelum memasang jarum ke pena insulin. Tutup jarum bagian luar . Ini menutupi jarum sebelum dan sesudah digunakan.
			Tutup jarum bagian dalam . Ini membantu menjaga jarum tetap bersih sebelum digunakan.
	Z/ 19	125	Sebuah jarum . Beginilah cara suntikan diberikan ke kulit.
14.	Percussion hammer*	Untuk mengetuk rongga dada depan dan belakang (punggung) unuk mengetahui keadaan organ di dalamnya	 Petugas memberikan penjelasan kepada pasien tentang pemeriksaan yang akan dilakukan Petugas mempersiapkanalat, pasien dan operator. Petugas menyuruh pasien untuk di pinggir tempat tidur dengan posisi 2 kaki menggantung lemas dan lutut fleksi 90 derajat Petugas berdiri pada sisi kanan pasien Petugas menahan kaki pasien pada fossa popliteadengan tangan kiri Petugas mencari 2cekungan pada lutut di bawah patella inferolateral/inferomedial Petugas mengayunkan hammer refleks sebatas kekuatan ayunan pergelangan tangan diatas tendon patella.

				Petugas melihat gerakan ekstensi pada lutut akibat kontraksi otot quadriceps femoris Petugas cuci tangan dan merapikan alatalat Petugas mencatat hasil pemeriksaan Hammer refleks
15.	Pulse meter*	OxyONE	untuk mengukur tingkat saturasi atau kadar oksigen dalam darah	 Pastikan kamu tidak menggunakan aksesori di area tangan dan cat kuku pada jari untuk pengecekan saturasi oksigen. Buat tangan dan jari lebih rileks. Letakkan alat saturasi dengan posisi yang tepat. Pastikan alat saturasi oksigen menyala hingga tanda pemeriksaan selesai. Lepaskan oximeter saat sudah mengetahui hasil pemeriksaan.
16.	Rectum speculum*		Untuk memeriksa dubur	Pasien harus melepas celana dalamnya dan mengambil posisi yang membuat anus diakses. Dokter mungkin meminta pasien untuk berbaring menyamping, tekuk atas meja periksa, atau duduk di atas meja dengan lutut terselip ke dada. Sebelum memasukkan spekulum, akan dilumasi untuk mencegah ketidak nyamanan dan dokter mungkin meminta push pasien seakan mencoba untuk membuat gerakan usus dan kemudian duduk santai. Dokter kemudian akan

				memasukkan dengan lembut spekulum dan bersinar cahaya ke dalam tabung untuk menerangi setiap celah, atau air mata di lapisan rektum, tonjolan, atau kelainan lainnya. Seringkali, dokter dapat memberikan pasien hasil ujian segera.
17.	Reflex hamer*	NEUROLOGICAL REFLEX HAMMERS	Untuk memeriksa kemampuan refleksi syaraf dengan cara mengetuk bagian tubuh tertentu, misalnya lutut.	 Petugas memberikan penjelasan kepada pasien tentang pemeriksaan yang akan dilakukan Petugas mempersiapkanalat, pasien dan operator. Petugas menyuruh pasien untuk di pinggir tempat tidur dengan posisi 2 kaki menggantung lemas dan lutut fleksi 90 derajat Petugas berdiri pada sisi kanan pasien Petugas menahan kaki pasien pada fossa popliteadengan tangan kiri Petugas mencari 2cekungan pada lutut di bawah patella inferolateral/inferomedial Petugas mengayunkan hammer refleks sebatas kekuatan ayunan pergelangan tangan diatas tendon patella. Petugas melihat gerakan ekstensi pada lutut akibat kontraksi otot quadriceps femoris Petugas cuci tangan dan merapikan alat-alat

			Petugas mencatat hasil pemeriksaan Hammer refleks
18.	Spirometer*	Untuk mengukurfungsi paru paru manusia. Alat ini akan mengukur volume statik dan volume dinamik paru paru	 Duduklah tegak di kursi yang nyaman atau di tepi tempat tidur Anda. Pegang perangkat dalam posisi tegak dengan kedua tangan. Geser indikator ke level target (indikator biasanya berada di sebelah kiri dekat corong). Penyedia layanan kesehatan Anda akan memberi tahu Anda harus mulai dari mana, tetapi 1.250 milimeter (mm) adalah perkiraan yang bagus. Anda mungkin perlu menambah atau mengurangi level ini, bergantung pada tujuan Anda. Tempatkan corong di mulut Anda dan tutup bibir Anda di sekitarnya. Usahakan untuk tidak menghalangi corong dengan lidah Anda. Tarik napas perlahan dan sedalam mungkin. Piston di bawah indikator harus naik ke dalam kolom. Ketika Anda telah mencapai kapasitas penuh untuk menarik napas, lepaskan corong dan tahan napas Anda setidaknya selama tiga detik (atau selama Anda bisa). Piston akan turun ke dasar kolom. Jika Anda mulai merasa pusing atau pusing, istirahatlah.

		MILLE	 Buang napas secara normal, lalu istirahat. Batuk untuk membersihkan saluran napas dari lendir jika diperlukan. Atur ulang indikator ke tingkat yang Anda capai selama upaya terbaik Anda.
19.	Stethoscope binaural*	Untuk mendengar bunyi organ dalam tubuh, seperti jantung dan paru paru	 Pilih tempat yang tenang untuk menggunakan stetoskop Atur posisi pasien Tentukan untuk menggunakan diagfragma atau bell Mintalah pasien untuk mengenakan baju atau melepas baju agar kulitnya tidak tertutupi
20.	Stethoscope monoaural*	Untuk mendengar bunyi jantung bayi dalam perut ibu hamil.	 Tempat mendengarkan harus tenang, agar tidak mendapat gangguan dari suara lain. Pemeriksaan ini sebagai lanjutan dari pemeriksaan palpasi. Mencari daerah atau tempat dimana kita akan mendengarkan biasanya merupakan punggung bayi. Setelah daerah ditemukan, stetoskop pinard di pakai bagian yang berlubang luas ditempatkan keatas tempat atau daerah dimana kita akan mendengarkan. Sedangkan bagian yang luasnya sempit ditempatkan pada telinga kita, letakkan tegak lurus

				 Kepala pemeriksa dimiringkan, perhatian dipusatkan pada denyut jantung janin. Bila terdengar suatu detak, maka untuk memastikan apakah yang terdengar itu denyut jantung janin, detak ini harus disesuai dengan detak nadi ibu. Bila detakkan itu sama dengan nadi ibu, yang terdengar bukan jantung janin, tetapi detak aorta abdominalis dari ibu. Setelah nyata bahwa yang terdengar itu betul-betul denyut jantung janin maka dihitung untuk mengetahui teraturnya dan frekuensinyadenyut jantung janin itu.
21.	Stopwatch*	45 55 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Untuk mengukur lamanya waktu yang telah berlalu atau yang dibutuhkan	 Mempersiapkan stopwatch yang akan digunakan untuk mengukur waktu. Memastikan kondisi stopwatch dalam keadaan nol atau sudah terkalibrasi. Menekan tombol start atau mulai untuk memulai pengukuran waktu. Menekan tombol stop atau berhenti untuk mengakhiri pengukuran waktu. Membaca hasil pengukuran waktu.

		-/ ₁ 5	MUHA	Untuk mengulangi pengukuran waktu, yang harus dilakukan adalah menekan tombol <i>start</i> atau <i>stop</i> 1 kali dan jarum akan kembali ke nol. Kemudian tekan tombol <i>start</i> lagi untuk kembali memulai pengukuran waktu dan tekan <i>stop</i> untuk mengakhiri.
22.	Termometer digital*		Alat yang secara otomatis menunjukkan suhu badan	 Nyalakan termometer dengan menekan atau menggeser tombol ON. Masukkan termometer secara perlahan dan hati-hati ke dalam mulut, lipatan ketiak atau liang telinga anak. Untuk pengukuran melalui anus, pastikan sudah memberi cukup pelumas. Biarkan selama 3 sampai 5 menit atau tunggu sampai ada bunyi yang menunjukkan pengukuran suhu sudah selesai dilakukan. Setelah itu, ambil termometer dan baca hasil yang tertera pada layar.
23.	Termometer oral	Thermoone ALPHA 3 DOTTAL CURNCAL THERMONTER PROPERTY OF THERMONTER AND THE THERMONT	Untuk mengukur suhu tubuh / badan melalui mulut	Meletakkan ujung termometer di bagian bawah lidah dan tutup mulut hingga alat mengeluarkan bunyi tertentu.

TUGAS KHUSUS PKL D3 FARMASI UMG_KARISMA CAHYANINGRUM_211105005_APOTEK K24 PPS GRESIK

24.	Termometer rektal*	GLINICAL THERMOMETER Franklin MEDIUM MERE 12FG	alat pengukur suhu tubuh digital, yang digunakan dengan memasukkannya ke dalam anus	Bersihkan termometer terlebih dahulu dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Lalu, lapisi dengan pelumas berbahan dasar air dan masukkan ujung termometer ke dalam anus
25.	Timer lab*	Service Servic	sebagai penanda waktu apakah sebuah rekasi telah berjalan sempurna	Searah jarum jam hingga ke angka 55 kemudian diputar balik kearah waktu sesuai yang diinginkan
26.	Tongue depressor		Untuk menekan lidah, melihat keadaan tenggorokan apakah ada peradangan seperti pharyngitis, amandel	 Petugas Cuci Tangan Identifikasi Pasien Jelaskan tindakan yang akan dilakukan kepada pasien dan keluarga Anjurkan pasien untuk membuka mulut Letakkan tongue spatel dari atas lidah pasien untuk melakukan pemeriksaan Lepaskan tongue spatel dari atas lidah dan keluarkan dari mulut pasien Rapikan alat Petugas cuci tangan Dokumentasikan hasil pemeriksaan pada berkas rekam medis pasien
27.	Tourniquet		Untuk mengontrol aliran darah pada vena atau arteri dengan cara	Tourniquet dipasang pada 3-4 inci di atas tempat tusukan. Jika terlalu dekat dari

		TOURNIQUET	menekan dan melepas dalam rentang waktu tertentu.	tempat tusukan,vena dapat kolaps ketika darah terisap ke dalam tabung dan jika terlalu jauh dari tempat tusukan pengambilan darah tidak akan efektif. Pasien yang memiliki kulit sensitif atau mengalami dermatitis, maka pemasangan tourniquet dilakukan diatas kain kering atau kasa yang melihat lengan. Ketika tourniquet telah terpasang, mintalah pasien untuk mengepalkan tangan sehingga pembuluh darah di lengan akan menjadi lebih menonjol, sehingga lebih mudah untuk mencari dan menusukkan jarum.
28.	Vaginal speculum*		Untuk memperlebar vagina, sehingga memudahkan pemeriksaan dan pemansangan alat-alat KB.	 Sterilisasi spekulum vagina atau cocor bebek 1. Rendam spekulum di dalam tarutan clorin 0.5% selama 10 menit. Larutan klorin juga disebut dengan kaporit (Kalsium Hipoklorit yang digunakan sebagai agen pemutih atau desinfektan. Senyawa ini adalah komponen yang digunakan dalam pemutih komersial, larutan pembersih, dan disinfektan untuk air minum, sistem pemumian air kolam renang) 2. Setelah Grendam kemudian dibersihkan dengan menggunakan air bersih mengalir 3. Keringkanlah spekulum



	menggunakni kain bersih 4. Setelah kering masukkan spekulum pada air mendidih dan biarkan sampai 20 menit
	Cara penggunaan spekulum vagina atau cocor bebek
	1. Pegang spekulum vagina pada bagian gagangnya, lalu kunci baut spekulum dibuka
	2. Masukkan dalam vagina, dimana spekulum masih dalam keadaan tertutup dan dalam posisi miring
18 9-16	3. Setelah masuk putar spekulum, kemudian buka spekulum (bagian cocor bebek)
	4. Kunni baut spekulum (kunci dengan paten jangan sampal longgar), selanjutnya pemeriksaan siap dilakukan

Gresik, 06 Juni 2024 Dosen Pembimbing PKL

Diah Ratnasari, S.Farm., Apt,. M.T

NIDN. 0721119001.

Gresik, 06 Juni 2024 Pembinibing Lapangan Apotek K24 PPS Gresik

Apt. Edri Zulfikar Fahmi, S. Farm

No. SIPA: 19940830/SIPA_35.25/2020/11767

A. SWAMEDIKASI

Buatlah studi kasus setiap harinya dengan katagori obat yang berbeda dan wajib menelesaikan 20 jenis Obat yang tertera dalam tabel

No	Nama obat	Kategori	Studi Kasus	Patient assesment	Pemilihan Obat dan alasannya	Pelayanan informasi obat
1.	Analgetik dan antipiretik	paracetamol; ibuprofen	Pasien datang dengan keluhan pusing	W: pasien dewasa W: pusing H: 6 jam lalu A: tidak ada M: tidak ada	Obat yang terpilih proris tablet tab (ibuprofen) Alasannya karena ibuprofen bisa untuk analgesik dan antiinflamasi	Indikasi: meredakan nyeri, sakit kepala Cara penggunaan: 3x sehari sesudah makan (bila nyeri) Kapan berhenti: apabila sudah tidak nyeri Kapan harus ke dokter: apabila dalam 3 hari keluhan masih sama atau bertambah parah ESO yang sering: mual, nyeri lambung Cara menyimpan: di tempat kering dan sejuk serta terhindar dari cahaya matahari lansgung

2.	Batuk	gliseril guaiakolat (guafenisin), bromheksin, diphenhidramin, asetilsistein, noskapin	Pasien datang dengan keluhan batuk kering dan tenggorokan gatal sudah seminggu tidak sembuh	W: pasien dewasa W: batuk kering dan tenggorokan gatal H: 1 minggu A: woods ekspektoran syr M: tidak ada	Obat yang terpilih longatin 50mg (noscapin) dan sominal tablet (diphenhidra mine) Alasannya	Indikasi: batuk, kering Cara penggunaan: longatin (noskapin) = 3 x sehari 1 tab Sominal (diphenhidramine) = 3x sehari 1 tablet Kapan berhenti:
			RES		karena Noscapine merupakan obat antitusif yang bisa menekan refleks batuk dan diphenhidra mine untuk mengurangi rasa gatal ditenggoroka n	kalau sudah tidak batuk dan sudah tidal gatal ditenggorokan Kapan harus ke dokter : apabila sudah 1 minggu setelah pengunaan obat ini tetapi batuk tidak kunjung reda atau malah bertambah parah ESO yang sering : mual, pusing Cara menyimpan : simpan di tempat kering dan sejuk serta terhindar dari sinar matahari langsung

3.	Obat Flu	Sediaan kombinasi parasetamol, dekstrometorfan,gliseril guaiakolat (guafenisin), CTM, dan efedrin/pseudoefedrin/ fenilpropanolamin	Pasien datang dengan keluhan panas, batuk pilek	W: anaknya SMP kelas 3 W: panas batuk pilek H: 2 hari lalu A: tidak ada M: tidak ada	Obat yang terpilih flucadex tab Alasannya flucadex tablet merupakan obat dengan kandungan chlorphenira mine maleate, glyceryl guaiacolate, paracetamol, dekstrometor fan dan phenylpropa nolamine HCl. Flucadex digunakan untuk meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat	Indikasi :meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat dan bersin-bersin yang disertai batuk. Cara penggunaan: 3 x sehari 1 tab sesudah makan Kapan berhenti: bila sudah tidak ada gejala Kapan harus ke dokter: jika dalam 1 minggu setelah pemakaian obat gejala tidak kunjung membaik atau malah semakin parah ESO yang sering: mengantuk Cara menyimpan: simpan di tempat kering dan sejuk serta terhindar dari
		// G	RES	14		kering dan sejuk

					disertai batuk kering maupun batuk berdahak	
4.	Obat Maag	Antasida, antagonis H2 (ranitidine, famotidine)	Pasien datang dengan keluhan nyeri di daerah ulu hati merasa mual muntah dan sering telat makan, sudah minum Lambucid tablet tapi masih mual dan nyeri	W: pasien dewasa W: nyeri ulu hati dan mual muntah H: 4 jam yang lalu A: tidak ada M: tidak ada	Obat yang terpilih famocid 40mg tab (famotidin) Alasannya karena famocid dapat menekan produksi asam lambung yang membuat pasien merasa mual muntah	Indikasi: mengatasi kondisi yang disebabkan oleh produksi asam lambung berlebih, seperti penyakit asam lambung (GERD) dan sakit maag Cara penggunaan: 1 x sehari sebelum makan Kapan berhenti: maksimal terapi 4 minggu Kapan harus ke dokter: apa bila dirasa gejala bertambah parah ESO yang sering: - Cara menyimpan: simpan di tempat kering dan sejuk serta terhindar dari sinar matahari langsung

5.	Kecacingan	Pirantel pamoat, piperazin, mebendazol	Pasien datang dengan mau beli obat cacing untuk anaknya yang masih kelas 6 SD mengeluhkan rasa gatal di anus tetapi tidak bisa minum obat tablet	W: anak SD kelas 6 W: rasa gatal di anus H: 3 hari yang lalu A: tidak ada M: tidak ada	Obat yang terpilih vermox tab (mebendazol e) Alasannya karena vermox merupakan tablet kunyah, sehingga cocok untuk adeknya yang tidak minum obat tablet	Indikasi: untuk mengobati akibat cacing kremi, cacing gelang, cacing tambang, cacing cambuk Cara penggunaan: 1 tab / 6 bulan Kapan berhenti: baiknya diminum rutin tiap 6 bulan sekali Kapan harus ke dokter: - ESO yang sering: pusing, mual muntah Cara menyimpan: simpan di tempat kering dan sejuk serta terhindar dari sinar matahari langsung
6.	Diare	Attalpugit, kaolin pectin, oralit, Norit	Pasien datang dengan keluhan diare cair sudah 5 kali dari tadi pagi (4 jam yang lalu). sudah mengkonsumsi obat lodia tadi pagi tapi masih diare	W: pasien dewasa W: diare sering dan cair H: 4 jam yang lalu A: tidak ada M: lodia	Obat yang terpilih diagit tablet (attapulgit dan pectin) dan oralit Alasannya karena attapulgit	Indikasi: diagit tablet (attapulgit, pectin) = diare oralit = mengembalikan cairan tubuh yang hilang akibat diare Cara penggunaan: diagit tablet =

					dan pectin dapat membuat tinja jadi lebih padat dan dapat mengurangi frekuensi diare. Oralit untuk mengembali kan cairan tubuh yang hilang supaya tidak lemas	diminum 2 tab sesudah buang air besar max 12 tab selama 24 jam oralit = 3 jam petama max 12 gelas, selanjutnya 2 gelas tiap diare Kapan berhenti: apabila diare sudah berhenti Kapan harus ke dokter: apabila dirasa lemas dan diare tak kunjung berhenti ESO yang sering: konstipasi ringan Cara menyimpan: simpan di tempat kering dan sejuk serta terhindar dari sinar matahari langsung
7.	Laksatif	Bisakodil, laktulosa, Na lauril sulfat.	Pasien datang dengan keluhan anaknya yang masih 5 tahun menangis karena susah BAB dan merasakan nyeri saat mau buang air besar, sudah 5	W: anak 5 tahun W: sembelit H: baru saja A: tidak ada M: tidak ada	Obat yang terpilih dulcolax 5mg suppo (bisakodil) Alasannya karena dulcolax	Indikasi: terapi konstipasi Cara penggunaan: anak-anak dibawah 12 tahun 1 suppo 5mg Kapan berhenti: - Kapan harus ke

		// K	hari tidak BAB	MA M	suppo memberian efek terapi yang cepat (kurang lebih 5 menit) dan bisa mengurangi nyeri saat buang air besar	dokter: apabila dalam 2 hari pemakaian obat tidak berefek ESO yang sering: nyeri perut Cara menyimpan: disimpan di tempat bersuhu dingin (2°c - 8°c) pintu lemari es
8.	Biang keringat, pruritus, antihistamintopikal	Salisil talk dan sediaan yang mengandung kalamin; ldifenhidramin 2%, prometazin HCl 2%.	Pasien datang dengan keluhan sudah 3 hari anaknya yang masih berumur 1 tahun mengalami biang keringat di dahi, leher dan punggung	W: bayi usia 1 tahun W: biang keringat H: 3 hari A: bedak bayi M: tidak ada	Obat yang terpilih caladine lotion (kalamin, dipenhydram in 2%) Alasannya karena masih bayi sebaiknya menggunaka n sediaan yang lotion, apabila menggunaka n sediaan bedak takutnya butiran - butiran	Indikasi: mengobati gatal biang keringat dan gigitan serangga Cara penggunaan: kocok dulu sebelum digunakan, oleskan tipis - tipis 2-4 kali sehari di kulit yang terkena biang keringat Kapan berhenti: apabila biang keringat sudah hilang Kapan harus ke dokter: jika keluhan bertambah parah atau terjadi efek samping

			5 MU	141	powdernya terhirup oleh bayi	alergi ESO yang sering: alergi, timbuk rasa terbakar Cara menyimpan: simpan di tempat yang kering dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung
9.	Jerawat	Obat yang mengandung sulfur; resorsinol; asam salisilat; benzoil peroksida; triclosan, minosiklin1%.	Pasien datang usia 15 tahun meminta obat jerawat salep, jerawatnya meradang dan masih baru	W: pasien remaja usia 15 tahun W: jerawat ringan H: 3 hari A: tidak ada M: tidak ada	Obat yang terpilih benzolac 2,5% cream Alasannya karena jerawat masih baru dan jerawat meradang	Indikasi: kulit berjerawat Cara penggunaan: sesuai kebutuhan Kapan berhenti: apabila jerawat sudah kempes atau menghilang Kapan harus ke dokter: apabila jerawat bertambah dan parah ESO yang sering: iritasi, reaksi alergi Cara menyimpan: simpan di tempat yang kering dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung

10.	Kadas/kurap, antifungi	Obat yang mengandung klotrimazol 1%,mikonasol nitrat 2%, ketoconazole nitrat	Pasien datang berusia 45 tahun mengeluhkan sudah seminggu sela - sela jari kaki gatal karena sering terkena air saat mencuci	W: pasien usia 25 tahun W: gatal jamur H: 7 hari A: tidak ada M: tidak ada	Obat yang terpilih Daktarin cr (miconazole) Alasannya karena daktarin cr mengandung miconazole yang dapat menghentika n jamur dan menghambat pertumbuhan jamur	Indikasi: infeksi fungi Cara penggunaan: oleskan tipis-tipis 2 kali sehari Kapan berhenti: apabila keluhan sudah hilang Kapan harus ke dokter: apabila sudah 4 minggu keluhan tidak kunjung membaik atau bertambah parah ESO yang sering: rasa terbakar Cara menyimpan: simpan di tempat yang kering dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung
11.	Ketombe	Shampoo yang mengandung Selenium sulfid, Zincpyrithione.	Pasien datang usia 18 tahun dengan keluhan sudah 2 hari gatal di kepala dan ditemukan ketombe saat menggaruk- garuk kepala	W: pasien usia 18 tahun W: ketombe ringan H: 2 hari A: tidak ada M: tidak ada	Obat yang terpilih selsun yellow (selenium sulfid) Alasannya selsun yellow	Indikasi: menghilangkan ketombe Cara penggunaan: dapat digunakan setiap hari Kapan berhenti: - Kapan harus ke dokter: apabila

			karena kebiasaan pasien yang setelah keramas langsung mengikat rambut dan menggunakan kerudung saat keadaan rambut masih basah	19/10	merupakan sediaan sampo anti ketombe yang ringan dan aman digunakan sehari hari	keluhan bertambah parah sampai terdapat luka-luka di kulit kepala ESO yang sering: Cara menyimpan: simpan di tempat yang kering dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung
12.	Kutil	obat yang mengandung asam salisilat 2 g, asam laktat 0,5 g.	Pasien datang usia dewasa mencari obat kutil baru muncul kemaren	W: pasien dewasa W: kutil H: 1 hari A: tidak ada M: tidak ada	Obat yang terpilih callusol (asam salisilat 2g, asam laktat 0,5g) Alasannya karena dapat melunakkan kulit yang mengeras akibat mata ikan, kutil, atau kapalan, sehingga mempercepat proses pengelupasa n dan	Indikasi: mata ikan, kutil Cara penggunaan: oleskan tipis" menggunakan cotton bud 2x sehari atau sesuai kebutuhan Kapan berhenti: apabila kutil sudah hilang Kapan harus ke dokter: apabila terjadi efek samping yang berlebih atau berbahaya ESO yang sering: - Cara menyimpan:

					pergantian sel kulit.	simpan di tempat yang kering dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung
13.	Luka bakar	Obat yang mengandung perak sulfadiazin; oleum iecoris aselli (minyak ikan,"levertraan").	Pasien dewasa datang dengan keluhan tangannya tertuang air panas baru saja	W: pasien dewasa W: luka bakar H: baru saja A: disiram air dingin M: tidak ada	Obat yang terpilih burnazin cr (perak sulfadiazin) Alasannya karena dapat mengobati luka bakar semua tingkat keparahan	Indikasi: luka bakar Cara penggunaan: 2 x sehari dioles tipis Kapan berhenti: apabila luka sudah semuh Kapan harus ke dokter: apabila timbul reaksi alergi yang parah ESO yang sering: rasa terbakar, gatal, ruam kulit Cara menyimpan: simpan di tempat yang kering dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung
14.	Luka iris	Povidon iodine	Pasien remaja usia 18 tahun datang dengan keluhan sariawan dan bau mulut	W: pasine usia 18 tahun W: sariawan dan bau mulut H: baru saja A:-	Obat yang terpilih betadine gargle (povidon iodin 1%)	Indikasi : cairan kumur antiseptik Cara penggunaan: kumur selama 30 detik, lakukan 3-5 kali sehari atau


				M: tidak ada	Alasannya karena betadine gargle (povidon iodine 1%) merupakan obat kumur antiseptik yang bermanfaat untuk keluhan di rongga mulut seperti mengobati sariawan dan bau mulut	seuai kebutuhan Kapan berhenti: apabila sariawan sudah sembuh atau sebaiknya digunakan sesekali untuk mencegah bau mulut Kapan harus ke dokter : apabila terjadi sariawan bertambah parah ESO yang sering : reaksi hipersensitifitas terhadap povidone iodine Cara menyimpan : simpan di tempat yang kering dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung
15.	Alergi	Klorfeniramin maleat, prometazine, diphenhidramine, deksklorfeniramin maleat, loratadine, cetirizine.	Pasien dewasa datang menunjukkan kulit tangannya gatal gatal seperti biduran. Pasien mengatakan kalau malam sering timbul	W: pasien dewasa W: alergi H: sering terjadi di malam hari A: tidak ada M: tidak ada	Obat yang terpilih Tiriz tablet (cetirizine) Alasannya karena cetirizine dapat mengobati	Indikasi: mengobati rinitis alergi Cara penggunaan: diminum 2x sehari Kapan berhenti: apabila sudah tidak timbul alergi Kapan harus ke


			seperti ini	144	rinitis alergi yang menyebabka n kantuk dan penggunaaan nya hanya sehari sekali pada malam hari	dokter: apabila gatal bertambah parah ESO yang sering: - Cara menyimpan: simpan di tempat yang kering dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung
16.	Vitamin dan mineral	Vit C, Vit A, Vit B1, Vit B6, Vit B12, Vitamin D, Asam folat, Mn, Zn, Fe, dll	Pasien datang minta multivitamin untuk anaknya karena anaknya sedang kuliah lagi banyak-banyaknya aktifitas	W: pasien dewasa W: multivitamin H:-A: tidak ada M: tidak ada	Obat yang terpilih provital plus kapsul Alasannya kandungan multivitamin dan mineralnya lengkap	Indikasi: multivitamin daya tahan tubuh Cara penggunaan: diminum 1 x sehari Kapan berhenti: diminum setiap hari tidak apa Kapan harus ke dokter: apabila timbul efek samping yang tidak diinginkan ESO yang sering: Cara menyimpan: simpan di tempat yang kering dan terhindar dari paparan sinar

						matahari langsung
17.	Antiseptik dan disinfektan	Alkohol 70%, povidone iodine 10%, klorheksidin, setrimida 0,5%, serbuk PK.	Pasien dewasa mengeluhkan sariawan sudah 5 hari. Pasien ingin obat yang dikumur. Pasien hanya minum vitamin c	W: pasien dewasa W: sariawan H: 5 hari A:- M: vitamin c	Obat yang terpilih minosep gargle (klorheksidin) Alasannya minosep merupakan antiseptik untuk mulut (gargle)	Indikasi: sariawan Cara penggunaan: dikumur - kumur 2 x sehari 1 cup Kapan berhenti: apabila sariawan sudah sembuh Kapan harus ke dokter: apabila sariawan bertambah parah ESO yang sering: - Cara menyimpan: simpan di tempat yang kering dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung
18.	Antiinflamasi topikal	sediaan topikal yang mengandung flusinolon asetonida; hidrokortison asetat 1%; desoksimetason 2,5 mg.	Pasien dewasa datang dengan menunjukkan kulit lehernya gatal-gatal seperti eksim. Gatal sudah 1 minggu	W: pasien dewasa W: gatal eksim H: 1 minggu A: tidak ada M: tidak ada	Obat yang terpilih inerson cr (desoximetha sone) Alasannya karena inerson cr tidak hanya untuk gatal dan	Indikasi: antiinflamasi, eksim Cara penggunaan: oleskan tipis-tipis 2 x sehari Kapan berhenti: apabila keluhan sudah sembuh Kapan harus ke dokter: apabila

			S MILL		atiinfalamasi saja tetapi bisa juga untuk eksim	timbul efeksamping yang tidak diinginkan yang membuat keluhan bertambah parah ESO yang sering :iritasi, rasa terbakar Cara menyimpan : simpan di tempat yang kering dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung
19.	Obat topikal penghilang rasa sakit	sediaan yang mengandung mentol, campor, metil salisilat, oleum mentae; kayu puti; lotion lidokain HCl 3%, natrium diklofenak 1% gel.	Pasien remaja datang minta obat untuk nyeri yang spray, digunakan untuk persiapan olah raga	W: pasien dewasa W: nyeri topikal spray H: untuk persediaan A: tidak ada M:tidak ada	Obat yang terpilih salonpas spray (metil salisilat, menthol) Alasannya salonpas spray merupakan salah satu bentuk sediaan spray untuk mengurangi nyeri yang mengandung	Indikasi: menghilangkan rasa sakit Cara penggunaan: semprotkan didaerah yang nyeri, seperlunya Kapan berhenti: apabila tidak nyeri Kapan harus ke dokter: ESO yang sering: Cara menyimpan: simpan di tempat yang kering dan terhindar dari

			-/>		metil salisilat dan menthol	paparan sinar matahari langsung
20	Terapi komplementer / obat tradisional	Jamu, OHT, Fitofarmaka	Pasien datang ingin membelikan istrinya obat untuk melancarkan ASI karena istrinya baru melahirkan dan ASI nya susah keluar	W: pasien dewasa W: terapi komplementer obat traditional H: 1 hari A: tidak ada M: tidak ada	Obat yang terpilih Mom Uung Alasannya karena Mom Uung mengandung ektrak daun katuk, ekstrak daun kelor digunakan sebagai ASI booster	Indikasi: untuk melancarkan ASI Cara penggunaan: diminum 2 x sehari 2 kapsul Kapan berhenti: apabila dirasa ASI sudah keluar dengan lancar Kapan harus ke dokter: apabila timbul efek samping yang tidak diinginkan ESO yang sering: tergantng masing- masing individu Cara menyimpan: simpan di tempat yang kering dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung





Gresik, 06 Juni 2024 Dosen Pembimbing PKL

Diah Ratnasari, S.Farm., Apt,. M.T.

NIDN. 0721119001

Gresik, 06 Juni 2024 Pembimbing Lapangan Apoli R24 PDS Gresik



Apt. Edri Zu fikar Fahmi, S. Farm

No. SIPA: 19940830/SIPA_35.25/2020/11767