




Lampiran 4. Kwitansi Pembayaran




Lampiran 5. Faktur




Lampiran 6. Nota Bukti Pembayaran



**Lampiran 7. Buku Pencatatan**



**Lampiran 8. Salinan Resep**



## Lampiran 9. Lembar Bimbingan Dosen Pembimbing PKL



**PRODI FARMASI**  
FAKULTAS KESEHATAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK



### LEMBAR BIMBINGAN PKL DOSEN PEMBIMBING PKL (DPP)\*

TAHUN AKADEMIK : 2024/2025

Nama Mahasiswa : TRIA AGUSTINA SUSANTI  
NIM : 221105013  
Nama instansi PKL : Apotek Cipta Medika 1 GKB  
Nama Dosen Pembimbing PKL : Apt. Diah Rainasari, S.Farm, M.T

No.	Tanggal	Bimbingan dan Saran	Paraf Pembimbing
1.	12 Maret 2025	logbook	df.
2.	21 Maret 2025	Logbook dan Tugas Khusus	df.
3.	13 April 2025	bimbingan logbook	df.
4.	6 Mei 2025	bimbingan Laporan.	df.
5.	7 Mei 2025	bimbingan tugas khusus	df.
6.	8 Mei 2025	bimbingan tugas khusus + Laporan	df.

\*MINIMAL BIMBINGAN 6 KALI

## Lampiran 10. Lembar Bimbingan Pembimbing PKL



**PRODI FARMASI**  
FAKULTAS KESEHATAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK



Lembar ke :


**LEMBAR BIMBINGAN PKL\***  
**PEMBIMBING PKL (PL)**

TAHUN AKADEMIK : 2024/2025

Nama Mahasiswa : TRIYA AGUSTINA SUSANU  
NIM : 221105413  
Nama instansi PKL : KLINIK Cipta Medika GKB  
Nama Pembimbing Lapangan : apt. Sofia Winata Meluasari, S.Farm

No.	Tanggal	Bimbingan dan Saran	Paraf Pembimbing
1.	13 Februari 2025	Belajar tata letak Penyimpanan obat + Pengerahan Resep	
2.	14 Februari 2025	Belajar Penerimaan obat + Kartu stock	
3.	18 Februari 2025	Belajar salinan resep	
4.	20 Februari 2025	Belajar Perencanaan dan Pengadaan	
5.	26 Februari 2025	Belajar stok opname + Resep Manual	
6.	1 Maret 2025	Belajar owa	
7.	4 Maret 2025	Belajar Penyimpanan obat + Resep pasien PKL	
8.	5 Maret 2025	Belajar Pemusnahan Obat	
9.	6 Maret 2025	Belajar Perhitungan biaya resep	
10.	15 Maret 2025	Belajar Penarikan obat + Rekap. psikotropika dan Narcotika	

\*)MINIMAL BIMBINGAN 6 KALI



The Power of Islamic Entrepreneurship

0633/LAM-PT/Kes/Akri/Dip/IX/2018

Jl. Sumatara 101 Gresik Kota Baru (GKB) Gresik. 61121 Telp. (031) 3951414. Fax. (031) 3952585 Website: <http://www.uma.ac.id>. Email: [info@uma.ac.id](mailto:info@uma.ac.id)

**Lampiran 11. Logbook (Agenda harian)**

**AGENDA HARIAN  
PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)  
DI APOTEK CIPTA MEDIKA GKB**



**TRIYA AGUSTINA SUSANTI  
NIM. 221105013**

## AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke :

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung □ dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Senin 10 Februari 2025	<p>→ Menyerahkan dokumen Pelaksanaan PKL kepada Pembimbing Lapangan</p> <p>→ Mempelajari tata letak Penyimpanan Obat di Apotek Cipta Medika CKB</p>	<p>→ Mahasiswa menyerahkan secara langsung dokumen kelengkapan dari kampus kepada pembimbing lahan Apotek Cipta Medika CKB</p>  <p>→ Mahasiswa mengetahui tata letak Penyimpanan obat, Penataan obat, dikelompokkan berdasarkan pasien BPJS, umum, PRB. tidak hanya itu penataan dikelompokkan berdasarkan bentuk sediaan dan farmakologis secara alfabetis di rak dan lenari penyimpanan. Penataan dan pengeluaran an/rotasi obat Menggunakan sistem FIFO dan FEFO. Serta untuk obat lisa diberi label, disetiap obat yang terdapat obat kesedangan untuk obat high alert dibedakan dalam rak sendiri.</p>    

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuai pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung □ dapat berupa foto/scan dokumen)
2	Selasa 11 Februari 2025	<p>→ Pengenalan Ruang lingkup Klinik dan Apotek</p> <p>→ Mempelajari pengadaan yang ada di Apotek Cipta Medika Cik</p>	<p>→ Apoteker memperlihatkan dan mengerjakan ruangan yang berada di klinik dan Apotek Cipta Medika Cik dimana Apotek dan ruang pemeriksaan terpusat serta terdapat lantai 2 yang berisi kantor dan klinik pemeriksaan gigi. Klinik disediakan kamar mandi, tempat sholat. Untuk lantai 1 ada ruang resepsionis dan poli umum. Sedangkan untuk ruang pelayanan dan peracikan di pisahkan oleh pirtu.</p> <p>→ Apoteker menjelaskan terkait pengadaan yang dilakukan di Apotek Cipta Medika Cik yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Pengadaan melalui whatsapp</li> <li>2.) Pengadaan melalui telfon</li> <li>3.) Pengadaan melalui sales datang langsung di Apotek</li> </ol> <p>dan juga bisa menggunakan aplikasi yang tersedia. Dokumen pengadaan adalah surat pesanan, faktur dan tanda terima. Fungsi penitisan pengadaan adalah agar kita dapat mengetahui barang-barang yang kita pesan datang/tidak, dapat mengetahui barang-barang yang kita pesan di PBF ada/tidak.</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuai pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung □ dapat berupa foto/scan dokumen)
			<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div> <p style="text-align: center;">↓ kartu stock</p> <p style="text-align: center;">↓ aplikasi pemesanan obat</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuai pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung □ dapat berupa foto/scan dokumen)
3	Rabu 12 Februari 2025	<p>→ Belajar Macam-Macam Etiket yang ada di Apotek Cipta Medika akb</p> <p>→ Belajar membaca dan menulis etiket yang ada Elektronik Rekam medis</p>	<p>→ Mahasiswa dapat membedakan macam-macam etiket seperti etiket obat pada umumnya seperti obat Antibiotik dengan etiket sendiri, obat berupa padat (tablet / Kapsul) dan puyer diberi etiket warna Putih, obat Anuvirus dengan etiket sendiri, sedangkan untuk Obat Pemakaian luar berwarna biru.</p>  <p style="text-align: center;">Apikasi Khansa</p>  <p>→ Mahasiswa dapat Membaca dan mengetahui obat apa, setelah itu ditulis di etiket sesuai nama pasien kemudian menyiapkan obat yang tertera pada Resep sesuai kebutuhan, pengecekan ulang, meracik obat jika diminta, memberikan etiket sesuai jenis obat, pemeriksaan akhir, KIE kepada pasien, memastikan Idenitas pasien yang menerima obat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila terjadi Mau lampu pada Apotek Cipta Medika akb, apikasi Khansa tetap bisa digunakan meski tanpa internet dengan sambungan kabel LAN, yang di sambungkan pada laptop / komputer.</li> <li>• pada Apotek Cipta Medika akb 90% Melayani Bpjs resep dari dokter di klinik, dan 10% Pasien umum.</li> </ul>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuai pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung □ dapat berupa foto/scan dokumen)
4	Kamis 13 Februari 2025	<p>→ Mengetahui visi dan Misi Apotek Cipta Medika akb</p> <p>→ Mengetahui tujuan di Apotek Cipta Medika akb</p> <p>→ Mempelajari tentang Alur pelayanan resep di Apotek Cipta Medika akb</p>	<p>→ Mahasiswa dapat mengetahui visi dan Misi Apotek Cipta Medika akb yaitu:</p> <p>Visi : Menjadi klinik pertama yang profesional serta berorientasi kepada kesehatan, kepercayaan, dan kepuasan pelanggan.</p> <p>Misi : 1.) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten. 2.) Memberikan pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan ramah. 3.) Menciptakan lingkungan klinik yang bersih, sehat, amat dan nyaman. 4.) Meningkatkan pelayanan yang bermutu untuk mencapai pertumbuhan klinik.</p> <p>→ Adapun Mahasiswa dapat mengetahui tujuan dari Apotek Cipta Medika akb yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat.</li> <li>2) Untuk mewujudkan masyarakat yang mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu</li> </ol> <p>→ Alur pelayanan obat di Apotek Cipta Medika akb merupakan alur pelayanan terhadap permintaan resep dari dokter kepada Apoteker untuk menyiapkan obat serta menyerahkan obat kepada pasien sesuai dengan resep dengan persetujuan dokter. Alur pelayanan sudah tertera pada sop di Apotek Cipta Medika akb sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Menyiapkan obat sesuai dengan resep.</li> <li>2.) Menghitung kebutuhan jumlah obat</li> <li>3.) Mengambil obat yang sesuai rak penyimpanan</li> <li>4.) Melakukan pengecekan ulang kebenaran Idenitas obat</li> <li>5.) Melakukan peracikan jika diperlukan</li> </ol>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung □ dapat berupa foto/scan dokumen)
			<p>6.) Memberi etiket pada kemasan obat dengan baik dan benar.</p> <p>7.) Melakukan pemeriksaan akhir kesesuaian antara Penulisan resep dan etiket</p> <p>8.) Melakukan KIE dengan cara memanggil nama pasien memeriksa, yang memberikan pertanyaan kepada pasien terkait identitas pasien, minimal nama, alamat, tanggal lahir.</p> <p>9.) Menasukan pasien/ keluarga pasien yang menerima obat</p> <p>10.) Menyerahkan obat disertai Pemberian Informasi Obat.</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung □ dapat berupa foto/scan dokumen)
5	Jumat 14 Februari 2025	<p>→ Belajar mengenai penerimaan obat</p> <p>→ Membantu Apoteker dalam penandatanganan Surat tanda terima.</p>	<p>→ Dapat mengetahui cara menerima barang yang datang -hal yang harus dicek saat barang datang dan diterima meliputi : Jumlah barang yang diterima dicocokkan dengan sudah pesanan beserta faktur sudah sesuai apa belum. setelah itu faktur ditandatangani dan diberi stempel diambil sebagai dokumen Apotek.</p> <p>→ pada Surat tanda terima saat penerimaan obat yang diberikan sales/ pihak pof untuk Apotek terdapat 2 Lembar kertas yang 1 dipegang oleh Apotek dan yang satu dikembalikan ke pihak sales. Sebelum dikembalikan ditandatangani dan diberi stempel terlebih dahulu</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div> <p style="text-align: right;">→ Penandatanganan Faktur</p>  

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuai pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung □ dapat berupa foto/scan dokumen)
6	Sabtu 15 Februari 2023	<p>→ Melakukan penyimpanan barang dan stok obat di gudang</p> <p>→ Membantu dalam menulis stok obat yang ada di gudang</p>	<p>→ Setelah barang datang, barang di simpan di gudang Apotek sesuai tempatnya. Gudang Apotek mempunyai fungsi sebagai tempat penyimpanan dalam kegiatan untuk mengelola barang persediaan farmasi agar menjamin kualitas barang, memudahkan pencarian obat, agar terhindar dari kerusakan fisik, dan mempermudah pengawasan stok dalam pengambilan. Apotek Cipta Medika OKB dalam penyimpanan dari gudang diurutkan sesuai Abjad, untuk salep dibedakan tempatnya, Antibiotik dalam lemari penyimpanan khusus Antibiotik agar mempermudah dalam pengambilan stok obat.</p> <p>→ Dapat mengetahui tata cara menulis stok obat apa saja yang diperlukan di dalam kartu stok obat terdapat tanggal terima/keluar, nomor dokumen, sumber/tujuan, No Batch, Tanggal ED, Jumlah Penerimaan, Jumlah pengeluaran, sisa stok dan paraf. Tetapi di stok gudang yang ditulis di kartu stock yaitu: tanggal terima, nomor dokumen, tujuan dari PT Mana, no-Batch sesuai barang yang ada di faktur, Tanggal ED, Jumlah penerimaan sisa stok (Jumlah Penerimaan + sisa barang yang ada di lemari gudang), paraf.</p>    

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuai pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung □ dapat berupa foto/scan dokumen)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Sediaan salep di Apotek Cipta Medika OKB yaitu ketokonazole krim, eramycetin salep Mata, Betamethasone krim, Miconazole krim, aciclovir krim, Gentamicin krim, eriderm-n krim, eliderm a-krim, genoint salep mata, Desoximetasone krim.</li> <li>• Untuk obat Antibiotik terdapat amoxiclin, Dionicol, cefadroxil, ciproflaxin, Bintamox, cefixime 100 mg, cefixime 200 mg, Lositacef, F4 Troches, Coli Moxazole, erytra forte, Parazol, faspirim forte.</li> </ul>

Gresik,  
Dosen Pembimbing,\*



DIAH RATNASARI, S.Farm., Apt., M. T  
NIDN. 0721119001

Gresik,  
Pembimbing Lapangan\* (Apotek Cipta Medika)



Apt. SOFIA WINATA MEILIASARI, S.Farm  
SIPA. 19860501/SIPA\_35.25/2022/2060

## AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 2

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung □ dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Senin 17 Februari 2025	→ Membantu TKK dalam melakukan pelayanan resep di Apotek Cipta Medika GKB.	<p>→ Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana alur pelayanan resep di Apotek Cipta Medika. ake. Mulai dari resep masuk ke apikasi khansa. kemudian TKK Menyiapkan obat sesuai Permintaan yang diresepkan, mengambil kebutuhan jumlah obat pada rak penyimpanan obat dengan menggunakan wadah, menulis etiket sesuai dengan resep, Melakukan pengecekan ulang, Merokok Obat jika pasien membutuhkan puyer, Melakukan pemeriksaan akhir apakah sudah sesuai apa belum, Mengembalikan wadah pengambilan obat, Melakukan KIE yang di dampingi oleh Apoteker.</p>  

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung □ dapat berupa foto/scan dokumen)
2	Selasa 18 Februari 2025	<p>→ Belajar Salinan Resep</p> <p>→ Belajar memasukkan Resep di sistem</p>	<p>→ Dapat Mengetahui hal-hal apa saja yang perlu ditulis di salinan resep yaitu dari dokter siapa, nama pasien, nomor resep, Tanggal resep, R/- nama obat yang sesuai dengan jumlah diresepkan menulis signa dengan diberi keterangan "det" atau "net det" dan "det orig"</p> <p>→ Dapat mengetahui bagaimana cara memasukkan data resep di sistem komputer, hal yang perlu dimasukkan ke dalam sistem terdapat dalam nama pasien, nama obat dan jumlah obat yang diberikan serta signa yakni resep yang dimasukkan adalah resep psiko tropika, narkotika, ditulis secara manual dan dipindahkan ke sistem.</p>  

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung □ dapat berupa foto/scan dokumen)
3	Rabu 19 Februari 2025	<p>→ Membantu Tvk dalam melakukan pelayanan resep di Apotek Cipta Medika aKB</p> <p>→ Belajar Meracik Puyer</p>	<p>→ Dapat mengetahui Alur pelayanan resep mulai dari resep yang masuk dalam apikasi khansa, kemudian menyiapkan obat sesuai dengan permintaan resep, meracik obat jika diperlukan menulis etiket sesuai resep, melakukan pemeriksaan akhir, melakukan kje yang di dampingi oleh Apoteker saat penyerahan obat.</p> <p>→ Dapat mengetahui cara yang benar dalam meracik puyer puyer di Apotek Cipta Medika aKB dalam meracik puyer menggunakan alat yaitu blender obat yang telah diblender dibagi dan dikemas dalam kemasan puyer dan di press dengan alat press.</p> 

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung □ dapat berupa foto/scan dokumen)
4	Kamis 20 Februari 2025	→ Belajar tentang perencanaan yang dijelaskan oleh pembimbing lahan	<p>→ Mahasiswa mendapatkan penjelasan terkait bagaimana perencanaan obat yang ada di Apotek Cipta Medika aKB</p> <p>→ Tujuan dari perencanaan yaitu untuk memastikan stok obat agar tidak terjadi slow moving serta untuk memprediksi kebutuhan persediaan obat dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>→ Proses perencanaan obat adalah memperumbangkan obat yang sering keluar dan juga jumlah stok obat</p> <p>→ Metode perhitungan pada saat perencanaan obat di Apotek Cipta Medika aKB menggunakan pola epidemiologi yaitu pola penyebaran penyakit dan pola pengobatan penyakit Masyarakat, dan juga menggunakan metode konsumsi yaitu moving Minimal/ Metode kombinasi, dengan rumus yang digunakan: <math>A = (B + C + D) = E</math></p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A = Rencana pengadaan</li> <li>B = pemakaian Rata-Rata per bulan</li> <li>C = Buffer stock</li> <li>D = Lead Time Stock</li> <li>E = sisa stock</li> </ul> <p>→ Pemilihan pof sebagai rencana kebutuhan Sediaan farmasi di Apotek Cipta Medika aKB adalah diskon, masa jatuh tempo pembayaran paling lama, pof yang lengkap dan Pesanan cepat datang</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung □ dapat berupa foto/scan dokumen)
			 <p>Contoh :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>B Pemakaian Rata Rata per bulan = 1000</li> <li>C stok aman 30% dari rata-rata perbulan = 300</li> <li>D Stok waktu tunggu 25% dari pemakaian Rata-Rata perbulan = 250</li> <li>E Sisa stok = 80</li> </ul> <p>• Stok optimum dihitung dengan</p> $A = (B + C + D) - E$ $= (1000 + 300 + 250) - 80$ $= 1470$ <p>* Rencana Order</p> $F = A - E$ $= 1470 - 80$ $= 1390 \text{ (14 box)}$ <p>Table excel Pemesanan obat</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung □ dapat berupa foto/scan dokumen)
6	Sabtu 22 Februari 2025	→ Mengetahui sop yang berada di Apotek Cipta Medika akb	→ Apoteker Menjelaskan bagaimana sop yang terdapat di Apotek Cipta Medika akb dan juga terdapat buku hand file yang berisi sop, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Obat</li> <li>2. Efek Samping</li> <li>3. Meso</li> <li>4. Kadaluarasa Obat</li> <li>5. High Alert</li> <li>6. psikotropika dan Narkotika</li> <li>7. Emergency</li> <li>8. Konseling</li> <li>9. Pemberian Obat</li> <li>10. pengkajian Obat</li> <li>11. medication error</li> <li>12. Swamedikasi</li> </ol>


No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung □ dapat berupa foto/scan dokumen)
		Libur	

Gresik,  
Dosen Pembimbing\*



DIAH RATNASARI, S.Farm., Apt., M. T  
NIDN. 0721119001

Gresik,  
Pembimbing Lapangan\* (Apotek Cipta Medika)




Apt. SOFIA WINATA MEILIASARI, S.Farm  
SIPA. 19860501/SIPA\_35.25/2022/2060

**AGENDA HARIAN (LOG BOOK)**

Minggu ke : 9

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung □ dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	senin 24 Februari 2023	→ Mempelajari Alur swamedikasi di Apotek Cipta Medika GKB	<p>→ Mahasiswa dapat memahami alur swamedikasi di Apotek Cipta Medika GKB yang bertujuan dari Pelayanan swamedikasi adalah menjamin pemberian obat tanpa resep yang dilakukan secara benar dan tepat dalam melaksanakan sop pemberian obat tanpa resep untuk memastikan pasien mendapatkan obat yang sesuai berdasarkan keluhan dengan saran yang sesuai dan benar</p> <p>→ sop pelayanan swamedikasi pada obat tanpa resep tertulis di Apotek Cipta Medika GKB ada 2 bagian, yaitu: Ada bagian A dan B</p> <p>B-pasien datang menanyakan obat tertentu/ membawa contoh obat - pasien bertanya tentang obat tertentu</p> <pre> graph TD     A[Obat tersedia] --&gt; B[Ya]     A --&gt; C[Tidak]     B --&gt; D[kemas obat]     C --&gt; E[Memberikan obat lain dengan kandungan sama]     C --&gt; F[menyarankan ke apotek lain]     </pre> <p>A-pasien datang dengan keluhan gejala sakit          Patient assesment          ↓          Memilih obat sesuai kebutuhan          ↓          Edukasi pasien</p> <p>Informasi obat dan edukasi          ↓          Dokumentasi kegiatan swamedikasi</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung □ dapat berupa foto/scan dokumen)
2	Selasa 25 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Membantu tvk dalam melakukan pelayanan resep di Apotek Cipta Medika GKB</li> <li>→ Membantu Apoteker menyiapkan mutasi obat ke klinik Cipta Medika Soetomo</li> <li>→ Diskusi terkait antibiotik bersama Apoteker</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dapat mengetahui alur pelayanan resep di Apotek Cipta Medika GKB yang dilakukan seperti hari sebelumnya tetapi ada salah satu resep yang stock obatnya kosong dan diganti dengan obat yang memiliki kandungan sama atas persetujuan dokter seperti obat amoxicillin diganti dengan amoxicillin.</li> <li>◦ Dapat Mengetahui obat yang diperlukan di klinik Cipta Medika Soetomo. Menyiapkan yang diperlukan untuk mutasi obat saat pengambilan obat di gudang Apotek Cipta Medika GKB menulis di kartu stok pengeluaran untuk tujuan di klinik Cipta Medika Soetomo kemudian menginput di kartu stock sistem dan dicetak.</li> <li>◦ Dapat Mengetahui aman atau tidaknya Antibiotik bisa dikonsumsi oleh ibu menyusui, karena Antibiotik memiliki anjuran harus dihabiskan yang mana dapat mempengaruhi produksi ASI, rasa dan kemungkinan saat minum obat Antibiotik membuat ASI menjadi agak pahit.</li> </ul> <div style="text-align: center;">  <p>→ Menyiapkan obat untuk mutasi ke klinik Cipta Medika yang lain</p> </div>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung □ dapat berupa foto/scan dokumen)
3	Rabu 26 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Belajar cara stok oprame di Apotek Cipta Medika GKB</li> <li>→ Belajar memahami resep Manual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dapat Mengetahui stok oprame yang ada di Apotek Cipta Medika GKB dengan cara menghitung langsung secara fisik dari beberapa obat, kemudian dicocokkan dengan data stok yang ada di Apikasi Khania. Apabila tidak sesuai dicatat diberita acara hasil Investigasi Ketidaksesuaian stok. Ketidaksesuaian bisa terjadi karena             <ol style="list-style-type: none"> <li>1- dari apikasi / sistem</li> <li>2- Human eror</li> <li>3- dan salah Membaca</li> </ol> </li> <li>◦ Dapat mengetahui dan memahami Penulisan resep secara Manual untuk resep manual peracikan ditandai dengan did dan da. resep yang ditandai dengan did artinya diatur sesuai takaran jadinya dihitung terlebih dahulu untuk da artinya diberikan. Adanya diakukan resep Manual dikarenakan Apotek sedang Melakukan stok oprame</li> </ul> <div style="text-align: center;">  </div>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung □ dapat berupa foto/scan dokumen)
4	Kamis 27 Februari 2025	<p>→ Mengamati cara Penulisan kwitansi Apotek Cipta Medika AKB</p> <p>→ Membantu Trk dalam Melakukan Penulisan Penjualan di buku Penjualan</p>	<p>° Dapat Mengetahui apa yang ada di dalam buku kwitansi atau bukti Pembayaran yang biasanya diminta oleh pasien sebagai bukti pembayaran tertulis, yang perlu diisi adalah nama pasien, jumlah uang, untuk Pembayaran, nominal uang, tanggal, tanda tangan, dan juga stempel</p> <p>° Dapat Mengetahui apa saja yang ditulis dalam buku Penjualan obat, yang tertera dalam buku yaitu: hari dan tanggal, bulan tahun, Nama obat yang dibeli, jumlah obat yang dibeli, serta harga obat. Kemudian Penjualan setiap harinya di Input di aplikasi Khansa komputer.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>↓ Kwitansi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>↓ Nota Pembayaran</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>↓ Buku Penjualan</p> </div> </div>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung □ dapat berupa foto/scan dokumen)
5	Jum'at 28 Februari 2025	→ Mempelajari Pendistrib usian obat PRB dari Klinik Cipta Medika AKB	<p>° Pendistribusian yang dilakukan klinik cipta Medika AKB dilakukan untuk Memenuhi kebutuhan obat PRB di Cipta Medika Cabang/Instalasi Farmasi di klinik cipta Medika lainya dengan prosedur menerima surat permintaan lalu di buat Produk yang diminta kemudian barang tersebut disiapkan sesuai permintaan. kemudian dimasukkan ke dalam wadah Plastik yang sudah disiapkan satu persatu dan dicocokkan kembali barang tersebut sesuai/ tidak sesuai ke surat permintaan. atau menyiapkan Surat Jalan ketika barang sudah diambil/ diterima oleh pihak cabang/ instalasi farmasi di klinik cipta Medika tersebut. Maka langsung Mendatangkan Surat tanda terima atau Invoice.</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung □ dapat berupa foto/scan dokumen)
6	sabtu 1 Maret 2025	→ Belajar OWA no. 2 dalam peraturan menteri kesehatan tahun 1999	<p>° Dapat Mengetahui yang dimaksud OWA. OWA adalah singkatan dari obat wajib Apotek, jadi owa adalah obat keras yang bisa diserahkan oleh Apoteker di Apotek tanpa resep dokter. Pada Penyerahan obat OWA terdapat beberapa kewajiban antara lain, Memenuhi ketentuan dan batasan tiap jenis obat per pasien yang disebutkan. Memberikan Informasi Kepada Pasien agar aman digunakan. contoh obat OWA no. 2 dalam Peraturan Menteri Kesehatan tahun 1999 yang ada di Apotek Cipta Medika. AKB antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Allapurinol</li> <li>2.) Flamar gel</li> <li>3.) Conterpain</li> <li>4.) Dexametason Krim</li> <li>5.) Hidrokortison</li> <li>6.) Ibuprofen 400 mg</li> <li>7.) Ketoconazole cream</li> <li>8.) Omeprazole 20 mg</li> <li>9.) Sucralfate 500 mg</li> </ol>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung □ dapat berupa foto/scan dokumen)
		Libur	

Gresik,  
Dosen Pembimbing.\*



DIAH RATNASARI, S.Farm., Apt., M. T  
NIDN. 0721119001

Gresik,  
Pembimbing Lapangan\* (Apotek Cipta Medika)



Apt. SOFIA WINATA MEILIASARI, S.Farm  
SIPA. 19860501/SIPA\_35.25/2022/2060

## AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 4

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung □ dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Senin 3 Maret 2025	<p>→ Mempelajari Penyimpanan obat dengan pembimbing lahan yang ada di Apotek Cipta Medina 1 AKB</p> <p>→ Mengetahui suhu Penyimpanan obat yang baik dan benar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan dari penyimpanan adalah untuk memelihara mutu obat, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga ketersediaan stok obat, serta memudahkan untuk pencarian dan pengawasan.</li> <li>• Cara penyimpanan yang ada di Apotek Cipta Medika 1 AKB adalah berdasarkan bentuk sediaan, Alfabetis, serta menggunakan Metode, FFO dan FIFO.</li> <li>• Obat-obatan yang ditaruh di dalam rak yang berbeda seperti antibiotik sendiri, obat luar sendiri tetapi tetap menggunakan metode FFO dan FIFO, tetapi hanya diprioritaskan dengan metode FFO secara alfabetis.</li> <li>• Aspek khusus penyimpanan obat high alert di area yang terpisah dari produk lain dan diberi tanda.</li> <li>• Cara Penyimpanan obat lasa tetapi diberi tanda lain yang dicetak dengan warna cerah dan tulisan yang jelas dan tebal.</li> <li>• Cara Penyimpanan Narkotika dan Psikotropika dengan 2 kunci yang berbeda dan kokoh tidak mudah ditemukan.</li> <li>• Dapat Mengetahui suhu Penyimpanan dengan baik dan benar sehingga dapat mengetahui obat rusak / tidaknya pada suhu ruang dan kulkas berdasar pengontrol suhu ruang diukuhkan dengan cara pencatatan menggunakan diagram.</li> </ul>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung □ dapat berupa foto/scan dokumen)
			

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung □ dapat berupa foto/scan dokumen)
2	Selasa 4 Maret 2025	→ Membantu trk dalam melakukan pelayanan resep PRB (pasien Rujuk balik) di Klinik Cipta Medika 1 GKB	<p>◦ Dapat Mengetahui alur pelayanan Resep di PRB di Apotek Cipta Medika 1 GKB Mulai dari dokter Menulis resep obat untuk jangka waktu satu bulan di buku khusus PRB dan ditulis ulang pada resep khusus PRB, lalu diserahkan kepada Apotek untuk menyiapkan obat sesuai permintaan yang tertera pada resep, Melakukan pengecekan ulang apakah sudah sesuai, Memberi etiket pada Masing-Masing obat dimasukkan ke dalam plastik kulp, diperiksa kembali serta tanda tangan pada Resep, Melakukan KIE serta Penyerahan Obat pasien juga Melakukan tanda tangan di resep tersebut. Petugas Apotek Menulis Resep ulang di buku khusus PRB dan dicatat tanggal kembali</p> 

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung □ dapat berupa foto/scan dokumen)
3	Rabu 5 Maret 2025	<p>→ Membantu trk dalam melakukan pelayanan resep di Apotek Cipta Medika 1 GKB</p> <p>→ Melakukan pemusnahan yang didampingi oleh Pembimbing Lahan</p>	<p>→ Dapat Mengetahui alur pelayanan resep di Apotek Cipta Medika 1 GKB yang dilakukan seperti hal sebelumnya Mulai dari dokter memberikan resep hingga Melakukan KIE kepada pasien.</p> <p>→ Dapat Mengetahui cara pemusnahan yang ada di Apotek Cipta Medika 1 GKB dengan kriteria pemusnahan yang sudah kadaluarsa rusak atau tidak sesuai dengan Muat baik dalam sediaan cair/padat dengan cara sediaan padat seperti tablet digerus terlebih dahulu. Sediaan cair/padat dimasukkan ke dalam plastik kulp untuk pembungkusan hingga tidak bisa terbaca. Plastik limbah dibuang di Penampungan limbah.</p> 

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung □ dapat berupa foto/scan dokumen)
4	Kamis 6 Maret 2025	<p>→ Mempelajari perhitungan biaya resep dg pembimbing lahan</p> <p>→ Mempelajari perhitungan biaya etc</p>	<p>◦ Dapat memahami jumlah pembekalan farmasi menggunakan 2 metode yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Perhitungan dari harga faktur dan PPN (11%) + 20% (Minimal sampai batas HET)</li> <li>◦ pasien umum (dihitung biaya konsultasi dokter dan obat yang dibutuhkan) dengan biaya dokter 35.000, serta ada juga biaya untuk lab.</li> </ul> <p>→ Contoh Resep pasien umum, (Jumlah x harga + embalaset tusiah) = Total</p> <p>Betadinesole = <math>1 \times 6.077 + 0 + 0 = 6.077</math>  Kasa steril = <math>1 \times 4.125 + 0 + 0 = 4.125</math>  Lostaref = <math>10 \times 1.006 + 0 + 0 = 10.060</math>  Metinal = <math>10 \times 1.665 + 0 + 0 = 16.650</math>  Total biaya resep = 36.912  Biaya dokter = 35.000  Rawat luka = 40.000</p> <p>→ contoh  VITACIMIN <math>1.678 + 11\% + 11\% = 2.235.096</math>  = Harga jual = 2.500</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung □ dapat berupa foto/scan dokumen)
5	Jumat 7 Maret 2025	<p>→ Mempelajari dan Mem bantu pemusnahan resep yang di dampingi oleh Apoteker</p> <p>→ Mengamati faktur Pembelian obat</p>	<p>→ Dalam pemusnahan faktur dan resep yang disimpan selama 5 tahun (Setiap 5 tahun sekali) akan dimusnahkan dengan cara dirusak/dibakar. resep dan faktur yang sudah tidak digunakan dikumpulkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemusnahan.</p> <p>→ Setelah itu pada saat melakukan pemusnahan <sup>resep</sup>/sedikan farmasi harus ada saksi yang menyaksikan proses pemusnahan.</p>  <p>→ Mengamati Informasi dalam faktur. Isi dalam faktur terdapat nama PBF, alamat PBF, nama apotek pemesan, alamat apotek Pemesanan harga serta ttd penerima. Serta bisa Mengetahui apa saja yang harus dicocokkan saat barang datang. hal pertama yang harus di cocokkan yaitu barang dengan surat Pemesanan. Kemudian yang harus dicocokkan lagi yaitu antara faktur dengan barang yang dikirim dengan mencocokkan nomor batch, tanggal, exp date, jika tidak sesuai maka bisa di return ke Pengirim/PBF.</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung □ dapat berupa foto/scan dokumen)
7	sabtu 8 Maret 2025	→ Belajar Mengetahui Obat owa no 1 dalam peraturan Menteri Kesehatan 1995	→ Dapat Mengetahui <del>Barang</del> obat owa no 1 dalam Peraturan menteri Kesehatan 1995 yang ada di Apotek Cipta Medika CKB antara lain: a. Postinor (PIL KB) b. Andakan (PIL KB) c. Microgynon (PIL KB)

Gresik,  
Dosen Pembimbing,\*



DIAH RATNASARI, S.Farm., Apt., M. T  
NIDN. 0721119001

Gresik,  
Pembimbing Lapangan\* (Apotek Cipta Medika)



Apt. SOFIA WINATA MEILIASARI, S.Farm  
SIPA. 19860501/SIPA\_35.25/2022/2060

#### AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 5

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung □ dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Senin 10 Maret 2025	→ Penerimaan barang datang serta menyimpan sesuai tata letak obat	→ Dapat Mengetahui cara menerima barang. Saat penerimaan barang harus dicek apa sesuai dengan surat pesanan serta faktur, Menghitung jumlah barang yang diterima. Setelah itu ditanda tangani di distempel Apotek, setelah itu barang yang datang di <del>stor</del> ke gudang, serta ditata berdasarkan tempat yang Sesuai

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung □ dapat berupa foto/scan dokumen)
2	Selasa 11 Maret 2025	→ Membantu TKK dalam Penerimaan barang, serta menginput faktur ke dalam apukasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui bagaimana cara menerima barang yang datang</li> <li>Hai yang harus diperhatikan 1 cek barang yang datang 1 diterima adalah menghitung jumlah barang yang diterima dengan dicocokkan dengan surat pesanan beserta faktur, faktur diambil dan distempel sebagai dokumen apotek, kemudian di input di Apukasi</li> </ul>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung □ dapat berupa foto/scan dokumen)
3	Rabu 12 Maret 2025	→ Membantu TKK dalam melakukan pelayanan resep Apotek Cipta Medika AKB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat Mengetahui bagaimana alur pelayanan resep di Apotek Cipta Medika AKB mulai dari resep yang masuk ke apukasi hingga kemudian TKK menyiapkan obat pada rak penyimpanan obat dengan menggunakan wadah, menuit euket sesuai dengan resep melakukan pengecekan ulang, meracik obat jika pasien membutuhkan puyer, melakukan pemeriksaan akhir apakah sudah sesuai atau belum, mengembuskan wadah pengambilan obat, melakukan KIE yang di dampingi oleh Apoteker.</li> <li>Kir obat scameirin krim perlu dijelaskan kepada pasien untuk pasien yang menderita scabies, scameirin digunakan 1x pemakaian Untuk seluruh tubuh, lama penggunaan scameirin krim antara 8 jam Pd malam hari sebelum tidur dan tidak boleh terkena air. Jika masih ada sisa obat boleh dipakai kembali dg jarak 5-7 hari setelah pemakaian pertama.</li> <li>ditambahkan salep 24 yang berfungsi sebagai Maintenance. Salep 24 berbasis lemak jadi sulit dihilangkan bekasnya di kulit, jadi bisa dibasuh dengan air hangat untuk membersihkan.</li> </ul>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung □ dapat berupa foto/scan dokumen)
4.	Kamis 13 Maret 2025	→ Membantu TVK dalam melakukan pelayanan resep di Apotek Cipta Medika GKB (obat KB)	<p>→ Dapat Mengetahui bagaimana alur pelayanan resep di Apotek Cipta Medika GKB mulai dari resep yang masuk ke apikasi khansa. kemudian TVK menyiapkan obat pada rak penyimpanan obat dengan menggunakan wadah, menulis etiket sesuai dengan resep, melakukan pengecekan ulang, meracik obat jika pasien membutuhkan puyer, melakukan pemeriksaan akhir apakah sudah sesuai apa belum, mengembalk an wadah pengambilan obat, melakukan KIE yang di dampingi oleh Apoteker.</p> <p>→ KIE pada obat pil KB juga perlu diperhatikan antara lain pil KB dapat diminum dengan 3 kondisi pasien:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pasien dengan kelutan menstruasi secara terus menerus ( untuk menstabilkan hormon) obat diminum hanya pil yang berwarna kuning dengan jumlah tertentu sesuai dengan resep dokter dan didampingi obat lain seperti vitamin K dan adrome, dan jika ada kontraksi perut maka perlu penambahan obat seperti ibuprofen.</li> <li>2) Pasien mengkonsumsi pil KB untuk menunda kehamilan, obat yang diminum hanya pil yang berwarna kuning dan diminum dalam jangka panjang, cara minum obat setiap hari dalam jam yang sama, dimulai dari hari pertama menstruasi sesuai hari pada ungkapan kuning di belakang buster dan lanjutkan sesuai arah tanda panah -habs buster, jika memulai di luar menstruasi melakukan tes kehamilan terlebih dahulu untuk memastikan terlebih dahulu memasukkan tidak hamil. jika terlewat minum 1 tablet pada biasanya segera minum tablet yang terlewat dan lanjutkan minum 2 tablet keesokan harinya jika terlewat 3 tablet/lebih maka hentikan penggunaan yang terlewat.</li> </ol>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung □ dapat berupa foto/scan dokumen)
5	Jumat 14 Maret 2025	→ Membantu TVK dalam melakukan pelayanan resep di Apotek Cipta Medika GKB (pelayanan resep obat anuhemoroid)	<p>→ Dapat mengetahui bagaimana alur pelayanan resep di Apotek Cipta Medika GKB mulai dari resep yang masuk ke apikasi khansa. kemudian TVK menyiapkan obat pada rak penyimpanan obat dengan menggunakan wadah, menulis etiket sesuai dengan resep, melakukan pengecekan ulang, meracik obat jika pasien membutuhkan puyer, melakukan pemeriksaan akhir apakah sudah sesuai apa belum, mengembalk an wadah pengembalian obat, Melakukan KIE yang di dampingi oleh Apoteker.</p> <p>→ KIE pada obat Anuhemoroid juga perlu diperhatikan antara lain mencuci tangan sebelum menggunakan obat, pisahkan pembungkus supositoria dari badan supositoria dengan air bersih, kemudian posisikan badan udur miring, dorong supositoria ke dalam dubur dengan jari kanan, jika supositoria terlalu lunak untuk dimasukkan ke dalam dubur maka simpan supositoria dalam lemari es selama 30 menit / siram dengan air es sebelum di lepas dari pembungkus kemudian mencuci tangan setelah menggunakan supositoria.</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung □ dapat berupa foto/scan dokumen)
6	Sabtu 15 Maret 2025	<p>→ Mempelajari penarikan obat di Apotek Cipta Medika AKB</p> <p>→ Mempelajari penyimpanan resep Manual psikotropika dan Narkotika</p> <p>→ Mempelajari rekap Laporan psikotropika dan Narkotika</p>	<p>→ Dapat Mengetahui Informasi tentang cara penarikan obat yang ada di Apotek Cipta Medika AKB dengan contoh: penarikan obat Aptordari PT Nicholas LAB-No, penarikan produk dengan nomor batch tertentu ditarik karena permasalahan izin edar dan diberi bukti surat penarikan obat dari PT yang berkaitan dengan pajak Retur.</p> <p>→ Dapat Mengetahui cara penyimpanan resep manual psikotropika dan Narkotika yang dilakukan di klinik Cipta Medika AKB pasien menerima resep obat dari dokter jika mendapatkan obat psikotropika dan Narkotika diberi tanda menggunakan spidol, biru y, psikotropika dan Merah y, Narkotika. Kemudian resep disimpan dalam lemari pinu ganda dan ditaruh pada ordner.</p> <p>→ Dapat Mengetahui cara rekap psikotropika dan Narkotika, yang setiap bulan, resep yang ada di dalam <sup>di setiap</sup> ordner dimasukkan ke dalam buku Rekap, hardan dicatat nama pasien, alamat, dan jumlah obat berdasarkan golongan obat, psikotropika dan Narkotika, pada akhir bulan obat yang diambil dan dicatat di buku rekap di jumlah kemudian dihitung stok akhir dan dikoreksi dengan jumlah fisik obat.</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung □ dapat berupa foto/scan dokumen)
		4bur	

Gresik,  
Dosen Pembimbing,\*



DIAH RATNASARI, S.Farm., Apt., M. T  
NIDN. 0721119001

Gresik,  
Pembimbing Lapangan\* (Apotek Cipta Medika)



Apt. SOFIA WINATA MEILIASARI, S.Farm  
SIPA. 19860501/SIPA\_35.25/2022/2060



**A. TUGAS KHUSUS RESEP**

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (3), resep polifarmasi (3), resep obat mata/telinga (1), resep obat kulit (1), resep mengandung sediaan inhaler (1), resep obat KB (1), Resep mengandung insulin (1), resep kudis/kurap (1), Resep obat saluran cerna (1), Resep saluran nafas (1), resep racikan anak (3), Resep racikan dewasa (3), resep pasien DM (1), Resep pasien HT (1), Resep pasien syaraf (1), resep yang ada pengulangan /iter (3), dan resep lainnya (4)

Total : 30 Resep

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep	
1.	Resep obat saluran cerna	A. Skrinning Administrasi	
		Nama Pasien :	Ada Novita Maghfiron
		Umur pasien :	Tidak Ada -
		Berat Badan :	Tidak Ada -
		Nama Obat :	Ada Ranitidin tab Paracetamol strip Antasida tab Vitamin B6
		Kekuatan :	Ada Ranitidin tab Paracetamol strip Antasida tab Vitamin B6 100 mg
		Bentuk sed. :	Ada Ranitidin : Tablet Paracetamol : Tablet Antasida : Tablet Vitamin B6 : Tablet
		Jumlah obat :	Ada Ranitidin tab : 6 tablet Paracetamol strip : 6 tablet Antasida tab : 6 tablet

TUGAS KHUSUS PKL D3 FARMASI UMG\_Triya Agustina Susanti\_221105013\_Apotek Cipta Medika GKB

			Vitamin B6 : 4 tablet
	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-
	Aturan pakai :	<u>Ada</u>	Ranitidin tab : sehari 2 kali 1 tablet sesudah makan Paracetamol strip : sehari 3 kali 1 tablet bila demam Antasida tab : sehari 2 kali 1 tablet ½ jam sebelum makan Vitamin B6 : sehari 1 kali 1 tablet
	Tanggal penulisan resep :	Ada	13 Februari 2025
	Nama dokter :	Ada	dr. Biendha Ulfatullaily
	Surat ijin :	Tidak Ada	-
	Alamat dr. :	Tidak Ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Ranitidin tab yang dibutuhkan 6 tablet  
 Paracetamol strip yang dibutuhkan 6 tablet  
 Antasida tab yang dibutuhkan 6 tablet  
 Vitamin B6 yang dibutuhkan 4 tablet

C. Perhitungan biaya resep

Ranitidine = 336 x 6 tablet = 2.016  
 Paracetamol = 435 x 6 tablet = 2.610  
 Antasida = 370 x 6 tablet = 2.222  
 Vitamin B6 = 234 x 4 tablet = 936  
 Total = 7.784 + 11% + 20% = 10.368 = 10.500

D. Etiket

Nama obat / warna etiket

Nama obat/warna etiket


<b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b> Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt	
No. RM :	Tgl Lahir
Nama: Novita	Tgl : 13-2-25
<b>Tab/Kapsul</b>	
...2..... X sehari 1	Bungkus
Lambung	Sendok teh/makan
<del>SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del>	
Penulis Resep:	Nama obat : Ranitidin
dr.Biendha	Tgl Kadaluarsa :

<b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b> Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt	
No. RM :	Tgl Lahir
Nama: Novita	Tgl : 13-2-25
<b>Tab/Kapsul</b>	
...3..... X sehari 1	Bungkus
Bila demam	Sendok teh/makan
<del>SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del>	
Penulis Resep:	Nama obat : paracetamol
dr.Biendha	Tgl Kadaluarsa :

		<p style="text-align: center;"><b>Nama obat/warna etiket</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b>                  Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989                  Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm. Apt             </td> </tr> <tr> <td>No. RM :</td> <td style="text-align: right;">Tgl Lahir</td> </tr> <tr> <td>Nama: Novita</td> <td style="text-align: right;">Tgl : 13-2-25</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">...2..... X sehari 1</td> <td style="text-align: right;"><b>Tab/Kapsul</b></td> </tr> <tr> <td>Lambung</td> <td style="text-align: right;">Bungkus</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Sendok teh/makan</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><del>½ jam SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del></td> </tr> <tr> <td>Penulis Resep: dr.Biendha</td> <td style="text-align: right;">Nama obat : Antasida Tgl Kadaluarsa :</td> </tr> </table>	<b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b> Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm. Apt		No. RM :	Tgl Lahir	Nama: Novita	Tgl : 13-2-25	 		...2..... X sehari 1	<b>Tab/Kapsul</b>	Lambung	Bungkus		Sendok teh/makan	 		<del>½ jam SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del>		Penulis Resep: dr.Biendha	Nama obat : Antasida Tgl Kadaluarsa :	<p style="text-align: center;"><b>Nama obat/warna etiket</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b>                  Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989                  Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm. Apt             </td> </tr> <tr> <td>No. RM :</td> <td style="text-align: right;">Tgl Lahir</td> </tr> <tr> <td>Nama: Novita</td> <td style="text-align: right;">Tgl : 13-2-25</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">...1..... X sehari 1</td> <td style="text-align: right;"><b>Tab/Kapsul</b></td> </tr> <tr> <td>Vitamin B6</td> <td style="text-align: right;">Bungkus</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Sendok teh/makan</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><del>SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del></td> </tr> <tr> <td>Penulis Resep: dr.Biendha</td> <td style="text-align: right;">Nama obat : Tgl Kadaluarsa :</td> </tr> </table>	<b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b> Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm. Apt		No. RM :	Tgl Lahir	Nama: Novita	Tgl : 13-2-25	 		...1..... X sehari 1	<b>Tab/Kapsul</b>	Vitamin B6	Bungkus		Sendok teh/makan	 		<del>SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del>		Penulis Resep: dr.Biendha	Nama obat : Tgl Kadaluarsa :
<b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b> Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm. Apt																																											
No. RM :	Tgl Lahir																																										
Nama: Novita	Tgl : 13-2-25																																										
...2..... X sehari 1	<b>Tab/Kapsul</b>																																										
Lambung	Bungkus																																										
	Sendok teh/makan																																										
<del>½ jam SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del>																																											
Penulis Resep: dr.Biendha	Nama obat : Antasida Tgl Kadaluarsa :																																										
<b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b> Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm. Apt																																											
No. RM :	Tgl Lahir																																										
Nama: Novita	Tgl : 13-2-25																																										
...1..... X sehari 1	<b>Tab/Kapsul</b>																																										
Vitamin B6	Bungkus																																										
	Sendok teh/makan																																										
<del>SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del>																																											
Penulis Resep: dr.Biendha	Nama obat : Tgl Kadaluarsa :																																										
<b>E. Product Knowledge</b>		<p>Nama obat: Ranitidin                  Kandungan: Ranitidin HCl 150 mg                  Dosis Lazim: sehari 2 kali 1 tablet atau dosis Tunggal 2 tablet menelangi tidur malam hari selama 4-8 minggu                  Kegunaan: pengobatan jangka pendek tukak duodenum aktif, tukak lambung aktif, mengurangi gejala refluks esophagitis.                  ESO: sakit kepala, sakit perut, diare, perut kembung, mual/muntah, konstipasi                  KI: hipersensitif terhadap derivat esomeprazole atau benzimidazole                  PERHATIAN: pasien dengan Riwayat profiria akut ibu hamil dan menyusui, anak, usia lanjut, gangguan fungsi hati dan ginjal</p>	<p>Nama obat: Paracetamol                  Kandungan: Paracetamol 500 mg                  Dosis lazim: dewasa: sehari 3-4 kali 1-2 kaplet; Anak: 6-12 tahun sehari 3-4 kali 1/2 -1 kaplet                  Kegunaan: meringankan rasa sakit pada keadaan sakit kepala, sakit gigi, menurunkan demam                  ESO: penggunaan jangka lama dan dosis besar dapat menyebabkan kerusakan hati                  KI: penderita gangguan fungsi hati yang berat, penderita hipersensitif terhadap obat ini.                  PERHATIAN: hati-hati pada penderita penyakit ginjal. Segera hubungi unit pelayanan kesehatan apabila demam tidak turun selama 2</p>																																								

		<p>Cara penyimpanan: disimpan pada suhu ruangan, jauhkan dari Cahaya langsung dan tempat yang lembap</p>	<p>hari dan nyeri tidak menghilang selama 5 hari.                  Cara penyimpanan: disimpan pada suhu ruangan, jauhkan dari Cahaya langsung dan tempat yang lembap.</p>
		<p>Nama obat: Antasida                  Kandungan: Aluminium hydroxide 200mg, Magnesium hydroxide 200mg                  Dosis lazim: dewasa: 1-2 tablet, sehari 3-4 kali; anak 6-12th 1 tablet, sehari 3-4 kali. Diminum 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan dan menjelang tidur                  Kegunaan: mengurangi gejala yang berhubungan dengan asam lambung, tukak lambung, dan dengan gejala mual muntah, gastritis, nyeri ulu hati.                  ESO: umumnya sembelit, diare, mual, muntah, gejala akan hilang bila pemakaian obat dihentikan.                  KI: hipersensitif terhadap alumunium dan magnesium.                  PERHATIAN: tidak dianjurkan digunakan selama 2 minggu secara terus menerus kecuali dengan izin dokter                  Cara penyimpanan: disimpan pada suhu ruangan, jauhkan dari Cahaya langsung dan tempat yang lembap</p>	<p>Nama obat: Vitamin B6                  Kandungan: Vitamin B6 100 mg                  Dosis lazim: sehari 1 tablet atau menurut petunjuk dokter                  Kegunaan: membantu mengurangi rasa mual terutama pada ibu hamil, membantu proses produksi insulin, serta melawan infeksi.                  ESO: pemakaian vitamin B6 dosis besar dalam jangka waktu lama                  KI: Hipersensitif terhadap komponen obat ini.                  PERHATIAN: sebaiknya tidak digunakan untuk pasien yang sedang menerima terapi levodopa.                  Cara penyimpanan: disimpan pada suhu ruangan, jauhkan dari Cahaya langsung dan tempat yang lembap</p>

		<p>F. Tahapan Pembuatan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan skrinning resep</li><li>2. Menyiapkan obat yang tertera pada resep yaitu Ranitidin tab sebanyak 6 tablet, Paracetamol strip sebanyak 6 tablet, Antasida tab sebanyak 6 tablet, Vitamin B6 sebanyak 4 tablet.</li><li>3. Menulis etiket pada masing-masing obat</li><li>4. Menempelkan etiket setiap obat dan dimasukkan pada plastik klip</li><li>5. Dicek kembali obat dan etiket apakah sudah sesuai dengan resep</li></ol> <p>G. Informasi obat yang diberikan (Berupa paragraph dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>TVF: Pengambilan oba atas nama Novita Magfirotun N: Ya, dengan saya sendiri mbak TVF: baik bu saya jelaskan terkait obatnya, ada 2 obat lambung yang satu diminum 2 kali sehari satu tablet sesudah makan, untuk yang satunya diminum 2 kali sehari satu tablet sebelum makan, untuk demam atau nyeri diminum 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan bila tidak demam atau nyeri tidak usah diminum, untuk vitamin nya diminum 1 kali sehari 1 tablet sesudah makan, baik bu apa ada yang ditanyakan N: sudah mbak. TVF: Baik bu, ini untuk obatnya semoga lekas sembuh, terimakasih</p>
--	--	--

2.	<p>Resep obat mata/telinga</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien:</td> <td>Ada</td> <td>Muhammad Yakub</td> </tr> <tr> <td>Umur Pasien:</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Pasien:</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama obat:</td> <td>Ada</td> <td>Reco Tetes Mata Piroxicam 10 mg Vitamin Bc</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada</td> <td>Reco Tetes Mata Piroxicam 10 mg Vitamin Bc</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sediaan :</td> <td>Ada</td> <td>Reco tetes mata: cair Piroxicam: Kapsul Vitamin Bc: tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Reco tetes mata: 1 botol Piroxicam: 6 kapsul Vitamin BC: 4 tablet</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi:</td> <td>Ada/Tidak ada</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aturan Pakai</td> <td>Ada</td> <td>Reco tetes mata: diteteskan 3 kali sehari 1 tetes pada mata kanan dan kiri Piroxicam: sehari 2 kali 1 kapsul Vitamin Bc: sehari 1 kali 1 tablet</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan Resep</td> <td>Ada</td> <td>15 Februari 2025</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter:</td> <td>Ada</td> <td>dr. Biendha Ulfatullaily</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> </table>	Nama Pasien:	Ada	Muhammad Yakub	Umur Pasien:	Tidak Ada	-	Berat Pasien:	Tidak Ada	-	Nama obat:	Ada	Reco Tetes Mata Piroxicam 10 mg Vitamin Bc	Kekuatan :	Ada	Reco Tetes Mata Piroxicam 10 mg Vitamin Bc	Bentuk sediaan :	Ada	Reco tetes mata: cair Piroxicam: Kapsul Vitamin Bc: tablet	Jumlah Obat :	Ada	Reco tetes mata: 1 botol Piroxicam: 6 kapsul Vitamin BC: 4 tablet	Duplikasi terapi:	Ada/Tidak ada		Aturan Pakai	Ada	Reco tetes mata: diteteskan 3 kali sehari 1 tetes pada mata kanan dan kiri Piroxicam: sehari 2 kali 1 kapsul Vitamin Bc: sehari 1 kali 1 tablet	Tanggal penulisan Resep	Ada	15 Februari 2025	Nama dokter:	Ada	dr. Biendha Ulfatullaily	Surat ijin	Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Tidak Ada	-
Nama Pasien:	Ada	Muhammad Yakub																																							
Umur Pasien:	Tidak Ada	-																																							
Berat Pasien:	Tidak Ada	-																																							
Nama obat:	Ada	Reco Tetes Mata Piroxicam 10 mg Vitamin Bc																																							
Kekuatan :	Ada	Reco Tetes Mata Piroxicam 10 mg Vitamin Bc																																							
Bentuk sediaan :	Ada	Reco tetes mata: cair Piroxicam: Kapsul Vitamin Bc: tablet																																							
Jumlah Obat :	Ada	Reco tetes mata: 1 botol Piroxicam: 6 kapsul Vitamin BC: 4 tablet																																							
Duplikasi terapi:	Ada/Tidak ada																																								
Aturan Pakai	Ada	Reco tetes mata: diteteskan 3 kali sehari 1 tetes pada mata kanan dan kiri Piroxicam: sehari 2 kali 1 kapsul Vitamin Bc: sehari 1 kali 1 tablet																																							
Tanggal penulisan Resep	Ada	15 Februari 2025																																							
Nama dokter:	Ada	dr. Biendha Ulfatullaily																																							
Surat ijin	Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Tidak Ada	-																																							

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Reco tetes mata yang dibutuhkan 1 botol  
 Piroxicam yang dibutuhkan 6 kapsul  
 Vitamin Bc yang dibutuhkan 4 tablet

C. Perhitungan biaya resep

Reco tetes mata =  $20.745 \times 1 = 20.745$   
 Piroxicam =  $286 \times 6 \text{ tablet} = 1.716$   
 Vitamin Bc =  $500 \times 4 \text{ tablet} = 2.000$   
 Total =  $24.461 + 11\% + 20\% = 32.581 = 33.000$

D. Etiket

Nama obat/warna etiket

Nama obat/warna etiket


APOTEK CIPTA MEDIKA 1 Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt	
No. RM :	Tgl Lahir
Nama: M.Yakub	Tgl : 15-2-25
...2..... X sehari 1	<b>Tab/Kapsul</b> Bungkus
Bila nyeri	Sendok teh/makan
<del>SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del>	
Penulis Resep: dr.Biendha	Nama obat : piroxicam Tgl Kadaluarsa :

APOTEK CIPTA MEDIKA 1 Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt	
No. RM :	Tgl Lahir
Nama: M. Yakub	Tgl : 15-2-25
...1..... X sehari 1	<b>Tab/Kapsul</b> Bungkus
Vitamin Bc	Sendok teh/makan
<del>SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del>	
Penulis Resep: dr.Biendha	Nama obat : Ranitidin Tgl Kadaluarsa :

		<p>Nama obat/warna etiket</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e1eef6;"> <p style="text-align: center;"><b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b>                  Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989                  Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt</p> <p>No. RM :                      Tanggal :15-2-25                  Nama : M.Yakub      Tgl Lahir :</p> <p style="text-align: center;">3 X sehari 1      <b>Tetes/Dioleskan/</b>                  Melalui Dubur</p> <p>Petunjuk khusus: mata kanan dan kiri</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>OBAT LUAR</b>      reco tetes mata</p> </div> <p style="text-align: center;">E. Product knowledge</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Nama obat: Reco tetes mata                      Kandungan: kloramfenikol                      Dosis lazim:                      Kegunaan: konjungtivis bacterial dan infeksi okular superfisial lain.                      ESO: Reaksi alergik, superinfeksi, hypoplasia sumsum tulang.                      KI: hipersensitif                      PERHATIAN: pertumbuhan berlebih organisme tidak peka termasuk jamur (pakaian jangka lama).                      Cara penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung.</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Nama obat: Piroxicam                      Kandungan: Piroxicam 10 mg                      Dosis lazim: Awal: 20 mg dosis Tunggal selama 3 hari; Gout akut: sehari 40 mg dosis Tunggal atau terbagi selama 4-6 hari; gangguan musculoskeletal akut: sehari 40 mg dosis Tunggal atau terbagi selama 2 hari, selanjutnya sehari 20 mg selama 7-14 hari.                      Kegunaan: Terapi simptomatik rematoid astritis, osteoarthritis, ankilosing spondylitis, gangguan musculoskeletal akut dan gout akut.                      ESO: keluhan epigastrik distress, nausea, gangguan abdominal atau nyeri, konstipasi diare dan flatutens. Kadang-kadang terjadi edema, pusing, sakit kepala, ruam kulit,</p> </td> </tr> </table>	<p>Nama obat: Reco tetes mata                      Kandungan: kloramfenikol                      Dosis lazim:                      Kegunaan: konjungtivis bacterial dan infeksi okular superfisial lain.                      ESO: Reaksi alergik, superinfeksi, hypoplasia sumsum tulang.                      KI: hipersensitif                      PERHATIAN: pertumbuhan berlebih organisme tidak peka termasuk jamur (pakaian jangka lama).                      Cara penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung.</p>	<p>Nama obat: Piroxicam                      Kandungan: Piroxicam 10 mg                      Dosis lazim: Awal: 20 mg dosis Tunggal selama 3 hari; Gout akut: sehari 40 mg dosis Tunggal atau terbagi selama 4-6 hari; gangguan musculoskeletal akut: sehari 40 mg dosis Tunggal atau terbagi selama 2 hari, selanjutnya sehari 20 mg selama 7-14 hari.                      Kegunaan: Terapi simptomatik rematoid astritis, osteoarthritis, ankilosing spondylitis, gangguan musculoskeletal akut dan gout akut.                      ESO: keluhan epigastrik distress, nausea, gangguan abdominal atau nyeri, konstipasi diare dan flatutens. Kadang-kadang terjadi edema, pusing, sakit kepala, ruam kulit,</p>
<p>Nama obat: Reco tetes mata                      Kandungan: kloramfenikol                      Dosis lazim:                      Kegunaan: konjungtivis bacterial dan infeksi okular superfisial lain.                      ESO: Reaksi alergik, superinfeksi, hypoplasia sumsum tulang.                      KI: hipersensitif                      PERHATIAN: pertumbuhan berlebih organisme tidak peka termasuk jamur (pakaian jangka lama).                      Cara penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung.</p>	<p>Nama obat: Piroxicam                      Kandungan: Piroxicam 10 mg                      Dosis lazim: Awal: 20 mg dosis Tunggal selama 3 hari; Gout akut: sehari 40 mg dosis Tunggal atau terbagi selama 4-6 hari; gangguan musculoskeletal akut: sehari 40 mg dosis Tunggal atau terbagi selama 2 hari, selanjutnya sehari 20 mg selama 7-14 hari.                      Kegunaan: Terapi simptomatik rematoid astritis, osteoarthritis, ankilosing spondylitis, gangguan musculoskeletal akut dan gout akut.                      ESO: keluhan epigastrik distress, nausea, gangguan abdominal atau nyeri, konstipasi diare dan flatutens. Kadang-kadang terjadi edema, pusing, sakit kepala, ruam kulit,</p>			

		<p>pruritus, somnolens, penurunan hemoglobin dan Hematokrit.                  KI:penderita asma yang mempunyai Riwayat tukak lambung, perforasi atau perdarahan lambung. Penderita yang hipersensitif terhadap obat ini. Penderita yang mengalami bronkospasme, polip hidung dan angioedema apabila diberikan asetosal anti inflamasi non steroid lainnya.                  PERHATIAN: tidak dianjurkan untuk ibu menyusui dan hamil, hati-hati pada penderita dengan gangguan pencernaan, jantung, hipertensi, dan keadaan predisposisi retensi air, ginjal, dan hati.                  Cara penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.</p>	
		<p>Nama obat: Vitamin BC                  Kandungan: Vitamin BC(thiamine)                  Dosis lazim: 1 tablet perhari                  Kegunaan: terapi defisiensi vitamin B kompleks                  ESO: sakit kepala dan mual, mati rasa pada tangan dan kaki</p>	

		<p>KI: hipersensitivitas terhadap thiamine atau komponen lain pada formula PERHATIAN: hati-hati pada pasien yang mendapat levodopa Cara penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.</p>	
		<p>E. Tahap pembuatan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan skrinning resep'</li><li>2. Menyiapkan obat yang tertera pada resep yaitu reco tetes mata, piroxicam, vitaminBC</li><li>3. Menulis etiket pada masing-masing obat</li><li>4. Menemplantkan etiket setiap obat dan dimasukkan ke dalam plastic klip</li><li>5. Dicek kembalo obat dan etiket apakah sudah sesuai dengan resep</li></ol>	
		<p>F. Informasi obat yang diberikan (Berupa paragraph dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>TVF: pengambilan obat atas nama Muhammad yakub M: ya mbak, dengan saya sendiri TVF: baik bu saya bantu jelaskan terkait obatnya, untuk obat nyeri diminum 2 kali sehari sesudah makan, untuk vitamin nya diminum 1 kali sehari 1 tablet. Apakah bapaknya sakit mata? M: iyaa mbak saya sakit mata TVF: baik pak ini ada tetes mata diteteskan 3 kali sehari 1 tetes pada mata kanan dan kiri ya pak, apakah ada yang ditanyakan. M: sudah mbak terimakasih TVF: baik pak sama-sama ini obatnya, semoga lekas sembuh.</p>	

3	<p><b>Resep obat mata/telinga</b></p> 	<p><b>A. Skrinning Administrasi</b></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="996 624 1220 663">Nama Pasien:</td> <td data-bbox="1220 624 1400 663">Ada</td> <td data-bbox="1400 624 1982 663">Rina Chamidah</td> </tr> <tr> <td data-bbox="996 663 1220 703">Umur pasien</td> <td data-bbox="1220 663 1400 703">Tidak Ada</td> <td data-bbox="1400 663 1982 703">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="996 703 1220 743">Berat Badan:</td> <td data-bbox="1220 703 1400 743">Tidak ada</td> <td data-bbox="1400 703 1982 743">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="996 743 1220 895">Nama obat:</td> <td data-bbox="1220 743 1400 895">Ada</td> <td data-bbox="1400 743 1982 895">Demacolin tablet Erlamycetin tetes telinga Flucadex Omedrinat</td> </tr> <tr> <td data-bbox="996 895 1220 1046">Bentuk sediaan</td> <td data-bbox="1220 895 1400 1046">Ada</td> <td data-bbox="1400 895 1982 1046">Demacolin: tablet Erlamycetin tetes telinga: cair Flucadex: Tablet Omedrinat: Tablet</td> </tr> <tr> <td data-bbox="996 1046 1220 1198">Jumlah obat:</td> <td data-bbox="1220 1046 1400 1198">Ada</td> <td data-bbox="1400 1046 1982 1198">Demacolin: 10 tablet Erlamycetin tetes telinga: 1 botol Flucadex: 10 Tablet Omedrinat: 10 Tablet</td> </tr> <tr> <td data-bbox="996 1198 1220 1278">Duplikasi terapi:</td> <td data-bbox="1220 1198 1400 1278">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1400 1198 1982 1278"></td> </tr> </table>	Nama Pasien:	Ada	Rina Chamidah	Umur pasien	Tidak Ada	-	Berat Badan:	Tidak ada	-	Nama obat:	Ada	Demacolin tablet Erlamycetin tetes telinga Flucadex Omedrinat	Bentuk sediaan	Ada	Demacolin: tablet Erlamycetin tetes telinga: cair Flucadex: Tablet Omedrinat: Tablet	Jumlah obat:	Ada	Demacolin: 10 tablet Erlamycetin tetes telinga: 1 botol Flucadex: 10 Tablet Omedrinat: 10 Tablet	Duplikasi terapi:	Ada/Tidak Ada	
Nama Pasien:	Ada	Rina Chamidah																					
Umur pasien	Tidak Ada	-																					
Berat Badan:	Tidak ada	-																					
Nama obat:	Ada	Demacolin tablet Erlamycetin tetes telinga Flucadex Omedrinat																					
Bentuk sediaan	Ada	Demacolin: tablet Erlamycetin tetes telinga: cair Flucadex: Tablet Omedrinat: Tablet																					
Jumlah obat:	Ada	Demacolin: 10 tablet Erlamycetin tetes telinga: 1 botol Flucadex: 10 Tablet Omedrinat: 10 Tablet																					
Duplikasi terapi:	Ada/Tidak Ada																						


		Aturan pakai	Ada	Demacolin: 3 kali sehari 1 tablet, bila demam, batuk Erlamycetin tetes telinga: diteteskan 3 kali sehari 1 tetes pada teliga Flucadex: 3 kali sehari 1 tablet bila flu dan batuk Omedrinat: 2 kali sehari 1 tablet, bila pusing
		Tanggal penulisan resep	Ada	12 Februari 2025
		Nama dokter	Ada	dr. Biendha Ulfatullaily
		Surat ijin	Tidak ada	-
		Alamat dr. :	Tidak ada	-
		<p>B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi</p>		
		<p>Demacolin yang dibutuhkan 10 tablet Erlamycetin tetes telinga yang dibutuhkan 1 botol Flucadex yang dibutuhkan 10 tablet Omedrinat yang dibutuhkan 10 tablet</p>		
		<p>C. Perhitungan biaya resep</p>		
		<p>Demacolin = 725 x 10 tablet = 7.250 Erlamycetin tetes telinga = 20.000 x 1 botol = 20.000 Flucadex = 500 x 10 tablet = 10.000 Omedrinat = 500 x 10 tablet = 10.000 Total = 47.250 + 11% + 20% = 62.937 = 63.000</p>		

		<p><b>D. Etiket</b></p> <p><b>Nama obat/warna etiket</b></p> <table border="1" data-bbox="996 312 1447 671"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b>                  Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989                  Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt             </td> </tr> <tr> <td>No. RM :</td> <td>Tgl Lahir</td> </tr> <tr> <td>Nama: Rina chamidah</td> <td>Tgl : 12-2-25</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <b>Tab/Kapsul</b>                  ...3..... X sehari 1 Bungkus                  Bila demam,batuk Sendok teh/makan             </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><del>—SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del></td> </tr> <tr> <td>Penulis Resep: dr.Biendha</td> <td>Nama obat : demacolin Tgl Kadaluaarsa :</td> </tr> </table> <p><b>Nama obat/warna etiket</b></p> <table border="1" data-bbox="996 754 1447 1114"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b>                  Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989                  Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt             </td> </tr> <tr> <td>No. RM :</td> <td>Tgl Lahir</td> </tr> <tr> <td>Nama: Rina chamidah</td> <td>Tgl : 12-2-25</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <b>Tab/Kapsul</b>                  ...3..... X sehari 1 Bungkus                  Bila flu, batuk Sendok teh/makan             </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><del>—SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del></td> </tr> <tr> <td>Penulis Resep: dr.Biendha</td> <td>Nama obat : flucadex Tgl Kadaluaarsa :</td> </tr> </table> <p><b>E. Product knowledge</b></p> <table border="1" data-bbox="996 1198 1512 1347"> <tr> <td>Nama obat: Demacolin Kandungan: Paracetamol 500mg, Pseudoefedrin HCL 7,5 mg, Klorfeniramin maleat 2 mg</td> <td>Nama obat: Erlamycetin tetes telinga Kandungan: chlorampulhenicol bse 1%</td> </tr> </table>	<b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b> Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt		No. RM :	Tgl Lahir	Nama: Rina chamidah	Tgl : 12-2-25	<b>Tab/Kapsul</b> ...3..... X sehari 1 Bungkus Bila demam,batuk Sendok teh/makan		<del>—SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del>		Penulis Resep: dr.Biendha	Nama obat : demacolin Tgl Kadaluaarsa :	<b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b> Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt		No. RM :	Tgl Lahir	Nama: Rina chamidah	Tgl : 12-2-25	<b>Tab/Kapsul</b> ...3..... X sehari 1 Bungkus Bila flu, batuk Sendok teh/makan		<del>—SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del>		Penulis Resep: dr.Biendha	Nama obat : flucadex Tgl Kadaluaarsa :	Nama obat: Demacolin Kandungan: Paracetamol 500mg, Pseudoefedrin HCL 7,5 mg, Klorfeniramin maleat 2 mg	Nama obat: Erlamycetin tetes telinga Kandungan: chlorampulhenicol bse 1%	<p><b>Nama obat/warna etiket</b></p> <table border="1" data-bbox="1473 312 1951 655"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b>                  Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989                  Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt             </td> </tr> <tr> <td>No. RM :</td> <td>Tanggal :12-2-25</td> </tr> <tr> <td>Nama : Rina chamidah</td> <td>Tgl Lahir :</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">                 3 X sehari 1 <b>Tetes/Dioleskan/</b>                  Melalui Dubur             </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Petunjuk khusus: telinga</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>OBAT LUAR Erlamycetin TT</b></td> </tr> </table> <p><b>Nama obat/warna etiket</b></p> <table border="1" data-bbox="1473 754 1928 1114"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b>                  Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989                  Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt             </td> </tr> <tr> <td>No. RM :</td> <td>Tgl Lahir</td> </tr> <tr> <td>Nama: Rina chamidah</td> <td>Tgl : 12-2-25</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <b>Tab/Kapsul</b>                  ...2..... X sehari 1 Bungkus                  Bila pusing Sendok teh/makan             </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><del>—SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del></td> </tr> <tr> <td>Penulis Resep: dr.Biendha</td> <td>Nama obat : omedrinat Tgl Kadaluaarsa :</td> </tr> </table>	<b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b> Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt		No. RM :	Tanggal :12-2-25	Nama : Rina chamidah	Tgl Lahir :	3 X sehari 1 <b>Tetes/Dioleskan/</b> Melalui Dubur		Petunjuk khusus: telinga		<b>OBAT LUAR Erlamycetin TT</b>		<b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b> Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt		No. RM :	Tgl Lahir	Nama: Rina chamidah	Tgl : 12-2-25	<b>Tab/Kapsul</b> ...2..... X sehari 1 Bungkus Bila pusing Sendok teh/makan		<del>—SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del>		Penulis Resep: dr.Biendha	Nama obat : omedrinat Tgl Kadaluaarsa :
<b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b> Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt																																																					
No. RM :	Tgl Lahir																																																				
Nama: Rina chamidah	Tgl : 12-2-25																																																				
<b>Tab/Kapsul</b> ...3..... X sehari 1 Bungkus Bila demam,batuk Sendok teh/makan																																																					
<del>—SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del>																																																					
Penulis Resep: dr.Biendha	Nama obat : demacolin Tgl Kadaluaarsa :																																																				
<b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b> Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt																																																					
No. RM :	Tgl Lahir																																																				
Nama: Rina chamidah	Tgl : 12-2-25																																																				
<b>Tab/Kapsul</b> ...3..... X sehari 1 Bungkus Bila flu, batuk Sendok teh/makan																																																					
<del>—SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del>																																																					
Penulis Resep: dr.Biendha	Nama obat : flucadex Tgl Kadaluaarsa :																																																				
Nama obat: Demacolin Kandungan: Paracetamol 500mg, Pseudoefedrin HCL 7,5 mg, Klorfeniramin maleat 2 mg	Nama obat: Erlamycetin tetes telinga Kandungan: chlorampulhenicol bse 1%																																																				
<b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b> Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt																																																					
No. RM :	Tanggal :12-2-25																																																				
Nama : Rina chamidah	Tgl Lahir :																																																				
3 X sehari 1 <b>Tetes/Dioleskan/</b> Melalui Dubur																																																					
Petunjuk khusus: telinga																																																					
<b>OBAT LUAR Erlamycetin TT</b>																																																					
<b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b> Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt																																																					
No. RM :	Tgl Lahir																																																				
Nama: Rina chamidah	Tgl : 12-2-25																																																				
<b>Tab/Kapsul</b> ...2..... X sehari 1 Bungkus Bila pusing Sendok teh/makan																																																					
<del>—SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del>																																																					
Penulis Resep: dr.Biendha	Nama obat : omedrinat Tgl Kadaluaarsa :																																																				

		<p>Dosis lazim: dewasa: 1 tablet 3 kali sehari, Anak 6-12 tahun: ½ tablet 3 kali sehari</p> <p>Kegunaan: untuk meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat dan bersin-bersin</p> <p>ESO:mengantuk, gangguan pencernaan, insomnia, gelisah, eksitasi, tremor, takikardi, aritmia ventrikuler, mulut kering, palpitasi, sulit berkemih. Penggunaan jangka Panjang menyebabkan kerusakan hati.</p> <p>KI: pasien dengan Riwayat hipersensitif terhadap salah satu komposisi dari demacolin. Pasien yang memiliki Riwayat gangguan fungsi hati yang berat.pasien yang peka terhadap obat simpatomimetik lain, penderita tekanan darah tinggi berat dan yang mendapat terapi obat</p> <p>PERHATIAN: gangguan fungsi hati dan ginjal, glaucoma, hipertrofi prostat, hipertiroid, gangguan jantung, diabetes melitus, tidak dianjurkan untuk anak dibawah 2 tahun, Wanita hamil dan menyusui.</p> <p>Cara penyimpanan: simpan di tempat kering, pada suhu dibawah 30°C.</p>	<p>Dosis lazim: teteskan kedalam lubang telinga 2-3 tetes, 3 kali sehari atau menurut petunjuk dokter.</p> <p>Kegunaan:infeksi superfisial pada telinga luar oleh bakteri gram positif atau gram negative yang peka terhadap chlorampulhenicol.</p> <p>ESO:iritasi local seperti gatal, rasa panas, dermatitis vesicular dan mokulopapular.</p> <p>KI: hipersensitif</p> <p>PERHATIAN: hindari penggunaan jangka Panjang karena apat merangsang hipersensitivitas dan superinfeksi oleh kuman yang resisten.</p> <p>Cara penyimpanan; simpan ditempat sjuk, kering dan terlindung dari Cahaya matahari.</p>
--	--	---	---

		<p>Nama obat: flucadex                  Kandungan: acetaminophen 500mg, gliseril guaicolat 50mg, fenilpropanolamin HCL 15mg, dekstrometorfan HBr 15mg, CTM 1mg                  Dosis lazim: dewasa diatas 12 tahun: 3 kali sehari 1 kaplet, anak 6-12 tahun: 3 kali sehari ½ kaplst.                  Kegunaan: meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin disertai batuk.                  ESO: mengantuk, gangguan pencernaan, gangguan pikomotor, takikardia, aritmia,mulut kering, palpitasi, retensi urin, penggunaan dosis besar dan jangka Panjang menyebabkan kerusakan hati.                  KI: penderita gangguan jantung dan diabetes melitus, penderita gangguan fungsi hati berat, hipersensitivitas.                  PERHATIAN: Hati-hati penggunaan pada penderita dengan gangguan fungsi hati dan ginjal – Tidak dianjurkan penggunaan pada anak usia dibawah 6 tahun, wanita hamil, dan menyusui, kecuali atas petunjuk dokter                  Cara penyimpanan: Simpan di tempat yang sejuk (15-25)°C dan terlindung dari cahaya</p>	<p>Nama obat: Omedrinat                  Kandungan: dimenhydrinat                  Dosis lazim: dosis penggunaan dimenhydrinate untuk tiap pasien bisa berbeda-beda. Dokter akan menyesuaikan takaran dengan usia, Riwayat kesehatan, dan reaksi tubuh pasien terhadap obat.                  Kegunaan: untuk meredakan mual dan muntah, termasuk yang disebabkan oleh vertigo dan morning sickness pada ibu hamil.                  ESO: kantuk, penglihatan buram, konstipasi, mulut,hidung,atau tenggorokan kering.                  KI: hipersensitif terhadap kandungan omedrinat dimenhydrinate, bayi baru lahir                  PERHATIAN: bila mengkonsumsi obat ini tidak dianjurkan menjalankan motor karena dapat menyebabkan kantuk.                  Cara penyimpanan: Simpan di tempat yang sejuk (15-25)°C dan terlindung dari cahaya</p>
--	--	--	---

		<p>F. Tahap pembuatan</p> <div data-bbox="1021 316 1984 632" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan skrinning resep</li><li>2. Menyiapkan obat yang tertera pada resep yaitu demacolin sebanyak 10 tablet, erlamycetin tetes telinga 1 botol, flucadex 10 tablet, dan omedrinat 10 tablet.</li><li>3. Menulis etiket pada masing-masing obat</li><li>4. Menempelkan etiket pada setiap obat dan dimasukkan kedalam plastic klip</li><li>5. Dicek kembali obat dan etiket apakah sudah sesuai dengan resep</li></ol></div> <p>G. informasi obat yang diberikan (berupa paragraph dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <div data-bbox="1032 783 1995 1286" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>TVF: pengambilan oba atas nama ibu rina chamidah R: iya mbak dengan saya sendiri TVF: baik bu, saya bantu jelasin obatnya ya, untuk obat demam batuk diminum 3 kali sehari 1 tablet bila tidak demam dan batuk tidak usah diminum tidak apa-apa, untuk flu, batuk diminum 3 kali sehari 1 tablet bila tidak flu dan batuk tidak usah diminum nggeh buk, untuk obat pusing diminum 2 kali sehari 1 tablet bila tidak pusing tidak usah diminum tidak apa-apa. Ibunya ada sakit telinga ya? R: iya mbak TVF: iya buk, ini ada tetes telinga diteteskan 3 kali sehari 1 tetes pada telinga yang sakit nggeh buk, baik bu apakah ada yang ditanyakan R: sudah mbak terimakasih TVF: baik mbak kalua sudah jelas, ini obatnya semoga lekas sembuh.</p></div>
--	--	--

4.	<p>Resep saluran nafas</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama pasien:</td> <td>Ada</td> <td>Ninik Widayanti</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama obat:</td> <td>Ada</td> <td>Flucadex Cefadroxil Salbutamol Vitamin BC Methylprednisolon</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan:</td> <td>Ada</td> <td>Flucadex Cefadroxil 500mg Salbutamol 2MG Vitamin BC Methylprednisolon</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sediaan:</td> <td>Ada</td> <td>Flucadex: tablet Cefadroxil: kapsul Salbutamol: tablet Vitamin BC: tablet Methylprednisolon: tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat:</td> <td>Ada</td> <td>Flucadex: 6 tablet Cefadroxil: 6 kapsul Salbutamol: 6 tablet Vitamin BC: 4 tablet Methylprednisolon: 6 tablet</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai:</td> <td>Ada</td> <td>Flucadex: sehari 3 kali 1 tablet, bila flu dan batuk</td> </tr> </table>	Nama pasien:	Ada	Ninik Widayanti	Umur pasien:	Tidak ada	-	Berat Badan:	Tidak ada	-	Nama obat:	Ada	Flucadex Cefadroxil Salbutamol Vitamin BC Methylprednisolon	Kekuatan:	Ada	Flucadex Cefadroxil 500mg Salbutamol 2MG Vitamin BC Methylprednisolon	Bentuk sediaan:	Ada	Flucadex: tablet Cefadroxil: kapsul Salbutamol: tablet Vitamin BC: tablet Methylprednisolon: tablet	Jumlah obat:	Ada	Flucadex: 6 tablet Cefadroxil: 6 kapsul Salbutamol: 6 tablet Vitamin BC: 4 tablet Methylprednisolon: 6 tablet	Duplikasi terapi:	Tidak ada	-	Aturan pakai:	Ada	Flucadex: sehari 3 kali 1 tablet, bila flu dan batuk
Nama pasien:	Ada	Ninik Widayanti																											
Umur pasien:	Tidak ada	-																											
Berat Badan:	Tidak ada	-																											
Nama obat:	Ada	Flucadex Cefadroxil Salbutamol Vitamin BC Methylprednisolon																											
Kekuatan:	Ada	Flucadex Cefadroxil 500mg Salbutamol 2MG Vitamin BC Methylprednisolon																											
Bentuk sediaan:	Ada	Flucadex: tablet Cefadroxil: kapsul Salbutamol: tablet Vitamin BC: tablet Methylprednisolon: tablet																											
Jumlah obat:	Ada	Flucadex: 6 tablet Cefadroxil: 6 kapsul Salbutamol: 6 tablet Vitamin BC: 4 tablet Methylprednisolon: 6 tablet																											
Duplikasi terapi:	Tidak ada	-																											
Aturan pakai:	Ada	Flucadex: sehari 3 kali 1 tablet, bila flu dan batuk																											

			Cefadroxil: sehari 2 kali 1 kapsul Salbutamol: sehari 2 kali 1 tablet, bila sesak Vitamin BC: sehari 1 kali 1 tablet Methylprednisolon: sehari 2 kali 1 tablet
Tanggal penulisan resep	Ada		21 Februari 2025
Nama dokter:	Ada		dr. Biendha ulfatulaily
Surat ijin:	Tidak ada		-
Alamat dr. :	Tidak ada		-
B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi			
Flucadex yang dibutuhkan 6 tablet Cefadroxil yang dibutuhkan 6 kapsul Salbutamol yang dibutuhkan 6 tablet Vitamin BC yang dibutuhkan 4 tablet Methylprednisolon yang dibutuhkan 6 tablet			
C. Perhitungan biaya resep			
Flucadex = $500 \times 6 = 3.000$ Cefadroxil = $1.500 \times 6 \text{ tablet} = 9.000$ Salbutamol = $300 \times 6 \text{ tablet} = 1.800$ Vitamin BC = $500 \times 4 \text{ tablet} = 2.000$ Methylprednisolon = $619 \times 6 \text{ tablet} = 3.714$ Total = $19.514 + 11\% + 20\% = 25.992 = 26.000$			

D. Etiket

Nama obat/warna etiket

<b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b> Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt	
No. RM :	Tgl Lahir
Nama: Ninik	Tgl : 21-2-25
<b>Tab/Kapsul</b>	
...3..... X sehari 1	Bungkus
Bila Flu, batuk	Sendok teh/makan
<b>-SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</b>	
Penulis Resep:	Nama obat : Flucadex
dr.Biendha	Tgl Kadaluarsa :

Nama obat/warna etiket

<b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b> Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt	
No. RM :	Tgl Lahir
Nama: Ninik	Tgl : 21-2-25
<b>Tab/Kapsul</b>	
...2..... X sehari 1	Bungkus
Bila sesak	Sendok teh/makan
<b>-SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</b>	
Penulis Resep:	Nama obat : salbutamol
dr.Biendha	Tgl Kadaluarsa :

Nama obat/warna etiket

<b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b> Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt	
No. RM :	Tgl Lahir
Nama: ninik	Tgl : 21-2-25
<b>Tab/Kapsul</b>	
...1..... X sehari 1	Bungkus
Vitamin Bc	Sendok teh/makan
<b>-SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</b>	
Penulis Resep:	Nama obat : demacolin
dr.Biendha	Tgl Kadaluarsa :

Nama obat/warna etiket

<b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b> Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt	
No. RM :	Tgl Lahir
Nama: Rina chamidah	Tgl : 12-2-25
<b>Tab/Kapsul</b>	
...2..... X sehari 1	Bungkus
Radang, nyeri	Sendok teh/makan
<b>-SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</b>	
Penulis Resep:	Nama obat : methyl
dr.Biendha	Tgl Kadaluarsa :

		<p>Nama obat/warna etiket</p> <table border="1" data-bbox="1032 328 1500 812"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt</td> </tr> <tr> <td>No. RM :</td> <td>Tgl Lahir :</td> </tr> <tr> <td>Nama : Ninik</td> <td>Tgl :21-2-25</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Tab/Kapsul</b></td> </tr> <tr> <td>2 X sehari 1</td> <td>Bungkus</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sendok teh/makan</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Diminum setiap 24 jam</td> </tr> <tr> <td><u>Diminum setiap 12 jam</u></td> <td><b>Antibiotik</b></td> </tr> <tr> <td>Diminum setiap 8 jam</td> <td><b>Dihabiskan</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Diminum setiap 6 jam</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Diminum setiap 4,5 jam</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b><u>KOCOK DULU/SEBELUM/SESUDAH MAKAN</u></b></td> </tr> <tr> <td>Penulis Resep: dr. Biendha</td> <td>Nama obat :cefadroxil Tgl Kadaluarsa :</td> </tr> </table> <p>E. Product knowledge</p> <table border="1" data-bbox="1032 868 2031 1383"> <tr> <td data-bbox="1032 868 1500 1383"> <p>Nama obat: flucadex Kandungan: acetaminophen 500mg, gliseril guaicolat 50mg, fenilpropanolamin HCL 15mg, dekstrometorfan HBr 15mg, CTM 1mg Dosis lazim: dewasa diatas 12 tahun: 3 kali sehari 1 kaplet, anak 6-12 tahun: 3 kali sehari ½ kaplst. Kegunaan: meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin disertai batuk.</p> </td> <td data-bbox="1500 868 2031 1383"> <p>Nama obat: cefadroxil 500mg Kandungan: cefadroxil 500mg Dosis lazim: dewasa: sehari sehari 1-2 g dalam sekali dosis atau 2 dosis terbagi, anak: sehari 25-50mg /kgBB dalam 2 dosis terbagi Kegunaan: infeksi saluran nafas, kulit, jaringan lunak, saluran cerna, saluran kemih, dan infeksi llain yang berkaitan dengan organisme bersangkutan. ESO: gangguan saluran cerna, gangguan hipersensitif. KI: penderita hipersensitif terhadap golongan sefalosporin.</p> </td> </tr> </table>	<b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b>		Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989		Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt		No. RM :	Tgl Lahir :	Nama : Ninik	Tgl :21-2-25	<b>Tab/Kapsul</b>		2 X sehari 1	Bungkus		Sendok teh/makan	Diminum setiap 24 jam		<u>Diminum setiap 12 jam</u>	<b>Antibiotik</b>	Diminum setiap 8 jam	<b>Dihabiskan</b>	Diminum setiap 6 jam		Diminum setiap 4,5 jam		<b><u>KOCOK DULU/SEBELUM/SESUDAH MAKAN</u></b>		Penulis Resep: dr. Biendha	Nama obat :cefadroxil Tgl Kadaluarsa :	<p>Nama obat: flucadex Kandungan: acetaminophen 500mg, gliseril guaicolat 50mg, fenilpropanolamin HCL 15mg, dekstrometorfan HBr 15mg, CTM 1mg Dosis lazim: dewasa diatas 12 tahun: 3 kali sehari 1 kaplet, anak 6-12 tahun: 3 kali sehari ½ kaplst. Kegunaan: meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin disertai batuk.</p>	<p>Nama obat: cefadroxil 500mg Kandungan: cefadroxil 500mg Dosis lazim: dewasa: sehari sehari 1-2 g dalam sekali dosis atau 2 dosis terbagi, anak: sehari 25-50mg /kgBB dalam 2 dosis terbagi Kegunaan: infeksi saluran nafas, kulit, jaringan lunak, saluran cerna, saluran kemih, dan infeksi llain yang berkaitan dengan organisme bersangkutan. ESO: gangguan saluran cerna, gangguan hipersensitif. KI: penderita hipersensitif terhadap golongan sefalosporin.</p>
<b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b>																																		
Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989																																		
Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt																																		
No. RM :	Tgl Lahir :																																	
Nama : Ninik	Tgl :21-2-25																																	
<b>Tab/Kapsul</b>																																		
2 X sehari 1	Bungkus																																	
	Sendok teh/makan																																	
Diminum setiap 24 jam																																		
<u>Diminum setiap 12 jam</u>	<b>Antibiotik</b>																																	
Diminum setiap 8 jam	<b>Dihabiskan</b>																																	
Diminum setiap 6 jam																																		
Diminum setiap 4,5 jam																																		
<b><u>KOCOK DULU/SEBELUM/SESUDAH MAKAN</u></b>																																		
Penulis Resep: dr. Biendha	Nama obat :cefadroxil Tgl Kadaluarsa :																																	
<p>Nama obat: flucadex Kandungan: acetaminophen 500mg, gliseril guaicolat 50mg, fenilpropanolamin HCL 15mg, dekstrometorfan HBr 15mg, CTM 1mg Dosis lazim: dewasa diatas 12 tahun: 3 kali sehari 1 kaplet, anak 6-12 tahun: 3 kali sehari ½ kaplst. Kegunaan: meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin disertai batuk.</p>	<p>Nama obat: cefadroxil 500mg Kandungan: cefadroxil 500mg Dosis lazim: dewasa: sehari sehari 1-2 g dalam sekali dosis atau 2 dosis terbagi, anak: sehari 25-50mg /kgBB dalam 2 dosis terbagi Kegunaan: infeksi saluran nafas, kulit, jaringan lunak, saluran cerna, saluran kemih, dan infeksi llain yang berkaitan dengan organisme bersangkutan. ESO: gangguan saluran cerna, gangguan hipersensitif. KI: penderita hipersensitif terhadap golongan sefalosporin.</p>																																	

		<p>ESO: mengantuk, gangguan pencernaan, gangguan pikomotor, takikardia, aritmia, mulut kering, palpitasi, retensi urin, penggunaan dosis besar dan jangka Panjang menyebabkan kerusakan hati.</p> <p>KI: penderita gangguan jantung dan diabetes melitus, penderita gangguan fungsi hati berat, hipersensitivitas.</p> <p>PERHATIAN: Hati-hati penggunaan pada penderita dengan gangguan fungsi hati dan ginjal – Tidak dianjurkan penggunaan pada anak usia dibawah 6 tahun, wanita hamil, dan menyusui, kecuali atas petunjuk dokter</p> <p>Cara penyimpanan: Simpan di tempat yang sejuk (15-25)°C dan terlindung dari cahaya</p>	<p>PERHATIAN: hati-hati bila digunakan pada penderita gangguan fungsi ginjal dan penderita colitis, alergi terhadap penisilin, Wanita menyusui, dan pemakaian lama karena dapat menimbulkan infeksi.</p> <p>Cara penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.</p>
		<p>Nama obat: salbutamol</p> <p>Kandungan: salbutamol sulfat</p> <p>Dosis lazim: 2-6 tahun: 1-2 mg, 6-12 tahun: 2mg, Dewasa dan anak &gt; 12 tahun 2-4mg. diberikan 3-4 kali sehari.</p> <p>Kegunaan: kejang bronkus pada semua asma bronkial, bronchitis kronis dan emfisema.</p> <p>ESO: pada pemakaian dosis besar kadang ditemukan terjadi tremor,</p>	<p>Nama obat: Vitamin BC</p> <p>Kandungan: Vitamin BC(thiamine)</p> <p>Dosis lazim: 1 tablet perhari</p> <p>Kegunaan: terapi defisiensi vitamin B kompleks</p> <p>ESO: sakit kepala dan mual, mati rasa pada tangan dan kaki</p> <p>KI: hipersensitivitas terhadap thiamine atau komponen lain pada formula</p> <p>PERHATIAN: hatihati pada pasien yang mendapat levodopa</p>

		<p>palpitasi, kejang otot, takikardia, sakit kepala, dan ketegangan                  KI: hipersensitif                  PERHATIAN: hati-hati pada penderita thyrotoksikosis, hipertensi, gangguan kardiovaskuler, hipertiroid. Sebaiknya dihindari pada kehamilan trisemester pertama. Hati-hati penggunaan pada anak kurang dari 2 tahun.                  Cara penyimpanan: simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>	<p>Cara penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.</p>
		<p>Nama obat: methylprednisolon                  Kandungan: methylprednisolon                  Dosis lazim: Dosis yang dianjurkan : 30 mg/kg berat badan, diberikan secara intravena paling tidak lebih dari 30 menit. Dosis ini dapat diulangi setiap 4-6 jam untuk setiap 48 jam. Dosis dapat dikurangi untuk bayi dan anak-anak tapi yang perlu lebih diperhatikan                  Kegunaan: terapi supresi inflamasi (peradangan) dan untuk menangani gatal-gatal, kemerahan, dan kekeringan pada kulit, pada beberapa individu dapat mengobati sariawan pada mulut.</p>	


		<p>ESO: Pemberian jangka pendek jarang menimbulkan efek samping yang serius. Pemberian jangka lama akan menimbulkan efek samping seperti yang ditimbulkan kortikosteroid lainnya</p> <p>KI: hipersensitivitas terhadap kortikosteroid</p> <p>PERHATIAN: TBC, ulkus peptikum, infeksi jamur sistemik, herpes simpleks, diabetes melitus, varisela. Hipersensitif terhadap metilprednisolon dan glukokortikoid lainnya.</p> <p>Cara penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari</p> <p>F. Tahapan pembuatan</p>	
--	--	--	--

1. Melakukan skrinning resep
2. Menyiapkan obat yang tertera pada resep yaitu: flucadex 6 tablet, cefadroxil 6 kapsul, salbutamol 6 tablet, vitamin BC 4 tablet, methylprednisolone 6 tablet.
3. Menulis etiket pada masing-masing obat
4. Menempelkan etiket setiap obat dan dimasukkan pada plastic klip
5. Dicek kembali obat dan etiket apakah sudah sesuai dengan resep

		<p>G. Informasi obat yang diberikan (berupa paragraf fan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>TVF: Pengambilan obat atas nama ninik widayanti                      N: iya mbak dengan saya sendiri                      TVF: baik bu, saya bantu menjelaskan obatnya ya buk. Untuk flu dan batuk diminum 3 kali sehari 1 tablet, bila tidak flu dan batuk tidak usah diminum buk, untuk antibiotic nya diminum 2 kali sehari 1 kapsul dihabiskan buk, untuk sesak diminum 2 kali sehari 1 tablet bila sesak aja buk, untuk vitamin iminum 1 kali sehari 1 tablet, untuk radang atau nyeri diminum 2 kali sehari 1 tablet. Baik bua pa ada yang ditanyakan.                      N: tidak ada mbak, saya sudah faham terimakasih                      TVF: baik buk sama-sama, ini obatnya semoga lekas sembuh buk.</p> </div>
--	--	--

<p>5. Resep KB</p>		<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama pasien:</td> <td>Ada</td> <td>Yunita rosydah</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat badan:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama obat:</td> <td>Ada</td> <td>Andalan 3 bulan</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan:</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sediaan:</td> <td>Ada</td> <td>Andalan 3 bulan: cairan injeksi</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat:</td> <td>Ada</td> <td>Andalan 3 bulan: 1 vial</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai:</td> <td>Ada</td> <td>Andalan 3 bulan: Serahkan ke tangan paramedis</td> </tr> </table>	Nama pasien:	Ada	Yunita rosydah	Umur pasien:	Tidak ada	-	Berat badan:	Tidak ada	-	Nama obat:	Ada	Andalan 3 bulan	Kekuatan:	Tidak Ada	-	Bentuk sediaan:	Ada	Andalan 3 bulan: cairan injeksi	Jumlah obat:	Ada	Andalan 3 bulan: 1 vial	Duplikasi terapi:	Tidak ada	-	Aturan pakai:	Ada	Andalan 3 bulan: Serahkan ke tangan paramedis
Nama pasien:	Ada	Yunita rosydah																											
Umur pasien:	Tidak ada	-																											
Berat badan:	Tidak ada	-																											
Nama obat:	Ada	Andalan 3 bulan																											
Kekuatan:	Tidak Ada	-																											
Bentuk sediaan:	Ada	Andalan 3 bulan: cairan injeksi																											
Jumlah obat:	Ada	Andalan 3 bulan: 1 vial																											
Duplikasi terapi:	Tidak ada	-																											
Aturan pakai:	Ada	Andalan 3 bulan: Serahkan ke tangan paramedis																											

		<table border="1"> <tr> <td>Tanggal penulisan resep:</td> <td>Ada</td> <td>7 Maret 2025</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter:</td> <td>Ada</td> <td>dr. Sofia</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr.:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> </table>	Tanggal penulisan resep:	Ada	7 Maret 2025	Nama dokter:	Ada	dr. Sofia	Surat ijin:	Tidak ada	-	Alamat dr.:	Tidak ada	-	<p>B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi</p> <p>Andalan 3 bulan yang diperlukan 1 vial</p> <p>C. Perhitungan biaya resep</p> <p>Andalan 3 bulan : Rp. 8.418 X 1 vial (1 ml) = 8.418</p> <p>D. Etiket Nama obat/warna etiket</p> <p>E. Product knowledge</p> <p>Nama obat: Andalan injeksi Kandungan: per ml terdapat medroxyprogesterone acetate 150 mg Dosis lazim: - Kegunaan: KB 3 bulan ESO: - KI: - PERHATIAN: Cara penyimpanan: -</p> <p>F. Tahap pembuatan</p> <p>Diserahkan kepada dokter</p>
Tanggal penulisan resep:	Ada	7 Maret 2025													
Nama dokter:	Ada	dr. Sofia													
Surat ijin:	Tidak ada	-													
Alamat dr.:	Tidak ada	-													

		<p>G. Informasi obat yang diberikan (berupa paragraph dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Dokter yang menyerahkan</p> </div>																																							
<p>6. Resep yang mengandung inhaler</p>		<p>A. Skrining administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1066 469 1984 1040"> <tr> <td>Nama pasien:</td> <td>Ada</td> <td>Musichanawati</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien:</td> <td>Ada</td> <td>68 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat badan:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama obat:</td> <td>Ada</td> <td>R/ Seretide discus</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan:</td> <td>Ada</td> <td>R/ Seretide discus 250 mcg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sediaan:</td> <td>Ada</td> <td>Seretide discus: inhaler</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat:</td> <td>Ada</td> <td>Seretide discus: 1 pcs inhaler</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai:</td> <td>Ada</td> <td>Sertide discus: dihirup sehari 1 kali 1 hirup</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep:</td> <td>Ada</td> <td>7 Maret 2025</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter:</td> <td>Ada</td> <td>dr. Frisky</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Sertide discus yang dibutuhkan 1 pcs inhaler</p> </div> <p>C. Perhitungan biaya resep</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Sertide discus = 373.937 x 1 pcs = 373.937</p> </div> <p>D. Etiket</p>	Nama pasien:	Ada	Musichanawati	Umur pasien:	Ada	68 tahun	Berat badan:	Tidak ada	-	Nama obat:	Ada	R/ Seretide discus	Kekuatan:	Ada	R/ Seretide discus 250 mcg	Bentuk sediaan:	Ada	Seretide discus: inhaler	Jumlah obat:	Ada	Seretide discus: 1 pcs inhaler	Duplikasi terapi:	Tidak ada	-	Aturan pakai:	Ada	Sertide discus: dihirup sehari 1 kali 1 hirup	Tanggal penulisan resep:	Ada	7 Maret 2025	Nama dokter:	Ada	dr. Frisky	Surat ijin:	Tidak ada	-	Alamat dr. :	Tidak ada	-
Nama pasien:	Ada	Musichanawati																																							
Umur pasien:	Ada	68 tahun																																							
Berat badan:	Tidak ada	-																																							
Nama obat:	Ada	R/ Seretide discus																																							
Kekuatan:	Ada	R/ Seretide discus 250 mcg																																							
Bentuk sediaan:	Ada	Seretide discus: inhaler																																							
Jumlah obat:	Ada	Seretide discus: 1 pcs inhaler																																							
Duplikasi terapi:	Tidak ada	-																																							
Aturan pakai:	Ada	Sertide discus: dihirup sehari 1 kali 1 hirup																																							
Tanggal penulisan resep:	Ada	7 Maret 2025																																							
Nama dokter:	Ada	dr. Frisky																																							
Surat ijin:	Tidak ada	-																																							
Alamat dr. :	Tidak ada	-																																							

	<div data-bbox="1050 217 1529 533" style="background-color: #ADD8E6; padding: 5px;"><p style="text-align: center;"><b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b> Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt</p><table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">No. RM :</td><td style="width: 50%;">Tanggal :7-3-25</td></tr><tr><td>Nama :</td><td>Musichanawati Tgl Lahir :</td></tr></table><p style="text-align: center;">1 X sehari 1 <del>Tetes/Dioleskan/</del> <del>Melalui Dubur</del></p><p>Petunjuk khusus: <b>dihirupkan</b></p><p style="text-align: center;"><b>OBAT LUAR</b></p></div> <p data-bbox="1061 572 1361 608"><b>E. Product knowledge</b></p> <div data-bbox="1061 608 1991 1165" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>Nama obat: Sertide discus Kandungan : salmeterol sinapoat 50mg, flutikason propionate 250 mcg Dosis lazim: &gt; 2 tahun sehari 2 kali 1 hirup Kegunaan: untuk terapi rutin penyakit penyumbatan saluran nafas, termasuk asma ESO: sakit kepala, jamur pada mlut, iritasi tenggorokan, tremor/gemetar, jantung berdebar, gangguan suara (serak), kram otot KI: penderita yang hipersensitif terhadap komponen obat PERHATIAN: harus dengan resep dokter. Tidak untuk meredakan gejala asma akut. TB paru, gangguan jantung berat, diabetes mellitus, hipokalemia yang tidak diterapi, tirotosikosis. Lakukan pengawasan berkla terhadap laju pertumbuhan pada anak yang mendapat terapi. Cara penyimpanan: simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p></div>	No. RM :	Tanggal :7-3-25	Nama :	Musichanawati Tgl Lahir :
No. RM :	Tanggal :7-3-25				
Nama :	Musichanawati Tgl Lahir :				

	<p>F. Tahap pembuatan</p> <div data-bbox="1093 256 1984 572"><ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan skrinning resep</li><li>2. Menyiapkan obat yang tertera pada resep yaitu sertide diskus 1 pcs</li><li>3. Menulis etiket pada masing-masing obat</li><li>4. Menempelkan etiket setiap obat dan dimasukkan ke dalam plastik</li><li>5. Dicek kembali obat dan etiket apakah sesuai dengan resep tersebut</li></ol></div> <p>G. Informasi obat yang diberikan (berupa paragraph dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <div data-bbox="1093 703 1984 1131"><p>TVF: pengambilan obat atas nama Musichanawati M: ya, dengan saya sendii mbak TVF: baik buk, saya bantu jelaskan obatnya ya obatnya berupa inhaler cara pemakaiannya tariklah napas perlahan-lahan dan hembuskan. Letakkan inhaler di mulut antara gigi dan bibir. Tarik napas mendalam melalui mulut, lalu lepaskan inhaler dari mulut dan tahan napas setelah itu hembuskan napas digunakan 1 kali sehari 1 hirup ya buk. Baik bu untuk penjelasan saya sudah dimengerti M: sudah mbak terimakasih TVF: baik buk ini obatnya semoga lekas sembuh</p></div>
--	---

7.	<p>Resep kudis/kurap</p>  <p>KLINIK CIPTA MEDIKA GKB          Jl. Balikpapan No. 6 GKB, Gresik, Jawa Timur          031-3954446/082245015803          E-mail : ciptamedikaklinik@gmail.com</p> <p>REKAP PENGGUNAAN OBAT PER PASIEN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Tanggal</th> <th>No RM</th> <th>Nama Pasien</th> <th>Jml</th> <th>Nama Obat</th> <th>Biaya</th> <th>Embalase</th> <th>Tumpah</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2025-03-03</td> <td>005002</td> <td>RAFAEL FREGA AL BARA</td> <td>6</td> <td>GKB1496 ASAM MEFENAMAT (MRS)</td> <td>1,200</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,200</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td>GKB1235 ERLADERM-N KRIM</td> <td>2,325</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2,325</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6</td> <td>GKB0879 OMEGTAMINE TAB</td> <td>1,068</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,068</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td>GKB1333 SALEP 24 30GR (HOL)</td> <td>2,061</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2,061</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Subtotal :</td> <td>6,654</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>6,654</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Total :</td> <td>6,654</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>6,654</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Tanggal	No RM	Nama Pasien	Jml	Nama Obat	Biaya	Embalase	Tumpah	Total	1	2025-03-03	005002	RAFAEL FREGA AL BARA	6	GKB1496 ASAM MEFENAMAT (MRS)	1,200	0	0	1,200					0.5	GKB1235 ERLADERM-N KRIM	2,325	0	0	2,325					6	GKB0879 OMEGTAMINE TAB	1,068	0	0	1,068					0.5	GKB1333 SALEP 24 30GR (HOL)	2,061	0	0	2,061						Subtotal :	6,654	0	0	6,654						Total :	6,654	0	0	6,654	<p>A. Skrinning administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama pasien:</td> <td>Ada</td> <td>Rafael Frega Al Bara</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat badan:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama obat:</td> <td>Ada</td> <td>Asam mefenamat Erladerm-N cream Omeptamine Salep 24</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan:</td> <td>Ada</td> <td>Asam mefenamat Erladerm-N cream Omeptamine Salep 24 30 gr</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sediaan:</td> <td>Ada</td> <td>Asam mefenamat: tablet Erladerm-N: cream Omeptamine: tablet Salep 24: cream</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat:</td> <td>Ada</td> <td>Asam mefenamat: 6 tablet Erladerm-N cream: 0.5 Omeptamine: 6 tablet Salep 24: 0.5</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai:</td> <td>Ada</td> <td>Racikan Erladerm-N + salep 24 cream: dioles tipis 3x sehari Asam mefenamat: 2 kali sehari 1 tablet Omeptamine: 2 kali sehari 1 tablet</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep:</td> <td>Ada</td> <td>03 Maret 2025</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter:</td> <td>Ada</td> <td>dr. Biendha</td> </tr> </table>	Nama pasien:	Ada	Rafael Frega Al Bara	Umur pasien:	Tidak ada	-	Berat badan:	Tidak ada	-	Nama obat:	Ada	Asam mefenamat Erladerm-N cream Omeptamine Salep 24	Kekuatan:	Ada	Asam mefenamat Erladerm-N cream Omeptamine Salep 24 30 gr	Bentuk sediaan:	Ada	Asam mefenamat: tablet Erladerm-N: cream Omeptamine: tablet Salep 24: cream	Jumlah obat:	Ada	Asam mefenamat: 6 tablet Erladerm-N cream: 0.5 Omeptamine: 6 tablet Salep 24: 0.5	Duplikasi terapi:	Tidak ada	-	Aturan pakai:	Ada	Racikan Erladerm-N + salep 24 cream: dioles tipis 3x sehari Asam mefenamat: 2 kali sehari 1 tablet Omeptamine: 2 kali sehari 1 tablet	Tanggal penulisan resep:	Ada	03 Maret 2025	Nama dokter:	Ada	dr. Biendha
No.	Tanggal	No RM	Nama Pasien	Jml	Nama Obat	Biaya	Embalase	Tumpah	Total																																																																																																
1	2025-03-03	005002	RAFAEL FREGA AL BARA	6	GKB1496 ASAM MEFENAMAT (MRS)	1,200	0	0	1,200																																																																																																
				0.5	GKB1235 ERLADERM-N KRIM	2,325	0	0	2,325																																																																																																
				6	GKB0879 OMEGTAMINE TAB	1,068	0	0	1,068																																																																																																
				0.5	GKB1333 SALEP 24 30GR (HOL)	2,061	0	0	2,061																																																																																																
					Subtotal :	6,654	0	0	6,654																																																																																																
					Total :	6,654	0	0	6,654																																																																																																
Nama pasien:	Ada	Rafael Frega Al Bara																																																																																																							
Umur pasien:	Tidak ada	-																																																																																																							
Berat badan:	Tidak ada	-																																																																																																							
Nama obat:	Ada	Asam mefenamat Erladerm-N cream Omeptamine Salep 24																																																																																																							
Kekuatan:	Ada	Asam mefenamat Erladerm-N cream Omeptamine Salep 24 30 gr																																																																																																							
Bentuk sediaan:	Ada	Asam mefenamat: tablet Erladerm-N: cream Omeptamine: tablet Salep 24: cream																																																																																																							
Jumlah obat:	Ada	Asam mefenamat: 6 tablet Erladerm-N cream: 0.5 Omeptamine: 6 tablet Salep 24: 0.5																																																																																																							
Duplikasi terapi:	Tidak ada	-																																																																																																							
Aturan pakai:	Ada	Racikan Erladerm-N + salep 24 cream: dioles tipis 3x sehari Asam mefenamat: 2 kali sehari 1 tablet Omeptamine: 2 kali sehari 1 tablet																																																																																																							
Tanggal penulisan resep:	Ada	03 Maret 2025																																																																																																							
Nama dokter:	Ada	dr. Biendha																																																																																																							


	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Surat ijin:</td> <td style="width: 30%;">Tidak ada</td> <td style="width: 40%;">-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> </table> <p><b>B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;">                 Asam mefenamat yang dibutuhkan 6 tablet                  Erladerm-N crem yang dibutuhkan 0,5 gr                  Omegtamin tab yang dibutuhkan 6 tablet                  Salep 24 crem yang dibutuhkan 0,5 gr             </div> <p><b>C. Perhitungan biaya resep</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;">                 Asam mefenamat : Rp. 200 x 6 Tablet = 1.200                  Erladerm-N crem : Rp. 2.325                  Omegtamin tab : Rp. 178 x 6 Tablet = 1.068                  Salep 24 crem:2.061                  Total: 6.654 + 11% + 20% = 8.863 = 10.000             </div> <p><b>D. Etiket</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; text-align: center;"><b>Nama obat/warna etiket</b></td> <td style="width: 50%; border: none; text-align: center;"><b>Nama obat/warna etiket</b></td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     APOTEK CIPTA MEDIKA 1                      Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989                      Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt                 </div> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">No. RM :</td> <td style="width: 50%;">Tgl Lahir</td> </tr> <tr> <td>Nama: Rafael</td> <td>Tgl : 3-3-25</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin: 5px 0;"><b>Tab/Kapsul</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">...2..... X sehari 1</td> <td style="width: 50%;">Bungkus</td> </tr> <tr> <td>Bila nyeri</td> <td>Sendok teh/makan</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin: 5px 0;"><del>SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Penulis Resep: dr.Biendha</td> <td style="width: 50%;">Nama obat : Asmef Tgl Kadaluarsa :</td> </tr> </table> </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     APOTEK CIPTA MEDIKA 1                      Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989                      Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt                 </div> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">No. RM :</td> <td style="width: 50%;">Tgl Lahir</td> </tr> <tr> <td>Nama: Rafael</td> <td>Tgl : 3-3-25</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin: 5px 0;"><b>Tab/Kapsul</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">...2..... X sehari 1</td> <td style="width: 50%;">Bungkus</td> </tr> <tr> <td>Radang, nyeri</td> <td>Sendok teh/makan</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin: 5px 0;"><del>SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Penulis Resep: dr.Biendha</td> <td style="width: 50%;">Nama obat : Omegtamin Tgl Kadaluarsa :</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Surat ijin:	Tidak ada	-	Alamat dr. :	Tidak ada	-	<b>Nama obat/warna etiket</b>	<b>Nama obat/warna etiket</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     APOTEK CIPTA MEDIKA 1                      Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989                      Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt                 </div> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">No. RM :</td> <td style="width: 50%;">Tgl Lahir</td> </tr> <tr> <td>Nama: Rafael</td> <td>Tgl : 3-3-25</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin: 5px 0;"><b>Tab/Kapsul</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">...2..... X sehari 1</td> <td style="width: 50%;">Bungkus</td> </tr> <tr> <td>Bila nyeri</td> <td>Sendok teh/makan</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin: 5px 0;"><del>SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Penulis Resep: dr.Biendha</td> <td style="width: 50%;">Nama obat : Asmef Tgl Kadaluarsa :</td> </tr> </table>	No. RM :	Tgl Lahir	Nama: Rafael	Tgl : 3-3-25	...2..... X sehari 1	Bungkus	Bila nyeri	Sendok teh/makan	Penulis Resep: dr.Biendha	Nama obat : Asmef Tgl Kadaluarsa :	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     APOTEK CIPTA MEDIKA 1                      Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989                      Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt                 </div> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">No. RM :</td> <td style="width: 50%;">Tgl Lahir</td> </tr> <tr> <td>Nama: Rafael</td> <td>Tgl : 3-3-25</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin: 5px 0;"><b>Tab/Kapsul</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">...2..... X sehari 1</td> <td style="width: 50%;">Bungkus</td> </tr> <tr> <td>Radang, nyeri</td> <td>Sendok teh/makan</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin: 5px 0;"><del>SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Penulis Resep: dr.Biendha</td> <td style="width: 50%;">Nama obat : Omegtamin Tgl Kadaluarsa :</td> </tr> </table>	No. RM :	Tgl Lahir	Nama: Rafael	Tgl : 3-3-25	...2..... X sehari 1	Bungkus	Radang, nyeri	Sendok teh/makan	Penulis Resep: dr.Biendha	Nama obat : Omegtamin Tgl Kadaluarsa :
Surat ijin:	Tidak ada	-																													
Alamat dr. :	Tidak ada	-																													
<b>Nama obat/warna etiket</b>	<b>Nama obat/warna etiket</b>																														
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     APOTEK CIPTA MEDIKA 1                      Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989                      Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt                 </div> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">No. RM :</td> <td style="width: 50%;">Tgl Lahir</td> </tr> <tr> <td>Nama: Rafael</td> <td>Tgl : 3-3-25</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin: 5px 0;"><b>Tab/Kapsul</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">...2..... X sehari 1</td> <td style="width: 50%;">Bungkus</td> </tr> <tr> <td>Bila nyeri</td> <td>Sendok teh/makan</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin: 5px 0;"><del>SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Penulis Resep: dr.Biendha</td> <td style="width: 50%;">Nama obat : Asmef Tgl Kadaluarsa :</td> </tr> </table>	No. RM :	Tgl Lahir	Nama: Rafael	Tgl : 3-3-25	...2..... X sehari 1	Bungkus	Bila nyeri	Sendok teh/makan	Penulis Resep: dr.Biendha	Nama obat : Asmef Tgl Kadaluarsa :	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     APOTEK CIPTA MEDIKA 1                      Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989                      Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt                 </div> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">No. RM :</td> <td style="width: 50%;">Tgl Lahir</td> </tr> <tr> <td>Nama: Rafael</td> <td>Tgl : 3-3-25</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin: 5px 0;"><b>Tab/Kapsul</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">...2..... X sehari 1</td> <td style="width: 50%;">Bungkus</td> </tr> <tr> <td>Radang, nyeri</td> <td>Sendok teh/makan</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin: 5px 0;"><del>SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Penulis Resep: dr.Biendha</td> <td style="width: 50%;">Nama obat : Omegtamin Tgl Kadaluarsa :</td> </tr> </table>	No. RM :	Tgl Lahir	Nama: Rafael	Tgl : 3-3-25	...2..... X sehari 1	Bungkus	Radang, nyeri	Sendok teh/makan	Penulis Resep: dr.Biendha	Nama obat : Omegtamin Tgl Kadaluarsa :										
No. RM :	Tgl Lahir																														
Nama: Rafael	Tgl : 3-3-25																														
...2..... X sehari 1	Bungkus																														
Bila nyeri	Sendok teh/makan																														
Penulis Resep: dr.Biendha	Nama obat : Asmef Tgl Kadaluarsa :																														
No. RM :	Tgl Lahir																														
Nama: Rafael	Tgl : 3-3-25																														
...2..... X sehari 1	Bungkus																														
Radang, nyeri	Sendok teh/makan																														
Penulis Resep: dr.Biendha	Nama obat : Omegtamin Tgl Kadaluarsa :																														

	<p style="text-align: center;">Nama obat/warna etiket</p> <div style="border: 1px solid black; background-color: #e1eef6; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b></p> <p style="text-align: center; margin: 0;">Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">No. RM :</td> <td style="width: 50%;">Tanggal :3-3-25</td> </tr> <tr> <td>Nama : Rafael</td> <td>Tgl Lahir :</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin: 5px 0;">3 X sehari      Tetes/<b>Dioleskan/</b> Melalui Dubur</p> <p style="margin: 5px 0;">Petunjuk khusus: dioleskan secara tipis-tipis</p> <div style="border: 1px solid black; background-color: #e1eef6; padding: 5px; text-align: center; margin: 5px 0;"> <p><b>OBAT LUAR</b></p> </div> <p style="text-align: center; margin: 10px 0;">E. Product knowledge</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p>Nama obat: Asam Mefenamat Kandungan: Asam mefenamat 500 mg Dosis Lazim: Dewasa dan Anak-anak diatas 14 tahun ; dsis awal 500 mg, kemudian dianjurkan 250 mg tiap 6 jam sesuai kebutuhan Kegunaan: Meringankan nyeri ringan sampai sedang sehubungan dengan sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot, dan nyeri sesudah operasi. ESO: Mual, muntah, diare, dan rasa sakit kepala updominal. KI: Pasien yang hipersensitiv terhadap asam mefenamat Perhatian: Sebaiknya diminum sesudah makan. Hati-hati jika</p> </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p>Nama obat: Omegtamine Kandungan: Dexamethasone 0,5 mg, dekslorfeniramin maleat 2 mg. Dosis lazim: Dewasa dan Anak-anak &gt;3-4 kali 1-2 kaplet sesudah makan dan sebelum tidur Kegunaan: Mengatasi kasus alergi Dimana diperlukan terapi kortikosteroid ESO: Dapat menyebabkan gangguan keseimbangan elektrolit saluran pencernaan, sistem araf, endokrin, metabolisme karbohidrat dan lemak, retensi urine KI: Tukak lambung aktif, herpes simplek okular, infeksi fungsi sistem sistemik, penderita dengan terapi penghambat MAO.</p> </td> </tr> </table>	No. RM :	Tanggal :3-3-25	Nama : Rafael	Tgl Lahir :	<p>Nama obat: Asam Mefenamat Kandungan: Asam mefenamat 500 mg Dosis Lazim: Dewasa dan Anak-anak diatas 14 tahun ; dsis awal 500 mg, kemudian dianjurkan 250 mg tiap 6 jam sesuai kebutuhan Kegunaan: Meringankan nyeri ringan sampai sedang sehubungan dengan sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot, dan nyeri sesudah operasi. ESO: Mual, muntah, diare, dan rasa sakit kepala updominal. KI: Pasien yang hipersensitiv terhadap asam mefenamat Perhatian: Sebaiknya diminum sesudah makan. Hati-hati jika</p>	<p>Nama obat: Omegtamine Kandungan: Dexamethasone 0,5 mg, dekslorfeniramin maleat 2 mg. Dosis lazim: Dewasa dan Anak-anak &gt;3-4 kali 1-2 kaplet sesudah makan dan sebelum tidur Kegunaan: Mengatasi kasus alergi Dimana diperlukan terapi kortikosteroid ESO: Dapat menyebabkan gangguan keseimbangan elektrolit saluran pencernaan, sistem araf, endokrin, metabolisme karbohidrat dan lemak, retensi urine KI: Tukak lambung aktif, herpes simplek okular, infeksi fungsi sistem sistemik, penderita dengan terapi penghambat MAO.</p>
No. RM :	Tanggal :3-3-25						
Nama : Rafael	Tgl Lahir :						
<p>Nama obat: Asam Mefenamat Kandungan: Asam mefenamat 500 mg Dosis Lazim: Dewasa dan Anak-anak diatas 14 tahun ; dsis awal 500 mg, kemudian dianjurkan 250 mg tiap 6 jam sesuai kebutuhan Kegunaan: Meringankan nyeri ringan sampai sedang sehubungan dengan sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot, dan nyeri sesudah operasi. ESO: Mual, muntah, diare, dan rasa sakit kepala updominal. KI: Pasien yang hipersensitiv terhadap asam mefenamat Perhatian: Sebaiknya diminum sesudah makan. Hati-hati jika</p>	<p>Nama obat: Omegtamine Kandungan: Dexamethasone 0,5 mg, dekslorfeniramin maleat 2 mg. Dosis lazim: Dewasa dan Anak-anak &gt;3-4 kali 1-2 kaplet sesudah makan dan sebelum tidur Kegunaan: Mengatasi kasus alergi Dimana diperlukan terapi kortikosteroid ESO: Dapat menyebabkan gangguan keseimbangan elektrolit saluran pencernaan, sistem araf, endokrin, metabolisme karbohidrat dan lemak, retensi urine KI: Tukak lambung aktif, herpes simplek okular, infeksi fungsi sistem sistemik, penderita dengan terapi penghambat MAO.</p>						

		<p>digunakan pada Wanita hamil dan menyusui                  Cara penyimpanan: simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>	<p>Perhatian: Simpan obat pada temperatur ruangan, jauh dari panas dan cahaya langsung. Jauhkan obat dari anak-anak dan hewan peliharaan.                  Cara penyimpanan: Simpan obat pada temperatur ruangan, jauh dari panas dan cahaya langsung.</p>
		<p>Nama Obat: Erladerm-N                  Kandungan: Betamethasone-17 valerate 1 mg, neomycin sulfate 5 mg tiap gram krim.                  Dosis lazim: Oles tipis pada area yang terjangkit 2-3 kali sehari, setelah ada perbaikan, pemberian sehari 1 kali sampai sembuh                  Kegunaan: Infeksi sekunder dari bakteri, eksim, psoriasis, neurodermatosis, dermatitis seboroik, anal dan genital intertrigo                  ESO: Penipisan, striae, dilatasi pembuluh darah tepi pada pemakaian jangka Panjang                  KI: Hipersensitif                  Perhatian: Tidak boleh digunakan pada mata dan sekitarnya, luka bakar yang luas.                  Cara penyimpanan: Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung.</p>	<p>Nama obat: Salep 24                  Kandungan: Tiap gram mengandung Asam salisilat 20 mg, Sulfur 40 mg                  Dosis lazim: Sehari 3-4 kali, dioleskan pada kulit yang sakit                  Kegunaan: Membantu meringankan penyakit kulit seperti panu, kadas, kudis, dan kurap                  ESO: kulit kemerahan dan sensasi terbakar                  KI: Penderita diabetes, pasien yang sedang menjalani persiapan pengangkatan kutil                  Perhatian: Hindari penggunaan di daerah sekitar mata, selaput lendir (hidung), mulut dan daerah anogenital (selangkangan) atau kulit yang terbuka                  Cara penyimpanan: Simpan dibawah suhu 30° C dan terlindung dari Cahaya matahari</p>

	<p>F. Tahapan pembuatan</p> <div data-bbox="1086 258 1980 612" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan skimming resep</li><li>2. Menyiapkan obat yang tertera pada resep yaitu asam mefenamat 6 tablet, racikan salep 1 tube, omeprazole 6 tablet</li><li>3. Menulis etiket pada masing-masing obat</li><li>4. Menempelkan etiket setiap obat dan dimasukkan ke dalam plastik</li><li>5. Dicek kembali obat dan etiket apakah sesuai dengan resep tersebut</li></ol></div> <p>G. Informasi obat yang diberikan (berupa paragraph dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <div data-bbox="1086 730 1980 1085" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>TVF: pengambilan obat atas nama Rafael M: ya, dengan saya sendiri mbak TVF: baik pak, saya bantu jelaskan obatnya ya, untuk nyeri diminum 2x sehari 1 tablet sesudah makan, untuk radang nyeri diminum 2x sehari sesudah makan, untuk racikan salep dioleskan secara tipis-tipis 3 kali sehari, Baik pak untuk penjelasan saya sudah dimengerti M: sudah mbak terimakasih TVF: baik pak ini obatnya semoga lekas sembuh</p></div>
--	--

8. Resep pasien syaraf



A. Skrining administrasi

Nama pasien:	Ada	Marsud Hadi Mulyono
Umur pasien:	Tidak ada	-
Berat badan:	Tidak ada	-
Nama obat:	Ada	Amitriptipilin Calcium karbonat Meloxicam Nadic gel Neurosanbe
Kekuatan:	Ada	Amitriptipilin 12,5 mg Calcium karbonat Meloxicam 15 mg Nadic gel Neurosanbe
Bentuk sediaan:	Ada	Amitriptipilin tablet Calcium karbonat kaplet Meloxicam tablet Nadic gel Neurosanbe tablet
Jumlah obat:	Ada	Amitriptipilin 30 tablet Calcium karbonat 30 kaplet Meloxicam 10 tablet Nadic gel 2 tube Neurosanbe 30 tablet
Duplikasi terapi:	Tidak ada	-
Aturan pakai:	Ada	Amitriptipilin 1 hari 1x 1 tablet Calcium karbonat 1 hari 1x 1 kaplet Meloxicam 2x sehari bila nyeri

						Nadic gel 2x sehari dioleskan tipis Neurosanbe 1x sehari 1 tablet	
Tanggal penulisan resep:	Ada					20 Desember 2024	
Nama dokter:	Ada					dr. Atika	
Surat ijin:	Tidak ada					-	
Alamat dr. :	Tidak ada					-	
B. Perhitungan jumlah pembekalan farmasi							
<table border="1"><tr><td>Amitriptilin yang dibutuhkan 30 tablet Calcium karbonat yang dibutuhkan 30 kaplet Meloxicam yang dibutuhkan 10 tablet Nadic gel yang dibutuhkan 2 tube Neurosanbe yang dibutuhkan 30 tablet</td></tr></table>							Amitriptilin yang dibutuhkan 30 tablet Calcium karbonat yang dibutuhkan 30 kaplet Meloxicam yang dibutuhkan 10 tablet Nadic gel yang dibutuhkan 2 tube Neurosanbe yang dibutuhkan 30 tablet
Amitriptilin yang dibutuhkan 30 tablet Calcium karbonat yang dibutuhkan 30 kaplet Meloxicam yang dibutuhkan 10 tablet Nadic gel yang dibutuhkan 2 tube Neurosanbe yang dibutuhkan 30 tablet							
C. Perhitungan biaya resep							
<table border="1"><tr><td>Amitriptilin = 4.000 x 30 = 120.000 Calcium karbonat 30 kaplet x 1.800 = 54.000 Meloxicam 10 tablet x 1.119 = 11.190 Nadic gel 2 tube x 17.150 = 34.300 Neurosanbe 30 tablet x 1.883 = 56.490 Total = 275.980 = 276.000</td></tr></table>							Amitriptilin = 4.000 x 30 = 120.000 Calcium karbonat 30 kaplet x 1.800 = 54.000 Meloxicam 10 tablet x 1.119 = 11.190 Nadic gel 2 tube x 17.150 = 34.300 Neurosanbe 30 tablet x 1.883 = 56.490 Total = 275.980 = 276.000
Amitriptilin = 4.000 x 30 = 120.000 Calcium karbonat 30 kaplet x 1.800 = 54.000 Meloxicam 10 tablet x 1.119 = 11.190 Nadic gel 2 tube x 17.150 = 34.300 Neurosanbe 30 tablet x 1.883 = 56.490 Total = 275.980 = 276.000							

D. Etiket



Rumah Sakit  
Muhammadiyah Gresik  
jujur – Transparan – kekeluargaan  
Jl. KH. Kholil 88 Gresik 61115 P: +62 31 3981275

Nama/ID: Marsud Hadi M TGL: 20/12/2024

ED

Nama obat: Amitriptilin

1x SEHARI 1 ~~TABLET / ML / SENDOK TAKAR /~~  
~~SEBELUM MAKAN / SAAT / SESUDAH MAKAN~~



Rumah Sakit  
Muhammadiyah Gresik  
jujur – Transparan – kekeluargaan  
Jl. KH. Kholil 88 Gresik 61115 P: +62 31 3981275

Nama/ID: Marsudi Hadi M TGL: 20/12/2024

ED

Nama obat: Calcium karbonat

2x SEHARI 1 ~~KAPLET / ML / SENDOK TAKAR /~~  
~~SEBELUM MAKAN / SAAT / SESUDAH MAKAN~~

	<div data-bbox="1093 236 1697 651" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik jujur – Transparan – kekeluargaan Jl. KH. Kholil 88 Gresik 61115 P: +62 31 3981275</p><hr/><p>Nama/ID: Marsud Hadi M      TGL: 20/12/2024 ED Nama obat: Meloxicam</p><p>2x SEHARI 1 <b>TABLET</b> / <del>ML/SENDOK TAKAR</del> / <del>SEBELUM MAKAN</del> / <del>SAAT</del> / <del>SESUDAH MAKAN</del></p></div> <div data-bbox="1093 678 1697 1093" style="background-color: #4a86e8; color: white; padding: 5px;"><p>Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik jujur – Transparan – kekeluargaan Jl. KH. Kholil 88 Gresik 61115 P: +62 31 3981275</p><hr/><p>Nama/ID: Marsud Hadi M      TGL: 20/12/2024 ED Nama obat: Nadic Gel</p><p>2x SEHARI <b>DIOLESKAN</b> / <del>ML/SENDOK TAKAR</del> / <del>SEBELUM MAKAN</del> / <del>SAAT</del> / <del>SESUDAH MAKAN</del></p></div>
--	---

	<div data-bbox="1088 252 1697 667" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;">  <p style="text-align: center;">Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik jujur – Transparan – kekeluargaan Jl. KH. Kholil 88 Gresik 61115 P: +62 31 3981275</p> <hr/> <p>Nama/ID: Marsud Hadi M      TGL: 20/12/2024 ED Nama obat: Neurosanbe</p> <p style="text-align: center;">1x SEHARI 1 <b>TABLET</b> / <del>ML</del> / <del>SENDOK TAKAR</del> / <del>SEBELUM MAKAN</del> / <del>SAAT</del> / <del>SESUDAH MAKAN</del></p> </div> <p>E. Product knowledge</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="1016 754 1509 1388" style="width: 50%; padding: 5px;"> <p>Nama obat: Amitriptilin Kandungan: Amitriptilin HCL Dosis Lazim: Dewasa ; dosis 25mg, 2x sehari selama 2 minggu-6 bulan. Dosis dapat ditingkatkan secara bertahap menjadi 50-150mg perhari dalam dosis terbagi. Lansia : 10-25mg perhari, dikonsumsi pada malam hari. Kegunaan: Untuk mengatasi gejala depresi, mengobati nyeri syaraf, migrain dan enuresis nocturnal kebiasaan (mengumpul pada anak-anak) ESO: Menyebabkan hipotensi ortostatik, pemanjangan interval qt, aritmia, pandangan kabur, mulut</p> </td> <td data-bbox="1509 754 2024 1388" style="width: 50%; padding: 5px;"> <p>Nama obat: Calcium karbonat Kandungan: Calcium karboat Dosis lazim: Dewasa 0,5-3g maksimal 8g setiap hari hingga 2 minggu, Anak 2-5thn 0,375-0,4g maksimal 1,5g setiap hari hingga 2 minggu Kegunaan: Mengobati nyeri ulu hati, mencegah osteoporosis, mengiatkan tulang dan gigi. ESO: Gangguan pencernaan, hiperkalemia, hipofosfatemia, syndrome milk-alkali KI: Hiperkalsemia akibat mieloma, metastasis tulang atau penyakit tulang ganas lainnya, sarkoidosis, hiperparatiroidisme primer, overdosis</p> </td> </tr> </table>	<p>Nama obat: Amitriptilin Kandungan: Amitriptilin HCL Dosis Lazim: Dewasa ; dosis 25mg, 2x sehari selama 2 minggu-6 bulan. Dosis dapat ditingkatkan secara bertahap menjadi 50-150mg perhari dalam dosis terbagi. Lansia : 10-25mg perhari, dikonsumsi pada malam hari. Kegunaan: Untuk mengatasi gejala depresi, mengobati nyeri syaraf, migrain dan enuresis nocturnal kebiasaan (mengumpul pada anak-anak) ESO: Menyebabkan hipotensi ortostatik, pemanjangan interval qt, aritmia, pandangan kabur, mulut</p>	<p>Nama obat: Calcium karbonat Kandungan: Calcium karboat Dosis lazim: Dewasa 0,5-3g maksimal 8g setiap hari hingga 2 minggu, Anak 2-5thn 0,375-0,4g maksimal 1,5g setiap hari hingga 2 minggu Kegunaan: Mengobati nyeri ulu hati, mencegah osteoporosis, mengiatkan tulang dan gigi. ESO: Gangguan pencernaan, hiperkalemia, hipofosfatemia, syndrome milk-alkali KI: Hiperkalsemia akibat mieloma, metastasis tulang atau penyakit tulang ganas lainnya, sarkoidosis, hiperparatiroidisme primer, overdosis</p>
<p>Nama obat: Amitriptilin Kandungan: Amitriptilin HCL Dosis Lazim: Dewasa ; dosis 25mg, 2x sehari selama 2 minggu-6 bulan. Dosis dapat ditingkatkan secara bertahap menjadi 50-150mg perhari dalam dosis terbagi. Lansia : 10-25mg perhari, dikonsumsi pada malam hari. Kegunaan: Untuk mengatasi gejala depresi, mengobati nyeri syaraf, migrain dan enuresis nocturnal kebiasaan (mengumpul pada anak-anak) ESO: Menyebabkan hipotensi ortostatik, pemanjangan interval qt, aritmia, pandangan kabur, mulut</p>	<p>Nama obat: Calcium karbonat Kandungan: Calcium karboat Dosis lazim: Dewasa 0,5-3g maksimal 8g setiap hari hingga 2 minggu, Anak 2-5thn 0,375-0,4g maksimal 1,5g setiap hari hingga 2 minggu Kegunaan: Mengobati nyeri ulu hati, mencegah osteoporosis, mengiatkan tulang dan gigi. ESO: Gangguan pencernaan, hiperkalemia, hipofosfatemia, syndrome milk-alkali KI: Hiperkalsemia akibat mieloma, metastasis tulang atau penyakit tulang ganas lainnya, sarkoidosis, hiperparatiroidisme primer, overdosis</p>		

		<p>kering, retensi urine, dan glaucoma sudut tertutup                  KI: Pemberian amitriptylin pada pasien dengan hipersensitifitas terhadap amitriptylin                  Perhatian: Amitriptylin tidak boleh dihentikan secara mendadak kepada pasien terutama pasien yang mendapatkan dosis tinggi karena dapat menyebabkan gejala putus obat                  Cara penyimpanan: Ditempat yang sejuk dan kering, serta terlindungi dar Cahaya matahari langsung, jauhkan dari jangkauan anak-anak serta hewan peliharaan</p>	<p>vitamin D. Osteoporosis akibat imobilisasi jangka panjang, hiperkalsiuria berat, batu ginjal. Gagal ginjal berat yang tidak diobati dengan dialisis ginjal.                  Cara penyimpanan: Simpan pada suhu 15-30° C</p>
		<p>Nama Obat: Meloxicam                  Kandungan: Meloxicam 15mg                  Dosis lazim: Oa : 7,5mg 1x sehari, dapat ditingkatkan sampai 15mg 1x sehari. Ar: 15mg 1x sehari, dapat dikurangi sampai 7,5mg 1x sehari                  Kegunaan: Trapis sintomatik untuk jangka pendek osteoarthritis (oa), dan jangka Panjang artritiseuomatoid (ar)                  ESO: Dispepsia, mual, muntah, konstipasi, anemia, esophagitis dan peradarahan GI, ruam                  KI: Hipersensitifitas meloxicam yang disebabkan oleh meloxicam</p>	<p>Nama obat: Natrium diclofenac gel                  Kandungan: Diklofenak dietilamin 1%                  Dosis lazim: 3-4x sehari                  Kegunaan: Peradangan tendon, ligament, otot dan sendi pasca trauma akibat kesleo, memar                  ESO: Rasa terbakar, gatal, iritasi, kulit kering                  KI: Hipersensitifitas                  Perhatian: Hentikan terapi bila terjadi kulit kering berlebihan, iritasi atau sensitisasi. Hindari kontak dengan mata dan membrane mukosa</p>

		<p>Perhatian: Riwayat penyakit GI (pendarahan dan tukak), penurunan fungsi ginjal, penyakit hati, gagal hati, dehidrasi</p> <p>Cara penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>	<p>Cara penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering serta terhindar dari sinar matahari langsung.</p>
		<p>Nama obat: Neurosanbe</p> <p>Kandungan: Vitamin B1 100mg, Vitamin B12 100mg, Vitamin B6 5000mcg.</p> <p>Dosis lazim: sehari 1x 1 tablet</p> <p>Kegunaan: Gangguan syaraf perifer dan defisiensi vitamin b</p> <p>ESO: Pengguna vitamin b6 dosis tinggi dan jangka Panjang dapat disebabkan syndrome neuropati</p> <p>KI: Hipersesnsitif terhadap vitamin b</p> <p>Perhatian: Sebaiknya tidak digunakan untuk pasien yang sedang menerima terapi lefodopa.</p> <p>Cara penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering serta terhindar dari sinar matahari langsung.</p>	

	<p style="text-align: center;">F. Tahapan pembuatan</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"><ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan skrinning resep</li><li>2. Menyiapkan obat yang tertera pada resep yaitu amitrtipilin 12,5 mg 30 tablet, calcium karbonat 30 tablet, meloxicam 15mg 10 tablet, nadic gel 2 tube, neurosanbe 30 tablet</li><li>3. Menulis etiket pada masing-masing obat</li><li>4. Menempelkan etiket setiap obat dan dimasukkan ke dalam plastik</li><li>5. Dicek kembali obat dan etiket apakah sesuai dengan resep tersebut</li></ol></div> <p style="text-align: center;">G. Informasi obat yang diberikan (berupa paragraph dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"><p>TVF: pengambilan obat atas nama Marsud M: ya, dengan saya sendiri mbak TVF: baik pak, saya bantu jelaskan obatnya ya obatnya berupa tablet, kapsul, dan gel, cara pemakaiannya amitrtipilyn diminum pada malam hari, calcium karbonat diminum 1x sehari, meloxicam diminum 2x sehari, neurosanbe 1x sehari, nadic gel dioleskan tipis pada area yang sakit M: sudah mbak terimakasih, Baik pak untuk pejelasan saya sudah dimengerti TVF: baik pak ini obatnya semoga lekas sembuh</p></div>
--	---

<p>9</p>	<p>Resep racikan anak</p>	<p>A. Skrinning administrasi</p>																																																																																																		
	<div style="text-align: center;">  <p>KLINIK CIPTA MEDIKA GKB                  Jl. Balikpapan No. 6 GKB, Gresik, Jawa Timur                  031-3954446/082245015803                  E-mail : ciptamedikaklinik@gmail.com</p> </div> <hr/> <p style="text-align: center;">REKAP PENGGUNAAN OBAT PER PASIEN</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Tanggal</th> <th>No.RM</th> <th>Nama Pasien</th> <th>Jml</th> <th>Nama Obat</th> <th>Biaya</th> <th>Embalase</th> <th>Tuslah</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2025-03-11</td> <td>013215</td> <td>AISYAH MECCA ALMAHYRA</td> <td>4</td> <td>GKB1275 CEFADROXIL 500MG CAPS(BERNO)</td> <td>3,904</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3,904</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td>GKB1503 FLUTROP TAB</td> <td>2,504</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2,504</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td>GKB0396 VITAMIN BC KALENG</td> <td>76</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Subtotal :</td> <td>6,888</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>6,888</td> </tr> <tr> <td colspan="5">                     &gt;&gt; Total :                 </td> <td></td> <td>6,888</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>6,888</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Tanggal	No.RM	Nama Pasien	Jml	Nama Obat	Biaya	Embalase	Tuslah	Total	1	2025-03-11	013215	AISYAH MECCA ALMAHYRA	4	GKB1275 CEFADROXIL 500MG CAPS(BERNO)	3,904	0	0	3,904					4	GKB1503 FLUTROP TAB	2,504	0	0	2,504					4	GKB0396 VITAMIN BC KALENG	76	0	0	76						Subtotal :	6,888	0	0	6,888	>> Total :						6,888	0	0	6,888	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nama pasien:</td> <td>Ada</td> <td>Aisyah mecca almahyra</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat badan:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama obat:</td> <td>Ada</td> <td>Cefadroxil Flutrop Vitamin BC kaleng</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan:</td> <td>Ada</td> <td>Cefadroxil 500 mg Flutrop Vitamin BC kaleng</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sediaan:</td> <td>Ada</td> <td>Cefadroxil : kapsul Flutrop : tablet Vitamin BC kaleng : tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat:</td> <td>Ada</td> <td>Cefadroxil : 4 kapsul Flutrop : 4 tablet Vitamin BC kaleng : 4 tablet</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai:</td> <td>Ada</td> <td>Sehari 3 kali 1 bungkus</td> </tr> <tr> <td>Tanggal pembuatan resep:</td> <td>Ada</td> <td>11 Maret 2025</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter:</td> <td>Ada</td> <td>dr. Sofia</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr.:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Cefadroxil yang dibutuhkan 4 kapsul                  Flutrop yang dibutuhkan 4 tablet                  Vitamin BC kaleng yang dibutuhkan 4 tablet</p> </div> <p style="text-align: center;">C. Perhitungan biaya resep</p>	Nama pasien:	Ada	Aisyah mecca almahyra	Umur pasien:	Tidak ada	-	Berat badan:	Tidak ada	-	Nama obat:	Ada	Cefadroxil Flutrop Vitamin BC kaleng	Kekuatan:	Ada	Cefadroxil 500 mg Flutrop Vitamin BC kaleng	Bentuk sediaan:	Ada	Cefadroxil : kapsul Flutrop : tablet Vitamin BC kaleng : tablet	Jumlah obat:	Ada	Cefadroxil : 4 kapsul Flutrop : 4 tablet Vitamin BC kaleng : 4 tablet	Duplikasi terapi:	Tidak ada	-	Aturan pakai:	Ada	Sehari 3 kali 1 bungkus	Tanggal pembuatan resep:	Ada	11 Maret 2025	Nama dokter:	Ada	dr. Sofia	Surat ijin:	Tidak ada	-	Alamat dr.:	Tidak ada
No.	Tanggal	No.RM	Nama Pasien	Jml	Nama Obat	Biaya	Embalase	Tuslah	Total																																																																																											
1	2025-03-11	013215	AISYAH MECCA ALMAHYRA	4	GKB1275 CEFADROXIL 500MG CAPS(BERNO)	3,904	0	0	3,904																																																																																											
				4	GKB1503 FLUTROP TAB	2,504	0	0	2,504																																																																																											
				4	GKB0396 VITAMIN BC KALENG	76	0	0	76																																																																																											
					Subtotal :	6,888	0	0	6,888																																																																																											
>> Total :						6,888	0	0	6,888																																																																																											
Nama pasien:	Ada	Aisyah mecca almahyra																																																																																																		
Umur pasien:	Tidak ada	-																																																																																																		
Berat badan:	Tidak ada	-																																																																																																		
Nama obat:	Ada	Cefadroxil Flutrop Vitamin BC kaleng																																																																																																		
Kekuatan:	Ada	Cefadroxil 500 mg Flutrop Vitamin BC kaleng																																																																																																		
Bentuk sediaan:	Ada	Cefadroxil : kapsul Flutrop : tablet Vitamin BC kaleng : tablet																																																																																																		
Jumlah obat:	Ada	Cefadroxil : 4 kapsul Flutrop : 4 tablet Vitamin BC kaleng : 4 tablet																																																																																																		
Duplikasi terapi:	Tidak ada	-																																																																																																		
Aturan pakai:	Ada	Sehari 3 kali 1 bungkus																																																																																																		
Tanggal pembuatan resep:	Ada	11 Maret 2025																																																																																																		
Nama dokter:	Ada	dr. Sofia																																																																																																		
Surat ijin:	Tidak ada	-																																																																																																		
Alamat dr.:	Tidak ada	-																																																																																																		

Cefadroxil : 4 kapsul x 977 = 3.908  
 Flutrop : 4 tablet x 726 = 2.904  
 Vitamin BC kaleng : 4 tablet x 19 = 76  
 Total = 6.888 + 11% + 20% = 9.174 = 10.000

D. Etiket  
 Nama obat/warna etiket

**APOTEK CIPTA MEDIKA 1**  
 Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989  
 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt

No. RM : Tgl Lahir :  
 Nama : Ninik Tgl :21-2-25  
 Tab/Kapsul  
 3 X sehari 1 **Bungkus**  
 Sendok teh/makan

Diminum setiap 24 jam  
 Diminum setiap 12 jam **Antibiotik**  
 Diminum setiap 8 jam **Dihabiskan**  
 Diminum setiap 6 jam  
 Diminum setiap 4,5 jam  
**KOCOK DULU/SEBELUM/SESUDAH MAKAN**

Penulis Resep: Nama obat : Puyer  
 dr. Sofia Tgl Kadaluarsa :

E. Product knowledge

Nama obat: cefadroxil 500mg  
 Kandungan: cefadroxil 500mg  
 Dosis lazim: dewasa: sehari  
 sehari 1-2 g dalam sekali dosis  
 atau 2 dosis terbagi, anak: sehari  
 25-50mg /kgBB dalam 2 dosis  
 terbagi

Nama obat: Flutrop  
 Kandungan: pseudoefedrin HCl  
 30mg, triprolidin HCl 2,5mg  
 Dosis lazim: dewasa dan anak >12  
 tahun: 3 kali sehari 1 tablet. anak 6-  
 12 tahun: 3 kali sehari 1/2 tablet.  
 anak 2-6 taun: 3 kali sehari 1/4  
 tablet.

		<p>Kegunaan: infeksi saluran nafas, kulit, jaringan lunak, saluran cerna, saluran kemih, dan infeksi lain yang berkaitan dengan organisme bersangkutan.</p> <p>ESO: gangguan saluran cerna, gangguan hipersensitif.</p> <p>KI: penderita hipersensitif terhadap golongan sefalosporin.</p> <p>PERHATIAN: hati-hati bila digunakan pada penderita gangguan fungsi ginjal dan penderita colitis, alergi terhadap penisilin, Wanita menyusui, dan pemakaian lama karena dapat menimbulkan infeksi.</p> <p>Cara penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.</p>	<p>Kegunaan: meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat dan bersin yang disertai batuk</p> <p>ESO: mengantuk, gangguan tidur, ruam kulit, kekeringan pada hidung, mulut dan tenggorokan, retensi urin yang terjadi kadang-kadang</p> <p>KI: penderita yang peka obat simpatomimetik, tekanan darah tinggi, gangguan jantung, dan diabetes. Tidak dianjurkan penggunaan pada anak dibawah 6 tahun, Wanita hamil dan menyusui, penderita debil dan hipoksia.</p> <p>PERHATIAN: hipertensi, penyakit jantung, DM, hipertiroid, peningkatan TIO, pembesaran prostat, disfungsi hati dan ginjal, dapat mengganggu kemampuan mengendara dan menjalankan mesin.</p> <p>Cara penyimpanan: simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>	
		<p>Nama obat: Vitamin B Kompleks</p> <p>Kandungan: Vitamin BC(thiamine)</p> <p>Dosis lazim: 1 tablet perhari</p>		

		<p>Kegunaan: terapi defisiensi vitamin B kompleks ESO: sakit kepala dan mual, mati rasa pada tangan dan kaki KI: hipersensitivitas terhadap thiamine atau komponen lain pada formula PERHATIAN: hati-hati pada pasien yang mendapat levodopa Cara penyimpanan: simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>	
<p>F. Tahap pembuatan</p>			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan skimming resep</li><li>2. Menyiapkan obat yang tertera pada resep yaitu cefadroxil 4 kaplet, flutrop 4 tablet, vitamin BC 4 tablet</li><li>3. Masukkan ke dalam blender dan haluskan, untuk cefadroxil keluarkan isinya dari cangkang kapsul</li><li>4. Lalu keluarkan dari blender dan takar sama berat pada wadah puyer</li><li>5. Menulis etiket pada masing-masing obat</li><li>6. Menempelkan etiket setiap obat dan dimasukkan ke dalam plastik</li><li>7. Dicek kembali obat dan etiket apakah sesuai dengan resep tersebut</li></ol>			
<p>G. Informasi obat yang diberikan (berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p>			

	<p>TVF: pengambilan obat atas nama aisyah mecca                  A: ya, dengan saya ibunya mbak                  TVF: baik pak, saya bantu jelaskan obatnya ya obatnya berupa puyer nggeh untuk flu serta ada antibiotiknya buk diminum 3 kli sehari 1 bungkus sesudah makan, dihabiskan nggeh buk. Baik bu apakah ada yang ditanyakan                  A: sudah mbak terimakasih,                  TVF: baik buk ini obatnya semoga lekas sembuh</p>																																																																																																	
<p>10 Resep racikan anak</p>  <p><b>KLINIK CIPTA MEDIKA GKB</b>                  Jl. Balikpapan No. 6 GKB, Gresik, Jawa Timur                  031-3954446/082245015803                  E-mail : ciptamedikaklinik@gmail.com</p> <p>REKAP PENGGUNAAN OBAT PER PASIEN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tanggal</th> <th>No RM</th> <th>Nama Pasien</th> <th>Jml</th> <th>Nama Obat</th> <th>Riaya</th> <th>Embalase</th> <th>Tucak</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2025-03-10</td> <td>012827</td> <td>ARSYLA GHANIA PERMANA</td> <td>2</td> <td>GKB0177 GRATISIF</td> <td>666</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>666</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>GKB0315 PREDNISONE KALENG</td> <td>190</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>190</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>GKB0396 VITAMIN Bc KALENG</td> <td>38</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>GKB0594 YUSIMOX SYRUP 60ML</td> <td>4,995</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4,995</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Subtotal :</td> <td>5,909</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>5,909</td> </tr> <tr> <td>&gt;&gt;</td> <td>Total</td> <td>:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,909</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>5,909</td> </tr> </tbody> </table>	No	Tanggal	No RM	Nama Pasien	Jml	Nama Obat	Riaya	Embalase	Tucak	Total	1	2025-03-10	012827	ARSYLA GHANIA PERMANA	2	GKB0177 GRATISIF	666	0	0	666					2	GKB0315 PREDNISONE KALENG	190	0	0	190					2	GKB0396 VITAMIN Bc KALENG	38	0	0	38					1	GKB0594 YUSIMOX SYRUP 60ML	4,995	0	0	4,995						Subtotal :	5,909	0	0	5,909	>>	Total	:				5,909	0	0	5,909	<p>A. Skrinning administrsi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama pasien:</td> <td>Ada</td> <td>Arsyila Ghania Permana</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat badan:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama obat:</td> <td>Ada</td> <td>Grantusif Prednisone kaleng Vitamin Bc kaleng Yusimox syrup</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sediaan:</td> <td>Ada</td> <td>Grantusif: tablet Prednisone kaleng: tablet Vitamin Bc kaleng: tablet Yusimox syrup: tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat:</td> <td>Ada</td> <td>Grantusif: 2 tablet Prednisone kaleng: 2 tablet Vitamin Bc kaleng: 2 tablet Yusimox syrup: 1 botol</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai:</td> <td>Ada</td> <td>Puyer: 3 kali 1 bungkus</td> </tr> </table>	Nama pasien:	Ada	Arsyila Ghania Permana	Umur pasien:	Tidak ada	-	Berat badan:	Tidak ada	-	Nama obat:	Ada	Grantusif Prednisone kaleng Vitamin Bc kaleng Yusimox syrup	Kekuatan:	Tidak ada	-	Bentuk sediaan:	Ada	Grantusif: tablet Prednisone kaleng: tablet Vitamin Bc kaleng: tablet Yusimox syrup: tablet	Jumlah obat:	Ada	Grantusif: 2 tablet Prednisone kaleng: 2 tablet Vitamin Bc kaleng: 2 tablet Yusimox syrup: 1 botol	Duplikasi terapi:	Tidak ada	-	Aturan pakai:	Ada	Puyer: 3 kali 1 bungkus
No	Tanggal	No RM	Nama Pasien	Jml	Nama Obat	Riaya	Embalase	Tucak	Total																																																																																									
1	2025-03-10	012827	ARSYLA GHANIA PERMANA	2	GKB0177 GRATISIF	666	0	0	666																																																																																									
				2	GKB0315 PREDNISONE KALENG	190	0	0	190																																																																																									
				2	GKB0396 VITAMIN Bc KALENG	38	0	0	38																																																																																									
				1	GKB0594 YUSIMOX SYRUP 60ML	4,995	0	0	4,995																																																																																									
					Subtotal :	5,909	0	0	5,909																																																																																									
>>	Total	:				5,909	0	0	5,909																																																																																									
Nama pasien:	Ada	Arsyila Ghania Permana																																																																																																
Umur pasien:	Tidak ada	-																																																																																																
Berat badan:	Tidak ada	-																																																																																																
Nama obat:	Ada	Grantusif Prednisone kaleng Vitamin Bc kaleng Yusimox syrup																																																																																																
Kekuatan:	Tidak ada	-																																																																																																
Bentuk sediaan:	Ada	Grantusif: tablet Prednisone kaleng: tablet Vitamin Bc kaleng: tablet Yusimox syrup: tablet																																																																																																
Jumlah obat:	Ada	Grantusif: 2 tablet Prednisone kaleng: 2 tablet Vitamin Bc kaleng: 2 tablet Yusimox syrup: 1 botol																																																																																																
Duplikasi terapi:	Tidak ada	-																																																																																																
Aturan pakai:	Ada	Puyer: 3 kali 1 bungkus																																																																																																

		Yusimox: 3 kali 1 sendok the
Tanggal penulisan resep:	Ada	10 Maret 2025
Nama dokter:	Ada	dr. Sofia
Surat ijin:	Tidak ada	-
Alamat dr.:	Tidak ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi

Grantusif yang dibutuhkan 2 tablet  
 Prednisone kaleng yang dibutuhkan 2 tablet  
 Vitamin Bc kaleng yang dibutuhkan 2 tablet  
 Yusimox sirup yang dibutuhkan 1 botol

C. Perhitungan biaya resep

Grantusif: 2 tablet x = 686  
 Prednisone kaleng: 2 tablet x 80 = 190  
 Vitamin Bc kaleng: 2 tablet x 19 = 38  
 Yusimox sirup: 1 botol x 4.995 = 4.995  
 Total: 5.909 + 11% + 20% = 7.870 = 8.000

D. Etiket

Nama obat/warna obat

Nama obat/warna obat

APOTEK CIPTA MEDIKA 1  
 Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989  
 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt

No. RM : Tgl Lahir  
 Nama: Arsyila Tgl : 10-3-25

Tab/Kapsul  
 ...3..... X sehari 1 **Bungkus**  
 Bila nyeri Sendok teh/makan

~~SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU~~

Penulis Resep: Nama obat : puer  
 dr.Soia Tgl Kadaluarsa :

APOTEK CIPTA MEDIKA 1  
 Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989  
 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt

No. RM : Tgl Lahir :  
 Nama : Arsyilla Tgl :10-3-25

Tab/Kapsul  
 3 X sehari 1 Bungkus  
**Sendok teh/makan**

Diminum setiap 24 jam  
 Diminum setiap 12 jam **Antibiotik**  
 Diminum setiap 8 jam **Dihabiskan**  
 Diminum setiap 6 jam  
 Diminum setiap 4,5 jam

~~KOCOK DULU/SEBELUM/SESUDAH MAKAN~~

Penulis Resep: Nama obat : yusimox  
 dr. Sofia Tgl Kadaluarsa :

		<p style="text-align: center;">E. Product knowledge</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p>Nama obat: grantusif                      Kandungan: dekstrometorfan HBr 15mg, gliserilguaiakolat 100mg, difenhidramin HCl 5mg                      Dosis lazim: dewasa dan anak &gt; 12 thn: sehari 3x1-2 tablet, anak 6-12 thn: 3x1/2 -1 tablet, anak 3-6 thn: sehari 3x1/4 tablet                      Kegunaan: batuk, pilek, bersin-bersin, gatal di tenggorokan dan hidung karena alergi                      ESO: mulut terasa kering, mengantuk, mual, pusing, konstipasi                      KI: hipersensitif                      PERHATIAN: Tidak dianjurkan untuk anak dibawah 2 tahun, Gangguan saluran pernapasan, Batuk pertusis dan batuk kronis, Wanita hamil dan menyusui, Mempengaruhi kemampuan mengemudi/menjalankan mesin.                      Cara penyimpanan: Simpan ditempat yang sejuk dan kering</p> </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p>Nama obat: prednisone kaleng                      Kandungan: prednison 5mg                      Dosis lazim:dewasa: sehari 3x 1 tablet, Anak: sehari 3x ½ tablet                      Kegunaan: keadaan alergi, peradangan, penyakit lain yang membutuhkan glukokortikoid seperti rematik                      ESO: gangguan cairan dan elektrolit, gangguan muskuloskeletal, gangguan gastrintestinal                      KI: tukak peptik, TBC aktif, osteoporosis, gangguan saraf, gangguan ginjal, gangguan jantung                      PERHATIAN: hindari penghentian pemberian secara tiba-tiba pada pemakaian jangka Panjang. Hati-hati pada pemakaian anak pada masa pertumbuhan Penyakit jantung kongestif, gangguan fungsi ginjal. Hindari penghentian terapi mendadak. Hamil, laktasi                      Cara penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari</p> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Nama obat: Vitamin B Kompleks</td> <td style="padding: 5px;">Nama obat: Yusimox syrup</td> </tr> </table>	<p>Nama obat: grantusif                      Kandungan: dekstrometorfan HBr 15mg, gliserilguaiakolat 100mg, difenhidramin HCl 5mg                      Dosis lazim: dewasa dan anak &gt; 12 thn: sehari 3x1-2 tablet, anak 6-12 thn: 3x1/2 -1 tablet, anak 3-6 thn: sehari 3x1/4 tablet                      Kegunaan: batuk, pilek, bersin-bersin, gatal di tenggorokan dan hidung karena alergi                      ESO: mulut terasa kering, mengantuk, mual, pusing, konstipasi                      KI: hipersensitif                      PERHATIAN: Tidak dianjurkan untuk anak dibawah 2 tahun, Gangguan saluran pernapasan, Batuk pertusis dan batuk kronis, Wanita hamil dan menyusui, Mempengaruhi kemampuan mengemudi/menjalankan mesin.                      Cara penyimpanan: Simpan ditempat yang sejuk dan kering</p>	<p>Nama obat: prednisone kaleng                      Kandungan: prednison 5mg                      Dosis lazim:dewasa: sehari 3x 1 tablet, Anak: sehari 3x ½ tablet                      Kegunaan: keadaan alergi, peradangan, penyakit lain yang membutuhkan glukokortikoid seperti rematik                      ESO: gangguan cairan dan elektrolit, gangguan muskuloskeletal, gangguan gastrintestinal                      KI: tukak peptik, TBC aktif, osteoporosis, gangguan saraf, gangguan ginjal, gangguan jantung                      PERHATIAN: hindari penghentian pemberian secara tiba-tiba pada pemakaian jangka Panjang. Hati-hati pada pemakaian anak pada masa pertumbuhan Penyakit jantung kongestif, gangguan fungsi ginjal. Hindari penghentian terapi mendadak. Hamil, laktasi                      Cara penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari</p>	Nama obat: Vitamin B Kompleks	Nama obat: Yusimox syrup
<p>Nama obat: grantusif                      Kandungan: dekstrometorfan HBr 15mg, gliserilguaiakolat 100mg, difenhidramin HCl 5mg                      Dosis lazim: dewasa dan anak &gt; 12 thn: sehari 3x1-2 tablet, anak 6-12 thn: 3x1/2 -1 tablet, anak 3-6 thn: sehari 3x1/4 tablet                      Kegunaan: batuk, pilek, bersin-bersin, gatal di tenggorokan dan hidung karena alergi                      ESO: mulut terasa kering, mengantuk, mual, pusing, konstipasi                      KI: hipersensitif                      PERHATIAN: Tidak dianjurkan untuk anak dibawah 2 tahun, Gangguan saluran pernapasan, Batuk pertusis dan batuk kronis, Wanita hamil dan menyusui, Mempengaruhi kemampuan mengemudi/menjalankan mesin.                      Cara penyimpanan: Simpan ditempat yang sejuk dan kering</p>	<p>Nama obat: prednisone kaleng                      Kandungan: prednison 5mg                      Dosis lazim:dewasa: sehari 3x 1 tablet, Anak: sehari 3x ½ tablet                      Kegunaan: keadaan alergi, peradangan, penyakit lain yang membutuhkan glukokortikoid seperti rematik                      ESO: gangguan cairan dan elektrolit, gangguan muskuloskeletal, gangguan gastrintestinal                      KI: tukak peptik, TBC aktif, osteoporosis, gangguan saraf, gangguan ginjal, gangguan jantung                      PERHATIAN: hindari penghentian pemberian secara tiba-tiba pada pemakaian jangka Panjang. Hati-hati pada pemakaian anak pada masa pertumbuhan Penyakit jantung kongestif, gangguan fungsi ginjal. Hindari penghentian terapi mendadak. Hamil, laktasi                      Cara penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari</p>					
Nama obat: Vitamin B Kompleks	Nama obat: Yusimox syrup					

		<p>Kandungan: Vitamin BC (thiamine) Dosis lazim: 1 tablet perhari Kegunaan: terapi defisiensi vitamin B kompleks ESO: sakit kepala dan mual, mati rasa pada tangan dan kaki KI: hipersensitivitas terhadap thiamine atau komponen lain pada formula PERHATIAN: hati-hati pada pasien yang mendapat levodopa Cara penyimpanan: simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>	<p>Kandungan: amoxicillin trihydrate 125mg/5ml Dosis lazim: dewasa &amp; anak &gt;20kg: 3 kali sehari 250-500mg (2-4 sendok takar 5ml). Kegunaan: infeksi saluran cerna, saluran nafas dan saluran kemih karena organisme gram positive dan negative ESO: mual, muntah, diare, ruam, urtikaria, anemia, gelisah, insomnia, pusing, agitasi, kejang. KI: hipersensitif PERHATIAN: hati-hati pada penderita leukimia limfatik, Wanita hamil dan menyusui Cara penyimpanan: simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>
--	--	---	--

	<p style="text-align: center;">F. Tahap pembuatan</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"><ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan skrinning resep</li><li>2. Menyiapkan obat yang tertera pada resep yaitu grantusif 2 tablet, prednisone 2 tablet, vitamin BC 2 tablet, yusimox syrup 1 botol</li><li>3. Masukkan kedalam blender dan haluskan, untuk cefadroxil keluarkan isinya dari cangkang kapsul</li><li>4. Lalu keluarkan pada blender dan takar sama bera pada wadah puyer</li><li>5. Menulis etiket pada masing-masing obat</li><li>6. Menempelkan etiket setiap obat dan dimasukkan ke dalam plastic</li><li>7. Dicek kembali obat dan etiket apakah sesuai dengan resep tersebut</li></ol></div> <p style="text-align: center;">G. Informasi obat yang diberikan (berupa paragraph dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"><p>TVF: pengambilan obat atas nama Arsyilla A: ya, dengan saya ibunya mbak TVF: baik pak, saya bantu jelaskan obatnya ya obatnya berupa puyer nggeh untuk batuk diminum 3 kali sehari 1 bungkus sesudah makan, nggeh buk. Untuk sirupnya ini diminum 3 kali 1 sendok teh sirupnya berupa sirup kering nanti ditambahin air sampai tanda batas lebih dari 7 hari dibuang nggeh bu. Baik bu apakah ada yang ditanyakan A: sudah mbak terimakasih, TVF: baik buk ini obatnya semoga lekas sembuh</p></div>
--	---

11	Resep racikan anak	<p><b>KLINIK CIPTA MEDIKA GKB</b>                  Jl. Balikpapan No. 6 GKB, Gresik, Jawa Timur                  031-3954446/082245015803                  E-mail : ciptamedikaklinik@gmail.com</p> <p>REKAP PENGGUNAAN OBAT PER PASIEN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Tanggal</th> <th>No.RM</th> <th>Nama Pasien</th> <th>Jml</th> <th>Nama Obat</th> <th>Biaya</th> <th>Embalase</th> <th>Tuslah</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2025-03-10</td> <td>007658</td> <td>MUHAMMAD YUSRI MAULANA</td> <td>4</td> <td>GKB1371 AMBROXOL (TRIMARI)</td> <td>360</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>360</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td>GKB2136 AMOXICILLIN 500MG (ETA)</td> <td>1,916</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,916</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>GKB0156 FLUCADEX</td> <td>900</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td>GKB0386 VITAMIN BC KALENG</td> <td>76</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Subtotal :</td> <td>3,252</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3,252</td> </tr> <tr> <td colspan="6">&gt;&gt; Total :</td> <td>3,252</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3,252</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Tanggal	No.RM	Nama Pasien	Jml	Nama Obat	Biaya	Embalase	Tuslah	Total	1	2025-03-10	007658	MUHAMMAD YUSRI MAULANA	4	GKB1371 AMBROXOL (TRIMARI)	360	0	0	360					4	GKB2136 AMOXICILLIN 500MG (ETA)	1,916	0	0	1,916					2	GKB0156 FLUCADEX	900	0	0	900					4	GKB0386 VITAMIN BC KALENG	76	0	0	76	Subtotal :						3,252	0	0	3,252	>> Total :						3,252	0	0	3,252	<p>A. Skrinning administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama pasien:</td> <td>Ada</td> <td>Muhammad yusri maulana</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat badan:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama obat:</td> <td>Ada</td> <td>Ambroxol Amoxicillin Flucadex Vitamin BC kaleng</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan:</td> <td>Ada</td> <td>Ambroxol Amoxicillin 500mg Flucadex Vitamin BC kaleng</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sediaan:</td> <td>Ada</td> <td>Ambroxol: tablet Amoxicillin: tablet Flucadex: tablet Vitamin BC kaleng: tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat:</td> <td>Ada</td> <td>Ambroxol: 4 tablet Amoxicillin: 4 tablet Flucadex: 2 tablet Vitamin BC kaleng: 4 tablet</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai:</td> <td>Ada</td> <td>3 kali sehari 1 bungkus</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep:</td> <td>Ada</td> <td>10 maret 2025</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter:</td> <td>Ada</td> <td>dr. Sofia</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr.:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> </table>	Nama pasien:	Ada	Muhammad yusri maulana	Umur pasien:	Tidak ada	-	Berat badan:	Tidak ada	-	Nama obat:	Ada	Ambroxol Amoxicillin Flucadex Vitamin BC kaleng	Kekuatan:	Ada	Ambroxol Amoxicillin 500mg Flucadex Vitamin BC kaleng	Bentuk sediaan:	Ada	Ambroxol: tablet Amoxicillin: tablet Flucadex: tablet Vitamin BC kaleng: tablet	Jumlah obat:	Ada	Ambroxol: 4 tablet Amoxicillin: 4 tablet Flucadex: 2 tablet Vitamin BC kaleng: 4 tablet	Duplikasi terapi:	Tidak ada	-	Aturan pakai:	Ada	3 kali sehari 1 bungkus	Tanggal penulisan resep:	Ada	10 maret 2025	Nama dokter:	Ada	dr. Sofia	Surat ijin:	Tidak ada	-	Alamat dr.:	Tidak ada	-
	No.	Tanggal	No.RM	Nama Pasien	Jml	Nama Obat	Biaya	Embalase	Tuslah	Total																																																																																																						
1	2025-03-10	007658	MUHAMMAD YUSRI MAULANA	4	GKB1371 AMBROXOL (TRIMARI)	360	0	0	360																																																																																																							
				4	GKB2136 AMOXICILLIN 500MG (ETA)	1,916	0	0	1,916																																																																																																							
				2	GKB0156 FLUCADEX	900	0	0	900																																																																																																							
				4	GKB0386 VITAMIN BC KALENG	76	0	0	76																																																																																																							
Subtotal :						3,252	0	0	3,252																																																																																																							
>> Total :						3,252	0	0	3,252																																																																																																							
Nama pasien:	Ada	Muhammad yusri maulana																																																																																																														
Umur pasien:	Tidak ada	-																																																																																																														
Berat badan:	Tidak ada	-																																																																																																														
Nama obat:	Ada	Ambroxol Amoxicillin Flucadex Vitamin BC kaleng																																																																																																														
Kekuatan:	Ada	Ambroxol Amoxicillin 500mg Flucadex Vitamin BC kaleng																																																																																																														
Bentuk sediaan:	Ada	Ambroxol: tablet Amoxicillin: tablet Flucadex: tablet Vitamin BC kaleng: tablet																																																																																																														
Jumlah obat:	Ada	Ambroxol: 4 tablet Amoxicillin: 4 tablet Flucadex: 2 tablet Vitamin BC kaleng: 4 tablet																																																																																																														
Duplikasi terapi:	Tidak ada	-																																																																																																														
Aturan pakai:	Ada	3 kali sehari 1 bungkus																																																																																																														
Tanggal penulisan resep:	Ada	10 maret 2025																																																																																																														
Nama dokter:	Ada	dr. Sofia																																																																																																														
Surat ijin:	Tidak ada	-																																																																																																														
Alamat dr.:	Tidak ada	-																																																																																																														

B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi

Ambroxol yang dibutuhkan 4 tablet  
Amoxicillin yang dibutuhkan 4 tablet  
Flucadex yang dibutuhkan 2 tablet  
Vitamin BC kaleng yang dibutuhkan 4 tablet

C. Perhitungan resep

Ambroxol: 4 tablet x 90 = 360  
Amoxicillin: 4 tablet x 479 = 1.916  
Flucadex: 2 tablet x 450 = 900  
Vitamin BC: 4 tablet x 19 = 76  
Total: 3.252 + 11% + 20% = 4.331 = 5.000

D. Etiket

Nama obat/warna obat

<b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b> Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt	
No. RM :	Tgl Lahir :
Nama : M.Yusri	Tgl :10-3-25
	Tab/Kapsul
3 X sehari 1	<b>Bungkus</b>
	Sendok teh/makan
Diminum setiap 24 jam	
Diminum setiap 12 jam	<b>Antibiotik</b>
<u>Diminum setiap 8 jam</u>	<b>Dihabiskan</b>
Diminum setiap 6 jam	
Diminum setiap 4,5 jam	
<b><u>KOCOK DULU/SEBELUM/SESUDAH MAKAN</u></b>	
Penulis Resep: dr. Sofia	Nama obat : puyer
	Tgl Kadaluarsa :

		<p>E. Product knowledge</p> <table border="1" data-bbox="1120 271 1948 1308"> <tr> <td data-bbox="1120 271 1523 1308"> <p>Nama obat: ambroxol                      Kandungan: ambroxol 30mg                      Dosis lazim: dewasa dan anak diatas 12 thn sehari 2-3 x 1 tablet, anak 6-12 thn sehari 2-3 x ½ tablet                      Kegunaan: penyakit saluran nafas akut dan kronik yng disertai sekresi bronchial yang abnormal                      ESO: Gangguan gatrointestinal ringan, reaksi alergi                      KI: Hipersensitif                      PERHATIAN: Penggunaan jangka lama. Insufisiensi ginjal, Hamil, Laktasi                      Cara penyimpanan: : simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p> </td> <td data-bbox="1523 271 1948 1308"> <p>Nama obat: amoxicillin                      Kandungan: amoxicillin 500mg                      Dosis lazim: Dewasa: 250-500 mg setiap 8 jam (3x sehari) , Anak-anak: 20-40mg kg/BB/hari dalam 3 dosis terbagi.                      Kegunaan: infeksi yang disebabkan oleh strain-strain bakteri                      ESO: reaksi hipersensitivitas seperti urtikaria, demam nyeri sendi, diare, syok anafilaksis, ruam eritematosus, leukemia limfatik kronik, dan iritasi gastrointestinal.                      KI:penderita hipersensitif terhadap antibiotic beta lactam                      PERHATIAN: Hati-Hati Pada Penderita Leukimia Limphatik, Wanita Hamil Dan Menyusui                      Cara penyimpanan: : simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1120 1308 1523 1348"> <p>Nama obat: flucadex</p> </td> <td data-bbox="1523 1308 1948 1348"> <p>Nama obat: Vitamin BC</p> </td> </tr> </table>	<p>Nama obat: ambroxol                      Kandungan: ambroxol 30mg                      Dosis lazim: dewasa dan anak diatas 12 thn sehari 2-3 x 1 tablet, anak 6-12 thn sehari 2-3 x ½ tablet                      Kegunaan: penyakit saluran nafas akut dan kronik yng disertai sekresi bronchial yang abnormal                      ESO: Gangguan gatrointestinal ringan, reaksi alergi                      KI: Hipersensitif                      PERHATIAN: Penggunaan jangka lama. Insufisiensi ginjal, Hamil, Laktasi                      Cara penyimpanan: : simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>	<p>Nama obat: amoxicillin                      Kandungan: amoxicillin 500mg                      Dosis lazim: Dewasa: 250-500 mg setiap 8 jam (3x sehari) , Anak-anak: 20-40mg kg/BB/hari dalam 3 dosis terbagi.                      Kegunaan: infeksi yang disebabkan oleh strain-strain bakteri                      ESO: reaksi hipersensitivitas seperti urtikaria, demam nyeri sendi, diare, syok anafilaksis, ruam eritematosus, leukemia limfatik kronik, dan iritasi gastrointestinal.                      KI:penderita hipersensitif terhadap antibiotic beta lactam                      PERHATIAN: Hati-Hati Pada Penderita Leukimia Limphatik, Wanita Hamil Dan Menyusui                      Cara penyimpanan: : simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>	<p>Nama obat: flucadex</p>	<p>Nama obat: Vitamin BC</p>
<p>Nama obat: ambroxol                      Kandungan: ambroxol 30mg                      Dosis lazim: dewasa dan anak diatas 12 thn sehari 2-3 x 1 tablet, anak 6-12 thn sehari 2-3 x ½ tablet                      Kegunaan: penyakit saluran nafas akut dan kronik yng disertai sekresi bronchial yang abnormal                      ESO: Gangguan gatrointestinal ringan, reaksi alergi                      KI: Hipersensitif                      PERHATIAN: Penggunaan jangka lama. Insufisiensi ginjal, Hamil, Laktasi                      Cara penyimpanan: : simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>	<p>Nama obat: amoxicillin                      Kandungan: amoxicillin 500mg                      Dosis lazim: Dewasa: 250-500 mg setiap 8 jam (3x sehari) , Anak-anak: 20-40mg kg/BB/hari dalam 3 dosis terbagi.                      Kegunaan: infeksi yang disebabkan oleh strain-strain bakteri                      ESO: reaksi hipersensitivitas seperti urtikaria, demam nyeri sendi, diare, syok anafilaksis, ruam eritematosus, leukemia limfatik kronik, dan iritasi gastrointestinal.                      KI:penderita hipersensitif terhadap antibiotic beta lactam                      PERHATIAN: Hati-Hati Pada Penderita Leukimia Limphatik, Wanita Hamil Dan Menyusui                      Cara penyimpanan: : simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>					
<p>Nama obat: flucadex</p>	<p>Nama obat: Vitamin BC</p>					

		<p>Kandungan: acetaminophen 500mg, gliseril guaicolat 50mg, fenilpropanolamin HCL 15mg, dekstrometorfan HBr 15mg, CTM 1mg  Dosis lazim: dewasa diatas 12 tahun: 3 kali sehari 1 kaplet, anak 6-12 tahun: 3 kali sehari ½ kaplst.  Kegunaan: meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin disertai batuk.  ESO: mengantuk, gangguan pencernaan, gangguan pikomotor, takikardia, aritmia, mulut kering, palpitasi, retensi urin, penggunaan dosis besar dan jangka Panjang menyebabkan kerusakan hati.  KI: penderita gangguan jantung dan diabetes melitus, penderita gangguan fungsi hati berat, hipersensitivitas.  PERHATIAN: Hati-hati penggunaan pada penderita dengan gangguan fungsi hati dan ginjal – Tidak dianjurkan penggunaan pada anak usia dibawah 6 tahun, wanita</p>	<p>Kandungan: Vitamin BC (thiamine)  Dosis lazim: 1 tablet perhari  Kegunaan: terapi defisiensi vitamin B kompleks  ESO: sakit kepala dan mual, mati rasa pada tangan dan kaki  KI: hipersensitivitas terhadap thiamine atau komponen lain pada formula  PERHATIAN: hati-hati pada pasien yang mendapat levodopa  Cara penyimpanan: simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>	
--	--	--	---	--

		<p>hamil, dan menyusui, kecuali atas petunjuk dokter Cara penyimpanan: Simpan di tempat yang sejuk (15-25)°C dan terlindung dari cahaya</p>		
<p>F. Tahap pembuatan</p>				
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan skринning resep</li><li>2. Menyiapkan obat yang tertera pada resep yaitu ambroxol 4 tablet, amoxicillin 4 tablet, flucadex 2 tablet, vitamin Bc 4 tablet.</li><li>3. Masukkan kedalam blender dan haluskan, untuk cefadroxil keluarkan isinya dari cangkang kapsul</li><li>4. Lalu keluarkan pada blender dan takar sama bera pada wadah puyer</li><li>5. Menulis etiket pada masing-masing obat</li><li>6. Menempelkan etiket setiap obat dan dimasukkan ke dalam plastic</li><li>7. Dicek kembali obat dan etiket apakah sesuai dengan resen tersebut</li></ol>				
<p>G. Informasi obat yang diberikan (berupa paragraph dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p>				

		<p>TVF: pengambilan obat atas nama M.yusri AR: ya, dengan saya ibunya mbak TVF: baik pak, saya bantu jelaskan obatnya ya obatnya berupa puyer nggeh untuk batuk, demam, flu, serta ada antibiotiknya diminum 3 kali sehari 1 bungkus sesudah makan, dihabiskan nggeh buk. Baik bu apakah ada yang ditanyakan AR: sudah mbak terimakasih, TVF: baik buk ini obatnya semoga lekas sembuh</p>
--	--	--

12	<p><b>Resep kulit</b></p>  <p>KLINIK CIPTA MEDIKA GKB          Jl. Balikpapan No. 6 GKB, Gresik, Jawa Timur          031-3954460/0224015903          E-mail: ciptamedika@gmail.com</p> <p>REKAP DATA RESEP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No Resep</th> <th>Tgl Resep</th> <th>Revisi</th> <th>Status</th> <th>Pasien</th> <th>Dokter Prescriber</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20250112048</td> <td>2025-03-12 15:08:03</td> <td></td> <td>Poli Klinik Umum</td> <td>225103121000007 012760 IYANG IRYANA (BP.25)</td> <td>Dr. Dendha Litaulydy</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>Kode Obat</td> <td>Nama Obat</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1 BTL</td> <td>GKB0132</td> <td>ERLAMYCETIN TETES TELINGA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6 TAB</td> <td>GKB0079</td> <td>OMEGTAMINE TAB</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1 TUB</td> <td>GKB1079</td> <td>HYDROCORTISON CREAM (KF)</td> </tr> </tbody> </table>	No Resep	Tgl Resep	Revisi	Status	Pasien	Dokter Prescriber	20250112048	2025-03-12 15:08:03		Poli Klinik Umum	225103121000007 012760 IYANG IRYANA (BP.25)	Dr. Dendha Litaulydy				Jumlah	Kode Obat	Nama Obat				1 BTL	GKB0132	ERLAMYCETIN TETES TELINGA				6 TAB	GKB0079	OMEGTAMINE TAB				1 TUB	GKB1079	HYDROCORTISON CREAM (KF)	<p><b>A. Skrinning administrasi</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Naman:</td> <td>Ada</td> <td>Iyang iryana</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat badan:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama obat:</td> <td>Ada</td> <td>Erlamycetin tetes telinga Omegtamine Hydrocortison cream</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sediaan:</td> <td>Ada</td> <td>Erlamycetin tetes telinga: cair Omegtamine: tablet Hydrocortison cream: cream</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat:</td> <td>Ada</td> <td>Erlamycetin tetes telinga: 1 botol Omegtamine: 6 tablet Hydrocortison cream: 1 tube</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai:</td> <td>Ada</td> <td>Erlamycetin tetes telinga: sehari 3 kali 1 tetes Omegtamine: sehari 2 kali 1 tablet Hydrocortison cream: dioleskan 3 kali secara tipis-tipis</td> </tr> </table>	Naman:	Ada	Iyang iryana	Umur pasien:	Tidak ada	-	Berat badan:	Tidak ada	-	Nama obat:	Ada	Erlamycetin tetes telinga Omegtamine Hydrocortison cream	Kekuatan:	Tidak ada	-	Bentuk sediaan:	Ada	Erlamycetin tetes telinga: cair Omegtamine: tablet Hydrocortison cream: cream	Jumlah obat:	Ada	Erlamycetin tetes telinga: 1 botol Omegtamine: 6 tablet Hydrocortison cream: 1 tube	Duplikasi terapi:	Tidak ada	-	Aturan pakai:	Ada	Erlamycetin tetes telinga: sehari 3 kali 1 tetes Omegtamine: sehari 2 kali 1 tablet Hydrocortison cream: dioleskan 3 kali secara tipis-tipis
No Resep	Tgl Resep	Revisi	Status	Pasien	Dokter Prescriber																																																												
20250112048	2025-03-12 15:08:03		Poli Klinik Umum	225103121000007 012760 IYANG IRYANA (BP.25)	Dr. Dendha Litaulydy																																																												
			Jumlah	Kode Obat	Nama Obat																																																												
			1 BTL	GKB0132	ERLAMYCETIN TETES TELINGA																																																												
			6 TAB	GKB0079	OMEGTAMINE TAB																																																												
			1 TUB	GKB1079	HYDROCORTISON CREAM (KF)																																																												
Naman:	Ada	Iyang iryana																																																															
Umur pasien:	Tidak ada	-																																																															
Berat badan:	Tidak ada	-																																																															
Nama obat:	Ada	Erlamycetin tetes telinga Omegtamine Hydrocortison cream																																																															
Kekuatan:	Tidak ada	-																																																															
Bentuk sediaan:	Ada	Erlamycetin tetes telinga: cair Omegtamine: tablet Hydrocortison cream: cream																																																															
Jumlah obat:	Ada	Erlamycetin tetes telinga: 1 botol Omegtamine: 6 tablet Hydrocortison cream: 1 tube																																																															
Duplikasi terapi:	Tidak ada	-																																																															
Aturan pakai:	Ada	Erlamycetin tetes telinga: sehari 3 kali 1 tetes Omegtamine: sehari 2 kali 1 tablet Hydrocortison cream: dioleskan 3 kali secara tipis-tipis																																																															

Tanggal penulisan resep:	Ada	12 maret 2025
Nama dokter:	Ada	dr. Biendha
Surat ijin:	Tidak ada	-
Alamat dr.:	Tidak ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi

Erlamycetin tetes telinga yang dibutuhkan 1 botol  
 Omegtamine yang dibutuhkan 6 tablet  
 Hidrocortison cream yang dibutuhkan 1 tube

C. Perhitungan resep

Erlamycetin tetes telinga 1 botol x 20.000 = 20.000  
 Omegtamine tablet 6 tablet x 178 = 1.068  
 Hidrocortison cream 1 tube x 10.000 = 10.000  
 Total = 31.068 + 11% + 20% = 41.382

D. Etiket

Nama obat/warna etiket

Nama obat/warna etiket

**APOTEK CIPTA MEDIKA 1**  
 Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989  
 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt

No. RM : Tanggal :12-3-25  
 Nama : Iyang Tgl Lahir :

3 X sehari 1 **Tetes/Dioleskan/**  
 Melalui Dubur

Petunjuk khusus: diteteskan pada telinga yang sakit

**OBAT LUAR**

**APOTEK CIPTA MEDIKA 1**  
 Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989  
 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt

No. RM : Tgl Lahir  
 Nama: Iyang Tgl : 12-3-25

**Tab/Kapsul**  
 ...2..... X sehari 1 Bungkus  
 Bila nyeri Sendok teh/makan

~~—SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU~~

Penulis Resep: Nama obat : Omegtamin  
 Dr.Biendha Tgl Kadaluarsa :

		<p>Nama obat/warna etiket</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;"><b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt</p> <hr/> <p>No. RM : Tanggal :12-3-25 Nama : Iyang Tgl Lahir :</p> <p style="text-align: center;">3 X sehari Tetes/Dioleskan/ Melalui Dubur</p> <p>Petunjuk khusus: secara tipis-tipis</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>OBAT LUAR</b></p> </div> <p>E. Product knowledge</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p>Nama obat: Erlamycetin tetes telinga Kandungan: chlorampulhenicol bse 1% Dosis lazim: teteskan kedalam lubang telinga 2-3 tetes, 3 kali sehari atau menurut petunjuk dokter. Kegunaan:infeksi superfisial pada telinga luar oleh bakteri gram positif atau gram negative yang peka terhadap chlorampulhenicol. ESO:iritasi local seperti gatal, rasa panas, dermatitis vesicular dan mokulopapular. KI: hipersensitif</p> </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p>Nama obat: Omegtamine Kandungan: Dexamethasone 0,5 mg, deksklorfeniramin maleat 2 mg. Dosis lazim: Dewasa dan Anak-anak &gt;3-4 kali 1-2 kaplet sesudah makan dan sebelum tidur Kegunaan: Mengatasi kasus alergi Dimana diperlukan terapi kortikosteroid ESO: Dapat menyebabkan gangguan keseimbangan elektrolit saluran pencernaan, sistem saraf, endokrin, metabolisme karbohidrat dan lemak, retensi urine</p> </td> </tr> </table>	<p>Nama obat: Erlamycetin tetes telinga Kandungan: chlorampulhenicol bse 1% Dosis lazim: teteskan kedalam lubang telinga 2-3 tetes, 3 kali sehari atau menurut petunjuk dokter. Kegunaan:infeksi superfisial pada telinga luar oleh bakteri gram positif atau gram negative yang peka terhadap chlorampulhenicol. ESO:iritasi local seperti gatal, rasa panas, dermatitis vesicular dan mokulopapular. KI: hipersensitif</p>	<p>Nama obat: Omegtamine Kandungan: Dexamethasone 0,5 mg, deksklorfeniramin maleat 2 mg. Dosis lazim: Dewasa dan Anak-anak &gt;3-4 kali 1-2 kaplet sesudah makan dan sebelum tidur Kegunaan: Mengatasi kasus alergi Dimana diperlukan terapi kortikosteroid ESO: Dapat menyebabkan gangguan keseimbangan elektrolit saluran pencernaan, sistem saraf, endokrin, metabolisme karbohidrat dan lemak, retensi urine</p>
<p>Nama obat: Erlamycetin tetes telinga Kandungan: chlorampulhenicol bse 1% Dosis lazim: teteskan kedalam lubang telinga 2-3 tetes, 3 kali sehari atau menurut petunjuk dokter. Kegunaan:infeksi superfisial pada telinga luar oleh bakteri gram positif atau gram negative yang peka terhadap chlorampulhenicol. ESO:iritasi local seperti gatal, rasa panas, dermatitis vesicular dan mokulopapular. KI: hipersensitif</p>	<p>Nama obat: Omegtamine Kandungan: Dexamethasone 0,5 mg, deksklorfeniramin maleat 2 mg. Dosis lazim: Dewasa dan Anak-anak &gt;3-4 kali 1-2 kaplet sesudah makan dan sebelum tidur Kegunaan: Mengatasi kasus alergi Dimana diperlukan terapi kortikosteroid ESO: Dapat menyebabkan gangguan keseimbangan elektrolit saluran pencernaan, sistem saraf, endokrin, metabolisme karbohidrat dan lemak, retensi urine</p>			

		<p>PERHATIAN: hindari penggunaan jangka Panjang karena apat merangsang hipersensitivitas dan superinfeksi oleh kuman yang resisten.          Cara penyimpanan; simpan ditempat sjuk, kering dan terlindung dari Cahaya matahari.</p>	<p>KI: Tukak lambung aktif, herpes simplek okular, infeksi fungsi sistem sistemik, penderita dengan terapi penghambat MAO.          Perhatian: Simpan obat pada temperatur ruangan, jauh dari panas dan cahaya langsung. Jauhkan obat dari anak-anak dan hewan peliharaan.          Cara penyimpanan: Simpan obat pada temperatur ruangan, jauh dari panas dan cahaya langsung.</p>
		<p>Nama obat: hidrocortison cream          Kandungan: hydrocortisone asetat          Dosis lazim: oleskan sehari 3-4x/hari          Kegunaan: menekan reaksi radang pada kulit yang bukan disebabkan infeksi;alergi kulit seperti dermatitis atopik/kontak, neurodermatitis          ESO: masalah kulit, seperti jerawat atau kulit tipis dan mengkilap          KI: hipersensitivitas terhadap hidrokortison, pengobatan dermatitis, penggunaan mata, infeksi mendasar          PERHATIAN: hindari penggunaan jangka Panjang.</p>	

		<p>Hindari penggunaan pada area mata, membrane mukosa, kulit yang sensitif atau luka terbuka. Cara penyimpanan: simpan pada area tempat yang sejuk, kering, terhindar dari Cahaya matahari langsung.</p>	
		<p>F. Tahapan pembuatan</p>	
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan skrinning resep</li><li>2. Menyiapkan obat yang tertera pada resep yaitu erlamycetin tetes telinga 1 botol, omegtamine 6 tablet, hidrocortison cream 1 tube</li><li>3. Menulis etiket pada masing-masing obat</li><li>4. Menempelkan etiket setiap obat dan dimasukkan ke dalam plastik</li><li>5. Dicek kembali obat dan etiket apakah sesuai dengan resep tersebut</li></ol>	
		<p>G. Informasi obat yang diberikan (berupa paragraph dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal).</p>	

		<p>TVF: pengambilan obat atas nama Iyung I : ya, dengan saya sendiri mbak TVF: baik pak, saya bantu jelaskan terkait obatnya ya obatnya ada tetes telinga diteteskan 3 kali 1 tetes pada telinga yang sakit, untuk radang/nyeri diminum 2 kali sehari 1 tablet sesudah makan, untuk krim dioleskan secara tipis-tipis pada bagian yang sakit sebanyak 3 kali nggeh pak.Baik pak apakah ada yang ditanyakan A: sudah mbak terimakasih, TVF: baik pak ini obatnya semoga lekas sembuh</p>
--	--	---

13 Resep hipertensi



A. Skrinning administrasi

Nama pasien:	Ada	Masyuri
Umur pasien:	Ada	50 th
Berat badan:	Tidak ada	-
Nama obat:	Ada	Amlodipin Bisoprolol
Kekuatan:	Ada	Amlodipin 5mg Bisoprolol 5mg
Bentuk sediaan:	Ada	Amlodipin: tablet Bisoprolol: tablet
Jumlah obat:	Ada	Amlodipin: 30 tablet Bisoprolol: 30 tablet
Duplikasi terapi:	Tidak ada	-
Aturan pakai:	Ada	Amlodipin: sehari 1 kali 1 tablet Bisoprolol: sehari 1 kali 1 tablet
Tanggal penulisan resep:	Ada	12 Maret 2025
Nama dokter:	Ada	dr. Sofia
Surat ijin:	Tidak ada	-
Alamat dr.:	Tidak ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi

Amlodipin 5mg yang dibutuhkan 30 tablet  
Bisoprolol 5mg yang dibutuhkan 30 tablet

C. Perhitungan biaya resep

<p>Amlodipin 5mg 30 tablet x 765 = 22.950                  Bisoprolol 5mg 30 tablet x 2.263 = 67.890                  Total 90.840 + 11% + 20% = 120.998 = 121.000</p>
--

D. Etiket

Nama obat/warna etiket

APOTEK CIPTA MEDIKA 1 Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt		APOTEK CIPTA MEDIKA 1 Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt	
No. RM : Nama: Masyuri	Tgl Lahir Tgl : 12-3-25	No. RM : Nama: Masyuri	Tgl Lahir Tgl : 12-3-25
<b>Tab/Kapsul</b>		<b>Tab/Kapsul</b>	
...1..... X sehari 1 hipertensi	Bungkus Sendok teh/makan	...1..... X sehari 1 Hipertensi	Bungkus Sendok teh/makan
<del>SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del>		<del>SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del>	
Penulis Resep: dr. Sofia	Nama obat : Amlodipin 5mg Tgl Kadaluarsa :	Penulis Resep: dr.Sofia	Nama obat : Bisoprolol 5mg Tgl Kadaluarsa :

E. Product knowledge

<p>Nama obat: Amlodipin 5mg                  Kandungan: amlodipine 5mg                  Dosis lazim: awal sehari 1 x 5mg, maks sehari 1 x 10 mg; usia lanjut dan kelainan fungsi hati dosis awal sehari 1 x 2,5 mg                  Kegunaan: hipertensi, angina stabil kronik, angina vasopatik, dan dapat digunakan sebagai obat Tunggal atau kombinasi.</p>	<p>Nama obat: bisoprolol 5mg                  Kandungan: bisoprolol fumarate 5mg                  Dosis lazim: sehari 1 kali 1 tablet                  Kegunaan: terapi hipertensi berupa monoterapi ataupun terapi kombinasi dengan antihipertensi lain                  ESO: vertigo, sakit kepala, konsentrasi berkurang, mulut kering, bradikardia, palpitasi, sakit dada, insomnia, depresi, nyeri perut, gastritis, dispepsia, mual, muntah,</p>
--	--

		<p>ESO: aritmia, bradikardi, nyeri dada, takikardi, hipestesia, neuropati perifer, anoreksia, konstipasi KI: hipersensitif PERHATIAN: pasien dengan gangguan fungsi hati, fungsi ginjal, usia lanjut, kehamilan dan menyusui Cara penyimpanan: Simpan obat pada temperatur ruangan, jauh dari panas dan cahaya langsung.</p>	<p>diare, konstipasi, sakit otot, sakit leher. KI: kondisi denyut jantung &lt; 50 kali/menit dan hipotensi PERHATIAN: penderita gangguan fungsi ginjal dan hati. obat-obat golongan beta bloker sebaiknya tidak untuk penderita kelainan jantung. Cara penyimpanan: Simpan pada suhu ruang dan terhindar dari sinar matahari langsung</p>
<p>F. Tahap pembuatan</p> <div data-bbox="1064 671 1957 987" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"><ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan skrinning resep</li><li>2. Menyiapkan obat yang tertera pada resep yaitu amlodipine 5mg dan bisoprolol 5mg</li><li>3. Menulis etiket pada masing-masing obat</li><li>4. Menempelkan etiket setiap obat dan dimasukkan ke dalam plastik</li><li>5. Dicek kembali obat dan etiket apakah sesuai dengan resep tersebut</li></ol></div>			

		<p>G. Informasi obat yang diberikan (berupa paragraph dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal).</p> <div data-bbox="1066 676 1957 976" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"><p>TVF: pengambilan obat atas nama masyuri M : ya, dengan saya sendiri mbak TVF: baik pak,saya jelaskan nggeh terkait obatnya ada 2 obat hipertensi diminum seari 1 kali 1 tablet sesudah makan nggeh.baik pa kapa ada yang ditanyakan terkait obatnya. M: sudah mbak terimakasih, TVF: baik pak ini obatnya semoga lekas sembuh</p></div>
--	--	--

14 Resep pasien DM



A. Skrinning administrasi

Nama pasien:	Ada	Sholeh
Umur pasien:	Tidak ada	-
Berat badan:	Tidak ada	-
Nama obat:	Ada	Glimepiride Metformin
Kekuatan:	Ada	Glimepiride 4mg Metformin 500mg
Bentuk sediaan:	Ada	Glimepiride: tablet Metformin: tablet
Jumlah obat:	Ada	Glimepiride: 30 tablet Metformin 30 tablet
Duplikasi terapi:	Tidak ada	-
Aturan pakai:	Ada	Glimepiride: diminum pada pagi hari 1 tablet Metformin: sehari 1 kali 1 tablet
Tanggal penulisan resep:	Ada	12 maret 2025
Nama dokter:	Ada	dr. Sofia
Surat ijin:	Tidak ada	-
Alamat dr.:	Tidak ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi

Glimepiride 4mg yang dibutuhkan 30 tablet  
Metformin 500mg yang dibutuhkan 30 tablet

C. Perhitungan biaya resep

Glimepiride 4mg 30 tablet x 2.774 = 83.220  
 Metformin 500mg 30 tablet x 361 = 10.830  
 Total 94.050 + 11% + 20% = 125.274 = 126.000

D. Etiket

Nama obat/warna etiket

<b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b> Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt	
No. RM :	Tgl Lahir
Nama: Sholeh	Tgl : 12-3-25
<b>Tab/Kapsul</b>	
...pagi..... X sehari 1 Bungkus	
Diabetes Sendok teh/makan	
<del>SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del>	
Penulis Resep:	Nama obat : Glimepirid 4mg
dr. Sofia	Tgl Kadaluarsa :

Nama obat/warna etiket

<b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b> Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt	
No. RM :	Tgl Lahir
Nama: Sholeh	Tgl : 12-3-25
<b>Tab/Kapsul</b>	
...1..... X sehari 1 Bungkus	
Diabetes Sendok teh/makan	
<del>SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del>	
Penulis Resep:	Nama obat : Metformin 500mg
dr. Sofia	Tgl Kadaluarsa :

E. Product knowledge

Nama obat: Glimepirid 4mg Kandungan: Glimepirid 4mg Dosis lazim: dosis awal 1 mg/hari, dapat ditingkatkan dengan interval 1-2 minggu bila diperlukan Kegunaan: penderita diabetes melitus tipe 2 yang tidak dapat dikontrol dengan diet dan olahraga	Nama obat: metformin 500mg Kandungan: metformin 500mg Dosis lazim: dosis awal: 1 x 500mg/hari, titrasi: dapat ditingkatkan 500mg/minggu. Dosis maksimum: 2000 mg dalam dosis terbagi. Diberikan Bersama makanan. Kegunaan: diabetes melitus tipe 2 (NIDDM) yang kadar gula darahnya tidak terkontrol dengan diet dan aktivitas fisik
---	--

		<p>ESO: hipoglikemia, gangguan penglihatan, gangguan GIT, urtikaria          KI: DM tipe 1, hipersensitivitas glimepiride dan golongan sulfonilurea, gangguan fungsi hati dan ginjal, ibu hamil dan menyusui          PERHATIAN: pasien dengan resiko hipoglikemia, penurunan fungsi hati dan ginjal, pasien lanjut usia, defisiensi G6PD          Cara penyimpanan: Simpan obat pada temperatur ruangan, jauh dari panas dan cahaya langsung.</p>	<p>ESO: gangguan gastrointestinal, adidosis laktat          KI: pasien dengan asidosis, alergi terhadap komponen sediaan, ataupun gangguan fungsi ginjal yang berat          PERHATIAN: Fungsi ginjal yang kurang sempurna. Monitor fungsi ginjal secara teratur. Hamil dan menyusui hentikan terapi 2-3 hari sebelum operasi. Kondisi yang dapat menyebabkan dehidrasi. Penderita dengan infeksi serius atau trauma.          Cara penyimpanan: Simpan obat pada temperatur ruangan, jauh dari panas dan cahaya langsung.</p>
		<p>F. Tahapan pembuatan</p> <div data-bbox="1120 922 2011 1276" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan skrinning resep</li> <li>2. Menyiapkan obat yang tertera pada resep yaitu glimepiride 4mg dan metformin 500mg masing-masing sebanyak 30 tablet</li> <li>3. Menulis etiket pada masing-masing obat</li> <li>4. Menempelkan etiket setiap obat dan dimasukkan ke dalam plastik</li> <li>5. Dicek kembali obat dan etiket apakah sesuai dengan resep tersebut</li> </ol> </div>	

		<p>G. Informasi obat yang diberikan (berup paragraph dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>TVF: pengambilan obat atas nama sholeh                  S : ya, dengan saya sendiri mbak                  TVF: baik pak,saya jelaskan nggeh terkait obatnya ada 2 obat diabetes diminum seari 1 kali 1 tablet sesudah makan nggeh, untuk gilmepirid nya diminum pada pagi hari nggeh pak .baik pak apa ada yang ditanyakan terkait obatnya.                  S: sudah mbak terimakasih,                  TVF: baik pak ini obatnya semoga lekas sembuh</p> </div>																																																									
15	<p>Resep polifarmasi</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">2</td> <td style="width: 20%;">2025-03-08 000756</td> <td style="width: 15%;">ASTUTIK</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 10%;">30</td> <td style="width: 20%;">GKBPRB208 PRB- AMLODIPIN 10MG (MEGA)</td> <td style="width: 5%;">3,150</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">3,150</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td>GKBPRB0181 PRB- SIMVASTATIN 20MG (SM)</td> <td>5,160</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>5,160</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Subtotal :</td> <td>8,310</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>8,310</td> </tr> </table>	2	2025-03-08 000756	ASTUTIK		30	GKBPRB208 PRB- AMLODIPIN 10MG (MEGA)	3,150	0	0	3,150					30	GKBPRB0181 PRB- SIMVASTATIN 20MG (SM)	5,160	0	0	5,160						Subtotal :	8,310	0	0	8,310	<p>A. Skrinning administrasi</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama pasien:</td> <td style="width: 30%;">Ada</td> <td style="width: 40%;">Astutik</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat badan:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama obat:</td> <td>Ada</td> <td>Amlodipin Simvastatin</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan:</td> <td>Ada</td> <td>Amlodipin 10mg Simvastatin 20mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sediaan:</td> <td>Ada</td> <td>Amlodipin : tablet Simvastatin : tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat:</td> <td>Ada</td> <td>Amlodipin : 30 tablet Simvastatin :30 tablet</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai:</td> <td>Ada</td> <td>Amlodipin : sehari 1 kali 1 tablet Simvastatin: sehari 1 kali 1 tablet (pada malam hari)</td> </tr> </table>	Nama pasien:	Ada	Astutik	Umur pasien:	Tidak ada	-	Berat badan:	Tidak ada	-	Nama obat:	Ada	Amlodipin Simvastatin	Kekuatan:	Ada	Amlodipin 10mg Simvastatin 20mg	Bentuk sediaan:	Ada	Amlodipin : tablet Simvastatin : tablet	Jumlah obat:	Ada	Amlodipin : 30 tablet Simvastatin :30 tablet	Duplikasi terapi:	Tidak ada	-	Aturan pakai:	Ada	Amlodipin : sehari 1 kali 1 tablet Simvastatin: sehari 1 kali 1 tablet (pada malam hari)
2	2025-03-08 000756	ASTUTIK		30	GKBPRB208 PRB- AMLODIPIN 10MG (MEGA)	3,150	0	0	3,150																																																		
				30	GKBPRB0181 PRB- SIMVASTATIN 20MG (SM)	5,160	0	0	5,160																																																		
					Subtotal :	8,310	0	0	8,310																																																		
Nama pasien:	Ada	Astutik																																																									
Umur pasien:	Tidak ada	-																																																									
Berat badan:	Tidak ada	-																																																									
Nama obat:	Ada	Amlodipin Simvastatin																																																									
Kekuatan:	Ada	Amlodipin 10mg Simvastatin 20mg																																																									
Bentuk sediaan:	Ada	Amlodipin : tablet Simvastatin : tablet																																																									
Jumlah obat:	Ada	Amlodipin : 30 tablet Simvastatin :30 tablet																																																									
Duplikasi terapi:	Tidak ada	-																																																									
Aturan pakai:	Ada	Amlodipin : sehari 1 kali 1 tablet Simvastatin: sehari 1 kali 1 tablet (pada malam hari)																																																									

Tanggal penulisan resep:	Ada	8 maret 2025
Nama dokter:	Ada	dr. Sofia
Surat ijin:	Tidak ada	-
Alamat dr.:	Tidak ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi

Amlodipine 10mg yang dibutuhkan 30 tablet  
 Simvastatin 20mg yang dibutuhkan 30 tablet

C. Perhitungan biaya resep

Amlodipine 10mg 30 tablet x 422 = 12.660  
 Simvastatin 20mg 30 tablet x 1.144 = 34.320  
 Totl 46.980 +11% + 20% = 62.577 = 63.000

D. Etiket

Nama obat/warna etiket:

Nama obat/warna etiket:

<b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b> Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt	
No. RM :	Tgl Lahir
Nama: Astutik	Tgl : 8-3-25
<b>Tab/Kapsul</b>	
...1..... X sehari 1	Bungkus
Hipertensi	Sendok teh/makan
<b>-SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</b>	
Penulis Resep: dr. Sofia	Nama obat :Amlodipin 10mg Tgl Kadaluarsa :

<b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b> Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt	
No. RM :	Tgl Lahir
Nama: Astutik	Tgl : 8-3-25
<b>Tab/Kapsul</b>	
Malam X sehari 1	Bungkus
Kolesterol	Sendok teh/makan
<b>-SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</b>	
Penulis Resep: dr. Sofia	Nama obat : simvastatin 20mg Tgl Kadaluarsa :

		<p>E. Product knowledge</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1115 276 1576 1200"> <p>Nama obat: amlodipin 10mg                      Kandungan: amlodipine 10mg                      Dois lazim: dosis awal yang dianjurkan: sehari 1 x 5mg, dengan dosis maks: sehari 1 x 10mg. pada pasien lansia atau kelainan fungsi hati, dosis awal yang dianjurkan sehari 1 x 2.5mg                      Kegunaan: pengobatan hipertensi, angina stabil kronik, angina vasospastik                      ESO: aritmia, edema, bradikardia, vertigo, anoreksia, rash, fatiue, mual, diare                      KI: hipersensitif                      PERHATIAN: hipersensitivitas                      Cara penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari</p> </td> <td data-bbox="1576 276 2045 1200"> <p>Nama obat: simvastatin 20mg                      Kandungan: simvastatin 20mg                      Dosis lazim: awal sehari 5-10mg dosis Tunggal pada malam hari                      Kegunaan: mengurangi kadar kolesterol buruk (LDL) dan trigliserid dalam darah, sekaligus menaikkan kadar HDL (kolesterol baik).                      ESO: Nyeri perut, konstipasi, kembung, astenia, sakit kepala, miopati, rabdomiolisis, tremor, pusing, vertigo.                      KI: penyakit hati aktif, hipersensitif, hamil dan menyusui                      PERHATIAN: Pantau kadar kolesterol secara periodik selama terapi. Lakukan tes fungsi hati sebelum terapi, 6 &amp; 12 bulan setelah terapi pertam dan selanjutnya secara periodic, Wanita hamil dan menyusui                      cara penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari</p> </td> </tr> </table>	<p>Nama obat: amlodipin 10mg                      Kandungan: amlodipine 10mg                      Dois lazim: dosis awal yang dianjurkan: sehari 1 x 5mg, dengan dosis maks: sehari 1 x 10mg. pada pasien lansia atau kelainan fungsi hati, dosis awal yang dianjurkan sehari 1 x 2.5mg                      Kegunaan: pengobatan hipertensi, angina stabil kronik, angina vasospastik                      ESO: aritmia, edema, bradikardia, vertigo, anoreksia, rash, fatiue, mual, diare                      KI: hipersensitif                      PERHATIAN: hipersensitivitas                      Cara penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari</p>	<p>Nama obat: simvastatin 20mg                      Kandungan: simvastatin 20mg                      Dosis lazim: awal sehari 5-10mg dosis Tunggal pada malam hari                      Kegunaan: mengurangi kadar kolesterol buruk (LDL) dan trigliserid dalam darah, sekaligus menaikkan kadar HDL (kolesterol baik).                      ESO: Nyeri perut, konstipasi, kembung, astenia, sakit kepala, miopati, rabdomiolisis, tremor, pusing, vertigo.                      KI: penyakit hati aktif, hipersensitif, hamil dan menyusui                      PERHATIAN: Pantau kadar kolesterol secara periodik selama terapi. Lakukan tes fungsi hati sebelum terapi, 6 &amp; 12 bulan setelah terapi pertam dan selanjutnya secara periodic, Wanita hamil dan menyusui                      cara penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari</p>
<p>Nama obat: amlodipin 10mg                      Kandungan: amlodipine 10mg                      Dois lazim: dosis awal yang dianjurkan: sehari 1 x 5mg, dengan dosis maks: sehari 1 x 10mg. pada pasien lansia atau kelainan fungsi hati, dosis awal yang dianjurkan sehari 1 x 2.5mg                      Kegunaan: pengobatan hipertensi, angina stabil kronik, angina vasospastik                      ESO: aritmia, edema, bradikardia, vertigo, anoreksia, rash, fatiue, mual, diare                      KI: hipersensitif                      PERHATIAN: hipersensitivitas                      Cara penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari</p>	<p>Nama obat: simvastatin 20mg                      Kandungan: simvastatin 20mg                      Dosis lazim: awal sehari 5-10mg dosis Tunggal pada malam hari                      Kegunaan: mengurangi kadar kolesterol buruk (LDL) dan trigliserid dalam darah, sekaligus menaikkan kadar HDL (kolesterol baik).                      ESO: Nyeri perut, konstipasi, kembung, astenia, sakit kepala, miopati, rabdomiolisis, tremor, pusing, vertigo.                      KI: penyakit hati aktif, hipersensitif, hamil dan menyusui                      PERHATIAN: Pantau kadar kolesterol secara periodik selama terapi. Lakukan tes fungsi hati sebelum terapi, 6 &amp; 12 bulan setelah terapi pertam dan selanjutnya secara periodic, Wanita hamil dan menyusui                      cara penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari</p>			

		<p>F. Tahapan pembuatan</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan skrinning resep</li> <li>2. Menyiapkan obat yang tertera pada resep yaitu amlodipine 10mg dan simvastatin 20mg masing-masing sebanyak 30 tablet</li> <li>3. Menulis etiket pada masing-masing obat</li> <li>4. Menempelkan etiket setiap obat dan dimasukkan ke dalam plastik</li> <li>5. Dicek kembali obat dan etiket apakah sesuai dengan resep tersebut</li> </ol> </div> <p>G. Informasi obat yang diberikan (berupa paragraph dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>TVF: pengambilan obat atas nama ibu astutik  A : ya, dengan saya sendiri mbak  TVF: baik bu,saya jelaskan nggeh terkait obatnya ada untuk hipertensi diminum 1 kali sehari 1 tablet dan untuk kolesterol diminum 1 kali sehari 1 tablet pada malam hari nggeh bu .baik bu apa ada yang ditanyakan terkait obatnya.  A: sudah mbak terimakasih,  TVF: baik bu ini obatnya semoga lekas sembuh</p> </div>																																												
16	<p>Resep polifarmasi</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">3</td> <td style="width: 20%;">2025-03-08 001144</td> <td style="width: 20%;">IUR SOLICHAH</td> <td style="width: 20%;">30</td> <td style="width: 20%;">GKBPRB207 PRB- AMLODIPIIN 5MG (MEGA)</td> <td style="width: 10%;">2,160</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td>GKBPRB0138 PRB- BISOPROLOL 5MG (DX)</td> <td>6,000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td>GKBPRB0199 PRB- VITAMIN B1 (FI) 50MG</td> <td>2,340</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Subtotal :</td> <td>10,500</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	3	2025-03-08 001144	IUR SOLICHAH	30	GKBPRB207 PRB- AMLODIPIIN 5MG (MEGA)	2,160	0	0				30	GKBPRB0138 PRB- BISOPROLOL 5MG (DX)	6,000	0	0				30	GKBPRB0199 PRB- VITAMIN B1 (FI) 50MG	2,340	0	0					Subtotal :	10,500	0	0	<p>A. Skrinning administrasi</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama pasien:</td> <td style="width: 30%;">Ada</td> <td style="width: 40%;">Nur solichah</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat badan:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama obat:</td> <td>Ada</td> <td>Amlodipin Bisoprolol Vitamin B1</td> </tr> </table>	Nama pasien:	Ada	Nur solichah	Umur pasien:	Tidak ada	-	Berat badan:	Tidak ada	-	Nama obat:	Ada	Amlodipin Bisoprolol Vitamin B1
3	2025-03-08 001144	IUR SOLICHAH	30	GKBPRB207 PRB- AMLODIPIIN 5MG (MEGA)	2,160	0	0																																							
			30	GKBPRB0138 PRB- BISOPROLOL 5MG (DX)	6,000	0	0																																							
			30	GKBPRB0199 PRB- VITAMIN B1 (FI) 50MG	2,340	0	0																																							
				Subtotal :	10,500	0	0																																							
Nama pasien:	Ada	Nur solichah																																												
Umur pasien:	Tidak ada	-																																												
Berat badan:	Tidak ada	-																																												
Nama obat:	Ada	Amlodipin Bisoprolol Vitamin B1																																												

			<table border="1"> <tr> <td>Kekuatan:</td> <td>Ada</td> <td>Amlodipin 5mg Bisoprolol 5mg Vitamin B1 50mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sediaan:</td> <td>Ada</td> <td>Amlodipin: tablet Bisoprolol : tablet Vitamin B1: tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat:</td> <td>Ada</td> <td>Amlodipin: 30 tablet Bisoprolol : 30 tablet Vitamin B1: 30 tablet</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai:</td> <td>Ada</td> <td>Amlodipin: 1 kali sehari 1 tablet Bisoprolol: 1 kali sehari 1 tablet Vitamin B1: 1 kali sehari 1 tablet</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep:</td> <td>Ada</td> <td>3 maret 2025</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter:</td> <td>Ada</td> <td>dr. Sofia</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr.:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> </table>	Kekuatan:	Ada	Amlodipin 5mg Bisoprolol 5mg Vitamin B1 50mg	Bentuk sediaan:	Ada	Amlodipin: tablet Bisoprolol : tablet Vitamin B1: tablet	Jumlah obat:	Ada	Amlodipin: 30 tablet Bisoprolol : 30 tablet Vitamin B1: 30 tablet	Duplikasi terapi:	Tidak ada	-	Aturan pakai:	Ada	Amlodipin: 1 kali sehari 1 tablet Bisoprolol: 1 kali sehari 1 tablet Vitamin B1: 1 kali sehari 1 tablet	Tanggal penulisan resep:	Ada	3 maret 2025	Nama dokter:	Ada	dr. Sofia	Surat ijin:	Tidak ada	-	Alamat dr.:	Tidak ada	-
Kekuatan:	Ada	Amlodipin 5mg Bisoprolol 5mg Vitamin B1 50mg																												
Bentuk sediaan:	Ada	Amlodipin: tablet Bisoprolol : tablet Vitamin B1: tablet																												
Jumlah obat:	Ada	Amlodipin: 30 tablet Bisoprolol : 30 tablet Vitamin B1: 30 tablet																												
Duplikasi terapi:	Tidak ada	-																												
Aturan pakai:	Ada	Amlodipin: 1 kali sehari 1 tablet Bisoprolol: 1 kali sehari 1 tablet Vitamin B1: 1 kali sehari 1 tablet																												
Tanggal penulisan resep:	Ada	3 maret 2025																												
Nama dokter:	Ada	dr. Sofia																												
Surat ijin:	Tidak ada	-																												
Alamat dr.:	Tidak ada	-																												
			<p>B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Amlodipine 5mg yang dibutuhkan 30 tablet                  Bisoprolol 5mg yang dibutuhkan 30 tablet                  Vitamin B1 yang dibutuhkan 30 tablet</p> </div>																											

C. Perhitungan biaya resep

Amlodipine 5mg 30 tablet x 765 = 22.950  
 Bisoprolol 5mg 30 tablet x 2.263 = 67.890  
 Vitamin B1 30 tablet x 2.595 = 77.850  
 Total 168.690 + 11% + 20% = 224.695 = 225.000

D. Etiket

Nama obat/warna etiket:

**APOTEK CIPTA MEDIKA 1**  
 Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989  
 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt

---

No. RM : Tgl Lahir  
 Nama: Nur solichah Tgl : 8-3-25

**Tab/Kapsul**

...1..... X sehari 1 Bungkus  
 Hipertensi Sendok teh/makan

~~—SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU~~

---

Penulis Resep: Nama obat :Amlodipin 5mg  
 dr. Sofia Tgl Kadaluarsa :

Nama obat/warna etiket:

**APOTEK CIPTA MEDIKA 1**  
 Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989  
 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt

---

No. RM : Tgl Lahir  
 Nama: Nur solichah Tgl : 8-3-25

**Tab/Kapsul**

...1..... X sehari 1 Bungkus  
 Hipertensi Sendok teh/makan

~~—SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU~~

---

Penulis Resep: Nama obat :Bisoprolol 5mg  
 dr. Sofia Tgl Kadaluarsa :

Nama obat/warna etiket:

**APOTEK CIPTA MEDIKA 1**  
 Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989  
 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt

---

No. RM : Tgl Lahir  
 Nama: Nur solichah Tgl : 8-3-25

**Tab/Kapsul**

...1..... X sehari 1 Bungkus  
 Vitamin B1 Sendok teh/makan

~~—SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU~~

---

Penulis Resep: Nama obat :  
 dr. Sofia Tgl Kadaluarsa :


		<p>E. Product knowledge</p> <table border="1" data-bbox="1115 312 1973 1201"> <tr> <td data-bbox="1115 312 1525 1201"> <p>Nama obat: amlodipine 5mg                      Kandungan: amlodipine 5mg                      Dosis lazim: dosis awal yang dianjurkan: sehari 1 x 5mg, dengan dosis maks: sehari 1 x 10mg. pada pasien lansia atau kelainan fungsi hati, dosis awal yang dianjurkan sehari 1 x 2.5mg                      Kegunaan: pengobatan hipertensi, angina stabil kronik, angina vasospastik                      ESO: aritmia, edema, bradikardia, vertigo, anoreksia, rash, fatiue, mual, diare                      KI: hipersensitif                      PERHATIAN: hipersensitivitas                      Cara penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari</p> </td> <td data-bbox="1525 312 1973 1201"> <p>Nama obat: bisoprolol 5mg                      Kandungan: bisoprolol 5mg                      Dosis lazim: awal sehari 1 x 5 mg, dapat dinaikkan sampai 10 sehari 20mg                      Kegunaan: sebagai terapi Tunggal atau kombinasi dengan antihipertensi lain                      ESO: gagal jantung, dispnea, pusing, kardiomiopati, bradikardia, hipotensi, takikardia, lemah, infeksi vrus dan pneumonia                      KI: gagal jantung akut, syok kardiogenik, blok AV tingkat 2 dan 3, sick sinus syndrome                      PERHATIAN: penderita gangguan fungsi ginjal dan hati. obat-obat golongan beta bloker sebaiknya tidak untuk penderita kelainan jantung                      Cara penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1115 1201 1525 1385"> <p>Nama obat: vitamin B1                      Kandungan: Thiamine HCL 50mg                      Dosis lazim:sehari 1 kali 1 tablet</p> </td> <td data-bbox="1525 1201 1973 1385"></td> </tr> </table>	<p>Nama obat: amlodipine 5mg                      Kandungan: amlodipine 5mg                      Dosis lazim: dosis awal yang dianjurkan: sehari 1 x 5mg, dengan dosis maks: sehari 1 x 10mg. pada pasien lansia atau kelainan fungsi hati, dosis awal yang dianjurkan sehari 1 x 2.5mg                      Kegunaan: pengobatan hipertensi, angina stabil kronik, angina vasospastik                      ESO: aritmia, edema, bradikardia, vertigo, anoreksia, rash, fatiue, mual, diare                      KI: hipersensitif                      PERHATIAN: hipersensitivitas                      Cara penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari</p>	<p>Nama obat: bisoprolol 5mg                      Kandungan: bisoprolol 5mg                      Dosis lazim: awal sehari 1 x 5 mg, dapat dinaikkan sampai 10 sehari 20mg                      Kegunaan: sebagai terapi Tunggal atau kombinasi dengan antihipertensi lain                      ESO: gagal jantung, dispnea, pusing, kardiomiopati, bradikardia, hipotensi, takikardia, lemah, infeksi vrus dan pneumonia                      KI: gagal jantung akut, syok kardiogenik, blok AV tingkat 2 dan 3, sick sinus syndrome                      PERHATIAN: penderita gangguan fungsi ginjal dan hati. obat-obat golongan beta bloker sebaiknya tidak untuk penderita kelainan jantung                      Cara penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari</p>	<p>Nama obat: vitamin B1                      Kandungan: Thiamine HCL 50mg                      Dosis lazim:sehari 1 kali 1 tablet</p>	
<p>Nama obat: amlodipine 5mg                      Kandungan: amlodipine 5mg                      Dosis lazim: dosis awal yang dianjurkan: sehari 1 x 5mg, dengan dosis maks: sehari 1 x 10mg. pada pasien lansia atau kelainan fungsi hati, dosis awal yang dianjurkan sehari 1 x 2.5mg                      Kegunaan: pengobatan hipertensi, angina stabil kronik, angina vasospastik                      ESO: aritmia, edema, bradikardia, vertigo, anoreksia, rash, fatiue, mual, diare                      KI: hipersensitif                      PERHATIAN: hipersensitivitas                      Cara penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari</p>	<p>Nama obat: bisoprolol 5mg                      Kandungan: bisoprolol 5mg                      Dosis lazim: awal sehari 1 x 5 mg, dapat dinaikkan sampai 10 sehari 20mg                      Kegunaan: sebagai terapi Tunggal atau kombinasi dengan antihipertensi lain                      ESO: gagal jantung, dispnea, pusing, kardiomiopati, bradikardia, hipotensi, takikardia, lemah, infeksi vrus dan pneumonia                      KI: gagal jantung akut, syok kardiogenik, blok AV tingkat 2 dan 3, sick sinus syndrome                      PERHATIAN: penderita gangguan fungsi ginjal dan hati. obat-obat golongan beta bloker sebaiknya tidak untuk penderita kelainan jantung                      Cara penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari</p>					
<p>Nama obat: vitamin B1                      Kandungan: Thiamine HCL 50mg                      Dosis lazim:sehari 1 kali 1 tablet</p>						

		<p>Kegunaan: untuk mengatasi kekurangan vitamin B1 pada tubuh. ESO: mual, diare, atau sakit perut KI: Riwayat anafilaktik dengan suplemen PERHATIAN: hati-hati karena ada risiko anafilaksis Cara penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari</p>	<p>F. Tahapan pembuatan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan skринning resep</li><li>2. Menyiapkan obat yang tertera pada resep yaitu amlodipine 5mg, bisoprolol 5mg, dan vitamin B1 masing-masing sebanyak 30 tablet</li><li>3. Menulis etiket pada masing-masing obat</li><li>4. Menempelkan etiket setiap obat dan dimasukkan ke dalam plastik</li><li>5. Dicek kembali obat dan etiket apakah sesuai dengan resep tersebut</li></ol>
--	--	--	--

G. Informasi obat yang diberikan (berupa paragraph dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TVF: pengambilan obat atas nama Nur solichah  
 NS: ya, dengan saya sendiri mbak  
 TVF: baik buk, saya bantu jelaskan obatnya berupa 2 obat hipertensi diminum masing-masing sehari 1 kali 1 tablet sesudah makan, sama ada vitamin nya diminum sehari 1 kali 1 tablet sesudah makan nggeh. baik bu apa ada yang ditanyakan terkait obatnya.  
 NS: sudah mbak terimakasih  
 TVF: baik buk ini obatnya semoga lekas sembuh

17 Resep polifarmasi



A. Skrinning administrasi

Nama pasien:	Ada	SM Bambang
Umur pasien:	Ada	63 tahun
Berat badan:	Tidak ada	-
Nama obat:	Ada	Amlodipin Ramipril simvastatin
Kekuatan:	Ada	Amlodipin 5mg Ramipril 5mg Simvastatin 20mg
Bentuk sediaan:	Ada	Amlodipin: tablet Ramipril : tablet Simvastatin: tablet
Jumlah obat:	Ada	Amlodipin: 30 tablet Ramipril: 30 tablet Simvastatin:30 tablet
Duplikasi terapi:	Tidak ada	-

			Aturan pakai:	Ada	Amlodipin: sehari 1 kali 1 tablet Ramipril: sehari 1 kali 1 tablet Simvastatin: sehari 1 kali 1 tablet	
			Tanggal penulisan resep:	Ada	3 maret 2025	
			Nama dokter:	Ada	dr. Tyas	
			Surat ijin:	Tidak ada	-	
			Alamat dr.:	Tidak ada	-	
		B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi				
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1104 671 1895 807">                     Amlodipine 5mg yang dibutuhkan 30 tablet                      Ramipril 5mg yang dibutuhkan 30 tablet                      Simvastatin 20mg yang dibutuhkan 30 tablet                 </td> </tr> </table>				Amlodipine 5mg yang dibutuhkan 30 tablet Ramipril 5mg yang dibutuhkan 30 tablet Simvastatin 20mg yang dibutuhkan 30 tablet
Amlodipine 5mg yang dibutuhkan 30 tablet Ramipril 5mg yang dibutuhkan 30 tablet Simvastatin 20mg yang dibutuhkan 30 tablet						
		C. Perhitungan biaya resep				
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1104 895 1895 1066">                     Amlodipine 5mg 30 tablet x 380 = 11.400                      Ramipril 5mg 30 tablet x 851 = 25.530                      Simvastatin 20mg 30 tablet x 846 = 25.380                      Total 62.310 + 11% + 20% = 82.996                 </td> </tr> </table>				Amlodipine 5mg 30 tablet x 380 = 11.400 Ramipril 5mg 30 tablet x 851 = 25.530 Simvastatin 20mg 30 tablet x 846 = 25.380 Total 62.310 + 11% + 20% = 82.996
Amlodipine 5mg 30 tablet x 380 = 11.400 Ramipril 5mg 30 tablet x 851 = 25.530 Simvastatin 20mg 30 tablet x 846 = 25.380 Total 62.310 + 11% + 20% = 82.996						

		<p><b>D. Etiket</b></p> <p><b>Nama obat/warna etiket:</b></p> <table border="1" data-bbox="1014 276 1480 635"> <tr> <td colspan="2"> <b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b>                      Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989                      Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt                 </td> </tr> <tr> <td>No. RM :</td> <td>Tgl Lahir</td> </tr> <tr> <td>Nama: Bambang</td> <td>Tgl : 3-3-25</td> </tr> <tr> <td>...1..... X sehari 1</td> <td><b>Tab/Kapsul</b> Bungkus</td> </tr> <tr> <td>Hipertensi</td> <td>Sendok teh/makan</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><del>-SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del></td> </tr> <tr> <td>Penulis Resep: dr. tyas</td> <td>Nama obat :Amlodipin 5mg Tgl Kadaluarsa :</td> </tr> </table> <p><b>Nama obat/warna etiket:</b></p> <table border="1" data-bbox="1014 683 1480 1042"> <tr> <td colspan="2"> <b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b>                      Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989                      Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt                 </td> </tr> <tr> <td>No. RM :</td> <td>Tgl Lahir</td> </tr> <tr> <td>Nama: Bambang</td> <td>Tgl : 3-3-25</td> </tr> <tr> <td>...1..... X sehari 1</td> <td><b>Tab/Kapsul</b> Bungkus</td> </tr> <tr> <td>Kolesterol</td> <td>Sendok teh/makan</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><del>-SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del></td> </tr> <tr> <td>Penulis Resep: dr. Tyas</td> <td>Nama obat :Simvastatin 20mg Tgl Kadaluarsa :</td> </tr> </table> <p><b>E. Product knowledge</b></p> <table border="1" data-bbox="1115 1161 2000 1383"> <tr> <td>                     Nama obat: amlodipine 5mg                      Kandungan: amlodipine 5mg                      Dois lazim: dosis awal yang dianjurkan: sehari 1 x 5mg, dengan dosis maks: sehari 1 x 10mg. pada pasien lansia atau                 </td> <td>                     Nama obat: Ramipril 5mg                      Kandungan: Ramipril 5mg]                      Dosis lazim: sehari 1 kali 1 tablet                      Kegunaan: Untuk pengobatan Hipertensi, Gagal jantung                 </td> </tr> </table>	<b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b> Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt		No. RM :	Tgl Lahir	Nama: Bambang	Tgl : 3-3-25	...1..... X sehari 1	<b>Tab/Kapsul</b> Bungkus	Hipertensi	Sendok teh/makan	<del>-SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del>		Penulis Resep: dr. tyas	Nama obat :Amlodipin 5mg Tgl Kadaluarsa :	<b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b> Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt		No. RM :	Tgl Lahir	Nama: Bambang	Tgl : 3-3-25	...1..... X sehari 1	<b>Tab/Kapsul</b> Bungkus	Kolesterol	Sendok teh/makan	<del>-SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del>		Penulis Resep: dr. Tyas	Nama obat :Simvastatin 20mg Tgl Kadaluarsa :	Nama obat: amlodipine 5mg Kandungan: amlodipine 5mg Dois lazim: dosis awal yang dianjurkan: sehari 1 x 5mg, dengan dosis maks: sehari 1 x 10mg. pada pasien lansia atau	Nama obat: Ramipril 5mg Kandungan: Ramipril 5mg] Dosis lazim: sehari 1 kali 1 tablet Kegunaan: Untuk pengobatan Hipertensi, Gagal jantung
<b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b> Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt																																
No. RM :	Tgl Lahir																															
Nama: Bambang	Tgl : 3-3-25																															
...1..... X sehari 1	<b>Tab/Kapsul</b> Bungkus																															
Hipertensi	Sendok teh/makan																															
<del>-SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del>																																
Penulis Resep: dr. tyas	Nama obat :Amlodipin 5mg Tgl Kadaluarsa :																															
<b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b> Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt																																
No. RM :	Tgl Lahir																															
Nama: Bambang	Tgl : 3-3-25																															
...1..... X sehari 1	<b>Tab/Kapsul</b> Bungkus																															
Kolesterol	Sendok teh/makan																															
<del>-SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del>																																
Penulis Resep: dr. Tyas	Nama obat :Simvastatin 20mg Tgl Kadaluarsa :																															
Nama obat: amlodipine 5mg Kandungan: amlodipine 5mg Dois lazim: dosis awal yang dianjurkan: sehari 1 x 5mg, dengan dosis maks: sehari 1 x 10mg. pada pasien lansia atau	Nama obat: Ramipril 5mg Kandungan: Ramipril 5mg] Dosis lazim: sehari 1 kali 1 tablet Kegunaan: Untuk pengobatan Hipertensi, Gagal jantung																															

		<p>kelainan fungsi hati, dosis awal yang dianjurkan sehari 1 x 2.5mg                  Kegunaan: pengobatan hipertensi, angina stabil kronik, angina vasospastik                  ESO: aritmia, edema, bradikardia, vertigo, anoreksia, rash, fatiue, mual, diare                  KI: hipersensitif                  PERHATIAN: hipersensitivitas                  Cara penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari</p>	<p>kongestif. Terapi kombinasi dengan diuretik dan/tanpa glikosida. Untuk menurunkan resiko terjadinya infark miokard, stroke tahap 2                  ESO: peningkatan serum kreatinin, pusing, dan sinkop, batuk juga sering terjadi karena peningkatan kadar bradikinin                  KI: hipersensitif terhadap ramipril atau obat yang termasuk ACE inhibitor lain, ibu hamil dan menyusui, Riwayat angioedema                  PERHATIAN: harus dengan resep doter. Pasien yang memiliki Riwayat hipersensitif terhadap rampiril atau obat yang termasuk ACE                  Cara penyimpanan: Simpan di tempat kering dan sejuk, serta terhindar dari panas sinar matahari langsung</p>
		<p>Nama obat: simvastatin 20mg                  Kandungan: simvastatin 20mg                  Dosis lazim: awal sehari 5-10mg dosis Tunggal pada malam hari                  Kegunaan: mengurangi kadar kolesterol buruk (LDL) dan trigliserid dalam darah, sekaligus</p>	

		<p>menaikkan kadar HDL (kolesterol baik). ESO: Nyeri perut, konstipasi, kembung, astenia, sakit kepala, miopati, rabdomiolisis, tremor, pusing, vertigo. KI: penyakit hati aktif, hipersensitif, hamil dan menyusui PERHATIAN: Pantau kadar kolesterol secara periodik selama terapi. Lakukan tes fungsi hati sebelum terapi, 6 &amp; 12 bulan setelah terapi pertam dan selanjutnya secara periodic, Wanita hamil dan menyusui cara penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari</p> <p>F. Tahap pembuatan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan skrinning resep</li><li>2. Menyiapkan obat yang tertera pada resep yaitu amlodipine 5mg, ramipril 5mg, dan simvastatin 20mg masing-masing sebanyak 30 tablet</li><li>3. Menulis etiket pada masing-masing obat</li><li>4. Menempelkan etiket setiap obat dan dimasukkan ke dalam plastik</li><li>5. Dicek kembali obat dan etiket apakah sesuai dengan resep tersebut</li></ol>	
--	--	--	--

		<p>G. Informasi obat yang diberikan (berupa paragraph dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal</p> <div data-bbox="1088 319 1982 671" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>TVF: pengambilan obat atas nama bapak bambang B : ya, dengan saya sendiri mbak TVF: baik pak, saya bantu jelaskan obatnya berupa 2 obat hipertensi diminum masing-masing sehari 1 kali 1 tablet sesudah makan, sama ada obat untuk kolesterol nya diminum sehari 1 kali 1 tablet sesudah makan pada malam hari nggeh. baik pak apa ada yang ditanyakan terkait obatnya. B: sudah mbak terimakasih TVF: baik pak ini obatnya semoga lekas sembuh</p></div>
--	--	---

18 Resep lainnya



KLINIK CIPTA MEDIKA GKB  
 Jl. Balikpapan No. 6 GKB, Gresik, Jawa Timur  
 031-3954460/082245015803  
 E-mail : ciptamedikaklinik@gmail.com

---

REKAP DATA RESEP

No Resep	Tgl Resep	Poli/Unit	Status	Pasien	Dokter Peresep
20250312005	2025-03-12 18:40:52	Poli/Unit Gigi	Sudah Terlayani	20250312000004 002371 ANIK MARDININGSIH (BPJS)	drg Arsyi Harnah Dentista
		Jumlah	Kode Obat	Nama Obat	Aturan Pakai
		6 TAB	GKB110	DEKAMETASONE 0,5 KALENG PLYER	2X1
		6 TAB	GKB1139	NATRIUM DIKLOFENAK 50MG (SAMCO)	2X1

A. Skrinning administrasi

Nama pasien:	Ada	Anik mardiningsih
Umur pasien:	Tidak ada	-
Berat badan:	Tidak ada	-
Nama obat:	Ada	Dexametason Natrium diklofenak
Kekuatan:	Ada	Dexametason: 0,5 Natrium diklofenak: 50mg
Bentuk sediaan:	Ada	Dexametason: tablet Natrium diklofenak: tablet
Jumlah obat:	Ada	Dexametason: 6 tablet Natrium diklofenak: 6 tablet
Duplikasi terapi:	Tidak ada	-
Aturan pakai:	Ada	Dexametason: sehari 2 kali 1 tablet Natrium diklofenak: 2 kali sehari 1 tablet
Tanggal penulisan resep:	Ada	12 Maret 2025
Nama dokter:	Ada	drg. Arsy
Surat ijin:	Tidak ada	-
Alamat dr.:	Tidak ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi

Dexametason kaleng yang dibutuhkan 6 tablet  
 Natrium diklofenak yang dibutuhkan 6 tablet

C. Perhitungan biaya resep

Dexametason kaleng 6 tablet x 231 = 1.386  
 Natrium diklofenak 6 tablet x 468 = 2.808  
 Total 4.194 + 11% + 20% = 5.586 = 6.000

D. Etiket

Nama obat/warna etiket:

nama obat/warna etiket:

<b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b> Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt	
No. RM :	Tgl Lahir
Nama: Anik	Tgl : 12-3-25
<b>Tab/Kapsul</b>	
...2..... X sehari 1	Bungkus
Radang, nyeri	Sendok teh/makan
<del>SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del>	
Penulis Resep: drg. Arsyl	Nama obat : Dexametason Tgl Kadaluarsa :

<b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b> Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt	
No. RM :	Tgl Lahir
Nama: Anik	Tgl : 12-3-25
<b>Tab/Kapsul</b>	
...2..... X sehari 1	Bungkus
Bila nyeri	Sendok teh/makan
<del>SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del>	
Penulis Resep: drg. Arsyl	Nama obat : Nadik Tgl Kadaluarsa :

E. Product knowledge

Nama obat: dexametasone Kandungan: deametasone 0,5mg Dosis lazim: 0,5 – 10g per hari Kegunaan: inflamasi, alergi dan penyakit lain yang responsif terhadap glukokortikoid ESO: lemah otot, osteoporosis, tukak peptik, gangguan penyembuhan luka, keringat	Nama obat: natrium diklofenak Kandungan: natrium diklofenak 50mg Dosis lazim: osteoartritis : 2-3 kali sehari 50 mg , reumatoid arthritis : 3-4 kali sehari 50 mg, ankilosing spondilitis : 4 kali sehari 25 mg Kegunaan: pengobatan akut dan kronis gejala-gejala reumatoid
--	---

		<p>berlebih, sakit kepala, gangguan siklus haid, hambat pertumbuhan pada anak, penurunan toleransi terhadap karbohidrat                  KI: hipersensitivitas, infeksi akut yang tidak diobati, dan adanya infeksi jamur                  PERHATIAN: hipotiroid, sirosis hati, terapi jangka lama                  Cara penyimpanan: simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>	<p>arthritis, osteoarthritis dan ankilosing spondylitis                  ESO: nyeri kram perut, sakit kepala, retensi cairan, diare mual, konstipasi, flatulen kelainan pada fungsi hati indigesti, tukak lambung, ruam tinnitus                  KI: hipersensitivitas                  PERHATIAN: penderita yang hipersensitif terhadap diklofenak atau menderita asma, urtikaria, penderita tukak lambung.                  Cara penyimpanan: Simpan di tempat yang sejuk dan kering, serta terlindung dari panas dan sinar matahari langsung</p> <p>F. Tahap pembuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Melakukan skrinning resep</li> <li>2. Menyiapkan obat yang tertera pada resep yaitu dexametason kaleng dan natrium diklofenak masing-masing 6 tablet</li> <li>3. Menulis etiket pada masing-masing obat</li> <li>4. Menempelkan etiket setiap obat dan dimasukkan ke dalam plastik</li> <li>5. Dicek kembali obat dan etiket apakah sesuai dengan resep tersebut</li> </ol> <p>G. Informasi obat yang diberikan (berupa paragraph dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p>
--	--	---	---

		<p>TVF: pengambilan obat atas nama ibu anik AN : ya, dengan saya sendiri mbak TVF: baik buk, dari dokter gigi ya buk, saya bantu jelaskan obatnya untuk radang nyeri diminum sehari 2 kali 1 tablet sesudah makan dan untuk nyeri nya diminum 2 kali sehari 1 tablet sesudah makan bila tidak nyeri tidak usah diminum nggeh buk . baik buk apa ada yang ditanyakan terkait obatnya. AN: sudah mbak terimakasih TVF: baik buk ini obatnya semoga lekas sembuh</p>
--	--	---

19 Resep lainnya



**KLINIK CIPTA MEDIKA GKB**  
 Jl. Balikpapan No. 6 GKB, Oresik, Jawa Timur  
 031-3954446/082245015803  
 E-mail : ciptamedikaklinik@gmail.com

---

REKAP DATA RESEP

No.Resep	Tgl.Resep	Polik/Unit	Status	Pasien	Dokter Per
202503120054	2025-03-12 16:29:09	Poliklinik Umum	Sudah Terlayani	2025/03/12/000063 005635 MUHAMMAD SYAIFUL FAIZ (BPJS)	dr. Tyas Fr
		Jumlah	Kode Obat	Nama Obat	Aturan Pak
		6 TAB	GKB0110	DEXAMETASONE 0.5 KALENG PLYER	3x1
		6 TAB	GKB0332	RAMAFLU	3x1

A. Skrinning administrasi

Nama pasien:	Ada	Muhammad syaiful faiz
Umur pasien:	Tidak ada	-
Berat badan:	Tidak ada	-
Nama obat:	Ada	Dexametason Ramaflu
Kekuatan:	Ada	Dexametason : 0,5 mg Ramaflu
Bentuk sediaan:	Ada	Dexametason: tablet Ramaflu: tablet
Jumlah obat:	Ada	Dexametason: 6 tablet Ramaflu: 6 tablet
Duplikasi terapi:	Tidak ada	-
Aturan pakai:	Ada	Dexametason: sehari 3 kali 1 tablet Ramaflu: sehari 3 kali 1 tablet
Tanggal penulisan resep:	Ada	12 maret 2025
Nama dokter:	Ada	dr. Tyas
Surat ijin:	Tidak ada	-
Alamat dr.:	Tidak ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi

Dexametason kaleng yang dibutuhkan 6 tablet  
Ramaflu yang dibutuhkan 6 tablet

C. Perhitungan biaya resep

Dexametason kaleng 6 tablet x x 231 = 1.386  
 Ramaflu 6 tablet x 600 = 3.600  
 Total 4.986 + 11% + 20% = 6.641 = 7.000

D. Etiket

Nama obat/warna etiket:

nama obat/warna etiket:

<b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b> Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt	
No. RM :	Tgl Lahir
Nama: M.syaiful	Tgl : 12-3-25
<b>Tab/Kapsul</b>	
...3..... X sehari 1	Bungkus
Radang, nyeri	Sendok teh/makan
<del>-SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del>	
Penulis Resep: dr.Tyas	Nama obat :Dexametason Tgl Kadaluarsa :

<b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b> Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt	
No. RM :	Tgl Lahir
Nama: M.syaiful	Tgl : 12-3-25
<b>Tab/Kapsul</b>	
...3..... X sehari 1	Bungkus
Demam, flu, batuk	Sendok teh/makan
<del>-SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del>	
Penulis Resep: dr. Tyas	Nama obat : Ramaflu Tgl Kadaluarsa :

E. Product knowledge

Nama obat: dexametason Kandungan: deametasone 0,5mg Dosis lazim: 0,5 – 10g per hari Kegunaan: inflamasi, alergi dan penyakit lain yang responsif terhadap glukokortikoid ESO: lemah otot, osteoporosis, tukak peptik, gangguan penyembuhan luka, keringat berlebih, sakit kepala,	Nama obat: ramaflu Kandungan: paracetamol 500mg, pseudoephedrine HCL 30mg, dextromethorphan HBr 15mg, chlorpheniramine maleate 2mg Dosis lazim: 1 kaplet, 3 kali sehari Kegunaan: Meringankan gejala flu, seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin - bersin yang disertai batuk.
---	--

		<p>gangguan siklus haid, hambat pertumbuhan pada anak, penurunan toleransi terhadap karbohidrat                  KI: hipersensitivitas, infeksi akut yang tidak diobati, dan adanya infeksi jamur                  PERHATIAN: hipotiroid, sirosis hati, terapi jangka lama                  Cara penyimpanan: simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>	<p>ESO: mual, muntah, mengantuk                  KI: alergi terhadap salah satu dari kandungan obat ramaflu, punya gangguan fungsi hati yang berat                  PERHATIAN: Konsultasikan kepada dokter terlebih dahulu apabila terdapat riwayat alergi terhadap kandungan dari produk ini.                  Cara penyimpanan: : simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>
		<p>F. Tahapan pembuatan</p>	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan skinning resep</li> <li>2. Menyiapkan obat yang tertera pada resep yaitu dexametason kaleng dan ramaflu masing-masing 6 tablet</li> <li>3. Menulis etiket pada masing-masing obat</li> <li>4. Menempelkan etiket setiap obat dan dimasukkan ke dalam plastik</li> <li>5. Dicek kembali obat dan etiket apakah sesuai dengan resep tersebut</li> </ol>	
		<p>G. Informasi obat yang diberikan (berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p>	

		<p>TVF: pengambilan obat atas nama bapak Muhammad saiful S : ya, dengan saya sendiri mbak TVF: baik pak, , saya bantu jelaskan obatnya untuk radang nyeri diminum sehari 3 kali 1 tablet sesudah makan dan untuk demam, flu, batuk diminum 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan. baik buk apa ada yang ditanyakan terkait obatnya. S: sudah mbak terimakasih TVF: baik pak ini obatnya semoga lekas sembuh</p>
--	--	--

20

Resep lainnya



KLINIK CIPTA MEDIKA GKB  
 Jl. Balikpapan No. 6 GKB, Gresik, Jawa Timur  
 031-3954446/082245015803  
 E-mail : ciptamedikaklinik@gmail.com

REKAP DATA RESEP

No Resep	Tgl Resep	Polik/Unit	Status	Pasien	Dokter Peresep
202503120053	2025-03-12 16:24:40	Poliklinik Umum	Sudah Terlayani	20250312/000061 001764 M ZAINAL ABIDIN (BPJS)	dr. Tyas Firmabona
		Jumlah	Kode Obat	Nama Obat	Aturan Pakai
		6 TAB	GKB0110	DEXAMETASONE 0.5 KALENG PUYER	3x1
		6 TAB	GKB1401	FLUTAMOL KAPLET	3x1
		10 KAP	GKB2135	AMOXICILLIN 500MG (ETA)	3x1

A. Skrinning administrasi

Nama pasien:	Ada	M Zainal abidin
Umur pasien:	Tidak ada	-
Berat badan:	Tidak ada	-
Nama obat:	Ada	Dexametasone Flutamol Amoxicillin
Kekuatan:	Ada	Dexametasone 0,5mg Flutamol Amoxicillin 500mg
Bentuk sediaan:	Ada	Dexametasone: tablet Flutamol: tablet Amoxicillin: kapsul
Jumlah obat:	Ada	Dexametasone: 6 tablet Flutamol: 6 tablet Amoxicillin: 10 kapsul
Duplikasi terapi:	Tidak ada	-
Aturan pakai:	Ada	Dexametasone: sehari 3 kali 1 tablet Flutamol: sehari 3 kali 1 tablet Amoxicillin: sehari 3 kali 1 kapsul
Tanggal penulisan resep:	Ada	12 Maret 2025
Nama dokter:	Ada	dr. Tyas
Surat ijin:	Tidak ada	-
Alamat dr.:	Tidak ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi

Dexametason kaleng yang dibutuhkan 6 tablet  
 Ramaflu yang dibutuhkan 6 tablet  
 Amoxicillin yang dibutuhkan 10 kapsul

C. Perhitungan biaya resep

Dexametason kaleng 6 tablet x x 231 = 1.386  
 Ramaflu 6 tablet x 600 = 3.600  
 Amoxicillin 10 tablet x 1.000 = 10.000  
 Total 14.986 + 11% + 20% = 19.961 = 20.000

D. Etiket

Nama obat/warna etiket:

Nama obat/warna etiket:

<b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b> Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt	
No. RM :	Tgl Lahir
Nama: M.zainal	Tgl : 12-3-25
<b>Tab/Kapsul</b>	
...3..... X sehari 1	Bungkus
Radang, nyeri	Sendok teh/makan
<del>SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del>	
Penulis Resep: dr.Tyas	Nama obat :Dexametason Tgl Kadaluarsa :

<b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b> Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt	
No. RM :	Tgl Lahir
Nama: M.zainal	Tgl : 12-3-25
<b>Tab/Kapsul</b>	
...3..... X sehari 1	Bungkus
Demam, flu, batuk	Sendok teh/makan
<del>SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del>	
Penulis Resep: dr.Tyas	Nama obat :Ramaflu Tgl Kadaluarsa :

		<p>Nama obat/ warna etiket:</p> <table border="1" data-bbox="1048 341 1518 826"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt</td> </tr> <tr> <td>No. RM :</td> <td>Tgl Lahir :</td> </tr> <tr> <td>Nama : M. zainal</td> <td>Tgl :12-3-25</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Tab/Kapsul</b></td> </tr> <tr> <td>3 X sehari 1</td> <td>Bungkus</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sendok teh/makan</td> </tr> <tr> <td>Diminum setiap 24 jam</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diminum setiap 12 jam</td> <td><b>Antibiotik</b></td> </tr> <tr> <td><u>Diminum setiap 8 jam</u></td> <td><b>Dihabiskan</b></td> </tr> <tr> <td>Diminum setiap 6 jam</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diminum setiap 4,5 jam</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b><u>KOCOK DULU/SEBELUM/SESUDAH MAKAN</u></b></td> </tr> <tr> <td>Penulis Resep:</td> <td>Nama obat : amoxicillin</td> </tr> <tr> <td>dr. Tyas</td> <td>Tgl Kadaluarsa :</td> </tr> </table> <p>E. Product knowledge</p> <table border="1" data-bbox="1146 903 2033 1385"> <tr> <td data-bbox="1146 903 1585 1385"> <p>Nama obat: dexametasone                  Kandungan: deametasone                  0,5mg                  Dosis lazim: 0,5 – 10g per hari                  Kegunaan: inflamasi, alergi dan                  penyakit lain yang responsif                  terhadap glukokortikoid                  ESO: lemah otot, osteoporosis,                  tukak peptik, gangguan                  penyembuhan luka, keringat                  berlebih, sakit kepala, gangguan                  siklus haid, hambat                  pertumbuhan pada anak,</p> </td> <td data-bbox="1585 903 2033 1385"> <p>Nama obat: ramaflu                  Kandungan: paracetamol                  500mg, pseudoephedrine HCL                  30mg, dextromethorphan HBr                  15mg, chlorpheniramine                  maleate 2mg                  Dosis lazim: 1 kaplet, 3 kali                  sehari                  Kegunaan: Meringankan gejala                  flu, seperti demam, sakit kepala,                  hidung tersumbat, dan bersin -                  bersin yang disertai batuk.                  ESO: mual, muntah, mengantuk</p> </td> </tr> </table>	<b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b>		Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989		Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt		No. RM :	Tgl Lahir :	Nama : M. zainal	Tgl :12-3-25	<b>Tab/Kapsul</b>		3 X sehari 1	Bungkus		Sendok teh/makan	Diminum setiap 24 jam		Diminum setiap 12 jam	<b>Antibiotik</b>	<u>Diminum setiap 8 jam</u>	<b>Dihabiskan</b>	Diminum setiap 6 jam		Diminum setiap 4,5 jam		<b><u>KOCOK DULU/SEBELUM/SESUDAH MAKAN</u></b>		Penulis Resep:	Nama obat : amoxicillin	dr. Tyas	Tgl Kadaluarsa :	<p>Nama obat: dexametasone                  Kandungan: deametasone                  0,5mg                  Dosis lazim: 0,5 – 10g per hari                  Kegunaan: inflamasi, alergi dan                  penyakit lain yang responsif                  terhadap glukokortikoid                  ESO: lemah otot, osteoporosis,                  tukak peptik, gangguan                  penyembuhan luka, keringat                  berlebih, sakit kepala, gangguan                  siklus haid, hambat                  pertumbuhan pada anak,</p>	<p>Nama obat: ramaflu                  Kandungan: paracetamol                  500mg, pseudoephedrine HCL                  30mg, dextromethorphan HBr                  15mg, chlorpheniramine                  maleate 2mg                  Dosis lazim: 1 kaplet, 3 kali                  sehari                  Kegunaan: Meringankan gejala                  flu, seperti demam, sakit kepala,                  hidung tersumbat, dan bersin -                  bersin yang disertai batuk.                  ESO: mual, muntah, mengantuk</p>
<b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b>																																				
Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989																																				
Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt																																				
No. RM :	Tgl Lahir :																																			
Nama : M. zainal	Tgl :12-3-25																																			
<b>Tab/Kapsul</b>																																				
3 X sehari 1	Bungkus																																			
	Sendok teh/makan																																			
Diminum setiap 24 jam																																				
Diminum setiap 12 jam	<b>Antibiotik</b>																																			
<u>Diminum setiap 8 jam</u>	<b>Dihabiskan</b>																																			
Diminum setiap 6 jam																																				
Diminum setiap 4,5 jam																																				
<b><u>KOCOK DULU/SEBELUM/SESUDAH MAKAN</u></b>																																				
Penulis Resep:	Nama obat : amoxicillin																																			
dr. Tyas	Tgl Kadaluarsa :																																			
<p>Nama obat: dexametasone                  Kandungan: deametasone                  0,5mg                  Dosis lazim: 0,5 – 10g per hari                  Kegunaan: inflamasi, alergi dan                  penyakit lain yang responsif                  terhadap glukokortikoid                  ESO: lemah otot, osteoporosis,                  tukak peptik, gangguan                  penyembuhan luka, keringat                  berlebih, sakit kepala, gangguan                  siklus haid, hambat                  pertumbuhan pada anak,</p>	<p>Nama obat: ramaflu                  Kandungan: paracetamol                  500mg, pseudoephedrine HCL                  30mg, dextromethorphan HBr                  15mg, chlorpheniramine                  maleate 2mg                  Dosis lazim: 1 kaplet, 3 kali                  sehari                  Kegunaan: Meringankan gejala                  flu, seperti demam, sakit kepala,                  hidung tersumbat, dan bersin -                  bersin yang disertai batuk.                  ESO: mual, muntah, mengantuk</p>																																			

		<p>penurunan toleransi terhadap karbohidrat                  KI: hipersensitivitas, infeksi akut yang tidak diobati, dan adanya infeksi jamur                  PERHATIAN: hipotiroid, sirosis hati, terapi jangka lama                  Cara penyimpanan: simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>	<p>KI: alergi terhadap salah satu dari kandungan obat ramafllu, punya gangguan fungsi hati yang berat                  PERHATIAN: Konsultasikan kepada dokter terlebih dahulu apabila terdapat riwayat alergi terhadap kandungan dari produk ini.                  Cara penyimpanan: simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>
		<p>Nama obat: amoxicillin                  Kandungan: amoxicillin 500mg                  Dosis lazim: Dewasa: 250-500 mg setiap 8 jam (3x sehari) ,                  Anak-anak: 20-40mg kg/BB/hari dalam 3 dosis terbagi.                  Kegunaan: infeksi yang disebabkan oleh strain-strain bakteri                  ESO: reaksi hipersensitivitas seperti urtikaria, demam nyeri sendi, diare, syok anafilaksis, ruam eritematosus, leukemia limfatik kronik, dan iritasi gastrointestinal.                  KI:penderita hipersensitif terhadap antibiotic beta lactam</p>	

		<p>PERHATIAN: Hati-Hati Pada Penderita Leukimia Limfatik, Wanita Hamil Dan Menyusui Cara penyimpanan: : simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p> <p>F. Tahapan pembuatan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan skrinning resep</li><li>2. Menyiapkan obat yang tertera pada resep yaitu dexametason kaleng dan ramaflu masing-masing 6 tablet, dan amoxicillin 10 kapsul</li><li>3. Menulis etiket pada masing-masing obat</li><li>4. Menempelkan etiket setiap obat dan dimasukkan ke dalam plastik</li><li>5. Dicek kembali obat dan etiket apakah sesuai dengan resep tersebut</li></ol> <p>G. informasi obat yang diberikan ( berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p>
--	--	---

		<p>TVF: pengambilan obat atas nama bapak Muhammad zainal Z : ya, dengan saya sendiri mbak TVF: baik pak , saya bantu jelaskan obatnya untuk radang nyeri diminum sehari 3 kali 1 tablet sesudah makan dan untuk demam, flu, batuk diminum 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan, sama ada antibiotiknya pak diminum sehari 3 kali 1 tablet sesudah makan, untuk antibiotic dihabiskan nggeh. baik pak apa ada yang ditanyakan terkait obatnya. Z: sudah mbak terimakasih TVF: baik pak ini obatnya semoga lekas sembuh</p>
--	--	---

21 Resep lainnya



KLINIK CIPTA MEDIKA GKB  
 Jl. Balikpapan No. 6 GKB, Gresik, Jawa Timur  
 031-3954446/082245015803  
 E-mail : ciptamedikaklinik@gmail.com

---

REKAP DATA RESEP

No Resep	Tgl Resep	Poli/Unit	Status	Pasien	Dokter Peresep
202503120046	2025-03-12 14:27:46	Poliklinik Umum	Sudah Terlayani	20250312000054 007748 ELVI HERRY ISMI NAUNI (BPJS)	dr. Biendha Ulfatulaily
		Jumlah	Kode Obat	Nama Obat	Aturan Pakai
		6 TAB	GKB0879	OMEGTAMINE TAB	2X1
		1 BTL	GKB1098	OBH ITRASAL SYRUP	3XC1
		4 TAB	GKB1788	VITAMIN BC STRIP (IF)	1X1

A. Skrinning administrasi

Nama pasien:	Ada	Elvi herry ismi nauni
Umur pasien:	Tidak ada	-
Berat badan:	Tidak ada	-
Nama obat:	Ada	Omeztamine OBH itrasal syrup Vitamin BC
Kekuatan:	Tidak ada	-
Bentuk sediaan:	Ada	Omeztamine: tablet OBH itrasal syrup: cair Vitamin BC: tablet
Jumlah obat:	Ada	Omeztamine: 6 tablet OBH itrasal syrup: 1 botol Vitamin BC: tablet
Duplikasi terapi:	Tidak ada	-
Aturan pakai:	Ada	Omeztamine: sehari 2 kali 1 tablet OBH itrasal syrup: sehari 3 kali 1 sendok makan Vitamin BC: sehari 1 kali 1 tablet
Tanggal penulisan resep:	Ada	12 Maret 2025
Nama dokter:	Ada	dr. Biendha
Surat ijin:	Tidak ada	-
Alamat dr.:	Tidak ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi

Omegtamine yang dibutuhkan 6 tablet  
 OBH itrasal syrup yang dibutuhkan 1 botol  
 Vitamin BC yang dibutuhkan 4 tablet

C. Perhitungan biaya resep

Omegtamine 178 x 6 Tablet = 1.068  
 OBH itrasal syrup 7.986 x 1 botol = 7.986  
 Vitamin BC 500 x 4 tablet = 2.000  
 Total 11.054 + 11% + 20% = 14.723 = 15.000

D. Etiket

Nama obat/warna etiket:

Nama obat/warna etiket:

<b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b> Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt	
No. RM :	Tgl Lahir
Nama: Elvi	Tgl : 12-3-25
<b>Tab/Kapsul</b>	
...2..... X sehari 1	Bungkus
Radang, nyeri	Sendok teh/makan
<b>-SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</b>	
Penulis Resep: dr.Biendha	Nama obat :omegtamine Tgl Kadaluarsa :

<b>APOTEK CIPTA MEDIKA 1</b> Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt	
No. RM :	Tgl Lahir
Nama: Elvi	Tgl : 12-3-25
<b>Tab/Kapsul</b>	
...3..... X sehari 1	Bungkus
Batuk	<b>Sendok teh/makan</b>
<b>-SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</b>	
Penulis Resep: dr.Biendha	Nama obat :OBH itrasal Tgl Kadaluarsa :

		<p>Nama obat/warna etiket:</p> <table border="1" data-bbox="1099 312 1563 671"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <b>APOTEK CIPTA MEDIKA I</b>                  Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989                  Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt             </td> </tr> <tr> <td>No. RM :</td> <td>Tgl Lahir</td> </tr> <tr> <td>Nama: Elvi</td> <td>Tgl : 12-3-25</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Tab/Kapsul</b></td> </tr> <tr> <td>...1..... X sehari 1</td> <td>Bungkus</td> </tr> <tr> <td>Vitamin BC</td> <td>Sendok teh/makan</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>-SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</b></td> </tr> <tr> <td>Penulis Resep:</td> <td>Nama obat :</td> </tr> <tr> <td>dr.Biendha</td> <td>Tgl Kadaluausa :</td> </tr> </table> <p>E. Product knowledge</p> <table border="1" data-bbox="1193 791 1993 1383"> <tr> <td data-bbox="1193 791 1599 1383"> <p>Nama obat: Omeztamine                      Kandungan: Dexamethasone 0,5 mg, dekslorfeniramin maleat 2 mg.                      Dosis lazim: Dewasa dan Anak-anak &gt;3-4 kali 1-2 kaplet sesudah makan dan sebelum tidur                      Kegunaan: Mengatasi kasus alergi Dimana diperlukan terapi kortikosteroid                      ESO: Dapat menyebabkan gangguan keseimbangan elektrolit saluran pencernaan, sistem saraf, endokrin,</p> </td> <td data-bbox="1599 791 1993 1383"> <p>Nama obat: OBH itrasal syrup                      Kandungan: Glycyrrhizae succus 160mg, Chloretum Ammonicum 100mg, solution ammonia, sprituosa anisate 100mg                      Dosis lazim: Anak-anak umur 1 - 3 tahun: sehari 3 kali 1/2 sendok teh., Anak-anak umur di atas 3 tahun: sehari 3 kali 1 sendok teh., Dewasa: sehari 3 kali 3 sendok teh.                      Kegunaan: Meredakan segala jenis batuk karena</p> </td> </tr> </table>	<b>APOTEK CIPTA MEDIKA I</b> Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt		No. RM :	Tgl Lahir	Nama: Elvi	Tgl : 12-3-25	<b>Tab/Kapsul</b>		...1..... X sehari 1	Bungkus	Vitamin BC	Sendok teh/makan	<b>-SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</b>		Penulis Resep:	Nama obat :	dr.Biendha	Tgl Kadaluausa :	<p>Nama obat: Omeztamine                      Kandungan: Dexamethasone 0,5 mg, dekslorfeniramin maleat 2 mg.                      Dosis lazim: Dewasa dan Anak-anak &gt;3-4 kali 1-2 kaplet sesudah makan dan sebelum tidur                      Kegunaan: Mengatasi kasus alergi Dimana diperlukan terapi kortikosteroid                      ESO: Dapat menyebabkan gangguan keseimbangan elektrolit saluran pencernaan, sistem saraf, endokrin,</p>	<p>Nama obat: OBH itrasal syrup                      Kandungan: Glycyrrhizae succus 160mg, Chloretum Ammonicum 100mg, solution ammonia, sprituosa anisate 100mg                      Dosis lazim: Anak-anak umur 1 - 3 tahun: sehari 3 kali 1/2 sendok teh., Anak-anak umur di atas 3 tahun: sehari 3 kali 1 sendok teh., Dewasa: sehari 3 kali 3 sendok teh.                      Kegunaan: Meredakan segala jenis batuk karena</p>
<b>APOTEK CIPTA MEDIKA I</b> Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt																						
No. RM :	Tgl Lahir																					
Nama: Elvi	Tgl : 12-3-25																					
<b>Tab/Kapsul</b>																						
...1..... X sehari 1	Bungkus																					
Vitamin BC	Sendok teh/makan																					
<b>-SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</b>																						
Penulis Resep:	Nama obat :																					
dr.Biendha	Tgl Kadaluausa :																					
<p>Nama obat: Omeztamine                      Kandungan: Dexamethasone 0,5 mg, dekslorfeniramin maleat 2 mg.                      Dosis lazim: Dewasa dan Anak-anak &gt;3-4 kali 1-2 kaplet sesudah makan dan sebelum tidur                      Kegunaan: Mengatasi kasus alergi Dimana diperlukan terapi kortikosteroid                      ESO: Dapat menyebabkan gangguan keseimbangan elektrolit saluran pencernaan, sistem saraf, endokrin,</p>	<p>Nama obat: OBH itrasal syrup                      Kandungan: Glycyrrhizae succus 160mg, Chloretum Ammonicum 100mg, solution ammonia, sprituosa anisate 100mg                      Dosis lazim: Anak-anak umur 1 - 3 tahun: sehari 3 kali 1/2 sendok teh., Anak-anak umur di atas 3 tahun: sehari 3 kali 1 sendok teh., Dewasa: sehari 3 kali 3 sendok teh.                      Kegunaan: Meredakan segala jenis batuk karena</p>																					

		<p>metabolisme karbohidrat dan lemak, retensi urine                  KI: Tukak lambung aktif, herpes simplek okular, infeksi fungsi sistem sistemik, penderita dengan terapi penghambat MAO.                  Perhatian: Simpan obat pada temperatur ruangan, jauh dari panas dan cahaya langsung. Jauhkan obat dari anak-anak dan hewan peliharaan.                  Cara penyimpanan: Simpan obat pada temperatur ruangan, jauh dari panas dan cahaya langsung</p>	<p>pilek, influenza, bronchitis, asma, dan kebanyakan merokok.                  ESO: dosis yang berlebihan dapat menimbulkan asidosis, mengantuk                  KI: hipersensitif                  PERHATIAN: jangan digunakan pada pasien yang hipersensitif terhadap komposisi obat. Harap ke dokter apabila geala batuk belum sembuh selama 3 hari                  Cara penyimpanan: Simpan di tempat yang kering pada suhu 15 - 30 derajat Celsius, terhindar dari cahaya matahari langsung</p>	
		<p>Nama obat: Vitamin BC                  Kandungan: Vitamin BC (thiamine)                  Dosis lazim: 1 tablet perhari                  Kegunaan: terapi defisiensi vitamin B kompleks                  ESO: sakit kepala dan mual, mati rasa pada tanga dan kaki                  KI: hipersensitivitas terhadap thiamine atau komponen lain pada formula</p>		

		<p>PERHATIAN: hati-hati pada pasien yang mendapat levodopa</p> <p>Cara penyimpanan: simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p> <p>F. Tahapan pembuatan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan skrinning resep</li><li>2. Menyiapkan obat yang tertera pada resep yaitu omegtamine 6 tablet, OBH itrasal 1 botol, dan vitamin BC 4 tablet</li><li>3. Menulis etiket pada masing-masing obat</li><li>4. Menempelkan etiket setiap obat dan dimasukkan ke dalam plastik</li><li>5. Dicek kembali obat dan etiket apakah sesuai dengan resep tersebut</li></ol> <p>G. Informasi obat yang diberikan (berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p>
--	--	---

		<p>TVF: pengambilan obat atas nama bapak Elvi                  Z : ya, dengan saya sendiri mbak                  TVF: baik pak, , saya bantu jelaskan obatnya untuk radang nyeri diminum sehari 2 kali 1 tablet sesudah makan dan untuk batuk diminum 3 kali sehari 1 sendok makan sesudah makan, sama untuk vitaminnya diminum sehari 1 kali 1 tablet nggeh. baik pak apa ada yang ditanyakan terkait obatnya.                  Z: sudah mbak terimakasih                  TVF: baik pak ini obatnya semoga lekas sembuh</p>																					
22	<p>Resep insulin</p> 	<p>A. Skrinning administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1173 804 2040 1367"> <tr> <td>Nama pasien:</td> <td>Ada</td> <td>Ny. Sutikhah</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien:</td> <td>Ada</td> <td>54 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat badan:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama obat:</td> <td>Ada</td> <td>Glimepiride Metformin Sansulin</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan:</td> <td>Ada</td> <td>Glimepiride 3mg Metformin 500mg Sansulin</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sediaan:</td> <td>Ada</td> <td>Glimepiride: tablet Metformin: tablet Sansulin: cairan injeksi</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat:</td> <td>Ada</td> <td>Glimepiride: 30 tablet Metformin: 60 tablet Sansulin: 2 pen</td> </tr> </table>	Nama pasien:	Ada	Ny. Sutikhah	Umur pasien:	Ada	54 tahun	Berat badan:	Tidak ada	-	Nama obat:	Ada	Glimepiride Metformin Sansulin	Kekuatan:	Ada	Glimepiride 3mg Metformin 500mg Sansulin	Bentuk sediaan:	Ada	Glimepiride: tablet Metformin: tablet Sansulin: cairan injeksi	Jumlah obat:	Ada	Glimepiride: 30 tablet Metformin: 60 tablet Sansulin: 2 pen
Nama pasien:	Ada	Ny. Sutikhah																					
Umur pasien:	Ada	54 tahun																					
Berat badan:	Tidak ada	-																					
Nama obat:	Ada	Glimepiride Metformin Sansulin																					
Kekuatan:	Ada	Glimepiride 3mg Metformin 500mg Sansulin																					
Bentuk sediaan:	Ada	Glimepiride: tablet Metformin: tablet Sansulin: cairan injeksi																					
Jumlah obat:	Ada	Glimepiride: 30 tablet Metformin: 60 tablet Sansulin: 2 pen																					


	Duplikasi terapi:	Tidak ada	-
	Aturan pakai:	Ada	Glimepiride: sehari 1 kali 1 tablet Metformin: sehari 2 kali 1 tablet Sansulin : diserahkan ke dokter
	Tanggal penulisan resep:	Ada	27 Februari 2025
	Nama dokter:	Ada	dr. Ika
	Surat ijin:	Tidak ada	-
	Alamat dr.:	Tidak ada	-
	B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi		
<table border="1"> <tr> <td>                     Glimepiride 3mg yang dibutuhkan 30 tablet                      Metformin 500mg yang dibutuhkan 60 tablet                      Sansulin yang dibutuhkan 2 pen                 </td> </tr> </table>			Glimepiride 3mg yang dibutuhkan 30 tablet Metformin 500mg yang dibutuhkan 60 tablet Sansulin yang dibutuhkan 2 pen
Glimepiride 3mg yang dibutuhkan 30 tablet Metformin 500mg yang dibutuhkan 60 tablet Sansulin yang dibutuhkan 2 pen			
C. Perhitungan biaya resep			
<table border="1"> <tr> <td>                     Glimepiride 3mg 30 tablet x 2.560 = 76.800                      Metformin 500mg 60 tablet x 361 =21.660                      Sansulin 2 pen x 97.000 =194.000                      Total 292.460 +11%+20% = 389.556 = 390.000                 </td> </tr> </table>			Glimepiride 3mg 30 tablet x 2.560 = 76.800 Metformin 500mg 60 tablet x 361 =21.660 Sansulin 2 pen x 97.000 =194.000 Total 292.460 +11%+20% = 389.556 = 390.000
Glimepiride 3mg 30 tablet x 2.560 = 76.800 Metformin 500mg 60 tablet x 361 =21.660 Sansulin 2 pen x 97.000 =194.000 Total 292.460 +11%+20% = 389.556 = 390.000			

		<p><b>D. Etiket</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <p><b>Nama obat/warna etiket:</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">APOTEK CIPTA MEDIKA 1 Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt</p> <p>No. RM : Tgl Lahir Nama: Ny. Sutikhah Tgl : 12-3-25</p> <p style="text-align: center;"><b>Tab/Kapsul</b></p> <p>...1..... X sehari 1 Bungkus Diabetes Sendok teh/makan</p> <p style="text-align: center;"><del>- SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del></p> <p>Penulis Resep: Nama obat : Glimepirid 3mg dr.Ika Tgl Kadaluarsa :</p> </div> </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <p><b>Nama obat/warna etiket:</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">APOTEK CIPTA MEDIKA 1 Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt</p> <p>No. RM : Tgl Lahir Nama: Ny. Sutikhah Tgl : 12-3-25</p> <p style="text-align: center;"><b>Tab/Kapsul</b></p> <p>...2..... X sehari 1 Bungkus Diabetes Sendok teh/makan</p> <p style="text-align: center;"><del>- SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del></p> <p>Penulis Resep: Nama obat : Metformin 500mg dr.Ika Tgl Kadaluarsa :</p> </div> </td> </tr> </table> <p><b>E. Product knowledge</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p>Nama obat: glimepirid 3mg Kandungan: glimepiride 3mg Dosis lazim: dosis awal 1 mg/hari, dapat ditingkatkan dengan interval 1-2 minggu bila diperlukan Kegunaan: penderita diabetes melitus tipe 2 yang tidak dapat dikontrol dengan diet dan olahraga ESO: hipoglikemia, gangguan penglihatan, gangguan GIT, urtikaria KI: DM tipe 1, hipersensitivitas glimepiride dan golongan sulfonilurea, gangguan fungsi</p> </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p>Nama obat: Metformin 500mg Kandungan: metformin 500mg Dosis lazim: dosis awal: 1 x 500mg/hari, titrasi: dapat ditingkatkan 500mg/minggu. Dosis maksimum: 2000 mg dalam dosis terbagi. Diberikan Bersama makanan. Kegunaan: diabetes melitus tipe 2 (NIDDM) yang kadar gula darahnya tidak terkontrol dengan diet dan aktivitas fisik ESO: gangguan gastrointestinal, adidosis laktat KI: pasien dengan asidosis, alergi terhadap komponen sediaan,</p> </td> </tr> </table>	<p><b>Nama obat/warna etiket:</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">APOTEK CIPTA MEDIKA 1 Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt</p> <p>No. RM : Tgl Lahir Nama: Ny. Sutikhah Tgl : 12-3-25</p> <p style="text-align: center;"><b>Tab/Kapsul</b></p> <p>...1..... X sehari 1 Bungkus Diabetes Sendok teh/makan</p> <p style="text-align: center;"><del>- SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del></p> <p>Penulis Resep: Nama obat : Glimepirid 3mg dr.Ika Tgl Kadaluarsa :</p> </div>	<p><b>Nama obat/warna etiket:</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">APOTEK CIPTA MEDIKA 1 Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt</p> <p>No. RM : Tgl Lahir Nama: Ny. Sutikhah Tgl : 12-3-25</p> <p style="text-align: center;"><b>Tab/Kapsul</b></p> <p>...2..... X sehari 1 Bungkus Diabetes Sendok teh/makan</p> <p style="text-align: center;"><del>- SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del></p> <p>Penulis Resep: Nama obat : Metformin 500mg dr.Ika Tgl Kadaluarsa :</p> </div>	<p>Nama obat: glimepirid 3mg Kandungan: glimepiride 3mg Dosis lazim: dosis awal 1 mg/hari, dapat ditingkatkan dengan interval 1-2 minggu bila diperlukan Kegunaan: penderita diabetes melitus tipe 2 yang tidak dapat dikontrol dengan diet dan olahraga ESO: hipoglikemia, gangguan penglihatan, gangguan GIT, urtikaria KI: DM tipe 1, hipersensitivitas glimepiride dan golongan sulfonilurea, gangguan fungsi</p>	<p>Nama obat: Metformin 500mg Kandungan: metformin 500mg Dosis lazim: dosis awal: 1 x 500mg/hari, titrasi: dapat ditingkatkan 500mg/minggu. Dosis maksimum: 2000 mg dalam dosis terbagi. Diberikan Bersama makanan. Kegunaan: diabetes melitus tipe 2 (NIDDM) yang kadar gula darahnya tidak terkontrol dengan diet dan aktivitas fisik ESO: gangguan gastrointestinal, adidosis laktat KI: pasien dengan asidosis, alergi terhadap komponen sediaan,</p>
<p><b>Nama obat/warna etiket:</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">APOTEK CIPTA MEDIKA 1 Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt</p> <p>No. RM : Tgl Lahir Nama: Ny. Sutikhah Tgl : 12-3-25</p> <p style="text-align: center;"><b>Tab/Kapsul</b></p> <p>...1..... X sehari 1 Bungkus Diabetes Sendok teh/makan</p> <p style="text-align: center;"><del>- SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del></p> <p>Penulis Resep: Nama obat : Glimepirid 3mg dr.Ika Tgl Kadaluarsa :</p> </div>	<p><b>Nama obat/warna etiket:</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">APOTEK CIPTA MEDIKA 1 Jl. Balikpapan no.6 GKB, Telp 031-3957989 Apoteker: Sofia Winata Meiliasari, S.Farm, Apt</p> <p>No. RM : Tgl Lahir Nama: Ny. Sutikhah Tgl : 12-3-25</p> <p style="text-align: center;"><b>Tab/Kapsul</b></p> <p>...2..... X sehari 1 Bungkus Diabetes Sendok teh/makan</p> <p style="text-align: center;"><del>- SEBELUM/SESUDAH MAKAN/KOCOK DULU</del></p> <p>Penulis Resep: Nama obat : Metformin 500mg dr.Ika Tgl Kadaluarsa :</p> </div>					
<p>Nama obat: glimepirid 3mg Kandungan: glimepiride 3mg Dosis lazim: dosis awal 1 mg/hari, dapat ditingkatkan dengan interval 1-2 minggu bila diperlukan Kegunaan: penderita diabetes melitus tipe 2 yang tidak dapat dikontrol dengan diet dan olahraga ESO: hipoglikemia, gangguan penglihatan, gangguan GIT, urtikaria KI: DM tipe 1, hipersensitivitas glimepiride dan golongan sulfonilurea, gangguan fungsi</p>	<p>Nama obat: Metformin 500mg Kandungan: metformin 500mg Dosis lazim: dosis awal: 1 x 500mg/hari, titrasi: dapat ditingkatkan 500mg/minggu. Dosis maksimum: 2000 mg dalam dosis terbagi. Diberikan Bersama makanan. Kegunaan: diabetes melitus tipe 2 (NIDDM) yang kadar gula darahnya tidak terkontrol dengan diet dan aktivitas fisik ESO: gangguan gastrointestinal, adidosis laktat KI: pasien dengan asidosis, alergi terhadap komponen sediaan,</p>					

		<p>hati dan ginjal, ibu hamil dan menyusui                  PERHATIAN: pasien dengan resiko hipoglikemia, penurunan fungsi hati dan ginjal, pasien lanjut usia, defisiensi G6PD                  Cara penyimpanan: Simpan obat pada temperatur ruangan, jauh dari panas dan cahaya langsung.</p>	<p>ataupun gangguan fungsi ginjal yang berat                  PERHATIAN: Fungsi ginjal yang kurang sempurna. Monitor fungsi ginjal secara teratur. Hamil dan menyusui hentikan terapi 2-3 hari sebelum operasi. Kondisi yang dapat menyebabkan dehidrasi. Penderita dengan infeksi serius atau trauma.</p>
		<p>Nama obat: sansulin                  Kandungan: insulin aspart 100 U/mL                  Dosis lazim: bersifat individual, 1 x sehari diinjeksi secara subkutan, diberikan pada waktu yang sama tiap harinya                  Kegunaan: mengontrol kadar gula darah yang tinggi pada pasien diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2                  ESO: hpoglikemia (kadar gula darah dibawah batas normal), gangguan penglihatan sementara, lipodistrofi, reaksi pada situs injeksi dan alergi.                  KI: hipersensitivitas terhadap komponen obat                  PERHATIAN: pasien dengan gangguan ginjal dan hati, Wanita hamil dan ibu menyusui, anak usia</p>	

		<p>dari 6 tahun, sebelum digunakan untuk pertama kali: simpan di lemari es (2-8°C), jangan dibekuan, simpan pen dalam kemasan karton luar.</p>	
<p>F. Tahapan pembuatan</p> <div data-bbox="1131 483 2022 837" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan skrinning resep</li><li>2. Menyiapkan obat yang tertera pada resep yaitu glimepiride 3mg 30 tablet, metformin 500mg 60 tablet, dan sansulin 2 pen (dokter yang menyerahkan)</li><li>3. Menulis etiket pada masing-masing obat</li><li>4. Menempelkan etiket setiap obat dan dimasukkan ke dalam plastik</li><li>5. Dicek kembali obat dan etiket apakah sesuai dengan resep tersebut</li></ol></div> <p>G. Informasi obat yang diberikan (berupa paragraph dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <div data-bbox="1115 957 2007 1311" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>TVF: pengambilan obat atas nama ibu sutikhah S : ya, dengan saya sendiri mbak TVF: baik buk, saya bantu jelaskan obatnya untuk 2 obat diabetes diminum sehari 1 kali 1 tablet nggeh, yang glimepiride diminum sebelum makan sama untuk yang metformin nya diminum sesudah makan. Untuk yang sansulinnya ditangani oleh dokter nggeh. baik buk apa ada yang ditanyakan terkait obatnya. S: sudah mbak terimakasih TVF: baik buk ini obatnya semoga lekas sembuh</p></div>			

23 Resep racikan dewasa



A. Skrinning administrasi

Nama pasien:	Ada	Bustari
Umur pasien:	Tidak ada	-
Berat badan:	Tidak ada	-
Nama obat:	Ada	Codein MP Cetirizine
Kekuatan:	Tidak ada	-
Bentuk sediaan:	Ada	Codein: tablet MP: tablet Cetirizine: tablet
Jumlah obat:	Ada	Codein: 10mg/10mg x 10 = 10 tablet MP: 4mg/8mg x 10 = 5 tablet Cetirizine: 1/2 tablet
Duplikasi terapi:	Tidak ada	-
Aturan pakai:	Ada	Diminum sehari 3 kali 1 kapsul bila batuk
Tanggal penulisan resep:	Ada	14 februari 2025
Nama dokter:	Ada	dr. lailatul inayah
Surat ijin:	Tidak ada	-
Alamat dr.:	Tidak ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi

Codein yang dibutuhkan  $10\text{mg}/10\text{mg} \times 10 = 10$  tablet  
 MP yang dibutuhkan  $4\text{mg}/8\text{mg} \times 10 = 5$  tablet  
 Cetirizine yang dibutuhkan  $1/2$  tablet

C. Perhitungan biaya resep

Codein: 10 tablet x 900 = 9.000  
 MP: 5 tablet x 992 = 4.960  
 Cetirizine yang dibutuhkan 1/2 tablet x 552 = 276  
 Cangkang kapsul: 10 x 53 = 530  
 Total: 14.766 --→ 15.000

D. Etiket

Nama obat/warna etiket: racikan kapsul / putih

	Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik jujur – Transparan – kekeluargaan Jl. KH. Kholil 88 Gresik 61115 P: +62 31 3981275
	Nama/ID: Bustari TGL: 14/02/2025 ED Nama obat: racikan kapsul
3 x SEHARI 1 <b>KAPSUL</b> / <del>ML</del> / <del>SENDOK TAKAR</del> / <del>SEBELUM MAKAN / SAAT</del> / <del>SESUDAH MAKAN</del>	

E. Product knowledge


Nama obat: codein Kandungan: codein phosphate hemihydrate 10mg Dosis lazim: meringankan nyeri dewasa: Dosis awal 15–60 mg tiap 4 jam. Dosis maksimal 360 mg per hari. Anak usia di atas 12 tahun: 0,5–1 mg/kgBB, diberikan tiap 6 jam. Dosis maksimal 240 mg per hari	Nama obat: Methylprednisolone Kandungan: Methylprednisolone 8 mg Dosis lazim: dosis awal 4 – 48 mg/hari dalam 1 – 4 dosis terbagi
---	---

		<p>dan dosis maksimal per dosis 60 mg. meredakan batuk dewasa: 15-30 mg 3-4 kali sehari. Mengatasi diare akut dewasa 30mg 3-4 kali sehari</p> <p>Kegunaan: meredakan batuk, meredakan nyeri ringan hingga sedang selain itu mengurangi diare akut</p> <p>ESO: adiksi opiat dan depresi pernapasan</p> <p>KI: depresi pernapasan, anak usia &lt;12 tahun, anak usia &lt;18 tahun yang baru saja menjalani tonsilektomi atau adenoidektomi, dan asma bronkial.</p> <p>PERHATIAN: harus dengan resep dokter, Beri tahu dokter tentang riwayat alergi yang anda miliki.</p> <p>Cara penyimpanan: simpan ditempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari. Jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak.</p>	<p>Kegunaan: antiinflamasi, gangguan endokrin, reumatik, hematologi, alergi</p> <p>ESO: gangguan saluran cerna, edema, diabetes mellitus laten, hipertensi, supresi sistem imun</p> <p>KI: hipersensitivitas</p> <p>PERHATIAN: Wanita hamil dan menyusui, anak-anak, lansia</p> <p>Cara penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.</p>
		<p>Nama obat: cetirizine</p> <p>Kandungan: cetirizine HCL</p> <p>Dosis lazim: Dewasa dan anak usia lebih dari 12 tahun: 10 mg (1 tablet) per hari. Anak usia 6-12 tahun: 5 mg. Anak usia lebih dari</p>	

		<p>12 tahun: sama seperti dosis dewasa Kegunaan: mengobati alergi ESO: mual muntah, mengantuk, sakit kepala, pusing, gelisah KI: hipersensitif, gangguan ginjal yang parah, menyusui PERHATIAN: Beri tahu dokter tentang riwayat alergi obat yang dimiliki Cara penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.</p>		
<p>F. Tahap pembuatan</p>				
<table border="1"><tr><td data-bbox="1144 799 2040 1152"><ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan skimming resep</li><li>2. Mengecek ketersediaan obat</li><li>3. Menghitung harga obat</li><li>4. Meracik kapsul</li><li>5. Mengambil obat di rak, yaitu codein 10 tablet, MP 5 tablet, dan cetirizine 1/2 tablet</li><li>6. Menulis etiket</li><li>7. Menempelkan etiket setiap obat dan dimasukkan ke dalam plastik</li></ol></td></tr></table>				<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan skimming resep</li><li>2. Mengecek ketersediaan obat</li><li>3. Menghitung harga obat</li><li>4. Meracik kapsul</li><li>5. Mengambil obat di rak, yaitu codein 10 tablet, MP 5 tablet, dan cetirizine 1/2 tablet</li><li>6. Menulis etiket</li><li>7. Menempelkan etiket setiap obat dan dimasukkan ke dalam plastik</li></ol>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan skimming resep</li><li>2. Mengecek ketersediaan obat</li><li>3. Menghitung harga obat</li><li>4. Meracik kapsul</li><li>5. Mengambil obat di rak, yaitu codein 10 tablet, MP 5 tablet, dan cetirizine 1/2 tablet</li><li>6. Menulis etiket</li><li>7. Menempelkan etiket setiap obat dan dimasukkan ke dalam plastik</li></ol>				
<p>G. Informasi obat yang diberikan (berupa paragraph dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p>				

		<p>TVF: pengambilan obat atas nama bapak bustari B : ya, dengan saya anaknya mbak TVF: baik mas, saya bantu jelaskan obatnya bapak bustari berupa racikan kapsul untuk batuk diminum sehari 3 kali 1 kapsul nggeh bila tidak batuk tidak usah diminum tidak apa-apa. baik mas apa ada yang ditanyakan terkait obatnya. B: sudah mbak terimakasih TVF: baik mas ini obatnya semoga lekas sembuh</p>
--	--	--

24 Resep racikan dewasa



A. Skrinning administrasi

Nama pasien:	Ada	Sri fatmawati
Umur pasien:	Tidak ada	-
Berat badan:	Ada	80kg
Nama obat:	Ada	b come lansoprazole braxidin Antasida Ondansentron paracetamol dimenhidrinat
Kekuatan:	Tidak ada	-
Bentuk sediaan:	Ada	b come: tablet lansoprazole: kapsul braxidin: tablet Antasida: tablet Ondansentron: tablet paracetamol: tablet Dimenhidrinat: tablet
Jumlah obat:	Ada	b come: 5 tablet lansoprazole: 10 kapsul braxidin: 1/2 tablet Antasida: 1/3 tablet Ondansentron: 4mg/4mg x 10 = 10 tablet Paracetamol: 400mg/500mg x 10 = 8 tablet Dimenhidrinat: 25mg/50mg x 10 = 5 tablet
Duplikasi terapi:	Tidak ada	-

		Aturan pakai:	Ada	b comc: sehari 1 kali 1 tablet, sesudah makan lansoprazole: sehari 2 kali 1 kapsul, sebelum makan diminum sehari 3 kali 1 kapsul, sebelum makan untuk nyeri ulu hati dan mual muntah diminum sehari 3 kali 1 kapsul, sesudah makan
		Tanggal penulisan resep:	Ada	1 Februari 2025
		Nama dokter:	Ada	dr. Fitri dwi
		Surat ijin:	Tidak ada	-
		Alamat dr.:	Tidak ada	-
		B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi		
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     b comc yang dibutuhkan 5 tablet                      lansoprazole yang dibutuhkan 10 kapsul                      braxidin yang dibutuhkan ½ tablet                      Antasida yang dibutuhkan 1/3 tablet                      Ondansentron yang dibutuhkan 4mg/4mg x 10 = 10 tablet                      Paracetamol yang dibutuhkan 400mg/500mg x 10 = 8 tablet                      Dimenhidrinat yang dibutuhkan 25mg/50mg x 10 = 5 tablet                 </div>		

C. Perhitungan biaya resep

b comc: 5 tablet x 2.376 = 11.880  
lansoprazole: 10 kapsul x 1.760 = 17.600  
braxidin: ½ tablet x 1.800 = 900  
Antasida: 1/3 tablet x 1.738 = 600  
Ondansentron: 10 tablet x 3.629 = 36.290  
Paracetamol: 8 tablet x 3.087 = 24.696  
Dimenhidrinat: 5 tablet x 262 = 1.310  
Total 94.585 = 95.000

D. Etiket

Nama obat/warna etiket: b comc/putih



Rumah Sakit

Muhammadiyah Gresik

jujur – Transparan – kekeluargaan

Jl. KH. Kholil 88 Gresik 61115 P: +62 31 3981275

Nama/ID: Sri fatmawati TGL: 1/02/2025

ED

Nama obat: b comc

2 x SEHARI 1 **TABLET** / ~~ML/ SENDOK TAKAR /~~  
~~SEBELUM MAKAN / SAAT / SESUDAH MAKAN~~

Nama obat/warna etiket: lansoprazole/putih

	Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik jujur – Transparan – kekeluargaan Jl. KH. Kholil 88 Gresik 61115 P: +62 31 3981275
Nama/ID: Sri fatmawati	TGL: 1/02/2025
ED	
Nama obat: lansoprazole	
2x SEHARI 1 <b>KAPSUL</b> / <del>ML/ SENDOK TAKAR</del> / SEBELUM MAKAN / <del>SAAT</del> / SESUDAH MAKAN	

Nama obat/warna etiket: racikan kapsul/putih

	Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik jujur – Transparan – kekeluargaan Jl. KH. Kholil 88 Gresik 61115 P: +62 31 3981275
Nama/ID: Sri fatmawati	TGL: 1/02/2025
ED	
Nama obat: racikan kapsul	
3x SEHARI 1 <b>KAPSUL</b> / <del>ML/ SENDOK TAKAR</del> / SEBELUM MAKAN / <del>SAAT</del> / SESUDAH MAKAN	

Nama obat/warna etiket: racikan kapsul/putih

	<p>Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik jujur – Transparan – kekeluargaan Jl. KH. Kholil 88 Gresik 61115 P: +62 31 3981275</p>
	<p>Nama/ID: Sri fatmawati TGL: 1/02/2025 ED Nama obat: racikan kapsul</p>
<p>3x SEHARI 1 <del>KAPSUL/ ML/ SENDOK TAKAR/</del> <del>SEBELUM MAKAN / SAAT / SESUDAH MAKAN</del></p>	

E. Product knowledge

<p>Nama obat: b come Kandungan: vitamin B1 50 mg, vitamin B2 25 mg, vitamin B6 10 mg, vitamin B12 5 mcg, calcium pantotenate 18,4 mg, vitamin B3 100 mg, vitamin C 500 mg Dosis lazim: sehari 1 kali 1 tablet Kegunaan: Membantu memenuhi kebutuhan multivitamin untuk dewasa dan anak-anak dalam masa pertumbuhan serta selama masa penyembuhan.</p>	<p>Nama obat: lansoprazole Kandungan: lansoprazole 30mg Dosis lazim: tukak duodenum, refluks esofagitis 1 tablet per hari selama 4 minggu. Tukak lambung, esofagitis erosif 1 tablet/hari selama 8 minggu Kegunaan: tukak lambung, duodenum, tukak pasca operasi, esofagiti ESO: Hipomagnesemia, fraktur terkait osteoporosis, polip kelenjar fundus KI: Hipersentif terhadap lansoprazole, serta pasien yang</p>
---	---


		<p>ESO: urine berwarna kuning terang, mual, rasa tidak nyaman di perut, sakit kepala          KI: hipersensitivitas terhadap salah satu komposisi becom-c          PERHATIAN: bila penderita mengeluh karena gangguan lambung, lebih baik dimulai dengan ½ kaplet sehari sesudah makan          Cara penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung</p>	<p>sedang mengkonsumsi rilpivirine dan atazanavir          PERHATIAN: Gangguan hati sedang sampai berat, kehamilan dan menyusui          Cara penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung</p>	
		<p>Nama obat: Braxidin          Kandungan: Chlordiazepoxide 5mg, serta clidinium 2,5mg          Dosis lazim: Dewasa 3-4 tab per hari, lansia 1-2 tab per hari          Kegunaan: Meredakan nyeri perut akibat kram di lambung, usus, atau kandung kemih          ESO: Mengantuk, hipotensi atau penurunan tekanan darah, serta retensi urine          KI: Ibu hamil menyusui tanpa rekomendasi dokter, pengidap glaucoma dan hipertrofi prostat          PERHATIAN: Informasikan ke dokter jika kamu mengidap glaucoma, pembesaran kelenjar</p>	<p>Nama obat: Antasida          Kandungan: Aluminium hydroxide 200mg dan magnesium hydroxide 200mg          Dosis lazim: Dewasa 1-2x tab, 3-4x per hari, Anak 6-12 thn 0,5-1 tab, 3-4x per hari          Kegunaan: Untuk mengurangi nyeri lambung yang disebabkan oleh kelebihan asam lambung, gastritis, ulkus gastritis dengan gejala seperti mual dan perih          ESO: Nyeri perut, konstipasi, diare, mual pada penggunaan jangka Panjang dapat terjadi hiperfosfatemia dan hipermagnesimia          KI: Disfungsi ginjal berat,</p>	

		<p>prostat, obstruksi usus, dan gagal ginjal                  Cara penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.</p>	<p>hipersensitif, obstruksi saluran pencernaan                  PERHATIAN: Pasien yang sedang menjalani diet rendah fosfor, pasien hemodialisis, dan gangguan fungsi ginjal                  Cara penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.</p>	
		<p>Nama obat: Ondansetron                  Kandungan: Ondansetron hcl dihydrate 4mg                  Dosis lazim: Dewasa mulai usia 12 thn 8mg 1-2 jam sebelum anestesi, Anak usia 4-12 thn 4mg 30 menit sebelum kemotrapi                  Kegunaan: Menekan rasa mual dan muntah akibat kemotrapi dan radioterapi atau perawatan pascaoperasi                  ESO: Nyeri dada, hipotensi, aritmia, hipoksia                  KI: Hipersensitivitas, sendirom QT Panjang bawaan                  PERHATIAN: Harus dengan resep dokter, hati-hati penggunaan pada pasien dengan hipokalemia, hypomagnesemia                  Cara penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, serta</p>	<p>Nama obat: Paracetamol                  Kandungan: Acetaminophen                  Dosis lazim: Dewasa 1-2 kaplet, 3-4x per hari, anak 7-12 thn 0,5-1 kaplet, 3-4x per hari                  Kegunaan: Untuk meringankan rasa sakit pada gigi, kepala, dan menurunkan demam                  ESO: Dapat menyebabkan kerusakan fungsi hati, reaksi hipersensitivitas/alergi                  KI: Diberikan kepada penderita hipersensitif/alergi terhadap paracetamol, penderita gangguan fungsi hati                  PERHATIAN: Hati-hati penggunaan pada pasien gagal ginjal, gangguan fungsi hati, dan alergi                  Cara penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, serta</p>	

		<p>terhindar dari sinar matahari langsung.</p> <p>Nama obat: Dimenhydrinate                  Kandungan: Difenhidramin dan 8-kloroteofilin                  Dosis lazim: Dewasa 50-100mg, 4-6 jam sekali, Anak 25-50mg, 6-8 jam sekali                  Kegunaan: Untuk muntah, vertigo akibat mabuk perjalanan                  ESO: Kantuk, penglihatan buram, konstipasi, mulut, hidung, tenggorokan menjadi kering                  KI: Penggunaan pada neonatus dan riwayat hipersensitivitas dengan obat ini atau komponennya                  PERHATIAN: Konsultasikan jika anda menderita gangguan pernapasan, penyakit jantung, hipertensi                  Cara penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.</p>	<p>terhindar dari sinar matahari langsung.</p>	
--	--	--	--	--

		<p>F. Tahap pembuatan</p> <div data-bbox="1095 284 1989 711"><ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan skrinning resep</li><li>2. Mengecek ketersediaan obat</li><li>3. Menghitung harga obat</li><li>4. Meracik kapsul</li><li>5. Mengambil obat di rak, yaitu b come 5 tablet, lansoprazole 10 kapsul, braxidin ½ tablet, antasida 1/3 tablet, ondansetron 10 tablet, paracetamol 8 tablet, dimenhidrinat 5 tablet</li><li>6. Menulis etiket</li><li>7. Menempelkan etiket setiap obat dan dimasukkan ke dalam plastik</li></ol></div> <p>G. Informasi obat yang diberikan ( berupa paragraph dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <div data-bbox="1095 847 1989 1276"><p>TVF: pengambilan obat atas nama Ibu Sri fatmwati SF : ya, dengan saya sendiri mbak TVF: baik bu, saya bantu jelaskan obatnya berupa tablet b come vitamin 1x sehari sesudah makan, lansoprazole untuk lambung sebelum makan, racikan kapsul untuk demam dan mual muntah dan racikan kapsul untuk nyeri ulu hati dan mual muntah 3x sehari 1 kapsul sebelum makan nggeh bila tidak merasakan nyeri dan mual muntah tidak usah dimnum tidak apa-apa. baik bu apa ada yang ditanyakan terkait obatnya. SF: sudah mbak terimakasih TVF: baik bu ini obatnya semoga lekas sembuh</p></div>
--	--	---

25 Resep racikan dewasa



A. Skrinning administrasi

Nama pasien:	Ada	Nur fitriyanah
Umur pasien:	Tidak ada	-
Berat badan:	Ada	-
Nama obat:	Ada	Lapibal Prelin Sanmol Valisanbe Amitriptilin
Kekuatan:	Tidak ada	-
Bentuk sediaan:	Ada	Lapibal: Kapsul Prelin: Kapsul Sanmol: Tablet Valisanbe: Tablet Amitriptilin: Tablet
Jumlah obat:	Ada	Lapibal: 15 kapsul Prelin: 15 kapsul Sanmol: 500mg/500mg x 10 = 10 tablet Valisanbe 1mg/ 5mg x 10 = 2 tablet Amitriptilin 5mg/10mg x 10 = 5 tablet
Duplikasi terapi:	Tidak ada	-
Aturan pakai:	Ada	Lapibal: sehari 1 kali 1 tablet Prelin: sehari 1 kali 1 tablet untuk malam hari, racikan kapsul diminum sehari 1 kali 1 bungkus
Tanggal penulisan resep:	Ada	1 Februari 2025

		<table border="1"> <tr> <td>Nama dokter:</td> <td>Ada</td> <td>dr. Firman prayudi</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr.:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> </table>	Nama dokter:	Ada	dr. Firman prayudi	Surat ijin:	Tidak ada	-	Alamat dr.:	Tidak ada	-
		Nama dokter:	Ada	dr. Firman prayudi							
		Surat ijin:	Tidak ada	-							
		Alamat dr.:	Tidak ada	-							
<p>B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi</p>											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Lapibal yang dibutuhkan 15 kapsul                      Prelin yang dibutuhkan 15 kapsul                      Sanmol yang dibutuhkan 500mg/500mg x 10 = 10 tablet                      Valisanbe 1mg/ 5mg x 10 = 2 tablet                      Amitriptilin 5mg/10mg x 10 = 5 tablet</p> </div>											
<p>C. Perhitungan biaya resep</p>											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Lapibal: 15 kapsul x 4.253 = 63.795                      Prelin: 15 kapsul x 12.862 = 192.930                      Sanmol: 10 tablet x 2.552 = 25.520                      Valisanbe: 2 tablet x 5.900 = 11.800                      Amitriptilin: 5 tablet x 550 = 2.750                      Total= 296.795 = 300.000</p> </div>											

D. Etiket

Nama obat/warna etiket: Lapibal/putih

	Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik jujur – Transparan – kekeluargaan Jl. KH. Kholil 88 Gresik 61115 P: +62 31 3981275
Nama/ID: Nur fitriyanah	TGL: 1/02/2025
ED	
Nama obat: Lapibal	
1 x SEHARI 1 <b>KAPSUL</b> / <del>ML / SENDOK TAKAR /</del> <del>SEBELUM MAKAN / SAAT / SESUDAH MAKAN</del>	

Nama obat/warna etiket: Prelin/putih

	Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik jujur – Transparan – kekeluargaan Jl. KH. Kholil 88 Gresik 61115 P: +62 31 3981275
Nama/ID: Nur fitriyanah	TGL: 1/02/2025
ED	
Nama obat: Prelin	
MALAM x SEHARI 1 <b>KAPSUL</b> / <del>ML / SENDOK TAKAR /</del> <del>SEBELUM MAKAN / SAAT / SESUDAH MAKAN</del>	

	<p>Nama obat/warna etiket: racikan kapsul/putih</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">  <p style="text-align: center;">Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik jujur – Transparan – kekeluargaan Jl. KH. Kholil 88 Gresik 61115 P: +62 31 3981275</p> </div> <p>Nama/ID: Nur Fitriyanah                      TGL: 1/02/2025 ED Nama obat: racikan kapsul</p> <p style="text-align: center;"><del>1x SEHARI 1 KAPSUL / ML / SENDOK TAKAR /</del> <del>SEBELUM MAKAN / SAAT / SESUDAH MAKAN</del></p> <p>E. Product knowledge</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p>Nama obat: Lapibal Kandungan: Mengandung mecobalamin yang merupakan satu bentuk kimiawinya berupa co-enzyme dari B12. Dosis lazim: 3x sehari 1 kapsul Kegunaan: Obat ini digunakan untuk mengobati neuropati perifer (saraf tepi) dan anemia megaloblastik yang disebabkan oleh defisiensi vitamin B12 ESO: Mual, muntah, diare, sakit perut, Anoreksia, Sakit kepala. Jarang, reaksi hipersensitivitas mis. ruam, dispnea</p> </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p>Nama obat: Prelin Kandungan: Pregablin Dosis lazim: Dosis awalnya: 150 mg / hari, dosis dapat di tingkatkan menjadi 300 mg / hari setelah 3-7 hari. Maksimal: 600 mg / hari setelah interval 7 hari. Semua dosis diberikan dalam 2 atau 3 dosis terbagi Kegunaan: untuk mengobati nyeri neuropatik (nyeri berkepanjangan akibat saraf yang rusak), dan fibromyalgia (kondisi yang ditandai dengan nyeri di sekujur tubuh disertai kelelahan dan</p> </td> </tr> </table>	<p>Nama obat: Lapibal Kandungan: Mengandung mecobalamin yang merupakan satu bentuk kimiawinya berupa co-enzyme dari B12. Dosis lazim: 3x sehari 1 kapsul Kegunaan: Obat ini digunakan untuk mengobati neuropati perifer (saraf tepi) dan anemia megaloblastik yang disebabkan oleh defisiensi vitamin B12 ESO: Mual, muntah, diare, sakit perut, Anoreksia, Sakit kepala. Jarang, reaksi hipersensitivitas mis. ruam, dispnea</p>	<p>Nama obat: Prelin Kandungan: Pregablin Dosis lazim: Dosis awalnya: 150 mg / hari, dosis dapat di tingkatkan menjadi 300 mg / hari setelah 3-7 hari. Maksimal: 600 mg / hari setelah interval 7 hari. Semua dosis diberikan dalam 2 atau 3 dosis terbagi Kegunaan: untuk mengobati nyeri neuropatik (nyeri berkepanjangan akibat saraf yang rusak), dan fibromyalgia (kondisi yang ditandai dengan nyeri di sekujur tubuh disertai kelelahan dan</p>
<p>Nama obat: Lapibal Kandungan: Mengandung mecobalamin yang merupakan satu bentuk kimiawinya berupa co-enzyme dari B12. Dosis lazim: 3x sehari 1 kapsul Kegunaan: Obat ini digunakan untuk mengobati neuropati perifer (saraf tepi) dan anemia megaloblastik yang disebabkan oleh defisiensi vitamin B12 ESO: Mual, muntah, diare, sakit perut, Anoreksia, Sakit kepala. Jarang, reaksi hipersensitivitas mis. ruam, dispnea</p>	<p>Nama obat: Prelin Kandungan: Pregablin Dosis lazim: Dosis awalnya: 150 mg / hari, dosis dapat di tingkatkan menjadi 300 mg / hari setelah 3-7 hari. Maksimal: 600 mg / hari setelah interval 7 hari. Semua dosis diberikan dalam 2 atau 3 dosis terbagi Kegunaan: untuk mengobati nyeri neuropatik (nyeri berkepanjangan akibat saraf yang rusak), dan fibromyalgia (kondisi yang ditandai dengan nyeri di sekujur tubuh disertai kelelahan dan</p>		


		<p>KI: Hipersensitif                  PERHATIAN: Hati-hati penggunaan pada pasien ibu hamil dan menyusui. Monitor serum K and vitamin B12 levels, haematocrit and reticulocyte count                  Cara penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.</p>	<p>gangguan tidur, ingatan atau suasana hati)                  ESO: Tanda dan gejala reaksi alergi mis ruam, sesak napas, pembengkakan wajah, mata, atau mulut, Memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri                  KI: Pasien hipersensitif terhadap gabapentin                  PERHATIAN: Pasien dengan diabetes, gangguan fungsi pernapasan, penyakit pernapasan atau neurologis, CHF, riwayat penyalahgunaan obat, riwayat episode angioedema                  Cara penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.</p>
		<p>Nama obat: Sanmol                  Kandungan: Paracetamol 500mg                  Dosis lazim: Dewasa 1 tab 3-4x sehari, Anak 1/2-1 tab 3-4x sehari                  Kegunaan: Untuk meringankan rasa sakit kepala, sakit gigi, dan menurunkan demam                  ESO: Hematologi, reaksi kulit, kerusakan hati (penggunaan jangka panjang/overdosis)                  KI: Penderita gangguan fungsi hati yang berat</p>	<p>Nama obat: Valisanbe                  Kandungan: Meengandung diazepam yang akan bekerja dengan cara meningkatkan efek zat kimia tertentu di otak yang disebut neurotransmitter                  Dosis lazim: Dosis awal yang dianjurkan adalah 2-5 miligram per hari                  Kegunaan: Untuk menangani gejala gangguan kecemasan dan kondisi kesehatan mental lainnya.</p>

		<p>PERHATIAN: Hati-hati penggunaan obat ini pada penderita penyakit ginjal. Bila setelah 2 hari demam tidak menurun atau setelah 5 hari nyeri tidak menghilang, segera hubungi Unit Pelayanan Kesehatan</p> <p>Cara penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.</p>	<p>ESO: Mual dan mulut kering, sakit kepala, perubahan nafsu makan</p> <p>KI: Punya riwayat penyalahgunaan zat karena valisanbe berisiko menyebabkan ketergantungan. Individu dengan kondisi medis serius, seperti penyakit jantung atau gangguan liver.</p> <p>PERHATIAN: Kehamilan dan menyusui, monitoring rutin</p> <p>Cara penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.</p>
		<p>Nama obat: Amitriptilin</p> <p>Kandungan: Amitriptilin HCL</p> <p>Dosis Lazim: Dewasa ; dosis 25mg, 2x sehari selama 2 minggu-6 bulan. Dosis dapat ditingkatkan secara bertahap menjadi 50-150mg perhari dalam dosis terbagi. Lansia : 10-25mg perhari, dikonsumsi pada malam hari.</p> <p>Kegunaan: Untuk mengatasi gejala depresi, mengobati nyeri syaraf, migrain dan enuresis nocturnal kebiasaan (mengompol pada anak-anak)</p>	

		<p>ESO: Menyebabkan hipotensi ortostatik, pemanjangan interval qt, aritmia, pandangan kabur, mulut kering, retensi urine, dan glaucoma sudut tertutup</p> <p>KI: Pemberian amitriptylin pada pasien dengan hipersensifitas terhadap amitriptylin</p> <p>PERHATIAN: Amitriptylin tidak boleh dihentikan secara mendadak kepada pasien terutama pasien yang mendapatkan dosis tinggi karena dapat menyebabkan gejala putus obat</p> <p>Cara penyimpanan: Ditempat yang sejuk dan kering, serta terlindungi dar Cahaya matahari langsung, jauhkan dari jangkauan anak-anak serta hewan peliharaan</p>	
		F. Tahap pembuatan	

	<div data-bbox="1095 248 1989 639" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan skrinning resep</li><li>2. Mengecek ketersediaan obat</li><li>3. Menghitung harga obat</li><li>4. Meracik kapsul</li><li>5. Mengambil obat di rak, yaitu lapibal 15 kapsul, prelin 15 kapsul, sanmol 10 tablet, valisanbe 2 tablet, amitriptilin 5 tablet</li><li>6. Menulis etiket</li><li>7. Menempelkan etiket setiap obat dan dimasukkan ke dalam plastik</li></ol></div> <p data-bbox="1140 659 2045 727">G. Informasi obat yang diberikan ( berupa paragraph dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <div data-bbox="1095 775 1989 1054" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>TVF: pengambilan obat atas nama Ibu Nur Fitriyanah NF : ya, dengan saya sendiri mbak TVF: baik bu, saya bantu jelaskan obatnya berupa lapibal 1x sehari 1 kapsul, prelin malam hari 1 tablet, racikan kapsul 1x sehari 1 kapsul. baik ibu apa ada yang ditanyakan terkait obatnya. NF: sudah mbak terimakasih TVF: baik bu ini obatnya semoga lekas sembuh</p></div>
--	--

26 Salinan resep



A. Skrinning administrasi

Nama pasien:	Ada	Zahidiyah
Umur pasien:	Tidak ada	-
Berat badan:	Tidak ada	-
Nama obat:	Ada	Hy folic Lanturool
Kekuatan:	Ada	Hy folic Lanturool 400mg
Bentuk sediaan:	Ada	Hy folic: Tablet Lanturool: Kapsul
Jumlah obat:	Ada	Hy folic: 30 Tablet Lanturool: 30 Kapsul
Duplikasi terapi:	Tidak ada	-
Aturan pakai:	Ada	Hy folic: Sehari 1 kali 1 tablet Lanturool: Sehari 1 kali 1 kapsul
Tanggal penulisan resep:	Ada	7 Januari 2025
Nama dokter:	Ada	dr. Rino
Surat ijin:	Tidak ada	-
Alamat dr.:	Tidak ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi

Hy folic yang dibutuhkan 30 tablet Lanturool yang dibutuhkan 30 tablet
---

C. Perhitungan biaya resep

Hy folic 30 tablet x 3.712 = 111.360  
Lanturool 30 tablet x 4.466 = 133.980  
Total 245.340 = 246.000

D. Etiket

Nama obat/warna etiket: putih

APOTEK	
<b>eRDe FARMA</b>	
APOTEK ERDE FARMA	
Jl. Dr. Wahidin SM NO.120,Gresik Telp +62 52 9000 3996	
APA : Dwi Rezqi Ramadhanis, S.Farm, Apt	
SIPA : 19880421/SIPA_35.25/2022/2583	
No.	Tgl: 7/01/2025 ED
1 x SEHARI 1 <b>TABLET</b> / <del>ML</del> / <del>SENDOK TAKAR</del> / <del>SEBELUM MAKAN</del> / <del>SAAT</del> / SESUDAH MAKAN (Jauhkan Obat dari Jangkauan Anak-anak) (Hubungi Apoteker/Asisten Apoteker Bila Anda Mmembutuhkan Informasi Obat)	

Nama obat/warna etiket: putih

 <b>eRDe FARMA</b> APOTEK ERDE FARMA Jl. Dr. Wahidin SM NO.120,Gresik Telp +62 52 9000 3996 APA : Dwi Rezqi Ramadhani, S.Farm, Apt SIPA : 19880421/SIPA_35.25/2022/2583	
No.	Tgl: 7/01/2025 ED
1 x SEHARI 1 <del>KAPSUL / ML / SENDOK TAKAR /</del> <del>SEBELUM MAKAN / SAAT /</del> SESUDAH MAKAN (Jauhkan Obat dari Jangkauan Anak-anak) (Hubungi Apoteker/Asisten Apoteker Bila Anda Mmembutuhkan Informasi Obat)	


E. Product knowledge

Nama obat: Hy-folic Kandungan: (6S)-5-methyltetrahydrofolic acid, glucosamine salt (quaterfolic) 1100 mcg (setara dengan 550 mcg asam folat). Methyltetrahydrofolic acid, glucosamine salt Dosis lazim: 1x sehari 1 tablet salut selaput	Nama obat: Lanturool Kandungan: D-Alpha-Tocopherol 400IU Dosis lazim: 1x sehari 1 kapsul Kegunaan: Suplemen mengandung vitamin E, vitamin E untuk membantuk memenuhi kebutuhan vitamin E ESO: Penggunaan dalam jangka waktu lama dan dosis besar
--	--

		<p>Kegunaan: Vitamin dan supplement yang membantu memenuhi kebutuhan asam folat</p> <p>ESO: Mual, kehilangan nafsu makan, kembung, rasa pahit di mulut, gangguan tidur</p> <p>KI: Kontraindikasi asam folat adalah reaksi hipersensitivitas terhadap asam folat beserta formulasinya</p> <p>PERHATIAN: Asam folat tidak diindikasikan untuk anemia pernisiiosa, maupun sebagai monoterapi untuk anemia megaloblastik yang hanya disebabkan oleh defisiensi vitamin B12</p> <p>Cara penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>	<p>menyebabkan kelemahan pada otot dan gangguan pencernaan</p> <p>KI: Hipersensitif</p> <p>PERHATIAN: Kelebihan vitamin E dapat mengurangi penyimpanan vitamin A</p> <p>Cara penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>
--	--	---	--

		<p>F. Tahap pembuatan</p> <div data-bbox="1144 280 2040 635" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan skimming resep</li><li>2. Mengecek ketersediaan obat</li><li>3. Menghitung harga obat</li><li>4. Meracik kapsul</li><li>5. Mengambil obat di rak, yaitu Hy folic 30 tablet dan Lanturool 30 kapsul</li><li>6. Menulis etiket</li><li>7. Menempelkan etiket setiap obat dan dimasukkan ke dalam plastik</li></ol></div> <p>G. Informasi obat yang diberikan (berupa paragraph dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <div data-bbox="1144 815 2040 1158" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>TVF: pengambilan obat atas nama ibu zahidiyah Z: ya, dengan saya anaknya mbak TVF: baik mbak, saya bantu jelaskan obatnya ibu zahidiyah berupa vitamin asam folat diminum 1x sehari 1 tablet, untuk vitamin e nya diminum 1x sehari 1 kapsul . baik mbak apa ada yang ditanyakan terkait obatnya. Z: sudah mbak terimakasih TVF: baik mbak ini obatnya semoga lekas sembuh</p></div>
--	--	--

27 Salinan resep



A. Skrinning administrasi

Nama pasien:	Ada	Aniyz
Umur pasien:	Tidak ada	-
Berat badan:	Tidak ada	-
Nama obat:	Ada	Kloderma Afucid Ketomed
Kekuatan:	Ada	Kloderma: 0,5% Afucid: 2% Ketomed: 2%
Bentuk sediaan:	Ada	Kloderma cream Afucid cream Ketomed cream
Jumlah obat:	Ada	Kloderma 15gr Afucid 5gr Ketomed 5gr
Duplikasi terapi:	Tidak ada	-
Aturan pakai:	Ada	Racikan Kloderma + Afucid + Ketomed cream: dioles tipis 3x sehari
Tanggal penulisan resep:	Ada	04 November 2024
Nama dokter:	Ada	dr. Dhani
Surat ijin:	Tidak ada	-
Alamat dr.:	Tidak ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi

Kloderma yang dibutuhkan 15gr  
Afucid yang dibutuhkan 5gr  
Ketomed yang dibutuhkan 5gr

C. Perhitungan biaya resep

Kloderma 15gr x 32.854 = 32.854  
 Afucid 5gr x 60.469 = 60.469  
 Ketomed 15gr x 14.000 = 14.000  
 Total 107.323 = 108.000

D. Etiket

Nama obat/warna etiket: biru




E. Product knowledge

Nama obat: Kloderma Kandungan: Clobetasol Propional 0.05%	Nama obat: Afucid Kandungan: Zat aktif fusidic acid 2%
---	--

		<p>Dosis lazim: Oleskan 1-2x sehari, tidak lebih dari 50gr dioleskan per minggu, hingga paling lama 4 minggu</p> <p>Kegunaan: Untuk kelainan kulit inflamasi hebat seperti eksim bandel yang tidak responsif terhadap kortikosteroid yang kurang kuat</p> <p>ESO: Penyebaran dan peburukan infeksi yang tidak diobati, penipisan kulit</p> <p>KI: Pengobatan jangka pendek hanya untuk kelainan kulit inflamasi hebat seperti eksim bandel yang tidak responsif terhadap kortikosteroid yang kurang kuat</p> <p>PERHATIAN: Hindari penggunaan jangka panjang kortikosteroid topikal pada wajah karena dapat meninggalkan bekas yang tidak hilang ( dan hindarkan dari mata )</p> <p>Cara penyimpanan: Simpan pada suhu di bawah 30°Celsius, di tempat kering dan sejuk serta jauh dari jangkauan anak-anak</p>	<p>Dosis lazim: 3-4x sehari (penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter)</p> <p>Kegunaan: Untuk infeksi kulit karena staphylococcus</p> <p>ESO: Akan terjadi ruam</p> <p>KI: Impetigo contagiosum, folikulitis superfisial, furunkulosis, sikosis barbae</p> <p>PERHATIAN: Dapat menyebabkan iritasi, reaksi alergi, resistensi dapat terjadi pada penggunaan jangka lama, hamil dan laktasi</p> <p>Cara penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>
		<p>Nama obat: Ketomed</p> <p>Kandungan: Ketoconazole 2%</p> <p>Dosis lazim: Dewasa oleskan 1-2x sehari pada tempat yang terinfeksi</p>	

		<p>Kegunaan: Untuk antijamur, infeksi dermatofita pada kulit atau kuku tangan ESO: Efek signifikansi penekan adrenal, perpanjangan QT, kerapuhan tulang, LFT abnormal KI: Hipersensitivitas, gangguan hati akut atau kronis, hamil (dengan sindrom cushing) PERHATIAN: Hati-hati penggunaan pada pasien dengan aklorhidria, kanker prostat Cara penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>	<p>F. Tahap pembuatan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan skринing resep</li><li>2. Mengecek ketersediaan obat</li><li>3. Menghitung harga obat</li><li>4. Meracik kapsul</li><li>5. Mengambil obat di rak, yaitu Kloderma cream 15gr, afucid cream 5gr, ketomed cream 5gr</li><li>6. Menulis etiket</li><li>7. Menempelkan etiket setiap obat dan dimasukkan ke dalam plastik</li></ol> <p>G. Informasi obat yang diberikan (berupa paragraph dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p>
--	--	--	---

		<p>TVF: pengambilan obat atas nama mbak aniyz                  A : ya, dengan saya sendiri mbak                  TVF: baik mbak, saya bantu jelaskan obatnya berupa racikan cream untuk penggunaannya dioleskan tipis di bagian yang terinfeksi 3x sehari, baik mbak apa ada yang ditanyakan terkait obatnya.                  A: sudah mbak terimakasih                  TVF: baik mbak ini obatnya semoga lekas sembuh</p>																																								
28	Salinan resep	<p>A. Skrinning administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1189 635 1968 1217"> <tr> <td>Nama pasien:</td> <td>Ada</td> <td>Ahmad yudi</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat badan:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama obat:</td> <td>Ada</td> <td>Power oksii</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sediaan:</td> <td>Ada</td> <td>Power oksii tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat:</td> <td>Ada</td> <td>Power oksii: 15 Tblet</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai:</td> <td>Ada</td> <td>Power oksii: sehari 1x 1 tablet</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep:</td> <td>Ada</td> <td>15 Oktober 2024</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter:</td> <td>Ada</td> <td>dr. Dhani</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr.:</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi</p> <table border="1" data-bbox="1178 1278 1968 1342"> <tr> <td>Power oksii yang dibutuhkan 15 tablet</td> </tr> </table>	Nama pasien:	Ada	Ahmad yudi	Umur pasien:	Tidak ada	-	Berat badan:	Tidak ada	-	Nama obat:	Ada	Power oksii	Kekuatan:	Tidak ada	-	Bentuk sediaan:	Ada	Power oksii tablet	Jumlah obat:	Ada	Power oksii: 15 Tblet	Duplikasi terapi:	Tidak ada	-	Aturan pakai:	Ada	Power oksii: sehari 1x 1 tablet	Tanggal penulisan resep:	Ada	15 Oktober 2024	Nama dokter:	Ada	dr. Dhani	Surat ijin:	Tidak ada	-	Alamat dr.:	Tidak ada	-	Power oksii yang dibutuhkan 15 tablet
Nama pasien:	Ada	Ahmad yudi																																								
Umur pasien:	Tidak ada	-																																								
Berat badan:	Tidak ada	-																																								
Nama obat:	Ada	Power oksii																																								
Kekuatan:	Tidak ada	-																																								
Bentuk sediaan:	Ada	Power oksii tablet																																								
Jumlah obat:	Ada	Power oksii: 15 Tblet																																								
Duplikasi terapi:	Tidak ada	-																																								
Aturan pakai:	Ada	Power oksii: sehari 1x 1 tablet																																								
Tanggal penulisan resep:	Ada	15 Oktober 2024																																								
Nama dokter:	Ada	dr. Dhani																																								
Surat ijin:	Tidak ada	-																																								
Alamat dr.:	Tidak ada	-																																								
Power oksii yang dibutuhkan 15 tablet																																										



C. Perhitungan biaya resep

Power oksidasi 15 tablet x 16.829 = 252.435

D. Etiket

Nama obat/warna etiket: putih

APOTEK  
**eRDe FARMA**  
APOTEK ERDE FARMA  
Jl. Dr. Wahidin SM NO.120,Gresik Telp +62 52 9000 3996  
APA : Dwi Rezqi Ramadhani, S.Farm, Apt  
SIPA : 19880421/SIPA\_35.25/2022/2583


No. \_\_\_\_\_ Tgl: 7/01/2025  
ED

1 x SEHARI 1 **TABLET** / ~~ML/SENDOK TAKAR/~~  
~~SEBELUM MAKAN / SAAT / SESUDAH MAKAN~~  
(Jauhkan Obat dari Jangkauan Anak-anak)  
(Hubungi Apoteker/Asisten Apoteker Bila Anda  
Mmemerlukan Informasi Obat)

		<p>E. Product knowledge</p> <p>Nama obat: Poweroksi Kandungan: TetraSOD 25 mg. Dosis lazim: Sehari 1 kali, 1 tablet Kegunaan: suplemen kesehatan yang digunakan untuk meningkatkan stamina, atau meningkatkan daya tahan tubuh secara keseluruhan</p> <p>ESO: KI:</p> <p>PERHATIAN: Konsultasikan kepada dokter terlebih dahulu apabila terdapat riwayat alergi terhadap kandungan dari produk ini</p> <p>Cara penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>
--	--	---

	<p>F. Tahap pembuatan</p> <div data-bbox="1144 280 2040 596" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan skrinning resep</li><li>2. Mengecek ketersediaan obat</li><li>3. Menghitung harga obat</li><li>4. Meracik kapsul</li><li>5. Mengambil obat di rak, yaitu power oksii 15 tablet</li><li>6. Menulis etiket</li><li>7. Menempelkan etiket setiap obat dan dimasukkan ke dalam plastik</li></ol></div> <p>G. Informasi obat yang diberikan (berupa paragraph dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <div data-bbox="1144 707 2040 986" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>TVF: pengambilan obat atas nama bapak Ahmad yudi Y : ya, dengan saya sendiri TVF: baik bapak, saya bantu jelaskan obatnya vitamin diminum sehari 1x 1 tablet, baik bapak apa ada yang ditanyakan terkait obatnya. Y: sudah mbak terimakasih TVF: baik bapak ini obatnya semoga lekas sembuh</p></div>
--	--

29 Resep yang ada pengulangan/ iter



A. Skrinning administrasi

Nama pasien:	Ada	Tulus widia dayanti
Umur pasien:	Tidak ada	40 thn
Berat badan:	Tidak ada	55 kg
Nama obat:	Ada	Cetirizine Desoksimesonone Acarbose
Kekuatan:	Ada	Cetirizine: 10mg Desoksimesonone: 15gr Acarbose: 50mg
Bentuk sediaan:	Ada	Cetirizine Tab Desoksimesonone Krim Acarbose Tab
Jumlah obat:	Ada	Cetirizine 10 tab Desoksimesonone Krim Acarbose Tab 30 tab
Duplikasi terapi:	Tidak ada	-
Aturan pakai:	Ada	Cetirizine sehari 1 kali 1 tablet Desoksimesonone dioleskan tipis dibagian yang terinfeksi sehari 3x Acarbose sehari 1 kali tablet
Tanggal penulisan resep:	Ada	11 Maret 2025
Nama dokter:	Ada	dr. Chyntiadewi Maharani Putri, Sp.PD

Surat ijin:	Tidak ada	-
Alamat dr.:	Tidak ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi

Cetirizine yang di butuhkan 10 tablet  
 Desoksimesasone yang di butuhkan 1 krim  
 Acarbose yang di butuhkan 30 tablet

C. Perhitungan biaya resep

Cetirizine Tab 10 x 616 = 6.160  
 Desoksimesasone Krim 1 x 21.152 = 21.152  
 Acarbose Tab 30 x 3.041 = 91.230  
 Total 118.542 = 120.000

D. Etiket

Nama obat/warna etiket: putih

RS. Islam Darus Syifa Surabaya  
 Jl. Raya Benowo No.05, Benowo, Kec. Pakal, Kota Surabaya  
 Telp. (031) 7406293, Fax. (031) 7422842

---

Nama/ID: Tulus Widia D TGL: 11/03/2025  
 ED  
 Nama obat: cetirizine 10mg

1x SEHARI 1 ~~TABLET/ ML/ SENDOK TAKAR / SEBELUM~~  
~~MAKAN / SAAT / SESUDAH MAKAN~~

Nama obat/warna etiket: putih

RS. Islam Darus Syifa Surabaya Jl. Raya Benowo No.05, Benowo, Kec. Pakal, Kota Surabaya Telp. (031) 7406293, Fax. (031) 7422842	
Nama/ID: Tulus Widia D	TGL: 11/03/2025
ED	
Nama obat: acarbose 50mg	
1x SEHARI 1 <del>TABLET/ ML/ SENDOK TAKAR / SEBELUM</del> <del>MAKAN / SAAT / SESUDAH MAKAN</del>	

Nama obat/warna etiket: biru


RS. Islam Darus Syifa Surabaya Jl. Raya Benowo No.05, Benowo, Kec. Pakal, Kota Surabaya Telp. (031) 7406293, Fax. (031) 7422842	
Nama/ID: Tulus Widia D	TGL: 11/03/2025
ED	
Nama obat: desoksimesone cr 15gr	
3x SEHARI 1 <del>TABLET/ ML/ SENDOK TAKAR / SEBELUM</del> <del>MAKAN / SAAT / SESUDAH MAKAN</del>	

		<p>E. Product knowledge</p> <table border="1" data-bbox="1126 312 2042 1350"> <tr> <td data-bbox="1126 312 1592 1350"> <p>Nama obat: Cetirizine 10 mg                      Kandungan: Cetirizine HCL 10mg                      Dosis lazim: Dewasa dan anak umur &gt;12 thn: sehari sekali 10mg, Anak umur 2-6 thn: sehari dua kali 2,5mg , Anak umur 6-12 thn: sehari dua kali 5mg                      Kegunaan: Untuk mencegah pruritus (gatal), kondisi akibat alergi seperti rhinitis menahun, rhinitis alergi seasonal                      ESO: Gangguan jantung takikardia, gangguan gastrointestinal: sakit perut, mulut kering, mual, diare                      KI: Hipersensitif, gangguan ginjal berat                      PERHATIAN: Antihistamin yang menyebabkan kantuk mempunyai aktivitas antimuskarinik yang nyata dan harus digunakan secara hati-hati pada pasien dengan peningkatan risiko retensi urin (lesi sumsum tulang belakang, hiperplasia prostat)                      Cara penyimpanan: Simpan di tempat kering dan sejuk serta jauh dari jangkauan anak-anak</p> </td> <td data-bbox="1592 312 2042 1350"> <p>Nama obat: Desoksümetasone 15gr                      Kandungan: Desoksümetasone 2,5%                      Dosis lazim: 1-2 kali sehari dioleskan ke area yang bermasalah                      Kegunaan: Untuk dermatitis, psoriasis yang peka terhadap kortikosteroid                      ESO: Pada pengobatan jangka Panjang dapat timbul gejala hipopigmentasi, terjadi iritasi kulit seperti gatal dan rasa panas                      KI: Infeksi kulit yang terbuka, tuberculosis kulit, herpes simpleks                      PERHATIAN: Hanya untuk penggunaan uar, hindari penggunaan jangka Panjang,                      Cara penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1126 1350 1592 1385"> <p>Nama obat: Acarbose 50 mg</p> </td> <td data-bbox="1592 1350 2042 1385"></td> </tr> </table>	<p>Nama obat: Cetirizine 10 mg                      Kandungan: Cetirizine HCL 10mg                      Dosis lazim: Dewasa dan anak umur &gt;12 thn: sehari sekali 10mg, Anak umur 2-6 thn: sehari dua kali 2,5mg , Anak umur 6-12 thn: sehari dua kali 5mg                      Kegunaan: Untuk mencegah pruritus (gatal), kondisi akibat alergi seperti rhinitis menahun, rhinitis alergi seasonal                      ESO: Gangguan jantung takikardia, gangguan gastrointestinal: sakit perut, mulut kering, mual, diare                      KI: Hipersensitif, gangguan ginjal berat                      PERHATIAN: Antihistamin yang menyebabkan kantuk mempunyai aktivitas antimuskarinik yang nyata dan harus digunakan secara hati-hati pada pasien dengan peningkatan risiko retensi urin (lesi sumsum tulang belakang, hiperplasia prostat)                      Cara penyimpanan: Simpan di tempat kering dan sejuk serta jauh dari jangkauan anak-anak</p>	<p>Nama obat: Desoksümetasone 15gr                      Kandungan: Desoksümetasone 2,5%                      Dosis lazim: 1-2 kali sehari dioleskan ke area yang bermasalah                      Kegunaan: Untuk dermatitis, psoriasis yang peka terhadap kortikosteroid                      ESO: Pada pengobatan jangka Panjang dapat timbul gejala hipopigmentasi, terjadi iritasi kulit seperti gatal dan rasa panas                      KI: Infeksi kulit yang terbuka, tuberculosis kulit, herpes simpleks                      PERHATIAN: Hanya untuk penggunaan uar, hindari penggunaan jangka Panjang,                      Cara penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>	<p>Nama obat: Acarbose 50 mg</p>	
<p>Nama obat: Cetirizine 10 mg                      Kandungan: Cetirizine HCL 10mg                      Dosis lazim: Dewasa dan anak umur &gt;12 thn: sehari sekali 10mg, Anak umur 2-6 thn: sehari dua kali 2,5mg , Anak umur 6-12 thn: sehari dua kali 5mg                      Kegunaan: Untuk mencegah pruritus (gatal), kondisi akibat alergi seperti rhinitis menahun, rhinitis alergi seasonal                      ESO: Gangguan jantung takikardia, gangguan gastrointestinal: sakit perut, mulut kering, mual, diare                      KI: Hipersensitif, gangguan ginjal berat                      PERHATIAN: Antihistamin yang menyebabkan kantuk mempunyai aktivitas antimuskarinik yang nyata dan harus digunakan secara hati-hati pada pasien dengan peningkatan risiko retensi urin (lesi sumsum tulang belakang, hiperplasia prostat)                      Cara penyimpanan: Simpan di tempat kering dan sejuk serta jauh dari jangkauan anak-anak</p>	<p>Nama obat: Desoksümetasone 15gr                      Kandungan: Desoksümetasone 2,5%                      Dosis lazim: 1-2 kali sehari dioleskan ke area yang bermasalah                      Kegunaan: Untuk dermatitis, psoriasis yang peka terhadap kortikosteroid                      ESO: Pada pengobatan jangka Panjang dapat timbul gejala hipopigmentasi, terjadi iritasi kulit seperti gatal dan rasa panas                      KI: Infeksi kulit yang terbuka, tuberculosis kulit, herpes simpleks                      PERHATIAN: Hanya untuk penggunaan uar, hindari penggunaan jangka Panjang,                      Cara penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>					
<p>Nama obat: Acarbose 50 mg</p>						

		<p>Kandungan: Acarbose 50 mg Dosis lazim: Dosis awal 25mg-50mg, sehari 1 kali, kemudian ditingkatkan menjadi sehari 3 kali Kegunaan: Untuk pasien diabetes melitus tipe 2 jika kadar gula darah tidak cukup dikendali dengan diet, latihan fisik, dan penurunan berat badan saja ESO: Flatulensi ( buang gas ), diare, nyeri abdominal, nausea KI: Pasien dengan gangguan intestinal kronis yang berhubungan dengan penyerapan dan gangguan pencernaan saja PERHATIAN: Diperlukan pemeriksaan ladar enzim hati selama 6-12 bulan pertama pengobatan Cara penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>	
--	--	---	--

		<p>F. Tahap pembuatan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan skrinning resep</li><li>2. Mengecek ketersediaan obat</li><li>3. Menghitung harga obat</li><li>4. Meracik kapsul</li><li>5. Mengambil obat di rak, yaitu cetirizine 10mg, desoksümetasone krim 15gr, acarbose 50mg</li><li>6. Menulis etiket</li><li>7. Menempelkan etiket setiap obat dan dimasukkan ke dalam plastik</li></ol> <p>G. Informasi obat yang diberikan (berupa paragraph dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>TVF: pengambilan obat atas nama Ibu Tulus T : ya, dengan saya sendiri mbak TVF: baik mbak, saya bantu jelaskan obatnya berupa tablet cetirizine untuk gatal, acarbose untuk diabet, dan berupa krim dioleskan dibagian kulit yang bermasalah nggeh, baik bu apa ada yang ditanyakan terkait obatnya. T: sudah mbak terimakasih TVF: baik bu ini obatnya semoga lekas sembuh</p>
--	--	--

30 Resep yang ada pengulangan/ iter



A. Skrinning administrasi

Nama pasien:	Ada	Sutik wulandari
Umur pasien:	Tidak ada	45 thn
Berat badan:	Tidak ada	58 kg
Nama obat:	Ada	Bisoprolol Glucosamin Vit B complex Nitrokaf retard Simvastatin
Kekuatan:	Ada	Bisoprolol: 5mg Glucosamin: 500mg Vit B complex Nitrokaf retard: 25mg Simvastatin: 20mg
Bentuk sediaan:	Ada	Bisoprolol tablet Glucosamin tablet Vit B complex tablet Nitrokaf retard kapsul Simvastatin tablet
Jumlah obat:	Ada	Bisoprolol Glucosamin 5 tablet Vit B complex 30 tablet Nitrokaf retard 60 kapsul Simvastatin 30 tablet
Duplikasi terapi:	Tidak ada	-
Aturan pakai:	Ada	Bisoprolol sehari 1 kali 1 tablet, sesudah makan

					<p>Glucosamin sehari 1 kali 1 tablet, sesudah makan</p> <p>Vit B complex sehari 1 kali 1 tablet, sesudah makan</p> <p>Nitrokaf retard sehari 2 kali 1 kapsul, sesudah makan</p> <p>Simvastatin sehari 1 kali 1 tablet, sesudah makan</p>	
				Tanggal penulisan resep:	Ada	10 Februari 2025
				Nama dokter:	Ada	Dr. Nisa Kurnia Ramad
				Surat ijin:	Tidak ada	-
				Alamat dr.:	Tidak ada	-
				<p>B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Bisoprolol</p> <p>Glucosamin yang di butuhkan 5 tablet</p> <p>Vit B complex yang di butuhkan 30 tablet</p> <p>Nitrokaf retard yang di butuhkan 60 kapsul</p> <p>Simvastatin yang di butuhkan 30 tablet</p> </div>		

C. Perhitungan biaya resep

Bisoprolol

Glucosamin 5 tablet x 1.500 = 7.500

Vit B complex 30 tablet x 295 = 8.850

Nitrokaf retard 60 kapsul x 3.544 = 212.640

Simvastatin 30 tablet x 846 = 25.380

Total = 254.370 = 255.000

D. Etiket

Nama obat/warna etiket: putih

RS. Islam Darus Syifa Surabaya

Jl. Raya Benowo No.05, Benowo, Kec. Pakal, Kota Surabaya

Telp. (031) 7406293, Fax. (031) 7422842

Nama/ID: Sutik Wulandari

TGL: 10/02/2025

ED

Nama obat: bisoprolol 5mg

1x SEHARI 1 ~~TABLET / ML / SENDOK TAKAR / SEBELUM~~

~~MAKAN / SAAT / SESUDAH MAKAN~~

Nama obat/warna etiket: putih

RS. Islam Darus Syifa Surabaya Jl. Raya Benowo No.05, Benowo, Kec. Pakal, Kota Surabaya Telp. (031) 7406293, Fax. (031) 7422842	
Nama/ID: Sutik Wulandar	TGL: 10/02/2025
ED	
Nama obat: glucosamine 500mg	
1x SEHARI 1 <del>TABLET/ ML/ SENDOK TAKAR/ SEBELUM</del> <del>MAKAN/ SAAT / SESUDAH MAKAN</del>	

Nama obat/warna etiket: putih

RS. Islam Darus Syifa Surabaya Jl. Raya Benowo No.05, Benowo, Kec. Pakal, Kota Surabaya Telp. (031) 7406293, Fax. (031) 7422842	
Nama/ID: Sutik Wulandari	TGL: 10/02/2025
ED	
Nama obat: vit b complex	
1x SEHARI 1 <del>TABLET/ ML/ SENDOK TAKAR/ SEBELUM</del> <del>MAKAN/ SAAT / SESUDAH MAKAN</del>	

Nama obat/warna etiket: putih

RS. Islam Darus Syifa Surabaya Jl. Raya Benowo No.05, Benowo, Kec. Pakal, Kota Surabaya Telp. (031) 7406293, Fax. (031) 7422842	
Nama/ID: Sutik Wulandari	TGL: 10/02/2025 ED
Nama obat: nitrokaf retard 25mg	
1x SEHARI 1 <del>KAPSUL/ ML/ SENDOK TAKAR / SEBELUM</del> <del>MAKAN / SAAT / SESUDAH MAKAN</del>	

Nama obat/warna etiket: putih

RS. Islam Darus Syifa Surabaya Jl. Raya Benowo No.05, Benowo, Kec. Pakal, Kota Surabaya Telp. (031) 7406293, Fax. (031) 7422842	
Nama/ID: Sutik Wulandari	TGL: 10/02/2025 ED
Nama obat: simvastatin 20mg	
1X SEHARI (MALAM) 1 <del>TABLET/ ML/ SENDOK TAKAR /</del> <del>SEBELUM MAKAN / SAAT / SESUDAH MAKAN</del>	


		<p>E. Product knowledge</p> <table border="1" data-bbox="1120 311 2038 1380"> <tr> <td data-bbox="1120 311 1579 1380"> <p>Nama obat: Bisoprolol 5mg                      Kandungan: Bisoprolol fumarate 5mg                      Dosis lazim: Hipertensi dan angina: 5mg-10mg per hari, gagal jantung kronik stabil: 1,25 per hari pada minggu pertama (diminum sesudah makan)                      Kegunaan: Untuk hipertensi dan angina pektoris, gagal jantung kronik sedang sampai berat                      ESO: Kram abdomen, diare, pusing, sakit kepala, mual, denyut jantung lambat, tekanan darah rendah, keadaan mati rasa, kesemutan                      KI: Bisoprolol jangan diberikan pada pasien yang memiliki asma berat, blok atrioventrikular (AV) derajat 2 dan 3, sindrom sinus sakit (tanpa pacu jantung permanen), dan sinus bradikardia (nadi &lt;50 kali/menit)                      PERHATIAN: Pasien dilarang menghentikan pengobatan tanpa berkonsultasi dengan dokter karena penghentian mendadak dapat menyebabkan gejala menjadi lebih buruk, seperti nyeri</p> </td> <td data-bbox="1579 311 2038 1380"> <p>Nama obat: Glucosamine 500mg                      Kandungan: Glucosamine 500mg                      Dosis lazim: Dosis glucosamine yang umum adalah 1.500-3.000 mg per hari, yang bisa dikonsumsi sekaligus atau dalam beberapa dosis kecil, Dalam sebagian besar studi mengenai pengobatan osteoarthritis, dosis yang umum digunakan adalah 500mg glucosamine sulfat, tiga kali sehari.                      Kegunaan: Osteoarthritis, Rheumatoid arthritis                      ESO: Mual, heartburn (nyeri atau rasa terbakar di dada), diare, konstipasi (sembelit), mengantuk, Reaksi kulit, sakit kepala                      KI: Konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi suplemen ini jika Anda memiliki diabetes, penyakit ginjal, penyakit jantung, gangguan pembekuan darah, atau tekanan darah tinggi.                      PERHATIAN: Pengidap asma sebaiknya berhati-hati dalam mengonsumsi suplemen glucosamine karena glucosamine dapat memperburuk asma,</p> </td> </tr> </table>	<p>Nama obat: Bisoprolol 5mg                      Kandungan: Bisoprolol fumarate 5mg                      Dosis lazim: Hipertensi dan angina: 5mg-10mg per hari, gagal jantung kronik stabil: 1,25 per hari pada minggu pertama (diminum sesudah makan)                      Kegunaan: Untuk hipertensi dan angina pektoris, gagal jantung kronik sedang sampai berat                      ESO: Kram abdomen, diare, pusing, sakit kepala, mual, denyut jantung lambat, tekanan darah rendah, keadaan mati rasa, kesemutan                      KI: Bisoprolol jangan diberikan pada pasien yang memiliki asma berat, blok atrioventrikular (AV) derajat 2 dan 3, sindrom sinus sakit (tanpa pacu jantung permanen), dan sinus bradikardia (nadi &lt;50 kali/menit)                      PERHATIAN: Pasien dilarang menghentikan pengobatan tanpa berkonsultasi dengan dokter karena penghentian mendadak dapat menyebabkan gejala menjadi lebih buruk, seperti nyeri</p>	<p>Nama obat: Glucosamine 500mg                      Kandungan: Glucosamine 500mg                      Dosis lazim: Dosis glucosamine yang umum adalah 1.500-3.000 mg per hari, yang bisa dikonsumsi sekaligus atau dalam beberapa dosis kecil, Dalam sebagian besar studi mengenai pengobatan osteoarthritis, dosis yang umum digunakan adalah 500mg glucosamine sulfat, tiga kali sehari.                      Kegunaan: Osteoarthritis, Rheumatoid arthritis                      ESO: Mual, heartburn (nyeri atau rasa terbakar di dada), diare, konstipasi (sembelit), mengantuk, Reaksi kulit, sakit kepala                      KI: Konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi suplemen ini jika Anda memiliki diabetes, penyakit ginjal, penyakit jantung, gangguan pembekuan darah, atau tekanan darah tinggi.                      PERHATIAN: Pengidap asma sebaiknya berhati-hati dalam mengonsumsi suplemen glucosamine karena glucosamine dapat memperburuk asma,</p>
<p>Nama obat: Bisoprolol 5mg                      Kandungan: Bisoprolol fumarate 5mg                      Dosis lazim: Hipertensi dan angina: 5mg-10mg per hari, gagal jantung kronik stabil: 1,25 per hari pada minggu pertama (diminum sesudah makan)                      Kegunaan: Untuk hipertensi dan angina pektoris, gagal jantung kronik sedang sampai berat                      ESO: Kram abdomen, diare, pusing, sakit kepala, mual, denyut jantung lambat, tekanan darah rendah, keadaan mati rasa, kesemutan                      KI: Bisoprolol jangan diberikan pada pasien yang memiliki asma berat, blok atrioventrikular (AV) derajat 2 dan 3, sindrom sinus sakit (tanpa pacu jantung permanen), dan sinus bradikardia (nadi &lt;50 kali/menit)                      PERHATIAN: Pasien dilarang menghentikan pengobatan tanpa berkonsultasi dengan dokter karena penghentian mendadak dapat menyebabkan gejala menjadi lebih buruk, seperti nyeri</p>	<p>Nama obat: Glucosamine 500mg                      Kandungan: Glucosamine 500mg                      Dosis lazim: Dosis glucosamine yang umum adalah 1.500-3.000 mg per hari, yang bisa dikonsumsi sekaligus atau dalam beberapa dosis kecil, Dalam sebagian besar studi mengenai pengobatan osteoarthritis, dosis yang umum digunakan adalah 500mg glucosamine sulfat, tiga kali sehari.                      Kegunaan: Osteoarthritis, Rheumatoid arthritis                      ESO: Mual, heartburn (nyeri atau rasa terbakar di dada), diare, konstipasi (sembelit), mengantuk, Reaksi kulit, sakit kepala                      KI: Konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi suplemen ini jika Anda memiliki diabetes, penyakit ginjal, penyakit jantung, gangguan pembekuan darah, atau tekanan darah tinggi.                      PERHATIAN: Pengidap asma sebaiknya berhati-hati dalam mengonsumsi suplemen glucosamine karena glucosamine dapat memperburuk asma,</p>			

		<p>dada, serangan jantung, dan detak jantung tidak teratur                  Cara penyimpanan: Simpan di tempat kering dan sejuk serta jauh dari jangkauan anak-anak</p>	<p>Glucosamine dapat mempengaruhi kadar glukosa dalam tubuh, sehingga mungkin tidak cocok untuk penderita diabetes atau intoleransi glukosa.                  Cara penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>
		<p>Nama obat: Vitamin B complex                  Kandungan: Thiamin (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), niasin (vitamin B3), asam pantotenik (vitamin B5), piridoksin (vitamin B6), biotin (vitamin B7), asam folat (vitamin B9), cyanocobalamin (vitamin B12)                  Dosis lazim: 1 tablet atau kapsul per hari, sesuai anjuran dokter                  Kegunaan: Suplemen penguat hormon testosteron, meningkatkan kesehatan otak, bermanfaat bagi ibu hamil, membantuk pembentukan sel darah merah, meningkatkan kesehatan saraf, mencegah anemia                  ESO: Diare ringan, nyeri perut ringan, nausea, pruritus, urtikaria, ruam, serta nyeri pada lokasi injeksi</p>	<p>Nama obat: Nitrokaf retard                  Kandungan: Glyceryl trinitrate (Nitroglycerin)                  Dosis lazim: Sehari 2-3 kali, 1 kapsul, kasus berat: sehari 2-3 kali, 2 kapsul                  Kegunaan: Mengurangi dan mencegah angina (nyeri dada) akibat penyakit jantung koroner                  ESO: Sakit kepala, hipotensi ortostatik, mengantuk                  KI: Hindari sildenafil, galukoma, syok kardiogenik, anemia berat, trauma kepala                  PERHATIAN: Hamil dan laktasi, alkoholisme, dapat mengganggu kemampuan mengemudi atau menjalankan mesin                  Cara penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>

		<p>KI: Alergi terhadap komponen vitamin B, pengidap sakit ginjal berat yang mengonsumsi vitamin B complex tanpa rekomendasi dokter</p> <p>PERHATIAN: Beri tahu dokter jika kamu mengidap gangguan pencernaan dan gangguan tiroid, diabetes, penyakit hati sebelum mengonsumsi vitamin b complex</p> <p>Cara penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>	
		<p>Nama obat: Simvastatin 20mg</p> <p>Kandungan: Simvastatin 20mg</p> <p>Dosis lazim: Awalnya 10-20mg per hari, pasien yang membutuhkan pengurangan kolesterol dalam jumlah besar atau dengan risiko CV tinggi: awalnya, 40mg sekali sehari, diminum sesudah makan pada malam hari</p> <p>Kegunaan: Untuk penurun kolesterol golongan statin</p> <p>ESO: Gangguan system darah dan limfatik: anemia, gangguan</p>	

		<p>gastrointestinal: sembelit, sakit perut, diare, mual KI: Penyakit hati aktif atau peningkatan transaminase serum persisten yang tidak dapat dijelaskan, miopati sekunder akibat agen penurun lipid lainnya PERHATIAN: Pasien dengan diabetes mellitus, factor predisposisi miopati/rhabdomyolisis (misalnya hipotiroididme yang tidak terkontrol) Cara penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>	
		<p>F. Tahap pembuatan</p>	
			<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan skrinning resep</li><li>2. Mengecek ketersediaan obat</li><li>3. Menghitung harga obat</li><li>4. Meracik kapsul</li><li>5. Mengambil obat di rak, yaitu bisoprolol 5mg, glucosamine 500mg 5 tablet, vit b complex 30 tablet, nitrokaf retard 25mg 60 kapsul, simvastatin 20mg 30 tablet</li><li>6. Menulis etiket</li><li>7. Menempelkan etiket setiap obat dan dimasukkan ke dalam plastik</li></ol>

		<p>G. Informasi obat yang diberikan (berupa paragraph dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>TVF: pengambilan obat atas nama bu Sutik                  S : ya, dengan saya sendiri mbak                  TVF: baik bu, saya bantu jelaskan obatnya berupa tablet bisoprolol untuk jantung, ini untuk sendi nya nggeh bu, vitamin nya untuk kekebalan tubuh, nitrokaf untuk nyeri dada, simvastatin untuk kolestrol, diminum nya sehari 1 kali 1 tablet semua kecuali nitrokaf sehari 2 kali 1 kapsul, baik bu apa ada yang ditanyakan terkait obatnya.                  S: sudah mbak terimakasih                  TVF: baik bu ini obatnya semoga lekas sembuh</p> </div>
--	--	---

31	<p>Resep yang ada pengulangan/ iter</p> 	<p>A. Skrinning administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama pasien:</td> <td>Ada</td> <td>Musriah</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien:</td> <td>Tidak ada</td> <td>58 thn</td> </tr> <tr> <td>Berat badan:</td> <td>Tidak ada</td> <td>74 kg</td> </tr> <tr> <td>Nama obat:</td> <td>Ada</td> <td>Glucosamin Gabapentin Candesartan Acarbose Adalat oros Simvastatin</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan:</td> <td>Ada</td> <td>Glucosamin 500mg Gabapentin 300mg Candesartan 8mg Acarbose 100mg Adalat oros 30mg Simvastatin 20mg</td> </tr> </table>	Nama pasien:	Ada	Musriah	Umur pasien:	Tidak ada	58 thn	Berat badan:	Tidak ada	74 kg	Nama obat:	Ada	Glucosamin Gabapentin Candesartan Acarbose Adalat oros Simvastatin	Kekuatan:	Ada	Glucosamin 500mg Gabapentin 300mg Candesartan 8mg Acarbose 100mg Adalat oros 30mg Simvastatin 20mg
Nama pasien:	Ada	Musriah															
Umur pasien:	Tidak ada	58 thn															
Berat badan:	Tidak ada	74 kg															
Nama obat:	Ada	Glucosamin Gabapentin Candesartan Acarbose Adalat oros Simvastatin															
Kekuatan:	Ada	Glucosamin 500mg Gabapentin 300mg Candesartan 8mg Acarbose 100mg Adalat oros 30mg Simvastatin 20mg															

			Bentuk sediaan:	Ada	Glucosamin tablet Gabapentin kapsul Candesartan tablet Acarbose tablet Adalat oros tablet Simvastatin tablet
			Jumlah obat:	Ada	Glucosamin Gabapentin Candesartan 30 tablet Acarbose 60 tablet Adalat oros 30 tablet Simvastatin
			Duplikasi terapi:	Tidak ada	-
			Aturan pakai:	Ada	Glucosamin sehari 1 kali 1 tablet, sesudah makan Gabapentin sehari 1 kali 1 tablet, sesudah makan Candesartan sehari 1 kali 1 tablet, sesudah makan Acarbose sehari 2 kali 1 tablet, sesudah makan Adalat oros sehari 1 kali 1 tablet, sesudah makan Simvastatin sehari 1 kali 1 tablet, sesudah makan Untuk Malam hari

Tanggal penulisan resep:	Ada	10 Februari 2025
Nama dokter:	Ada	dr. Umar Nur Rachman, Sp. PD
Surat ijin:	Tidak ada	-
Alamat dr.:	Tidak ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan farmasi

Glucosamin Gabapentin Candesartan yang di butuhkan 30 tablet Acarbose yang di butuhkan 60 tablet Adalat oros yang di butuhkan 30 tablet Simvastatin
--

C. Perhitungan biaya resep

Glucosamin Gabapentin Candesartan 30 tablet x 2.008 = 60.240 Acarbose 60 tablet x 3.041 = 182.460 Adalat oros 30 tablet x 12.703 = 381.090 Simvastatin Total 623.790 = 625.000
--

D. Etiket

Nama obat/warna etiket: putih

RS. Islam Darus Syifa Surabaya Jl. Raya Benowo No.05, Benowo, Kec. Pakal, Kota Surabaya Telp. (031) 7406293, Fax. (031) 7422842	
Nama/ID: Musriah	TGL: 10/02/2025
ED	
Nama obat: glucosamine 500mg	
1x SEHARI 1 <del>TABLET/ ML/ SENDOK TAKAR / SEBELUM</del> <del>MAKAN / SAAT / SESUDAH MAKAN</del>	

Nama obat/warna etiket: putih

RS. Islam Darus Syifa Surabaya Jl. Raya Benowo No.05, Benowo, Kec. Pakal, Kota Surabaya Telp. (031) 7406293, Fax. (031) 7422842	
Nama/ID: Musriah	TGL: 10/02/2025
ED	
Nama obat: gabapentin 300mg	
1x SEHARI 1 <del>KAPSUL/ ML/ SENDOK TAKAR / SEBELUM</del> <del>MAKAN / SAAT / SESUDAH MAKAN</del>	

Nama obat/warna etiket: putih

RS. Islam Darus Syifa Surabaya Jl. Raya Benowo No.05, Benowo, Kec. Pakal, Kota Surabaya Telp. (031) 7406293, Fax. (031) 7422842	
Nama/ID: Musriah	TGL: 10/02/2025
ED	
Nama obat: candesartan 8mg	
1x SEHARI 1 <del>TABLET/ ML/ SENDOK TAKAR / SEBELUM</del> <del>MAKAN / SAAT / SESUDAH MAKAN</del>	

Nama obat/warna etiket: putih

RS. Islam Darus Syifa Surabaya Jl. Raya Benowo No.05, Benowo, Kec. Pakal, Kota Surabaya Telp. (031) 7406293, Fax. (031) 7422842	
Nama/ID: Musriah	TGL: 10/02/2025
ED	
Nama obat: acarbose 100mg	
2x SEHARI 1 <del>TABLET/ ML/ SENDOK TAKAR / SEBELUM</del> <del>MAKAN / SAAT / SESUDAH MAKAN</del>	

Nama obat/warna etiket: putih

RS. Islam Darus Syifa Surabaya Jl. Raya Benowo No.05, Benowo, Kec. Pakal, Kota Surabaya Telp. (031) 7406293, Fax. (031) 7422842	
Nama/ID: Musriah	TGL: 10/02/2025
ED	
Nama obat: adalat oros 30mg	
1x SEHARI 1 <del>TABLET/ ML/ SENDOK TAKAR / SEBELUM</del> <del>MAKAN / SAAT / SESUDAH MAKAN</del>	

Nama obat/warna etiket: putih

RS. Islam Darus Syifa Surabaya Jl. Raya Benowo No.05, Benowo, Kec. Pakal, Kota Surabaya Telp. (031) 7406293, Fax. (031) 7422842	
Nama/ID: Musriah	TGL: 10/02/2025
ED	
Nama obat: simvastatin 20mg	
1x SEHARI (MALAM) 1 <del>TABLET/ ML/ SENDOK TAKAR /</del> <del>SEBELUM MAKAN / SAAT / SESUDAH MAKAN</del>	

		<p>E. Product knowledge</p> <table border="1" data-bbox="1120 311 2038 1380"> <tr> <td data-bbox="1131 311 1579 1380"> <p>Nama obat: Gabapentin                      Kandungan: Gabapentin                      Dosis lazim: Dewasa/usia anak diatas 12 thn: 900-1800 mg/hari, hari ke-1: 300 mg sehari 1 kali                      Kegunaan: Untuk meredakan kejang pada penderita epilepsi                      ESO: Kantuk atau pusing, sakit kepala atau penglihatan kabur, mual, muntah, diare, mulut kering                      KI: Hipersensitif terhadap gabapentin                      PERHATIAN: Masalah pernapasan, diabetes, gangguan suasana hati seperti depresi atau gangguan mood, konsumsi alkohol                      Cara penyimpanan: Simpan di tempat kering dan sejuk serta jauh dari jangkauan anak-anak</p> </td> <td data-bbox="1579 311 2027 1380"> <p>Nama obat: Glucosamine 500mg                      Kandungan: Glucosamine 500mg                      Dosis lazim: Dosis glucosamine yang umum adalah 1.500-3.000 mg per hari, yang bisa dikonsumsi sekaligus atau dalam beberapa dosis kecil, Dalam sebagian besar studi mengenai pengobatan osteoarthritis, dosis yang umum digunakan adalah 500mg glucosamine sulfat, tiga kali sehari.                      Kegunaan: Osteoarthritis, Rheumatoid arthritis                      ESO: Mual, heartburn (nyeri atau rasa terbakar di dada), diare, konstipasi (sembelit), mengantuk, Reaksi kulit, sakit kepala                      KI: Konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi suplemen ini jika Anda memiliki diabetes, penyakit ginjal, penyakit jantung, gangguan pembekuan darah, atau tekanan darah tinggi.                      PERHATIAN: Pengidap asma sebaiknya berhati-hati dalam mengonsumsi suplemen glucosamine karena glucosamine dapat memperburuk asma,</p> </td> </tr> </table>	<p>Nama obat: Gabapentin                      Kandungan: Gabapentin                      Dosis lazim: Dewasa/usia anak diatas 12 thn: 900-1800 mg/hari, hari ke-1: 300 mg sehari 1 kali                      Kegunaan: Untuk meredakan kejang pada penderita epilepsi                      ESO: Kantuk atau pusing, sakit kepala atau penglihatan kabur, mual, muntah, diare, mulut kering                      KI: Hipersensitif terhadap gabapentin                      PERHATIAN: Masalah pernapasan, diabetes, gangguan suasana hati seperti depresi atau gangguan mood, konsumsi alkohol                      Cara penyimpanan: Simpan di tempat kering dan sejuk serta jauh dari jangkauan anak-anak</p>	<p>Nama obat: Glucosamine 500mg                      Kandungan: Glucosamine 500mg                      Dosis lazim: Dosis glucosamine yang umum adalah 1.500-3.000 mg per hari, yang bisa dikonsumsi sekaligus atau dalam beberapa dosis kecil, Dalam sebagian besar studi mengenai pengobatan osteoarthritis, dosis yang umum digunakan adalah 500mg glucosamine sulfat, tiga kali sehari.                      Kegunaan: Osteoarthritis, Rheumatoid arthritis                      ESO: Mual, heartburn (nyeri atau rasa terbakar di dada), diare, konstipasi (sembelit), mengantuk, Reaksi kulit, sakit kepala                      KI: Konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi suplemen ini jika Anda memiliki diabetes, penyakit ginjal, penyakit jantung, gangguan pembekuan darah, atau tekanan darah tinggi.                      PERHATIAN: Pengidap asma sebaiknya berhati-hati dalam mengonsumsi suplemen glucosamine karena glucosamine dapat memperburuk asma,</p>
<p>Nama obat: Gabapentin                      Kandungan: Gabapentin                      Dosis lazim: Dewasa/usia anak diatas 12 thn: 900-1800 mg/hari, hari ke-1: 300 mg sehari 1 kali                      Kegunaan: Untuk meredakan kejang pada penderita epilepsi                      ESO: Kantuk atau pusing, sakit kepala atau penglihatan kabur, mual, muntah, diare, mulut kering                      KI: Hipersensitif terhadap gabapentin                      PERHATIAN: Masalah pernapasan, diabetes, gangguan suasana hati seperti depresi atau gangguan mood, konsumsi alkohol                      Cara penyimpanan: Simpan di tempat kering dan sejuk serta jauh dari jangkauan anak-anak</p>	<p>Nama obat: Glucosamine 500mg                      Kandungan: Glucosamine 500mg                      Dosis lazim: Dosis glucosamine yang umum adalah 1.500-3.000 mg per hari, yang bisa dikonsumsi sekaligus atau dalam beberapa dosis kecil, Dalam sebagian besar studi mengenai pengobatan osteoarthritis, dosis yang umum digunakan adalah 500mg glucosamine sulfat, tiga kali sehari.                      Kegunaan: Osteoarthritis, Rheumatoid arthritis                      ESO: Mual, heartburn (nyeri atau rasa terbakar di dada), diare, konstipasi (sembelit), mengantuk, Reaksi kulit, sakit kepala                      KI: Konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi suplemen ini jika Anda memiliki diabetes, penyakit ginjal, penyakit jantung, gangguan pembekuan darah, atau tekanan darah tinggi.                      PERHATIAN: Pengidap asma sebaiknya berhati-hati dalam mengonsumsi suplemen glucosamine karena glucosamine dapat memperburuk asma,</p>			

			<p>Glucosamine dapat mempengaruhi kadar glukosa dalam tubuh, sehingga mungkin tidak cocok untuk penderita diabetes atau intoleransi glukosa.          Cara penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>
		<p>Nama obat: Candesartan 8mg          Kandungan: Candesartan 8mg          Dosis lazim: Dosis awal 4mg per hari dan dapat ditingkatkan hingga 16mg sehari 1 kali          Kegunaan: Untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi (darah tinggi)          ESO: Infeksi saluran pernafasan bagian atas, nyeri punggung, dan pusing          KI: Hipersensitif, gangguan hati yang berat atau tanpa ketoasidosis          PERHATIAN: Disarankan melakukan pemantauan secara berkala terkait kadar kalium dan kadar keratinin dalam serum          Cara penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>	<p>Nama obat: Acarbose 100mg          Kandungan: Acarbose 100mg          Dosis lazim: Dosis awal: sehari 1 kali 50 mg, Dosis selanjutnya: sehari 3 kali 100-200 mg, dosis dapat ditingkatkan setelah 4-8 minggu          Kegunaan: Untuk diabetes melitus yang tidak dapat diatur hanya dengan diet saja          ESO: Flatulensi (buang gas), diare, nyeri abdominal, nausea          KI: Hipersensitif terhadap acarbose/komponen dalam obat          PERHATIAN: Diperlukan pemeriksaan kadar enzim hati selama 6-12 bulan pertama pengobatan          Cara penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>

		<p>Nama obat: Simvastatin 20mg                  Kandungan: Simvastatin 20mg                  Dosis lazim: Awalnya 10-20mg per hari, pasien yang membutuhkan pengurangan kolesterol dalam jumlah besar atau dengan risiko CV tinggi: awalnya, 40mg sekali sehari, diminum sesudah makan pada malam hari                  Kegunaan: Untuk penurunan kolesterol golongan statin                  ESO: Gangguan system darah dan limfatik: anemia, gangguan gastrointestinal: sembelit, sakit perut, diare, mual                  KI: Penyakit hati aktif atau peningkatan transaminase serum persisten yang tidak dapat dijelaskan, miopati sekunder akibat agen penurun lipid lainnya                  PERHATIAN: Pasien dengan diabetes mellitus, factor predisposisi miopati/</p>	<p>Nama obat: Adalat oros 30mg                  Kandungan: Nifedipine GITS (Gastro Intestinal Therapeutic System) 30mg                  Dosis lazim: Sehari 1 kali 1 tablet                  Kegunaan: Untuk mengobati hipertensi dan angina                  ESO: Sakit kepala, penumpukan cairan di bagian kaki ( edema perifer), pelebaran pembuluh darah (vasodilatasi)                  KI: Hipersentivitas, syok kardiovaskular, 8 hari pertama setelah infark miokard akut                  PERHATIAN: Gagal jantung, gangguan fungsi hati, kehamilan dengan usia di atas 20 minggu                  Cara penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>

		<p>rhabdomyolisis (misalnya hipotiroidisme yang tidak terkontrol) Cara penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>	
		<p>F. Tahap pembuatan</p> <div data-bbox="1149 542 2045 970" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"><ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan skimming resep</li><li>2. Mengecek ketersediaan obat</li><li>3. Menghitung harga obat</li><li>4. Meracik kapsul</li><li>5. Mengambil obat di rak, yaitu glucosamin 500mg, gabapentin 300mg, candesartan 8mg 30 tablet, acarbose 100mg 60 tablet, Adalat oros 30mg 30 tablet, simvastatin 20mg</li><li>6. Menulis etiket</li><li>7. Menempelkan etiket setiap obat dan dimasukkan ke dalam plastik</li></ol></div>	

		<p>G. Informasi obat yang diberikan (berupa paragraph dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <div data-bbox="1137 331 2033 722" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>TVF: pengambilan obat atas nama Ibu Musriah M : ya, dengan saya anak nya mbak TVF: baik mbak, saya bantu jelaskan obatnya berupa tablet glucosamin, gabapentin, candesartan untuk darah tinggi, acarbose, Adalat oros ini untuk darah tinggi, simvastatin diminum nya malam hari sehari 1 kali 1 tablet, untuk yang lain nya sama ya mbak sehari 1 kali 1 tablet semua kecuali acarbose sehari 2 kali 1 kapsul, baik mbak apa ada yang ditanyakan terkait obatnya. M: sudah mbak terimakasih TVF: baik mbak ini obatnya semoga lekas sembuh</p></div>
--	--	--

Gresik, 25 Maret 2025

Dosen Pembimbing PKL,



Diah Ratnasari, S.Farm., Apt.,M.T

NIDN.0721119001

Gresik, 25 Maret 2025

Pembimbing Lapangan Apotek Cipta Medika GKB



Apt. Sofia Winata Meiliasari, S. Farm.,

SIPA. 19860501/SIPA\_35.25/2022/2060

## LAMPIRAN

### 1. Resep obat saluran cerna



KLINIK CIPTA MEDIKA GKB  
Jl. Balikpapan No. 6 GKB, Gresik, Jawa Timur  
031-3954446/082245015803  
E-mail : ciptamedikaklinik@gmail.com

#### REKAP DATA RESEP

No.Resep	Tgl.Resep	Poli/Unit	Status	Pasien	Dokter Peresep
202502130033	2025-02-13 14:39:10	Poliklinik Umum	Sudah Terlayani	2025/02/13/000047 000282 [REDACTED] (BPJS)	dr.Biendha Ulfatullaily
		Jumlah	Kode Obat	Nama Obat	Aturan Pakai
		6 TAB	GKB1006	RANITIDINE TAB (HJ)	2x1pc
		6 TAB	GKB1081	PARACETAMOL STRIP (PIM)	3x1prm
		6 TAB	GKB1652	ANTASIDA TAB (ERELA)	2x1ac
		4 TAB	GKB1787	VITAMIN B6 STRIP 10MG (IFI)	1x1

### 2. Resep obat mata



KLINIK CIPTA MEDIKA GKB  
Jl. Balikpapan No. 6 GKB, Gresik, Jawa Timur  
031-3954446/082245015803  
E-mail : ciptamedikaklinik@gmail.com

#### REKAP DATA RESEP

No.Resep	Tgl.Resep	Poli/Unit	Status	Pasien	Dokter Peresep
202502150051	2025-02-15 19:07:19	Poliklinik Umum	Sudah Terlayani	2025/02/15/000054 005693 [REDACTED] (BPJS)	dr.Biendha Ulfatullaily
		Jumlah	Kode Obat	Nama Obat	Aturan Pakai
		1 BTL	GKB0334	RECO TETES MATA	3X1GTT ODS
		6 CAP	GKB1293	PIROXICAM 10MG (FM)	2X1
		4 TAB	GKB1788	VITAMIN BC STRIP (IFI)	1X1

### 3. Resep obat telinga



**KLINIK CIPTA MEDIKA GKB**  
 Jl. Balikpapan No. 6 GKB, Gresik, Jawa Timur  
 031-3954446/082245015803  
 E-mail : ciptamedikaklinik@gmail.com

#### REKAP DATA RESEP

No.Resep	Tgl.Resep	Poli/Unit	Status	Pasien	Dokter Peresep
202502120062	2025-02-12 19:55:22	Poliklinik Umum	Sudah Terlayani	2025/02/12/000090 00604 [REDACTED] (BPJS)	dr.Biendha Ulfatullaily
		Jumlah	Kode Obat	Nama Obat	Aturan Pakai
		10 TAB	GKB0107	DEMACOLIN TAB	3X1PRN
		1 BTL	GKB0132	ERLAMYCETIN TETES TELINGA	3X1GTT
		10 TAB	GKB0156	FLUCADEX	3X1PRN
		10 TAB	GKB0293	OMEDRINAT	2X1PRN

### 4. Resep obat saluran nafas



**KLINIK CIPTA MEDIKA GKB**  
 Jl. Balikpapan No. 6 GKB, Gresik, Jawa Timur  
 031-3954446/082245015803  
 E-mail : ciptamedikaklinik@gmail.com

#### REKAP DATA RESEP

No.Resep	Tgl.Resep	Poli/Unit	Status	Pasien	Dokter Peresep
202502210041	2025-02-21 17:14:17	Poliklinik Umum	Sudah Terlayani	2025/02/21/000056 001 [REDACTED] (BPJS)	dr.Biendha Ulfatullaily
		Jumlah	Kode Obat	Nama Obat	Aturan Pakai
		6 TAB	GKB0156	FLUCADEX	3X1PRN
		6 CAP	GKB1275	CEFADROXIL 500MG CAPS(BERNO)	2X1
		6 TAB	GKB1307	SALBUTAMOL 2MG (MULIA)	2X1PRN
		4 TAB	GKB1788	VITAMIN BC STRIP (IFI)	1X1
		6 TAB	GKB2124	METHYLPREDNISOLONE 4MG (ERITA)	2X1

## 5. Resep obat KB



KLINIK CIPTA MEDIKA GKB  
Jl. Balikpapan No. 6 GKB, Gresik, Jawa Timur  
031-3954446/082245015803  
E-mail : ciptamedikaklinik@gmail.com

### REKAP PENGGUNAAN OBAT PER PASIEN

No.	Tanggal	No.RM	Nama Pasien	Jml	Nama Obat	Biaya	Embalase	Tuslah	Total
1	2025-03-07	005003		1	GKB1703 ANDALAN INJ 3 BULAN	8,418	0	0	8,418
					Subtotal :	8,418	0	0	8,418
>>	Total	:				8,418	0	0	8,418

6. Resep obat yang mengandung inhaler

 **BPJS Kesehatan**  
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

059

RESEP OBAT RUJUK BALIK  
PEESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL



**C3C-Medika**  
KLINIK CIPTA MEDIKA WAJIB  
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 111, Kota Baru, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Kota Baru, Jambi

Tanggal : 7/3/2025  
Dokter Penulis Resep  
dr. Frisky Lutfia Winda (dr. Frisky)  
SIP. 446/354/437/52/2024

R/ Serokade Rscus 250 mcg No 1  
Si dd 1

---

Nama Penderita : [REDACTED] (P/S/IA)  
Umur : 68 th  
No. Kartu Peserta : 0002229433356

Pelayan Obat :   
Penerima Obat : 

## 7. Resep kudis/kurap



**KLINIK CIPTA MEDIKA GKB**  
Jl. Balikpapan No. 6 GKB, Gresik, Jawa Timur  
031-3954446/082245015803  
E-mail : ciptamedikaklinik@gmail.com

### REKAP PENGGUNAAN OBAT PER PASIEN

No.	Tanggal	No.RM	Nama Pasien	Jml	Nama Obat	Biaya	Embalase	Tuslah	Total
1	2025-03-03	005032		6	GKB1496 ASAM MEFENAMAT (MRS)	1,200	0	0	1,200
				0.5	GKB1235 ERLADERM -N KRIM	2,325	0	0	2,325
				6	GKB0879 OMEGTAMINE TAB	1,068	0	0	1,068
				0.5	GKB1333 SALEP 24 30GR (HOLI)	2,061	0	0	2,061
					Subtotal :	6,654	0	0	6,654
>>	Total	:				6,654	0	0	6,654

8. Resep obat pasien syaraf

RS MUHAMMADIYAH GRESEK  
Jl. KH. KHolid No.28, Gresik, Jawa Timur  
62 21 296274 286282  
E-mail : rsmdg@rsmdg.com

Pemberi : DR. ATIKA NIRA AGNIANA, Sp.N  
No. Resep : 202412200083

**RESEP**

R/ AMETRIPIRIN 12,5MG f 0-0-1	No. 300
R/ CALCIUM KARBONAT f 1X1	No. 300
R/ MELDOKICAM 15MG f 2X1 BILA NYERI	No. X
R/ NADIC GEL f 2X1	No. 11
R/ NEUROGANBE f 1X1	No. 300

Gresik, 20-12-2024



No. Rawat : 2024/12/20/000041 Tgl Lahir : 1961-07-12  
No. R.M. : 347661 Berat : - kg  
Nama : MARSUD HADI Alergi : -  
Monyon : Mulyono, Tri  
Instansi : BPDS

9. Resep racikan anak



**KLINIK CIPTA MEDIKA GKB**  
 Jl. Balikpapan No. 6 GKB, Gresik, Jawa Timur  
 031-3954446/082245015803  
 E-mail : ciptamedikaklinik@gmail.com

**REKAP PENGGUNAAN OBAT PER PASIEN**

No.	Tanggal	No.RM	Nama Pasien	Jml	Nama Obat	Biaya	Embalase	Tuslah	Total
1	2025-03-11	013215	[REDACTED]	4	GKB1275 CEFADROXIL 500MG CAPS(BERNO)	3,908	0	0	3,908
				4	GKB1593 FLUTROP TAB	2,904	0	0	2,904
				4	GKB0396 VITAMIN BC KALENG	76	0	0	76
					Subtotal :	6,888	0	0	6,888
>>	Total	:				6,888	0	0	6,888

10. Resep racikan anak



**KLINIK CIPTA MEDIKA GKB**  
 Jl. Balikpapan No. 6 GKB, Gresik, Jawa Timur  
 031-3954446/082245015803  
 E-mail : ciptamedikaklinik@gmail.com

**REKAP PENGGUNAAN OBAT PER PASIEN**

No.	Tanggal	No.RM	Nama Pasien	Jml	Nama Obat	Biaya	Embalase	Tuslah	Total
1	2025-03-10	012827	[REDACTED]	2	GKB0177 GRANTUSIF	686	0	0	686
				2	GKB0315 PREDNISON KALENG	190	0	0	190
				2	GKB0396 VITAMIN BC KALENG	38	0	0	38
				1	GKB0594 YUSIMOX SYRUP 60ML	4,995	0	0	4,995
					Subtotal :	5,909	0	0	5,909
>>	Total	:				5,909	0	0	5,909

**11. Resep racikan anak**



**KLINIK CIPTA MEDIKA GKB**  
 Jl. Balikpapan No. 6 GKB, Gresik, Jawa Timur  
 031-3954446/082245015803  
 E-mail : ciptamedikaklinik@gmail.com

**REKAP PENGGUNAAN OBAT PER PASIEN**

No.	Tanggal	No.RM	Nama Pasien	Jml	Nama Obat	Biaya	Embalase	Tuslah	Total
1	2025-03-10	007658	[REDACTED]	4	GKB1371 AMBROXOL (TRIMAN)	360	0	0	360
				4	GKB2135 AMOXICILLIN 500MG (ETA)	1,916	0	0	1,916
				2	GKB0156 FLUCADEX	900	0	0	900
				4	GKB0396 VITAMIN BC KALENG	76	0	0	76
					Subtotal :	3,252	0	0	3,252
>>	Total	:				3,252	0	0	3,252

**12. Resep kulit**



**KLINIK CIPTA MEDIKA GKB**  
 Jl. Balikpapan No. 6 GKB, Gresik, Jawa Timur  
 031-3954446/082245015803  
 E-mail : ciptamedikaklinik@gmail.com

**REKAP DATA RESEP**

No.Resep	Tgl.Resep	Poli/Unit	Status	Pasien	Dokter Peresep
202503120048	2025-03-12 15:08:03	Poliklinik Umum	Sudah Terlayani	2025/03/12/000057 012760 [REDACTED] (BPJS)	dr.Biendha Ulfatullaily
		Jumlah	Kode Obat	Nama Obat	Aturan Pakai
		1 BTL	GKB0132	ERLAMYCETIN TETES TELINGA	3x1gtt
		6 TAB	GKB0879	OMEGTAMINE TAB	2x1
		1 TUB	GKB1079	HIDROCORTISON CREAM (KF)	ue3x1

13. Resep hipertensi

**BPJS Kesehatan**  
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

RESEP OBAT RUJUK BALIK  
PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

**C3C-Medika**  
KLINIK GKB  
Jl. Balikpapan No. 6 GKB Gresik  
Telp. 031-3314446

Tanggal: 12 MAR 2025  
Dokter Penulis Resep  
(dr. Sofia Aulina)  
Dokter Umum  
No xxx

Rl Amlodipin 5 mg  
/idd1

4  
M. Bisoprolol 5 mg  
/idd1

—————  
No xxx

Nama Penderita : [REDACTED] PIS/IA  
Umur : 50 th.  
No. Kartu Peserta : 0001127118839

14. Resep pasien DM

**BPJS Kesehatan**  
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

**RESEP OBAT RUJUK BALIK**  
PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

**CIC-Medika**  
KLINIK GKB  
Jl. Balikpapan No. 6 GKB Gresik  
Telp. 031-3554446

Tanggal : 12-3-25  
Dokter Penulis Resep  
dr. Sofia Aulina  
Dokter Umum  
No xxx

Rl Glimepirid 4 mg  
11-0-0  
4  
14 Metformin 500  
1dd1  
No xxx

Nama Penderita : [REDACTED] PIS/IA  
Umur : .....  
No. Kartu Peserta : 0001130268123

### 15. Resep polifarmasi



**KLINIK CIPTA MEDIKA GKB**  
Jl. Balikpapan No. 6 GKB, Gresik, Jawa Timur  
031-3954446/082245015803  
E-mail : ciptamedikaklinik@gmail.com

### REKAP PENGGUNAAN OBAT PER PASIEN

No.	Tanggal	No.RM	Nama Pasien	Jml	Nama Obat	Biaya	Embalase	Tuslah	Total
1	2025-03-08	000283		30	GKBPRB208 PRB- AMLODIPIN 10MG (MEGA)	3,150	0	0	3,150
				30	GKBPRB0138 PRB- BISOPROLOL 5MG (DX)	6,000	0	0	6,000
					Subtotal :	9,150	0	0	9,150

### 16. Resep polifarmasi

2	2025-03-08	000756		30	GKBPRB208 PRB- AMLODIPIN 10MG (MEGA)	3,150	0	0	3,150
				30	GKBPRB0181 PRB- SIMVASTATIN 20MG (SM)	5,160	0	0	5,160
					Subtotal :	8,310	0	0	8,310

### 17. Resep polifarmasi

3	2025-03-08 001144		30	GKBPRB207 PRB- AMLODIPIN 5MG (MEGA)	2,160	0	0	2,160
			30	GKBPRB0138 PRB- BISOPROLOL 5MG (DX)	6,000	0	0	6,000
			30	GKBPRB0199 PRB- VITAMIN B1 (IFI) 50MG	2,340	0	0	2,340
				Subtotal :	10,500	0	0	10,500
>>	Total	:			27,960	0	0	27,960

### 18. Resep lainnya



**KLINIK CIPTA MEDIKA GKB**  
 Jl. Balikpapan No. 6 GKB, Gresik, Jawa Timur  
 031-3954446/082245015803  
 E-mail : ciptamedikaklinik@gmail.com

#### REKAP DATA RESEP

No.Resep	Tgl.Resep	Poli/Unit	Status	Pasien	Dokter Peresep
202503120055	2025-03-12 16:40:52	Poliklinik Gigi	Sudah Terlayani	2025/03/12/000064 002371 [REDACTED] (BPJS)	drg.Arsyi Hikmah Dentisia
		Jumlah	Kode Obat	Nama Obat	Aturan Pakai
		6 TAB	GKB0110	DEXAMETASONE 0.5 KALENG PUYER	2X1
		6 TAB	GKB1139	NATRIUM DIKLOFENAK 50MG (SAMCO)	2X1

### 19. Resep lainnya



KLINIK CIPTA MEDIKA GKB  
Jl. Balikpapan No. 6 GKB, Gresik, Jawa Timur  
031-3954446/082245015803  
E-mail : ciptamedikaklinik@gmail.com

#### REKAP DATA RESEP

No.Resep	Tgl.Resep	Poli/Unit	Status	Pasien	Dokter Peresep
202503120054	2025-03-12 16:29:09	Poliklinik Umum	Sudah Terlayani	2025/03/12/000063 005635 [REDACTED] (BPJS)	dr.Tyas Frimabona
		Jumlah	Kode Obat	Nama Obat	Aturan Pakai
		6 TAB	GKB0110	DEXAMETASONE 0.5 KALENG PUYER	3x1
		6 TAB	GKB0332	RAMAFLU	3x1

### 20. Resep lainnya



KLINIK CIPTA MEDIKA GKB  
Jl. Balikpapan No. 6 GKB, Gresik, Jawa Timur  
031-3954446/082245015803  
E-mail : ciptamedikaklinik@gmail.com

#### REKAP DATA RESEP

No.Resep	Tgl.Resep	Poli/Unit	Status	Pasien	Dokter Peresep
202503120053	2025-03-12 16:24:40	Poliklinik Umum	Sudah Terlayani	2025/03/12/000061 001764 [REDACTED] (BPJS)	dr.Tyas Frimabona
		Jumlah	Kode Obat	Nama Obat	Aturan Pakai
		6 TAB	GKB0110	DEXAMETASONE 0.5 KALENG PUYER	3x1
		6 TAB	GKB1401	FLUTAMOL KAPLET	3x1
		10 KAP	GKB2135	AMOXICILLIN 500MG (ETA)	3x1

### 21. Resep lainnya




**KLINIK CIPTA MEDIKA GKB**  
 Jl. Balikpapan No. 6 GKB, Gresik, Jawa Timur  
 031-3954446/082245015803  
 E-mail : ciptamedikaklinik@gmail.com


#### REKAP DATA RESEP

No.Resep	Tgl.Resep	Poli/Unit	Status	Pasien	Dokter Peresep
202503120046	2025-03-12 14:27:46	Poliklinik Umum	Sudah Terlayani	2025/03/12/000054 007748 [REDACTED] (BPJS)	dr.Biendha Ulfatullaily
		Jumlah	Kode Obat	Nama Obat	Aturan Pakai
		6 TAB	GKB0879	OMEGTAMINE TAB	2X1
		1 BTL	GKB1098	OBH ITRASAL SYRUP	3XC1
		4 TAB	GKB1788	VITAMIN BC STRIP (IFI)	1X1

### 22. Resep insulin



23. Resep racikan dewasa



**RS MUHAMMADIYAH GRESIK**  
Jl. KH. Kholil No.88, Gresik, Jawa Timur  
62 31 3981275 3981561  
E-mail : rsabmg@yahoo.com

Pemberi : dr. LAILATUL INAYAH  
No. Resep : 202502140022

**RESEP**

R/ Codein 10 mg  
MP 4 mg  
Cetirizine 1/2 tab  
*mfla pulv da in cap No. X*  
∫ 3dd1 prn batuk

Gresik, 14-02-2025



No. Rawat : 2025/02/14/000196 Tgl Lahir : 1951-09-18  
No. R.M. : 379412 Berat : - kg  
Nama : [REDACTED] TN Alergi :  
Penjamin : Umum

24. Resep racikan dewasa

Pemberi : dr. FITRI DWI PRABANDHARI (POLI)  
No. Resep : 202502010110

---

**RESEP**

R/ b comc No. V  
    ∫ 1x1 pc

---

R/ lansoprazole No. X  
    ∫ 2x1 ac

---

R/ braxidin 1/2 tab  
   antasida 1/3 tab  
   ondansentron 4 mg  
   *mfla pulv da in cap No. X*  
    ∫ 3x1 ac  
   *nyeri ulu hati dan mual muntah*

---

R/ paracetamol 400 mg  
   dimenhidrinat 25 mg  
   *mfla pulv da in cap No. X*  
    ∫ 3x1 pc

---

Gresik, 01-02-2025



---

No. Rawat : 2025/02/01/000228	Tgl Lahir : 1995-04-12
No. R.M. : 268118	Berat : 80 kg
Nama : SRI FATMAWATI,NY	Alergi : -
Penjamin : Umum	

25. Resep racikan dewasa

Pemberi : dr. FIRMAN PRAYUDI, Sp.N  
No. Resep : 202502010161

**RESEP**

R/ LAPIBAL No. XV  
∫ 1DD1

R/ PRELIN 75 No. XV  
∫ 1DD1 MALAM


R/ SANMOL 500  
VALISANBE 1  
AMITRIPTILIN 5  
*mfla pulv da in cap No. X*  
∫ 1DD1

Gresik, 01-02-2025



No. Rawat : 2025/02/01/000180 Tgl Lahir : 1989-07-07  
No. R.M. : 252613 Berat : - kg  
Nama : [REDACTED],NY Alergi : -  
Penjamin : WILMAR

26. Salinan resep



27. Salinan resep

**APOTEK**  
**eRDe FARMA**  
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Randuagung 120, Gresik  
Telp : 0852 9000 3996

APA : Dwi Rezqi Ramadhanis, S. Farm, Apt  
SIA : 503.28/26/437.74/2021  
SIPA : 19880421/SIPA\_35.25/2022/2583

---

**SALINAN RESEP**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

di dari Dokter : dr. Dhani Sp.Pdt Tgl: 4/24  
Nama Pasien : [REDACTED] Tgl: 11  
Nomor Resep : .....


**R/**

Cloderm	0,05%	15g
Apucia	2%	5g
Letumol	2%	5g
mp da in per	25g	

JUL 371

habet

28. Salinan resep



## 29. Resep yang ada pengulangan/iter

**RUMAH SAKIT ISLAM DARUS SYIFA` SURABAYA**  
Jl. Raya Benowo No.5, Benowo, Kec. Pakal, Kota Surabaya  
Telp. (031) 7406293, Fax. (031) 7422842

---

Dokter : dr. UMAR NUR RACHMAN, Sp.PD  
SIP/SIK Dokter : 503.446/861/B/IP.DS/436.7.17/2021  
Poli / Ruang : Poli Spesialis Penyakit Dalam  
Riwayat Alergi : Ada, eperisone, antalgin >> gatal, bendol,  
biduren

Surabaya, 10-02-2025

**ITER 2X**

R	GLUCOSAMIN 500 mg TAB	NO XXX
	<i>S 1 dd 1 Tab pc Po</i>	
R	CANDESARTAN 8 mg TAB	NO XXX
	<i>S 1 dd 1 DARAH TINGGI</i>	
R	ACARBOSE 100 mg TAB	NO LX
	<i>S 2 dd 1 Tab pc Po</i>	
R	ADALAT OROS 30 mg TAB	NO XXX
	<i>S 1 dd 1 DARAH TINGGI</i>	
R	SIMVASTATIN 20 mg TAB	NO XXX
	<i>S 1 dd 1 Tab pc Po malam hari</i>	

Nama : XXXXXXXXXX  
Umur : 58 thn 7 bln 26 hr  
Berat Badan : 74 Kg  
Alamat : KLAKAHREJO LOR RT6 RW9  
No. RM : 335928  
Penjamin : BPJS

30. Resep yang ada pengulangan/iter

**RUMAH SAKIT ISLAM DARUS SYIFA' SURABAYA**  
Jl. Raya Benowo No.5, Benowo, Kec. Pakal, Kota Surabaya  
Telp. (031) 7406293, Fax. (031) 7422842

Dokter : dr. ROXANTIN UTAMI, Sp.S  
SIP/SIK Dokter : 500.16.7.2/2505/B/IP.DS/436.7.15/2024  
Poli / Ruang : Poli Spesialis Saraf  
Riwayat Alergi : Tidak Ada

Surabaya, 13-02-2025

R/ ALPRAZOLAM 05 mg TAB S 1 dd 1 Tab pc Po mlm	NO XXX 10
R/ BETAHISTIN 6 mg TAB S 3 dd 1 Tab pc Po kp pusing	NO XV 10
R/ FLAMAR GEL S	NO I
R/ MECOBALAMIN 500 mg KAP S 2 dd 1 Caps pc Po VIT SARAF	NO LX 10
✓ R/ CANDESARTAN 8 mg TAB S 1 dd 1 Tab pc Po PAGI	NO XXX
R/ EPERISONE 50 mg TAB S 1 dd 1 Tab pc Po KAKU OTOT	NO XXX 10
R/ NA DIKLOFENAK 50 mg TAB S 2 dd 1 Tab pc Po KP NYERI	NO XX 10
ADIM M X R/ NEUROSANTIN 300 mg KAP S 1 dd 1 Caps pc Po	NO XXX 10

Nama : [REDACTED]  
Umur : 52 thn 10 bln 28 hr  
Berat Badan : 62 Kg  
Alamat : SEMEMI BARU IV  
No. RM : 393861  
Penjamin : BPJS

Antrian Instalasi Farmasi Depo 2  
RSI Darus Syifa' Surabaya  
Nomor Antrian Non Rawat  
**F54**  
Anda sedang menunggu 55 ora  
13/02/2025 06:45:33  
Poli Spesialis Saraf  
\*Dicetak tanggal : 13/02/2025 - 13:40:54

NRM : 393861  
Nama : TARTI  
No. Antrian : 2  
Debitor : BPJS  
Dokter : dr. ROXANTIN UTA  
Sp.S

31. Resep yang ada pengulangan/iter

**RUMAH SAKIT ISLAM DARUS SYIFA' SURABAYA**  
Jl. Raya Benowo No.5, Benowo, Kec. Pakal, Kota Surabaya  
Telp. (031) 7406293, Fax. (031) 7422842

Dokter : dr. ROXANTIN UTAMI, Sp.S  
SIP/SIK Dokter : 500.16.7.2/2505/B/IP.DS/436.7.15/2024  
Poli / Ruang : Poli Spesialis Saraf  
Riwayat Alergi : Tidak Ada

Surabaya, 13-02-2025

R/ AMITRIPTILIN 25 mg TAB NO XXX  
S 1 dd 1 Tab pc Po m/m

R/ GLUCOSAMIN 500 mg TAB NO XXX (7)  
S 1 dd 1 Tab pc Po SENDI

R/ GABAPENTIN 300 MG KAPSUL NO XXX FNR  
S 1 dd 1 Caps pc Po NYERI SARAF 20

R/ EPERISONE 50 mg TAB NO LX (10)  
S 2 dd 1 Tab pc Po KAKU OTOT

R/ NA DIKLOFENAK 50 mg TAB NO XXX (20)  
S 2 dd 1 Tab pc Po KP NYERI

R/ MEGABAL TAB NO XXX (10)  
S 1 dd 1 Tab pc Po VIT SARAF

Nama : [REDACTED]  
Umur : 54 thn 10 bln 28 hr  
Berat Badan : 61 Kg  
Alamat : DUSUN KURIPAN WETAN  
No. RM : 403553  
Penjamin : BPJS

Antrian Instalasi Farmasi Depo?  
RSI Darus Syifa' Surabaya  
Nomor Antrian Non Racikan:  
**F58**  
Anda sedang menunggu 57 orang  
13/02/2025 06:45:37

ROXANTIN UTAMI, Sp.S  
Usia : -  
Asal Kunjungan : Poli Spesialis Saraf  
\* Dicitak tanggal : 13/02/2025 - 14:37:35

NRM : 403553  
Nama : JUMAATI  
No. Antrian : 9  
Debitur : BPJS  
Dokter : dr. ROXANTIN UTAMI, Sp.S

**A. PRODUCT KNOWLEDGE BERDASARKAN KELAS TERAPI**

**(1) ANALGETIK- ANTIPIRETIK- ANTIINFLAMASI**

<b>Golongan</b>	<b>Nama Obat</b>	<b>Nama Obat di Tempat PKL</b>	<b>Kontraindikasi</b>	<b>Indikasi</b>	<b>Dosis dan Cara Pakai</b>	<b>Efek Samping</b>	<b>Cara Simpan</b>
Analgetik- Antipiretik- Antiinflamasi	Acetaminophen	Paracetamol	Hipersensitif/alergi terhadap paracetamol, penderita gangguan fungsi hati berat.	Obat ini digunakan untuk meredakan nyeri ringan hingga sedang seperti sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot, serta menurunkan demam.	Dewasa 1-2 kaplet, 3- 4 kali per hari. Penggunaan maximum 8 kaplet per hari. Anak 7-12 tahun: 0.5-1 kaplet, 3- 4 kali per hari Penggunaan maximum 4 kaplet perhari	Penggunaan untuk jangka waktu penjang dan dosis besar dapat menyebabkan kerusakan fungsi hati	Simpan pada suhu dibawah 30°C.
	<b>Metampron</b>	Metamizol	Penderita hipersensitif ; wanita hamil dan menyusui ; penderita tekanan darah sistolik kurang dari 100 mmHg	Untuk meringankan rasa sakit terutama nyeri kolik dan sakit setelah oprasi	Dewasa jika sakit 1 kaplet, berikutnya 1 kaplet tisp 6-8 jam, maksimum 4 kaplet sehari.	Reaksi hipersensitivitas : reaksi pada kulit , misal kemerahan; agranulositosis.	Simpan pada suhu dibawah 30°C.

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
	Ibuprofen	Ibuprofen	Penderita dengan ulkus peptikum (tukak lambung dan duodenum) yang berat dan aktif. Penderita dengan riwayat hipersensitif terhadap Ibuprofen dan obat anti inflamasi non steroid lain. Penderita sindroma poli hidung, angioedema dan penderita dimana bila menggunakan aspirin atau obat antiinflamasi non steroid akan timbul gejala asma, rinitis atau urtikaria. Kehamilan tiga bulan terakhir.	Karena efek Nyeri ringan sampai sedang antara lain nyeri pada penyakit gigi atau pencabutan gigi, nyeri pasca bedah, sakit kepala, gejala artritis reumatoid,gejala osteoartritis, gejala juvenile artritis reumatoid, menurunkan demam pada anak.	Dewasa: Dosis yang dianjurkan 200-250 mg 3-4 kali sehari. Osteoartritis, artritis reumatoid: 1200 mg 1800 mg 3 kali sehari. Eksaserbasi akut Dosis maksimum 2400 mg/hari, jika kondisi sudah stabil selanjutnya dosis dikurangi hingga maksimum 1800 mg/hari. Anak-anak: Anak 1-2 tahun: 50 mg 3-4 kali sehari. Anak 3-7 tahun: 100-125 mg 3-4 kali sehari. Anak 8-12 tahun: 200-250 mg 3-4 kali sehari. Tidak boleh dipergunakan pada anak dengan berat badan kurang dari 7 kg.	Pusing, sakit kepala, dispepsia, diare, mual, muntah, nyeri abdomen, konstipasi,ruam	Simpan pada suhu dibawah 30°C.

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
	Diklofenak	Diclofenac Sodium	<p>Hipersensitivitas terhadap diklofenak atau NSAID lainnya. Gagal jantung sedang hingga berat, penyakit jantung iskemik, penyakit arteri perifer, penyakit serebrovaskular, ulserasi gastrointestinal, perforasi atau Perdarahan gastrointestinal. Penggunaan bersamaan dengan NSAID lainnya, antiplatelet, antikoagulan. Gangguan hati atau ginjal berat. Kehamilan (trimester ketiga).</p>	<p>Obat pereda nyeri dari nyeri ringan sampai sedang dan membantu meredakan peradangan. Terapi simtomatik untuk eksaserbasi akut dari arthritis reumatoid (AR) dan Osteoarthritis (OA), spondilitis ankilosa.</p>	<p>Dewasa dan Anak diatas 14 tahun: 25 mg atau 50 mg, 2 sampai 3 kali per hari. Sesudah makan.</p>	<p>Gangguan dan perdarahan GI, tukak peptik, sakit kepala, cemas, ruam kulit, pruritus, tinitus, edema, depresi, mengantuk, insomnia, penglihatan kabur. Hipersensitivitas. Kerusakan hati dan ginjal. Agranulositosis dan trombositopenia.</p>	<p>Simpan ditempat sejuk dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
	Asam Mefenamot	Mefenamic acid	<p>Pasien yang Hipersensitivitas. Pasien dengan aktif atau riwayat tukak/perdarahan peptikum berulang, riwayat perdarahan gastrointestinal atau perforasi</p> <p>(terkait dengan terapi NSAID sebelumnya), penyakitradang usus, gagal jantung berat, riwayat asma, bronkospasme, rinitis,angioedema, urtikaria,atau tipe alergi reaksi setelah minum aspirin atau NSAID lainnya. Pengobatan nyeri peri-operatif dalam pengaturan operasi CABG. Ginjal (CrCl &lt;30 mL/menit) dan gangguan hati berat. Kehamilan (trimester ketiga).</p>	<p>Meredakan nyeri ringan hingga sedang pada sakit kepala, sakit gigi, nyeri haid primer, termasuk nyeri karena trauma, nyeri otot, dan nyeri paska operasi</p>	<p>Dewasa dan anak &gt;14 tahun : 3 x sehari 500 mg. Lansia : Mulailah dengan dosis yang lebih rendah dan durasi sesingkat mungkin. Diberikan sesudah makan.</p>	<p>Sistem pencernaan: Sakit kepala, gugup, mual dan muntah</p>	<p>Simpan ditempat sejuk dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
	Piroxicam	Piroxicam	Wanita hamil, menyusui dan mengalami kesuburan	Meredakan rasa nyeri pada Osteoarthritis, Ankilosa spondilitis, Gangguan muskuloskeletal akut, gout akut, dan nyeri persendian	Reumatoid arthritis, osteoarthritis, spondilitis ankilosa : 1 x sehari 20 mg ;Gangguan muskuloskeletal akut: 40 mg/hari dalam dosis tunggal atau terbagi selama 2 hari, kemudian 1 x sehari 20 mg selama 7-14 hari ; Gout akut : dosis awal 40 mg /hari dalam dosis tunggal, kemudian 40 mg dosis tunggal atau terbagi selama 4-6 hari. Tidak untuk terapi gout jangka panjang Berikan Segera sesudah makan.	Gangguan lambung, sakit kepala, iritasi dan ulkus gaster (dosis > 20mg /hari	Simpan pada suhu dibawah 30°C, terlindung dari cahaya
	<b>Aspirin</b>	Astika acetylsalicyli c acid tablet	Penderita alergi (termasuk asma), tukak lambung, pernah atau sering mengalami pendarahan di bawah kulit (konsultasikan Dengan dokter). Penderita yang sedang diterapi	Untuk mencegah terjadinya infark miokard, agina tidak stabil atau serangan iskemik serebral Yang bersifat sementara	A. g -160 mg / hari	Iritasi lambung, mual, muntah. Pemakaian lama dapat terjadi pendarahan lambung, tukak lambung. Reaksi hipersensitifitas (sesak napas, reaksi kulit). Dapat terjadi	Disimpan pada suhu dibawah 30°C

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
			<p>dengan anti koagulan (konsultasikan dengan dokter). Penderita hemofilia dan trombositopenia. Jangan digunakan pada penderita varicella cacar air / chickenpox dan gejala flu. Penderita yang hipersensitif. Anak usia dibawah 12 tahun. Ibu menyusui</p>			berkurangnya jumlah trombosit (trombositopenia)	
	Meloxicam	Hufaxicam tablet	<p>Hipersensitif, ukus peptik aktif, penyakit ginjal dan hati berat, perdarahan, gastrointestinal, pendarahan selebrovaskuler, gangguan pendarahan lainnya, serangan asma, polip hidung, angiodema, hamil dan menyusui, remaja &lt; 15 thn.</p>	<p>Terapi simtomatis jangka pendek untuk eksaserbasi OA akut. Terapi simtomatis jangka panjang untuk AR.</p>	<p>OA dan AR ; sehari 7,5 – 15 mg; lansia: dosis awal sehari 7,5 mg; dialisis gagal ginjal: maksimal sehari 7,5mg</p>	<p>Dengan dosis yang dianjurkan, meloxicam jarang menimbulkan efek samping</p>	<p>Disimpan pada suhu dibawah 30°C</p>

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
	<b>Celecoxib</b>	Celebrex	Hipersensitivitas terhadap celecoxib dan NSAID lain, aspirin atau sulfonamid. Ulserasi peptik aktif perdarahan atau gastrointestinal, penyakit inflamasi usus, penyakit jantung iskemik, penyakit serebrovaskular, atau penyakit arteri perifer. Gangguan ginjal berat dan hati. Kehamilan (trimester 3) dan menyusui.	Meredakan tanda dan Osteoarthritis gejala (OA), Rheumatoid arthritis (RA) & Ankilosing Spondilitis pada orang dewasa serta Artritis idiopatik juvenil pada anak- anak.	Dewasa osteoarthritis (OA) dan spondylitis ankilosa: 200 mg, 1 kali sehari 1 kapsul atau 100 mg, 2 kali sehari 1 kapsul. Max.400 mg per hari rheumatoid arthritis (RA): 100-200 mg 2 kali sehari. Max.400 mg per hari. Anak-anak artritis idiopatik juvenil: umur 2 tahun 10-25 kg: 50 mg 2 x sehari, >25 kg: 100 mg 2 x sehari setelah makan.	depresi, halusinasi, sakit kepala, mual, muntah, dan mulut kering, diare, dispepsia, luka pada saluran pencernaan, muncul ruam pada kulit, mudah kelelahan, gangguan tidur	Simpan pada suhu dibawah 30°C, terlindung dari cahaya
	<b>Parecoxib</b>	Dynastat	Meningkatkan risiko terjadinya efek samping yang berbahaya, berupa luka perdarahan dan di saluran cernajika digunakan bersama aspirin Peningkatan risiko terjadinya efek samping parecoxib bila digunakan	Meredakan nyeri pascaoper	Dewasa: dosis awal 40 mg, dapat dilanjutkan dengan dosis 20-40 mg tiap 6-8 jam apabila diperlukan. Dosis maksimal 80 mg per hari. Lansia dengan berat badan <50 kg: dosis awal 20 mg. dosis maksimal 40 mg per hari. Parecoxib dapat	Mual, muntah, sakit perut, sembelit, sakit maag, perut kembung, nyeri punggung, bengkak di tangan atau kaki.	Simpan ditempat sejuk dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung

TUGAS KHUSUS PKL D3 FARMASI UMG\_TRIYA AGUSTINA SUSANTI\_221105013\_APOTEK CIPTA MEDIKA GKB

<b>Golongan</b>	<b>Nama Obat</b>	<b>Nama Obat di Tempat PKL</b>	<b>Kontraindikasi</b>	<b>Indikasi</b>	<b>Dosis dan Cara Pakai</b>	<b>Efek Samping</b>	<b>Cara Simpan</b>
			bersama fluconazole atau ketoconazole Peningkatan risiko terjadinya perdarahan jika digunakan bersama warfarin, atau obat antikoagulan lain, seperti apixaban dan dabigatran		disuntikkan langsung ke dalam pembuluh darah atau ke dalam otot, tergantung kondisi pasien		

**(2) ANTIMIKROBA****(2.a) ANTIBIOTIK**

<b>Golongan</b>	<b>Nama Obat</b>	<b>Nama Obat di Tempat PKL</b>	<b>Kontraindikasi</b>	<b>Indikasi</b>	<b>Dosis dan Cara Pakai</b>	<b>Efek Samping</b>	<b>Cara Simpan</b>
Penisilin	Ampicillin	Ampicillin	Hipersensitif terhadap penisilin	Infeksisaluran pernafasan, seperti pneumonia faringitis, bronkitis, laryngitis	Infeksi saluran empedu, bronkitis, endokarditis, gastroenteritis, listeriosis, otitis media, infeksi streptokokus perinatal, peritonitis: Dewasa: 0,25-1 g tiap 6 jam. Anak: <10 tahun separuh dari dosis rutin orang dewasa. • Demam tifoid dan paratifoid: Dewasa: 1-2 g tiap 6 jam selama 2 minggu pada infeksi akut, dan 4-12 minggu pada karier. • Infeksi saluran kemih: Dewasa: 500 mg tiap 8 jam.	Mual, muntah, diare, eritematosa ruam makulo-papular, sakit mulut, lidah hitam /berbulu, ruam.	Simpan ditempat sejuk dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung
	Amoksisilin	Amoxicillin	Hipersensitivitas atau riwayat reaksi alergi berat (misalnya	Penyakit infeksi kulit dan jaringan lunak, infeksi saluran	Dewasa: 250-500 mg setiap 8 jam (3x sehari) atau 500-875	Diare, sakit kepala, mual, muntah, ruam, kolitis. Segera hubungi dokter jika	Simpan pada suhu dibawah 30°C, terlindung dari

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
			anafilaksis, sindrom Stevens-Johnson) terhadap amoksisilin atau – laktam lainnya (misalnya penisilin, sefalosporin, karbapenem, monobaktam). Mononukleosis Menular (dicurigai atau dikonfirmasi).	pernafasan, infeksi saluran genitourinari, dan gonore yang Disebabkan organisme Gram positif & Gram Negatif yang peka terhadap Amoxicillin	mg setiap 12 jam (2x sehari). Sesudah makan.	terjadi efek samping berupa perubahan mental, insomnia, kebingungan, kecemasan	cahaya.
Cephalosporin	cefadroxil	Cefadroxil	Hipersensitif terhadap cefadroxil.	Mengatasi infeksi saluran pernafasan, saluran kemih dan kelamin serta infeksi kulit dan jaringan lunak	Infeksi kulit dan struktur kulit, faringitis streptokokus, Tonsilitis, infeksi saluran kemih. Dewasa: 1-2 g setiap hari sebagai dosis tunggal atau dalam 2 dosis terbagi. Anak: 6 tahun <40 kg: 30- 50 mg / kg setiap hari sebagai dosis tunggal atau dalam 2 dosis terbagi, hingga 100 mg / kg	Mual, muntah, diare, alergi (misalnya: ruam), disfungsi hati (mis. kolestasis, peningkatan serum transaminase).	Simpan ditempat sejuk dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
					setiap hari. sesudah makan		
	Cefixime	Cefixime	Pasien dengan riwayat syok atau hipersensitif terhadap beberapa bahan dari obat ini.	Infeksi saluran kemih, otitis media, faringitis, tonsilitis, bronkitis akut dan eksaserbasi dari bronkitis kronik, Gonore tak terkomplikasi, demam tifoid.	Anak : - 1,5-3 MG/kg Berat Badan; 2 kali sehari - 6 MG/KG Berat Badan; 2 kali sehari - 10-15 MG/ kg Berat Badan; konsumsi selama 2 minggu Dewasa/AnakBB >30KG : - 50-100 MG; 2 kali sehari	Hipersensitivitas, gangguan Gastrointestinal & pernapasan, syok, gangguan fungsi ginjal, granulositopenia atau eosinofilia, stomatitis, kandidiasis, defisiensi vit atau eosinofilia, stomatitis, kandidiasis, defisiensi vit K	Simpan ditempat sejuk dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung
	<b>Cefotaxime</b>	Biocef	Cefotaxim dapat menimbulkan interaksi obat berupa peningkatan efek toksik pada ginjal jika digunakan bersama obat golongan aminoglikosida atau diuretik. Selain itu, kadar cefotaxim dalam darah juga dapat meningkat jika digunakan	Menangani infeksi bakteri dan mencegah infeksi luka operasi	Dewasa: 1-2 gram tiap 8-12 jam. Tergantung dari tingkat keparahan infeksi. Suntikan dapat diberikan IM, atau IV dengan suntikan perlahan selama 3-5, atau melalui infus selama 20-60 menit. Dosis maksimal adalah 12 gram per hari.	Nyeri atau bengkak di area yang disuntik, diare, mual dan muntah, sakit atau kram perut, kejang.	Simpan pada suhu dibawah 30°C, terlindung dari cahaya.

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
			bersama probenecid.				
Chloramphenicol	<b>kloramfenikol</b>	Navachlor	Hipersensitivitas, ibu hamil, menyusui	Bruselosis, pneumonia bakteri, pertusis meningitis non-TNC, demam, tifus dan paratifus epidemik, limfogranuloma inguinale.	Dewasa, anak dan bayi >2 minggu: 50 mg/kgBB dalam 3-4 dosis. Bayi < 2 minggu dan bayi premature 25mg/kgBB/hari dibagi  4 dosis. Berikan pada saat perut kosong 1 jam sebelum atau 2 jam sesudah makan	Diare, Sakit kepala, Neuritis perifer, Enterokoliti, Depresi ringan, Mual Muntah.	Simpan ditempat sejuk dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung
	Thiamfenicol	Dionicol	Hipersensitif terhadap Thiaphenicol Pasien dengan gangguan faalhati yang berat. Jangan digunakan untuk pencegahan infeksi	infeksi akibat bakteri Salmonella seperti tifus, H influenzae (terutama infeksi meningeal), riketsia, bakteri gram negatif-penyebab bakteremia, meningitis	Dewasa, anak & bayi > 2 minggu 50 mg/kg berat badan/hari dalam 3-4 dosis terbagi. Bayi prematur & bayi < 2 minggu 25 mg/kg berat badan/hari dalam 4 dosis terbagi. Sesudah makan	Gangguan gastrointestinal, reaksi hipersensitivitas, sakit kepala, anafilaktik, diskrasia darah	Simpan pada suhu 30 °C dan ditempat kering.

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Macrolides dan Lincosamide	Eritromisin	Erythromycin	Hipersensitif terhadap eritromisin atau makrolida lainnya; porfiria.	Infeksi sal nafas, kulit dan jar lunak, pneumonia, GO, infeksi karena kuman yang peka terhadap eritromisin.	infeksi kuman yang peka terhadap eritromisin. menjadi 4 g/hari untuk infeksi parah. Anak-anak: 30–50 mg/kgBB, 4 kali sehari. Dosis dapat digandakan jika infeksi yang diderita parah. Dapat dikonsumsi saat perut kosong. Paling baik diminum saat perut kosong minimal 30 menit sebelum makan.	Diare, mual, sakit perut, muntah, hingga kehilangan nafsu makan	Simpan di bawah suhu 30°C
	Azitromisin	Azithromycin	Hipersensitif, pasien dengan kerusakan hati .	Infeksi saluran napas atas & bawah, kulit & struktur kulit, uretritis & servisititis non GO krn Chlamydia trachomatis.	Dewasa : 1 g dosis tunggal oral. Semua indikasi lainnya 500 mg 1 x/hari selama 3 hari. Anak 10 mg/kg BB/hari dosis tunggal selama 3 hari	gangguan saluran cerna disertai diare, perut nyeri dan keram, mual, muntah dan flatulen.	Simpan di bawah suhu 30°C

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
	Klaritromisin	Klindamisin	Hipersensitif terhadap klidamisin atau linkomisin	Infeksi pada saluran nafas atas dan bawah, kulit dan jaringan lunak, infeksi pada gigi, osteomielitis, otitis media akut, infeksi anaerob.	Dewasa: Infeksi ringan-sedang 150- 300 mg 4x sehari. Infeksi berat 300- 450 mg 4x sehari. Anak >1 bulan: Infeksi ringan-Sedang 8-16 mg/KgBB/hari dibagi 3-4 dosis. Infeksi berat 16-20 mg/KgBB/hari dibagi 3-4 dosis.	Urtikaria, ruam kulit, pruritus, gangguan Saluran pencernaan, ikterik, perubahan hematopietik.	Simpan ditempat sejuk dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung
	<b>Klindamisin</b>	Clindamycin tablet 200 mg	Penderita yang hipersensitivitas terhadap Clindamycin.	Untuk pengobatan infeksi berat yang disebabkan oleh bakteri anaerob Gram positif yang peka seperti streptococcus, pneumococcus dan staphylococcus pada: Saluran pefafasan: emphisema, pneumonitis anaerob dan abses paru-paru. Kulit dan jaringan lunak. Infeksi intra abdominal seperti	Jika diare selama penggunaan antibiotik ini harus dihentikan. Dewasa Infeksi serius: 150-300 mg/6 jam. Infeksi yang lebih berat: 300-450 mg/6 jam. Anak-anak: 3-6 mg/kg BB tiap 6 jam tergantung beratnya infeksi. Untuk mencegah kemungkinan iritasi pada	Gastrointestinal colitis yang berhubungan dengan antibiotik sakit perut, mual, muntah dan diare, rasa logam di mulut atau tidak enak setelah pemberian i.v dosis tinggi dari dindamycin phosphate. Hipersensitivitas: ruam maculopapular dan urtikaria, ruam kulit umum seperti bentuk morbili ringan sampai sedang, Steven's	Simpan pada suhu dibawah 30°C

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
				peritonitis dan abses intra abdominal. Septicemia. Infeksi ginkologi meliputi endometritis, pelvic cellulitis, infeksi pasca bedah pada vagina. Infeksi tulang dan sendi.	kerongkongan, kapsul harus ditelan dengan satu gelas penuh air. Untuk infeksi yang disebabkan oleh streptococci beta hemolytic pengobatan harus dilanjutkan sekurang-kurangnya 10 hari.	Johnson Syndrome dan anafilaksis Hati : <i>jaundice</i> , ketidaknormalan tes fungsi hati. Ginjal : gangguan fungsi ginjal seperti azotemia, oliguria, dan/atau proteinuria. Hematopoietik: neutropenia (leukopenia) dan eosiniphilia, jarang: agranulositosis, trombositopenia Reaksi lokal : sakit, induration, abses setelah pemberian Infus i.v. Muskuloskeletal jarang, poliartthritis. Cardiovascular jarang, cardiopulmonary arrest dan hipotensi Kulit dan selaput lendir pruritus, vaginitis dan kasus jarang eksudatif dan dermatitis vesikobulosa	

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Aminoglikosida	<b>Neomisin</b>	Erladerm -N krim 5g	Hipersensitif	Infeksi sekunder dari bakteri, eksim, psoriasis, neurodermatosis, dermatitis seboroik, anal dan genital intertrigo.	Oleskan tipis pada area yang terjangkit 2-3x sehari, setelah ada perbaikan pemberian sehari 1x sampai sembuh.	Penipisan, striae, dilatasi pembuluh darah tepi pada pemakaian jangka panjang, perubahan pigmentasi dan hipertrikosis dengan streoid topikal.	Pada suhu dibawah 30°C ditempat kering, terhindar dari cahaya matahari langsung, dan jauhkan dari anak-anak.
	Gentamisin	Gentamisin	Hipersensitif Terhadap gentamisin dan aminoglikosida lainnya. Myasthenia gravis.	Untuk pengobatan topikal infeksi primer dan sekunder pada kulit yang disebabkan oleh bakteri yang peka terhadap gentamicin	Krim/Salep Gentamicin dioleskan tipis pada daerah yang sakit sebanyak 3-4 kali sehari sampai tercapai kesembuhan. Daerah yang sakit boleh ditutupi dengan perban (gauze dressing). Dioleskan tipis tipis pada kulit yang bermasalah setelah kulit dibersihkan dan sikeringkan	Penggunaan topikal Antibiotik gentamisin dapat menyebabkan iritasi yang bersifat sementara, biasanya ditandai dengan kulit kemerahan dan gatal. Kemungkinan terjadinya fotosensitisasi pernah dilaporkan pada beberapa pasien. Penggunaan antibiotik gentamisin topikal dalam jangka panjang dapat menyebabkan jamur atau bakteri yang kebal tumbuh berlebihan.	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Quinolones	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin	Hipersensitivitas terhadap ciprofloxacin atau kuinolon lainnya. Riwayat atau risiko perpanjangan QT, diketahui riwayat miastenia gravis. Penggunaan bersamaan dengan tizanidine.	Infeksi saluran kemih, infeksi saluran nafas, infeksi saluran cerna, infeksi kulit dan jaringan lunak, infeksi tulang dan sendi, infeksi intra-abdomen dengan komplikasi	Infeksi saluran kemih : ringan-sedang : 250 mg, infeksi berat : 500 mg. Infeksi saluran nafas, kulit dan jaringan lunak, tulang dan sendi : ringan-sedang : 500 mg, infeksi berat : 750 mg. Infeksi saluran cerna : 500 mg. Osteomielitis akut : 750 mg. Semua dosis diberikan 2 kali sehari.	Gangguan pencernaan, pusing, sakit kepala, insomnia, halusinasi, tremor, letih, gangguan penglihatan, reaksi kulit	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya.
	<b>Levofloxacin</b>	Levofloxacin Hemihydrate	Levofloxacin di kontraindikasikan pada pasien yang memiliki riwayat hipersensitivitas terhadap levofloxacin, antimikroba golongan quinolone atau komponen lainnya yang terkandung dalam produk ini	Levofloxacin Hemihydrate diindikasikan untuk pengobatan pasien dewasa ( $\geq$ 18 tahun) dengan infeksi ringan, sedang dan berat yang disebabkan oleh mikroorganisme yang rentan.	Dosis untuk pasien dengan fungsi ginjal normal : 250 – 750 mg 1 X sehari 2 – 14 hari tergantung tingkat keparahan penyakitnya	mual, diare, rasa gatal, nyeri perut, sakit kepala dan konstipasi	Simpan pada suhu di bawah 30°C

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Tetrasiklin	<b>Tetrasiklin</b>	Super Tetra 250 mg	Hipersensitif, gangguan ginjal berat, Hamil, dan anak < 12 tahun.	Infeksi yang di sebabkan oleh mikroorganisme gram positif dan gram negatif yang sensitif terhadap Tetracyclin.	1 kapsul 3-4x sehari. Sebelum makan.	Mual, muntah, ruam kulit, urtikaria, nyeri epigastrium.	Simpan pada suhu di bawah 30°C.
	Doksisiklin	Doksisiklin	Hipersensitif terhadap doxycycline. Kehamilan dan menyusui.	Infeksi saluran pernafasan, saluran pencernaan, saluran kemih, dan infeksi jerawat.	Dewasa dan anak > 8 tahun dengan berat badan > 45 kg, 100 mg 2 kali sehari pada hari pertama, dilanjutkan 50 mg 2 kali sehari; anak > 8 tahun dengan BB < 45 kg hari pertama 4,4 mg/kgBB/hari dibagi menjadi 2 dosis, dan Selanjutnya 2,2 mg/kgBB/hari dibagi menjadi 2 dosis	Mual, muntah, kulit memerah, urtikaria, diare, fotosensivitas, peningkatan kadar urea darah, anemia hemolitik, trombositopenia, neutropenia, eosinofilia.	Simpan ditempat kering dengan suhu 20-25 derajat Celcius.
	<b>Minosiklin</b>	Nomika	Hipersensitivitas terhadap tetracycline.	Infeksi yang disebabkan oleh Organisme yang sensitive atau resisten terhadap tetrasiklin lain,	Dewasa: awal 2 kali sehari setiap 12 jam 200 mg, kemudian 100 mg. Anak usia lebih dari 8	Gangguan saluran cerna, ruam makulopapular dan eritema, reaksi hipersensitif, pusing, vertigo, mual,	simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
				terapi tambahan untuk amubiasis intestinal akut, akne berat.	tahun: awal 2 kali sehari setiap 12 jam 4 mg/kg BB kemudian 2 mg/kg BB. Gonore pada pasien yang sensitif terhadap penisilin: awal 2 kali sehari setiap 12 jam 200 mg, kemudian 100 mg. minimal 4 hari dengan 2-3 hari kultur pasca terapi. Karier meningokokus: 2 kali sehari setiap 12 jam 100 mg selama 5 hari. Infeksi Mycobacterium marinum 2 kali sehari 100 mg selama 5 hari. Lama terapi infeksi strep 10 hari dan sifilis 10-15 hari	tinitus, anemia hemolitik, trombositopenia, neutropenia dan eosinofilia.	langsung
Sulfa	sulfametoksazol-trimetoprim	Sulfametoksazol	Hipersensitif, gangguan hati dan	Obat ini untuk menangani infeksi	Dosis lazim untuk dewasa	Mual, Muntah, ruam kulit. Pada	Simpan pada suhu di

TUGAS KHUSUS PKL D3 FARMASI UMG\_TRIYA AGUSTINA SUSANTI\_221105013\_APOTEK CIPTA MEDIKA GKB

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
			ginjal, wanita hamil, menyusui	yang disebabkan oleh bakteri, seperti bronkitis, otitis media, dan infeksi saluran kemih. Selain itu, kotrimoksazol juga dapat digunakan untuk menangani dan mencegah Pneumocystis Carinii Pneumonia (PCP) pada pasien dengan daya tahan tubuh turun, seperti Penderita HIV/AIDS.	dan anak usia diatas 12 tahun: 2 kali sehari 1 tablet, selama 10-14 hari. Sesudah makan.	penggunaan jangka panjang pernah dilaporkan adanya megaloblastik anemia dan hal ini dapat ditolerir dengan pengobatan asam folinat.	bawah 30°C.

(2.b) ANTIJAMUR

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Polyenes	amphotericin B	Cazetin	Hipersensitif terhadap obat ini	Pengobatan kandidiasis rongga mulut dan saluran pencernaan	Dewasa : 1-2 ml 4x sehari Bayi & anak : 1-2ml 4x sehari	Diare , mual, muntah., sindrom stevens-jhonsons	simpan di bawah 30°C
Imidazole	ketoconazol	Ketoconazol krim	Hipersensitif terhadap ketoconazole	Pengobatan topikal infeksi dermatofit dikulit: tinea korporis tinea kruris , tinea manus dan tinea pedis yang disebabkan oleh trichophyton rubrum, trichopyton mentagrophytes, microsporum canis dan Epidermophyton floccosum, tinea (pityriasis) versikolor oleh mallaseria furfur , kandiasis kutan ( termasuk penggunaan luar pada vultitis) mikosis sistemik (kandidiasis, paraksidiodomikasis , cocci dioidomycosis, hiptoplasmosis).	Oleskan 1-2 kali sehari tergantung beratnya infeksi. Pengobatan harus diteruskan sedikitnya sampai beberapa hari sejak hilangnya semua gejala. Lama pengobatan biasanya tinea versikolor 2-3 minggu, tinea korporis 3-4 minggu, tinea pedis 4-6 minggu. (4-6 minggu), T. Kruris (2-4 minggu), Infeksi ragi (2-3 minggu), Dermatitis Seboroik (2-4 minggu).	Iritasi, pruritus, rasa terbakar dan reaksi alergi dapat terjadi selama pengobatan dengan ketoconazole krim.	Simpan pada suhu dibawah 30°C, terlindung dari cahaya
	<b>Mikonazol</b>	Mikonazol	Kontraindikasi penggunaan miconazole berupa riwayat hipersensitivitas	Obat ini dapat digunakan pada kondisi medis yang disebabkan oleh infeksi jamur di	Oleskan 2 kali per hari selama 2 sampai 4 minggu.	Beberapa efek samping yang mungkin terjadi antara lain: Rasa sensasi terbakar pada	Simpan di Tempat yang dingin, kering dan jauh dari sinar dan panas

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
			atau alergi terhadap miconazole (misalnya biduran atau bengkak pada kelopak mata), serta tidak boleh diberikan pada bayi dengan usia < 4 bulan	kulit, misalnya panu atau kurap, serta infeksi jamur sistemik yang terjadi secara luas di tubuh.		area setempat, Biduran, Muncul lenting-lenting di kulit, Gatal, Bercak putih (hipopigmentasi) di kulit, Kulit terkelupas, kemerahan, atau bengkak, Nyeri, atau tanda iritasi lainnya.	langsung
	<b>Klotrimazol</b>	Fungiderm	Jangan menggunakan obat ini untuk pasien yang memiliki riwayat hipersensitif pada clotrimazole atau obat golongan imidazole lainnya	Infeksi jamur pada kulit dan kuku karena dermatofit, ragi dan jamur lainnya.	Oleskan (Krim)/ taburkan (bedak) secukupnya 2-3 x pada bagian yang sakit selama 10-14 hari secara teratur dan tidak berhenti. Infeksi disela jari kuku membutuhkan waktu 1 bulan, aturan pakai oleskan tipis pada bagian yang membutuhkan	Kulit kering, pruritus, iritasi, rasa terbakar/ tersengat ringan atau sedang. Perubahan atropik local pada kulit (penggunaan lama dan intensif),	Simpan di tempat yang dingin, kering dan jauh dari sinar dan panas langsung
Triazole	<b>Flukonazol,</b>	Fluconazole 150 mg	Hipersensitif terhadap triazol. Penggunaan bersamaan dengan astemizole,	Menganitis kriptokokal, Kandidiasis sistemik, kandidiasis	Dewasa menginitis kriptokokal: hari ke-1 : 400 mg sebagai dosis	Sakit kepala, nyeri perut, diare, pusing, mual, ruam kulit, gangguan ginjal, leukopenia.	Simpan di bawah suhu 30°C

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
			cisapride, quinidine, terfenadine, pimozide, erythromycin	orofaringeal, kandidiasis vagina akut atau relaps, infeksi kandida superfisial, infeksi kandida, iskemik atau infeksi kriptokokal	tunggal; hari ke-2 dan seterusnya 200 - 400 mg per hari. Lama terapi : 6 - 8 minggu. Kandidiasis mukosal: 50 mg/hari selama 14 hari. Kandidiasis vagian: 150 mg sebagai dosis tunggal oral. Kandidiasis orofaringeal: Hari ke-1: 200-400 mg, diikuti oleh 100-200 Mg sekali sehari selama 7-21 hari.		
	<b>Itraconazole</b>	Itraconazole 100mg	Hamil, hipersensitif terhadap Itraconazole, gangguan ginjal berat.	Dermatomikosis, kandidiasis, mikosis sistemik, fungal keratitis, kandidiasis vagina.	Kandidiasis : 1 x sehari 1-2 tablet selama 3-7 minggu; Dermatomikosis : 1 x sehari 1 tablet selama 15 hari. Sesudah makan.	Mual, nyeri abdomen, sakit kepala, pusing, dispepsia, reaksi alergi.	Simpan pada suhu dibawah 30°C
Lainnya	<b>Griseofulvin</b>	Griseofulvin tab	Hipersensitif terhadap griseofulvin, lupus eritema tosus sistemik	Pengobatan infeksi jamur pada kulit, kulit kepala dan kuku bila pengobatan secara	Dewasa: 500 mg per hari dosis tunggal atau dosis terbagi. Anak-anak: 10	Pemakaian obat umumnya memiliki efek samping tertentu dan sesuai dengan masing-	Simpan pada suhu dibawah 30°C

TUGAS KHUSUS PKL D3 FARMASI UMG\_TRIYA AGUSTINA SUSANTI\_221105013\_APOTEK CIPTA MEDIKA GKB

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
			(SLE), porfiria, gangguan hati yang parah, kehamilan.	topikal gagal	mg per Kg BB dalam dosis tunggal atau dosis terbagi. Aturan pakai : dikonsumsi bersama dengan makanan	masing individu. Jika terjadi efek samping yang berlebih dan berbahaya, harap konsultasikan kepada tenaga medis. Efek samping yang mungkin terjadi dalam penggunaan obat adalah: Ruam kulit, urtikaria, kering pada mulut, mual, muntah, sakit kepala, diare.	

(2.c) ANTIVIRUS

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat HIV-AIDS	<b>NRTI (zidovudine, abacavir)</b>	Zidovudine	Neutropenia atau anemia berat neonatus dengan hiper bilirubinemia yang memerlukan terapi selain fototerapi atau dengan peningkatan transaminase.	Terapi infeksi HIV, profilaksis transmisi HIV dari ibu ke janin selama kehamilan dan kelahiran, profilaksis serta infeksi HIV pada neonatus	Dewasa dan anak-anak dengan BB di atas 30 kg: 250 mg atau 300 mg, diminum dua kali sehari dalam kombinasi dengan agen antiretroviral lainnya. Anak-anak dengan BB 8-13 kg 100 mg diminum dua kali sehari. Anak-anak dengan BB 14-21 kg 100mg diminum pagi hari, 200 mg diminum malam hari. Anak dengan BB 22-30 kg 200mg. diminum dua kali sehari	Sulit tidur, mual ringan, sembelit, nyeri sendi, sakit kepala, dan perubahan lemak di tubuh terutama pada bagian lengan, kaki, wajah, leher, dan dada	Simpan di tempat yang dingin, kering dan jauh dari sinar dan panas langsung.

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
	<b>NNRTI (efavirenz, nevirapine)</b>	Efavirenz	hipersensitivitas terhadap efavirenz atau komponen dari sediaan obat efavirenz	Mencegah bertambahnya jumlah virus HIV yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh.	Dewasa dan anak-anak dengan berat badan $\geq 40$ kg: 600 mg 1 kali sehari. Anak-anak dengan berat badan 3,5–4,9 kg: 100 mg 1 kali sehari. Anak-anak dengan berat badan 5–7,4 kg: 150 mg 1 kali sehari. Anak-anak dengan berat badan 7,5–14,9 kg: 200 mg 1 kali sehari. Anak-anak dengan berat badan 15–19,9 kg: 250 mg 1 kali sehari. Anak-anak dengan berat badan 20–24,9 kg: 300 mg 1 kali sehari. Anak-anak dengan berat badan 25–32,4 kg: 350 mg 1 kali sehari. Anak-anak dengan berat badan	Mual, muntah, ruam kulit, tubuh terasa lelah, sakit kepala, pusing, kantuk, insomnia.	Simpan di tempat yang dingin, kering dan jauh dari sinar dan panas langsung.

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
					32,5–40 kg: 400 mg 1 kali sehari.		
	<b>PI (saquinavir, indinavir)</b>	Indinavir	Peningkatan resiko terjadinya hipotesni jika digunakan dengan alfuzosin. Peningkatan resiko terjadinya aritmia jika digunakan amiodarone, pimozide, atau cisapride	Infeksi HIV dalam kombinasi dengan penghambat reverse transkriptase, nukleosida.	Dewasa: 800 mg tiap 8 jam. Jika pengobatan digabung dengan ritonavir, dosis indinavir menjadi 800 mg tiap 12 jam, sedangkan ritonavir 100-200 mg tiap 12 jam. Anak-anak usia 4-17 tahun: 500 mg/m <sup>2</sup> tiap 8 jam. Dosis maksimum 800 mg tiap 8 jam.	Sakit perut, mual, muntah, nafsu makan hilang, sakit kepala, sakit punggung, indera perasa berubah, diare.	Simpan di tempat yang dingin, kering dan jauh dari sinar dan panas langsung.
Herpes virus	acyclovir	Acyclovir	Hipersensitivitas terhadap asiklovir dan antivirus serupa.	Digunakan sebagai terapi dan Pencegahan infeksi yang disebabkan oleh virus, seperti	Oleskan ke dalam saku konjungtiva 5 kali dengan interval 4 jam dan lanjutkan terapi hingga 3 hari	Sensitisasi kontak, gangguan kulit dan jaringan subkutan seperti pruritus, ruam, fotosensitivitas,	Simpan pada suhu dibawah 30°C, terlindung dari cahaya

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
				herpes simpleks, herpes zoster (cacar air), infeksi virus Varicella-zoster.	setelah sembuh 7 hari	urtikaria, kerontokan rambut.	
Hepatitis B dan C	<b>interferon</b>	Peginterveron Alfa-2b	hipersensitivitas terhadap interferon alfa, seperti angioedema, urtikaria, bronkokonstriksi, anafilaksis, sindrom Stevens-Johnson, dan <i>toxic epidermal necrolysis</i> . Selain itu, obat ini juga dikontraindikasikan pada hepatitis autoimun, penyakit liver dekompensasi (dengan skor Child- Pugh >6), dan pada sirosis hepatis akibat hepatitis C kronik yang terjadi sebelum atau saat terapi	Sebagai terapi Tambahan untuk mencegah kekambuhan melonoma setelah dilakukan operasi pengangkatan jaringan tumor.	Dewasa: Sebagai monoterapi atau pengobatan tunggal, yaitu 1 mcg/kg berat badan sekali seminggu selama 24-48 minggu. Sebagai terapi Kombinasi dengan ribavirin (biterapi) atau dengan ribavirin dan obat antivirus lainnya (triterapi), yaitu 1,5 mcg/kg berat badan sekali seminggu. Durasi pengobatan yakni 48 minggu (untuk pasien dengan genotipe 1 atau untuk terapi yang sebelumnya	Mengantuk, kelelahan, pusing, sakit kepala, depresi, sulit tidur, mulut kering.	Simpan ditempat yang dingin, kering dan jauh dari sinar dan panas langsung

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
					<p>gagal) atau 24 minggu (untuk pasien genotipe 2 dan 3). Anak: Usia 3-18 tahun, sebagai terapi kombinasi dengan ribavirin, yaitu 60 mcg/m<sup>2</sup> sekali seminggu. Durasi pengobatan, yaitu 48 minggu (untuk pasien dengan genotipe 1) atau 24 minggu (untuk pasien dengan genotipe 2 dan 3). Lansia: Pengurangan dosis mungkin diperlukan</p>		
	<b>lamivudine</b>	Lamivudine	Hindari penggunaan pada pasien dengan kondisi: Sembelit, distensi abdomen, ileus, Kolitis ulseratif akut, disentri akut yang ditandai dengan tinja berdarah dan	Mengatasi infeksi virus hepatitis B dan HIV	Dosis awal pemakaian dewasa: 2 tablet. Dosis selanjutnya: 1 tablet, dengan maksimal pemakaian 3x sehari. Sebaiknya obat dikonsumsi	Pusing, terasa lemas, menyebabkan kantuk, kembung, mual muntah	Simpan pada suhu antara 20-25 derajat Celcius.

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
			demam tinggi. Enterokolitis bakterial yang disebabkan oleh Salmonella, Shigella, dan Campylobacter. Kolitis terkait antibiotic. Sakit perut tanpa diare.		setelah buang air besar		
Influenza A dan B virus	<b>amantadine</b>	Amantadine	Hipersensitivitas terhadap kandungan obat Amantadine, Penyakit gangguan fungsi ginjal, Glaukoma, Depresi Dermatitis atopik, Narkolepsi	Digunakan sebagai antivirus dan antiparkinson. Obat ini diindikasikan untuk beberapa penyakit seperti pengobatan dan terapi penyakit parkinson serta beberapa jenis influenza A.	Sebanyak 200 mg/hari atau sebanyak 100 mg/2kali sehari. Dosis bagi pasien yang mengalami CNS dapat diturunkan sampai dengan 100mg/hari. Pengobatan Amantadine harus dilakukan sesegera mungkin (sebaiknya dalam kurun waktu 24 – 48 jam setelah timbulnya gejala). Pengobatan dilakukan terus menerus sampai	Mual, muntah, sakit kepala, rasa mengantuk, insomnia, mulut kering, depresi, kegelisahan, sulit berkonsentrasi	Simpan pada suhu antara 20-25 derajat Celcius.

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
					dengan 5 hari atau 24-48 jam setelah gejala hilang. Untuk pasien anak-anak sebaiknya konsultasikan kembali ke dokter untuk penggunaan dosis yang tepat.		
	<b>rimantadine</b>	Rimantadine	persensitivitas terhadap ranitidin atau kandungan lain dalam sediaan	Mencegah atau mengobati jenis virus flu tertentu yaitu influenza A.	Ulserasi NSAID: 150 mg (1 tab) 2 kali sehari atau 300 mg (2 tab) sebelum tidur selama 8 minggu Dispepsia: 150 mg (1 tab) dalam 2 dosis selama 6 minggu Refluks gastro- esofagus: 150 mg (1 tab) 2 kali sehari atau 300 mg (2 tab) sebelum tidur selama 8-12 minggu Ulkus duodenum (H.Pylori): 150 mg (1 tab) dalam 2 dosis terbagi atau 300 mg (2	Mual, muntah, diare, kehilangan nafsu makan, sakit perut, mulut kering, insomnia, sakit kepala, kecemasan, sulit berkonsentrasi	Simpan pada suhu antara 20-25 derajat Celcius.

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
					tab) sebelum tidur diberikan dengan amoksisilin dan metronidazol selama 2 minggu. Ulkus lambung dan duodenum jinak: Dewasa dan anak > 12 tahun: 150 mg (1 tab) 2 kali sehari atau 300 mg (2 tab) sebelum tidur selama 4 minggu Anak		
	<b>oseltamivir</b>	Oseltamivir	hipersensitif terhadap oseltamivir atau komponen lain dalam obat ini. Bila terjadi kondisi anafilaksis dan reaksi kulit yang serius, obat harus segera dihentikan.	Untuk mengatasi infeksi virus, influenza tipe A (misalnya flu burung) atau B.	Dewasa: 75 mg, Bayi usia 0–1 bulan:2mg/kgBB, Bayi usia >1–3 bulan: 2,5 mg/kgBB, Bayi usia >3–12 bulan: 3 mg/kgBB, Bayi usia >1 tahun dengan berat badan ≤15 kg: 30mg, Bayi usia >1 tahun dengan berat badan >15–23 kg: 45 mg, Bayi usia >1	Sakit perut, sakit kepala,diare, mual, muntah, sulit tidur.	Simpan pada suhu antara 20-25 derajat Celcius.

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
					tahun dengan berat badan >23-40 kg: 60 mg, Bayi usia >1 tahun dengan berat badan >60 kg: 75 mg		

(2.d) ANTIPROTOZOA

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antiamoeba	metronidazole	Metronidazole	Hipersensitivitas terhadap metronidazol dan nitroimidazol lainnya. Penggunaan bersamaan dengan disulfiram dalam 14 hari terakhir. Pemberian bersamaan dengan alkohol atau produk yang mengandung propilen glikol selama atau 3 hari setelah penghentian terapi. Kehamilan selama trimester Pertama dalam Pengobatan trikomoniasis.	Pengobatan uretritis dan vaginitis karena Trichomonas vaginalis, amoebiasis intestinal dan hepar, pencegahan infeksi anaerob pasca operasi, giardiasis karena Giardia lambliasis	Trikomoniasis Dewasa: 2 g sebagai dosis tunggal selma 1 hari atau 500 mg 2x/hari atau 250 mg 3x/hari selama 7 hari. Anak: 15mg/kgB/ hari dalam 3 dosis terbagi selama 7-10 hari. Giardiasis Dewasa: 250-500 mg 3x/hari selama 5-7 hari atau 2 g 1x/hari selama 3 hari Anak: 5mg/kgB 3x/hari selama 5-7 hari. Infeksi anaerob serius	muntah, anoreksia, nyeri epigastrium kejang, neuropati perifer, gangguan daya penecapan, lidah berbulu, mual, gangguan gastrointestinal, urtikaria, ruam kulit, pruritus, angioedema, syok anafilaksis, pusing, mengantuk, sakit kepala, ataksia, urin berwarna gelap, leukopenia ringan	simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung

TUGAS KHUSUS PKL D3 FARMASI UMG\_TRIYA AGUSTINA SUSANTI\_221105013\_APOTEK CIPTA MEDIKA GKB

					Dewasa: 7.5 mg/kgBB tiap 6 jam. Maksimal 4 g per hari selama 7 hari. Dapat diberikan 1 jam sebelum makan		
Antimalaria	<b>Primaquine</b>	Primaquine	Hipersensitif	Malaria	<p>Pasien <i>malaria falciparum</i> diberikan dosis 0,25 mg/kgBB pada hari pertama saja. Dosis ini juga berlaku pada infeksi campuran antara <i>malaria falciparum</i> + <i>vivaks/ovale</i>.  Pasien <i>malaria vivaks</i> dan <i>oval</i> perlu diberikan dosis 0,25 mg/kgBB selama 14 hari.  Kekambuhan kasus <i>malaria vivaks (relaps)</i> perlu mendapatkan peningkatan dosis hingga 0,5 mg/kgBB selama 14 hari. Pasien <i>malaria malariae</i> tidak diberikan dosis primakuin,</p>	Mual, muntah, perut kram, detak jantung tidak teratur, ruam kulit, pusing.	simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung

					cukup obat ACT saja.		
	<b>artemisinin</b>	Artemisinin	<p>Riwayat alergi artemisinin.</p> <p>Malaria bersifat parah atau disertai komplikasi.</p> <p>Riwayat aritmia (gangguan irama jantung) atau bradikardia (denyut jantung lambat di bawah normal). Riwayat keluarga serangan jantung. Risiko pemanjangan interval QT bawaan (kelainan jantung yang dapat menyebabkan detak jantung tidak teratur, pingsan, atau bahkan kematian mendadak).</p> <p>Ketidakseimbangan elektrolit.</p> <p>Mengonsumsi obat-obatan yang dapat mempengaruhi detak jantung</p>	<p>Pengobatan malaria tanpa komplikasi yang disebabkan oleh infeksi Parasit <i>Plasmodium falciparum</i> atau <i>Plasmodium vivax</i></p>	<p>Dosis yang diberikan selama 3 hari berdasarkan berat badan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5kg (usia 0-1 bulan): ¼ tablet/hari</li> <li>- 6-10 kg (usia 2-11 bulan): ½ tablet/hari</li> <li>- 11-17 kg (usia 1-4 tahun): 1 tablet/hari</li> <li>- 18-30 kg (usia 5-9 tahun): 1 ½ tablet/hari</li> <li>- Usia 31-40 kg (10-14 tahun): 2 tablet/hari</li> <li>• 41-59 kg (usia ≥ 15 tahun) 3 tablet/hari</li> </ul>	<p>anemia (kekurangan darah), sakit kepala, pemanjangan interval QT, takikardia (denyut jantung cepat di atas normal), mudah lelah/lemah, demam, konjungtivitis (radang selaput pembungkus mata).</p>	<p>simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung</p>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\geq 60</math> kg (usia <math>\geq 15</math> tahun): 3 tablet/hari</li> </ul> <p>Jangan menghentikan pengobatan sebelum 3 hari meskipun gejalanya telah hilang</p>		
	doksisiklin	Doksisiklin	Hipersensitif terhadap doxycycline. Kehamilan dan menyusui.	Infeksi saluran pernafasan, saluran pencernaan, saluran kemih, dan infeksi jerawat	Dewasa : 2 kali sehari 1 tablet Dikonsumsi sesudah makan	Mual, muntah, kulit memerah, urtikaria, diare, fotosensivitas, peningkatan kadar urea darah, anemia hemolitik, trombositopenia, neutropenia, eosinofilia.	simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung

(2.e) ANTELMINTIK

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antelmintik	albendazole,	Albendazole	Sebaiknya hindari penggunaan obat jika memiliki riwayat hipertensif pada albendazole, benzimidazole, atau komponen lain di dalam obat ini, selain itu, ini kalangan yang tidak boleh menggunakan obat: anak berusia dibawah 2 tahun, wanita hamil, dan menyusui, pengidap sirosis hati.	Infeksi tunggal atau campuran dari cacing	Dewasa dan anak >2 tahun: 1 kaplet atau 10 ml sebagai dosis tunggal: strongyloidiasis dan taeniasis: sehari 1 kaplet atau 10 ml diberikan selama 3 hari berturut-turut. Tidak diperlukan pencahar atau puasa.	Mual, muntah, sakit perut, sakit kepala, pusing, rambut rontok (sementara).	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung
	mebendazole,	Mebendazole	Obat ini tidak untuk diberikan untuk ibu hamil, anak usia dibawah 5 tahun, serta individu yang mengalami hipersensitivitas atau alergi terhadap komponen obat ini	Obat cacing untuk infeksi cacing kremi, cacing gelang, cacing tambang, cacing cambuk, atau infeksi cacing campuran tersebut.	Dewasa: 1 tablet kunyah diberikan sekali sehari. Anak di atas 5 tahun: sama dengan dosis dewasa.	Kadang-kadang terjadi nyeri perut, diare, sakit kepala, demam, gatal-gatal, dan ruam kulit.	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung
	pirantel pamoat, dietilkarbamazin(DEC), piperazine	Pirantel pamoat	Obat ini pantang dikonsumsi jika memiliki kondisi seperti: penyakit hati, alergi terhadap pyrantel pamoat, anak dibawah usia 2 tahun.	Mengatasi infeksi cacing kremi, cacing tambang, dan cacing gelang	Infeksi tunggal atau campuran karena cacingan yang rentan. Dewasa: 10 mg/kg sebagai dosis tunggal. Anak: 10 mg/kg sebagai dosis tunggal.	ruam, mual, muntah, kram perut, diare, penurunan nafsu makan, sakit kepala, insomnia, mengantuk, pusing	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung

## (2.f) OBAT TB

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat TB	Rifampisin	Rifampisin	Penderita hipersensitif, penderita gangguan saluran empedu, serta selama kehamilan trimester pertama. Neuritis optik. Anak usia kurang dari 13 tahun.	Tuberkulosis dan Lepra Terapi penyakit tuberculosi (TB) paru yang resistensi.	Tuberkulosis : Dewasa 450-600mg/hari sebagai dosis tunggal. Maksimal: 600mg/hari. Lepra : Dewasa 450-600mg/hari. Paling baik diberikan pada saat perut kosong 1 jam sebelum atau 2 jam sesudah makan. Dosis lazim: 15- 25 mg per kg berat badan per hari dosis Tunggal. Pasien yang belum pernah diobati dengan obat anti tuberkolusis: 15 mg per kg berat badan per hari dosis Tunggal. Diberikan sesudah makan	Efek Gastrointestinal, fungsi hati abnormal, ikterus, demam disertai gejala seperti flu.	Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
	Etambutol	Santibi	Neuritis optik. Anak usia kurang dari 13 tahun.	Terapi penyakit tuberculosis (TB) paru yang resistensi.	Dosis lazim: 15-25 mg per kg berat badan per hari dosis Tunggal. Pasien yang belum pernah diobati dengan obat anti tuberculosis: 15 mg per kg berat badan per hari dosis Tunggal. Diberikan sesudah makan	Neuritis retrobulbar dengan penurunan daya penglihatan, skotoma sentral buta warna hijau-merah, ruam alergi, gangguan susunan saraf pusat.	Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung
	Isoniazid	Ihna	Hepatitis atau penyakit hati yang diinduksi oleh obat, epilepsi, gangguan ginjal	Terapi penyakit tuberculosis (TB) dalam kombinasi dengan obat anti tuberculosis lain	Sehari 5mg/kgBB sampai 300 mg Sebagai dosis Tunggal, sebaiknya diberikan saat Kondisi perut kosong: 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan.	Neuropati perifer dan efek neurotoksik lainnya, mual, muntah.	Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung
	Pirazinamid	Sanazed	Riwayat hipersensitif terhadap pyrazinamide	terapi tuberculosis dikombinasikan dengan obat-obat anti TB lainnya	Dewasa: 20-35 mg/kgBB/hari. Maksimal 3 g, dibagi dalam 3-4 dosis. Anak : 3-4 dosis, berikan bersamaan dengan makan	Mata atau kulit berwarna kuning martralgia, anoreksia, mual, demam	Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung

(2) ANTIHISTAMIN DAN ANTIALERGI

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Generasi I	chlorpheniramine	Orpen	Penggunaan pada anak usia <2 tahun tidak dianjurkan kecuali atas petunjuk dokter, tidak boleh digunakan pada bayi baru lahir, prematur, atau penderita seramgan asma akut	Pilek, urticaria (gatal-gatal atau biduran), seasonal hayfever, rhinitis, pengaruh pemakaian obat-obatan seperti sulfa atau penicilin.	Dewasa 1 kaplet 3-4 kali perhari. Anak 6-12 tahun ½ kaplet 3-4 kali perhari, 2-6 tahun ½ kaplet 3-4 kali perhari	Kelemahan otot, tinitus, gangguan darah, reaksi alergi, sakit kepala, hipotensi.	Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung
	Diphenhyramine	Diphenhyramine	Hipersensitivitas, Penggunaan sebagai anastesi lokal karena efek nekrosis, Ibu menyusui, Bayi baru lahir dan bayi prematur	Mencegah mabuk perjalanan, Meredakan reaksi alergi pada tubuh, seperti mata merah, iritasi, gatal, dan berair; bersin-bersin, serta pilek	Dewasa: 10 - 50 mg sehari, jika perlu dapat ditingkatkan hingga 100 mg sehari, maksimum 400 mg sehari. Anak- anak: 5 mg/kg sehari atau 150 mg/m persegi sehari dalam dosis terbagi, maksimum 300 mg sehari.	Rasa kantuk, gelisah, penglihatan kabur, euforia, kejang, lelah, kesulitan, berkemih, hipotensi, fotosensitivitas, anoreksia, mulut kering, mual, muntah, takikardia, vertigo	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
Generasi II	<b>Ketotifen</b>	Intifen	Hipersensitif, Penggunaan Bersama antidiabetic oral	Pencegahan jangka panjang untuk asma brokial.	Dewasa: 2x sehari 1 tablet, bila diperlukan dapat ditingkatkan hingga 2x sehari 2 tablet. Anak >3 tahun: 2x sehari 0,5 sesudah makan	Mulut kering, pusing, mengantuk	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
	loratadine	Loratadine	Hipersensitif terhadap Loratadine.	Mengatasi gejala alergi, seperti bersin- bersin, pilek,	Dewasa dan anak usia lebih dari 12 tahun :	Sakit kepala, mengantuk, kelelahan, gugup. Gangguan	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung

				hidung tersumbat, dan ruam kulit yang terasa gatal.	10 mg sekali sehari atau 5 mg dua kali sehari. Anak usia 2-12 tahun:BB kurang dari 30 kg: 5 mg sekali sehari. BB lebih dari 30: 10 mg, sekali sehari. Dikonsumsi sebelum atau sesudah makan.	gastrointestinal: Mulut kering, nyeri perut, mual, muntah, diare, gastritis. Gangguan metabolisme dan nutrisi: Nafsu makan meningkat.	dari cahaya
	Cetirizine	Cetirizine	Hindari penggunaan pada pasien dengan riwayat hipersensitif Terhadap Cetirizine, gangguan ginjal berat	Rinitis menahun, rinitis alergi seasonal, konjungtivitis, pruritus, urtikaria idiopati kronis.	Dewasa dan anak umur >12 tahun: 10 mg sekali sehari. Anak umur 2-6 tahun: 2,5 mg 2x sehari. Anak umur 6-12 tahun: 5 mg 2x sehari. Lansia: Belum ada data untuk menurunkan dosis pada pasien lansia. Insufisiensi ginjal: dosis 1/2 kali dosis yang dianjurkan. Sebelum atau sesudah makan	Gangguan jantung: Takikardia. Gangguan pencernaan: Nyeri perut, mulut kering, mual, diare, muntah, Kelelahan, asthenia, malaise, edema. Gangguan sistem saraf: Pusing, sakit kepala, kejang-kejang, agitasi	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya
Generasi III	<b>Desloratadin</b>	Delsotine	Hipersensitivitas	Meredakan gejala	Dewasa dan	Mulut kering,	Simpan pada

				simptomatik rinitis alergi nasal dan non-nasal dan pruritus. Sesuaikan jumlah dan ukuran dosis pada pasien $\geq 12$ tahun.	anak >12 tahun 5 mg 1 x sehari. Gangguan hati atau ginjal awal 5 mg setiap hari. Sesudah makan.	kelelahan, mengantuk, radang tenggorokan, sakit kepala, mual, pusing.	tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung.
--	--	--	--	---	---	---	---

### (3) SITOSTATISTIKA

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Sitostatika	<b>siklofosamid</b>	Cyclophosphamide	Hipersensitivitas	Digunakan sebagai agen antineoplastik untuk kanker seperti leukimia dan agen immunosupresif pada kasus sindrom nefrotik kelainan minimal pada anak	Pemberian intravena diberikan dengan dosis 40-50 mg/kg BB dalam dosis terbagi selama 2-5 hari, dapat diulang dengan interval 2-4 minggu, terapi kontinu diberikan dengan dosis 1-2,5 mg/kg BB/hari.	Mual, muntah, hilang nafsu makan, diare, sakit perut, kulit dan kuku berubah warna menjadi gelap, rambut rontok, sariawan di mulut dan lidah.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, suhu 20-25°C.
	<b>Doksorubisin</b>	Doxorubicin	Hipersensitivitas	Terapi pengobatan leukimia akut, sarkoma jaringan lunak dan tulang belakang, kanker payudara, kanker	Dosis alternatif: 60-75 mg/m <sup>2</sup> tiap 21 hari sekali dosis alternatif 2: 60 mg/m <sup>2</sup> tiap 14	Mual, muntah, diare, kehilangan nafsu makan, rambut rontok, selama pengobatan infeksi jamur dan kuku.	Disimpan pada kulkas dengan suhu 2-8°C

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
				ovarium, kanker kandung kemih, kanker teroid, kanker paru, kanker lambung, limfoma	hari sekali, dosis alternatif 3: 40-60 mg/m <sup>2</sup> tiap 21-28 hari sekali, dosis alteernatif 4: 20 mg/m <sup>2</sup> tiap 1 minggu sekali.		
	<b>5-fluorourasil,</b>	Flourouracil	Hipersensitivitas	Mengobati berbagai jenis penyakit kanker seperti kaner usus besar (kolorektal), kanker lambung dan kanker payudara	Dosis flourourasil yang direkomendasika n ialah 200 mg/m <sup>2</sup> LPT. Obat diberikan melalui infus IV secara terus menerus dalam tidak minggu yang terhitung sebagai satu siklus.	Mual, muntah, nafsu makan berkurang, diare atau sembelit.	Disimpan pada suhu 20-25°C
	<b>carboplatin</b>	Carboplatin	Hipersensitivitas	Menangani kanker tertentu, seperti kanker ovarium	Dewasa: untuk pasien dewasa yang belum pernah mendapatkan pengobatan sebelumnya. Dosisnya adalah 400 mg/m <sup>2</sup> LPT	Sakit perut, nyeri atau rasa tidak enak badan, mual, dan mutah, nyeri otot, sendi, atau tulang.	Simpan pada suhu ruang 15°C

TUGAS KHUSUS PKL D3 FARMASI UMG\_TRIYA AGUSTINA SUSANTI\_221105013\_APOTEK CIPTA MEDIKA GKB

<b>Golongan</b>	<b>Nama Obat</b>	<b>Nama Obat di Tempat PKL</b>	<b>Kontraindikasi</b>	<b>Indikasi</b>	<b>Dosis dan Cara Pakai</b>	<b>Efek Samping</b>	<b>Cara Simpan</b>
	<b>Metroteksat</b>	Rheutrex	Gangguan ginjal hati berat	Mengatasi kanker seperti kanker payudara, kanker tulang,	Dosisnya 15-30 mg perhari, selama 5 hari, dosis kembali diberikan setelah jeda minimal 1 minggu, pengulangan dosis dapat dilakukan 3-5 kali.	Sakit kepala, pusing, kantuk, gusi terasa sakit, dan bengkak.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung.

**(4) OBAT SISTEM SARAF**

<b>Golongan</b>	<b>Nama Obat</b>	<b>Nama Obat di Tempat PKL</b>	<b>Kontraindikasi</b>	<b>Indikasi</b>	<b>Dosis dan Cara Pakai</b>	<b>Efek Samping</b>	<b>Cara Simpan</b>
Obat hipnotik sedatif/antiansietas	benzodiazepin (alprazolam, diazepam, lorazepam, nitrazepam)	Alprazolam	Hindari penggunaan alprazolam pada pasien dengan gangguan hati berat. Insufisiensi pernapasan berat (paru-paru tidak dapat berfungsi dengan baik). Penggunaan bersamaan dengan ketoconazole dan itraconazole	Alprazolam digunakan untuk mengurangi kecemasan, gejala depresi, dan gangguan panik dengan atau agorafobia	Gangguan kecemasan 0,25-0,5mg 3 kali/hari. Pasien geriatrik atau keadaan yang lemah 0,25mg 2-3 x/hari	Penglihatan kabur, sakit kepala, mengantuk, pusing, ataksia, (pudarnya kemampuan koordinasi atas gerakan otot), anesia (kondisi terganggunya daya ingat), kebingungan dan halusinasi, insomnia (gejala kelainan dalam tidur berupa kesulitan untuk tidur), tremor (getaran atau menggigil yang terjadi secara sadar)	Disimpan pada suhu 20-25°C
	<b>Barbiturat (fenobarbital)</b>	Phenobarbital	Hipersensitivitas, gangguan hepar dan ginjal yang berat	Digunakan untuk pengobatan kejang termasuk epilepsi, serta untuk efek sedasi dan hipnotik.	Dewasa : 60-180 mg Per hari pada malam hari	Dosis ketidaknyamanan lambung kesulitan tidur, pusing, gelisah, gugup,	Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung.
	<b>Lainnya (buspiron)</b>	Xiety	Hipersensitif	Gangguan ansietas umum dan gejala ansietas nonspesifik dengan atau tanpa depresi	Gangguan ansietas umum dan gejala ansietas nonspesifik dengan atau tanpa depresi	Dosis awal: 3 x sehari 5 mg dapat ditingkatkan menjadi 5 mg pada interval 2-3 hari sampai efek terapeutik optimal	Dosis ketidaknyamanan lambung kesulitan tidur, pusing, gelisah, gugup,

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
					diperoleh total dosis harian: 20-30 mg per hari dalam 2-3 dosis terbagi maks: 60 mg setiap hari		
Obat analgetik sentral	fentanil	Fentanyl	Depresi pernapasan, cedera kepala, alkoholisme akut, serangan asma akut, intoleransi, hamil, menyusus	Suplemen analgesik narkotik pada anesesi regional atau general.	Sebagai analgesik tambahan dosis rendah 2mcg/kg, dosis sedang 2-20mcg/kg, dosis tinggi 20-50mcg/kg.	Depresi napas, kekakuan otot, hipotensi, mual, muntah, menggigil, pusing, reaksi alergi	Simpan pada suhu antara 20-25 °C, dan terhindar dari cahaya
	petidin	Penitidin	hipersensitivitas terhadap obat ini.	untuk manajemen nyeri derajat sedang-berat, misalnya akibat persalinan, pankreatitis atau kolelitiasis	Dosisnya sekitar 25 - 150mg melalui injeksi IM atau SC setiap 4jam sesuai kebutuhan; juga dapat diberikan melalui injeksi IV lambat dengan dosis 25-50 mg diulang setiap 4 jam sesuai kebutuhan. Anak: 0,5-2 mg/kg melalui injeksi IM atau	Sesak napas, napas menjadi lebih lambat, depresi disertai tubuh kelelahan.	Simpan dalam wadah tertutup baik, tidak embus cahaya, pada suhu ruang

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
					SC, dapat diulang setelah 4 jam sesuai kebutuhan. Lansia: Mulai dari dosis paling rendah		
	morfin	Morfina	Pasien dengan hipersensitivitas terhadap obat dan pasien dengan gejala depresi pernapasan	Meredakan nyeri yang tidak bisa diatasi dengan analgesik non narkotik.	Dewasa: 5–20 mg, tiap 4 jam. Anak usia 1-5 tahun: 5 mg, tiap 4 jam. Dosis maksimal adalah 30 mg. Anak usia 6-12 tahun: 5–10 mg, tiap 4 jam	Mual, muntah, mengantuk, Berkeringat tanpa henti, merasakan sakit pada otak karena berangsur angsur menyerang saraf otak, membuat suasana hati mudah berubah ubah dan tidak nyaman	Simpan wadah dan penyimpanan Dalam wadah tertutup rapat, tidak tembus cahaya.Simpan pada suhu tidak lebih dari 40°
	nalokson.	Nalaxone	Tidak boleh diberikan kepada orang yang alergi terhadap obat. Beri tahu dokter jika menderita penyakit jantung atau pernah mengalami kejang	depresi pernapasan akibat overdosis nalokson.	Dewasa: 0,4–2 mg, dosis dapat diulang tiap 2-3 menit jika diperlukan.	Mual, muntah, sakit perut, diare.	Simpan pada Suhu 25°C,lindungi dari cahaya.
Obat antidepresan	amitriptilin, fluoksetin,	Amitriptyline Hydrochloride	Jangan diberikan pada penderita skizofrenia. Penderita riwayat aritmia, infark jantung, kelainan jantung bawaan.	Amitriptyline digunakan pada keadaan ansietas dan depresi	Dosis awal sehari 3 – 4 tablet, kemudian Ditingkatkan sampai 6 tablet dalam dosis terbagi.	Efek samping berupa rasa kering di mulut, sembelit, retensi urin, sedasi, leukopenia, nausea, postural hipotension, dizzines, tremor, skin	Simpan pada suhu dibawah 30°C, terlindung dari cahaya.

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
			Penderita yang peka terhadap anti depresan trisiklik			rash.	
Obat anestesi lokal	bupivakain, lidokain	Lidocain	Hipersensitivitas terhadap lidocaine atau anestesi lokal tipe amide, Obat topikal sebaiknya tidak diberikan pada kulit yang sedang meradang atau luka, Mengalami gagal jantung kronik, Hipovolemia, Mengalami sindrom Wolf Parkinson White.	Digunakan untuk tujuan anestesi lokal atau regional Lidocain juga dapat digunakan sebagai antiaritmia dalam manajemen aritmia ventrikel.	Dosis maksimal dewasa adalah 7 mg/kgBB dan tidak melebihi 500 mg. Dosis maksimal anak adalah 3 mg/kgBB	sakit kepala, hipotensi, mual dan muntah, konstipasi, pusing, kesemutan, tremor, iritasi kulit, kemerahan atau bengkak di area suntikan.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung.
Obat sistem saraf otonom (antikholinergik, kholinergik)	<b>prostigmin, atropin, ipratropium, skopolamin, triheksifenidil</b>	Atropin sulfat	Alergi, bumil, busui	Untuk kandung kemih dan usus	Sesuai aturan dokter	Mual, pusing	Simpan disuhu < 30°
Obat sistem saraf otonom (adrenergik, antiadrenergik)	klonidin, fenilefrin, noradrenalin, adrenalin, fenoterol, terbutalin, salbutamol, propanolol, atenolol, prazosin	Salbutamol	Hipersensitif	Kejang bronkus pada semua asma bronkial, bronkitis kronis dan emfisema.	Dewasa : 3-4 kali sehari 2-4 mg tablet. Anak-anak berusia 6-12 tahun : 2 kali sehari 2 mg. Anak berusia 2-6 tahun : 3 kali sehari 1-2 mg. Sebelum makan	Takikardi, palpitasi, mual, muntah, kram otot, tremor, sakit kepala.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung.

**(5) OBAT KARDIOVASKULAR**

**(6.a) Obat antihipertensi**

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Diuretik	furosemid,	Furosemid	Obat ini tidak boleh diberikan kepada pasien dengan kondisi: Hipersensitif terhadap Furosemide dan Sulfonamide. Anuria atau gagal ginjal. Memiliki penyakit Addison. Mengalami Hipovolema atau dehidrasi. Keadaan prekomatosa yang berhubungan dengan sirosis hati.	Edema akibat gangguan jantung, hati, dan ginjal, serta hipertensi.	Dewasa: sehari 1-2 kali 1-2 tab, maksimal 5 tab sehari atau dosis awal 40 mg IM/IV, Edema paru akut: dosis awal 40 mg IV, dapat dilanjutkan 20-40 mg setelah 20 menit.	Haus, hiperurisemia, hipokalemia, hiponatremia, sakit kepala, mengantuk, kram otot, hipotensi, mulut kering, haus, lemah, lesu, gelisah, oliguria, gangguan saluran saraf pusat, gangguan hematologi, gangguan saluran cerna.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung.
	HCT	HCT	Hipersensitivitas terhadap tiazid atau sulfonamida. Anuria.	digunakan sebagai obat anti hipertensi yang bekerja dengan mengurangi kemampuan ginjal untuk menyerap terlalu banyak natrium yang bisa menyebabkan retensi cairan.	Dewasa untuk edema : 5-10 mg sehari pada pagi hari. Dosis untuk Hipertensi: 12,5-25 mg perhari. Dosis untuk Nefrokalsinosis	Ketidakseimbangan elektrolit, anoreksia, mual, muntah, sakit kepala, hiperurisemia, hiperglikemia, hiperlipidemia.	Simpan pada tempat sejuk Dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung.

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
					s: 25 mg 1 kali sehari. Dosis untuk Osteoporosis: 25 mg 1 kali sehari. Dosis untuk Diabetes insipidus: 50 mg 1 kali sehari.		
	Spironolakton	Spironolactone 25 mg	Hiperkalemia, gagal ginjal berat digunakan bersama diuretik hemat Kalium dan suplemen kalium	Pengobatan Hipertensi atau edema yang refrakter, edema, yang disebabkan oleh kongestif heart failure, serosis hepatic dengan ascites, sindrom nefrotik, hipertensi idiopatik, primary hyperaldosternism	Sehari 50-100 mg dalam dosis tunggal/terbagi Dewasa sehari 25-200mg.	Gangguan gastrointestinal, sakit kepala, hirsutisme, ataksia, bingung, Ginekosmatia, gangguan menstruasi, impotensi, ruam kulit, hiponatremia, hiperkalemia.	Simpan pada tempat sejuk Dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung.
	Amilorid	Lorinid mite	Sensitif terhadap tiazid, sulfonamid, amilorid.Hiperkalemia, terapi dengan diuretik hemat K lain dan suplemen K, anuria, gagal ginjal akut, anak.	Hipertensi esensial, Edema akibat CHF/Gagal Jantung Kongestif, Sirosis Hepatik disertai Asites.	1 tablet perhari sesudah makan	Imbalans elektrolit, anoreksia, gangguan GI, parestesia, haus, pusing,hiperurisemia, hipotensi postural, ruam kulit, pruritus, lemah, kram otot, perubahan psikiatrik atau visual ringan, meningkatkan konsentrasi BUN. Jarang : kolestatik	Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari dan jauhkan dari jangkauan anak

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
						jaundice, pankreat	
CCB	Amlodipine,	Amlodipine 5, 10 mg	Hipersensitif	Hipertensi, angina stabil, angina vasopatik.	Dewasa: Hipertensi dan angina: Dosis awal 1 x sehari 5 mg, dapat ditingkatkan hingga dosis max.10 mg. Anak, usia 6-17 tahun: Dosis awal 1 x sehari 2,5 mg , dapat Ditingkatkan menjadi 5 mg sekali sehari setelah interval 4 minggu sesuai dengan respons klinis. Lansia: Dosis awal 2,5 mg sekali sehari	Sakit kepala, pusing, mengantuk, debaran jantung, sakit perut, mual, edema , kelelahan. Pasien (6-17 thn): Vasodilatasi, epistaksis, kelemahan.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung
	nifedipin	Adalat oros 30 mg	Hipersensitif terhadap nifedipin atau penghambat kanal kalsium dihidropiridin, syok kardiovaskuler.	Hipertensi, jantung koroner, angina pektoris pasca infark (kecuali 8 hari pertama pasca infark miokard akut)	1 kali sehari 1 tablet. Terapi Awal : 1 kali sehari 30 mg. Dosis Awal : 1 kali sehari 20 mg dapat dipertimbangkan jika ada	Sakit kepala, pusing, edema, vasodilatasi, astenia, edema perifer, palpitasi, konstipasi.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
					indikasi medis. Tablet tidak boleh dikunyah atau dihancurkan		
	<b>verapamil,</b>	Soptin	Gangguan konduksi berat (blok AV derajat 2 dan 3, blok SA), hipersensitif terhadap verapamil HCl, hipotensi (TD sistolik < 90 mmHg) atau syok kardiogenik, infark miokard akut terkomplikasi (bradikardi, hipotensi, gagal vertikal kiri), sindroma sick sinus	Hipertensi	1 kaplet pada pagi hari. Penurunan tekanan darah bertahap : 0.5 kaplet pada pagi hari, setelah 2 minggu dapat ditingkatkan menjadi 2 kaplet perhari dalam dosis terbagi. Aturan Pakai Bersama makanan atau segera sesudah makan	Blokade AV, sinus bradikardi, hipotensi, konstipasi	Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari dan jauhkan dari jangkauan anak
	<b>Nicardipine</b>	Nicardipine	stenosis aorta yang parah dan hipersensitivitas terhadap nicardipine	Untuk menurunkan tekanan darah pada hipertensi. Dengan lebih ter kendalinya tekanan darah, risiko timbulnya komplikasi akibat hipertensi, seperti serangan jantung, gagal jantung, stroke,	Dosis awal pemberian nicardipine adalah 3-5 mg per jam melalui infus. Dosis dapat ditingkatkan hingga maksimal 15	Pusing, sakit kepala, mual	Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari dan jauhkan dari jangkauan anak

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
				gagal ginjal, atau gangguan penglihatan, akan menurun	mg per jam jika diperlukan. Kurangi dosis hingga 2–4 mg per jam jika kondisi dan tekanan darah pasien mulai stabil		
ARB	Valsartan	Valsartan 80 mg	Hipersensitivitas, gagal hati berat, sirosis hati, obstruksi sal empedu.	Hipertensi, gagal jantung, dan pasca infark miokard	Hipertensi : 1 kali sehari, 80 mg (maksimum 160 mg). - Gagal jantung : dosis awal : 2 kali sehari 40 mg, dosis maksimal : 320 mg. - Pasca-infark miokard : dosis awal : 2 kali sehari 20 mg, dosis target : 2 kali sehari 160 mg.	Sakit kepala, pusing, lelah, hipokalemia, hiperuresimia, hipotensi postural, peningkatan kadar lemak dalam darah	Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung
	candesartan	candesartan	Hipersensitifitas	Hipertensi	Pasien hipertensi: Dosis awal 4 mg per hari dan dapat ditingkatkan hingga 16 mg, satu kali sehari. - Pasien gagal	Infeksi saluran pernafasan bagian atas, nyeri punggung, dan pusing.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
					jantung : 4 mg per hari		
	Irbesartan	Irbesartan	Hamil dan laktasi	Hipertensi esensial, untuk menurunkan mikro dan makro albuminurea pada pasien hipertensi dengan diabetik nefropati yang disebabkan oleh Non-Insulin Dependent Diabetic Mellitus (NIDDM).	Dosis awal dan pemeliharaan : 150 mg sekali sehari. Dapat ditingkatkan sampai dengan 300 mg atau Ditambah dengan obat antihipertensi lain.	Sakit kepala, gangguan kecemasan, muntah dan kelelahan	Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung
	Telmisartan	Telmisartan	Kehamilan, menyusui, hipertensi retrovaskular, gangguan ginjal dan transplantasi ginjal, depleksi volume intravaskular, blokade ganda sistem renin-angiotensin-aldosteron, hiperkalemia	Hipertensi esensial	Diberikan 80 mg sekali sehari	Gangguan Gi, artralgia, berkeringat banyak, gangguan penglihatan, vertigo, infeksi saluran napas atas, cemas, eksema, kram atau nyeritungkai, tendinitis, gejala influenza, nyeri dada danpunggung, milgia, ISK.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung
ACEI	Kaptopil	Kaptopil 25 mg	Hipersensitif	Hipertensi ringan s/d sedang pada pasien dewasa dan anak-anak. Pengobatan	Awal : sehari 2 kali 12.5 mg. Ditingkatkan menjadi 25-50	Pruritus, gangguan indera pengcapan, gangguan proteinuria,	Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
				gagal jantung kongesti, digunakan dengan diuretik atau digitalis	Mg 2-3 hari Hipertensi berat: s/d 450 mg/hari. kategori kehamilan.	meningkatnya nilai nitrogen urea darah dan kreatinin, neutropenia.	cahaya matahari langsung
	Lisinopril	Lisinopril	Hipersensitif, dehidrasi karena sakit atau diare, serangan jantung, ibu menyusui, anak dibawah usia 6 tahun	Hipertensi essensial, Hipertensi renovaskuler, Gagal jantung kongestif, Infark miokard	Hipertensi: Dosis Awal : 1 kali sehari 1 tablet; Dosis penunjang lazim : 20 mg sehari; Maksimal : 80 mg sehari. Sesudah makan	Sakit kepala, mual dan muntah, diare, batuk kering	Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung
	Ramipril	Ramipril	Pasien yang memiliki Riwayat hipersensitif terhadap Ramipril atau obat-obat yang termasuk ACE inhibitor lain. Ibu hamil atau berencana untuk hamil. Riwayat angioedema (herediter atau idiopatik) atau pernah mengalami angioedema saat menggunakan	Hipertensi ringan sampai sedang	Hipertensi : diawali dengan 2.5 mg sekali sehari. Pemeliharaan : 2.5-5 mg/hari. Maksimal : 10 mg/hari. Pasien yang diobati dengan diuretika : jika memungkinkan, diuretika dihentikan 2-3 hari sebelum pengobatan dimulai. Maksimal : 2.5	Efek samping yang paling umum adalah peningkatan serum kreatinin, pusing, dan sinkop. Batuk juga sering terjadi karena peningkatan kadar bradikinin. Batuk akan segera hilang jika Pengobatan dihentikan. Efek samping lainnya adalah kemungkinan terjadinya hipotensi (tekanan darah rendah)dangagal ginjal akut.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
			obat-obat golongan inhibitor ACE. Pasien dengan diabetes melitus		mg/hari. Pengobatan setelah infark miokardial : diawali dengan 1.25 - 2.5 mg 2 kali sehari. Maksimal : 10 mg/hari.		
Beta blocker	Atenolol	Betablok	Hipotensi. Bradikardia. Penyakit arteri perifer berat. Syok kardiogenik. Asidosis metabolik. Gagal jantung yang tak terkompensasi	Mengobati tekanan darah tinggi dan penyakit komplikasi yang diakibatkan darah tinggi.	Dosis dewasa: Sebesar 2,5 mg disuntikkan secara intravena dengan kecepatan 1 mg/menit, diulang tiap 5 menit jika diperlukan dengan maksimal 10 mg	menimbulkan efek samping berupa tubuh yang terasa dingin. Hal ini akibat berkurangnya aliran darah ke tangan dan kaki. Pastikan untuk menghindari rokok, sebab dapat memperburuk efek ini	Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari dan jauhkan dari jangkauan anak
	Propranolol	Propranolol 10 mg	Tidak boleh diberikan pada penderita syok kardiogenik, sinus bradikardia dan asma, Berhati-hati dalam pemberian untuk penderita diabetes, gangguan tiroid, gangguan hati serta ginjal.	Terapi hipertensi, angina, aritmia, pencegahan migrain	Dewasa dan anak > 12 tahun untuk hipertensi : 20 mg, 3-4 kali sehari; aritmia : 10-20 mg, 3-4 kali sehari; angina : 10-20 mg, 3-4 kali	Lemah, lesu, mual, bradikardi (denyut jantung lebih lambat), konstipasi, diare	Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
					sehari; mencegah migrain : 40 mg,2-3 kali sehari. Anak- anak : aritmia : 0,5 mg/kgBB/hari dibagi 3-4 kali pemberian; hipertensi : 1-3 mg/kgBB/hari dibagi 3 kali pemberian. Berikan sebelum makan		
	Bisoprolol	Bisoprolol	Hipersensitivitas, gagal jantung akut,	Sebagai terapi tunggal atau kombinasi dengan antihipertensi lain	Hipertensi dan angina: 5 mg - 10 mg per hari. - Gagal jantung kronik stabil: 1.25 mg per hari pada minggu pertama. Dosis dapat ditingkatkan secara bertahap. - Pada penderita bronkospastik, gangguan hati (hepatitis atau sirosis) dan	Efek samping yang mungkin terjadi dalam penggunaan obat adalah: Kram abdomen, diare, pusing, sakit kepala, mual, denyut jantung lambat, tekanan Darahrendah, keadaan mati rasa, kesemutan, ekstremitas dingin, nyeri tenggorokan, dan sesak napas atau mengi, kelelahan.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
					gangguan ginjal (bersihan kreatinin kurang dari 40 ml/menit): dosis awal 2.5 mg sekali. Sesudah maka		
Alfa blocker	Prazosin, hidralazin	Minipress	Meningkatan efek penurunan tekanan darah jika digunakan bersama obat antihipertensi lain, termasuk diuretik atau penghambat beta (beta blockers) Peningkatan risiko terjadinya hipotensi jika digunakan dengan obat phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitors, seperti sildenafil, vardenafil, atau tadalafil	Mengobati hipertensi dan bisa digunakan untuk meredakan keluhan akibat pembesaran prostat jinak	Hipertensi : Dosis awal 0,5 mg, 2 atau 3 kali sehari, dikonsumsi sebelum tidur, selama 3-7 hari. Dosis dapat ditingkatkan menjadi 1 mg, 2 atau 3 kali sehari, selama 3-7 hari berikutnya, sesuai dengan kondisi pasien. Dosis maksimal 20 mg per hari, dibagi dalam beberapa jadwal konsumsi.	Kantuk Mual atau muntah Pusing atau sakit kepala Pandangan kabur Diare atau justru konstipasi Lelah dan lemas	Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari dan jauhkan dari jangkauan anak
Sentral	<b>Metildopa, klonidin</b>	Dopamet	Hipersensitif, sirosis hati atau riwayat	Hipertensi essensial termasuk Hipertensi	Diawali 0.5-1 tablet perhari,	Ruam kulit, mulut kering, sakit kepala,	Simpan di tempat sejuk dan

TUGAS KHUSUS PKL D3 FARMASI UMG\_TRIYA AGUSTINA SUSANTI\_221105013\_APOTEK CIPTA MEDIKA GKB

<b>Golongan</b>	<b>Nama Obat</b>	<b>Nama Obat di Tempat PKL</b>	<b>Kontraindikasi</b>	<b>Indikasi</b>	<b>Dosis dan Cara Pakai</b>	<b>Efek Samping</b>	<b>Cara Simpan</b>
			penyakit hati, hepatitis akut.	Maligna, Hipertensi pada Tahap awal Kehamilan, Hipertensi nefrogenik	ditingkatkan secara bertahap dengan 0.5-1 tablet setiap 3 hari	lesu, hidung tersumbat, gangguan saluran cerna, pusing, peningkatan berat badan, edema, impotensi.	kering, serta terhindar dari sinar matahari dan jauhkan dari jangkauan anak

**(6.b) OBAT ANTIANGINA**

<b>Golongan</b>	<b>Nama Obat</b>	<b>Nama Obat di Tempat PKL</b>	<b>Kontraindikasi</b>	<b>Indikasi</b>	<b>Dosis dan Cara Pakai</b>	<b>Efek Samping</b>	<b>Cara Simpan</b>
Obat antiangina	Isosorbide dinitrate,	Isosorbide dinitrate	Hipersensitif atau idiosinkrasi terhadap nitrit/ Nitrat yang lain, hipotensi berat, infark jantung akut disertai tekanan pengisian, kegagalan sirkulasi akut.	Pencegahan dan pengobatan angina pektoris yang disebabkan penyakit jantung koroner	Dosis awal: 5 mg, dapat ditingkatkan 10 mg pada hari ke-2 atau ke-3 sesuai anjuran dokter. Dosis pemeliharaan: 1 tablet 2 kali per hari. Dihisap dibawah lidah	Hipotensi ortostatik, takikardia, kardiomiopati hipertropik, sakit kepala, palpitasi.	Simpan pada tempat sejuk Dan kering, terhinar dari cahaya matahari langsung.
	nitrogliserin	Nitrokaf retard	Hindari sildenafil. Glaukoma, syok kardiogenik, anemiaberat, traumakepala, peningkatan TIK, pendarahan otak, insipiens, kegagalan sirkulasi akut, hipotensi.	Pencegahan dan terapi jangka Panjang Angina Pektoris	2-3 x sehari 1 kapsul, kasus berat : 2-3 x sehari 2 kapsul Aturan Pakai Sebelum atau sesudah makan	Sakit kepala, hipotensi ortostatik, takikardi, kolaps yang disertai dengan aritmia bradikardi, mengantuk. Jarang : kolaps, kemerahan pada kulit.	Simpan ditempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari dan juahkan dari jangkauan anak- anak.

**(6.c) OBAT GAGAL JANTUNG KONGESTIF**

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat gagal jantung kongestif	Digoksin	Digoxin	Blok AV total dan blok AV tingkat kedua, bradikardia sinus.	Payah jantung kronik, payah jantung penderita lansia dengan atau tanpa payah ginjal, payah jantung akut, payah jantung pada anak.	Dewasa : Untuk digitalisasi cepat (24-36 jam) : 4-6 tablet , kemudian 1 tablet pada interval tertentu sampai kompensasi tercapai. Untuk digitalisasi lambat (3-5 hari) : 2-6 tablet/hari dalam dosis terbagi. Pemeliharaan : 1/2-3 tablet/hari.	Dosis berlebihan dapat mengakibatkan anoreksia, mual ,muntah, konfusi, disorientasi, ataksia, kromatopsia, pruritus, urtikaria, ruam makular.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung

**(6.d) ANTIPLATELET**

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antiplatelet	Asetosal,	Nospirinal	Ulkus peptikum, hipersensitif terhadap kandungan dalam nospirinal atau NSAID lainnya, asma, rhinitis, tukak lambung.	Infark miokard, serangan iskemik transien, angina tidak stabil, pencegahan komplikasi trombolitik setelah operasi cangkok bypass arteri koroner, pencegahan sekunder penyakit kardiovaskuler, pencegahan sekunder penyakit serebrovaskular trombotik.	Untuk pengobatan awal bagi dewasa 150-300 mg. Untuk dewasa dalam jangka panjang 1 kali sehari 75-150 mg. Diperlukan dosis hingga 300 mg setiap hari terutama penggunaan jangka pendek.	Bronkospasme, serangan asma, pendarahan berkepanjangan, mual, muntah, diare, sakit perut, mulas.	Simpan ditempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari dan jauhkan dari jangkauan anak
	klopidogrel	Clopidogrel	Gangguan hati berat, tukak peptik atau pendarahan Intrakarnial.	Penurunan kejadian aterotrombotik pada stroke isemik atau Penyakit arteri perifer, terapi kombinasi dengan asam asetil salisilat (ASA) untuk mengatasi peningkatan segmen non ST pada sindrom koroner akut (angina tidak stabil atau infark miokard	Sehari 1 kali 1 tablet (75 mg). Tidakada penyesuaian dosis yang diperlukan untuk pasien lanjut usia atau pasien dengan penyakit ginjal.	Purpura, memar, hematoma, epistaksis, hematuria pendarahan okular, intrakarnial dan saluran napas, pendarahan gastrointestinal, retroperitonal, neutropenia, anemia aplastik, trombositopenia, pensitopenia dan agranulositosis.	Simpanpada Tempatejuk dankering, terhindar dari cahaya matahari langsung

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
				non gelombang Q).			

**(6.e) OBAT DYSLIPIDEMIA**

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat dyslipidemia	Simvastatin,	Simvastatin	Penyakit hati aktif atau peningkatan transaminase serumpersisten yang tidak dapat dijelaskan, miopati sekunder akibatagen penurunlipid lainnya. Penggunaan bersamaan denganinhibitor CYP3A4kuat (misalnya itrakonazol, ketoconazole, posaconazole, voriconazole, klaritromisin, eritromisin, telithromycin, nefazodone, inhibitor protease HIV, produk yang mengandung cobicistat asam	Menurunkan kadar kolesterol total, LDL, trigliserida, dan meningkatkan kadar HDL dalam darah.	Dosisawal: dosis10 mg/hari diberi kanpada malamhari. Dosis awal untuk pasien dengan hiperk olesterolemia r ingansampai sedang: dosis 5 mg/hari. Pengaturan dosis dilakukan denganjarak tidakkurang dari 4 minggu sampai maksimal 40 mg/hari (diberikan malamhari). Lakukan pengukuran kadar lipid dengan jarak	Sakit kepala, mual, perut kembung, mulas, diare, pusing, insomnia.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
			fusidat), ciclosporin, danazol dan gemfibrozil. Kehamilan dan menyusui.		tidak kurang dari 4 minggu. Dosis disesuaikan dengan respons penderita		
	atorvastatin, fenofibrate, gemfibrozil, ezetimib	Atorvastatin	Hipersensitif, ibu hamil, menyusui atau usia produktif yang tidak menggunakan alat kontrasepsi yang adekuat, penyakit hati aktif	Terapi tambahan untuk menurunkan kadar kolesterol total, LDL, apolipoprotein B, dan trigliserida yang meningkat pada pasien dengan hiperkolesterolemia primer, hiperlipidemia kombinasi atau campuran, serta hiperkolesterolemia familial heterozigot dan homozigot, Bila diet dan penatalaksanaan non-farmakologik lainnya kurang berhasil.	Dosis awal yang biasa diberikan adalah 10 mg 1 kali sehari. Rentang dosis adalah antara 10-80mg sekali sehari. Hiperkolesterolemia primer Dan hiperlipidemia campuran : 10 mg, diberikan 1 kali sehari. Familial hiperkolesterolemia homozigot: 10-80 mg per hari. Familial hiperkolesterolemia heterozigot pada pasien anak-anak (10-17 tahun): dosis awal	Sakit perut, sembelit, insomnia, sakit kepala, mual, diare, muntah.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
					<p>yang direkomendasikan adalah 10 mg/hari, dosis maksimum Yang direkomendasikan adalah 20 mg/hari . Penyesuaian harus dilakukan pada interval 4 minggu.kombinasi dg siklosporinari . Penyesuaian harus dilakukan pada interval 4 minggu.kombinasi dg siklosporin,tela previr atau kombinasi tipranavir/ritonavir, Dosis Tidak boleh melebihi 10 mg.</p>		
	fenofibrate,	Fenofibrate	Gangguan fungsi hati dan ginjal berat, gangguan kandung empedu, hipersensitivitas.	Pengobatan hiperkolesterolemia, hiperlipidemia campuran tipe II a dan II b klasifikasi fredikson kadar trigliserid serum yang sangat tinggi.	1 kali 200 mg/hari.	Nyeri epigastrium, perut kembung, mual, diare, konstipasi, eritema, gatal, urtikaria, nyeri otot, sakit kepala, Penurunan libido,	Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
						rambut rontok, penurunan berat badan.	
	gemfibrozil, ezetimib	Hypofil	Penderita hipersensitif, gangguan fungsi hati atau ginjal, dan kandungan empedu.	Hiperkolesterolemia, dislipidemia campuran dan hipertrigliseridemia atau menurut klasifikasi frederickson tipe II a, II b dan IV, sehingga dapat mencegah penyakit jantung koroner .	2 kapsul 2 x sehari. 30 menit Sebelum makan pagi dan malam hari.	Nyeri abdomen, diare, nyeri epigastrik, muntah, flatulen, rash, dermatitis, pruritus dan urtikaria.	Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung

**(6.f) OBAT ANTIARITMIA**

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat antiaritmia	<b>Amiodaron</b>	Amiodaron hydrochloride	Gangguan kelenjar tiroid, hipotensi berat, bradikardia, syok kardiogenik, dan gangguan pernapasan.	Mengatasi irama jantung yang tidak stabil.	Tablet Dewasa: Dosis awal adalah 200 mg, 3 kali sehari, untuk satu minggu. Dosis selanjutnya dapat dikurangi menjadi 200 mg, 2 kali	Fotosensitisasi dan pigmentasi, hipotiroid, mikrodeposit kornea, toksisitas pulmonal dan neurotoksik.	Simpan ditempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari dan jauhkan dari jangkauan anak.

					<p>sehari. Dosis pemeliharaan adalah kurang dari 200 mg per hari. Intravena dewasa: Dosis awal adalah 300 mg atau 5 mg/kgBB dengan injeksi cepat. Dosis lanjutan adalah 150 mg atau 2,5 mg/kgBB.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

## 7. OBAT SALURAN CERNA

### (7.a) Obat gastritis dan tukak lambung

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antasida	Al(OH) <sub>3</sub> , Mg(OH) <sub>2</sub> , natrium bikarbonat	Sanmag	Hipersensitif	Meredakan gejala mual,nyeri lambung,nyeri ulu hati,atau perut kembung akibat produksi asam lambung yang berlebih	Dosis 1-2 sendok teh (5-10 ml), 3-4 kali sehari. Cara pakai : sebaiknya dikonsumsi menjelang tidur saat perut kosong yaitu 1 jam sebelum 2 jam setelah makan.	Kram perut,mual atau muntah, diare atau sembelit,sakit kepala.	Simpan obat pada suhu dibawah 30°C, di tempat yang sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung.
H <sub>2</sub> Bloker	Simetidin,	Simetidin	Hipersensitif	Pengobatan jangka pendek tukak usus 12 jari yang aktif. Terapi pemeliharaan tukak usus 12 jari pada pengurangan dosis setelah penyembuhan tukak aktif. Pengobatan jangka pendek untuk tukak aktif yang jinak. Pengobatan refluks gastroesofagus erosif. Pencegahan pendarahan saluran pencernaan bagian atas pada penderita yang kritis. Pengobatan keadaan hiperekskresi patologis	Tukak usus 12 jari yang aktif: sehari 1x 800 mg pada malam hari. Terapi pemeliharaan: sehari 1x 400 mg pada malam hari sebelum tidur. Refluks gastroesofagus erosif: sehari 1600 mg dalam dosis terbagi selama 12 minggu; Hiperekskresi patologis: sehari 4x 300 mg pada saat makan dan sebelum tidur	Diare ringan, sakit kepala, pusing, mengantuk	Simpan pada suhu dibawah 30°C, terlindung dari cahaya.

	ranitidin, femotidin	Ranitidin	Riwayatporfiria akut	Tukaklambung dantukak duodenum, refluks esofagitis, dispepsiaepisodik kronis, tukak akibat AINS,tukak duodenumkarena H.pylori, sindrom Zollinger-Ellison, kondisi lain dimana pengurangan asam lambung	selama6 minggu Refluks gastro- esofagus:150 mg (1 tab)2  kali sehari atau 300 mg (2 tab) sebelum tidur selama 8-12 minggu Ulkus duodenum (H.Pylori): 150 mg(1tab)  dalam 2 dosis terbagi atau 300 mg (2 tab) sebelum tidur diberikan dengan amoksisilin dan metronidazol Selama 2 minggu. Ulkus lambung dan duodenum jinak: Dewasa dan anak > 12 tahun: 150 mg (1 tab) 2 kali sehari atau 300 mg (2 tab) sebelum tidur	Pemakaian obat umumnya memiliki efeksamping tertentu dan sesuai dengan masing-masing individu. Jika terjadi efek sampingyang Berlebih dan berbahaya, harap konsultasikan kepada tenaga medis. Efek samping yang mungkin Terjadi dalam penggunaan obat adalah: Sakit kepala, konstipasi, diare, mual, rasa tidak nyaman/nyeri perut, pusing.	Simpan pada suhu dibawah 30°C, terlindung dari cahaya.

					selama 4 minggu Anak 3-11 tahun: 4-8 mg/kg setiap hari dalam 2 dosis terbagi maks.300 mg selama 4-8 minggu. dikonsumsi bersama atau setelah Makanan. Telan utuh,jangan dikunyah		
PPI	Omeprazol,	Omeprazole	Omeprazole dikontraindikasikan untuk pasien yang diketahui hipersensitivitas terhadap obat ini atau bahanlain yangterdapat dalam formulasi. Penggunaan dengan nelfinavir.	Pengobatan jangka pendek untuk tukak lambung dan tukak duodenum, tukak lambung dan duodenum yang terkait dengan AINS,lesi lambungdan duodenum, regimeneradikasi H. pylori pada tukakpeptik, refluks esofagitis, Sindrom Zollinger Ellison.	Tukak Lambung/duodenum krn NSAID: Dewasa:20 mg1kali sehari hingga 8 minggu Eradikasi H.Pylori: Dewasa:20 mg2kali sehari/ 40 mg 1 kali sehari,selama 1 minggu (dikombinasi dengan antibiotik) Anak:>4 tahun, 15-30 kg: 10 mg 2 kali sehari. > 4 tahun, 31-40	Pemakaian obat umumnya memiliki efek samping tertentu dan sesuai dengan masing-masing individu. Jika terjadi efek samping yang berlebihan dan berbahaya, harap konsultasikan kepada tenaga medis. Efek samping yang mungkin Terjadi dalam penggunaan obat adalah: Hipomagnasemia, lupuseritematosus kulit,SLE,fraktur terkait osteoporosis, polip kelenjar fundus, karsinoma, diare terkait	Simpan pada suhu dibawah 30°C, terlindung dari cahaya.

				<p>kg: 20 mg 1 kali sehari, selama 1 minggu (dikombinasi dengan antibiotik).                  Tukak Peptik/ Peptic Ulcer:                  Dewasa:                  Pengobatan: 20-40 mg 1 Kali sehari, selama 4 minggu (ulkus duodenum) dan 8 minggu (ulkus lambung).                  Pemeliharaan: 10-20 mg 1 kali sehari, dapat ditingkatkan hingga 40 mg.                  Gastro-oesophageal reflux Dewasa:                  Pengobatan: 20 mg 1 kali sehari, selama 4-8 minggu.                  Untuk kasus yang parah: 40 mg 1 x kali sehari selama 8 minggu.                  Pemeliharaan:</p>	<p>Clostridium difficile, nefritis interstisial, Defisiensi vitamin B12 (terapi jangka panjang), infeksi gastrointestinal (mis. salmonella, Campylobacter). Gangguan gastrointestinal: Mual, muntah, diare, konstipasi, perut kembung, sakit perut. Gangguan umum dan kondisi tempat pemberian: Kelemahan, malaise. Gangguan hepatobilier: Peningkatan enzim hati. Gangguan sistem kekebalan: Urtikaria. Gangguan metabolisme dan nutrisi: Edema perifer. Gangguan muskuloskeletal dan jaringan ikat: Sakit punggung. Gangguan sistem saraf: Sakit kepala, pusing, mengantuk, parestesia, vertigo. Gangguan jiwa: Insomnia. Gangguan pernapasan, toraks dan mediastinum: Batuk. Gangguan</p>	
--	--	--	--	---	--	--

					10 mg 1 kali sehari, dapat ditingkatkan menjadi 20-40 mg sekali sehari.	kulit dan jaringan subkutan: Ruam, dermatitis, pruritus.	
lansoprazol,	Lansoprazole	Penderitayang hipersensitif terhadap lansoprazole, serta pasien yang sedang mengkonsumsi Rilpivirinedan atazanavir.	Pengobatan tukak duodenum dan tukak lambung ringan,tukak peptik, refluks esofagitis, sindrom Zollinger-ellison Dan eradikasi H.pylori	Esofagitis refluks Dewasa: Pengobatan: 30 mg 1 kali sehari, selama 4-8 minggu. Profilaksis: 15 mg 1kali sehari, dapat ditingkatkan hingga 30 mg jika perlu.Refluk s gastro-esofagus Dewasa: 15-30 Mg 1 kali sehari, selama 4 minggu. Ulserasi terkait NSAID Dewasa:30 mg sekali sehari selama 4-8 minggu. Sindrom	Esogagitis refluks Dewasa: Pengobatan: 30 mg 1 kali sehari, selama 4-8 minggu. Profilaksis: 15 mg 1kali sehari, dapat ditingkatkan hingga 30 mg jika perlu.Refluk s gastro-esofagus Dewasa: 15-30 Mg 1 kali sehari, selama 4 minggu. Ulserasi terkait NSAID Dewasa:30 mg sekali sehari selama 4-8 minggu. Sindrom	Pemakaian obat umumnya memiliki efek samping tertentu dan sesuai dengan masing-masing individu. Jika terjadi efek samping yang berlebih dan berbahaya harap konsultasikan kepada tenaga medis. Defisiensi vitamin B12 (terapi jangka panjang). Gangguan sistem darah dan limfatik: Trombositopenia, leukopenia, eosinofilia. Gangguan mata: Gangguan penglihatan. Gangguan gastrointestinal: Diare, sakit perut, sembelit, mual, dispepsia, perut kembung, mulut atau tenggorokan kering. Jarang, kolitis, stomatitis. Gangguan	Simpan pada suhu dibawah 30°C, terlindung dari cahaya.

					<p>Zollinger-Ellison  Dewasa:  Awalnya 60mg 2 kali sehari, dapat disesuaikan hingga 180 mg setiap hari sesuai respons.  Dosis harian &gt;120 mg harus diberikan dalam 2 dosis terbagi.  Eradikasi H. pylori Dewasa: Sebagai terapi rangkap 3: 30 Mg 2 kali sehari, selama 7-14 hari (dalam kombinasi dengan antibiotik).  Sebagai terapi ganda: 30 mg tiga kali sehari selama 14 hari dalam kombinasi dengan amoksisilin.</p>	<p>umum dan kondisi situs admin: Kelelahan, nyeri dan reaksi situs inj (IV).  Gangguan hepatobilier: Peningkatan enzim hati. Gangguan sistem kekebalan: Urtikaria. Gangguan metabolisme dan nutrisi: Edema perifer. Gangguan muskuloskeletal dan jaringan ikat: Artralgia, mialgia.  Gangguan sistem saraf: Sakit kepala, pusing, vertigo, mengantuk, parestesia.  Gangguan kejiwaan: Depresi, insomnia, kebingungan.  Gangguan sistem Reproduksi.</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--

	<b>Pantoprazol</b>	Vomizole	Hipersensitivitas	<p>Dalam kombinasi dengan 2 antibiotik yang tepat untuk eradikasi H.pylori. Ulkus peptikum. Ulkus duodenum. Ulkus lambung, Inflamasi esofagus (refluks esofagus) sedang dan berat. Sindrom Zollinger Ellison dan kondisi hipersekresi patologis lainnya.</p>	<p>Tukak duodenum Pengobatan: 1 kali sehari selama 2 minggu. Untuk tukak duodenum yang disebabkan H.pylori, Eradikasi H.pylori: 1 tablet dengan 1.000mg amoksisilin dan 500mg klaritromisin atau 1 tablet dengan 500 mg metronidazole dan 500 mg klaritromisin atau 1 tablet dengan 1.000 mg amoksisilin dan 500 mg metronidazole. Semuanya diberikan 2 kali sehari, atauran pakai ten utuh dengan air 1 jam sebelum sarapan.</p>	<p>Gangguan saluran cerna (seperti mual, muntah, nyeri lambung, kembung, diare dan konstipasi), sakit kepala dan pusing. Efek samping yang kurang sering terjadi diantaranya adalah mulut kering, insomnia, mengantuk, malaise, penglihatan kabur, ruam kulit dan pruritus.</p>	<p>Simpan pada suhu dibawah 30°C, terlindung dari cahaya.</p>
--	--------------------	----------	-------------------	--	---	---	---

Pelindung mukosa	<b>Sukralfat</b>	Sucralfate, Episan	Hipersensitivitas, pasiendengan gagaljinjal Kronis karena obat ini bisa menyebabkan nefropati yang diinduksi oleh aluminium	Sakit maag, Tukak Usus halus, Tukak Lambung, Gastritis kronis	Dewasa : 4 x sehari 2 sendok Teh/sendok takar 5 cc. Saat perut kosong : 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan dan menjelang tidur malam	Pemakaian obat umumnya memiliki efek samping tertentu dan sesuai dengan masingmasing individu. Jika terjadi efek samping yang berlebih dan berbahaya, harap konsultasikan kepada tenaga medis. Efek samping yang mungkin terjadi dalam penggunaan obat adalah: Mulut kering, konstipasi	Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari dan jauhkan dari jangkauan anak anak.
Antiflatulen	Dimetilpolisiloksan	Disflaty	Hipersensitif, Aritmia, Hipokalsemia, Hipomagnesia, CHF, Jantung Iskemik	Meredakan kembung dan rasa tidak nyaman diperut karena gas yang berlebihan.	Dewasa : 3 x sehari 2 tablet dikunyah sesudah makan dan sebelum tidur sesuai kebutuhan atau sesuai petunjuk dokter. Dosis maksimal: 500 mg/24 jam dengan anjuran dan pengawasan dokter. Diberikan sesudah makan. Dikunyah sampai halus	Pemakaian obat umumnya memiliki efek samping tertentu dan sesuai dengan masingmasing individu. Jika terjadi efek samping yang berlebih dan berbahaya, harap konsultasikan kepada tenaga medis. Efek samping yang mungkin terjadi dalam penggunaan obat adalah sendawa	Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari dan jauhkan dari jangkauan anak

TUGAS KHUSUS PKL D3 FARMASI UMG\_TRIYA AGUSTINA SUSANTI\_221105013\_APOTEK CIPTA MEDIKA GKB

Analog prostaglandin	Misoprostol	Misoprolol tablet	Kontraindikasi dari pemakaian misoprostol adalah riwayat reaksi alergi terhadap obat ini dan hipersensitivitas terhadap prostaglandin.	mencegah tukak lambung saat mengonsumsi obat untuk tukak lambung.	Tukak lambung: 0,2 mg 4x sehari atau 0,4 mg 2x sehari selama 4 minggu. Jika diperlukan pengobatan dapat dilanjutkan hingga 8 minggu Pencegahan Tukak lambung Dosis untuk dewasa adalah 200 mikrogram setiap hari. Dosis ini bisa dibagi menjadi 2-4 dosis selama minimal empat minggu.	Diare, kram atau sakit perut, perut kembung atau sering buang angin, mual atau muntah	Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari dan jauhkan dari jangkauan anak
----------------------	-------------	-------------------	--	---	---	---	--

(7.b) Obat antidiare

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antimotilitas	Loperamid	Loperamid, Lodia	Anak < 12th, kilitis akut, hipersensitif, keadaan menghindari konstipasi	Diare non spesifik akut & diare kronik	Diare non spesifik dosis awal, 2 tab; dosis lazim sehari 1-2x 1 sampai 2 tab. Diare kronik sehari 2-4 tab dalam dosis	Sembelit, kram perut, pusing, kantuk, mual, muntah, dan mulut kering.	Simpan pada suhu dibawah 30°C, terlindung dari cahaya.

					terbagi, tergantung dari beratnya diare. Dosis maks sehari 8 tab		
Adsorben	Kaolin pektin,	NEO KAOLANA suspense (kaolin pectin)	Konstipasi, obstruksi intestinal	Meredakan gejala diare non spesifik	Dewasa dan anak-anak 12 tahun keatas 2 sdm atau 6 sdt (30 ml/ hari). Maks sehari 12 sdm atau 36 sdt/hari. Anak 6-12 tahun: sehari 1 sdm atau 3 sdt (15ml/hari). Maks sehari 6 sdm atau 18 sdt/hari	Konstipasi, diare, pusing, sindrom ekstrapiramidal	Simpan ditempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari dan jauhkan dari jangkauan anak
	<b>Attapulgit</b>	DIAGIT tablet (activated attapulgite, pectin)	Penderita dimana konstipasi harus dihindari, hipersensitif dan penderita obstruksi usus	Pengobatan simptomatik pada diare yang tidak diketahui penyebabnya	Dewasa dan anak >12 tahun: 2 tablet tiap setelah buang air besar, maks 12 tablet. Anak 6-12 tahun: 1 tablet tiap setelah buang air besar, maks 6 tablet sehari	Sembelit	Simpan ditempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari dan jauhkan dari jangkauan anak

7.c) Obat laksatif

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Laksatif osmotik garam	Mg sulfat	Magnesium sulfat (MgSO <sub>4</sub> )	-	Membantu melancarkan buang air besar	Anak usia 6-12 tahun, gunakan 1-2 sendok teh garam. Anak di atas 12 tahun sampai dewasa, 2-6 sendok teh garam setiap hari.	kram perut, diare, kembung, gas dan mual mual.	Simpan pada suhu di bawah 30 derajat celcius
Laksatif osmotik alkohol/gula tdk dicerna	<b>Gliserin,</b>	Laxadine emulsi (phenolphtalein, paraffin liquid, glyserin)	Ileus obstruktif, nyeri perut yang tidak diketahui penyebabnya	Mengatasi susah buang air besar (konstipasi)	Dewasa : 1 kali sehari 1-2 sendok makan Anak 6-12 thn: 1 kali sehari 0,5-1 sendok Makan	Ruam kulit, pruritus, rasa panas terbakar, kehilangan elektrolit dan cairan tubuh, diare.	Simpan ditempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari dan jauhkan dari jangkauan anak
	<b>Laktulosa</b>	Dulcolaxtol	Hipersensitivitas, obstruksi intestinal & galaktosemia.	Untuk pengobatan konstipasi pada pasien dengan konstipasi kronis Untuk portal systemic encephalopathy termasuk keadaan pre	Anak- anak 1-5 tahun 2 x 5 ml perhari Anak- anak 5-10 tahun 2 x 10 ml perhari	Kembung, kram perut & rasa tidak nyaman, diare dalam dosis berlebihan, mual, muntah, mulut kering, ketidakseimbangan	Simpan ditempat yang kering dan sejuk (15-25 derajat celcius)

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
				koma hepatic & koma hepatic	Anak- anak <1 tahun 2 x 2.5 ml perhari Dewasa keadaan ringan Dosis awal 15 ml. Dosis penunjang 10 ml Dewasa keadaan sedang Dosis awal 15 - 30 ml. Dosis penunjang 10 -15 ml Dewasa Keadaan Parah Dosis awal 2 x 15 ml per hari. Di minum Sebelum atau sesudah makan,dapat diberikan bersama makanan untuk mengurangi ketidaknyaman an	gan elektrolit jika dikonsumsi dalam dosis tinggi.	

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
					<p>pencernaan. Sebaiknya diminum pada waktu sarapan.</p>		
<p>Laksatif stimulan</p>	<p>Turunan difenilmetan(bisakodil)</p>	<p>Bisacodyl tablet</p>	<p>Hipersensitif pasien kondisi operasi abdomen akut, apendicitis, pendarahan rektal gastroenteritis</p>	<p>Memudahkan buang air besar pada sembelit, sebelum/sesudahnya</p>	<p>Dewasa dan anak &gt;12 tahun: 2 tab dalam dosis tunggal, diminum sebelum tidur atau diminum setengah jam sebelum makan pagi. Pada keadaan konstipasi yang sulit diatasi, dosis dapat ditingkatkan menjadi 1 tab. Anak 6-12 tahun: 1 tab sehari diminum sebelum tidur dan harus ditelan tanpa</p>	<p>Mual, kram usus, diare</p>	<p>Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari dan jauhkan dari jangkauan anak</p>

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
					dikunyah		

(7.d) Antiemetik

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antiemetik	Dimenhidrinat, ,	Dimenhidrinat	Memiliki riwayat asma, kejang, hipertensi, gangguan hati. ibu hamil, menyusui.	untuk tatalaksana dan pencegahan vertigo, <i>motion sickness</i> , penyakit Meniere, dan hiperemesis gravidarum. Dimenhydrinate juga dapat digunakan untuk mengurangi gejala alergi misalnya pada rhinitis alergi dan urtikaria.	Dewasa dan anak (usia di atas 12 tahun): 50 hingga 100 mg, setiap 4 hingga 6 jam. Dosis maksimal 300 mg/hari. Anak usia 6 hingga 11 tahun: 25 hingga 50 mg, setiap 6 hingga 8 jam. Dosis maksimal 150 mg/hari. Anak usia 2	Kesulitan buang air kecil, reaksi alergi seperti ruam kulit dan gatal-gatal, pembengkakan pada wajah, bibir, lidah	Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari dan jauhkan dari jangkauan anak

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
					Hingga 5 tahun: 12,5 hingga 25 mg, setiap 6 hingga 8 jam. Dosis maksimal 75 mg/hari.		
	Ondansetron	Trovensis	Hipersensitivitas terhadap ondansetron	Menangani mual dan muntah yang disebabkan oleh kemoterapi dan radioterapi, sebagai pencegahan mual/muntah setelah operasi	Dewasa dan anak >12 thn: sehari 2x 8 mg, anak usia 4-12 thn: sehari 3x 4 mg	Konstipasi, sakit kepala dan diare	Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari dan jauhkan dari jangkauan anak
	Metoklorpramide	Metrochloramide HCl	Hipersensitivitas	Gangguan saluran cerna seperti mual, muntah akibat intoleransi obat digitalis, antibiotik, antimikotik, PAS, etionamida, morfin dan kodein	Dewasa: sehari 3x ½-1 tab atau 1-2 sendok takar. Anak 6-14 thn: sehari 3x ¼ - ½ tab atau ½ - 1sendok takar diberikan 30 menit sebelum makan dan waktu mau tidur	Pusing, sembelit dan diare	Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari dan jauhkan dari jangkauan anak

**(8) OBAT SALURAN NAPAS**

<b>Golongan</b>	<b>Nama Obat</b>	<b>Nama Obat di Tempat PKL</b>	<b>Kontraindikasi</b>	<b>Indikasi</b>	<b>Dosis dan Cara Pakai</b>	<b>Efek Samping</b>	<b>Cara Simpan</b>
Obat Batuk	Codein	Codikaf	Pasien degan gangguan pernapasan berat, riwayat alergi terhadap kodein atau bahan aktif lainnya	Mengurangi iritasi pada saluran napas	Dewasa dan anak >12 thn: 10-20 mg 4 kali sehari. Dosis maksimal 60 mg per hari	Mengantuk, mual dan muntah, pusing dan sakit kepala, konstipasi, mulut kering, keringat berlebih	Simpan ditempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari dan juahkan dari jangkauan anak
	Gliseril guaikolat	Bisolvon extra	Hipersensitif	Sekretolitik (mukolitik), dan ekspektoran untuk meredakan batuk berdahak dan mempermudah pengeluaran dahak	Dewasa dan anak >12 thn: sehari 3x 10 ml. Anak 6-12 thn: sehari 3x 5 ml. Anak 2-6 thn: sehari 3x 2,5 ml	Gangguan GI ringan, reaksi alergi, ruam kulit, sakit kepala, vertigo	Simpan ditempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari dan juahkan dari jangkauan anak
	Amonium klorida	Sanadryl	Hipersensitif, wanita hamil dan menyusui	Meringankan gejala batuk tidak berdahak atau batuk karena alergi	Dewasa: sehari 3-4x 2 sendok takar sirup. Anak 6-12 thn: sehari 3-4x 1 sendok takar sirup	Mengantuk, sedasi, pusing, konstipasi	Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari dan juahkan dari jangkauan anak

TUGAS KHUSUS PKL D3 FARMASI UMG\_TRIYA AGUSTINA SUSANTI\_221105013\_APOTEK CIPTA MEDIKA GKB

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
	Bromheksin	Mucohexin	Hipersensitif	Bronkitis dan gangguan pernapasan lain, untuk mempermudah pengeluaran dahak	Anak 2-5 thn: sehari 2x ½ tab. Dewasa dan anak >10 thn: sehari 3x 1 tab	Mual, diare, gangguan pencernaan, sakit kepala	Simpan ditempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari dan jauhkan dari jangkauan anak
	Ambroxol	Ambroxol HCl	Hipersensitif	Penyakit saluran pernapasan akut, sebagai sekretolitik yang dapat mempermudah peneluran sekret yang kental dan lengket didalam saluran pernapasan	Dewasa dan anak >12 thn: sehari 3x 1 tab. Anak 6-12 thn: sehari 3x ½ tab	Mual, muntah, diare, mulut atau tenggorokan kering, sakit perut	Simpan ditempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari dan jauhkan dari jangkauan anak
	Asetilsistein	Sistenol	Hipersensitif	Meringankan batuk berdahak dan menurunkan demam yang disebabkan flu	Dewasa dan anak >12 thn: sehari 3x 1 kaplet. Anak 6-12 thn: sehari 3x ½ - 1 kaplet	Reaksi alergi, mual	Simpan ditempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari dan jauhkan dari jangkauan anak

TUGAS KHUSUS PKL D3 FARMASI UMG\_TRIYA AGUSTINA SUSANTI\_221105013\_APOTEK CIPTA MEDIKA GKB

Obat asma	Salbutamol	Ventasal inh	Hipersensitifitas	Meredakan serangan atau pencegahan asma ringan, sedang atau berat	Dewasa Menghilangkan bronkosam akut: 100 atau 200 mcg. Pencegahan alergen atau bronkospasme: 200 mcg. Terapi kronis: 200 mcg, 4x/hari. Anak-anak menghilangkan bronkospam akut: 100 mcg. Pencegahan alergen atau bronkospasme: 100 mcg. Terapi kronis: 200 mcg 4x/hari	Tremor halus pada otot rangka, rasa tertekan, sakit kepala, kram otot sementara	Simpan ditempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari dan juahkan dari jangkauan anak
	Budesonid	Budesma inj		Pengobatan asma bronkial	Dewasa dan anak >12 thn: 1-2 mg 2x sehari. Anak 6-12 thn: 0,5-1 mg 2x sehari	Suara serak, nyeri, iritasi tenggorokan ringan, iritasi lidah dan mulut, mulut kering, kandidiasis oral, batuk	Simpan ditempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari dan juahkan dari jangkauan anak
	Ipratropium bromida	Farbivent inj		Terapi untuk bronkospasme yang berhubungan dengan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) pada pasien yang diterapi dengan	Dewasa (termasuk lansia) 1 amp 3-4x/hari	Sakit kepala, pusing, gelisah, takikardi,mual, muntah	Simpan ditempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari dan juahkan dari jangkauan anak

				ipratropium bromida bersama salbutamol			
	Teofilin	Teosal	Hipertiroidisme	Sebagai bronkodilator pada penderita asma bronkial dan bronkitis kronis	Dewasa: 3x sehari 1 tab. Anak 6-12 tahun: 3x sehar ½ tab	Sakit kepala, mual, muntah	Simpan ditempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari dan jauhkan dari jangkauan anak

**(9) VITAMIN, MINERAL, ENZIM**

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Vitamin	Vitamin A	Elkana CL Emulsion 120ml	Pasien yang mengalami hipersensitivitas atau alergi terhadap salah satu komponen suplemen ini. Tidak boleh digunakan untuk anak dibawah 1 tahun	Suplemen untuk membantu kebutuhan vitamin dan kalsium untuk anak – anak pada masa pertumbuhan , wanita hamil, dan menyusui	Dewasa dan anak – anak diatas 6 tahun : 5ml seklai sehari Anak – anak dibawah 6 tahun : 2,5 ml seklai sehari	Reaksi alergi	Simpan ditempat bersuhu ruang dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak – anak
	Vitamin B	Vitamin B complex	pasien yang memiliki reaksi hipersensitivitas, berupa riwayat reaksi alergi atau anafilaksis	profilaksis dan tata laksana defisiensi vitamin B akibat pola makan yang buruk, penyakit tertentu,	dewasa, dapat diberikan 1 tablet sekali sehari sesuai indikasi dan dosis anjuran.	ruam/ kemerahan dikulit, gatal, kesulitan bernafas, bengkak diwajah, sesak nafas	Simpan ditempat bersuhu ruang dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung.

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
			terhadap masing-masing kandungan.	alkoholisme, atau selama kehamilan.			Jauhkan obat dari jangkauan anak – anak
	Vitamin B1 ( thiamin )	Vitamin B1 50 mg	Hipersensitivitas terhadap obat ini	Memenuhi kebutuhan vitamin B1	1 tablet sekali sehari	Mual, diare , sakit perut.	Simpan ditempat bersuhu ruang dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak – anak
	Vitamin B6 ( pyrodixine )	Vitamin B6 HCL 10mg	Hipersensitivitas terhadap obat ini	Defisiensi vitamin B6	Dewasa : sesuai kebutuhan pasien. Dapat hingga 150mg per hari	Neuropati sensorik	Simpan ditempat bersuhu ruang dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak – anak
	Vitamin B12	Neurosanbe	Hipersensitivitas terhadap obat ini	Pengobatan kekurangan vitamin B1, B6, B12 seperti pada polineuritis	1 kali sehari 1 tablet	Sindrom neuropatik	Simpan ditempat bersuhu ruang dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak – anak

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
	Vitamin C	Vitamin C	Gangguan ginjal	Untuk memenuhi kebutuhan vitamin c	1 kali sehari 1 tablet	Gangguan gastrointetinal	Simpan ditempat bersuhu ruang dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak – anak
	Vitamin D	Hi – D 5000	Penderita hipersensitivitas terhadap vitamin D3	Meningkatkan kadar vitamin vitamin D	1 tablet sekali sehari	Hiperkalsemia dan hiperkalsiuria	Simpan ditempat bersuhu ruang dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak – anak
	Vitamin E	Santa E 400 IU	Hipersensitivitas , wanita hamil dengan kadar fenilalalin tinggi, bayi dibawah usia 1 tahun	Membantu memenuhi kebutuhan vitamin E	1 kali sehari	Mual, kelemahan otot, sakit kepala	Simpan ditempat bersuhu ruang dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak – anak
	Vitamin K	Vitamin k	Anemia akibat defisiensi piruvat kinase dan G6PD	Profilaksi dan tata laksana gangguan pendarahan akibat difisiensi vitamin k	Dewasa 2,5-25mg Bayi baru lahir 1-2mg	Sakit perut dan diare	Simpan ditempat bersuhu ruang dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
							jangkauan anak – anak
	Asam Folat	Folavit 400mg	Terapi jangka panjang pada defisiensi kobalamin yang tidak diobati	Membantu memenuhi kebutuhan asam folat terutama untuk ibu hamil dan menyusui	Dosis awal : 0,25 – 1 mg Dosis pemeliharaan : 0,25mg per hari Ibu hamil dan menyusui : 2 tablet perhari	Mual, sakit perut , tidak nafsu makan,.	Simpan ditempat bersuhu ruang dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak – anak
Mine	Cu	Folamil genio	Hipersensitivitas terhadap obat ini	Suplemen multivitamin dan mineral mengandung DHA untuk menutrisi ibu hamil dan menyusui	1 kali sehari	Belum ada efek samping	Simpan ditempat bersuhu ruang dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak – anak
	I2	Blackmores I-Folic	Alergi pada salah satu kandungan obat blackmores i-folic	Memenuhi kebutuhan asam folat dan yodium selama kehamilan	1 kali sehari sesudah makan	Sakit perut, mual , diare	Simpan ditempat bersuhu ruang dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak – anak

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
	Cl*	Renovit	Hipersensitivitas	Membantu memenuhi kebutuhan multivitamin dan mineral	1 kaplet perhari	Efek samping tergantung individu	Simpan pada suhu dibawah 30°C, dan terhindar dari sinar matahari
	Fe	Queenvit	Hipersensitivitas	Membantu memenuhi kebutuhan mikronutrien untuk membantu kesehatan pada wanita	2x sehari 1 kaplet	Efek samping tergantung individu	Simpan ditempat bersuhu ruang dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak – anak
	Zn	Zinc Sulfate Monohdyrate 20 mg	Hipersensitivitas , ibu hamil dan menyusui	Terapi komplementer untuk diare pada anak , dalam kombinasi dengan terapi garam rehidrasi oral	Usia 1-3 thn : 5mg 1x sehari Usia 4-8thn: 10mg 1x sehari Usia 9-13 thn : 10-20mg 1x sehari Dewasa : 50mg 1x sehari	Sakit perut, muntah , diare.	Simpan ditempat bersuhu ruang dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak – anak
	K*	Fatigon 6 kaplet	Hipertensi , anak – anak, wanita hamil dan menyusui	Mencegah dan membantu mengobati kekurangan vitamin E,B1,B6,B12 serta kekurangan mineral kalium dan magnesium	2-3 kali sehari satu kaplet sesudah makan	Diare , mual, muntah	Simpan ditempat bersuhu ruang dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak – anak

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
	Mg	Formical – B	Penderita dengan hipersensitivitas dengan vitamin D3 dan analognya atau dengan komponen lain dalam formula, hiperkalsemia dan hiperkalsiuria , kalsium nefrokalsinosis D, kerusakan ginjal berat serta gagal ginjal	Untuk memenuhi kebutuhan kalsium pada remaja dan dewasa muda, wanita hamil dan menyusui , wanita menopause dan orang lanjut usia	1 kaplet diminum perhari atau sesuai petunjuk dokter , dikonsumsi setelah makan	Mual , sendawa , sakit perut, perut kembung, sembelit , mulut kering	Simpan ditempat bersuhu ruang dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak – anak.
	Na	Imunos 4 kaplet	Tidak boleh digunakan oleh penderita sclerosis multiple , penyakit kolagen, leucosis.	Membantu memelihara dan kesehatan daya tahan tubuh	Dewasa : 1 kaplet sekali sehari Dikonsumsi sesudah makan	Sakit perut , sembelit, diare , rasa panas di dada ( heartburn) , muntah atau ruam kulit	Simpan ditempat bersuhu ruang dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak – anak
	Ca	Calcium lactate 500mg	Penderita hiperkalemia dan hiperkalsiuera	Kalsium tambahan pada masa pertumbuhan , masa hamil , menyusui, serta untuk pertumbuhan tulang dan gigi	Deawas : 3x sehari 1-2 tablet Anak : 2-3x sehari 1 tablet atau menurut petunjuk dokter	Mual, muntah, kehilangan nafsu makan, sembelit , tenggorokan kering , buang gas	Simpan ditempat bersuhu ruang dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak – anak

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
	P	Vossecal	Alergi terhadap kadungan di dalam obat ini , hipertivaminotis D, hiperkalsemia , hiperkalsiuria	Membantu menjaga kesehatan tulang dalam tubuh	2 kali sehari 1 kapsul sesudah makan	Sembelelit perut kembung , mual, sakit perut diare	Simpan ditempat bersuhu ruang dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak – anak
	Mn	Provital plus kapsul	Tidak boleh dikonsumsi oleh yang alergi terhadap salah satu kandungan obat ini	Membantu memelihara kesehatan tubuh	1 kali sehari 1 kapsul lunak dikonsumsi setelah makan	Rasa panas dan kemerahan di wajah , sakit perut ringan, mual, muntah, hilang selera makan, sakit kepala, kesemutan, lelah, diare, kantuk	Simpan ditempat bersuhu ruang dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak – anak

**(10) OBAT SISTEM ENDOKRIN**

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat Diabetes melitus	Sulfonilurea (glibenclamide)	Glibenklamid 5mg	Hipersensitivitas terhadap sulfoniura, pasien yang mengalami DM tipe 1 penderita gangguan ginjal dan hati ringan	Mengendalikan kadar gula darah yang tinggi pada diabetes tipe 2	Dosis awal: 2,5-5 mg, dosis bisa ditingkatkan setiap minggu sampai maksimal 20mg per hari,	Berat badan naik, mual, sensasi terbakar di dada, perut terasa penuh, hipoglikemia	Simpan ditempat bersuhu ruang dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak –

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
			smapai sedang , pasien yang lemah dan kurang gizi , wanita menyusui		untuk dosis yang lebih dari 10 mg per hari glibenclamid tablet bisa dikonsumsi 2 kali sehari. Dikonsumsi bersama makan atau makanan utama pertama pada hari itu		anak
	Sulfonilurea (Glimepirid )	Glimepirid 4mg	Hipersensitivitas pasien ketoasidosis diabetik dengan atau tanpa koma	Mengendalikan kadar gula darah pada DM tipe 2	Dosis Awal : 1-2mg satu kali sehari  Dosis pemeliharaan :1-4mg satu kali sehari , dosis maksimum 8mg satu kali sehari  Dikonsumsi sebelum makan utama yang pertama pada hari yang sama jangan mengurangi jadwal makan	Pusing , sakit kepala , mual ,muntah diare	Simpan ditempat bersuhu ruang dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak – anak

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
	metformin,	Metformin	Obat ini tidak boleh diberikan kepada pasien dengan kondisi: Penyakit ginjal dengan kadar kreatinin serum lebih dari 1.5 mg/dL (pria) dan lebih dari 1.4 mg/dL (wanita). Infark miokard akut, septikemia, gagal jantung kongestif. Penyakit hati kronik, alkoholik, hipoksia. Asidosis metabolik akut atau kronik atau memiliki riwayat asidosis laktat, termasuk ketoasidosis diabetes dengan atau tanpa disertai koma. Wanita hamil atau wanita menyusui	Terapi awal untuk diabetes dewasa dengan keadaan kelebihanberat badan serta kadar guladarah yang tidakdapat dikendalikan hanya dengandietsaja. Terapi kombinasi untuk kegagalan terapi Sulfonilurea primer atau sekunder.Terapi tambahan pada insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM) atau Diabetes tipe1 untuk mengura ngi dosis insulin	Dosis awal: Sehari 2 x 500 mg atau 2 x 850 mg. Dosis dapat ditingkatkan sesuaidengan respon pasien. Dosis maksimal 3000 mg/hari dalam 3 dosis terbagi. Dosis pemeliharaan: Sehari 2 x 850 mg. Diminum bersamaan dengan makan Atau sesudah makan dalam dosis terbagi	Gangguan saluran cerna yang bersifat sementara, namun dapatdihindari dengancara konsumsi Metformin HCl bersamaan dengan makanan. Anoreksia, mual, muntah, daire. Berkurangnya absorpsivitamin B12. Mialgia, kepala terasa ringan. Ruam kulit.Keringat berlebihan,dan Gangguan daya pengecapan.	Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari dan jauhkan dari jangkauan anak
	( sulfonilurea )	Pioglitazone	Obat ini	Menurunkan kadar	Monoterapi:	Sakit kepala ,	Simpan

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
	pioglitazone	HCL 30 mg	<p>dikontraindikasikan pada : Pasien yang hipersensitif terhadap pioglitazone atau salah satu bahan yang terdapat dalam formula obat. Gagal jantung atau pada pasien yang mempunyai riwayat gagal jantung (NYHA I sampai IV). Gangguan hati. Penderita kanker kandung kemih atau memiliki riwayat kanker kandung kemih. Pioglitazone dikontraindikasikan untuk dikombinasi dengan insulin</p>	gula darah pada pasien Diabetes Melitus Tipe 2	<p>15 atau 30 mg sekali sehari, dapat ditingkatkan hingga dosis maksimal menjadi 45 mg sekali sehari. Kombinasi dengan Metformin atau Sulfonilurea: 15 atau 30 mg sekali sehari</p>	kembung , nyeri tenggorokan , nyeri otot, berat badan bertambah	<p>ditempat bersuhu ruang dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak – anak</p>
	Sulfonilurea ( Acarbose )	Acarbose 100mg	Pasien yang hipersensitif terhadap acarbose dan/atau komponen dalam Obat. Pasien dengan gangguan	Menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2	<p>Dosis awal: 3 kali sehari 50 mg ½ tablet. Dosis selanjutnya: 3 kali sehari 100-200 mg.</p>	Flatulensi (buang gas), diare, nyeri abdominal, nausea.	<p>Simpan ditempat bersuhu ruang dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung.</p>

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
			intestinal kronis yang berhubungan dengan penyerapan dan gangguan pencernaan secara nyata. Keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan perburukan sebagai hasil dari peningkatan pembentukan gas didalam usus (misalnya Roemheld syndrome, hernia mayor, obstruksi intestinal, dan ulkus intestinal) Penderita Inflammatory bowel disease, Seperti kolitis ulseratif dan Crohn disease, obstruksi parsial intestinal atau pada pasien yang mempunyai predisposisi obstruksi intestinal atau ileus. Pasien dengan		Dosis dapat ditingkatkan setelah 4-8 minggu, dan bila pasien menunjukkan respon klinis yang inadkuat setelah pengobatan selanjutnya. Dosis rata-rata : 300 mg per hari. Dikonsumsi bersama satu suapan pertama makanan atau ditelan utuh dengan sedikit airsegera sebelum makan.		Jauhkan obat dari jangkauan anak – anak

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
			gangguan ginjal berat (bersihan kreatinin <25 ml/menit). Selama kehamilan.				
	Insulin	Sansulin Log G cartridge 3 ml	Hipersensitivitas terhadap komponen obat	Pasien yang membutuhkan insulin biasanya diabetes mellitus	Dosis bersifat individual 1 kali sehari diinjeksi secara subkutan diberikan pada waktu yang sama tiap harinya	Gula darah rendah, gangguan penglihatan sementara, perubahan pembentukan lemak tubuh, reaksi diareja injeksi dan alergi, serta terbentuknya antibodi insulin	Simpan pada suhu 2-2 derajat celsius terhindar dari cahaya langsung dan jangan dibekukan
Obat hipertiroid Dan hipotiroid	Levotiroksin	Levothyroxin e sodium 100mcg	Hipersensitivitas terhadap obat ini dan isufisiensi adrenal yang tidak terkoreksi	Mengobati hipotiroidisme yaitu kondisi rendahnya kadar hormon tiroid ( gejalanya adalah mudah lelah, sembelit atau mudah lupa )	Hipotiroidisis Dewasa : dosis awal 50-100 mcg/hari dosis daoat ditambah sebanyak 25 - 50mcg setelah 3-4 minggu Dosis perawatan 100-200mcg Bayi baru lahir : 10-15 mcg/kgBB perhari. Dosis dapat disesuaikan 4-6 minggu	Berat badan turun, sakit kepala , kaki kram, muntah, demam, diare, perubahan siklus menstruasi, rambut rontok, nafsu makan bertambah, tremor.	Simpan dalam wadah tertutup dintemoat sejuk dan terhindar dari sinar matahari langsung, serta jauhkan dari jangkauan anak – anak .
	Propiltiourasil	Propylthiouraci 1100mg	Wanita hamil trimester III	Mengani gejala keringat berlebih , berat badan menurun , mudah	Dosis awal : 100- 150 mg seccar oral tiap 8 jam , jarang	Mual , muntah, sakit peurt , nyeri sendi atau otot, sulit membedakan rasa	Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
				emosi, pembesaran kelenjar tiroid, serta tremor yang biasa terdapat pada penyakit hipertiroid dimana terdapat banyak hormon tiroid dalam tubuh	terjadi 200-300 mg oral tiap 8 jam Perawatan : 100- 150 mg/ hari dalam dosis yang dibagi rata setiap 8 – 12 jam	makanan, atau minuman , pusing, rambut rontok, kesemutan.	sinar matahari dan jauhkan dari jangkauan anak
Kortikosteroid	Hidrokortison,	Hidrokortison acetate cream 2,5%	Hipersensitif, pengobatan dermatitis, penggunaan mata, infeksi mendasar	Mengobati eksim , inflamasi, kemerahan, serta gatal – gatal pada kulit, yang dapat diobati ( dermatitis atopik, alergi, kontak, pruritus anogenital, neurodermatitis)	Oleskan pada kulit yang bermasalah 1-2 kali per hari. oleskan tipis padabagian yang membutuhkan	Muncul rasa tersengat atau kemerahan di area kulit yang dioleskan , gangguan kulit.	Simpan dalam kemasannya letakkan ditempat tertutup dan terhindar dari hawa panas , temoat yang lembab , serta terhindar dari sinar matahari. Jauhkan dari jangkauan anak – anak.
	Betametason,	Betametason	Hipersensitif, TB kulit, infeksi jamur dan virus pada kulit.	Ekzema, termasuk ekzema atopik, infantil, stasis & diskoid & prurigo	Dioleskan 3-4 kali sehari sampai fase akut berakhir, lalu oleskan 1 kali per hari. Oles tipis-tipis pada kulit yang bermasalah	Kulit terasa gatal Kemerahan di kulit Kulit kering Rasa terbakar pada kulit Kulit melepuh	Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari dan jauhkan dari jangkauan anak

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
	Prednison,	Prednison	Penderita penyakit tuberculosis aktif, infeksi akut, infeksi jamur, herpes simpleks mata, ulkus peptikum, hipertensi mengalami osteoporosis mengalami psikosis maupun psikoneurosis berat, serta sedang menerima vaksin hidup.	Artritis reumatoid, asma bronkhial, lupus eritematosus sistemik, demam reumatik yang berhubungan dengan karditis	1-4 tablet 5 mg per hari. Anak: 1-2mg/kgBB per hari dalam 3-4 dosis terbagi Diberikan setelah makan dan sebelum tidur	Mual, anoreksia (kehilangan nafsu makan), nyeri otot, gelisah. Edema, hipernatremia, hipokalemia, iritasi lambung, hipernatremia, hiperkalemia. Gangguan tidur (pada awal terapi)	Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari dan jauhkan dari jangkauan anak
	Metilprednisolon	Metilprednisolon	Infeksi jamur sistemik kecuali terapi antiinfeksi spesifik digunakan; Admin IM pada purpura trombositopenik idiopatik. Admin intratekal. Pemberian vaksin hidup atau hidup yang dilemahkan secara bersamaan (pada pasien yang	Obat ini diindikasikan untuk keadaan alergi dan mengurangi peradangan atau supresi inflamasi.	Dewasa : 4 80mg/hari. Anak : 0.8 - 1.1 mg/kg BB. Dosis pemeliharaan : Dewasa : 4 - 8 mg/hari dosis ditingkatkan menjadi 16 mg/hari. Anak : 2 - 4 mg/hari, dapat ditingkatkan sampai 8 mg/hari. Dosis	Penekanan adrenal, reaksi anafilaktoid, immunosupresi, miopati akut, sarkoma Kaposi, gangguan kejiwaan (misalnya depresi, euforia, insomnia, perubahan suasana hati, perubahan kepribadian), peningkatan kerentanan dan keparahan infeksi,	Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari dan jauhkan dari jangkauan anak

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
			menerima dosis imunosupresif).		substitusi : 4 - 8mg/hari, dalam keadaan stres ditingkatkan menjadi 16 Mg/hari. Dikonsumsi sesudah makan	gangguan penyembuhan, HTN, Nadiaretensi cairan, kolaps CV (dosis tinggi), tukak lambung, katarak subkapsular, atrofi kulit, jerawat, kelemahan otot, retardasi pertumbuhan, penurunan K darah; depresi kulit dermal/subdermal pada tempat inj. Topikal: Gatal, eritema terbakar, vesikulasi; jarang, folikulitis, hipertrikosis, dermatitis perioral, perubahan warna kulit, reaksi alergi pada kulit.	

Obat KB	Levonorgestrel ,	Postinor 2	Hamil, penyakit, kuning, Riwayat kanker payudara, ovarium dan uterus, Riwayat asma,gagal jantung, stroke.	Kontrasepsi oral darurat.	Dewasa:2 tablet sekaligus, dikonsumsi dalam waktu 12-72 jam setelah seksual tanpa perlindungan atau kegagalan alat kontrasepsi	Nyeri perut bagian bawah, sakit kepala, pusing,perlunakan payudara, dismenorhea.	Simpan di Suhu ruang dan kering, serta terhindar dari sinar matahari dan jauhkan dari jangkauan anak - anak
	Etinilestradol	Diane – 35	Hamil, laktasi, gangguan fungsi hati berat, riwayat iketrus idiopatik atau pruritus selama hamil, sindrom dubin-jhonsons, sinrom rotot, kanker payudara, diabetes millitus berat, tumor hati.	Kontrasepsi oral	1 tablet sekali sehari , dimulai pada hari ke 1 siklus haid selama 21 hari diikuti masa istirahat selama 7 hari Dikonsumsi sebelum atau sesudah makan	Perlunakan payudara, nyeri payudara, sakit kepala, mual , nyeri perut, perubahan BB, dismenoera.	Simpan di Suhu ruang dan kering, serta terhindar dari sinar matahari dan jauhkan dari jangkauan anak - anak
	Lynestrenol	Andalan laktasi	Wanita hamil, sedang merencanakan kehamilan,penyak it hati berat, pendarahan vagina,herpes gestasionis,prurit us, riwayat ikterik	Kontrasepsi oral	1 kali sehari 1 tablet	Spotting pada 3 bulan pertama , pusing, mual , peyudara terasa lembek.	Simpan di Suhu ruang dan kering, serta terhindar dari sinar matahari dan jauhkan dari jangkauan anak - anak

Gresik, 25 Maret 2025

Dosen Pembimbing PKL,



Diah Ratnasari, S.Farm., Apt.,M.T

NIDN.0721119001

Gresik, 25 Maret 2025

Pembimbing Lapangan Apotek Cipta Medika GKB



Apt. Sofia Winata Meiliasari, S. Farm.,

SIPA. 19860501/SIPA\_35.25/2022/2060

**A. PRODUCT KNOWLEDGE ALAT KESEHATAN**

**(1) ALKES PERAWATAN**

No	Alkes perawatan	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Bandage gauze (kasa hidrofil)		<p>Digunakan untuk membalut luka setelah dibersihkan dan diberikan obat juga Membantu menyerap darah atau cairan, dan mempercepat penyembuhan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cuci tangan terlebih dahulu sebelum memasang perban untuk menjaga kebersihan dan mencegah infeksi.</li> <li>2. Pastikan ukuran perban sesuai dengan area tubuh atau luka yang akan dibalut, agar perlindungan maksimal.</li> <li>3. Pasang perban dengan hati-hati, jangan terlalu kencang agar sirkulasi udara dan aliran darah tetap lancar di sekitar area yang terluka.</li> <li>4. Amankan ujung perban dengan simpul yang kuat, serta gunakan klip atau perekat untuk menjaga perban tetap pada posisinya.</li> <li>5. Ganti perban secara berkala, setidaknya sekali sehari atau saat sudah lembap dan kotor, agar luka tetap kering, bersih, dan terhindar dari infeksi.</li> </ol>
2.	Elastic bandage		<p>Digunakan untuk menutup luka dan memberikan penyangga pada area cedera jaringan, seperti pergelangan kaki.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posisikan pergelangan kaki pada sudut 90 derajat agar pemasangan perban lebih efektif dan stabil.</li> <li>2. Mulai membalut dari bantalan telapak kaki, dan lakukan sebanyak dua kali putaran untuk memastikan penyangga awal yang kuat.</li> <li>3. Letakkan perban di atas kaki, kemudian lilitkan ke sekitar pergelangan kaki dan silangkan ke</li> </ol>

				<p>arah kaki yang berlawanan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Gunakan teknik membalut pola angka “8”, agar dukungan terhadap sendi lebih optimal dan perban tidak mudah bergeser.</li> <li>Setelah seluruh pergelangan kaki tertutup, amankan ujung perban di area yang tidak langsung bergesekan dengan kulit untuk menghindari iritasi.</li> <li>Pastikan perban terpasang erat namun tidak terlalu ketat, agar aliran darah tetap lancar dan tidak menimbulkan rasa tidak nyaman.</li> </ol>
3.	Kapas pembalut		<p>Digunakan untuk membersihkan dan menutupi luka agar tidak mudah terinfeksi serta dapat digunakan untuk lapisan perban.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bersihkan luka terlebih dahulu dari kotoran atau darah menggunakan cairan antiseptik.</li> <li>Keringkan kulit di sekitar luka dengan hati-hati untuk mencegah iritasi.</li> <li>Tutup luka menggunakan kasa steril, pastikan seluruh area luka tertutupi dengan baik sebelum dilapisi perban.</li> </ol>
4.	Kasa berisi obat (sufra tulle, daryant tulle, bacti grass, actisorb, paronet)		<p>Digunakan untuk melindungi dan membantu pemulihan luka bakar, infeksi sekunder pada kulit</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Potong kasa sesuai ukuran luka, usahakan sedikit lebih lebar agar seluruh area luka tertutup dengan baik.</li> <li>Tempelkan kasa dengan hati-hati pada permukaan luka, pastikan tidak menekan luka terlalu keras agar tidak memperparah kondisi.</li> </ol>

5.	Kasa dressing		Digunakan untuk menutupi luka bakar	Kain kasa dipotong sesuai dengan ukuran luka untuk memastikan seluruh area luka tertutup dengan baik. Setelah dipotong, kain kasa kemudian dilekatkan langsung pada luka secara hati-hati agar menempel dengan sempurna tanpa menyebabkan iritasi atau tekanan berlebih.
6.	Kasa steril		digunakan untuk operasi besar atau kecil, khitan, menutup luka, dan membebat pusar bayi.	Sebelum digunakan, bersihkan luka dari kotoran dan bakteri, keringkan area sekitar luka, lalu tutup luka dengan kasa steril.
7.	Pembalut gips (gypsona)		digunakan untuk membalut bagian tubuh setelah diberi lap kapas atau saat terjadi patah tulang.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasang pelindung (stockinette &amp; padding).</li> <li>2. Celupkan roll gypsona ke air hangat 5–10 detik.</li> <li>3. Balut ke area tubuh secara merata.</li> <li>4. Bentuk sesuai anatomi, biarkan mengeras.</li> <li>5. Cek jari: tidak kebas, tidak membiru.</li> </ol>

8.	Pembalut leher/cervical collar		digunakan untuk menopang kepala dan membatasi pergerakan tulang leher (cervical vertebrae).	Alat ini dipasang dengan cara memasukkan collar secara perlahan ke leher pasien, lalu merekatkan kedua sisinya dengan kuat namun tetap nyaman.
9.	Plester Elastik (handyplas, band aid, elastikon)		digunakan untuk menutup luka dengan sifat elastis, tidak melekat langsung pada luka, steril, dan membantu mencegah infeksi.	Sebelum digunakan, bersihkan dan keringkan kulit di sekitar luka, lalu tempelkan plester tanpa diregangkan. Ganti plester secara teratur agar luka tetap bersih dan kering.
10.	Plester kertas (leukopor, dermilite)		digunakan untuk menutup luka dengan daya rekat tinggi dan tetap tembus udara, sehingga membantu meminimalisir iritasi pada kulit.	Tempelkan plester kertas pada luka dengan hati-hati, pastikan permukaannya bersih dan kering. Pastikan plester merekat dengan kuat agar menutup luka secara optimal dan terlindung dari air.

11.	Plester plastik (leukofix, transfor)		digunakan sebagai perekat untuk plester infus, kateter, kanula, dan alat medis lainnya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gunting atau sobek plester sesuai ukuran yang dibutuhkan.</li> <li>2. Pastikan area yang akan ditemplei bersih, kering, dan tidak berminyak.</li> <li>3. Tempelkan plester pada area yang diinginkan, lalu rekatkan ke kulit atau alat dengan hati-hati.</li> <li>4. Pastikan semua ujung plester menempel dengan baik agar tidak mudah lepas.</li> </ol>
12.	Plester plastik waterprof (setonplast, blenderm)		digunakan untuk melindungi luka dari air, kuman, dan kotoran, sehingga mempercepat proses penyembuhan.	Tempelkan plester langsung pada luka agar tetap kering dan tidak perih saat terkena air.
13.	Plester rayon (microfore, dermisel)		Plester rayon (seperti Microfoam atau Dermisel) memiliki daya rekat kuat dan bersifat anti alergi. Plester ini digunakan untuk menutup luka	dengan cara merekatkannya bersamaan dengan kasa pada area yang terluka.

14.	Plester sutera (leukosilk)		<p>digunakan untuk menutup luka dengan cara mengintegrasikan nanodiamon ke dalam serat sutra.</p>	<p>Sebelum digunakan, luka dibersihkan terlebih dahulu dengan alkohol atau antiseptik lainnya. Setelah itu, plester ditempelkan pada luka. Kandungan nanodiamon membantu mempercepat proses penyembuhan.</p>
15.	Plester ZnO (leukoplas)		<p>digunakan sebagai perekat untuk penutup luka, tabung infus (tube), kateter, dan kanula.</p>	<p>Leukoplast digunakan seperlunya sesuai kebutuhan pengobatan untuk menjaga alat medis tetap pada tempatnya atau menutup luka secara efektif.</p>

**(2) PERAWATAN PASIEN**

No	Perawatan pasien	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Bedpan		Digunakan sebagai wadah feses bagi pasien yang tidak bisa ke kamar mandi.	Letakkan bedpan dengan posisi nyaman, bantu pasien untuk duduk atau berbaring di atasnya. Setelah digunakan, buang feses dan cuci bedpan hingga bersih.
2.	Breast pump		Digunakan untuk membantu mengeluarkan ASI.	Letakkan corong isap pada payudara, lalu alat akan memberikan tekanan untuk memompa ASI ke dalam botol. Bisa digunakan secara manual maupun elektrik, sesuai petunjuk penggunaan.

3.	Colostomy bag		Digunakan untuk menampung feces pada pasien pasca operasi usus besar (kolostomi).	Dokter akan membuat lubang di perut untuk menghubungkan usus besar dengan colostomy bag yang dipasang di luar tubuh.
4.	Ihsjap/eskap		Digunakan untuk meredakan demam atau cedera.	Isi eskap dengan es batu yang sudah dihancurkan hingga $\frac{3}{4}$ penuh. Tempelkan pada area yang ingin dikompres. Setelah digunakan, gantung eskap dengan posisi tutup di bawah agar cepat kering.
5.	Kruk		Digunakan sebagai penyangga tubuh bagi pasien yang mengalami cedera pada tungkai kaki.	Sesuaikan tinggi tongkat kruk, bangun dari posisi duduk menggunakan tongkat, lalu berjalan dengan bantuan kruk untuk menjaga keseimbangan.

6.	Pus basin/emesis basin		Tempat menampung/membuang kapas bekas pakai, nanah, muntah	Pada saat melakukan oprasi dokter akan menggunakan pus basin sebagai tempat pembuangan kapas bekas
7.	Spalk		Digunakan untuk pertolongan pertama pada patah tulang tangan atau kaki.	Lepaskan pakaian yang menutupi area cedera, pasang splak pada bagian yang patah, lalu lilit dengan perban, kain, atau kertas koran bila tidak ada alat lain.
8.	Tapelhoed/nipple shield		Digunakan untuk melindungi puting ibu menyusui yang terluka atau sakit, agar bayi tetap bisa menyusui.	Tempelkan nipple shield pada puting sebelum menyusui, lalu biarkan bayi menyusui melalui alat tersebut.


9.	Tongkat pyramide/elbow		Alat bantu jalan yang menopang tubuh saat berdiri.	Pegang tongkat dengan tangan yang berlawanan dari kaki yang sakit. Tempatkan sedikit ke samping, lalu gerakkan tongkat ke depan bersamaan dengan kaki yang sakit. Pegang dengan stabil.
10.	Urinal		Digunakan untuk menampung urine pada pasien pria.	Arahkan alat kelamin ke dalam wadah, lalu gunakan saat buang air kecil dalam posisi duduk atau berbaring.
11.	Walker		Digunakan oleh lansia atau pasien dengan gangguan berjalan atau patah kaki.	Pegang tongkat dengan tangan yang berlawanan dari sisi yang sakit. Posisikan sedikit ke samping, lalu gerakkan tongkat ke depan bersamaan dengan kaki yang sakit. Pegang tongkat secara stabil.

12.	Warm waterzak		Digunakan untuk menghangatkan bagian tubuh yang nyeri.	Isi warm waterzak dengan air panas, lalu tempelkan pada area tubuh yang sakit untuk membantu meredakan nyeri.
13.	Windring/air cushion		Alas duduk yang digunakan oleh penderita ambeien, wasir, atau cedera punggung agar lebih nyaman saat duduk.	Letakkan windring pada kursi sebelum digunakan untuk duduk.

**(3) ALKES TINDAKAN MEDIS**

No	Alkes tindakan medis	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Ballon/folley cathether		<p>Digunakan untuk menjaga agar kandung kemih tetap kosong guna mendukung penyembuhan luka, pengobatan infeksi, atau pasca operasi.</p>	<p>Selang akan dilumuri dengan pelumas tertentu agar mudah dimasukkan ke dalam saluran kencing. Lalu pasien diberi bius lokal terlebih dahulu untuk mengurangi rasa sakit atau tidak nyaman saat dipasang kateter, kemudian dimasukkan selang kateter ke dalam saluran kencing (uretra) sedikit demi sedikit kira-kira sekitar 5 cm, hingga mencapai leher kandung kemih</p>
2.	Condom cathether		<p>Digunakan untuk pasien pria yang tidak bisa buang air kecil secara normal karena gangguan fisik atau mental.</p>	<p>Pasang condom catheter pada penis, lalu hubungkan dengan urine bag untuk menampung urin.</p>

3.	Disposable syringe		Alat bantu medis berupa pompa piston sederhana untuk menyuntikkan atau menghisap cairan atau gas	mulut pasien dibuka dan memasukkan laringoskop untuk membuka jalan napas dan melihat pita suaranya, kemudian endotracheal dimasukkan dari mulut ke dalam batang tenggorokan pasien. Ukuran tabung akan disesuaikan dengan usia dan ukuran tenggorokan pasien. Selanjutnya tabung endotracheal akan dihubungkan ke sebuah kantong pompa napas sementara atau alat bantu pernapasan berupa ventilator agar oksigen dapat masuk ke paru-paru pasien.
4.	Endotracheal		Digunakan untuk membantu pernapasan pasien yang tidak dapat bernapas sendiri.	Setelah pasien dibius, tabung endotracheal dimasukkan melalui mulut ke batang tenggorokan, lalu dihubungkan ke ventilator atau ambu bag agar oksigen bisa masuk ke paru-paru.

5.	Enema syringe	 The image shows a box for 'Cipta ENEMA SYRINGE'. The box is white with blue and yellow accents. It features the brand name 'Cipta' in a blue circle, the product name 'ENEMA SYRINGE' in large blue letters, and '2 Year Limited Warranty' in smaller text. Below the product name, there is a photograph of the white enema syringe. At the bottom of the box, it lists '• Adult' and '• 6 Ounce Capacity'.	Digunakan untuk mencegah infeksi silang dan membantu proses pengeluaran feses.	Masukkan selang enema ke dalam anus hingga kedalaman 10–12,5 cm, pastikan selang sudah mencapai rektum sebelum cairan dimasukkan.
6.	Feeding syringe	 The image shows two clear plastic feeding syringes in their original packaging. Each syringe has a white plunger and a clear barrel with measurement markings. The packaging is white with blue text and a logo.	Digunakan untuk membantu pemberian makanan atau obat pada pasien yang tidak bisa menelan, seperti bayi prematur atau pasien koma.	Isi spuit dengan makanan halus atau obat cair, lalu masukkan secara perlahan ke dalam mulut pasien.

7.	Feeding tube		<p>Digunakan untuk memberikan nutrisi pada pasien yang tidak bisa makan melalui mulut.</p>	<p>Dengan pemberian anestesi lokal pada pasien terlebih dahulu kemudian feeding tube dilumasi dengan cairan khusus, lalu dimasukkan ke dalam tubuh pasien melalui hidung hingga ke dalam perut. Kemudian makanan atau nutrisi dalam bentuk cair akan di masukkan ke selang feeding tube.</p>
8.	Gliserin syringe		<p>Digunakan untuk menyempotkan cairan ke dalam anus guna merangsang buang air besar.</p>	<p>Letakkan bedpan di bawah pasien, lalu masukkan gliserin perlahan ke anus dengan satu tangan menahan dan tangan lainnya menyempotkan.</p>
9.	Gloves/handschoen		<p>Dipakai untuk mencegah infeksi silang dan penularan kuman, terutama saat prosedur bedah atau tindakan medis.</p>	<p>Cuci tangan dengan sabun, keringkan, lalu gunakan sarung tangan sebelum memulai tindakan.</p>

10.	Infusion set dewasa		Selang infus yang digunakan untuk pemberian cairan atau obat pada pasien dewasa.	Usap area tangan pasien dengan alkohol swab, lalu cari pembuluh vena untuk pemasangan selang infus.
11.	Infusion set pediatrik		Selang infus untuk pemberian cairan atau obat pada anak dan bayi.	Bersihkan area tangan anak/bayi dengan alkohol swab, lalu cari vena untuk pemasangan selang infus.


12.	Insulin syringe		Digunakan untuk menyuntik insulin pada pasien diabetes.	Cubit kulit, bersihkan dengan alkohol, suntikkan insulin dengan sudut 90°, dorong dosis hingga habis, lalu tarik jarum sebelum melepas cubitan.
13.	Intra vena catheter		Digunakan untuk pengobatan intravena jangka panjang (>48 jam).	Tentukan area pembuluh darah yang akan dipasang IV kemudian Tourniquet atau tali pembendung dipasang sekitar 3– 4 inci dari atas area tusukan dan petugas medis membersihkan permukaan kulit di mana infus akan dipasang dengan menggunakan alkohol swab, lalu kateter IV dimasukkan ke pembuluh darah menggunakan jarum. Setelah masuk, jarum dilepaskan dan selang dilekatkan ke lengan pasien

14.	Masker oksigen		Memberikan O <sub>2</sub> dengan kadar sedar	Pastikan sudah terpasang selang ke sumber oksigen, pastikan kantung reservoir mengembang, dan pastikan terdapat katup satu arah berfungsi baik, ubah aliran O <sub>2</sub> menjadi 10-15 L/menit dan letakkan masker oksigen pada wadah pasien menutupi hidung dan mulut
15.	Masker nebulizer anak-anak		Melegakan saluran nafas untuk anak2	Masukkan obat ke cangkir nebulizer sesuai aturan dokter, sambungkan corong mulut ke cangkir nebulizer pasang selang penyambung antara mesin kompresor dan cangkir nebulizer, nyalakan mesin, letakkan corong mulut ke mulut dan pastikan tidak ada celah, biasanya membutuhkan waktu 15-20 menit.
16.	Masker nebulizer dewasa		Melegakan saluran nafas untuk orang dewasa	Masukkan obat ke cangkir nebulizer sesuai aturan dokter, sambungkan corong mulut ke cangkir nebulizer pasang selang penyambung antara mesin kompresor dan cangkir nebulizer, nyalakan mesin, letakkan corong mulut ke mulut dan pastikan tidak ada celah, biasanya membutuhkan waktu 15-20 menit.

17.	Metal cathether		Membantu mengeluarkan urin pada pasien yang mengalami retensi urine.	Metal catheter dimasukkan secara perlahan ke dalam saluran kemih (uretra) hingga mencapai kandung kemih. Setelah itu, ujung bulat dari catheter akan ditarik agar urin dapat keluar melalui selang.
18.	Mucus extractor		Menghisap lendir dari saluran napas bayi baru lahir agar tidak mengganggu pernapasan. Alat ini juga dikenal dengan nama <i>slim suike</i> .	Masukkan ujung mucus extractor ke dalam saluran napas yang tersumbat lendir. Pastikan posisi ujung alat berada di tempat yang tepat, lalu tarik perlahan mucus extractor ke luar untuk mengeluarkan lendir dari saluran pernapasan.
19.	Nasal gastric tube		Menyuplai makanan, cairan, atau obat-obatan kepada pasien yang tidak bisa makan secara oral.	Masukkan selang NGT melalui lubang hidung, melewati tenggorokan hingga mencapai lambung. Setelah posisi dipastikan tepat, makanan cair, minuman, atau obat-obatan dapat dimasukkan melalui selang.

20.	Nebulizer set		<p>Mengubah obat cair menjadi uap yang dapat dihirup untuk membantu melegakan saluran pernapasan.</p>	<p>Masukkan obat ke dalam cangkir nebulizer sesuai anjuran dokter. Sambungkan corong atau masker ke cangkir, lalu pasang selang penghubung ke mesin kompresor. Nyalakan mesin, lalu arahkan corong ke mulut pasien secara rapat. Prosedur ini biasanya berlangsung selama 15–20 menit.</p>
21.	Needle		<p>Untuk Menembus kulit hingga ke pembuluh darah untuk memasukkan obat cair secara intravena.</p>	<p>Buka kemasan jarum suntik, kemudian pasang jarum ke spuit. Setelah itu, alat siap digunakan sesuai kebutuhan medis.</p>
22.	Nelaton cathether		<p>Membantu pasien buang air kecil dalam jangka pendek, terutama pada kondisi retensi urine.</p>	<p>Oleskan pelumas pada selang kateter untuk memudahkan proses pemasukan. Masukkan selang secara perlahan melalui uretra hingga mencapai kandung kemih. Setelah itu, urin akan mengalir keluar melalui selang kateter.</p>

23.	Oxygen nasal canula		<p>Alat bantu pernapasan yang digunakan untuk memberikan oksigen tambahan melalui hidung.</p>	<p>Posisikan pasien dalam posisi duduk atau setengah duduk. Hubungkan selang nasal kanul ke sumber oksigen, lalu atur aliran oksigen sesuai dosis yang dibutuhkan pasien.</p>
24.	Rectal tube		<p>Untuk mencuci isi saluran rektal (rektum).</p>	<p>Pasang alas pada area bokong pasien. Ikatkan plastik pada ujung rectal tube menggunakan karet sebagai penampung. Oleskan pelumas pada rectal tube, buka anus pasien dengan tangan kiri, lalu masukkan rectal tube secara perlahan. Setelah masuk, fiksasi tabung agar tidak bergeser selama proses berlangsung.</p>
25.	Spinal needle		<p>Digunakan untuk pemberian anestesi spinal atau prosedur lumbal pungsi.</p>	<p>Pasangkan spinal needle ke dalam spuit, lalu isikan obat atau cairan sesuai instruksi. Suntikkan ke dalam tubuh pasien di area lumbal (bagian bawah tulang belakang) dengan teknik aseptik oleh tenaga medis terlatih.</p>

26.	Stomach tube		Digunakan untuk membilas atau mencuci lambung, serta untuk mengambil getah lambung.	Oleskan pelumas pada selang stomach tube, lalu masukkan selang melalui mulut atau hidung ke dalam lambung pasien secara perlahan. Prosedur dilakukan oleh petugas medis sesuai indikasi medis.
-----	--------------	--	---	--

27.	Suction cathether		Menyedot lendir dari saluran napas bayi yang baru lahir agar tidak mengganggu pernapasan.	Hidupkan mesin suction, lalu sambungkan suction catheter ke selang suction. Masukkan ujung catheter ke dalam trakea secara perlahan. Tutup lubang kontrol di catheter dengan ibu jari dan gulung catheter di antara ibu jari dan telunjuk saat menariknya keluar, sehingga lendir tersedot keluar dengan optimal.
28.	Suction connecting		Selang penghubung antara suction catheter dan mesin penyedot lendir.	Sambungkan salah satu ujung selang ke mesin suction dan ujung lainnya ke suction catheter untuk memungkinkan hisapan lendir dari saluran napas pasien.

29.	Tranfusion set		Untuk memberikan cairan infus atau transfusi darah ke dalam tubuh pasien.	Usap area tangan pasien dengan alkohol swab untuk sterilisasi. Temukan vena yang sesuai, lalu pasang jarum infus. Sambungkan transfusion set ke cairan infus atau darah, dan pastikan aliran berjalan lancar sesuai dosis yang diperlukan.
30.	Tuberculin syringe		Alat suntik khusus untuk pemberian obat atau cairan dalam volume kecil (1 cc), biasanya digunakan untuk suntik tuberkulin atau insulin.	Masukkan cairan (misalnya napza atau insulin) ke dalam spuit. Pastikan tidak ada gelembung udara di dalam alat suntik. Pegang spuit secara tegak lurus, kemudian suntikkan ke bagian tubuh sesuai instruksi medis, dorong plunger (stik) perlahan hingga semua cairan masuk.

31.	Urine bag		Menampung urine pasien yang tidak bisa buang air kecil secara normal, biasanya digunakan pada pasien rawat inap atau pasca operasi.	Sambungkan urine bag ke kateter urin yang sudah terpasang pada pasien. Pastikan koneksi rapat dan urine bisa mengalir bebas dari tubuh ke dalam kantong penampung.
32.	Wing needle		Untuk akses vena tambahan, pengambilan darah, atau pemberian cairan/obat melalui pembuluh darah.	Tentukan vena pasien, masukkan cairan ke dalam spuit, pasang wing needle, tusuk bagian yang akan diambil darahnya.

**(4) ALAT-ALAT BEDAH**

No	Alat-alat bedah	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Arterie klem/artery forceps		Alat penjepit untuk menahan atau menjepit benda saat prosedur medis.	Pegang arteri klem dengan jari lalu capit benda yang akan dipakai
2.	Bandage scissors		Gunting khusus untuk memotong perban, plester, atau kain medis.	Siapkan perban yang akan dipotong. Pegang bandage scissors dan potong perban sesuai kebutuhan, pastikan tidak mengenai kulit pasien.
3.	Benang jahit catgut chromic		Digunakan untuk menjahit luka dalam atau jaringan tubuh yang butuh waktu lebih lama untuk pulih, biasanya diserap tubuh dalam waktu sekitar 10 hari.	Masukkan benang catgut chromic ke dalam jarum bedah. Lakukan anestesi (bius) pada pasien sebelum menjahit luka dengan teknik sesuai prosedur medis.

<p>4.</p>	<p>Benang jahit catgut plain</p>		<p>Menjahit jaringan lunak seperti otot, usus, dan uterus, karena benang ini akan diserap tubuh dalam waktu 3–7 hari.</p>	<p>Masukkan benang jahit ke jarum bedahl, bias pasien dulu sebelum melakukan</p>
<p>5.</p>	<p>Benang jahit silk</p>		<p>Menjahit luka yang ada dikulit dan sering bergerak</p>	<p>Masukkan benang jahit ke jarum bedahl, bias pasien dulu sebelum melakukan</p>
<p>6.</p>	<p>Bisturi</p>		<p>Alat pemotong yang digunakan dalam tindakan pembedahan untuk menyayat jaringan.</p>	<p>Pegang bisturi dengan menggenggam bagian bawah gagang. Pastikan mata pisau sudah steril. Arahkan ke area tubuh yang akan disayat sesuai prosedur medis.</p>

7.	Forceps/pinset anatomis		Menjepit atau memegang jaringan saat operasi tanpa merusak jaringan.	Pegang forceps pada bagian tengah yang berpola garis menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Gunakan untuk menjepit atau menahan jaringan dengan lembut selama tindakan medis.
8.	Forceps/pinset cilia		Untuk mencabut rambut halus atau digunakan dalam proses persalinan normal untuk membantu mengeluarkan bayi.	Setelah pasien dibius dan kateter urin dipasang untuk mengosongkan kandung kemih, dokter akan melakukan sayatan pada jalan lahir (episiotomi) dan menggunakan forceps cilia untuk membantu menarik keluar bayi secara perlahan.
9.	Forceps/pinset sirugis		Menjepit jaringan saat tindakan diseksi atau untuk membentuk pola dalam proses penjahitan luka.	Genggam forceps menggunakan ibu jari dan dua/tiga jari lainnya. Gunakan untuk memegang jaringan kecil atau objek dengan presisi selama prosedur pembedahan.
10.	Forceps/pinset splinter		Digunakan untuk mencabut pecahan kecil yang menancap di permukaan kulit, seperti serpihan kaca atau logam.	Pegang forceps dengan mantap menggunakan ibu jari dan telunjuk. Arahkan ujung alat ke pecahan yang menancap, kemudian tarik perlahan hingga pecahan keluar dari kulit.

11.	Gunting bedah mayo		Memotong jaringan tebal seperti otot atau memotong balutan medis.	Digunakan saat pembedahan untuk memotong jaringan atau balutan yang tidak sesuai. Pegang dengan kuat, arahkan ke jaringan atau kain yang akan dipotong, lalu gunting sesuai kebutuhan.
12.	Gunting bedah metzenbaum		Untuk memotong jaringan halus atau melakukan diseksi tumpul pada jaringan lunak.	Pegang gunting dengan tangan dominan, arahkan ke jaringan yang akan disayat secara hati-hati agar tidak merusak jaringan sekitar. Cocok digunakan untuk diseksi dalam prosedur bedah.
13.	Gunting bedah runcing		Digunakan untuk memotong, atau membedah organ seperti usus dan jantung.	Pegang gunting dengan ibu jari dan jari telunjuk, kemudian arahkan dan gunting bagian tubuh atau organ yang menjadi target operasi sesuai dengan prosedur medis yang berlaku.

14.	Gunting tali pusar		Memotong tali pusar bayi baru lahir	Genggam alat dengan tangan kanan lalu potong tali pusar pada bayi yang baru lahir
15.	Hecting set		Alat bedah minor untuk menjahit luka	Membantu saat benang jahit keluar dan masuk ke dalam kulit
16.	Jarum jahit		Menutupi goresan, luka dan sayatan	Anestesi dulu, pembersihan luka, jahit luka dengan jarum jahit yang sesuai yang akan digunakan

17.	Klem mosquito		Menjepit jaringan tubuh maupun pembuluh darah untuk menghentikan pendarahan	Jepit jaringan dengan memegang klem dengan tangan kanan (dominan)
18.	Klem tali pusat/umbilical cord clem		Menjepit tali pusat yang baru dipotong dari plasenta	Jepit tali pusar dengan klemtasi pusar pada bayi yang baru lahir

19.	Needle holders		Menjepit jarum jahit serta menjahit luka tertentu	Memotong benang dengan alat ini selama pembedahan
20.	Peritoneum forceps		Membantu proses pembedahan dengan membuka akses ke bagian tubuh yang dibutuhkan..	Genggam peritoneum menggunakan tangan kanan, lalu jepit jaringan tersebut bersama lapisan peritoneum.
21.	Skalpel		digunakan untuk melakukan sayatan atau pembelahan jaringan.	Tentukan bagian tubuh yang akan dilakukan pembedahan, lalu gunakan skalpel untuk membuka atau membedah bagian tersebut sesuai prosedur medis.

**(5) Disinfektan**

No	Disinfektan	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Alkohol 70%		Digunakan sebagai antiseptik, untuk membersihkan luka serta alat-alat medis.	Dituang pada kassa steril atau kapas, kemudian diusapkan pada area luka atau permukaan alat medis yang akan digunakan
2.	Alkohol swab		Tisu alkohol praktis yang dipakai sebelum tindakan injeksi (contoh: insulin), pengambilan darah, serta sterilisasi alat kesehatan.	Langsung diusap pada kulit pasien sebelum injeksi/pengambilan darah, atau pada alat kesehatan sebelum digunakan.
3.	H2O2 3%		Digunakan sebagai disinfektan luar dan untuk pembersih luka ringan.	Digunakan secara topikal (luar) dalam jumlah yang sesuai, diteteskan atau diusap pada luka untuk membersihkan area dari kotoran atau mikroorganisme..

4.	Povidone iodine		Membunuh kuman penyebab infeksi pada luka terbuka maupun sariawan. Mencegah infeksi pada luka lecet, tergores, terkoyak, terkelupas, dan luka ringan lainnya.	Membunuh kuman penyebab infeksi pada luka terbuka maupun sariawan. Mencegah infeksi pada luka lecet, tergores, terkoyak, terkelupas, dan luka ringan lainnya.
5.	Rivanol		Digunakan untuk membersihkan luka ringan. Rivanol memiliki sifat antiseptik ringan yang dapat mencegah infeksi dan mempercepat penyembuhan luka.	Tuangkan rivanol pada kapas steril, kemudian usapkan secara perlahan ke area luka. Bisa juga digunakan untuk membasuh luka secara menyeluruh.

**(6) APD**

No	APD	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Apron		Melindungi tubuh dari suhu panas dan percikan bahan kimia berbahaya.	Dipakai sebelum memasuki area laboratorium atau ruangan dengan risiko bahan kimia untuk perlindungan tubuh.

2.	Masker		Mencegah masuknya mikroorganisme, debu, dan partikel kotoran melalui saluran pernapasan.	Pasang masker di wajah sebelum melakukan tindakan medis, seperti pemeriksaan atau prosedur steril.
3.	Masker N95 disposable		Menyaring partikel halus di udara dan memberikan perlindungan tambahan setelah masker bedah.	Digunakan setelah memakai masker bedah untuk perlindungan lebih tinggi terhadap kontaminasi udara.
4.	Non woven/surgical cap		Menutup rambut untuk mencegah kontaminasi, serta menyerap keringat agar tidak menetes ke pasien.	Dipasang di kepala sebelum tindakan medis untuk menjaga area kerja tetap steril.

5.	Sarung tangan		Melindungi tangan dari kontaminasi lingkungan, cairan tubuh, dan bahan kimia.	Pakai di kedua tangan sebelum memegang alat atau melakukan kontak dengan pasien/produk steril.
6.	Shoe cover		Melindungi kaki dan alas kaki dari kontaminasi virus, bakteri, atau kotoran lingkungan.	Dipakai menutupi sepatu/sandal bersih sebelum memasuki area steril atau ruang tindakan.

7.	Kaca mata google		Melindungi mata dari percikan cairan tubuh, bahan kimia, dan paparan sinar UV saat tindakan medis.	Digunakan sebelum prosedur medis seperti operasi; pastikan posisi nyaman dan menutup rapat area mata.
----	------------------	--	--	---


**(7) ALKES UNTUK DIAGNOSA**

No	Alkes untuk diagnosa	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Anaroid spygmomanometer		Mengukur tekanan darah (tanpa air raksa)	Siapkan alat, pasang manset di lengan atas, letakkan stetoskop di lipatan siku, pompa manset dan baca nilai sistolik & diastolik.

2.	Electrical sphygmomanometer		Mengukur tekanan darah secara otomatis	Pasang manset di lengan atas, pastikan selang di posisi tengah, duduk tegak, tekan tombol mulai dan tunggu hasil di layar.
3.	Mercurial sphygmomanometer		Mengukur tekanan darah dengan akurasi tinggi, menggunakan kolom air raksa	Pasien diminta luruskan lengan, pasang manset dan pompa hingga tekanan naik, baca hasil di kolom air raksa.

<p>4.</p>	<p>Chart vision Snellen</p>	 <p>The image shows a standard Snellen vision chart. It consists of several rows of letters of decreasing size. The top row has a single large 'O'. The second row has 'X' and 'F'. The third row has 'Z', 'O', and 'H'. The fourth row has 'L', 'D', 'A', and 'T'. The fifth row has 'T', 'A', 'L', 'O', and 'E'. The sixth row has 'A', 'L', 'D', 'O', 'T', and 'F'. The seventh row has 'O', 'E', 'H', 'L', 'T', and 'A', 'D'. The eighth row has 'L', 'D', 'O', 'L', 'D', 'A', 'T', and 'F'. The ninth row has 'E', 'C', 'T', 'L', 'D', 'A', 'Z', 'O', and 'H'. The tenth row has 'Z', 'O', 'R', 'L', 'D', 'O', 'T', 'T', 'L', 'D', and 'A'. On the left side, distances in feet are listed: 200, 100, 75, 50, 40, 30, 25, 20, 15, and 10. On the right side, distances in meters are listed: 61.00, 30.50, 21.34, 15.24, 12.19, 9.14, 7.62, 6.10, 4.57, and 3.05.</p>	<p>Menilai ketajaman penglihatan, sekaligus memastikan pasien tidak buta huruf</p>	<p>Pasien berdiri/duduk 6 meter dari kartu, satu mata ditutup, kemudian diminta membaca huruf dari atas ke bawah.</p>
<p>5.</p>	<p>Ear speculum</p>	 <p>The image shows a metal ear speculum, which is a pair of forceps with a curved, hook-like end used to examine the ear canal.</p>	<p>Memeriksa rongga telinga untuk melihat kondisi saluran atau adanya infeksi</p>	<p>Pegang spekulum dengan ibu jari dan telunjuk, tarik daun telinga dengan jari tengah dan manis, lalu masukkan spekulum ke telinga</p>

6.	Ear thermometer		Mengukur suhu tubuh dari dalam telinga	Tekan tombol ON, masukkan ke telinga belakang secara perlahan, tunggu bunyi indikator, baca hasil di layar, lalu tekan tombol OFF.
7.	Gelang pasien		Memberi tanda status atau identitas pasien	Pasangkan pada pergelangan tangan pasien sesuai warna kode: Merah (alergi), Biru (laki-laki), Pink (perempuan), Abu-abu (kemoterapi), Kuning (pengawasan).
8.	Head lamp		Memberikan pencahayaan saat pemeriksaan area seperti THT, IGD, dan ruang bedah	Dipasang di kepala sebelum tindakan medis untuk memastikan pencahayaan fokus ke area yang diperiksa.

9.	Hemometer		Menentukan kadar hemoglobin dalam darah dengan perbandingan warna	Isi tabung dengan HCl 0,01N sampai batas, tambahkan darah 0,02 ml, aduk, encerkan dengan aquades hingga warna sesuai standar hemometer.
10.	Ishihara's test for colour blindness		Menentukan kelainan buta warna pada pasien	Pasien diminta membaca angka atau mengikuti pola warna dari buku tes. Hasil interpretasi berdasarkan pola yang terlihat atau tidak terlihat.
11.	Laringeal mirror		Memeriksa keadaan dalam mulut dan laring	Cermin diarahkan ke bagian belakang rongga mulut, dengan permukaan menghadap ke atas untuk refleksi visual ke laring.

12.	Nasal speculum		Untuk memeriksa kondisi dalam rongga hidung	Dimasukkan secara vertikal ke dalam vestibul hidung sekitar 1 cm untuk membuka dan mengevaluasi rongga hidung.
13.	Pen needle		Mempermudah penggunaan insulin bagi pasien diabetes	Pasangkan pen needle pada ujung insulin pen, kemudian insulin siap untuk disuntikkan sesuai dosis anjuran.
14.	Percussion hammer		Menghasilkan suara getar saat mengetuk tubuh, untuk evaluasi refleks atau organ	Pegang gagang palu, ketukkan perlahan pada area tubuh tertentu yang sedang diperiksa, seperti sendi atau otot.

15.	Pulse meter		Mengukur kadar oksigen (SpO2) dalam darah	Nyalakan alat, tempatkan di jari tangan, tunggu hasil muncul, lalu bersihkan dengan alkohol setelah digunakan.
16.	Rectum speculum		Pemeriksaan rektum dan lubang anus	Cuci tangan, masukkan bagian anoskop ke anus, alat akan melebarkan bukaan agar bagian dalam bisa dilihat.
17.	Reflex hamer		Memeriksa respons refleksi otot atau tendon	Pegang gagang palu, ayunkan ke area tendon (misal: lutut) untuk melihat refleksi otomatis tubuh.

18.	Spirometer		Mengukur kapasitas udara saat bernapas masuk dan keluar dari paru-paru	Pasien duduk nyaman, hidung ditutup dengan klip, tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan cepat dan kuat ke mouthpiece alat.
19.	Stethoscope binaural		Mendengar bunyi organ dalam (jantung, paru-paru, perut)	Pasang ke telinga, arahkan ke depan, letakkan membran di dada/punggung, sesuaikan posisi hingga suara terdengar jelas
20.	Stethoscope monoaural		Mendengar detak jantung bayi	Letakkan bagian besar di perut ibu hamil, gunakan ujung kecil untuk menangkap detak jantung janin.

21.	Stopwatch		Mengukur waktu pada prosedur tertentu	Tekan tombol sesuai kebutuhan penghitungan, simpan di tempat aman untuk memantau durasi tindakan medis.
22.	Termometer digital		Mengukur suhu tubuh (mulut, ketiak)	Nyalakan, tempelkan di area pengukuran, tunggu bunyi indikator, baca hasil di layar, lalu matikan dan bersihkan alat.
23.	Termometer oral		Mengukur suhu melalui rongga mulut	Letakkan di bawah lidah, tutup mulut rapat, tunggu bunyi, lalu baca hasil pengukuran.

24.	Termometer rektal		Mengukur suhu melalui anus (rektum)	Cuci tangan, siapkan alat, posisikan pasien nyaman, masukkan ke anus, baca hasil, lalu bersihkan alat kembali.
25.	Timer lab		Sebagai pengatur waktu dalam prosedur medis/eksperimen	Putar searah jarum ke angka 55, lalu balik ke waktu yang diinginkan. Dapat digunakan sebagai pengingat atau alarm waktu.
26.	Tongue depressor		Menekan lidah agar dokter dapat melihat lebih jelas bagian tenggorokan	Pasien buka mulut, tekan lidah perlahan dengan tongue depressor untuk membuka pandangan ke faring dan laring.

27.	Tourniquet		Untuk menghentikan pendarahan pada luka terbuka di lengan dan kaki	Torniquet dipasang pada 3-4 inci diatas tempat tusukan , jika terlalu dekat dari tempat tusukan,vena dapat kolaps ketika darah terisap ke dalam tabung dan jika terlalu jauh dari tempat tusukan pengambilan darah tidak akan efektif.
28.	Vaginal speculum		Untuk Memeriksa lubang Vagina	Dikedalam Vagina selama operasi langsung dan memriksa vagina di dalamnya.

Gresik, 25 Maret 2025

Dosen Pembimbing PKL,



Diah Ratnasari, S.Farm., Apt.,M.T

NIDN.0721119001

Gresik, 25 Maret 2025

Pembimbing Lapangan Apotek Cipta Medika GKB



Apt. Sofia Winata Meiliasari, S. Farm.,

SIPA. 19860501/SIPA\_35.25/2022/2060

D. SWAMEDIKASI

Buatlah studi kasus setiap harinya dengan kategori obat yang berbeda dan wajib menyelesaikan 20 jenis obat yang tertera dalam tabel.

No	Nama obat	kategori	Studi kasus	Patient assesment	Pemilihan obat dan alasannya	Pelayanan informasi obat
1.	Analgetik dan antipiretik	Paracetamol, ibuprofen	Seorang ibu mengeluh anaknya yang berumur 8 tahun dengan keluhan demam dan nyeri kepala yang berlangsung selama 2 hari. Anaknya memiliki Riwayat gangguan pencernaan yang diketahui. Sebelumnya hanya dilakukan dengan diberikan bye-bye fever	W: anak usia 8 tahun mempunyai Riwayat gangguan pencernaan W: mengeluh demam dan nyeri kepala H: selama 2 hari A: diberikan bye-bye fever M: belum mengkonsumsi obat apapun	Obat yang terpilih paracetamol, karena pasien termasuk kategori anak-anak dengan usia 8 tahun dan mengatasi nyeri ringan hingga sedang tanpa risiko iritasi lambung, serta lebih aman untuk anak-anak	Indikasi: meredakan sakit kepala, menurunkan demam Cara penggunaan: dewasa: 1-2 tablet, diberikan sebanyak 3-4 kali per hari Anak usia 6-12 tahun: ½ tablet, diberikan sebanyak 3-4 kali per hari Kapan berhenti: apabila tidak demam dan nyeri Kapan harus ke dokter: jika demam dan nyeri tidak bisa turun dengan paracetamol, bila demam tidak berkurang 2 hari lebih dan disertai gejala lain ESO yang sering: ruam pada kulit, kehilangan nafsu makan Cara menyimpan: Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.
2.	Batuk	gliseril guaiakolat (guaifenesin), bromheksin, diphenhidramin, asetilsistein, noskapin	Seorang pasien laki-laki berusia 35 tahun datang dengan keluhan batuk berdahak yang berlangsung selama 3 hari dan dahaknya	W: seorang pasien laki-laki berumur 35 tahun W: mengeluh batuk berdahak	Obat yang terpilihnya bromheksin karena pasien mengeluh batuk berdahak dengan dahaknya	Indikasi: untuk mengatasi batuk berdahak, kondisi pernafasan yang ditandai dengan lendir berlebih pada saluran napas

			susah untuk dikeluarkan dan belum dilakukan tindakan apapun sebelumnya	H: selama 3 hari A: tidak ada M: belum mengkonsumsi obat apapun	susah dikeluarkan	Cara penggunaan: diminum 3 kali sehari 1 tablet Kapan berhenti: apabila batuk sudah berhenti Kapan harus ke dokter: jika gejala tersebut belum sembuh hingga hari lebih ESO yang sering: pusing, mual Cara menyimpan: Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.
3	Obat flu	Sediaan kombinasi parasetamol, dekstrometorfan, gliseril guaiakolat (guaifenesin), CTM, dan efedrin/pseudoefedrin/fenilpropanolamin	Seorang Wanita yang berusia 20 tahun datang ke apotek mengeluhkan flu hingga hidung tersumbat, bersin, dan disertai badan meriang dan batuk sejak 4 hari yang lalu sehingga sulit untuk tidur sebelumnya menggunakan OBH combi untuk meringankan gejala tetapi tidak kunjung sembuh	W: Wanita berusia 20 tahun W: flu, bersin, badan meriang hingga batuk H: sejak 4 hari yang lalu A: tidak ada M: mengkonsumsi obat OBH combi	Obat yang terpilihnya flucadex karena dapat mengatasi flu, bersin, batuk, batuk serta ada efek mengantuk karena Wanita mengeluhkan tidak bisa tidur sehingga dengan efek obat tersebut dapat beristirahat	Indikasi: meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk Cara penggunaan: dewasa di atas 12 tahun: 3 kali sehari 1 kaplet, anak 6-12 tahun: 3 kali sehari ½ kaplet Kapan berhenti: jika flu dan batuk sudah berhenti Kapan harus ke dokter: jika gejala tersebut tidak kunjung sembuh selama 4 hari ESO yang sering: mengantuk Cara menyimpan: Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.
4	Obat maag	Antasida, antagonis H2	Seorang pria berumur 40	W: pria usia 40 tahun	Obat yang terpilihnya	Indikasi: gejala yang terikat dengan

		(ranitidine, famotidine)	tahun datang ke apotek yang memiliki Riwayat penyakit maag, pria ini sering melewati makan pagi dan mengkonsumsi kopi secara berlebihan sehingga akibatnya ia dari kemarin merasakan nyeri di perut, mual, muntah, dan perut terasa kembung	memiliki Riwayat penyakit maag yang sering telat makan W: nyeri perut, mual, muntah, dan perut trasa kembung H: dari kemarin A: belum minum obat apapun	yaitu antasida doen karena untuk meredakan nyeri dibagian perut, mual, muntah, dan perut kembung	kelebihan produksi asam lambung, gastritis, tukak duodenum dan peptic seperti mual, nyeri lambung dan nyeri ulu hati Cara penggunaan: Dewasa : 1-2 tablet 3-4kali/hari. Anak (6-12 tahun) : 1/2 - 1 tablet 3-4 kali/hari diberikan 1-2 sebaiknya diminum saat perut kosong dengan dikunyah Kapan berhenti: jika asam lambungnya sudah tidak kambuh Kapan harus ke dokter: bila gejala tersebut melebihi dari 3 hari tidak sembuh-sembuh ESO yang sering: mual, muntah Cara menyimpan: Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung
5	kecacangan	Pirantel pamoat, piperazin, mebendazol	Seorang ibu membawa anaknya berusia 6 tahun yang menderita sulit bertambah berat badan tetapi porsi makan yang dimakan seperti biasanya. Akhir-akhir itu anaknya sering membeli makanan diluar. Ibunya mengeluhkan bahwa anaknya	W: ibu membawa anaknya usia 6 tahun yang sulit bertambah berat badan W: gatal di daerah anus H: sudah 3 hari A: membasuh dengan sabun M: belum mengkonsum	Obat yang terpilihnya combantrim 125 mg karena yang dikeluhkan disebabkan oleh cacing	Indikasi: pengobatan infeksi yang disebabkan oleh cacing Cara penggunaan: 2-6 tahun: 1-2 tablet, 6-12 tahun: 2-3 tablet, >12 tahun: 3-4 tablet Kapan berhenti: - Kapan harus ke dokter: apabila gejala masih muncul setelah minum obat ESO yang sering: mual, muntah,

			sering menggaruk area anus yang sudah 3 hari, akibatnya anak sering sulit tidur sehingga bagian anus dibasuh dengan sabun namun belum redah juga gatalnya	msi obat apapun		diare, sakit kepala, pusing Cara menyimpan: simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung
6	Diare	Attal pugit, kaolin pectin, oralit, Norit	Seorang ibu membawa anaknya berusia 5 tahun, ibu mengeluhkan bahwa anaknya mengalami buang air besar cair sebanyak 3 kali sejak pagi hari. tetapi tidak muntah atau demam tinggi namun anak tersebut badan agak lemas. Ibunya telah memberikan rebusan daun jambu tetapi belum sembuh	W: ibu membawa anaknya berusia 5 tahun W: yang mengalami diare dan lemas H: pagi hari A: minum rebusan daun jambu M: belum minum obat apapun	Obat yang terpilihnya oralit karena pasien tersebut diare dan badannya lemas	Indikasi: mengatasi pada pasien muntah dan diare Cara penggunaan: larutkan 1 bungkus ke dalam 200ml air matang Kapan berhenti: apabila diare sudah berhenti atau fases sudah memadat Kapan harus ke dokter: apabila diare berlanjut selama 2 hari, mengalami dehidrasi dan muncul darah pada fases ESO yang sering: perut kembung Cara menyimpan: simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung
7	Laksatif	Bisakodil, laktulosa, Na lauril sulfat.	Seorang pria berusia 50 tahun datang ke apotek dengan keluhan susah buang air besar selama 5 hari, biasanya buang air besar setiap 2 hari sekali dan merasa begah di perut, kadang-	W: pria usia 50 tahun W: kesulitan buang air besar dengan begah di perut, perut mulas H: selama 5 hari	Obat yang terpilihnya Dulcolax karena mampu mengatasi susah BAB	Indikasi: untuk mengatasi konstipasi Cara penggunaan: 12 th: 2-3 tablet sekali sehari, 6-12 th: 1 tablet sekali sehari diminum pada malam hari sebelum tidur

			kadang mulas tapi tidak kunjung bisa BAB. Pria ini sudah mengonsumsi sayuran dan buah-buahan yang mengandung serat tinggi	A: mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran yang mengandung serat tinggi M: belum minum obat apapun		Kapan berhenti: jika sudah bisa BAB lancar Kapan harus ke dokter: jika masih kesulitan BAB ESO yang sering: nyeri perut Cara menyimpan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
8	Biang keringat, pruritus, antihistamin topikal	Salisil talk dan sediaan yang mengandung kalamina; difenhidramin 2%, prometazin HCl 2%.	Anak berusia 1 tahun mengalami ruam kemerahan di leher, punggung, dan dada anaknya. Kulit tampak merah, berbintik kecil, merasa gatal, anaknya sering berkeriang karena panas dan bermain aktif, ruam ini muncul sejak 2 hari yang lalu. Ibunya telah memberikan sabun gatal lactacyd baby saat mandi dan menggunakan minyak telon	W: anak berusia 1 tahun W: muncul bitnik kecil serta kemerahan merasa gatal dan sering berkeriang H: sejak 2 hari A: diberi minyak telon M: saat mandi menggunakan lactacyd baby	Obat yang terpilih bedak salicyl acid karena dapat digunakan untuk mengobati gatal yang dikarenakan biang keringat dan terasa sejuk saat digunakan	Indikasi: untuk menyembuhkan macam-macam penyakit kulit seperti gatal-gatal pada kulit, keringat buntut, bisul-bisul, cacar air, gabaken, dll Cara penggunaan: ditaburkan pada bagian kulit yang sakit atau gatal Kapan berhenti: bisa digunakan setiap hari untuk menyejukan badan Kapan harus ke dokter: apabila biang keringat dan gatal tidak sembuh atau semakin parah ESO yang sering: - Cara menyimpan: disimpan pada tempat yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari
9	Jerawat	Obat yang mengandung sulfur; resorsinol; asam salisilat; benzoil peroksida; triclosan,	Seorang remaja berusia 19 tahun datang ke apotek mengeluhkan wajahnya sedang jerawat banyak sejak beberapa bulan terakhir, jerawat	W: remaja berusia 19 tahun W: adanya jerawat banyak, nyeri tetapi tidak sampai bernanah	Obat yang terpilihnya acnes sealing gel karena dapat mengobati jerawat, mengangkat sel kulit mati	Indikasi: mengecilkan volume jerawat, mengurangi kemerahan pada kulit wajah akibat jerawat Cara penggunaan: dioles

		minosiklin 1%.	muncul terutama di dahi, pipi, dan dagu. Terkadang nyeri tetapi tidak sampai bernanah berat. Ia mencoba beberapa produk pembersih wajah tetapi masih belum cocok, ia ingin membeli produk secara gel yang ada sensasi dingin	H: beberapa bulan terakhir A: menggunakan beberapa produk pembersih wajah M: belum menggunakan obat apapun	selepas jerawat sediaannya berupa gel yang memberikan efek dingin di kulit yang berjerawat	kan secara tipis-tipis pada jerawat Kapan berhenti: jika jerawat sudah tidak muncul Kapan harus ke dokter: apabila jerawat masing-masing belum mengempes atau meradang ESO yang sering: iritasi pada wajah Cara menyimpan: Simpan pada suhu 20-25°C, terhindar dari cahaya matahari langsung
10	Kadas/kurap, antifungi	Obat yang mengandung klotrimazol 1%, mikonazol nitrat 2%, ketoconazole nitrat	Bapak x yang berusia 42 tahun datang ke apotek dengan keluhan gatal dan munculnya bercak kemerahan di daerah sela-sela jari tangan dan kakinya terasa perih, panas, dan kemerahan sejak 3 hari. Ia bekerja sebagai teknisi lapangan, sehingga sering berkeringat terutama pada siang hari biasanya pada malam harinya di lap dan belum menggunakan obat apapun	W: bapak x usia 42 tahun bekerja sebagai teknisi lapangan W: pada sela-sela jari tangan dan kaki terasa perih, panas, kemerahan H: sejak 3 hari A: hanya di lap jika kakinya basah dan terasa perih M: belum menggunakan obat apapun	Obat yang terpilihnya miconazole krim karena dapat mengatasi infeksi jamur seperti kutu air	Indikasi: infeksi kuku dan kulit karena dermatofita, kandida atau jamur lain dan bakteri gram positif Cara penggunaan: dioleskan pada bagian yang sakit Kapan berhenti: setelah menggunakan selama 2 minggu Kapan harus ke dokter: apabila gejala belum sembuh atau semakin parah ESO yang sering: sensasi rasa terbakar Cara menyimpan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
11	Ketombe	<i>Shampoo</i> yang mengandung Selenium sulfid, Zinc pyrithione	Seorang Wanita berusia 30 tahun mengeluh gatal dan ketombe berlebih di kulit kepala, ia mengeluh	W: seorang Wanita berusia 30 tahun W: mengeluh adanya	Obat yang terpilihnya selsun blue shampoo karena mengandung selenium	Indikasi: mengatasi rambut ketombe Cara penggunaan: tuangkan selsun secukupnya, aplikasikan pada rambut dan kulit

			serpihan putih yang sering terlihat, dan kulit kepala terasa perih dan berminyak sejak seminggu. Ia sudah mencoba beberapa merk shampoo tetapi hasilnya hanya bertahan sebentar	ketombe dan terasa gatal H: semingguan A: belum ada Tindakan M: belum menggunakan obat apapun	sulfida yang efektif menghilangkan dan mencegah ketombe jika dibandingkan dengan shampoo lainnya	kepala secara merata, biarkan 2-3 menit untuk hasil yang maksimal kemudian bilas hingga bersih Kapan berhenti: shampoo ini bisa digunakan secara terus menerus untuk mencegah ketombe Kapan harus ke dokter: jika ketombe tidak berkurang ESO yang sering: - Cara menyimpan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
12	Kutil	obat yang mengandung asam salisilat 2 g, asam laktat 0,5 g.	Seorang pria berusia 25 tahun datang ke apotek dengan keluhan adanya benjolan kecil di telapak kaki bagian tumit yang terasa nyeri saat berjalan. Benjolan tersebut mulai muncul sekitar 1 minggu lebih. Pria tersebut tidak melakukan Tindakan apapun sebelumnya dan belum menggunakan obat apapun	W: seorang pria usia 25 tahun W: di bagian telapak kaki ada benjolan kecil terasa nyeri saat berjalan H: semingguan A: belum ada tindakan M: belum menggunakan obat apapun	Obat yang terpilihnya callusol karena dapat melunakkan kulit yang mengeras seperti kutil, mata ikan	Indikasi: untuk mata ikan, kapalan, kutil Cara penggunaan: callusol dituangkan ke kapas/kasa, ditempelkan di bagian yang luka selama semalam digunakan pada malam hari selama tidur Kapan berhenti: jika kutil terlepas Kapan harus ke dokter: jika terjadi pada efek samping yang tidak kunjung sembuh ESO yang sering: iritasi Cara menyimpan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari

13	Luka bakar	Obat yang mengandung perak sulfadiazin; oleum iecoris aselli (minyak ikan," <i>levertra an</i> ").	Seorang ibu datang ke apotek mengeluh anak laki-lakinya yang berusia 9 tahun pada bagian kaki bawah luka melepuh akibat terkena knalpot sepeda montor tiga hari sebelumnya dan kulitnya terada panas, perih, dan kemerahan. Luka sempat diobati dengan mengoleskan pasta gigi justru itu luka semakin memburuk	W: seorang ibu membawa anak laki-lakinya berusia 9 tahun W: terkena knalpot sepeda montor sehingga kulitnya terasa panas, perih, kemerahan H: 3 hari sebelumnya A: dioleskan dengan pasta gigi M: belum menggunakan obat apapun	Obat yang terpilihnya bioplacenton karena dapat mengobati luka bakar salah satunya terkena knalpot	Indikasi: penyembuhan luka bakar, luka terinfeksi, ulkus kulit Cara penggunaan: dioleskan pada luka 3-5 kali sehari Kapan berhenti: jika luka bakarnya sudah sembuh Kapan harus ke dokter: jika luka bakar semakin parah dan tidak mengalami perubahan setelah penggunaan ESO yang sering: Gatal, terbakar Cara menyimpan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
14	Luka iris	Povidon iodine	Bapak R berusia 35 tahun datang dengan keluhan luka lecet di pergelangan tangan yang baru terjadi akibat terjatuh saat mengendarai sepeda montor luka tampak kemerahan dan sedikit perih. Saat kejadian luka dibersihkan menggunakan air dan tissue. Ia merasakan perih dan ingin diberikan obat	W: bapak R usia 35 tahun W: luka lecet di pergelangan tangan akibat terjatuh saat mengendarai sepeda montor H: baru terjadi A: dibersihkan dengan air dan tissue M: belum menggunakan obat	Obat yang terpilih betadine solution karena obat antiseptic yang dapat membersihkan luka sekaligus membunuh bakteri, jamur, virus yang menempel pada kulit saat luka.	Indikasi: pengobatan infeksi luka, irigasi, kompres luka bernanah Cara penggunaan: 1-3 kali sehari dengan cara dioleskan di bagian tubuh yang terluka. Kapan berhenti: jika luka sudah mulai mengering atau sembuh Kapan harus ke dokter: jika gejala dari gangguan tidak sembuh atau bahkan membengkak Cara menyimpan: simpan dibawah suhu 30°C

15	Alergi	Klorfeniramin maleat, prometazine, diphenhidramine, deksklorfeniramin maleat, loratadine, cetirizine.	Ibu W yang berusia 37 tahun datang ke apotek dengan keluhan gatal-gatal pada badannya terutama tangannya terdapat bitnik kemerahan setelah makan seafood, dulu pernah mengalami hal yang sama namun obatnya sudah habis. Ibu W sudah 2 hari badannya terasa gatal dan selalu menggaruknya untuk mengatasinya ibu W menggunakan sabun antiseptik dan air hangat namun tak kunjung sembuh	W: ibu W berusia 37 tahun W: badannya terasa gatal terdapat bitnik-bintik merah akibat setelah makan seafood H: 2 hari A: menggunakan air hangat saat mandi M: menggunakan sabun antiseptik	Obat yang terpilihnya cetirizine karena termasuk salah satu antihistamin yang dapat mengatasi urtikaria seperti penyebab dari alergi makanan dan efek kantuknya lebih ringan tidak akan mengganggu aktivitas.	Indikasi: Rinitis musiman atau tahunan, urtikaria idiopatik kronik. Cara penggunaan: usia > 12 th; 1 tablet per hari, anak 6-11 tahun; 1/2-1 tablet per hari, anak 2-5 <sup>th</sup> ; 1/4-1/2 tablet per hari Kapan berhenti: jika sudah tidak merasakan gatal-gatal Kapan harus ke dokter: jika masih gatal saat mengkonsumsi obat tersebut dan semakin parah ESO yang sering: Nyeri perut, mulut kering, mual, diare, muntah. Cara menyimpan: Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung.
16	Vitamin dan mineral	Vit C, Vit A, Vit B1, Vit B6, Vit B12, Vitamin D, Asam folat, Mn, Zn, Fe, dll	Tn. T berusia 45 tahun datang ke apotek dengan keluhan pegal-pegal di seluruh tubuh, terutama pada bagian punggung, leher, dan bahu yang dirasakan sejak 3 hari. Keluhan muncul setelah pasien bekerja lembur dan duduk terlalu lama di depan computer. Tn. T hanya memberikan	W: Tn. T berusia 45 tahun W: mengalami pegal-pegal diseluruh tubuh terutama pada bagian punggung, leher, dan bahu H: sejak 3 hari A: memberikan counterpain	Obat yang terpilihnya neurosanbe karena mengandung vitamin B1, B6, B12 untuk mengobati pegal-pegal	Indikasi: untuk gangguan sistem saraf perifer Cara penggunaan: sehari 1 kali 1 tablet Kapan berhenti: apabila tidak pegal-pegal, bila pegal-pegal boleh diminum Kapan harus ke dokter: apabila pegal-pegal semakin parah ESO yang sering: tidak nafsu makan Cara menyimpan: Simpan pada tempat sejuk dan

			counterpain dan memijatnya	dan memijatnya M: belum minum obat apapun		kering, terhindar dari cahaya matahari langsung.
17	Antiseptik dan disinfektan	Alkohol 70%, povidone iodine 10%, klorheksidin, setrimida 0,5%, serbuk PK.	Pasien T berusia 16 tahun datang ke apotek setelah mengalami kecelakaan sepeda motor sekitar 2 jam yang lalu, ia mengeluhkan luka lecet dan robek pada bagian lutut kanan dan telapak tangan kiri akibat terjatuh di jalan aspal. Luka tampak mengeluarkan darah dan belum melakukan Tindakan apapun karena sangat panik	W: pasien T berusia 16 tahun W: mengalami kecelakaan sepeda motor dengan luka lecet dan sobek H: sekitar 2 jam yang lalu A: belum melakukan Tindakan M: belum minum obat	Obat yang terpilih yaitu alkohol 70% karena cairan tersebut digunakan sebagai antiseptic membunuh serta menghambat pertumbuhan mikroorganisme	Indikasi: sebagai antiseptic Cara penggunaan: dituang ke kassa steril atau kapas, lalu diusapkan pada luka Kapan berhenti: apabila luka sudah tertutup atau kering Kapan harus ke dokter: apabila luka semakin parah ESO yang sering: gatal-gatal, ruam kulit Cara menyimpan: disimpan pada tempat kering dan sejuk
18	Antiinflamasi topikal	sediaan topikal yang mengandung flusinolone asetonida; hidrokortison asetat 1%; desoksimeson 2,5 mg.	Wanita yang berumur 26 tahun datang ke apotek dengan keluhan kulit kemerahan, terasa gatal, dan sedikit bersisik di kedua tangan, terutama pada bagian punggung tangan dan jari. Gejala tersebut muncul sejak 5 hari yang lalu. Wanita tersebut hanya memberikan bedak caladine pada yang gatal	W: Wanita berumur 26 tahun W: kulit kemerahan, terasa gatal, sedikit bersisik di kedua tangan H: sejak 5 hari A: menggunakan bedak caladine M: belum minum obat apapun	Obat yang terpilihnya hydrocortison karena untuk menghilangkan gatal-gatal yang disebabkan alergi	Indikasi: Dermatitis atopik, kontak, alergi; pruritus anogenital, neurodermatitis Cara penggunaan: dioleskan pada bagian yang gatal Kapan berhenti: jika gatal-gatal dan kemerahan sudah tidak muncul Kapan ke dokter: jika gatal-gatal semakin parah ESO yang sering: parah atau perih Cara menyimpan: Simpan pada suhu kamar

19	Obat topikal penghilang rasa sakit	sediaan yang mengandung mentol, campor, metil salisilat, oleum mentae; kayu puti; lotion lidokain HCl 3%, natrium diklofenak 1% gel.	Seorang bapak berusia 35 tahun datang ke apotek dengan keluhan pegal dan nyeri otot di daerah bahu dan punggung atas, yang dirasakan sejak 2 hari. Keluhan muncul setelah mengangkat barang berat di tempat kerja. Bapak tersebut memijatnya dengan minyak urut GPU	W: seorang bapak 35 tahun W: pegal dan nyeri otot H: sejak 2 hari A: mengolesi dengan minyak pijat GPU M: belum menggunakan obat apapun	Obat yang terpilihnya flamar gel karena mengandung diclofenac yang dapat meredakan nyeri pada otot	Indikasi: inflamasi karena trauma pada tendon, ligamen, otot dan persendian Cara penggunaan: digosokkan perlahan pada bagian tubuh yang sakit Kapan berhenti: apabila nyeri nya sudah sembuh Kapan kembali ke dokter: apabila nyeri nya semakin parah ESO yang sering: ruam kulit Cara menyimpan: Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung.
20	Terapi komplementer /obat tradisional	Jamu, OHT, Fitofarmaka	Ibu pasien mengeluhkan anaknya yang berusia 7 tahun yang sering sakit, terutama batuk pilek ringan hampir 4 hari. Anaknya juga tampak mudah Lelah, terutama setelah bermain di luar rumah. Anak ini belum diberikan obat dan Tindakan apapun	W: anak usia berusia 7 tahun W: sering sakit dan mudah lelah H: hampir 4 hari A: belum melakukan Tindakan apapun M: belum menggunakan obat apapun	Obat yang terpilihnya stimuno sirup karena membantu merangsang tubuh memproduksi lebih banyak antibodi dan mengaktifkan sistem kekebalan tubuh agar daya tahan tubuh bekerja optimal dan sudah teruji secara preklinik dan klinik	Indikasi:membantu kekebalan tubuh dan merangsang tubuh memproduksi lebih banyak antibody Cara penggunaan: sehari 1 kali 1 sendok takar (5ml) Kapan berhenti: - Kapan harus ke dokter: apabila terjadi reaksi alergi ESO yang sering: - Cara menyimpan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari.

TUGAS KHUSUS PKL D3 FARMASI UMG\_Triya Agustina Susanti\_221105013\_Aptek Cipta Medika GKB

Gresik, 25 Maret 2025

Dosen Pembimbing PKL,



Diah Ratnasari, S.Farm., Apt.,M.T

NIDN.0721119001

Gresik, 25 Maret 2025

Pembimbing Lapangan Apotek Cipta Medika GKB



Apt. Sofia Winata Meiliasari, S. Farm.,

SIPA. 19860501/SIPA\_35.25/2022/2060