LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Bimbingan PKL DPP

PRODI FARMASI
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Formulir PKL-003

LEMBAR BIMBINGAN PKL
DOSEN PEMBIMBING PKL (DPP)*

TAHUN AKADEMIK : 2024/2025

Nama Mahasiswa : Danu Prastiyo
NIM : 2211 05038
Nama instansi PKL : RSI Dars Syifa' Surabaya
Nama Dosen Pembimbing PKL : Anindi Lupita Nuryanka, S.Farm., Apt., M.Farm

No.	Tanggal	Bimbingan dan Saran	Paraf Pembimbing
1.	17 Februari 25	Bimbingan e logbook.	
2.	07 Maret 25	Revisi obat pakai ≠ obat generik bermerk	
3.	13 Maret 25	Tiap dokumentasi diberi keterangan kegiatan	
4.	~~21~~ Maret 25	Bimbingan laporan pembelajaran PKL di RSI	
5.	21 Maret 25	Bimbingan logbook dan tugas khusus	
6.	8 Mei 25	Bimbingan laporan dan tugas khusus	

*)MINIMAL BIMBINGAN 6 KALI

Lampiran 2. Lembar Bimbingan PL

Formulir PKL-004

PRODI FARMASI
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Lembar ke :

LEMBAR BIMBINGAN PKL*
PEMBIMBING PKL (PL)

TAHUN AKADEMIK : 2024/2025


Nama Mahasiswa : Dany Prastiyo
NIM : 221050035
Nama instansi PKL : RSI Dars Syifa' Surabaya
Nama Pembimbing Lapangan : Nur Sri Ratnawati, S.Farm., Apt

No.	Tanggal	Bimbingan dan Saran	Paraf Pembimbing
1	14 Februari 25	Materi profil dan tata tertib RSI Dars Syifa'	
2	22 Februari 25	Materi manifestasi limbah B3 di RSI Dars Syifa'	
3	1 Maret 2025	Materi formularium nasional & formularium RS	
4	8 Maret 2025	Monitoring ESO dan pengadaan barang	
5.	17 Maret 2025	Bimbingan ; tugas khusus & logbook	
6.	17 Maret 2025	Bimbingan PKRS dan capaian pembelajaran di RSI	

*)**MINIMAL BIMBINGAN 6 KALI**

AKREDITASI BAN-PT
0633/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2018

Lampiran 3. Form MESO



FORMULIR PELAPORAN ... (ESO) | Kode Sumber Data :

PENDERITA

Nama (Singkatan) :	Umur :	Suku :	Berat Badan :	Pekerjaan :
AMR	92	Jawa	75	.....

Kelamin (Beri Tanda √) :
- Pria ☑
- Wanita ☐
- Hamil ☐
- Tidak hamil ☐
- Tidak tahu ☐

Penyakit Utama : Hipokalemia + multiple Vull abrasi

Kesudahan Penyakit Utama (Beri Tanda √) :
- ☑ Sembuh
- ☐ Sembuh dengan gejala sisa
- ☐ Belum sembuh
- ☐ Meninggal
- ☐ Tidak Tahu

Penyakit / Kondisi Lain yang Menyertai (Beri Tanda √) :
- ☐ Gangguan Ginjal
- ☐ Gangguan Hati
- ☐ Alergi
- ☐ Kondisi medis lainnya
- ☐ Faktor Industri, pertanian, kimia.
- ☐ Lain-lain :

EFEK SAMPING OBAT

Bentuk / Manifestasi ESO yang Terjadi / Keluhan Lain :	Masalah pada Mutu/ Kualitas Produk Obat :	Saat/Tanggal Mula Terjadi :	Kesudahan ESO (Beri Tanda √) : Tanggal: 15/05/2024
Gatal - gatal di badan	13/05/2024	13/05/2024	☑ Sembuh ☐ Sembuh dengan gejala sisa ☐ Belum sembuh ☐ Meninggal ☐ Tidak tahu

Riwayat ESO yang Pernah Dialami : Tidak Ada

OBAT

Nama (Nama Dagang/Nama Generik/Industri Farmasi)	Bentuk Sediaan	Obat JKN (Beri Tanda √)	No. Bets	Obat yang Dicurigai (Beri Tanda √)	Pemberiaan: Cara	Dosis/ Waktu	Tgl. Mula	Tgl. Akhir	Indikasi Penggunaan
1. Ceftriaxon	Vial	√	.....	√	IV	1x1 amp	13/5	19/5	Antibiotik
2. Ketorolac	ampul	√	.....	.....	IV	1x1 amp	13/5	16/5	Analgesik
3. Ondansetron	ampul	√	.....	.....	IV	2x1 amp	13/5	15/5	Antiemetik
4. omeprazole	Vial	√	.....	.....	IV	2x1 amp	13/5	19/5	Antiemetik
5. Ranitidin	ampul	√	.....	.....	IV	3x1 amp	13/5	19/5	Analgesik
6. Diphenhidramin	ampul	√	.....	.....	IV	3x1 amp	13/5	19/5	Antihistamin
7. Dexametason	ampul	√	.....	.....	IV	1x1 amp	13/5	15/5	Antihistamin
8.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
9.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
10.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Keterangan Tambahan (misalnya : kecepatan timbulnya Efek Samping Obat, reaksi setelah obat dihentikan, pengobatan yang diberikan untuk mengatasi ESO)

Pasien dapat inj Ceftriaxon, muncul gatal di telinga badan. Inj Ceftriaxon dihentikan, pasien diberi inj Diphenhidramin, beberapa saat kemudian.

Data Laboratorium (bila ada) : Tidak Ada

Tgl. Pemeriksaan :

Surabaya, tgl. 23/05/2024

Tanda Tangan Pelapor

(Ahmad Aziz R.)

RAHASIA	MONITORING EFEK SAMPING OBAT NASIONAL

Untuk diserahkan kepada:
PUSAT FARMAKOVIGILANS/MESO NASIONAL
Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor
Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
Jl. Percetakan Negara No. 23, Kotak Pos No. 143 Jakarta 10560
E-mail : pv-center@pom.go.id
Subsite : https://e-meso.pom.go.id/ADR
Aplikasi : E-MESO Mobile (Play Store)

PENGIRIM :

Nama : Lisa Dwikoharoh
Keahlian : Apoteker
Instansi : RSI Darus Syifa' Surakarta
Alamat : Jl. Raya Benowo no.5
Nomor Telepon:

PENJELASAN :

1. Monitoring Efek Samping Obat (MESO) yang dilakukan di Indonesia bekerja sama dengan WHO-*Uppsala Monitoring Centre* (*Collaborating Center for International Drug Monitoring*) yang dimaksudkan untuk memonitor semua efek samping obat yang dijumpai pada penggunaan obat. Laporan Efek Samping Obat (ESO) dapat disampaikan secara elektronik melalui *subsite* e-meso (https://e-meso.pom.go.id/ADR) yang juga dapat diakses melalui laman Badan POM (https://pom.go.id/new/#) pada menu Layanan Online bagian Layanan Informasi atau melalui aplikasi E-MESO Mobile yang dapat diunduh di Play Store.
2. Hasil evaluasi dari semua informasi yang terkumpul akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan penilaian kembali obat yang beredar serta untuk melakukan tindakan pengamanan atau penyesuaian yang diperlukan.
3. Umpan balik akan dikirim kepada pelapor.

ALGORITMA NARANJO (Tidak wajib diisi)


No.	Pertanyaan/ Questions	Scale		
		Ya/Yes	Tidak/No	Tidak Diketahui/ Unknown
1	Apakah ada laporan efek samping obat yang serupa? *(Are there previous conclusive reports on this reaction?)*	1	0	(0)
2	Apakah efek samping obat terjadi setelah pemberian obat yang dicurigai? *(Did the ADR appear after the suspected drug was administered?*	(2)	-1	0
3	Apakah efek samping obat membaik setelah obat dihentikan atau obat antagonis khusus diberikan? *(Did the ADR improve when the drug was discontinued or a specific antagonist was administered?)*	(1)	0	0
4	Apakah Efek Samping Obat terjadi berulang setelah obat diberikan kembali? *(Did the ADR recure when the drug was readministered?)*	2	-1	(0)
5	Apakah ada alternative penyebab yang dapat menjelaskan kemungkinan terjadinya efek samping obat? *(Are there alternative causes that could on their own have caused the reaction?)*	-1	2	(0)
6	Apakah efek samping obat muncul kembali ketika plasebo diberikan? *(Did the ADR reappear when a placebo was given?)*	-1	1	(0)
7	Apakah obat yang dicurigai terdeteksi di dalam darah atau cairan tubuh lainnya dengan konsentrasi yang toksik? *(Was the drug detected in the blood (or other fluids) in concentrations known to be toxic?)*	1	(0)	0
8	Apakah efek samping obat bertambah parah ketika dosis obat ditingkatkan atau bertambah ringan ketika obat diturunkan dosisnya? *(Was the ADR more severe when the dose was increased or less severe when the dose was decreased?)*	1	0	(0)
9	Apakah pasien pernah mengalami efek samping obat yang sama atau dengan obat yang mirip sebelumnya? *(Did the patient have a similar ADR to the same or similar drugs in any previous exposure?)*	1	(0)	0
10	Apakah efek samping obat dapat dikonfirmasi dengan bukti yang obyektif? *(Was the ADR confirmed by objective evidence?)*	(1)	0	0
	Total Score	4		

NARANJO PROBABILITY SCALE:

Score	Category
9+	Highly probable
5 - 8	Probable
1 - 4	Possible ✓
0-	Doubtful

Lampiran 4. Contoh Faktur

- Contoh Faktur Obat Regular



ANTARMITRA SEMBADA
Jalan Raya Balas Klumprik No. 118 RT. 03
RW. 01 Kel. Balas Klumprik, Kec. Wiyung
Telp. (031) 7673034, 7672890, 7673018,

FAKTUR 124 2690720
Nomor : INVSB2250300281
Tanggal : 03-03-2025
No PO/SP : POCSB2250300365
Jatuh Tempo : 24-03-2025
Faktur Pajak : 040.002-25.32400871

0004827780047 IDAK:8120004827780055
OL :CDOB1154/R/4-4788/12/2023 CC :CDOB1154/R/1-1847/12/2023
PLSB2025030316

Kepada : DARUS SIFA, RS / DARUS SIFA, RS (2803)
Alamat Penagihan : JL. RAYA BENOWO, NO:05 SURABAYA
Alamat Pengiriman Barang : JL. RAYA BENOWO, NO:05 SURABAYA
NPWP/NIK : 002.054.285.8-604.000

1EH02 / IMK0002 / S62R05 Hal : 1/ 1

Nama Barang	Kemasan	No. Batch	ED	Jumlah	Harga	Disc. (%)	Harga Jual
BLOOD SET GSTC 18	DUS, 50PCS	6126724D	03-2029	2	575,000		1,150,000
NYSTATIN SUSPENSI 100000IU	1 BOX	26M556	12-2026	5	20,000	20.000	100,000
PD CREPE 4	1 ROLL	4241008	10-2029	5	100,000	10.000	500,000
PD NOXYCAN ADULT	POUCH	20240625	06-2027	50	7,600		380,000
PROPOFOL INJEKSI 20 ML	1 BOX @ 5	27A065A	01-2027	3	75,000		225,000

Total Harga Jual	Total Discount	DPP	PPN	Meterai	Total Tagihan
2,355,000	70,000	-	251,350		2,536,350

Terbilang : DUA JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH RUPIAH
Transfer : BCA No: 6120126600 Cabang: surabaya

Penerima :
Cap & TTD
Nama :
SIPA :


Penanggung Jawab Teknis DAK,
apt. Riska Rovikasari, S.Farm
503.446/21708/SIPA/ 436.7.2/2021

Penanggung Jawab PBF,
apt. Dicky Adha Aruna Jaya, S.Farm
500.16.7.2/487/B/ SIPA/436.7.15/2023

PELANGGAN YANG TERTERA DIFAKTUR INI ("Pelanggan"), MENGAKUI & MENYETUJUI :
- Pembayaran wajib dipenuhi oleh Pelanggan sesuai tanggal jatuh tempo faktur.
- Terlepas segala kesepakatan yang terjadi antara Pelanggan dengan Pihak lain, Distributor Pihak Berwenang, dan/atau Pihak Berwenang lainnya, apabila dan/atau item tidak dikembalikan, maka Pelanggan bersedia bertanggungjawab secara Pidana sesuai Kitab Undang-undang Hukum Pidana

3504178 CO_03-03-2025_14:22:22

- Contoh Faktur Obat Narkotika



kimia farma
INVOICE LOCAL

Date: 18.02.2025
Payer:
RSI. DARUS SYIFA
JL. RAYA BENOWO NO.5
KOTA SURABAYA - 00000 Telp:
Sold To: 10026470
RSI. DARUS SYIFA
JL. RAYA BENOWO NO.5
KOTA SURABAYA - 00000
NPWP: 002054285604000
PO No: 0513
Payment Terms: 20.03.2025

Kimia Farma Trading&Dist.
NPWP: 01.001.226.1-091.000
Izin PBF: 91201010024/2001/40
No.Seri Obat Lain: 2587/WM4-4006/08/2022
No.Seri CCP: 2587/S/1-1329/05/2022
No.Seri Narkotika: 2587/S/2-0068/05/2021
Branch:
Jl. Jemursari Raya No. 41
Surabaya - 60237
Phone: (031) 8431953 Fax: (031) 8437345
Pelayanan: Rutin
Salesman: ANDHI BUDI SETIAWAN
Invoice No: 2808141208
Tax No:

Material	Batch / ED	Qty	UoM	Price	Disc (%)	Amount
DO No: 2308797891 10 CODEINE 10 MG (DUS 100 TAB). Isi Kemasan: 100 TAB	H42007J 22.08.2026	20	DUS	74.724	0,00	1.494.480

BANK Bank BRI
NO. VA : 131063010025470
BANK DANAMON
NO. REK / VA : - / 003681772006
BANK -
NO. REK / VA : - / -

Total Amount	1.494.480
Disc.	0
Surcharge	0
Nett	1.494.480
Ppn	164.393
Biaya e-Materai	0
Nett + Surcharge + Ppn	1.658.873

In words:
Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah.

Customer, Spv. Penjualan APOTEKER PENANGGUNG JAWAB OBAT Branch Manager


apt. Anggun Putri Paramitha, S. Farm
500.16.7.2/521/B/SIPA/436.7.15/2023
Penanggung Jawab PBF

SYAFRUDDIN GHOZALI ,S.Farm.,Apt


2808141208
RSI. DARUS SYIFA

1/1

- Contoh Faktur Obat Psikotropika



- Contoh Faktur Obat Prekuros





Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan PKL



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
GRESIK

Lampiran 6. Etiket





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Lampiran 7. Dokumen Pemusnahan Limbah B3

NOMOR
KLHK-1672010392

MANIFES LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Diisi dengan huruf cetak dan jelas

I.BAGIAN YANG HARUS DILENGKAPI OLEH PENGIRIM LIMBAH B3

1. Nama dan alamat perusahaan Pengirim limbah B3:
RSI Darus Syifa Surabaya
JL. RAYA BENOWO NO.05

2. Lokasi Pemuatan jika berbeda dari alamat perusahaan:
JL. RAYA BENOWO NO.05

3. Nomor Registrasi Pengirim Limbah B3 : KLH-13324

4. Data Pengiriman Limbah B3

A. Jenis limbah B3 :	B. Nama Teknik, bila ada :	C. Karakteristik Limbah B3 :	D. Kode limbah B3 :
Produk farmasi kedaluwarsa	OBAT-OBATAN KADALUARSA (EXPIRED MEDICINE)	Berbahaya Terhadap Lingkungan	A337-2

E. Kelompok Kemasan:	F. Satuan ukuran:	G. Jumlah total kemasan:	H. Peti kemas
Kemasan Karton atau plastik	Berat 0.012 Ton	2	Nomor : 4016 Jenis : VAN

5. Keterangan tambahan untuk Limbah B3 tersebut di atas :
WPS 30645 (Kemasan 2 Box)

6. Instruksi penanganan khusus dan keterangan tambahan : SESUAI S.O.P

7. Nomor telepon yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat : 087751050320

8. Tujuan pengangkutan ke : Pengumpul/Pengolah/Pemanfaat/Peniumbun Limbah B3*

Catatan: Jika pengisian formulir ini oleh Pengumpul Limbah B3, sebutkan nama Pengirim asal Limbah B3 yang limbahnya akan diangkut disertai lampiran salinan Manifes Limbah B3 yang dikirim oleh Pengirim asal ke Pengumpul Limbah B3.

Pernyataan perusahaan Pengirim Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa Limbah B3 yang dikirimkan sesuai dengan perincian pada daftar isian baku tersebut di atas, dikemas, dilekati label dan simbol dalam keadaan baik untuk angkutan di jalan raya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

9. Nama : Yessy Lania | 10. Tanda tangan : TTD | 11. Jabatan : KANIT Kesling | 12. Tanggal : 2022-11-17

II.BAGIAN YANG HARUS DILENGKAPI OLEH PERUSAHAAN PENGANGKUT LIMBAH B3

13. Nama dan alamat perusahaan Pengirim limbah B3:
A. PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri
Jalan Raya Narogong, Desa Nambo PO Box 18
14. Nomor telepon : 0218674042
15. Nomor Fax : 0218674043

16. Nomor pendaftaran KLHK : KLH-57
17. Identitas kendaraan :
Nomor Truk : F 8909 GW
Nama Kapal :
Izin pengangkutan : SK.00202/AJ.309/1/DJPD/2018

18. Nama : RAHMAT | 19. Tanda tangan : TTD | 20. Jabatan : DRIVER | 21. Tanggal Angkut : 2022-11-17 | 22. Tanggal tandatangan : 2022-11-17

III.BAGIAN YANG HARUS DILENGKAPI OLEH PERUSAHAAN PENGANGKUT LIMBAH B3

23. Nama dan alamat perusahaan Pengirim limbah B3:
A. PT kerio ferida Jaya
Jl. Cikunir Raya No 9 RT 002/RW 013 Jati Asih .Bekasi 17423
24. Nomor telepon : 021-82761473
25. Nomor Fax : 021-82623987

26. Nomor pendaftaran KLHK : KLH-16474
27. Identitas kendaraan :
Nomor Truk : B 9062 FEV
Nama Kapal/Kereta : -
Izin pengangkutan : SK.00165/AJ.309/1/DJPD/2020

28. Nama : S.Suheller Tambunan | 29. Tanda tangan : TTD | 30. Jabatan : Direktur Utama | 31. Tanggal Angkut : 2022-11-18 | 32. Tanggal tandatangan : 2022-11-18

IV. BAGIAN YANG HARUS DILENGKAPI OLEH PERUSAHAAN PENERIMA LIMBAH B3

33. Nama dan alamat perusahaan Penerima limbah B3:
A. PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri
Jalan Raya Narogong, Desa Nambo PO Box 18
34. Nomor telepon : 0218674042
35. Nomor Fax : 0218674043
36. Nomor pendaftaran KLHK : KLH-57

Pernyataan perusahaan Penerima Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah menerima kiriman Limbah B3 dengan jenis dan jumlah seperti tersebut di atas dan bahwa Limbah B3 tersebut akan diproses sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

37. Nama : | 38. Tanda tangan : TTD | 39. Jabatan : | 40. Tanggal :

Pernyataan ketidaksesuaian limbah: Setelah dianalisa, Limbah B3 yang disebutkan tidak memenuhi syarat sehingga selanjutnya akan dikembalikan kepada Pengirim asal LimbahB3.

Dokumen ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui sistem Festronik KLHK sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah http://festronik.menlhk.go.id

Lampiran 8. Logbook PKL

Lampiran 9. Tugas Khusus DPP

Lampiran 10. Tugas Khusus PL

PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
DI RSI DARUS SYIFA' SURABAYA

DANU PRASTIYO
NIM. 221105035

PROGRAM STUDI DIPLOMA III FARMASI
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK
2025

Dipindai dengan CamScanner

AGENDA HARIAN (*LOG BOOK*)

Minggu ke : 1

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Senin, 10 Februari 2025 (8.00 - 14.00)	• Orientasi Rumah Sakit Darus Syifa' Surabaya (Profil RS, Peningkatan mutu, PPI, keamanan obat, Insiden keselamatan pasien).	•> Capaian »Mengetahui sejarah singkat berdirinya RS Islam Darus Syifa' Surabaya beserta Visi, Misi, dan Mottonya. Nama RS : RS Islam Darus Syifa Surabaya Alamat : Jl. Raya Benowo No. 5 Surabaya Kepemilikan : Yayasan (Yayasan Darus Syifa) Jenis RS : RS Umum Kelas RS : RS Tipe C Kode RS : 3578742 Tahun Berdiri : 1991 Akreditasi : Paripurna » Mengetahui Indikator Nasional Mutu Rumah Sakit. 1. kepatuhan kebersihan tangan. 2. kepatuhan penggunaan APD. 3. kepatuhan identifikasi pasien. 4. waktu tanggap operasi sectio caesarea emergensi. 5. waktu tunggu rawat jalan. 6. Penundaan operasi elektif. 7. kepatuhan waktu visite dokter. 8. Pelaporan hasil kritis laboratorium. 9. ketepatan penggunaan formularium nasional. 10. kepatuhan terhadap alur klinis (CP). 11. kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh. 12. kecepatan respon terhadap komplain. 13. kepuasan pasien.

Dipindai dengan CamScanner

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			» Mengetahui Pencegahan dan pengendalian infeksi di RSI Darus Syifa' Pengertian : Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) adalah suatu upaya kegiatan untuk mencegah dan mengendalikan infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan . pelaksanaan . pengawasan . pembinaan . monitoring evaluasi serta pelaporan. » Mengetahui Pengelolaan obat - obat kewaspadaan tinggi (High Alert Medication). Pengertian : obat - obatan yang memiliki resiko lebih tinggi untuk menyebabkan komplikasi & membahayakan pasien secara signifikan jika terjadi kesalahan penggunaan (dosis . interval . route . dll.) » Mengetahui komite mutu dan keselamatan pasien Dasar Hukum : UU RI No. 17 th. 2023 ttg Kesehatan . dan Permenkes No. 11 th. 2017 ttg keselamatan pasien • Patient Safety atau keselamatan pasien adalah sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman. • 6 sasaran keselamatan pasien - ketepatan identifikasi pasien - peningkatan komunikasi efektif - peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai - kepastian tepat lokasi . tepat prosedur . dan tepat pasien operasi - pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan - pengurangan resiko pasien jatuh.  * suasana orientasi  * penyerahan mahasiswa  * suasana orientasi


Dipindai dengan CamScanner

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
		• Mempelajari sistem dan penataan dan penyimpanan obat dan alat kesehatan di Depo 1 Farmasi yang melayani resep untuk poli dan rawat inap di RSI Darus Syifa'	•> Capaian » Mengetahui penataan berdasarkan kategori rak obat generik bermerk & rak obat generik yang memiliki sub rak lagi berdasarkan sub kategori obat LASA dan obat High Alert. Kemudian ada kategori rak khusus injeksi, cairan infus, alkes, dan khusus untuk kategori inject pen seperti insulin Leg & Pyrodeg. • Pada rak obat oral generik maupun generik bermerk, obat disusun berurutan sesuai dengan abjad. Namun, untuk sub kategori obat LASA disusun secara acak. Menurut penjelasan apoteker, penyusunan obat LASA dilakukan untuk menghindari kesalahan saat pengambilan obat. Kemudian, ada kategori rak sirup yang diisi sediaan sirup, drop, suspensi, emulsi, dry sirup, dan mouthwash atau gargle yang disusun berdasarkan abjad. Ada juga rak kategori salep yg dibagi sub kategori (anti jamur, anti virus, antibiotik, lotion & bedak) dan rak kategori Suppositoria dan tetes telinga. Terakhir, ada lemari khusus Narkotika dan Psikotropika yang memang disimpan khusus dan dikunci untuk menjaga keamanan obat dan hilang atau dicuri.  * rak LASA & generik bermerk  * penyimpanan khusus untuk insulin  * rak sirup LASA, generik bermerk & generik.  * rak obat luar (salep, cream, bedak, dll)

Dipindai dengan CamScanner

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
		• Menerima obat dari gudang, kemudian ditata di rak depo	• > Capaian » Mengetahui alur penerimaan obat dari gudang ke depo Farmasi • Sebenarnya dalam kegiatan ini masih belum terasa komplit alurnya menurut saya pada hari ke 1. Saya diinstruksikan untuk menghitung satu per satu obat yang datang dari gudang, kemudian masukkan jumlah stok obat yang datang ke kartu stok masing-masing. Saya juga diinstruksikan untuk menata obat secara rapi di rak-rak obat. sembari membuka kotak obat dan mengisikan obat di rak-rak obat yang kosong, terutama yang fast moving. Harapan saya dimunggu selanjutnya akan dapat saya pelajari dengan jelas alur penerimaan barang dari gudang ke depo farmasi dan membantu pencatatannya.  * Menerima stok obat dari gudang Logistik Farmasi  * Mencari lokasi obat kemudian menghitung dan mencatat di kartu stok Yang perlu ditulis dikartu stok, yaitu tanggal, nomor batch, expired date, dan jumlah stok akhir.

Dipindai dengan CamScanner

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
2	Selasa, 11 Februari 2025 (13.00-20.00)	• Membantu dispensing dosis Nitrokaf Retard 5mg menjadi dosis 2.5 mg dalam sediaan kapsul.	•> Capaian >> Mampu melakukan produksi pengenceran dosis nitrokaf kapsul • Nitrokaf Retard kapsul merupakan obat untuk mengurangi dan mencegah angina (nyeri dada) akibat jantung koroner. Dosis yang tersedia di RSI Darus Syifa' untuk nitrokaf retard kapsul adalah 5 mg. Dosis tersebut dibagi menjadi 2.5 mg per kapsulnya. Berdasarkan komunikasi yang saya lakukan dengan apoteker dan TVK. pembagian dosis Nitrokaf Retard ini merupakan permintaan dari dokter Poli Spesialis Jantung. Maka dari itu. saya membantu TVK lainnya dalam mencatat kebutuhan yang sudah ditetapkan dan membantu produksi obat ini sesuai SOP dan juga dibawah pengawasan apoteker. Saya juga mendokumentasikan dan menata obat di gudang / rak depo farmasi setelah proses tersebut. Dalam produksi pembagian dosis secara mandiri ini juga ditekankan untuk melakukan cuci tangan yang benar sebelum dan setelah produk sebagai teknis aseptis sesuai SOP.  *menyiapkan Nitrokaf 5 mg  * melakukan dispensing  *dimasukkan ke klip sesuai jumlah

Dipindai dengan CamScanner

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
		• Menerima resep dan obat dari TVK. kemudian memberi etiket obat sesuai resep	=> Capaian >> Mampu melayani penebusan resep dengan baik dan benar • Pada saat penebusan resep, TVK akan mengambil resep yang sudah diterima & di crosscek oleh apoteker dan perawat. TVK kemudian mengambilkan obat yang sesuai dengan resep. termasuk dosis dan jumlah Nomernya. Setelah semua obat siap, saya diberi kesempatan untuk memberi etiket tiap-tiap obat. Mayoritas obat oral diberi etiket putih yang otomatis dicetak oleh printer. Sedangkan obat luar, diberi etiket biru yang ditulis secara manual namun tetap mengikuti Signa sesuai resep yang diberikan.

INSTALASI FARMASI
RUMAH SAKIT ISLAM
DARUS SYIFA` SURABAYA

No. THTA00071 Tgl. 14-02-2025
NAMA : AQILA NUR KHOIRUNNISA
No RM : 421361
Tgl Lahir : 13-09-2019
NYERI / DEMAM
3 x Sehari 1
ED : ..... BUD : .....
Semoga Allah SWT Menyembuhkan Anda


* Ini adalah contoh etiket putih yang dicetak otomatis oleh printer

INSTALASI FARMASI
RSI DARUS SYIFA'
Jl. Raya Benowo No. 08 Surabaya
Telp. (031) 7404603

No. RM :
Nama :
Obat :
Tgl :
ED :
Petunjuk Khusus :
Sesudah / Sebelum / Waktu Makan
Petunjuk Khusus :

* Ini adalah contoh etiket manual putih dan biru RSI Darus Syifa'

Dipindai dengan CamScanner

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
3	Rabu, 12 Februari 2025 (13.00-20.00)	• Menerima sisa obat baru yang tidak digunakan dari Unit Dose Dispensing (UDD) dan One Daily Dose (ODD), serta multi dose dispensing.	•> Capaian >> mampu mendeskripsikan alur penerimaan barang retur ke depo farmasi • Menurut penuturan TVK, hampir setiap hari ada sisa obat baru yang tidak digunakan. Saat obat dan alkes tersebut dikembalikan ke depo farmasi, saya diinstruksikan untuk membantu memisahkan berbagai obat dan alkes yang tercampur dalam 1 kantong. kemudian mengembalikan tiap-tiap obat dan alkes ke rak nya masing-masing. kebanyakan dari item yang dikembalikan adalah sediaan injeksi dan cairan infus  * mengembalikan botol  * mengembalikan kantong infus  * mengembalikan cairan
		• Membuat copy resep untuk pasien umum	•> Capaian >> Mampu membuat copy resep dengan baik dan benar •) Pada saat TVK menerima resep, terkadang ada yang menebus obat separuh atau sebagiannya saja. Maka dari itu copy resep akan dibuatkan dan diserahkan ke pasien untuk ditebus lagi obat yang masih belum ditebus. Tentu ini tidak berlaku untuk sediaan sirup, dry sirup, maupun drop bila ingin menebusnya sebagian. Copy resep hanya diberikan untuk pasien umum, karena pemerintah tidak mengcover sebagian biaya obat yang belum ditebus oleh pasien BPJS.

Dipindai dengan CamScanner

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			Copy resep dibuat dengan menyalin nomor resep, tanggal resep, nama dokter, nama pasien, nama obat (dosis, sediaan, signa) yg belum ditebus, memberi keterangan (did, dst, nedet, dsb), dan pcc. * Berikut disamping merupakan contoh copy resep dari RSI Darus Syifa'.

INSTALASI FARMASI RSI
DARUS SYIFA'
Jl. Raya Benowo No. 05 ☎ (031) 7406293, 7404603
Surabaya 60195


SALINAN RESEP

Salinan dari resep nomor : tanggal


P.C.C

Semoga lekas sembuh
APOTEKER : NUR SUCI RATNAWATI, S.Farm.Apt
SIK No. 19820629/SIPA-35 78/2013/2780


Dipindai dengan CamScanner

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
4	Kamis, 13 Februari 2025 (13.00-20.00)	• Diperaktikan cerak kategori sediaan tetes mata.	•> Capaian >> mengetahui lokasi rak sediaan tetes mata • Pada hari ini saya diplotkan di depo 2 farmasi di lantai 2 gedung belakang RSI Darus Syifa'. Disini ada rak khusus untuk kategori tetes mata dan dibagi lagi sub kategori sesuai fungsi dari sediaan tetes mata masing-masing. Selain tetes mata, juga ada sediaan salep mata di rak ini.  * rak salep mata dan tetes mata
		• Melayani resep racikan kapsul	•> Capaian >> mampu melayani resep racikan kapsul • Pada depo 2 farmasi, terdapat banyak sebab pola yang dilayani termasuk pola mata. Namun, depo 2 farmasi tidak melayani rawat inap (UDD & ODD). Terdapat resep dalam sediaan berbentuk racikan kapsul yang saya bantu layani bersama TVK lain. Pertama, disiapkan obat-obat yang perlu untuk diracik. Lalu, pastikan tangan kita bersih dan telah memakai tangan. Kemudian campur obat menggunakan mortir & stamper atau bisa menggunakan blender yang disediakan. Setelah diracik dan tau gramasi racikan, kemudian ditentukan ukuran kapsul yg sesuai. Kemudian bagi rata. Kemudian tutup kapsul dengan rapat, bersihkan dengan tisu, masukkan klip


Dipindai dengan CamScanner

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			plastik, lalu beri etiket. Di depo 2 farmasi ini saya juga mempelajari cara membuat etiket baru untuk sediaan tetes mata dan sediaan salep mata. Selain itu, di depo 2 farmasi terdapat lebih sedikit rak dariada di depo 1 farmasi. Di depo 2 farmasi tidak terdapat rak untuk alat kesehatan dan cairan infus.  * membagi serbuk ke dalam kapsul Pada saat pembagian serbuk ke dalam kapsul, pastikan membagi serbuk dengan rata dan jangan sampai ada kapsul yg kempong atau tidak padat.  * Contoh resep racikan kapsul Berikut adalah contoh resep racikan kapsul. Diresepkan clarithromycin 500 mg tab sebanyak 14 tab dan domperidone tab sebanyak 14 tab. Kemudian dibagi menjadi 28 kapsul.

Dipindai dengan CamScanner

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
5	Jumat, 14 Februari 2025 (13.00-20.00)	• Menerima resep racikan puyer	• Capaian >> Mampu melayani resep racikan puyer • Dapat membuat racikan puyer yang sesuai SOP Rumah Sakit. Resep racikan puyer yang diterima dan diproses oleh TFK biasanya telah dihitung terlebih dahulu oleh Apoteker. Berikut contohnya: Racikan puyer tertera nomor x6x (30) namun hanya dibuat 3(10) saja. Contoh Perhitungannya: PCT : $\frac{400\ mg}{500\ mg}$ x 10 puyer : 8 tab  S 2 dd 1 Tab pc Po R/ PARACETAMOL 500 mg TAB 400 mg 8 VALISANBE 5 mg TAB 2 mg 4 AMITRIPTILIN 25 mg TAB 6.25 mg 2.5 KETOPROFEN 100 mg 75 mg 7.5 dd do in dtd NO XXX S 2 dd 1 10 Nama [redacted] Umur 62 thn 7 bln 15 hr Berat Badan 60 Kg Alamat [redacted] No. RM [redacted] Penjamin BPJS * contoh resep racikan puyer Setelah semua obat siap, kemudian digerus ad homogen atau tercampur sempurna dan halus. lalu bagi ke dalam tatakan kertas puyer secara merata.  * membagi serbuk ke dalam tatakan kertas puyer

Dipindai dengan CamScanner

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
		• Memberikan pelayanan resep dengan dibantu oleh TVK.	•>Capaian >> Mampu memberi pelayanan resep dengan baik bersama TVK lain. • Pada jam-jam tertentu. penebusan resep akan sangat banyak & menumpuk. Tentu mengikuti arahan dari TVK lain & sikap cekatan itu perlu saya tunjukkan. Semakin lama saya semakin terbiasa dengan pelayanan resep yg meliputi: • Penyiapan obat dengan cepat & tepat • melakukan peracikan dengan teliti • memberi etiker yg sesuai dengan obat dan resep • memeriksa kesesuaian atau double crosscek dengan TVK lain. • melakukan pengemasan obat sesuai SOP. Tidak lupa juga menjaga kebersihan apabila resep telah dilayani semua. Sembari menunggu resep dari pasien selanjutnya tiba.  * mencari lokasi obat  * memberi etiket  * membersihkan tempat kerja

Gresik, 17 Februari 2025
Dosen Pembimbing

Apt. Arindi Lupita Nasyanka, S.Farm, M.Farm
NIDN. 1181 1907 247

Surabaya,
Dosen Pembimbing Lapangan


RSI DARUS SYIFA SURABAYA
Jl. Raya Benowo 05 Surabaya
apt. Nur Sucl Rahmawati, S.Farm.
SIPA : 503.448/2783/11/SIPA/436.7.2/2021

Apt.
NIK/SIPA

Dipindai dengan CamScanner

AGENDA HARIAN (*LOG BOOK*)

Minggu ke : 2

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1	Senin, 17 Februari 2025 (8.00 - 15.00)	• Menyiapkan resep dan melakukan KIE pada pasien	• > Capaian >> Mampu menyiapkan obat dan memberi etiket obat dan melakukan KIE pada pasien di RSI Darus Syifa'. • Pada saat saya menerima resep yang sudah disiapkan oleh apoteker untuk disiapkan obat, etiket sudah otomatis di cetak oleh printer, kecuali etiket biru. Saya akan memberikan contoh resep dan poli Spesialis penyakit dalam.  *contoh resep Dari keterangan resep bahwa obat yang ditebus hanya: • Candesartan 8 mg untuk obat darah tinggi, diminum sehari sekurang satu tablet sesudah makan • Acarbose 100 mg untuk obat diabetes, diminum sehari dua kali 1 tablet sesudah makan • Adalat Oros 30 mg untuk kombinasi obat darah tinggi, diminum sehari sekurang 1 tablet sesudah makan

Dipindai dengan CamScanner

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			Obat disiapkan dan diserahkan kepada pasien sesuai nomero yang tertera dan di KIE kan kepada pasien sesuai signa dengan diawasi oleh apoteker.  * momen KIE pasien Pada resep contoh juga terdapat keterangan iter 2x yg bearti resep dapat ditebus sebanyak 3 x yang bearti dibuatkan copy resep dan diserahkan bersama dengan obatnya.

Dipindai dengan CamScanner

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
2	Selasa. 18 Februari 2025 (8.00-15.00)	• Menyiapkan obat yg fast moving dan mengin stok obat yang menipis di rak obat.	◦) Capaian » Mengetahui obat-obatan yang fast moving dan terbiasa dengan letak rak obat. • Pada saat awal shift, saya diinstruksikan untuk membantu menyiapkan obat-obatan untuk pole-pole yang buka pada hari tersebut, terutama yang fast moving. Contohnya Pole Penyakit dalam, obat-obatan yang banyak disiapkan adalah obat Hipertensi, diabetes, kolesterol, dan syaraf. Saya juga diinstruksikan mengecek rak obat generik, dan generik Lasa, karena kategori ini kebanyakan adalah obat-obatan fast moving. Hal-hal yang telah saya jelaskan di atas ialah untuk mempersiapkan penebusan resep dari pasien yang datang bersamaan dari berbagai poli. Pelayanan resep akan lebih mudah dan cepat apabila obat-obat fast moving ini telah disiapkan dalam jumlah yang cukup banyak.

Dipindai dengan CamScanner

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			Dampak dari kegiatan ini adalah efisiensi TVK dalam pelayanan resep dan membuat saya terbiasa dengan lokasi dan stok obat - obat yang fast moving. komunikasi yang efektif dengan TVK lain juga harus ditekankan agar kita saling terbantu dalam bekerja sama. kita juga perlu bertanya poli apa saja yang buka pada hari tersebut agar penyiapan obat bisa lebih tepat.



* Penyiapan obat - obatan fast moving

Dipindai dengan CamScanner

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
3	Rabu. 19 Februari 2025 (8.00-15.00)	• Ikut berkeliling ke berbagai ruangan bersama apoteker Aziz. untuk belajar Emergency kit.	•> Capaian » Mengetahui secara langsung lokasi emergency kit dan jenis-jenis item apa saja yang ada pada kotak emergency. troli emergency. dan koper bag emergency. • Emergency kit ialah tempat penyimpanan obat-obatan yang bersifat live saving dan diperlukan saat keadaan darurat. Pada hari ini saya diajak berkeliling ke berbagai ruangan untuk melihat & belajar apa itu emergency kit. Ruangannya adalah IGD. Dewasa. Anak. Bedah. Nifas. ICU. NICU. PONEK. Untuk ruangan VK tidak sempat kami kunjungi karena sedang digunakan untuk proses persalinan dan item emergency kit yang tersedia pun sama.  * Lembar checklist supervisi Pertama yg perlu diperhatikan adalah lembar checklist supervisi untuk melihat ketersediaan : 1. ketersediaan daftar nama dan jumlah obat emergency. 2. tata letak obat emergency. 3. ketersediaan stok fisik dengan jumlah daftar obat. 4. Pengawasan expired date. 5. kotak emergency selalu dikunci dan tersegel. 6. dilakukan pencatatan & pelaporan

Dipindai dengan CamScanner

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)

Pertama, isi atau item dari kotak emegency adalah berupa injeksi seperti Ephinephrine, Lidocain, Phenytoin, tentu saya ada banyak injeksi dan disesuaikan dengan kebutuhan ruangan tersebut.



* kotak emergency dalam bag



* emergency kit



* emergency kit

Kedua, isi atau item tools emergency terbagi menjadi airway, breathing, dan circulation. Pada kabinet airway contohnya berisi item Nasofaring, kateter, Mucus extractor, dll. Pada kabinet breathing berisi item Masal, Oksigen naster, Oksigen reservoar, Masker nebul, masker anestesi, dll. Sementara untuk kabinet Circulation berisi Carran infus, spuit, needle, Infus set, dll.



* kabinet airway



* kabinet breathing




* kabinet circulation


Dipindai dengan CamScanner

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)

Form supervisi juga tersedia untuk kotak emergency, kabinet airway, breathing, dan circulation.



* Form supervisi emergency kit



* Form troly emergency



* Form troly emergency

Form di atas berisi nama alat atau nama obat, jumlah, expired date, dan ditanda tangani oleh petugas farmasi dan petugas ruangan.

Selain itu ada juga form pengambilan obat atau alkes dan penggantian obat atau alkes emergency kit.



* Form pengambilan obat / alkes emergency kit


Form pengambilan berisi tgl & waktu buka laurei, nama parer, jumlah, paraf petugas farmasi & perawat. Sementara yang membedakan di form pengembalian adalah tgl & waktu pengembalian alkes atau obat beserta tutup laurei.

Dipindai dengan CamScanner

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			Yang ini adalah koper bag emergency yaitu berisi campuran obat & alkes dari kotak P3K emergency, yang mana koper bag ini dapat dengan mudah dibawa bersama saya jika diberikan pada beberapa darurat di luar ruangan. Ada juga alat bantu pernapasan di koper bag emergency.  * bag emergency  * isi bag emergency  * isi bag emergency  * isi bag emergency

Dipindai dengan CamScanner

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
4.	Kamis, 20 Februari 2025 (8.00 - 15.00	• Menyiaptan UDD (unit dose dispensing) dan ODD (One Dayli Dose)	›> Capaian »» Mampu menyiaptan UDD dan ODD sesuai prosedur di Rumah Sakit Islam Darus Syifa' • Di RSI Darus Syifa diberikan ODD dan beberapa kali UDD. Jam paling awal UDD yaitu pada pukul 10.00 pagi. Mata pada awal Sif I saya diinstruksikan untuk membantu menyiaptan UDD dan ODD. Pertama, saya diberi formulir kebutuhan pasien yg berisi obat dan alkes. kemudian saya siaptan kebutuhan pasien sesuai isi formulir seperti contoh di bawah ini:




* contoh form UDD

Handscoon non steril		1 pasang
Ranitidin	Inj	2 ampul
Gentamicin	Inj	1 ampul
Infus NaCl	100 ml	2 botol
Dexsema		3 ampul
Spuit	1cc	6 pcs
Ampicillin	Inj	2 pcs


Setelah semua kebutuhan pasien disiapkan, lalu dimasukkan obat ke box seperti biasa dengan aturan sesuai dengan Formulir kebutuhan obat pasien. Setelah itu, berikan gelang identitas pasien pada bungkus UDD atau ODD yang telah siap. Double crosscek akan dilakukan oleh TVE dan apoteker agar tidak terjadi kesalahan penyiapan.

Dipindai dengan CamScanner


No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
5.	Jum'at, 21 Februari 2025 (8.00 - 15.00	• Mempelajari Struktur organisasi unit kerja di RSI Darus Syifa'	•> Capaian >> Mampu memahami urutan Struktur organisasi unit kerja di Rumah Sakit Islam Darus Syifa' • Struktur di bawah ini merupakan struktur unit kerja yang lebih spesifik - yaitu Struktur Organisasi Instalasi Farmasi. Instalasi farmasi dipimpin oleh direktur & wakil direktur dengan di bawahnya ada kepala instalasi farmasi & koordinator instalasi farmasi. kemudian diikuti para penanggung jawab lainnya di lingkup farmasi yang tidak perlu saya jabarkan lebih luas karena telah diorientasikan pada hari pertama saat orientasi rumah sakit.



Dipindai dengan CamScanner

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			Dalam struktur organisasi RSI Darus Syifa' yg lebih luas. RSI DARUS SYIFA dipimpin oleh seorang direktur yg membawahi 2 (dua) wakil direktur. terdiri atas wakil direktur medis serta wakil direktur umum dan keuangan. Dalam menjalankan tugasnya direktur dibantu oleh beberapa perangkat antara lain Komite Medis. Komite keperawatan. Satuan Pemeriksa Internal (SPI) komite lain dan tim-tim.  Struktur organisasi RSI Darus Syifa digambarkan sebagai berikut YAYASAN DARUS SYIFA DIREKTUR WAKIL DIREKTUR MEDIS BIDANG KEPERAWATAN BIDANG UMUM Gambar 4.1 Struktur Organisasi Rumah Sakit Islam Darus Syifa Surabaya

Dipindai dengan CamScanner

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
6.	Sabtu, 22 Februari 2025 (8.00 - 15.00)	• Mempelajari Formulir MESO (Monitoring Efek Samping obat).	• > Capaian >> Memahami Formulir Monitoring Efek Samping Obat >> MESO atau Monitoring Efek Samping Obat adalah pengelolaan kejadian efek samping obat yg dirasakan oleh pasien. Pasien yg mengalami efek samping obat akan diminta identitas dan dimasukkan untuk pengisian formulir meso. Tiap pertanyaan akan memiliki nilai yang disebut Naranjo Probability Scale. Pasien juga diminta untuk menyebutkan seluruh obat yang dikonsumsi dan bagaimana cara pasien tersebut mengonsumsi dan periode mengonsumsi obat tersebut.  * Form MESO halaman 1  * Form Meso halaman 2

Dipindai dengan CamScanner

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			Pasien yg telah selesai melakukan pelaporan MESO akan diminta untuk menghentikan terapi obat. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah efek samping yg terjadi akan hilang atau tidak. Setelah dokumen MESO telah siap, maka harus dilaporkan ke BPOM.

Gresik, 7 Maret 2025
Dosen Pembimbing

Apt. Anindi Lupita Maryanka, S.Farm., M.Farm
NIDN. 1181 1907 247

Surabaya,
Dosen Pembimbing Lapangan

RSI DARUS SYIFA SURABAYA
Jl. Raya Darmo 68 Surabaya
Telp. (031) 7345678


apt. Nur Suci Ratnawati, S.Farm.
SIPA : 503.448 / 2780 / 1 / SIPA / 436.7.2 / 2021

Apt.
NIK/SIPA

Dipindai dengan CamScanner

AGENDA HARIAN (*LOG BOOK*)

Minggu ke : 3

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1	Senin, 24 Februari 2025 (8.00 - 15.00)	• Menyiapkan barang yang telah di defect	•> Capaian >> Mampu menyiapkan obat dan alkes yang telah di defect • Dalam menyiapkan obat dan alkes, saya diberikan daftar defect dari salah satu instalasi farmasi di RS Darus Syifa' seperti IFRS / Depo Farmasi, Depo Farmasi 2, atau Depo Farmasi 150.  *contoh nota defect 150 / bon permintaan barang dari 150 ke gudang logistik Pada lembar defect yang akan saya siapkan kali ini, merupakan permintaan dari depo 150. Barang akan saya siapkan sesuai jumlah yang diminta. Apabila jumlah sudah sesuai, maka saya diinstruksikan untuk memberi centang, apabila jumlah yang saya siapkan ada perbedaan atau tidak sesuai maka jumlah awal akan dicoret dan saya tulis jumlah yang tersedia atau yang saya siapkan.

Dipindai dengan CamScanner

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
		• Mengantarkan barang defect yang telah disiapkan	Setelah itu bila coret kartu stok dengan menulis tanggal, tujuan barang, stok yang keluar, dan jumlah akhir. Jumlah akhir juga ditulis di lembar defect untuk nantinya direkap. Apabila barang yang diminta sedang kosong, maka saya diinstruksikan untuk mencopotnya di lembar defect. » Mampu mengantarkan barang yang disiapkan sesuai tujuan. • Berbeda dengan UOD, pengantaran barang defect lebih simpel karena tidak terlalu banyak tujuan, dan keseluruhan barang dikemas dengan dijadikan satu kantong plastik besar atau satu kardus dan diberi label pengenal (tulis tangan) atau label lokasi dari barang tersebut.  * momen pengantaran Saat sampai di instalasi yang dituju, bila juga diinstruksikan untuk menyampaikan ketidaksesuaian barang, atau ada yang kosong maupun diberikan barang pengganti.

Dipindai dengan CamScanner

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
2.	Selasa, 25 Februari 2025 (8.00 - 15.00	• Tata kelola barang logistik	•> Capaian >> Mampu melakukan tata kelola dan manajemen ruangan. • Di gudang logistik farmasi RSI Darus Syifa' memiliki barang obat dan alat kesehatan dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini saya rasa tidak sebanding dengan ruangan logistik. Maka dari itu saya ditugaskan untuk membantu tata kelola barang dan memenejemen ruangan logistik agar tetap berdusir.



* susunan obat & alkes di logistik



* perampungan obat jika tidak muat di rak PBF obat

ketika barang datang dari PBF dalam jumlah sangat banyak, rak obat atau alkes tidak akan cukup untuk menampungnya. Maka bita harus cukup jelih untuk melihat ruang dan menyusun barang ber dus-dus secara rapi dan tinggi. namun harus kokoh dan mempertimbangkan keamanan.

Sama seperti IFRS, ketika ada rak obat maupun alkes yang kosong atau menipis. maka bita wajib mengisinya agar ketika penyiapan barang defet bisa lebih efisien waktu & tenaga.

ketika barang dari dus sudah tidak muat di rak. maka akan ditata di tolor-tolor perampungan obat yang telah disediakan di atas palet kayu.

Dipindai dengan CamScanner

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
3	Rabu. 26 Februari 2025 (8.00 - 15.00)	• Menerima barang dari PBF di RSI Darus Syifa'	•> Capaian >> Mampu menerima barang dari PBF dan memahami alur penerimaan • Pada hari ini saya diajak untuk menerima pesanan obat dari PBF. Pertama, kita akan mendapatkan fakstur dari obat atau alkes yg kita pesan. Kurir dari PBF akan diinstruksi untuk membuka semua kardus untuk memastikan jumlah obat sama dengan faktur yg kita pesan. Expired Date (ED) dan Batch Number juga kita cek apakah sama. * unboxing barang untuk Pengecekan  Pengecekan ini guna untuk mengantisipasi kesalahan pengiriman dari PBF. Seperti jumlah obat atau alkes kurang, ED yg cukup dekat, dan nomer batch yg tidak sama. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka akan dilakukan retur. Yaitu kita akan lapor ke bagian Pengadaan barang atau kepada koordinator yang kemudian akan melakukan konfirmasi retur barang kepada PBF. Barang yg perlu diretur tidak kita masukkan ke sistem sim RS dan cukup kita sisihkan diberi keterangan retur agar selanjutnya dijemput oleh kurir PBF.





Dipindai dengan CamScanner

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
4.	Kamis, 27 Februari 2025 (8.00 - 15.00	• Menulis dan merekap kertas defect	• Capaian » Mampu menulis dan merekap kertas defect untuk selanjutnya dijadikan dasar pengadaan. • Pada hari pertama minggu ketiga, saya membantu menyiapkan barang gudang yg di defect oleh IFRS. Jumlah stok akhir yg kita tulis di lembar permintaan atau defect itulah yg akan direkap atau dijadikan indikator bahwa suatu obat atau alkes akan diorder atau dimasukkan list pengadaan. Di RSI Darus Syifa' melakukan pengadaan barang menggunakan metode konsumsi, yaitu perencanaan pengadaan obat dengan menggunakan data konsumsi obat periode sebelumnya.  ↖ merekap cara stok di bon permintaan Setelah barang kita ambil sesuai yg diminta, kita wajib mengurangi pada kartu stok dan ditulis pada kertas defect atau lembar permintaan. Kemudian sisa stok yg teridentasi menipis (terutama fast moving) akan direkap di buku defect gudang atau TYK yg kemudian disetor pada kepala koordinator atau pengadaan. Untuk melakukan order kita perlu membuat surat pesanan (SP). Apabila order dilakukan via whatsapp maka SP perlu ditoto dan dikirim ke PBF tujuan.

Dipindai dengan CamScanner

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
5.	Jum'at, 28 Februari 2025 (13.00-20.00)	• Membuat surat pesanan (SP) untuk pengadaan dan mempelajari macam SP.	•) Capaian)) Mampu membuat SP dan memahami macam-macam SP. • SP atau surat pesanan obat adalah surat permintaan obat yg dibuat oleh Instalasi farmasi Rumah sakit kepada pemasok atau pedagang Besar farmasi (PBF). Surat ini penting ketika dilakukan pengadaan obat dan alkes. Ada 5 macam surat pesanan, yaitu reguler, prekursor, Obat-obat tertentu (OOT), Psikotropika, & Narkotika. Surat pesanan reguler bisa diisi oleh beberapa jenis obat asalkan masih ditujukan ke PBF yg sama. Kategori obat pada SP reguler yaitu obat bebas, bebas terbatas, dan obat keras yg tidak mengandung zat prekursor. SP reguler dibuat dua rangkap (asli, bukan hasil fotokopi). Satu rangkap diserahkan ke PBF dan satu rangkap untuk disimpan pihak farmasi Rumah Sakit sebagai arsip. Sementara untuk SP Prekursor, OOT, Psikotropika, dan narkotika harus dipisah dari SP obat reguler. Berbeda dari SP reguler, SP golongan obat ini dibuat rangkap tiga, yaitu dua rangkap diserahkan ke PBF sesuai regulasi dan satu rangkap lainnya untuk arsip.

Dipindai dengan CamScanner

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			 * SP COT  * SP PSIKOTROPIKA  * SP NARKOTIKA  * SP Reguler  Dalam mengisi SP akan saya jelaskan dengan contoh SP reguler di samping. SP memuat identitas Rumah Sakit (pihak pemesan) dan PBF yg dituju (disini PBF nya PT. Intigunbar Hasil Sempurna). kemudian diikuti nomer SP, tanggal, dan keterangan pembayaran kredit atau cash. Lalu kolom yg perlu diisi yaitu nomor item, jumlah yg dipesan, nama item, dan keterangan diisi bila perlu. Lalu diberi stempel IFRS dan stempel apoteker (disini apt. Nur Suci R., S.Farm) beserta paraf nya.

Dipindai dengan CamScanner

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
6.	Sabtu, 1 Maret 2025 (8.00 - 15.00)	• Merekap faktur dari PBF	•> Capaian »» Mampu melakukan rekap faktur dengan benar. • Faktur merupakan dokumen yg dikeluarkan oleh PBF kepada Rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan lainnya sebagai bukti transaksi pembelian obat dan alkes. Fungsi perekapan faktur biasanya untuk keperluan audit / pemeriksaan - perpajakan dan pelaporan keuangan - maupun untuk verifikasi pembayaran Langkah perekapan cukup simpel - yaitu dengan menjadikan satu antara rangkap SP - faktur - dan ceklist penerimaan barang datang kemudian di stapler dan dimasukkan ke dalam map besar / kantex masing-masing PBF. * saat kegiatan merekap faktur  * tumpukan faktur rekapan 
		• Diperkenalkan ke gudang cairan dan gudang penyimpanan B3	»» Mampu memahami dan mengetahui lokasi gudang penyimpanan cairan dan penyimpanan B3 • Gudang cairan diperuntukkan untuk menyimpan berbagai cairan seperti Nacl - Ringer Laktat - dextrose - dan lain-lain

Dipindai dengan CamScanner

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			Sementara untuk gudang penyimpanan B3 berisi cairan dengan kategori Bahan Berbahaya & Beracun. Ada kunci khusus untuk tiap gudang cairan. dimana gudang B3 lebih banyak tertera simbol peringatan seperti beracun dan mudah terbakar. Contoh barang di gudang B3 yaitu povidone iodine, Hydrogen Peroxide, Poli aid, dan lain-lain.  * gudang cairan  * ruang B3  * rak cairan B3

Gresik, 13 Maret 2025
Dosen Pembimbing

Apt. Anindi Cyptia Maryanka, S.Farm, M.Farm
NIDN. 1181 1507 247

Surabaya,
Dosen Pembimbing Lapangan

INSTALASI FARMASI
apt. Nur Suci Rahmawati, S.Farm.
SIPA : 503.440/2788/1/SIPA/436.7.2/2021


Apt.
NIK/SIPA

Dipindai dengan CamScanner

AGENDA HARIAN (*LOG BOOK*)

Minggu ke : 4

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Senin, 3 Maret 2025 (13.00 - 20.00)	• Orientasi rak obat dan alat kesehatan di depo Farmasi IGD	•> Capaian » Mampu memahami dan mengidentifikasi perbedaan item dengan depo farmasi lain berdasarkan kebutuhan dan kondisi • Seperti pada depo farmasi sebelumnya, di depo farmasi IGD juga ada kategori rak LASA, High Alert, Paten, Generik, dan alkes. Namun yg membedakan di depo IGD memiliki rak cairan yg sangat lengkap dan banyak seperti di depo farmasi 1, dan memiliki rak untuk item salep mata dan tetes mata seperti di depo 2. Depo farmasi IGD juga melayani 24 jam nonstop dan sering menerima kebutuhan atau permintaan darurat untuk alkes dan injeksi seperti resep cito manual maupun e-resep.  * rak obat oral  * rak alkes  * rak cairan  * rak sirup, salep, tetes mata & telinga & injeksi

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
2.	Selasa, 4 Maret 2025 (8.00 - 17.00)	• Menulis buku monitoring konsumsi obat oral atau injeksi kategori Narkotika dan Psikotropika	a) Capaian >> Mampu mengisi dan memahami tujuan dibuat monitoring buku konsumsi Narkotika dan Psikotropika. • Tujuan dari dibuatnya buku ini adalah untuk monitoring stok agar tidak terjadi selisih jumlah stok obat yang ada di sistem. Baik stok dan jumlah fisiknya. Tentu dengan adanya buku monitoring ini memudahkan Apoteker dan TTK dalam pelaporan narkotika dan Psikotropika ke Sistem Pelaporan Narkotika & Psikotropika (SIPNAP).  * Buku Percobaan Psikotropika dan narkotika Yang perlu diisi dari buku monitoring tersebut adalah nomer resep, nama dokter yg menulis resep, nama pasien, jumlah obat yg diminta, dan alamat pasien.

Dipindai dengan CamScanner

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
3.	Rabu, 5 Maret 2025 (21.00 - 7.00)	• Permintaan injeksi dan alat kesehatan melalui resep cito atau e-resep	•> Capaian >> Mampu memahami dan melayani resep cito atau resep yg dibuat dokter untuk segera dilayani • Resep cito merupakan salah satu resep yg harus segera dilayani saat itu juga di rumah sakit. Yang sering menyampaikan resep ini adalah perawat. Sejauh yg saya alami selama kegiatan PKL, baru mengetahui resep ini di IGD karena di depo 1 dan depo 2 hanya melayani poli dan rawat inap. Sementara di depo farmasi IGD sesuai namanya melayani kebutuhan resep darurat.  * contoh resep cito Berikut merupakan contoh resep cito. Yang diminta adalah cairan ringer laktat 1 dan injeksi ketorolac 1. Menurut pemapan TVT di IGD. Contoh resep ini termasuk kurang lengkap karena tidak ada nama petugas dan keterangan cito karena disampaikan secara lisan oleh perawat. Sementara untuk permintaan cito yg tidak sempat dibuatkan resep manual cito bisa menyusul pembuatan e-resep melalui SIM RS seperti resep pada umumnya di RSI Ibnu Sina.

Dipindai dengan CamScanner

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
4.	Sabtu, 8 Maret 2025 (21.00 - 7.00)	-> Penyiapan Unit Dose Dispensing untuk unit Ruang Kamar Operasi (OK) dan Ruang Kamar Bersalin (VK).	-> Capaian >> Mampu menyiapkan UDD untuk Ruang Kamar Operasi (OK) dan Ruang Kamar Bersalin (VK) dengan benar. • Berbeda dengan Depo 1 Farmasi yg menyiapkan UDD untuk ruang dewasa, anak, VVIP, Nifas, di IGD ada juga penyiapan UDD untuk ruang kamar Operasi dan ruang kamar bersalin. Penyiapan unit ini juga dilakukan saat malam, namun tidak diantar oleh TFK melainkan diambil langsung oleh perawat atau keluarga pasien yg bersangkutan.

Gresik, 21 Maret 2025
Dosen Pembimbing

Apt. Anindi Lupita Maryanka, SFarm, M.Farm
NIDN. 1181 1907 242

Surabaya,
Dosen Pembimbing Lapangan


apt. Nur Sari Ratnayati, S.Farm.
SIPA : 503 448 7288 [illegible] / 436.7.2 / 2021

Apt.
NIK/SIPA

Dipindai dengan CamScanner


AGENDA HARIAN (*LOG BOOK*)

Minggu ke : 5


No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Senin, 10 Maret 2025 (21.00-7.00)	• Mempelajari Lembar manifes Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (B3)	•) Capaian » Mampu memahami data pada Lembar Manifes Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (B3) • Limbah B3 adalah limbah yg mengandung zat berbahaya dan beracun yg dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Limbah B3 harus dimusnahkan karena dapat membahayakan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.  *Lembar Manifestasi limbah B3 Dalam hal pemusnahan, RSI Nurus Syifa tidak dapat memusnahkannya sendiri, melainkan bekerja sama dengan PT. Kerio Ferida Jaya sebagai pengangkut limbah B3 dari RS, dan PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri sebagai penerima dan pemusnah limbah B3. Pada form disamping dapat dilihat B3 yg dikirim adalah obat-obatan expired termasuk alkes dengan karakteristik berbahaya Terhadap Lingkungan.

Dipindai dengan CamScanner

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
3.	Rabu, 12 Maret 2025 (13.00-20.00)	• Mempelajari Formularium Nasional dan Formularium Rumah Sakit	*> Capaian >> Mampu memahami Formularium Nasional dan Formularium Rumah Sakit • Formularium Nasional (Fornas) adalah daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan digunakan sebagai acuan penulisan resep pada pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program Jaminan kesehatan Nasional. Sementara Formularium Rumah sakit dibuat sebagai rujukan tenaga medis dalam meresepkan obat yg efektif dan efisien serta memberi kejelasan dalam pemilihan, pengadaan dan pengelolaan obat. Adapun Perbedaan : • For Nas - disusun oleh komite Nasional penyusunan Fornas - berdasarkan bukti ilmiah mutakhir - digunakan sebagai acuan pelayanan kesehatan nasional dan acuan penulisan resep JKN • Formularium RS - disusun oleh komite / Tim Farmasi dan terapi RS. - berdasarkan kesepakatan staf medis - digunakan sebagai acuan pengobatan di RS tersebut. - Memiliki rasio kompact - risiko paling menguntungkan pasien.



*FORNAS



*FORMULARIUM RUMAH SAKIT

Dipindai dengan CamScanner

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
6.	Sabtu, 15 Maret 2025 (21.00 - 7.00)	• Mengetahui lokasi penyimpanan arsip faktur setiap PBF	•) Capaian)) Mengetahui dan memahami lokasi arsip dan tata letaknya. • Faktur obat dari PBF merupakan bukti pembelian yg sah yg diberikan kepada Rumah Sakit. Tujuan Pengarsipan faktur obat adalah untuk memudahkan pencarian dokumen di masa depan apabila diperlukan.  *Lemari box file PBF Setiap faktur diarsip pada box file PBF masing-masing. Di RSI Ocrus hyifa satu box file hanya terdiri dari 1-2 PBF saja. Apabila satu box file telah terisi penuh, maka wajib dibuat keterangan periode akhir faktur yg tersimpan di box file tersebut. Contoh : Agustus 22 — Agustus 24. faktur YS diarsip disimpan selama 5 tahun sebelum dimusnahkan.

Gresik, 21 Maret 2025
Dosen Pembimbing

Apt. Anindi Lupita Nasyanta, S.Farm., M.Farm
NIDN. 1101 1907 247

Surabaya,
Dosen Pembimbing Lapangan


apt. Nur Suci Ratnawati, S.Farm.
Apt.
NIK/SIPA

Dipindai dengan CamScanner

A. TUGAS KHUSUS RESEP

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep **(3**), resep polifarmasi **(3),** resep obat mata/telinga **(1),** resep obat kulit **(1)**, resep mengandung sediaan inhaler (1), resep obat KB (1), Resep mengandung insulin **(1**), resep kudis/kurap (1), Resep obat saluran cerna **(1)**, Resep saluran nafas (1), resep racikan anak (3), Resep racikan dewasa **(3),** resep pasien DM **(1),** Resep pasien HT **(1)**, Resep pasien syaraf **(1)**, resep yang ada pengulangan /iter **(3**), dan resep lainnya **(4)**

Total : 30 Resep

<table>
<tr><th>No</th><th>Resep</th><th>Tahapan Pengerjaan Resep</th></tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Jenis Resep : Salinan resep
Resep obat : Non racikan
Jumlah obat dalam resep : 2
Pengulangan resep : Neiter
Tempel Resep/salin resep disini!
 
</td>
<td>A. Skrinning Administrasi
<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada</td><td>Tn. A</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada</td><td>Cefat
Mefinal</td></tr>
<tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada</td><td>Cefat 500mg
Mefinal (Tidak ada)</td></tr>
<tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada</td><td>Cefat kapsul
Mefinal tablet</td></tr>
<tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada</td><td>Cefat 10 kapsul
Mefinal 10 tablet</td></tr>
<tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada</td><td>Sehari 2 kali 1 caps
Sehari 3 kali 1 tab</td></tr>
<tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada</td><td>20-3-2025</td></tr>
<tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada</td><td>dr. Eko</td></tr>
<tr><td>Surat ijin :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Alamat dr. :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
</table>
B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi
Cefat 500mg 10 kapsul
Mefinal 10 tablet

c. Perhitungan biaya resep
Cefat 500mg kaps: 150.000
Mefinal 500mg tab: 20.000
Embalase: 1.000</td>
</tr>
</table>

Total: 171.000

d. ETIKET

20-03-2025 Nama : Tn. A No. RM : xxxxxx Tgl Lahir : dd-mm-yyyy Cefat 500mg Sehari 2 kali 1 kapsul Sesudah makan Wajib dihabiskan	20-03-2025 Nama : Tn. A No. RM : xxxxxx Tgl Lahir : dd-mm-yyyy Mefinal Sehari 3 kali 1 kapsul Sesudah makan Bila nyeri

e. *Product knowledge*

Nama Obat : Cefat 500mg Kandungan : cefadroxil 500 mg Indikasi: infeksi saluran pernafasan, infeksi kulit dan jaringan lunak, infeksi saluran kemih, osteomielitis dan septik artritis Kategori: Anti Infeksi (Sistemik) Dosis: 2 kali sehari 1 kapsul, atau bisa dosis tunggal 1000mg sekali minum per hari Penyajian: sebelum / sesudah makan, dihabiskan Cara Penyimpanan: simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung Perhatian: hipersensitifitas terhadap cephalosporin.	Nama Obat : Mefinal 500mg Kandungan: asam mefenamat 500 mg Indikasi: Meredakan nyeri ringan hingga sedang pada sakit kepala, sakit gigi, dismenore primer, juga nyeri traumatik, otot, dan pasca operasi Kategori: Sistem Saraf Pusat Dosis: dewasa : awal 500 mg, dilanjutkan 250 mg/6 jam Penyajian: segera sesudah makan Cara Penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari Perhatian: tukak GI atau penyakit inflamasi pada saluran cerna atas atau bawah. Gagal hati atau ginjal. Bronkospasme, rinitis alergi dan urtikaria jika diterapi dengan aspirin (asam asetil salisilat) atau AINS lain. Terapi nyeri peri operasi pada bedah pintas koron Efek Samping:

Efek Samping: mual, muntah, diare, ruam urtikaria, pruritis, genital pruritus, genital moniliasis, vaginitis	gangguan GI, mengantuk, hipertensi, diare	

f. Tahap pembuatan

1. Melakukan skrining resep Tn. A
2. Mengecek kesetersediaan obat
3. Menghitung harga obat dan embalase
4. Mengambil Mefinal 10 tablet, Cefat 500mg 10 kapsul di rak masing-masing
5. Menulis etiket obat, Mefinal sehari 3 kali 1 kapsul sesudah makan bila nyeri, Cefat 500mg sehari 2 kali 1 kapsul sesudah makan wajib dihabiskan
6. Memasukkan obat & etiket kedalam plastik klip
7. Dilakukan KIE oleh apoteker

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)


A = Apoteker
P = Pasien

A : Atas nama Tuan A dari poli penyakit dalam.
P : Iya, saya.
A : Boleh disebutkan tanggal lahir dan alamatnya Pak?
P : dd-mm-yyyy, jalan xxx
A : Baik, ini bapak mendapatkan obat cefat kapsul. Ini adalah antibiotik, jadi wajib dihabiskan ya pak, diminum 2 kali sehari 1 kapsul sesudah makan. Kemudian, untuk mefinal, ini diminum jika terasa nyeri saja, 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Apakah sudah paham bapak?
P : Oh, begitu. Iya mbak, terima kasih.
A : Sama-sama pak, semoga lekas sembuh.

2.

Jenis Resep : Salinan resep
Resep obat : Non racikan
Jumlah obat dalam resep : 3
Pengulangan resep : Neiter

Tempel Resep/salin resep disini!


INSTALASI FARMASI RSI
DARUS SYIFA'
Jl. Raya Benowo No. 05 ☎ (031) 7406293, 7404603
Surabaya 60195

umum

SALINAN RESEP

Salinan dari resep nomor : ..... tanggal .....
Dari : dr. Iman Rachmanto
Dibuat Tgl. 12/2 2025
Untuk : [redacted]

R/ Amlodipine 5mg x X x
dtd —
R/ Mefinter 500 x V
dtd VIII —
R/ Labumin 500 x V
dtd VIII —

P.C.C

Semoga lekas sembuh
APOTEKER : NUR SUCI RATNAWATI, S.Farm.Apt
SIK. No. 19820629/SIPA-35.78/2013/2780

A. Skrinning Administrasi

Nama Pasien :	Ada	Tn. B
Umur pasien :	Tidak Ada	-
Berat Badan :	Tidak Ada	-
Nama Obat :	Ada	Amlodipine Mefinter Labumin
Kekuatan :	Ada	Amlodipine 5mg Mefinter 500mg Labumin 500mg
Bentuk sed. :	Ada	Amlodipine tablet Mefinter tablet Labumin kapsul
Jumlah obat :	Ada	Amlodipine 5mg 15 tablet Mefinter 500mg 8 tablet Labumin 500mg 8 kapsul
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Tidak Ada	-
Tanggal penulisan resep :	Ada	12-2-2025
Nama dokter :	Ada	dr. Iman Rachmanto
Surat ijin :	Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Tidak Ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Amlodipine 5mg 15 tablet
Mefinter 500mg 8 tablet
Labumin 500mg 8 kapsul

c. Perhitungan biaya resep

Amlodipine 5mg: 7.500
Mefinter 500mg: 30.000
Labumin 500mg: 82.000
Embalase: 1000
Total: 120.500

d. ETIKET

12-02-2025
Nama : Tn. B
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Amlodipine 5mg

Sesudah makan

12-02-2025
Nama : Tn. B
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Mefinter 500mg

Sesudah makan
Bila nyeri

12-02-2025
Nama : Tn. B
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Labumin 500mg

Sesudah makan

e. *Product knowledge*


Nama Obat : amlodipine 5mg Kandungan : amlodipine 5mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: untuk hipertensi dan angina Kategori: Sistem Kardiovaskuler & Hematopoietik Dosis: 1x1 Sehari Penyajian: sesudah makan Perhatian: hamil dan menyusui, pasien dengan gangguan fungsi hati, dan gagal jantung kongesif, pasien lanjut usia Efek Samping:	Nama Obat : mefinter 500mg Kandungan : asam mefenamat 500mg Indikasi: demam, sakit gigi, mialgia, nyeri telinga, nyeri pasca operasi, reumatik, bursitis, dan dismenore Kategori: Sistem Saraf Pusat Dosis: dewasa dan anak >14th awal 500mg. dilanjutkan 250mg setiap 6jam. maksimal 7 hari Penyajian: diminum segera sesudah makan Perhatian: hamil, dehidrasi, epilepsi, asma

		sakit kepala, edema, kelelahan yang menyeluruh, mual, rasa panas dan kemerahan pada wajah, pusing	Efek Samping: gangguan dan pendarahan pada gastrointestinal, tukak peptik, sakit kepala, mengantuk, pusing,cemas, gangguan penglihatan, ruam kulit, diskrasia darah (gangguan sel plasma), nefropati (kerusakan pada ginjal)
		Nama Obat : labumin 500mg Kandungan : ekstrak ophiocephalus striatus (ikan gabus) 500mg Kategori: Herbal Dosis: 1x3 Sehari Cara Penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Perhatian: Konsultasikan kepada dokter terlebih dahulu apabila terdapat riwayat alergi terhadap kandungan dari produk ini.	

f. Tahap pembuatan

1. Melakukan skrining resep Tn. B
2. Mengecek kesetersediaan obat dan embalase
3. Menghitung harga obat
4. Mengambil amlodipine 5mg 15 tablet, mefinter 500mg 8 tablet, labumin 500mg 8 kapsul di rak masing-masing
5. Menulis etiket amlodipine 5mg sesudah makan, mefinter 500mg sesudah makan bila nyeri, labumin sesudah makan 500mg
6. Memasukkan obat & etiket ke dalam plastik klip
7. Dilakukan KIE oleh apoteker

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)
A = Apoteker
P = Pasien
A : Atas nama Tuan B dari poli penyakit dalam.
P : Iya, saya.
A : Boleh disebutkan tanggal lahir dan alamatnya Pak?
P : dd-mm-yyyy, jalan xxx
A : Baik, ini bapak mendapatkan obat amlodipine 5mg diminum pagi sesudah makan. Kemudian, untuk mefinter, ini diminum jika terasa nyeri saja sesudah makan, dan labumin untuk suplemen sehari sekali sesudah makan. Apakah sudah paham bapak?
P : Oh, begitu. Iya mbak, terima kasih.
A : Sama-sama pak, semoga lekas sembuh.</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Jenis Resep : Salinan resep
Resep obat : Non racikan
Jumlah obat dalam resep : 4
Pengulangan resep : Neiter
Tempel Resep/salin resep disini!</td>
<td>a. Skrinning Administrasi
<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada</td><td>Tn. C</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada</td><td>Ibuprofen
Ranitidine
Acyclovir
Methyl prednisolone</td></tr>
<tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada</td><td>Ibuprofen 400mg
Ranitidine 150mg
Acyclovir salep 5%
Methyl prednisolone 4mg</td></tr>
<tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada</td><td>Ibuprofen tablet
Ranitidine tablet
Acyclovir salep
Methyl prednisolone tablet</td></tr>
<tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada</td><td>Ibuprofen 400mg 10 tablet
Ranitidine 150mg 10 tablet
Acyclovir salep 1 pot
Methyl prednisolone 4mg 10 tablet</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>



RUMAH SAKIT ISLAM DARUS SYIFA'
SURABAYA
Jl. Raya Benowo No.5, Benowo, Kec. Pakal, Kota Surabaya
Telp. (031) 7406293, Fax. (031) 7422842

SALINAN RESEP

Dari Dokter : dr. Sita Romita Putri
Untuk : [redacted]
No Resep : IGD/003454
Tertulis pada tanggal : 24-02-2025
Dibuat pada tanggal : 24-02-2025

R/ IBUPROFEN 400 mg TAB NO X
S 2 dd 1 Tab DEMAM/NYERI
det 10

R/ RANITIDINE 150 mg TAB NO X
S 3 dd 1 Tab NYERI PERUT
det 10

R/ ACYCLOVIR 5 SALEP NO I
S 2 dd 1 Tube
det 1

R/ METHYL PREDNISOLON 4 mg TAB NO X
S 3 dd 1 Tab RADANG
det 10

Surabaya, 26-02-2025
PCC

Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada	Sehari 2 kali 1 tablet Sehari 3 kali 1 tablet Sehari 2 kali oleskan Sehari 3 kali 1 tablet
Tanggal penulisan resep :	Ada	26-2-25
Nama dokter :	Ada	dr. Sita Romita Putri
Surat ijin :	Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Tidak Ada	-

b. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Ibuprofen 400mg 10 tablet
Ranitidine 150mg 10 tablet
Acyclovir 5% salep 1 tube
Methyl prednisolone 4mg 10 tablet

c. Perhitungan biaya resep

Ibuprofen 400mg: 6.000
Ranitidine 150mg: 7.000
Acyclovir 5% salep: 5.000
Methyl prednisolone 4mg: 8.000
Embalase:1.000
Total: 22.000

d. ETIKET

26-02-2025
Nama : Tn. C
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Ibuprofen 400mg
Sehari 2 kali 1 tab
Sesudah makan

26-02-2025
Nama : Tn. C
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Ranitidine 150mg
Sehari 3 kali 1 tab
Sesudah makan

		26-02-2025 Nama : Tn. C No. RM : xxxxxx Tgl Lahir : dd-mm-yyyy Acyclovir 5% sehari 2 kali oleskan OBAT LUAR 26-02-2025 Nama : Tn. C No. RM : xxxxxx Tgl Lahir : dd-mm-yyyy Methylprednisolone 4mg Sehari 3 kali 1 tab Sesudah makan e. *Product knowledge* Nama Obat : ibuprofen 400mg Kandungan : ibuprofen 400mg Indikasi: Mengobati sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot, rasa sakit pada saat haid, rasa sakit/nyeri setelah operasi. Kategori: Sistem Saraf Pusat Dosis: Dewasa : 3 kali sehari 1-2 tablet. Anak-anak : 20 mg/kg berat badan/hari dibagi menjadi beberapa kali pemberian. Penyajian: Dikonsumsi bersamaan dengan makanan. Cara Penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung Perhatian: Hati-hati pemberian pada penderita tukak lambung atau mempunyai riwayat tukak lambung dan penderita payah jantung, gangguan fungsi ginjal, hipertensi. Efek Samping: Nama Obat : ranitidine 150mg Kandungan : ranitidine 150mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: pengobatan jangka pendek tukak dudenum aktif, tukak lambung aktif, mengurangi gejala refluks esofagitis, terapi pemeilharan setelah penyembuhan tukak duodenum dan lambung. Kategori: Sistem Gastrointestinal & Hepatobilier Dosis: tukak duodenum : 2 kali sehari 150mg (pagi dan malam) selama 4-8minggu. tukak lambung aktif : 2 kali sehari 150mg (pagi dan malam) selama 2 minggu. terapi pemeliharaan tukak duodenum dan lambung : 1 kali sehari 150mg sebelum tidur. refluks gastro esofagitis : 2 kali sehari 150mg. esofagitis erosif : 4 kali sehari 150mg. terapi pemeliharaan esofagitis erosif : 2 kali sehari 150mg. Penyajian: diminum sebelum atau setelah makan Perhatian: pasien dengan riwayat profiria akut. ibu hamil dan menyusui,

			Mual, muntah, diare, konstipasi, nyeri kambung, ruam kulit, sakit kepala, pusing.	anak, usia lanjut. gangguan fungsi hati dan ginjal. Efek Samping: sakit kepala, malaise (merasa lemas dan kurang fit), pusing, mengantuk, insomnia, vertigo, agitasi (resah dan gelisah), depresi, halusinasi, gangguan gastrointestinal.
			Nama Obat : acyclovir 5% salep Kandungan : acyclovir Indikasi: Pengobatan infeksi virus herpes simplex pada kulit dan selaput lendir, termasuk herpes genitalis yang inisial dan rekuren Kategori: Kulit Dosis: 5x/hr setiap 4 jam selama 5 hr. Pengobatan dapat diperpanjang hingga 10 hr. Penyajian: Oleskan tipis-tipis pada bagian kulit yang mengalami lesi Perhatian: Krim Acyclovir tidak boleh digunakan untuk membran mukosa seperti mulut, mata dan vagina Efek Samping: rasa terbakar sementara setelah menggunakan krim. Kekeringan kulit.	Nama Obat : methylprednisolone 4mg Kandungan : methylprednisolone 4mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: Asma bronkial; Gangguan pada kulit seperti dermatitis , psoriasis , sindrom Stevens-Johnson dan kelainan kulit lainnya yang responsif terhadap kortikosteroid; Gangguan kolagen : Lupus eritematosus sistemik; Kelainan lainnya yang responsif terhadap korti... Kategori: Hormon Dosis: Parenteral :Dosis yang dianjurkan : 30 mg/kg berat badan, diberikan secara intravena paling tidaklebih dari 30 menit. Dosis ini dapat diulangi setiap 4-6 jam untuk setiap 48 jam. Dosis dapat dikurangi untuk bayi dan anak-anak tapi yang perlu lebih diperh... Penyajian: sesudah makan Cara Penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari Perhatian: TBC, ulkus peptikum, infeksi jamur sistemik, herpes simpleks, diabetes melitus, varisela. Hipersensitif terhadap

				metilprednisolon dan glukokortikoid lainnya. Efek Samping: Pemberian jangka pendek jarang menimbulkan efek samping yang serius.Pemberian jangka lama akan menimbulkan efek samping seperti yang ditimbulkan kortikosteroid lainnya, misalnya moon face, bufallo hump, hipertensi, osteoporosis, gangguan toleransi glukos.


f. Tahap pembuatan

1. Melakukan skrining resep Tn. C
2. Mengecek kesetersediaan obat
3. Menghitung harga obat
4. Mengambil ibuprofen 400mg 10 tablet, ranitidine 150mg 10 tablet, salep acyclovir 5% 1 tube, methylprednisolone 4mg 10 tablet di rak masing-masing
5. Menulis etiket ibuprofen 400mg sehari 2 kali 1 tablet sesudah makan, ranitidine 150mg sehari 3 kali 1 tablet sesudah makan, oleskan tipis salep acyclovir 5% di area kulit yg terinfeksi, methylprednisolone 4mg sehari 3 kali 1 tablet sesudah makan
6. Memasukkan obat & etiket kedalam plastik klip
7. Dilakukan KIE oleh apoteker

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

A = Apoteker
P = Pasien
A : Atas nama Tn. C
P : Iya, saya.
A : Boleh disebutkan tanggal lahir dan alamatnya Pak?
P : dd-mm-yyyy, jalan xxx
A : Baik, ini bapak mendapatkan obat ibuprofen 400mg sehari 2 kali 1 tablet sesudah makan untuk demam, ranitidine 150mg sehari 3 kali 1 tablet sesudah makan untuk nyeri tukak lambung, oleskan tipis salep acyclovir 5% di area kulit yg terinfeksi, methylprednisolone 4mg sehari 3 kali 1 tablet sesudah makan untuk radang tenggorokan. Apakah sudah paham bapak?
P : Oh, begitu. Iya mbak, terima kasih.
A : Sama-sama pak, semoga lekas sembuh.</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Jenis Resep : Resep asli (Polifarmasi)
Resep obat : Non racikan
Jumlah obat dalam resep : 5
Pengulangan resep : Neiter</td>
<td>a. Skrinning Administrasi
<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada</td><td>Ny. A</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada</td><td>63 tahun</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada</td><td>Betahistin
Glucosamin
Kalium diklofenak
Alpentin
Tizanidin</td></tr>
<tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada</td><td>Betahistin 6mg
Glucosamin 500mg
Kalium diklofenak 50mg
Alpentin 100mg
Tizanidin 2mg</td></tr>
<tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada</td><td>Betahistin tablet
Glucosamin tablet
Kalium diklofenak tablet
Alpentin kapsul</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

Tempel Resep/salin resep disini!



RUMAH SAKIT ISLAM DARUS SYIFA` SURABAYA
Jl. Raya Benowo No.5, Benowo, Kec. Pakal, Kota Surabaya
Telp. (031) 7406293, Fax. (031) 7422842

Dokter : dr Fitri Kusuma Wardhani, Sp. KFR
SIP/SIK Dokter : 503.446/02420/II/IP.DS/436.7.2/2020
Poli / Ruang : Poli Rehabilitasi Medis
Riwayat Alergi : Ada, tidak ada

Surabaya, 03-03-2025

R/ BETAHISTIN 6 mg TAB NO XX 10
S 2 dd 1 Tab pc Po pusing
R/ GLUCOSAMIN 500 mg TAB NO XX 5
S 2 dd 1 Caps pc Po SENDI
R/ KALIUM DIKLOFENAK 50 mg TAB NO XX 10
S 2 dd 1 Tab pc Po
R/ ALPENTIN 100 mg KAP NO XX 10
S 2 dd 1 Caps pc Po
R/ ~~ZITANID~~ 2 mg TAB Tizanidin NO XX 4
S 2 dd 1 Tab pc Po

Nama : [redacted]
Umur : 63 thn 8 bln 22 hr
Berat Badan : - Kg
Alamat : UKA GG 20/17
No. RM : 412227
Penjamin : BPJS

		Tizanidin tablet
Jumlah obat :	Ada	Betahistin 6mg 10 tablet Glucosamin 500mg 5 tablet Kalium diklofenak 50mg 10 tablet Alpentin 100mg 10 kapsul Tizanidin 2mg 4 tablet
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada	Sehari 2 kali 1 tab sesudah makan Sehari 2 kali 1 tab sesudah makan Sehari 2 kali 1 tab sesudah makan Sehari 2 kali 1 kaps sesudah makan Sehari 2 kali 1 tab sesudah makan
Tanggal penulisan resep :	Ada	3-3-2025
Nama dokter :	Ada	dr. Fitri Kusuma W.
Surat ijin :	Ada	503.445/02420/SIP.DS/436.7.2/2020
Alamat dr. :	Tidak Ada	-

b. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Betahistin 6mg 10 tablet
Glucosamin 500mg 5 tablet
Kalium diklofenak 50mg 10 tablet
Alpentin 100mg 10 kapsul
Tizanidin 2mg 4 tablet

c. Perhitungan biaya resep

Betahistin 6mg : 10000
Glucosamin 500mg : 12000
Kalium diklofenak 50mg : 11500
Alpentin 100mg : 48000
Tizanidin 2mg : 20000
Embalase: 1000
Total: 102500

d. ETIKET

3-3-2025
Nama : Ny. A
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Betahistine 2mg
Sehari 2 kali 1 tab
Sesudah makan

3-3-2025
Nama : Ny. A
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Glucosamine 500mg
Sehari 2 kali 1 tablet
Sesudah makan

3-3-2025
Nama : Ny. A
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Kalium diklofenak 50mg
Sehari 2 kali 1 tablet
Sesudah makan

3-3-2025
Nama : Ny. A
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Alpentin 100mg
Sehari 2 kali 1 kapsul
Sesudah makan

3-3-2025
Nama : Ny. A
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Tizanidine 2mg
Sehari 2 kali 1 tablet
Sesudah makan

e. *Product knowledge*


Nama Obat : Betahistine mesylate 6mg Kandungan : Betahistine mesylate 6mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: antivertigo Kategori: Sistem Saraf Pusat Dosis: Dewasa 1-2 kaplet 3 x perhari. Penyajian: Sebaiknya diberikan bersama makanan.	Nama Obat : Glucosamin 500mg Kandungan : Glucosamin 500mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: memelihara kesehatan persendian Kategori: Sistem Muskuloskeletal Dosis: 1x1 Sehari Penyajian: sesudah makan Cara Penyimpanan: Simpan pada suhu 30 derajad Celcius, terhindar drai cahaya matahari secara langsung.

		Cara Penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari Perhatian: Asma, tukak peptik yang sudah ada atau pernah terjadi. Hamil & laktasi. Efek Samping: Gangguan Gastro Intestinal, sakit kepala, ruam kulit, pruritus.	Perhatian: hipersensitif terhadap bahan aktif obat, Pasien dengan / toleransi glukosa terganggu, DM tidak terkontrol, risiko penyakit CV, asma. Kehamilan dan menyusui. Efek Samping: Eksaserbasi asma, hiperkolesterolemia, peningkatan resistensi insulin. Sakit kepala, kelelahan, kantuk. Mulas, perut kembung, sakit perut, diare, sembelit, dispepsia. Pruritus, ruam, angioedema, urtikaria.
		Nama Obat : Kalium diklofenak 50mg Kandungan : Kalium diklofenak 50mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: sebagai pengobatan jangka pendek untuk kondisi-kondisi akut sebagai berikut: nyeri inflamasi setelah trauma, seperti karena terkilir, nyeri dan inflamasi setelah operasi seperti operasi gigi atau tulang Kategori: Sistem Saraf Pusat Dosis: dewasa: dosis awal 100-150 mg sehari, dosis terbagi 2-3 kali Penyajian: sesudah makan Cara Penyimpanan: simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung Perhatian: tukak lambung, hipersensitif terhadap zat aktif Efek Samping: gangguan saluran pencernaan, gangguan susunan saraf, gangguan kulit, gangguan sistem urogenital, gangguan hati, gangguan darah, gangguan hipersensitivitas, gangguan susunan organ lainnya	Nama Obat : Alpentin 100mg Kandungan : Alpentin 100mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: terapi tambahan terhadap obat anti epilepsi standard yang tidak dapat dikendalikan serangannnya serta untuk pengobatan nyeri neuropati Kategori: Sistem Saraf Pusat Dosis: dewasa & anak > 12 tahun 900-1800 mg/hr. hari ke-1: 300 mg 1x sehari. Hari ke-2 300 mg 2x sehari. Hari ke-3 300 mg 3x sehari. Selanjutnya, dosis dapat ditingkatkan s/d 1200 mg/hr diberikan dalam 3 dosis terbagi. Peningkatan dosis lebih lanjut dapat dilakukan Penyajian: sesudah makan Cara Penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari Perhatian: hamil, laktasi, anak < 12 thn Efek Samping: pusing, lelah, sakit kepala, tremor, rhinitis, mual, muntah
		Nama Obat : Tizanidin 2mg Kandungan : Tizanidin 2mg	

		Indikasi / Manfaat / Kegunaan: • Kelenturan pada pasien dengan multiple sclerosis atau cedera atau penyakit sumsum tulang belakang. Kategori: Sistem Muskuloskeletal Dosis: • Dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Penyajian: • Dewasa: Awal: 2 mg sebagai dosis tunggal, meningkat sesuai dengan kebutuhan dan respons pasien dengan peningkatan 2-4 mg setiap hari dengan interval 3-4 hari. Dosis harus diminum dalam 3-4 dosis terbagi. Dosis umum: 24 mg / hari. Maks: 36 mg / hari. Cara Penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung. Perhatian: • Wanita hamil dan menyusui. • Lansia. • Hindari pengurangan dan penarikan dosis secara tiba-tiba. Efek Samping: • Pusing. • Mengantuk. • Gangguan pencernaan. • Kelemahan. • Kelelahan.	
		f. Tahap pembuatan 1. Melakukan skrining resep Ny. A 2. Mengecek kesetersediaan obat 3. Menghitung harga obat dan embalase 4. Mengambil betahistine 6mg 10 tab, glucosamine 500mg 5 tab, kalium diklofenac 50mg 10 tab, alpentin 100mg 10 tab, tizanidine 2mg 4 tab di rak masing-masing 5. Menulis etiket betahistine 6mg sehari 2 kali 1 tab sesudah makan, glucosamine 500mg sehari 2 kali 1 tab sesudah makan, kalium diklofenac 50mg sehari 2 kali 1 tab sesudah makan, alpentin 100mg sehari 2 kali 1 kapsul sesudah makan, tizanidine 2mg sehari 2 kali 1 tab sesudah makan 6. Memasukkan obat & etiket kedalam plastik klip 7. Dilakukan KIE oleh apoteker	

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal

A = Apoteker
P = Pasien
A : Atas nama Ny. C
P : Iya, saya.
A : Boleh disebutkan tanggal lahir dan alamatnya Bu?
P : dd-mm-yyyy, jalan xxx
A : Baik, ini bapak mendapatkan obat betahistine sehari 2 kali 1 tab sesudah makan untuk pusing, glucosamine sehari 2 kali 1 tab sesudah makan untuk vitamin sendi, kalium diklofenac sehari 2 kali 1 tab sesudah makan bila nyeri, alpentin sehari 2 kali 1 kapsul sesudah makan untuk vitamin syaraf, tizanidine sehari 2 kali 1 tab sesudah makan untuk kaku otot. Apakah sudah paham bapak?
P : Oh, begitu. Iya mbak, terima kasih.
A : Sama-sama bu, semoga lekas sembuh.</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Jenis Resep : Resep asli (Polifarmasi)
Resep obat : Non racikan
Jumlah obat dalam resep : 10
Pengulangan resep : Neiter</td>
<td>a. Skrinning Administrasi
<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada</td><td>Ny. B</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>Tidak Ada</td><td>63 tahun</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>Tidak Ada</td><td>63 kg</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada</td><td>Allopurinol
Glimepiride
Spironolakton
Lansoprazole
Candesartan
Acarbose
Pregabalin
Simvastatin
Tablet tambah darah
Tazovell</td></tr>
<tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada</td><td>Allopurinol 100mg
Glimepiride 4mg
Spironolakton 100mg
Lansoprazole 30mg
Candesartan 8mg</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

	Tempel Resep/salin resep disini!  RUMAH SAKIT ISLAM DARUS SYIFA' SURABAYA Jl. Raya Benowo No.5, Benowo, Kec. Pakal, Kota Surabaya Telp. (031) 7406293, Fax. (031) 7422842 Dokter : dr. UMAR NUR RACHMAN, Sp.PD SIP/SIK Dokter : 503.446/861/B/IP.DS/436.7.17/2021 Poli / Ruang : Poli Spesialis Penyakit Dalam Riwayat Alergi : Tidak Ada Surabaya, 12-02-2025 R/ ALLOPURINOL 100 mg TAB NO XXX S 1 dd 1 Tab pc Po malam R/ GLIMEPIRIDE 4 mg TAB NO XXX S 1 dd 1 Tab pc Po pagi R/ SPIRONOLAKTON 100 mg TAB NO XXX S 1 dd 1 PAGI R/ ANALSIK TAB NO X S 1 dd 1 malam R/ INBION KAP NO XXX S 1 dd 1 Caps ac Po R/ LANSOPRAZOLE 30 mg KAP NO X S 1 dd 1 R/ MECOBALAMIN 500 mg KAP NO X S 1 dd 1 VITAMIN SARAF R/ CANDESARTAN 8 mg TAB NO XXX S 1 dd 1 pagi// DARAH TINGGI R/ ACARBOSE 100 mg TAB NO XC S 2 dd 1 pagi// DIABET R/ LACTULOSA 60ml NO I S 3 dd 1 C pc Po R/ PREGABALIN 75 mg KAP NO XXX S 1 dd 1 MALAM// NYERI SARAF R/ PENOFIBRATE 100 mg KAP NO XXX S 1 dd 1 Caps pc Po malam R/ SIMVASTATIN 20 mg TAB NO XXX S 1 dd 1 Tab pc Po malam R/ TABLET TAMBAH DARAH NO XXX S 1 dd 1 R/ TAZOVELL 30 mg TAB NO XXX S 1 dd 1 MALAM// DIABET Nama : [redacted] Umur : 63 thn 6 bln 2 hr Berat Badan : 63 Kg Alamat : BRINGKANG No. RM : 386066 Penjamin : BPJS				

		Sehari 1 kali 1 tab malam sesudah makan Sehari 1 kali 1 tab Sehari 1 kali 1 tab malam
Tanggal penulisan resep :	Ada	12-2-2025
Nama dokter :	Ada	dr. Umar Nur Rahman, Sp.PD
Surat ijin :	Ada	503.446/861/B/IP.DS/436.7.17/2021
Alamat dr. :	Tidak Ada	-

b. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Allopurinol 100mg 30 tablet
Glimepiride 4mg 30 tablet
Spironolakton 100mg 30 tablet
Lansoprazole 30mg 5 kapsul
Candesartan 8mg 30 tablet
Acarbose 100mg 60 tablet
Pregabalin 75mg 30 tablet
Simvastatin 20mg 30 tablet
Tablet tambah darah 30 tablet
Tazovell 30mg 30 tablet

c. Perhitungan biaya resep

Allopurinol 100mg: 15000
Glimepiride 4mg : 36000
Spironolakton 100mg: 27000
Lansoprazole 30mg: 9000
Candesartan 8mg : 18000
Acarbose 100mg : 72000
Pregabalin 75mg : 210000
Simvastatin 20mg : 42000
Tablet tambah darah: 24000
Tazovell 30mg: 126000
Embalase: 1000
Total: 580000

d. ETIKET

12-02-2025
Nama : Ny. B
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Allopurinol 100mg
Sehari 1 kali 1 tab
Sesudah makan
malam

12-02-2025
Nama : Ny. B
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Glimepiride 4mg
Sehari 1 kali 1 tab
Sesudah makan
pagi

12-02-2025
Nama : Ny. B
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Spironolakton 100mg
Sehari 1 kali 1 tab

12-02-2025
Nama : Ny. B
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Lansoprazole 30mg
Sehari 1 kali 1 tab

12-02-2025
Nama : Ny. B
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Candesartan 8mg
Sehari 1 kali 1 tab

pagi

12-02-2025
Nama : Ny. B
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Acarbose 100mg
Sehari 1 kali 1 tab

pagi

12-02-2025
Nama : Ny. B
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Pregabalin 75mg
Sehari 1 kali 1 tab

malam

12-02-2025
Nama : Ny. B
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Simvastatin 20mg
Sehari 1 kali 1 tab
Sesudah makan
malam

		12-02-2025 Nama : Ny. B No. RM : xxxxxx Tgl Lahir : dd-mm-yyyy Tablet tambah darah Sehari 1 kali 1 tab 12-02-2025 Nama : Ny. B No. RM : xxxxxx Tgl Lahir : dd-mm-yyyy Tazovell 30mg Sehari 1 kali 1 tab malam e. *Product knowledge* Nama Obat : Allopurinol 100mg Kandungan : Allopurinol 100mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: manifestasi klinis utama dari endapan garam urat/asam urat termasuk gout artritis, kerusakan ginjal karena endapan kristal/pembentukan batu Kategori: Sistem Muskuloskeletal Dosis: 1x1 Sehari Penyajian: sesudah makan Cara Penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari Perhatian: hipersensitif terhadap allopurinol Efek Samping: pruritus (gatal), ruam kulit/makulopapular, kadang-kadang terjadi pengelupasan, purpurik dan jarang eksfoliatif,Hipersensitivitas yang menyeluruh. pada kondisi ini Zyloric harus dihentikan segera dan selamanya,angioimmunoblastic lymphadenopathy (jarang) Nama Obat : Glimepiride 4mg Kandungan : Glimepiride 4mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: terapi diabetes tipe 2 dimana kadar gula darah tidak dapat dikontrol dengan diet dan olahraga Kategori: Sistem Endokrin dan Metabolik Dosis: 1x3 Sehari Penyajian: segera sebelum makan Cara Penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari Perhatian: hipersensitif terhadap glimepirid, pasien ketoasidosis dengan atau tanpa koma Efek Samping: hipoglikemia, gangguan penglihatan, mual, muntah, nyeri perut, diare, kelainan darah, reaksi alergi atau pseudoalergi Nama Obat : Spironolakton 100mg Kandungan : Spironolakton 100mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: Hipertensi esensial, hipertensi berat, Nama Obat : Lansoprazole 30mg Kandungan : Lansoprazole 30mg

		Edema jantung, edema karena sirosis hati, edema karena sindroma nefrotik Kategori: Sistem Kardiovaskuler & Hematopoietik Dosis: 1x1 Sehari Penyajian: Berikan bersama dengan makanan Perhatian: Gangguan fungsi ginjal / hati, DM, asidosis, wanita hamil dan menyusui Efek Samping: Sakit kepala, mengantuk, gangguan lambung, ataksia, kebingungan mental, hirsutisme, ketidakteraturan menstruasi, impotensi, ruam kulit, ginekomastia, jarang terjadi : pembesaran payudara, hiponatremia, hiperkalemia	Indikasi / Manfaat / Kegunaan: Tukak duodenum dan refluks esofagus, tukak lambung ringan. Kategori: Sistem Gastrointestinal & Hepatobilier Dosis: • Dewasa dan lanjut usia: 30 mg 1xsehari. Lama terapi: tukak duodenum dan refluks esofagitis 4 minggu. tukak lambung ringan 8 minggu. Pasien dengan gangguan hati dan ginjal: dosis maksimal 30 mg sehari. Penyajian: Harus diminum saat perut kosong. Cara Penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung. Perhatian: • Wanita hamil dan menyusui. • Lanjut usia. Efek Samping: Diare, sakit kepala, mual, alegi kulit, nyeri perut, konstipasi, kembung dan muntah.
		Nama Obat : Candesartan 8mg Kandungan : Candesartan 8mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: hipertensi, pengobatan pada pasien gagal jantung dan gangguan fungsi sistolik ventrikel kiri ketika obat penghambat ACE tidak ditolerir Kategori: Sistem Kardiovaskuler & Hematopoietik Dosis: 1x1 Sehari Penyajian: sebelum / sesudah makan Cara Penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari Perhatian: hipersensitif terhadap komponen, wanita hamil, menyusui, gangguan hati berat dan/atau kolestasia	Nama Obat : Acarbose 100mg Kandungan : Acarbose 100mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: Terapi kombinasi dengan diet untuk DM Kategori: Sistem Endokrin dan Metabolik Dosis: 1x1 Sehari Penyajian: Berikan bersama dengan suapan pertama makanan utama Cara Penyimpanan: Simpan di tempat yang kering dan terlindung dari cahaya Perhatian: Monitor fungsi hati selama 6-12 bulan pertama terapi, anak < 18 tahun Efek Samping: Sering terjadi : kembung, bising usus meningkat. Kadang terjadi : diare dan nyeri abdomen. Gejala pada lambung dan abdomen yang tidak spesifik

			Efek Samping: back pain, pusing, infeksi saluran pernafasan atas, faringitis, rinitis	
			Nama Obat : Pregabalin 75mg Kandungan : Pregabalin 75mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: Pengobatan nyeri neuropati perifer & sentral pada dewasa. Sebagai terapi tambahan pada pasien dewasa dengan kejang parsial dengan atau tanpa generalisasi sekunder. Terapi gangguan cemas menyeluruh (GAD) pada dewasa. Meredakan nyeri pada penatalaksanaan fibromialgia. Kategori: Sistem Saraf Pusat Dosis: 1. Nyeri neuropatik: Awal 75 mg 2x/hari. Dapat ditingkatkan hingga 150 mg 2x/hari sesudah selang waktu 3-7 hari. Maksimal 300 mg 2x/hari sesudah 1 minggu., 2. Epilepsi: Awal 75 mg 2x/hari. Dapat ditingkatkan hingga 150 mg 2x/hari sesudah 1 minggu. Maksimal 300 mg 2x/hari sesudah penambahan minggu terapi., 3.GAD: 150-600 mg/ hari dalam 2-3 dosis terbagi. , 4.Fibromialgia: 300-450 mg mg/hari diberikan dalam 2 dosis terbagi. Penyajian: Dapat diberikan sebelum atau sesudah makan. Cara Penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung. Perhatian: Pasien dengan kelainan herediter yang jarang dari intoleransi galaktosa, defisiensi Lapp-lactase atau malabsorbsi glukosa-galaktosa, gangguan ginjal, diabetes, hamil, lanjut usia, anak 12-17 tahun.	Nama Obat : Simvastatin 20mg Kandungan : Simvastatin 20mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: mengurangi kadar kolesterol total dan ldl, sebagai anti hipertensi primer maupun sekunder Kategori: Sistem Kardiovaskuler & Hematopoietik Dosis: 1x1 Sehari Penyajian: malam hari sebelum tidur Cara Penyimpanan: simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung Perhatian: gangguan hepatik akut, peningkatan sgot/sgpt tanpa penjelasan, hamil dan laktasi Efek Samping: kejang otot, mialgia, tremor, pusing, vertigo, gangguan kulit, hilangnya daya ingat

		Efek Samping: pusing, penglihatan kabur, peningkatan nafsu makan, suasana hati euforia (kegembiraan berlebihan), kebingungan, vertigo.	
		Nama Obat : Tablet tambah darah Kandungan : f erro fumarate setara dengan fe elemen 60mg, asam folat 0.40mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: Membantu memenuhi kebutuhan zat besi dan asam folat tubuh. Kategori: Vitamin dan Mineral Dosis: 1x1 Sehari Penyajian: Diminum setelah makan. Cara Penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.	Nama Obat : Tazovell 30mg Kandungan : Pioglitazone 30 mg Indikasi Untuk membantu menjaga kadar gula darah pada penderita diabetes tetap terkontrol. Dosis HARUS SESUAI DENGAN RESEP DOKTER. Dewasa : Dosis awal 15-30 mg 1 x sehari dalam kombinasi dengan metformin atau sulfonilurea. Efek Samping Pioglitazone dengan metformin: anemia, BB bertambah, sakit kepala, gangguan visual, kembung, artralgia, hematuria, impotensi. Pioglitazone dengan sulfonilurea: BB bertambah, hipoglikemia, peningkatan laktat dehidrogenase, peningkatan napsu makan, pusing, sakit kepala, vertigo, berkeringat, proteinuria, lelah. Kontra Indikasi Hipesensitif, gagal jantung atau riwayat gagal jantung, gangguan hati sedang sampai dengan berat, kanker kandung kemih atau riwayat kanker kandung kemih, terapi kombinasi dengan insulin. Perhatian Tidak diberikan pada pasien dengan DM tipe 1 atau ketoasidosis. Tidak disarankan digunakan sebagai monoterapi. Pasien dengan edema atau gagal jantung (NYHA III atau IV).Pemantauan ketat terhadap diet. Gangguan hati sedang hingga berat; disfungsi menstruasi. Pastikan adanya faktor risiko kanker kandung kemih &

			hematuria makroskopik sebelum terapi. Kehamilan dan laktasi. Anak & remaja <18 tahun. Cara Penyimpanan Simpan obat ditempat yang sejuk (tidak lebih dari 30°C) dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.


f. Tahap pembuatan

1. Melakukan skrining resep Ny. B
2. Mengecek kesetersediaan obat
3. Menghitung harga obat dan embalase
4. Mengambil obat Allopurinol 100mg 30 tablet Glimepiride 4mg 30 tablet Spironolakton 100mg 30 tablet Lansoprazole 30mg 5 kapsul Candesartan 8mg 30 tablet Acarbose 100mg 60 tablet Pregabalin 75mg 30 tablet Simvastatin 20mg 30 tablet Tablet tambah darah 30 tablet Tazovell 30mg 30 tablet di rak masing-masing
5. Menulis etiket allopurinol 100mg Sehari 1 kali 1 tab malam sesudah makan, Lansoprazole 30mg Sehari 1 kali 1 tab pagi sesudah makan, Candesartan 8mg Sehari 1 kali 1 tab pagi, Acarbose 100mg Sehari 1 kali 1 kaps, Pregabalin 75mg Sehari 1 kali 1 tab pagi, Simvastatin 20mg Sehari 2 kali 1 tab pagi, Tablet tambah darah Sehari 1 kali 1 tab malam, Tazovell 30mg Sehari 1 kali 1 tab malam sesudah makan Glimepiride 4mg Sehari 1 kali 1 tab, Spironolakton 100mg Sehari 1 kali 1 tab malam
6. Memasukkan obat & etiket kedalam plastik klip
7. Dilakukan KIE oleh dokter

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

A = Apoteker
P = Pasien
A : Atas nama Ny. B dari poli penyakit dalam.
P : Iya, saya.
A : Boleh disebutkan tanggal lahir dan alamatnya bu?
P : dd-mm-yyyy, jalan xxx
A : Baik, ini bu mendapatkan obat allopurinol 100mg Sehari 1 kali 1 tab malam sesudah makan, Lansoprazole 30mg Sehari 1 kali 1 tab pagi sesudah makan, Candesartan 8mg Sehari 1 kali 1 tab pagi, Acarbose 100mg Sehari 1 kali 1 kaps, Pregabalin 75mg Sehari 1 kali 1 tab pagi, Simvastatin 20mg Sehari 2 kali 1 tab pagi, Tablet tambah darah Sehari 1 kali 1 tab malam, Tazovell 30mg Sehari 1 kali 1 tab malam sesudah makan Glimepiride 4mg Sehari 1 kali 1 tab, Spironolakton 100mg Sehari 1 kali 1 tab malam. Apakah sudah paham bu?
P : Oh, begitu. Iya mbak, terima kasih.
A : Sama-sama bu, semoga lekas sembuh.</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Jenis Resep : Resep asli (Polifarmasi)
Resep obat : Non racikan
Jumlah obat dalam resep : 7
Pengulangan resep : Neiter</td>
<td>a. Skrinning Administrasi
<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada</td><td>Ny. C</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada</td><td>75 Th</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada</td><td>63 kg</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada</td><td>Alprazolam
Betahistine
Glimepiride
Glucosamine
Analsik
Natrium Diklofenak
Alpentin</td></tr>
<tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada</td><td>Alprazolam 5mg
Betahistine 6mg
Glimepiride 2mg
Glucosamine 500mg
Analsik -</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

Tempel Resep/salin resep disini!



RUMAH SAKIT ISLAM DARUS SYIFA' SURABAYA
Jl. Raya Benowo No.5, Benowo, Kec. Pakal, Kota Surabaya
Telp. (031) 7406293, Fax. (031) 7422842

Dokter : dr. ROXANTIN UTAMI, Sp.S
SIP/SIK Dokter : 500.16.7.2/2505/B/IP.DS/436.7.15/2024
Poli / Ruang : Poli Spesialis Saraf
Riwayat Alergi : Ada, piracetam

Surabaya, 12-02-2025

R/ ALPRAZOLAM 05 mg TAB NO XX 20
S 1 dd 1 Tab pc Po mlm
R/ BETAHISTIN 6 mg TAB NO XV 10
S 3 dd 1 Tab pc Po kp pusing
R/ GLIMEPIRIDE 2 mg TAB NO XXX
S 1 dd 1 Tab ac Po DIABET
R/ GLUCOSAMIN 500 mg TAB NO LX 10
S 2 dd 1 SENDI
R/ ANALSIK TAB NO XX 5
S 2 dd 1 Tab pc Po kp nyeri
R/ NA DIKLOFENAK 50 mg TAB NO XX
S 2 dd 1 KP NYERI
R/ ALPENTIN 100 mg KAP NO LX
S 2 dd 1 Caps pc Po NYERI SYARAF

Nama : [redacted]
Umur : 75 thn 9 bln 2 hr
Berat Badan : 63 Kg

		Natrium Diklofenak 50mg Alpentin 100mg
Bentuk sed. :	Ada	Alprazolam tab Betahistine tab Glimepiride tab Glucosamine tab Analsik tab Natrium Diklofenak tab Alpentin kapsul
Jumlah obat :	Ada	Alprazolam 5mg 20 tablet Betahistine 6mg 10 tablet Glimepiride 2mg 30 tablet Glucosamine 500mg 10 tablet Analsik 5 tablet Natrium Diklofenak 50mg 20 tablet Alpentin 100mg 60 tablet
Duplikasi terapi :	Ada	Analsik dan na diklofenak sebagai analgesik
Aturan pakai :	Ada	Alprazolam S 1 dd 1 tab pc po malam Betahistine S 3 dd1 tab pc po kp pusing Glimepiride S 1 dd1 tab ac po diabet Glucosamine S 2 dd 1 tab sendi Analsik S 2 dd1 tab pc po kp nyeri Natrium Diklofenak S 2 dd1 tab kp nyeri Alpentin S 2 dd 1 caps pc po nyeri syaraf
Tanggal penulisan resep :	Ada	12-2-2025
Nama dokter :	Ada	dr Roxantin Utami, Sp. S
Surat ijin :	Ada	500.16.7.2/2505/B/IP.DS/436.7.15/2024
Alamat dr. :	Tidak Ada	-

b. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Alprazolam 5mg 20 tablet Betahistine 6mg 10 tablet Glimepiride 2mg 30 tablet Glucosamine 500mg 10 tablet

Analsik 5 tablet
Natrium Diklofenak 50mg 20 tablet
Alpentin 100mg 60 tablet

c. Perhitungan biaya resep

Alprazolam 5mg : 52000
Betahistine 6mg : 10000
Glimepiride 2mg: 18000
Glucosamine 500mg: 24000
Analsik: 12500
Natrium Diklofenak 50mg: 10000
Alpentin 100mg: 288000
Embalase: 1000
Total: 415500

d. ETIKET

12-02-2025
Nama : Ny. C
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Alprazolam 5mg
Sehari 1 kali 1 tab
Sesudah makan - malam

12-02-2025
Nama : Ny. C
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Betahistine 6mg
Sehari 3 kali 1 tab
Sesudah makan
Bila pusing

12-02-2025
Nama : Ny. C
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Glimepiride 2 mg
Sehari 1 kali 1 tab
Sebelum makan

12-02-2025
Nama : Ny. C
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Gucosamine 500mg
Sehari 2 kali 1
Sesudah makan

12-02-2025
Nama : Ny. C
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
analsik
sehari 2 kali 1
Sesudah makan
Bila nyeri

12-02-2025
Nama : Ny. C
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Na diklofenak 50mg
Sehari 2 kali 1 tab
Sesudah makan
Bila nyeri

12-02-2025
Nama : Ny. C
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Alpentin 100mg
Sehari 2 kali 1 kaps
Sesudah makan

e. *Product knowledge*

Nama Obat : Alprazolam 0,5mg Kandungan : Alprazolam 0,5mg Indikasi Pengobatan jangka pendek, ansietas sedang atau berat dan ansietas yang berhubungan dengan depresi. Kontraindikasi Pasien yang hipersensitif terhadap golongan benzodiazepin. Glaukoma sudut sempit akut. Miastenia gravis, insufisiensi pulmonar akut, kondisi fobia dan obsesi psikosis kronik, anak dan bayi prematur. Efek Samping Mengantuk, kelemahan otot, ataksia, amnesia, depresi, light-headedness, bingung, halusinasi, pandangan kabur. Jarang terjadi: nyeri kepala, insomnia, reaksi paradoksikal, tremor, hipotensi, gangguan gastrointestinal, rash, perubahan libido,	Nama Obat : Betahistine 6mg Kandungan : Betahistine 6mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: antivertigo Kategori: Sistem Saraf Pusat Dosis: Dewasa 1-2 kaplet 3 x perhari. Penyajian: Sebaiknya diberikan bersama makanan. Cara Penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari Perhatian: Asma, tukak peptik yang sudah ada atau pernah terjadi. Hamil & laktasi. Efek Samping: Gangguan Gastro Intestinal, sakit kepala, ruam kulit, pruritus.

		menstruasi tidak teratur, retensi urin, diskrasia darah dan ikterus. Dosis Dewasa: 0,25-0,5 mg, 3 kali sehari. Jika perlu dosis dapat dinaikkan dengan interval 3-4 hari hingga maksimum 4 mg sehari dalam dosis terbagi. Untuk pasien lanjut usia, debil (lemah) dan gangguan fungsi hati berat: 0,25 mg, 2-3 kali sehari, ditingkatkan bertahap jika perlu. Cara Penyimpanan Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya.	
		Nama Obat : Glimepiride 2mg Kandungan : Glimepiride 2mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: terapi diabetes tipe 2 dimana kadar gula darah tidak dapat dikontrol dengan diet dan olahraga Kategori: Sistem Endokrin dan Metabolik Dosis: 1x3 Sehari Penyajian: segera sebelum makan Cara Penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari Perhatian: hipersensitif terhadap glimepirid, pasien ketoasidosis dengan atau tanpa koma Efek Samping: hipoglikemia, gangguan penglihatan, mual, muntah, nyeri perut, diare, kelainan darah, reaksi alergi atau pseudoalergi	Nama Obat : Glucosamine 500mg Kandungan : Glucosamine 500mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: memelihara kesehatan persendian Kategori: Sistem Muskuloskeletal Dosis: 1x1 Sehari Penyajian: sesudah makan Cara Penyimpanan: Simpan pada suhu 30 derajad Celcius, terhindar drai cahaya matahari secara langsung. Perhatian: hipersensitif terhadap bahan aktif obat, Pasien dengan / toleransi glukosa terganggu, DM tidak terkontrol, risiko penyakit CV, asma. Kehamilan dan menyusui. Efek Samping: Eksaserbasi asma, hiperkolesterolemia, peningkatan resistensi insulin. Sakit kepala, kelelahan, kantuk. Mulas, perut kembung, sakit perut, diare, sembelit, dispepsia. Pruritus, ruam, angioedema, urtikaria.
		Nama Obat : Analsik Kandungan : Metamphyrone 500mg, Diazepam 2mg Golongan: Psikotropika Kategori Obat: Obat Anti-inflamasi Nonsteroid Dikonsumsi oleh: Dewasa	Nama Obat : Natrium Diklofenak 50mg Kandungan : Natrium Diklofenak 50mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: pengobatan akut dan kronis gejala-gejala reumatoid artritis, osteoartritis dan ankilosing spondilitis

		Bentuk obat: Kaplet Salut Selaput Analsik untuk ibu hamil dan menyusui: Kategori D: ada bukti bahwa berisiko. Segera konsultasikan pada dokter apabila ingin mengonsumsi obat ini. Dosis: Dewasa: 1 kaplet, bila nyeri berlanjut minum 1 kaplet setiap 6-8 jam sehari. Dosis maksimal adalah 4 kaplet per hari. Anak: konsultasikan kepada dokter terlebih dahulu. Peringatan Menyusui: Belum ada penelitian yang memadai mengenai risiko mengonsumsi Analsik pada Ibu menyusui. Selalu konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi obat ini. Cara Penyimpanan: Simpan obat Analsik pada suhu di bawah 30 derajat Celsius, di tempat kering dan sejuk.	Kategori: Sistem Saraf Pusat Dosis: osteoartritis : 2-3 kali sehari 50 mg , reumatoid artritis : 3-4 kali sehari 50 mg, ankilosing spondilitis : 4 kali sehari 25 mg Penyajian: sesudah makan , sebelum makan, sebelum tidur. Cara Penyimpanan: Simpan di tempat yang sejuk dan kering, serta terlindung dari panas dan sinar matahari langsung Perhatian: penderita yang hipersensitif terhadap diklofenac atau menderita asma, urtikaria, penderita tukak lambung. Efek Samping: nyeri kram perut, sakit kepala, retensi cairan, diare mual, konstipasi,flatulen kelainan pada fungsi hati indigesti, tukak lambung,ruam tinnitus
		Nama Obat : Alpentin 100mg Kandungan : Alpentin 100mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: terapi tambahan terhadap obat anti epilepsi standard yang tidak dapat dikendalikan serangannnya serta untuk pengobatan nyeri neuropati Kategori: Sistem Saraf Pusat Dosis: dewasa & anak > 12 tahun 900-1800 mg/hr. hari ke-1: 300 mg 1x sehari. Hari ke-2 300 mg 2x sehari. Hari ke-3 300 mg 3x sehari. Selanjutnya, dosis dapat ditingkatkan s/d 1200 mg/hr diberikan dalam 3 dosis terbagi. Peningkatan dosis lebih lanjut dapat dilakukan Penyajian: sesudah makan Cara Penyimpanan: Simpan ditempat sejuk	

		dan kering, terlindung dari cahaya matahari Perhatian: hamil, laktasi, anak < 12 thn Efek Samping: pusing, lelah, sakit kepala, tremor, rhinitis, mual, muntah		

f. Tahap pembuatan

1. Melakukan skrining resep
2. Mengecek kesetersediaan obat
3. Menghitung harga obat dan embalase
4. Mengambil obat alprazolam 5mg 20 tab, betahistine 6mg 10 tab, glimepiride 2mg 30 tab, glucosamine 500mg 10 tab, analsik 5 tab, na diklofenak 50mg 20 tab, alpentin 100mg 60 tab di rak masing-masing
5. Menulis etiket alprazolam sehari 1 kali 1 tab sesudah makan waktu malam, betahistine sehari 3 kali 1 tab bila pusing, glimepiride sehari 1 kali 1 tab sebelum makan, glucosamine sehari 2 kali 1 tab sesudah makan, analsik sehari 2 kali 1 tab bila nyeri, na diklofenak sehari 2 kali 1 tab bila nyeri, alpentin sehari 2 kali 1 kapsul sesudah makan
6. Memasukkan obat & etiket kedalam plastik klip
7. Dilakukan KIE oleh apoteker


g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

A = Apoteker
P = Pasien

A : Atas nama Ny. C dari poli syaraf
P : Iya, saya.
A : Boleh disebutkan tanggal lahir dan alamatnya Pak?
P : dd-mm-yyyy, jalan xxx
A : Baik, ini ibu mendapatkan obat alprazolam sehari 1 kali 1 tab sesudah makan waktu malam, betahistine sehari 3 kali 1 tab bila pusing, glimepiride sehari 1 kali 1 tab sebelum makan, glucosamine sehari 2 kali 1 tab sesudah makan, analsik sehari 2 kali 1 tab bila nyeri, na diklofenak sehari 2 kali 1 tab bila nyeri, alpentin sehari 2 kali 1 kapsul sesudah makan. Apakah sudah paham bu?
P : Oh, begitu. Iya mbak, terima kasih.
A : Sama-sama bu, semoga lekas sembuh.

7.

Jenis Resep : Resep asli (Obat mata)
Resep obat : Non racikan
Jumlah obat dalam resep : 1
Pengulangan resep : Neiter
Tempel Resep/salin resep disini!



RUMAH SAKIT ISLAM DARUS SYIFA' SURABAYA
Jl. Raya Benowo No.5, Benowo, Kec. Pakal, Kota Surabaya
Telp. (031) 7406293, Fax. (031) 7422842

Dokter : dr. ULULIL CHUSAIDA WANUDYAHATI, Sp.M
SIP/SIK Dokter : 503.446/674/B/IP.DS/436.7.15/2022
Poli / Ruang : Poli Spesialis Mata
Riwayat Alergi : Ada, Tidak ada

Surabaya, 13-02-2025

R/ POLIDEMISIN NO I
S 4 dd 1 od

Nama : [redacted]
Umur : 63 thn 12 bln 2 hr
Berat Badan : Kg
Alamat : TAMBAK DONO RT02 RW07
No. RM : 287980
Penjamin : BPJS

a. Skrinning Administrasi

Nama Pasien :	Ada	Tn. D
Umur pasien :	Ada	63 Th
Berat Badan :	Tidak Ada	-
Nama Obat :	Ada	Polidemisin
Kekuatan :	Tidak Ada	-
Bentuk sed. :	Ada	Tetes Mata
Jumlah obat :	Ada	1 tube
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada	Sehari 4 kali 1 tetes di mata kanan
Tanggal penulisan resep :	Ada	13-2-2025
Nama dokter :	Ada	dr Ululil Chusaida Wanudyahati, Sp. M
Surat ijin :	Ada	503.446/674/B/IP.DS/436.7.15/2022
Alamat dr. :	Tidak Ada	-

b. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Polidemisin 1 tube

c. Perhitungan biaya resep

Polidemisin : 45000
Embalase: 1000
Total: 46000

d. ETIKET

Etiket biru

13-2-2025
Nama : Tn. D
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Polidemisin
Sehari 4 kali 1 tetes
di mata kanan

e. *Product knowledge*

Nama Obat : Polidemisin Kandungan : neomisin 3,5 mg, polimiksin B-sulfat 6,000iu, deksametason 1mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: mengobati peradangan pada mata yang disertai infeksi bakteri Kategori: Mata Dosis: 4-6 x sehari 1 atau 2 tetes pada mata yang terinfeksi Perhatian: hipersensitif, epithelial herpes simplek, cacar sapi, cacar air, penyakit jamur pada mata Efek Samping: sensitasi konjungtiva	

f. Tahap pembuatan

1. Melakukan skrining resep Tn. D
2. Mengecek kesetersediaan obat
3. Menghitung harga obat dan embalase
4. Mengambil polidemisin tetes mata 1 tube di rak obat tetes mata
5. Menulis etiket polidemisin sehari 4 kali 1 tetes di mata kanan
6. Memasukkan obat & etiket kedalam plastik klip
7. KIE


g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

A = Apoteker
P = Pasien

A : Atas nama Tn. D dari Poli Spesialis Mata
P : Iya, saya.
A : Boleh disebutkan tanggal lahir dan alamatnya Pak?
P : dd-mm-yyyy, jalan xxx
A : Baik, ini bapak mendapatkan obat tetes mata polidemisin sehari 4 kali 1 tetes di mata kanan. Apakah sudah paham bapak?
P : Oh, begitu. Iya mbak, terima kasih.
A : Sama-sama pak, semoga lekas sembuh.

8.

Jenis Resep : Resep asli (Obat kulit)
Resep obat : Non racikan
Jumlah obat dalam resep : 6
Pengulangan resep : Neiter
Tempel Resep/salin resep disini!



RUMAH SAKIT ISLAM DARUS SYIFA` SURABAYA
Jl. Raya Benowo No.5, Benowo, Kec. Pakal, Kota Surabaya
Telp. (031) 7406293, Fax. (031) 7422842

Dokter : dr. Febrian Renatasari, Sp.D.V.E
SIP/SIK Dokter : 500.1.17.2/3972/B/IP.DS/436.7.15/2023
Poli / Ruang : Poli Spesialis Kulit Kelamin
Riwayat Alergi : Ada, tidak ada

Surabaya, 11-02-2025

R| HISTAPAN TAB NO XV
S 3 dd 1 rutin
R| KALIUM DIKLOFENAK 50 mg TAB NO X
S 2 dd 1 Tab pc Po pagi malam
R| CEFIXIM 100 mg KAP NO X
S 2 dd 1 Caps pc Po pagi malam
R| INFUS NACL 500 ml NO I
S 3 kompres
R| KASA STERIL ISI 10 NO II
S
R| FUSIBAT 10 Gr Cr NO I
S 3 Tube sue Sue oles tipis

Nama : TASYA AULIA HADIYANTO
Umur : 13 thn 2 bln 22 hr
Berat Badan : 50 Kg
Alamat : BENOWO SAWAH IV NO 29

a. Skrinning Administrasi

Nama Pasien :	Ada	Tn. E
Umur pasien :	Ada	13 Th
Berat Badan :	Ada	50 kg
Nama Obat :	Ada	Histapan Kalium diklofenak Cefixim Infus NACL Kasa Steril Fusibat cr
Kekuatan :	Ada	Histapan - Kalium diklofenak 50mg Cefixim 100mg Infus NACL 500ml Kasa Steril - Fusibat 10g
Bentuk sed. :	Ada	Histapan tablet Kalium diklofenak tablet Cefixim 100mg tablet NACL infus Kasa Steril Fusibat cream
Jumlah obat :	Ada	Histapan 8 tablet Kalium diklofenak 5 tablet Cefixim 5 tablet Infus NACL 500ml 1 botol Kasa Steril 1 pack Fusibat 10g cream 1 tube
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada	Histapan tab S 3 dd 1 rutin Kalium diklofenak 50mg tab S 2dd1 pc Cefixim 100mg tab S 2dd1 caps pc Infus NACL 500ml S 3 kompres Kasa Steril - Fusibat 10g cream S 3 SUE oles tipis

Tanggal penulisan resep :	Ada	11-2-2025
Nama dokter :	Ada	dr. Febrian Renatarasari, Sp. D.V.E
Surat ijin :	Tidak Ada	500.1.17.2/3972/B/IP.DS/436.7.15/2023
Alamat dr. :	Tidak Ada	-

b. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Histapan 8 tablet
Kalium diklofenak 5 tablet
Cefixim 5 tablet
Infus NACL 500ml 1 botol
Kasa Steril 1 pack
Fusibat 10g cream 1 tube

c. Perhitungan biaya resep

Histapan tab: 8000
Kalium diklofenak 50mg tab: 5500
Cefixim 100mg tab: 6500
Infus NACL 500ml: 17000
Kasa Steril: 16000
Fusibat 10g cream: 130000
Embalase: 1000
Total: 184000

d. ETIKET

11-02-2025
Nama : Tn. E
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Histapan tab
Sehari 3 kali 1 tab
Sesudah makan
rutin

11-02-2025
Nama : Tn. E
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Kalium diklofenak 50mg
Sehari 2 kali 1 tab
Sesudah makan

11-02-2025
Nama : Tn. E
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Cefixime 100mg
Sehari 2 kali 1 tab
Sesudah makan

11-02-2025
Nama : Tn. E
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Infus NACL

kompres

11-02-2025
Nama : Tn. E
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Kassa steril

11-02-2025
Nama : Tn. E
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Fusibat Cr 10g
Sehari 3 kali oles tipis

OBAT LUAR

e. *Product knowledge*


Nama Obat : Histapan tab Kandungan : Mebhidrolin Napadisilat Indikasi / Manfaat / Kegunaan: Histapan digunakan untuk pengobatan terhadap penyakit alergi. Kategori: Alergi dan Sistem Imun Dosis: Dewasa : 100 mg – 300 mg sehari dalam dosis terbagi. Anak-anak 6 – 12 tahun : 100 mg – 200 mg sehari dalam dosis terbagi. Atau menurut petunjuk dokter Perhatian: Mengurangi kesadaran, disarankan untuk tidak berkendara setelah konsumsi obat tersebut	Nama Obat : Kalium diklofenak 50mg Kandungan : Kalium diklofenak 50mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: sebagai pengobatan jangka pendek untuk kondisi-kondisi akut sebagai berikut: nyeri inflamasi setelah trauma, seperti karena terkilir, nyeri dan inflamasi setelah operasi seperti operasi gigi atau tulang Kategori: Sistem Saraf Pusat Dosis: dewasa: dosis awal 100-150 mg sehari, dosis terbagi 2-3 kali Penyajian: sesudah makan Cara Penyimpanan: simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung Perhatian: tukak lambung, hipersensitif terhadap zat aktif

			Efek Samping: gangguan saluran pencernaan, gangguan susunan saraf, gangguan kulit, gangguan sistem urogenital, gangguan hati, gangguan darah, gangguan hipersensitivitas, gangguan susunan organ lainnya
		Nama Obat : Cefixim 100mg tab Kandungan : Cefixim 100mg tab Indikasi / Manfaat / Kegunaan: Pengobatan infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme antara lain infeksi saluran kemih tanpa komplikasi yang disebabkan oleh escerichia colli dan proteus mirabilis, otitis media, faringitis dan tonsilitis, bronkitis akut dan bronkitis kronik. Kategori: Anti Infeksi (Sistemik) Dosis: Infeksi yang rentan Dewasa: 200-400 mg setiap hari diberikan sebagai dosis tunggal atau dalam 2 dosis terbagi selama 7 hari, dapat dilanjutkan hingga 14 hari jika perlu, tergantung pada tingkat keparahan infeksi. Anak: >6 bulan sampai <10 tahun dengan berat badan <50 kg: 8 mg/kg setiap hari sebagai dosis tunggal atau dalam 2 dosis terbagi; >10 tahun dengan berat >50 kg: Sama dengan dosis dewasa. Penyajian: Dapat diberikan dengan atau tanpa makanan. Cara Penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari. Perhatian: Pasien dengan riwayat alergi terhadap kandungan obat ini. Efek Samping: Diare, sakit perut, dispepsia, perut kembung, mual, muntah.	Nama Obat : Infus NACL 500ml Kandungan : Per ml : NaCl 0.9 % **Indikasi Umum:** Mengembalikan keseimbangan elektrolit pada keadaan dehidrasi. **Dosis:** Sebagai pengganti cairan atau elektolit tubuh: - Dosis, kecepatan infus, dan durasi pemberian bersifat individual berdasarkan kondisi tiap pasien. Kondisi seperti usia, berat badan, dan hasil laboratorium pasien. **Aturan Pakai:** Sesuai dengan petunjuk dokter **Perhatian:** Hati-hati pengunaan pada pasien hipertensi, gagal jantung kongestif, oedema perifer dan pulmonal, gangguan fungsi ginjal, pra-eklamsia, pasien anak-anak dan orang tua. Hati-hati pemberian pada pasien yang menerima kortikosteroid atau kortikotropin. Selalu periksa kecocokan obat tambahan dengan larutan ini sebelum digunakan. Simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. **Kontra Indikasi:** Kondisi dimana pemberian natrium klorida dapat membahayakan. Gagal Jantung Kongestif. **Efek Samping:** Pemakaian obat umumnya memiliki efek samping tertentu dan sesuai dengan masing-masing individu. Jika terjadi efek samping yang berlebih dan berbahaya,

				harap konsultasikan kepada tenaga medis. Efek samping yang mungkin terjadi dalam penggunaan obat adalah: Pembengkakan terutama pada kaki, hipernatremia, rasa haus, demam, takikardi, hipertensi, sakit kepala, pusing, rasa kelelahan, iritabilitas, mulut kering, infeksi pada daerah penyuntikan.
			Nama Obat : Kasa Steril Kandungan : Kasa Steril **Indikasi Umum:** Kasa steril ini digunakan untuk operasi besar/kecil, khitan, penutup luka, dan bebat pusar bayi. **Dosis:** Sesuai kebutuhan **Aturan Pakai:** Bersihkan luka dari kotoran, bakteri dan partikel untuk mencegah infeksi. Keringkan kulit sekitar luka dengan lembut. Tutup luka dari kotoran dan bakteri menggunakan Kasa Steril. **Golongan Produk:** Alat Kesehatan & Medis Habis Pakai	Nama Obat : Fusibat 10g cream Kandungan : Tiap 1 gram cream mengandung asam fusidat 20 mg **Indikasi Umum:** Infeksi kulit karena Staphilococcus, Streptococcus, Propionibacterium acnes, Corynebacterium minutissimum **Dosis:** Gunakan pada area yang terinfeksi 2-3 kali sehari **Aturan Pakai:** Krim dioleskan pada area kulit yang sakit. **Perhatian:** Dapat menyebabkan iritasi, reaksi alergi. Resistensi dapat terjadi pada penggunaan jangka lama. Hamil dan laktasi **Kontra Indikasi:** Infeksi karena Pseudomonas aeruginosa **Efek Samping:** Rasa nyeri tersengat, iritasi kulit, ruam kulit dan urtikaria

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>f. Tahap pembuatan
1. Melakukan skrining resep
2. Mengecek kesetersediaan obat
3. Menghitung harga obat dan embalase
4. Mengambil obat Histapan 8 tablet Kalium diklofenak 5 tablet Cefixim 5 tablet Infus NACL 500ml 1 botol Kasa Steril 1 pack Fusibat 10g cream 1 tube di rak masing-masing
5. Menulis etiket Histapan tab S 3 dd 1 rutin Kalium diklofenak 50mg tab S 2dd1 pc Cefixim 100mg tab S 2dd1 caps pc Infus NACL 500ml S 3 kompres Kasa Steril - Fusibat 10g cream S 3 SUE oles tipis
6. Memasukkan obat & etiket kedalam plastik
7. Dilakukan KIE oleh apoteker

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)
A = Apoteker
P = Pasien
A : Atas nama Tn. E dari poli kulit kelamin
P : Iya, saya.
A : Boleh disebutkan tanggal lahir dan alamatnya Pak?
P : dd-mm-yyyy, jalan xxx
A : Baik, ini bapak mendapatkan obat Histapan Sehari 3 kali 1 tablet sesudah makan rutin untuk alergi, Kalium diklofenak 50mg Sehari 2 kali 1 tablet sesudah makan untuk nyeri, Cefixim 100mg Sehari 2 kali 1 kapsul sesudah makan untuk antibiotik, Infus NACL 500ml Sehari 3 kali untuk kompres, Kasa Steril, Fusibat 10g cream Sehari 3 kali oles tipis. Apakah sudah paham bapak?
P : Oh, begitu. Iya mbak, terima kasih.
A : Sama-sama pak, semoga lekas sembuh.</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>Jenis Resep : Resep asli (Sediaan inhaler)
Resep obat : Non racikan
Jumlah obat dalam resep : 1
Pengulangan resep : Neiter
Tempel Resep/salin resep disini!</td>
<td>a. Skrinning Administrasi
<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada</td><td>Tn. F</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada</td><td>37 Th</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada</td><td>Seretide diskus</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>



RUMAH SAKIT ISLAM DARUS SYIFA` SU
Jl. Raya Benowo No.5, Benowo, Kec. Pakal, K
Telp. (031) 7406293, Fax. (031) 742

Dokter : dr. WINARIANI KOESOEMOPRODJO, Sp.P
SIP/SIK Dokter : 503.446/1596/B/IP.DS/436.7.15/2022
Poli / Ruang : Poli Spesialis Paru-Paru
Riwayat Alergi : Ada, dexamethason

Surabaya, 19-03-2025

[redacted]

R/ SERETIDE DISKUS 250 NO I
S 2 dd 1

Nama : [redacted]
Umur : 37 thn 9 bln 2 hr
Berat Badan : - Kg
Alamat : [redacted]
No. RM : [redacted]
Penjamin : BPJS

Kekuatan :	Ada	250mcg
Bentuk sed. :	Ada	inhaler
Jumlah obat :	Ada	1 item
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada	Sehari 2 kali 1
Tanggal penulisan resep :	Ada	19-3-2025
Nama dokter :	Ada	dr Winariani Koesoemoprodjo, Sp. P
Surat ijin :	Ada	503.446/IP.DS/436.7.15/2022
Alamat dr. :	Tidak Ada	-

b. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Seretide diskus 250mcg 1 item

c. Perhitungan biaya resep

Seretide diskus 250mcg: 460.000
Embalase: 1000
Total: 461.000

d. ETIKET

Etiket biru

19-03-2025
Nama : Tn. F
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Seretide diskus 250mcg
Sehari 2 kali 1

e. *Product knowledge*

Nama Obat : Seretide diskus 200mcg Kandungan : salmeterol sinapoat 50 mg, flutikason propionat 250 mcg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: untuk terapi rutin penyakit penyumbatan saluran nafas, termasuk asma	

Kategori: Sistem Pernapasan Dosis: > 2 th, sehari 2x1 hirup Penyajian: dihirup Cara Penyimpanan: simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung Efek Samping: sakit kepala, jamur pada mulut, iritasi tenggorokan, tremor/gemetar, jantung berdebar, gangguan suara (serak), kram otot			

f. Tahap pembuatan

1. Melakukan skrining resep Tn. F
2. Mengecek kesetersediaan obat
3. Menghitung harga obat dan embalase
4. Mengambil seretide diskus 250mcg di rak inhaler
5. Menulis etiket biru seretide diskus 250mcg sehari 2 kali 1
6. Memasukkan obat & etiket kedalam plastik klip
7. Dilakukan KIE oleh apoteker


g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

A = Apoteker
P = Pasien

A : Atas nama Tuan F dari poli paru-paru
P : Iya, saya.
A : Boleh disebutkan tanggal lahir dan alamatnya Pak?
P : dd-mm-yyyy, jalan xxx
A : Baik, ini bapak mendapatkan obat inhaler seretide diskus sehari 2 kali 1 hirup, caranya buka penutup lalu dorong tuas, letakkan tegak lurus ke arah mulut, lalu hirup dalam-dalam dan tahan napas selama 10 detik, lalu lepaskan napas perlahan. Apakah sudah paham bapak?
P : Oh, begitu. Iya mbak, terima kasih.

*10.

Jenis Resep : Resep asli (KB)
Resep obat : Non racikan
Jumlah obat dalam resep : 1
Pengulangan resep : Neiter
Tempel Resep/salin resep disini!


dr. Defita Ratna Wati
Jl. KH Hasyim Asy'ari No.21 Sukodono Gresik
SIP : 446/317/437.52/2024

15/3/25

R/ Inj ... no. I

Jm

Pro : [redacted]

Umur : 34 th

Alamat : Jl. ... XC

a. Skrinning Administrasi

Nama Pasien :	Ada	Ny. D
Umur pasien :	Ada	34 Th
Berat Badan :	Tidak Ada	-
Nama Obat :	Ada	Cyclofem injeksi
Kekuatan :	Tidak Ada	-
Bentuk sed. :	Ada	Injeksi
Jumlah obat :	Ada	1
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada	1 bulan sekali
Tanggal penulisan resep :	Ada	19-3-2025
Nama dokter :	Ada	dr Defita Ratna Wati
Surat ijin :	Ada	446/317/437.52/2024
Alamat dr. :	Ada	Jl. KH Hasyim Asy'ari No. 21 Sukodono, Gresik

b. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Inj Cyclofem 1 ampul

c. Perhitungan biaya resep

Inj Cyclofem: 15000
Embalase: 1000
Total: 16000

d. ETIKET

Etiket biru

19-3-2025
Nama : Ny. D
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Cyclofem Inj

e. *Product knowledge*


Nama Obat : Inj Cyclofem Kandungan : Kegunaan: sebagai alat kontrasepsi untuk mencegah atau menunda kehamilan. • Dosis dan Aturan Pakai: Suntikan pertama harus diberikan dalam 5 hari pertama haid • Suntikan berulang harus diberikan tiap bulan dengan jarak 28 ± 3 hari • Obat disuntikkan melalui injeksi intramuskular (injeksi ke dalam otot tubuh) Tujuan: Kontrasepsi untuk mencegah atau menunda kehamilan Cara Penyimpanan: Simpan pada suhu ruang, di tempat yang kering dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Efek Samping: Cyclofem yang mungkin terjadi antara lain: Mual Sakit kepala Nyeri dada Berat badan naik Perdarahan endometrium	

f. Tahap pembuatan

1. Melakukan skrining resep Ny. D
2. Mengecek kesetersediaan obat
3. Menghitung harga obat dan embalase
4. Mengambil cyclofem inj 1 ampul di rak injeksi KB
5. Menulis etiket biru inj cyclofem
6. Memasukkan obat & etiket kedalam plastik klip
7. Dilakukan KIE oleh apoteker

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

A = Apoteker
P = Pasien

A : Atas nama Ny. B
P : Iya, saya.
A : Boleh disebutkan tanggal lahir dan alamatnya Pak?
P : dd-mm-yyyy, jalan xxx
A : Baik, ini ibu mendapatkan injeksi cyclofem untuk KB selama 1 bulan, bisa disuntikkan dengan bantuan perawat. Apakah sudah paham bu?
P : Oh, begitu. Iya mbak, terima kasih.
A : Sama-sama bu.</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>Jenis Resep : Resep asli (Sediaan insulin)
Resep obat : Non racikan
Jumlah obat dalam resep : 2
Pengulangan resep : Neiter
Tempel Resep/salin resep disini!
 
</td>
<td>c. Skrinning Administrasi
<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada</td><td>Ny. E</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada</td><td>57 Th</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada</td><td>69 kg</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada</td><td>Novorapid
Lantus</td></tr>
<tr><td>Kekuatan :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada</td><td>Novorapid pen
Lantus pen</td></tr>
<tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada</td><td>Novorapid 2 pen
Lantus 1 pen</td></tr>
<tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Tidak Ada</td><td>Novorapid dan Lantus sebagai terapi insulin</td></tr>
<tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada</td><td>Novorapid S 3dd 6 units ac
Lantus S 1 dd 8 units malam</td></tr>
<tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada</td><td>12-2-2025</td></tr>
<tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada</td><td>dr. Umar Nur Rachman, Sp.PD</td></tr>
<tr><td>Surat ijin :</td><td>Ada</td><td>503.446/861/B/IP.DS/436.7.17/2021</td></tr>
<tr><td>Alamat dr. :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>

d. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Novorapid 2 pen Lantus 1 pen

c. Perhitungan biaya resep

Novorapid: 320000 Lantus: 372000 Embalase: 1000 Total: 693000

d. ETIKET

12-02-2025 Nama : Ny. E No. RM : xxxxxx Tgl Lahir : dd-mm-yyyy Novorapid Sehari 3 kali 6 units Sebelum makan	12-02-2025 Nama : Ny. E No. RM : xxxxxx Tgl Lahir : dd-mm-yyyy Lantus Sehari 1 kali 8 units malam

e. *Product knowledge*


Nama Obat : Novorapid pen inj Kandungan : insulin aspart 100 IU/ml Indikasi / Manfaat / Kegunaan: pengobatan iddm tipe 1 dan 2, pada orang dewasa, remaja, dan anak-anak 6 tahun ke atas Kategori: Sistem Endokrin dan Metabolik Dosis: 1x1 Sehari Penyajian: sesudah makan, suntikkan secara sub kutan (di bawah kulit) Perhatian: Penyakit / obat yang dapat memperlambat absorpsi makanan dan atau meningkatkan kebutuhan insulin. Pengurangan jadwal makan, aktivitas fisik yang berat. Preparat yang mengandung metacresol yang dapat menyebabkan reaksi alergi.	Nama Obat : Lantus pen inj Kandungan : insulin glargin 100 iu/ml Indikasi / Manfaat / Kegunaan: pengobatan iddm tipe 1 dan 2, pada orang dewasa, remaja, dan anak-anak 6 tahun ke atas Kategori: Sistem Endokrin dan Metabolik Dosis: 1x1 Sehari Penyajian: sesudah makan, suntikkan secara sub kutan (di bawah kulit) Cara Penyimpanan: Simpan pada suhu kulkas Perhatian: hipersensitifitas Efek Samping: hipoglikemia, kerusakan penglihatan sementara, lipoatrofi, atau lipohipertofi, reaksi pada tempat penyuntikan, jarang reaksi alergi yang

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>Efek Samping: Hipoglikemia</td><td>parah, edema, bronkospasme, hipotensi dan syok</td></tr>
</table>

f. Tahap pembuatan

Melakukan skrining resep
Mengecek kesetersediaan obat
Menghitung harga obat dan embalase
Mengambil novorapid pen 1 dan lantus pen 1 di rak/kulkas insulin
Menulis etiket Novorapid Sehari 3 kali 6 units sebelum makan dan Lantus Sehari 1 kali 8 units malam
Memasukkan obat & etiket kedalam plastik
Dilakukan KIE oleh apoteker

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)
A = Apoteker
P = Pasien
A : Atas nama Ny. E dari poli penyakit dalam.
P : Iya, saya.
A : Boleh disebutkan tanggal lahir dan alamatnya bu?
P : dd-mm-yyyy, jalan xxx
A : Baik, ini bapak mendapatkan obat pen insulin Novorapid Sehari 3 kali 6 units sebelum makan dan pen Lantus Sehari 1 kali 8 units pada malam hari, cara diputar tuas pen unit sesuai dosis di etiket lalu disuntikkan di lengan. Apakah sudah paham bu?
P : Oh, begitu. Iya mbak, terima kasih.
</td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
<td>Jenis Resep : Resep asli (Obat kudis/kurap)
Resep obat : Non racikan
Jumlah obat dalam resep : 3
Pengulangan resep : Neiter
Tempel Resep/salin resep disini!</td>
<td>a. Skrinning Administrasi
<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada</td><td>An. A</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada</td><td>5 Th</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada</td><td>20 kg</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada</td><td>Intercon cr 1 tube
Parasol 15 lotion 1 pot
Salep LCD 5 1 pot</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>



RUMAH SAKIT ISLAM DARUS SYIFA' SURABAYA
Jl. Raya Benowo No.5, Benowo, Kec. Pakal, Kota Surabaya
Telp. (031) 7406293, Fax. (031) 7422842

Dokter : dr. Febrian Renatasari, Sp.D.V.E
SIP/SIK Dokter : 500.1.17.2/3972/B/IP.DS/436.7.15/2023
Poli / Ruang : Poli Spesialis Kulit Kelamin
Riwayat Alergi : Tidak Ada

Surabaya, 19-03-2025

R/ INTERCON CR NO I
S
R/ PARASOL 15 LOT NO I
S Tube sue Sue
R/ SALEP LCD 5 NO I
S

[redacted]

Nama [redacted]
Umur : 5 thn 4 bln 2 hr
Berat Badan : 20 Kg
Alamat [redacted]
No. RM [redacted]
Penjamin : UMUM

Kekuatan :	Tidak Ada	-
Bentuk sed. :	Ada	Intercon cream Parasol 15 lotion Salep LCD 5
Jumlah obat :	Ada	Intercon cr 1 tube Parasol 15 lotion 1 pot Salep LCD 5 1 pot
Duplikasi terapi:	Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada	Intercon cr - Parasol 15 lotion S SUE Salep LCD 5 -
Tanggal penulisan resep:	Ada	19-3-2025
Nama dokter :	Ada	dr. Febrian Renatarasari, Sp. D.V.E
Surat ijin :	Ada	500.1.17.2/3972/B/IP.DS/436.7.15/2023
Alamat dr. :	Tidak Ada	-

b. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Intercon cr 1 tube
Parasol 15 lotion 1 pot
Salep LCD 5 1 pot

c. Perhitungan biaya resep

Intercon cr: 162000
Parasol 15 lotion: 90000
Salep LCD 5: 173000
Embalase: 1000
Total: 426000

d. ETIKET

19-03-2025
Nama : An. A
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Intercon Cr

19-03-2025
Nama : An. A
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Parasol 15 lotion
OBAT LUAR

19-03-2025
Nama : An. A
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Salep LCD 5

e. *Product knowledge*


Nama Obat : Intercon CR Kandungan : Mometasone furoate Indikasi / Manfaat / Kegunaan: Meredakan gejala inflamasi dan dermatosis yang reponsif terhadap kortikosteroid, misalnya psoriasis dan dermatitis atopik. Kategori: Kulit Dosis: Oleskan tipis-tipis pada area yang terinfeksi 1 kali sehari. Tidak boleh ditutup kasa pembalut Perhatian: Iritasi atau sensitisasi (hentikan penggunaan). Hamil, anak Efek Samping: Rasa terbakar, pruritus, atrofi kulit	Nama Obat : Parasol 15gram lotion Kandungan : ethylhexyl-methoxycinnamate, titanium dioxide, oxy benzone Indikasi / Manfaat / Kegunaan: Pelindung terhadap paparan sinar matahari Kategori: Kulit Dosis: Oleskan 30 menit sebelum terkena sinar matahari Penyajian: Dioleskan tipis pada kulit yang tidak terlindung pakaian Perhatian: Hipersensitivitas Efek Samping: Hindari kontak dengan mata, mulut dan selaput lendir lain
Nama Obat : Salep LCD 5 Kandungan : coal tar Liquor carbonis detergens (LCD) atau coal tar (tar batubara) adalah obat yang digunakan untuk mengatasi gatal-gatal, kulit bersisik, dan mengelupas karena psoriasis, dermatitis seboroik, hingga dermatitis atopik (eksim). Kandungan batubara dan belerang dalam obat ini bersifat antiseptik. Obat ini akan meredakan masalah kulit dengan cara mencegah pertumbuhan jamur penyebab gatal-gatal. Sementara untuk mengatasi	

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>kulit bersisik dan mengelupas, coal tar akan bekerja dengan cara memperlambat pergantian lapisan epidermis kulit.</td><td></td></tr>
</table>

f. Tahap pembuatan

Melakukan skrining resep An. A
Mengecek kesetersediaan obat
Menghitung harga obat dan embalase
Mengambil Intercon cr 1 tube, Parasol 15 lotion 1 pot, Salep LCD 5 1 pot di rak masing-masing
Menulis etiket Intercon cr SUE, Parasol 15 lotion SUE. Salep LCD 5 SUE
Memasukkan obat & etiket kedalam plastik klip
Dilakukan KIE oleh apoteker

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)
A = Apoteker
P = Pasien
A : Atas nama An. A dari poli kulit kelamin.
P : Iya, saya ibu An. A.
A : Boleh disebutkan tanggal lahir An. A dan alamatnya bu?
P : dd-mm-yyyy, jalan xxx
A : Baik, ini An. A mendapatkan obat Intercon cream untuk kulit alergi dan kemerahan, Parasol 15 lotion untuk pelindung kulit dari sinar matahari, Salep LCD 5 untuk gatal-gatal, semuanya obat luar dioles tipis dikulit. Apakah sudah paham bu?
P : Oh, begitu. Iya mbak, terima kasih.
</td>
</tr>
<tr>
<td>13.</td>
<td>Jenis Resep : Resep asli (Obat saluran cerna)
Resep obat : Non racikan
Jumlah obat dalam resep : 2
Pengulangan resep : Neiter
Tempel Resep/salin resep disini!</td>
<td>a. Skrinning Administrasi
<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada</td><td>Ny. F</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada</td><td>50 Th</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada</td><td>54 kg</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada</td><td>Prorenal</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>



RUMAH SAKIT ISLAM DARUS SYIFA' SU
Jl. Raya Benowo No.5, Benowo, Kec. Pakal, K
Telp. (031) 7406293, Fax. (031) 7422

Dokter : dr. UMAR NUR RACHMAN, Sp.PD
SIP/SIK Dokter : 503.446/861/B/IP.DS/436.7.17/2021
Poli / Ruang : Poli Spesialis Penyakit Dalam
Riwayat Alergi : Ada, Tidak ada

Surabaya, 12-02-2025

R/ PRORENAL TAB NO X 3
S 1 dd 1 Tab pc Po
R/ LANSOPRAZOLE 30 mg KAP NO X
S 1 dd 1 Caps ac Po
[redacted]

Nama : [redacted]
Umur : 50 thn 5 bln 3 hr
Berat Badan : 54 Kg
Alamat : [redacted]
No. RM [redacted]
Penjamin : BPJS

		Lansoprazole
Kekuatan :	Ada	Prorenal - Lansoprazole 30mg
Bentuk sed. :	Ada	Prorenal tablet Lansoprazole kapsul
Jumlah obat :	Ada	Prorenal 3 tablet Lansoprazole 10 kapsul
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada	Prorenal s 1dd1 pc Lansoprazole s 1dd1 caps ac
Tanggal penulisan resep :	Ada	12-2-2025
Nama dokter :	Ada	dr. Umar Nur Rachman, Sp.PD
Surat ijin :	Ada	503.446/861/B/IP.DS/436.7.17/2021
Alamat dr. :	Tidak Ada	-

b. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Prorenal 3 tablet
Lansoprazole 10 tablet

c. Perhitungan biaya resep

Prorenal: 27000
Lansoprazole: 18000
Embalase: 1000
Total: 46000

d. ETIKET

12-02-2025
Nama : Ny. F
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Prorenal tab
Sehari 1 kali 1 tablet
Sesudah makan

12-02-2025
Nama : Ny. F
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Lansoprazole 50mg tab
Sehari 1 kali 1 kapsul
Sebelum makan

e. *Product knowledge*


Nama Obat : Prorenal tab Kandungan : dl-3-metil-2-okso-asam valerianat 67 mg, 4-metil-2-okso-asam valerianat 101 mg, 2-okso-3-fenil-asam propionat 68 mg, l-lisin monoasetat 105 mg, l-treonin 53 mg, l-histidin 38 mg, l-tirosin 30 mg, kandungan nitrogen total 36 mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: terapi insufisiensi ginjal kronik bersama dengan diet tinggi kalori-rendah protein, pada retensi yang terkompensasi atau tidak terkompensasi Kategori: Sistem Kemih Kelamin Dosis: Ginjal kronik : 3x sehari 4-8 tablet. Retensi yang terkompensasi: 3 x sehari 4-6 tablet. Retensi yang terdekompensasi; 3 x sehari 4-8 tablet. Dosis maksimal 50 tablet/hari Penyajian: sewaktu makan Cara Penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari Perhatian: hiperkalsemia, gangguan metabolisme asam amino Efek Samping: hiperkalsemia	Nama Obat : Lansoprazole 30mg kaps Kandungan : Lansoprazole 30mg Kemasan: 1 Dos isi 5 Strip x 10 Tablet Indikasi / Manfaat / Kegunaan: Tukak duodenum dan refluks esofagus, tukak lambung ringan. Kategori: Sistem Gastrointestinal & Hepatobilier Dosis: • Dewasa dan lanjut usia: 30 mg 1xsehari. Lama terapi: tukak duodenum dan refluks esofagitis 4 minggu. tukak lambung ringan 8 minggu. Pasien dengan gangguan hati dan ginjal: dosis maksimal 30 mg sehari. Penyajian: Harus diminum saat perut kosong. Cara Penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung. Perhatian: • Wanita hamil dan menyusui. • Lanjut usia. Efek Samping: Diare, sakit kepala, mual, alegi kulit, nyeri perut, konstipasi, kembung dan muntah.	

f. Tahap pembuatan

1. Melakukan skrining resep
2. Mengecek kesetersediaan obat
3. Menghitung harga obat embalase
4. Mengambil obat Prorenal 3 tablet, Lansoprazole 10 kapsul di rak masing-masing
5. Menulis etiket Prorenal s 1dd1 pc, Lansoprazole s 1dd1 caps ac
6. Memasukkan obat & etiket kedalam plastik klip
7. Dilakukan KIE oleh apoteker

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

A = Apoteker
P = Pasien

A : Atas nama Ny. F dari poli penyakit dalam.
P : Iya, saya.
A : Boleh disebutkan tanggal lahir dan alamatnya bu?
P : dd-mm-yyyy, jalan xxx
A : Baik, ini bu mendapatkan obat Prorenal sehari 1kali 1 tablet sesudah makan untuk gangguan ginjal, dan Lansoprazole sehari 1 kali 1 kapsul sebelum makan untuk penurun asam lambung. Apakah sudah paham bu?
P : Oh, begitu. Iya mbak, terima kasih.
A : Sama-sama pak, semoga lekas sembuh.</td>
</tr>
<tr>
<td>14.</td>
<td>Jenis Resep : Resep asli (obat saluran nafas)
Resep obat : Non racikan
Jumlah obat dalam resep : 1
Pengulangan resep : Neiter
Tempel Resep/salin resep disini!
 
</td>
<td>a. Skrinning Administrasi
<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada</td><td>Tn. G</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada</td><td>37 Th</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada</td><td>Seretide diskus</td></tr>
<tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada</td><td>250mcg</td></tr>
<tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada</td><td>inhaler</td></tr>
<tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada</td><td>1 item</td></tr>
<tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada</td><td>Sehari 2 kali 1</td></tr>
<tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada</td><td>19-3-2025</td></tr>
<tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada</td><td>dr Winariani Koesoemoprodjo, Sp. P</td></tr>
<tr><td>Surat ijin :</td><td>Ada</td><td>503.446/IP.DS/436.7.15/2022</td></tr>
<tr><td>Alamat dr. :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
</table>
b. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi
Seretide diskus 250mcg 1 item

c. Perhitungan biaya resep
Seretide diskus 250mcg: 460.000</td>
</tr>
</table>

Embalase: 1000
Total: 461.000

d. ETIKET


17-02-2025
Nama : Tn. G
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Seretide diskus 250mcg
Sehari 2 kali 1

e. *Product knowledge*

Nama Obat : Seretide diskus 200mcg Kandungan : salmeterol sinapoat 50 mg, flutikason propionat 250 mcg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: untuk terapi rutin penyakit penyumbatan saluran nafas, termasuk asma Kategori: Sistem Pernapasan Dosis: > 2 th, sehari 2x1 hirup Penyajian: dihirup Cara Penyimpanan: simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung Efek Samping: sakit kepala, jamur pada mulut, iritasi tenggorokan, tremor/gemetar, jantung berdebar, gangguan suara (serak), kram otot	

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>f. Tahap pembuatan
1. Melakukan skrining resep Tn. G
2. Mengecek kesetersediaan obat
3. Menghitung harga obat dan embalase
4. Mengambil seretide diskus 250mcg di rak inhaler
5. Menulis etiket biru seretide diskus 250mcg sehari 2 kali 1
6. Memasukkan obat & etiket kedalam plastik klip
7. Dilakukan KIE oleh apoteker

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)
A = Apoteker
P = Pasien
A : Atas nama Tn. E dari poli kulit kelamin
P : Iya, saya.
A : Boleh disebutkan tanggal lahir dan alamatnya Pak?
P : dd-mm-yyyy, jalan xxx
A : Baik, ini bapak mendapatkan obat Histapan Sehari 3 kali 1 tablet sesudah makan rutin untuk alergi, Kalium diklofenak 50mg Sehari 2 kali 1 tablet sesudah makan untuk nyeri, Cefixim 100mg Sehari 2 kali 1 kapsul sesudah makan untuk antibiotik, Infus NACL 500ml Sehari 3 kali untuk kompres, Kasa Steril, Fusibat 10g cream Sehari 3 kali oles tipis. Apakah sudah paham bapak?
P : Oh, begitu. Iya mbak, terima kasih.
A : Sama-sama pak, semoga lekas sembuh.</td>
</tr>
<tr>
<td>15.</td>
<td>Jenis Resep : Resep asli (Racikan anak)
Resep obat : Racikan
Jumlah obat dalam resep : 3
Pengulangan resep : Neiter
Tempel Resep/salin resep disini!</td>
<td>a. Skrinning Administrasi
<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada</td><td>An. B</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada</td><td>2 Th</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada</td><td>12 kg</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada</td><td>Cefat 500mg
Paracetamol 500mg
Mefinall 500mg</td></tr>
<tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada</td><td>Cefat 150mg
Paracetamol 150mg
Mefinall 50mg</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>



RUMAH SAKIT ISLAM DARUS SYIFA' SURABAYA
Jl. Raya Benowo No.5, Benowo, Kec. Pakal, Kota Surabaya
Telp. (031) 7406293, Fax. (031) 7422842

Dokter : dr. VITRI SAKTIWI, Sp.A
SIP/SIK Dokter : 503.446/429/B/IP.DS/436.7.17/2021
Poli / Ruang : Poli Spesialis Anak
Riwayat Alergi : Tidak Ada

Surabaya, 13-03-2025

R/ CEFAT 500 mg KAP 150 mg
Mf da in Pulv dtd NO X
S 2 dd 1

R/ PARACETAMOL 500 mg TAB 150 mg
MEFINAL 500 mg TAB 50 mg
Mf da in Pulv dtd NO X
S 3 dd 1

[redacted]

Nama : [redacted]
Umur : 2 thn 6 bln 9 hr
Berat Badan : 12 Kg
Alamat : [redacted]
No. RM : [redacted]
Penjamin : UMUM

Bentuk sed. :	Ada	Puyer
Jumlah obat :	Ada	Cefat 500mg 1kapsul Paracetamol 500mg 1 tablet Mefinall 500mg 1 tablet
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	Paracetamol dan mefinal sebagai analgesik
Aturan pakai :	Ada	Cefat 500mg S 2dd1 Paracetamol 500mg Mefinall 500mg S 3dd1
Tanggal penulisan resep :	Ada	13-3-2025
Nama dokter :	Ada	dr. Vitri Saktiwi, Sp.A
Surat ijin :	Ada	503.446/429/B/IP.DS/436.7.17/2021
Alamat dr. :	Tidak Ada	-

b. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Cefat 500mg 1kapsul
Paracetamol 500mg 1 tablet
Mefinall 500mg 1 tablet

c. Perhitungan biaya resep

Cefat 500mg: 15000
Paracetamol 500mg: 500
Mefinall 500mg: 2000
Embalase: 1000
Total: 18500

d. ETIKET

13-03-2025
Nama : An. B
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
antibiotik
Sehari 2 kali 1 bungkus
Sesudah makan
Wajib dihabiskan

13-03-2025
Nama : An. B
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
nyeri
sehari 3 kali 1 bungkus
Sesudah makan

e. *Product knowledge*


Nama Obat : Cefat 500mg Kandungan : cefadroxil 500 mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: infeksi saluran pernafasan, infeksi kulit dan jaringan lunak, infeksi saluran kemih, osteomielitis dan septik artritis Kategori: Anti Infeksi (Sistemik) Dosis: 2 kali sehari 1 kapsul, atau bisa dosis tunggal 1000mg sekali minum per hari Penyajian: sebelum / sesudah makan, dihabiskan Cara Penyimpanan: simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung Perhatian: hipersensitifitas terhadap cephalosporin. Efek Samping: mual, muntah, diare, ruam urtikaria, pruritis, genital pruritus, genital moniliasis, vaginitis	Nama Obat : Paracetamol 500mg Kandungan : Paracetamol 500mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: Analgesik dan antipiretik Kategori: Sistem Saraf Pusat Dosis: Anak 1-5 tahun: 3-4 x sehari 1-4-1/2 tablet. Anak 6-12 tahun: 3-4 x sehari 1/2-1 tablet. Anak 13 tahun-dewasa: 3-4 x sehari 1-2 tablet. Cara Penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari Perhatian: Hati-hati pada penderita penyakit ginjal. Dapat meningkatkan risiko penyakit hati pada individu yang mengkonsumsi alkohol Efek Samping: Penggunaan dosis besar dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan kerusakan hati
Nama Obat : Mefinal 500mg Kandungan : asam mefenamat 500 mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: Meredakan nyeri ringan hingga sedang pada sakit kepala, sakit gigi, dismenore primer, juga nyeri traumatik, otot, dan pasca operasi Kategori: Sistem Saraf Pusat Dosis: dewasa : awal 500 mg, dilanjutkan 250 mg/6 jam Penyajian: segera sesudah makan Cara Penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari Perhatian: tukak GI atau penyakit inflamasi pada saluran cerna atas atau bawah. Gagal hati atau ginjal. Bronkospasme, rinitis alergi dan	

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>urtikaria jika diterapi dengan aspirin (asam asetil salisilat) atau AINS lain.
Terapi nyeri peri operasi pada bedah pintas
Efek Samping: gangguan GI, mengantuk, hipertensi, diare</td><td></td></tr>
</table>

f. Tahap pembuatan

Melakukan skrining resep An. B
Mengecek kesetersediaan obat
Menghitung harga obat dan embalase
Meracik obat cefixime 1 kapsul, paracetamol 1 tab dan mefinal 1 tab
Menulis etiket
Memasukkan obat & etiket kedalam plastik klip
Dilakukan KIE oleh dokter

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)
A = Apoteker
P = Pasien
A : Atas nama Tuan B dari poli penyakit dalam.
P : Iya, saya bapak An. B.
A : Boleh disebutkan tanggal lahir An. B dan alamatnya Pak?
P : dd-mm-yyyy, jalan xxx
A : Baik, ini bapak mendapatkan obat puyer antibiotik wajib dihabiskan sehari 2 kali 1 bungkus dan puyer nyeri sehari 3 kali 1 bungkus. Apakah sudah paham bapak?
P : Oh, begitu. Iya mbak, terima kasih.
A : Sama-sama pak, semoga lekas sembuh.
</td>
</tr>
<tr>
<td>16.</td>
<td>Jenis Resep : Resep asli (Racikan anak)
Resep obat : Racikan
Jumlah obat dalam resep : 3
Pengulangan resep : Neiter
Tempel Resep/salin resep disini!</td>
<td>a. Skrinning Administrasi
<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada</td><td>An. C</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada</td><td>10 Th</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada</td><td>41 kg</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>



RUMAH SAKIT ISLAM DARUS SYIFA` SURABAYA
Jl. Raya Benowo No.5, Benowo, Kec. Pakal, ~~Kota~~ Surabaya
Telp. (031) 7406293, Fax. (031) 7422842

Dokter : dr.Arizka Yuli Maulani Khasanah
SIP/SIK Dokter :
Poli / Ruang : Poli Umum
Riwayat Alergi : Tidak Ada

Surabaya, 12-02-2025

[redacted]

R/ CEFIXIM 100 mg KAP 1 tablet 10
CETIRIZIN 10 mg TAB 1/2 tablet
INDEXON 0,5 mg TAB 1/2 tablet 5
Mf da in Pulv dtd NO X
S 3 dd 1 Caps pc

Nama : [redacted]
Umur : 10 thn 11 bln 20 hr
Berat Badan : 41 Kg
Alamat : [redacted]
No. RM : [redacted]
Penjamin : UMUM

Nama Obat :	Ada	Cefixim Cetirizin Indexon
Kekuatan :	Ada	Cefixim 100mg Cetirizin 10mg Indexon 0.5 mg
Bentuk sed. :	Ada	puyer
Jumlah obat :	Ada	Cefixim 100mg 10 kaps Cetirizin 10mg 5 tab Indexon 0.5 mg 5 tab
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada	S 3dd1 caps sesudah makan
Tanggal penulisan resep :	Ada	12-2-2025
Nama dokter :	Ada	dr. Arizka Yuli Maulani Khasanah
Surat ijin :	Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Tidak Ada	-

b. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Cefixim 100mg 10 kaps
Cetirizin 10mg 5 tab
Indexon 0.5 mg 5 tab

c. Perhitungan biaya resep

Cefixim 100mg: 6500
Cetirizin 10mg :2500
Indexon 0.5 mg : 7000
Embalase: 1000
Total: 17000

c. ETIKET

12-02-2025
Nama : An. C
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Alergi
Sehari 3 kali 1 kapsul
Sesudah makan

e. *Product knowledge*


Nama Obat : Cefixim 100mg tab Kandungan : Cefixim 100mg tab Indikasi / Manfaat / Kegunaan: Pengobatan infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme antara lain infeksi saluran kemih tanpa komplikasi yang disebabkan oleh escerichia colli dan proteus mirabilis, otitis media, faringitis dan tonsilitis, bronkitis akut dan bronkitis kronik. Kategori: Anti Infeksi (Sistemik) Dosis: Infeksi yang rentan Dewasa: 200-400 mg setiap hari diberikan sebagai dosis tunggal atau dalam 2 dosis terbagi selama 7 hari, dapat dilanjutkan hingga 14 hari jika perlu, tergantung pada tingkat keparahan infeksi. Anak: >6 bulan sampai <10 tahun dengan berat badan <50 kg: 8 mg/kg setiap hari sebagai dosis tunggal atau dalam 2 dosis terbagi; >10 tahun dengan berat >50 kg: Sama dengan dosis dewasa.	Nama Obat : Cetirizine 10mg Kandungan : Cetirizine 10mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: rinitis alergi musiman dan tahunan, urtikaria kronik Kategori: Alergi dan Sistem Imun Dosis: > 12 th: 10 mg (1 tablet per hari), anak 6-11 th: 5-10 mg (1/2-1 tablet per hari), anak 2-5 th: 2,5-5 mg (1/4-1/2 tablet per hari) Penyajian: sebelum / sesudah makan Cara Penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari Perhatian: hipersensitif terhadap cetirizine, hidroksizin atau salah satu komponen, laktasi, hamil trimester 1, penyakit ginjal berat Efek Samping: sakit kepala, pusing, mengantuk, perangsangan emosi, marah, mulut kering, dan rasa tidak enak pada pencernaan (ringan dan sementara).
Nama Obat : Indexone 0,5 mg Kandungan : Dexamethasone 0,5 mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: anti inflamasi, rheumatik arthritis, dermatitis, rhinitis alergi Kategori:	

		Sistem Kardiovaskuler & Hematopoietik Dosis: Dewasa : 0,5-10 mg per hari Anak-anak : 0,08 mg-0,3 mg/kgBB/hari dibagi 3-4 dosis Penyajian: Dapat diberikan sesudah makan. Cara Penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung. Perhatian: Riwayat alergi terhadap kandungan obat ini. Wanita hamil dan menyusui. Penggunaan dexamethasone dalam jangka panjang. Obat ini dapat menyebabkan pusing, hindari aktivitas yang membutuhkan kewaspadaan seperti berkendara setelah mengonsumsi obat ini. Efek Samping: Gangguan tidur Pusing Sakit kepala Sakit perut Berat badan bertambah Nafsu makan meningkat		

f. Tahap pembuatan

1. Melakukan skrining resep An. C
2. Mengecek kesetersediaan obat
3. Menghitung harga obat dan embalase
4. Meracik obat Cefixim 100mg 10 kaps, Cetirizin 10mg 5 tab, Indexon 0.5 mg 5 tab menjadi sediaan kapsul
5. Menulis etiket S 3dd1 caps sesudah makan
6. Memasukkan obat & etiket kedalam plastik klip
7. Dilakukan KIE oleh apoteker

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

A = Apoteker
P = Pasien
A : Atas nama An. C dari poli umum
P : Iya, saya ibu dari An. C
A : Boleh disebutkan tanggal lahir dan alamatnya bu?
P : dd-mm-yyyy, jalan xxx
A : Baik, ini bu racikan kapsul untuk alergi diminum sehari 3 kali 1 kapsul sesudah makan. Apakah sudah paham bu?
P : Oh, begitu. Iya mbak, terima kasih.
A : Sama-sama pak, semoga lekas sembuh.</td>
</tr>
<tr>
<td>17.</td>
<td>Jenis Resep : Resep asli (Racikan anak)
Resep obat : Racikan
Jumlah obat dalam resep : 2
Pengulangan resep : Neiter
Tempel Resep/salin resep disini!
 
</td>
<td>a. Skrinning Administrasi
<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada</td><td>An. D</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada</td><td>10 Th</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada</td><td>41 kg</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada</td><td>Sanmol
Mefinal</td></tr>
<tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada</td><td>Sanmol 500mg
Mefinal 500mg</td></tr>
<tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada</td><td>Kapsul</td></tr>
<tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada</td><td>Sanmol 500mg 10 tab
Mefinal 500mg 5 tab</td></tr>
<tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada</td><td>Sanmol dan mefinal sebagai analgesik</td></tr>
<tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada</td><td>S 3dd1 caps pc</td></tr>
<tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada</td><td>12-2-2025</td></tr>
<tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada</td><td>dr. Arizka Yuli Maulani Khasanah</td></tr>
<tr><td>Surat ijin :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Alamat dr. :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>

b. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Sanmol 500mg 10 tab
Mefinal 500mg 5 tab

c. Perhitungan biaya resep

Sanmol 500mg : 7500
Mefinal 500mg : 10000
Embalase:1000
Total: 18500

d. ETIKET


12-02-2025
Nama : An. D
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Nyeri dan demam
sehari 3 kali 1 kapsul
Sesudah makan

e. *Product knowledge*

Nama Obat : Sanmol Kandungan : Paracetamol 500 mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: Meringankan rasa sakit seperti sakit kepala, sakit gigi dan menurunkan demam. Kategori: Sistem Saraf Pusat Dosis: • Dewasa: 1-2 tablet, diberikan sebanyak 3-4 kali per hari. • Anak usia 6-12 tahun: ½-1 tablet, diberikan sebanyak 3-4 kali per hari. Penyajian: Dapat diberikan setelah makan. Cara Penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.	Nama Obat : Mefinal 500mg Kandungan : asam mefenamat 500 mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: Meredakan nyeri ringan hingga sedang pada sakit kepala, sakit gigi, dismenore primer, juga nyeri traumatik, otot, dan pasca operasi Kategori: Sistem Saraf Pusat Dosis: dewasa : awal 500 mg, dilanjutkan 250 mg/6 jam Penyajian: segera sesudah makan Cara Penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari Perhatian: tukak GI atau penyakit inflamasi pada saluran cerna atas atau bawah. Gagal hati atau ginjal.

		Perhatian: Jangan mengonsumsi dan menggunakan paracetamol jika memiliki riwayat alergi dengan obat ini. Efek Samping: Mual, muntah, nyeri lambung, kehilangan nafsu makan, ruam pada kulit. | Bronkospasme, rinitis alergi dan urtikaria jika diterapi dengan aspirin (asam asetil salisilat) atau AINS lain. Terapi nyeri peri operasi pada bedah pintas Efek Samping: gangguan GI, mengantuk, hipertensi, diare f. Tahap pembuatan 1. Melakukan skrining resep An. D 2. Mengecek kesetersediaan obat 3. Menghitung harga obat dan embalase 4. Meracik kapsul sanmol 10 tablet dan mefinal 5 tablet 5. Menulis etiket nyeri s 3dd1 caps pc 6. Memasukkan obat & etiket kedalam plastik klip 7. Dilakukan KIE oleh apoteker g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal) **A = Apoteker** **P = Pasien** A : Atas nama An. D dari poli umum. P : Iya, saya bapak dari An. D A : Boleh disebutkan tanggal lahir dan alamatnya Pak? P : dd-mm-yyyy, jalan xxx A : Baik, ini bapak mendapatkan obat racikan kapsul untuk pereda nyeri dan demam diminum sehari 3 kali 1 kapsul sesudah makan. Apakah sudah paham bapak? P : Oh, begitu. Iya mbak, terima kasih. A : Sama-sama pak, semoga lekas sembuh.
18.	Jenis Resep : Resep asli (Racikan dewasa) Resep obat : Racikan Jumlah obat dalam resep : 2 Pengulangan resep : Neiter	a. Skrinning Administrasi Nama Pasien : | Ada | Tn. H Umur pasien : | Ada | 34 Th Berat Badan : | Ada | 64 kg

Tempel Resep/salin resep disini!



RUMAH SAKIT ISLAM DARUS SYIFA` SURABAYA
Jl. Raya Benowo No.5, Benowo, Kec. Pakal, Kota Surabay
Telp. (031) 7406293, Fax. (031) 7422842

Dokter : dr. UMAR NUR RACHMAN, Sp.PD
SIP/SIK Dokter : 503.446/861/B/IP.DS/436.7.17/2021
Poli / Ruang : Poli Spesialis Penyakit Dalam
Riwayat Alergi : Ada, ibu profen

Surabaya, 12-02-2025

[redacted]

R/ CLAST 05 mg TAB 0,5
DOMPERIDON 10 mg TAB 0,5
METOCLOPRAMID 5 mg TAB 0,5
Mf da in dtd NO LX
S 2 dd 1 Caps ac

Nama : [redacted]
Umur : 33 thn 29 hr
Berat Badan : 64 Kg
Alamat : [redacted]
No. RM : [redacted]
Penjamin : BPJS

Nama Obat :	Ada	Clast Domperidon
Kekuatan :	Ada	Clast 0.5 mg Domperidon 10mg
Bentuk sed. :	Ada	Clast 0.5 mg tablet Domperidon 10mg tablet
Jumlah obat :	Ada	Clast 0.5 mg 14 tablet Domperidon 10mg 14 tablet
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada	S 2dd1 caps ac
Tanggal penulisan resep :	Ada	12-2-2025
Nama dokter :	Ada	dr. Umar Nur Rachman, Sp.PD
Surat ijin :	Ada	503.446/861/B/IP.DS/436.7.17/2021
Alamat dr. :	Tidak Ada	-

b. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Clast 0.5 mg 14 tablet
Domperidon 10mg 14 tablet

c. Perhitungan biaya resep

Clast 0.5 mg : 42000
Domperidon 10mg : 8400
Embalase: 1000
Total: 51400

d. ETIKET


12-02-2025
Nama : Tn. H
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Mual muntah
Sehri 2 kali 1 kapsul
Sebelum makan

e. *Product knowledge*

Nama Obat : Clast 0,5mg Kandungan : Clebopride malate 0,5 mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: Mual dan muntah, tukak peptik dan gastroduodenitis. Muntah yang disebabkan obat anti kanker dan radioterapi, obstruksi usus, bedah saraf, pasca anastesia, cegukan pasca operasi, perubahan morfologi (stenosis pilorik). Muntah pada gastritis akut, uremia, alkoholisme akut. Muntah karena asetonemia, pasca infeksi (pertusus, infeksi saluran nafas dan meningeal). Kategori: Sistem Gastrointestinal & Hepatobilier Dosis: 3 x sehari 1 tablet Penyajian: Berikan 30 menit sebelum makan Cara Penyimpanan: simpan pada suhu ruangan dan terlindung dari sinar matahari langsung Perhatian: Anak-anak, hamil trimester 1, menyusui, dapat mengganggu kemampuan mengemudi dan mengoperasikan mesin Efek Samping: Dosis besar : mengantuk, payudara melunak, pusing	Nama Obat : Domperidone 10mg Kandungan : Domperidone 10mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: Mengurangi mual dan muntah, gangguan motilitas saluran cerna. Kategori: Sistem Gastrointestinal & Hepatobilier Dosis: Dapat diberikan 15-30 menit sebelum makan. Penyajian: 1.Terapi mual dan muntah Dewasa: 10-20 mg dengan interval 4-8 jam. Anak: 0.2-0.4 mg/kg dengan interval 4-8 jam. 2.Terapi simptomatis dispepsia fungsional Dewasa: 10-20 mg 3 kali sehari dan 1 kali pada malam hari. Cara Penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung. Perhatian: *Gangguan ginjal atau hati, *Wanita hamil atau menyusui *Alergi terhadap obat ini *Penggunaan jangka panjang *Pasien dengan riwayat gangguan jantung. Efek Samping: Galaktore, ginekomastia, mulut kering, sakit kepala, diare, ruam kulit, rasa haus, gangguan cemas, gatal.

f. Tahap pembuatan

1. Melakukan skrining resep
2. Mengecek kesetersediaan obat
3. Menghitung harga obat dan embalase
4. Meracik obat kapsul clast 0.5mg 14 tab dan domperidone 10mg 14 tab menjadi 28 kapsul
5. Menulis etiket mual muntah sehari 2 kali 1 kapsul sebelum makan
6. Memasukkan obat & etiket kedalam plastik klip
7. Dilakukan KIE oleh dokter

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)
A = Apoteker
P = Pasien
A : Atas nama Tuan H dari poli penyakit dalam.
P : Iya, saya.
A : Boleh disebutkan tanggal lahir dan alamatnya Pak?
P : dd-mm-yyyy, jalan xxx
A : Baik, ini bapak mendapatkan obat racikan kapsul untuk mual muntah diminum sehari 2 kali 1 kapsul sebelum makan. Apakah sudah paham bapak?
P : Oh, begitu. Iya mbak, terima kasih.
A : Sama-sama pak, semoga lekas sembuh.</td>
</tr>
<tr>
<td>19.</td>
<td>Jenis Resep : Resep asli (Racikan dewasa)
Resep obat : Racikan
Jumlah obat dalam resep : 5
Pengulangan resep : Neiter
Tempel Resep/salin resep disini!
 

</td>
<td>c. Skrinning Administrasi
<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada</td><td>Tn. I</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada</td><td>Santagesik
Na diklofenak
Ranitidine
Amitriptilin
Valisanbe</td></tr>
<tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada</td><td>Santagesik 500mg
Na diklofenak 50mg
Ranitidine 150mg
Amitriptilin 25mg
Valisanbe 5mg</td></tr>
<tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada</td><td>Racikan kapsul</td></tr>
<tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada</td><td>Santagesik 500mg 9 tab
Na diklofenak 50mg 5 tab
Ranitidine 150mg 5 tab
Amitriptilin 25mg 4 tab
Valisanbe 5mg 2 tab</td></tr>
<tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada</td><td>• Santagesik dan na diklofenak sebagai analgesik</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

		• Amitriptilin dan valisanbe sebagai antideprean
Aturan pakai :	Ada	S 3dd1 caps pc
Tanggal penulisan resep :	Ada	11-2-2025
Nama dokter :	Ada	dr. Roxantin Utami, Sp.S
Surat ijin :	Ada	500.16.7.2/2505/B/IP.DS/436.7.15/2024
Alamat dr. :	Tidak Ada	-

d. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Santagesik 500mg 9 tab
Na diklofenak 50mg 5 tab
Ranitidine 150mg 5 tab
Amitriptilin 25mg 4 tab
Valisanbe 5mg 2 tab

c. Perhitungan biaya resep

Santagesik : 9000
Na diklofenak : 2500
Ranitidine : 2500
Amitriptilin: 16000
Valisanbe : 7000
Embalase: 1000
Total: 38000

d. ETIKET

11-02-2025
Nama : Tn. I
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Obat syaraf
Sehari 2 kali 1 kapsul
Sesudah makan

e. *Product knowledge*

Nama Obat : Santagesik 500mg Kandungan : Metamizole Na 500 mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: Nyeri akut atau kronik berat seperti sakit kepala, sakit gigi, tumor, nyeri pasca operasi & nyeri pasca cedera; nyeri berat yang berhubungan dengan spasme otot polos (akut atau kronik) misalnya spasme otot atau kolik yang mempengaruni GIT, pasase bilier, ginjal, atau saluran kemih bagian bawah. Kategori: Sistem Saraf Pusat Dosis: 1 tablet sebagai dosis tunggal. Maks: 4 x 1 tablet Penyajian: Sebaiknya diberikan bersama makanan atau sesuah makan Cara Penyimpanan: Simpan di tempat yang kering dan sejuk, terhindar dari panas matahari langsung Perhatian: Insidensi agranulositosis yg dipicu oleh metamizole dengan suatu penyebab imunoalergi yg berlangsung selama sekurang-kurangnya 1 minggu Efek Samping: Reaksi anafilaksis/anafilaktoid, dispnea, urtikaria, angioedema berat atau bronkospasme; aritmia kordis, hipotensi & syok sirkulasi	Nama Obat : Natrium Diklofenac 50mg Kandungan : Natrium Diklofenac 50mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: pengobatan akut dan kronis gejala-gejala reumatoid artritis, osteoartritis dan ankilosing spondilitis Kategori: Sistem Saraf Pusat Dosis: osteoartritis : 2-3 kali sehari 50 mg , reumatoid artritis : 3-4 kali sehari 50 mg, ankilosing spondilitis : 4 kali sehari 25 mg Penyajian: sesudah makan , sebelum makan, sebelum tidur. Cara Penyimpanan: Simpan di tempat yang sejuk dan kering, serta terlindung dari panas dan sinar matahari langsung Perhatian: penderita yang hipersensitif terhadap diklofenac atau menderita asma, urtikaria, penderita tukak lambung. Efek Samping: nyeri kram perut, sakit kepala, retensi cairan, diare mual, konstipasi,flatulen kelainan pada fungsi hati indigesti, tukak lambung,ruam tinnitus
Nama Obat : Ranitidine 150mg Kandungan : Ranitidine 150mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: pengobatan jangka pendek tukak dudenum aktif, tukak lambung aktif, mengurangi gejala refluks esofagitis, terapi pemeilharan setelah penyembuhan tukak duodenum dan lambung.	Nama Obat : amitriptiline 25 mg Kandungan : amitriptiline 25 mg Golongan Obat resep Kategori Antidepresan trisiklik Manfaat Mengatasi depresi, nyeri saraf, migrain, dan kebiasaan mengompol pada anak-anak


		Kategori: Sistem Gastrointestinal & Hepatobilier Dosis: tukak duodenum : 2 kali sehari 150mg (pagi dan malam) selama 4-8minggu. tukak lambung aktif : 2 kali sehari 150mg (pagi dan malam) selama 2 minggu. terapi pemeliharaan tukak duodenum dan lambung : 1 kali sehari 150mg sebelum tidur. refluks gastro esofagitis : 2 kali sehari 150mg. esofagitis erosif : 4 kali sehari 150mg. terapi pemeliharaan esofagitis erosif : 2 kali sehari 150mg. Penyajian: diminum sebelum atau setelah makan Perhatian: pasien dengan riwayat profiria akut. ibu hamil dan menyusui, anak, usia lanjut. gangguan fungsi hati dan ginjal. Efek Samping: sakit kepala, malaise (merasa lemas dan kurang fit), pusing, mengantuk, insomnia, vertigo, agitasi (resah dan gelisah), depresi, halusinasi, gangguan gastrointestinal.	Dikonsumsi oleh Dewasa, lansia, dan anak usia ≥6 tahun Amitriptyline untuk ibu hamil dan menyusui Kategori C: Studi pada binatang percobaan memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin, tetapi belum ada studi terkontrol pada wanita hamil.Obat hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya risiko terhadap janin. Amitriptyline terserap ke dalam ASI. Bila Anda sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa berkonsultasi dulu dengan dokter.
		Nama Obat : Valisanbe 5mg Kandungan : diazepam 5mg Golongan Psikotropika Kategori obat Anti konvulsan dan ansiolitik Dikonsumsi oleh Anak-anak dan dewasa Bentuk obat Tablet dan injeksi Entrostop untuk ibu hamil dan menyusui Kategori D: Studi klinis pada ibu hamil terbukti menunjukan risiko berbahaya pada janin. Peringatan Menyusui: Valisanbe bisa saja masuk melalui ASI, maka disarankan untuk tidak menyusui selama jangka	

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>waktu tertentu setelah menerima pengobatan obat ini.</td><td></td></tr>
</table>

f. Tahap pembuatan

Melakukan skrining resep Tn. I
Mengecek kesetersediaan obat
Menghitung harga obat dan embalase
Meracik obat kapsul Santagesik 500mg 9 tab Na diklofenak 50mg 5 tab Ranitidine 150mg 5 tab Amitriptilin 25mg 4 tab Valisanbe 5mg 2 tab menjadi 10 kapsul
Menulis etiket obat syaraf sehari 2 kali 1 kapsul sesudah makan
Memasukkan obat & etiket kedalam plastik klip
Dilakukan KIE oleh dokter

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)
A = Apoteker
P = Pasien
A : Atas nama Tuan I dari poli syaraf.
P : Iya, saya.
A : Boleh disebutkan tanggal lahir dan alamatnya Pak?
P : dd-mm-yyyy, jalan xxx
A : Baik, ini bapak mendapatkan obat racikan kapsul sehari 2 kali 1 kapsul sesudah makan. Apakah sudah paham bapak?
P : Oh, begitu. Iya mbak, terima kasih.
A : Sama-sama pak, semoga lekas sembuh.
</td>
</tr>
<tr>
<td>20.</td>
<td>Jenis Resep : Resep asli (Racikan dewasa)
Resep obat : Racikan
Jumlah obat dalam resep : 4
Pengulangan resep : Neiter
Tempel Resep/salin resep disini!</td>
<td>a. Skrinning Administrasi
<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada</td><td>Nn. A</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada</td><td>14 Th</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>Tidak Ada</td><td>80 kg</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada</td><td>Tremenza
Methylprednisolone 4mg
Ambroxol 30mg
Loratadine 10mg</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>



RUMAH SAKIT ISLAM DARUS SYIFA` SURABAYA
Jl. Raya Benowo No.5, Benowo, Kec. Pakal, Kota Surabaya
Telp. (031) 7406293, Fax. (031) 7422842

Dokter : dr. M. FADJAR WIDJOKONGKO, Sp T.H.T.B.K.L
SIP/SIK Dokter : 500.16.7.2/2529/B/IP.DS/436.7.15/2023
Poli / Ruang : Poli Spesialis THT
Riwayat Alergi : Tidak Ada

Surabaya, 10-02-2025

R/ TREMENZA TAB 2/3 tablet
METHYL PREDNISOLON 4 mg TAB 1 tablet
AMBROXOL 30 mg TAB 1 tablet
LORATADINE 10 mg TAB 1/3 tablet
Mf da in Caps dtd NO XX
S 3 dd 1

Nama :
Umur : 14 thn 6 bln 2 hr
Berat Badan : 80 Kg
Alamat :
No. RM :
Penjamin : UMUM

Kekuatan :	Ada	Tremenza 14 tab Methylprednisolone 4mg Ambroxol 30mg Loratadine 10mg
Bentuk sed. :	Ada	Kapsul
Jumlah obat :	Ada	Tremenza 14 tab Methylprednisolone 4mg 20 tab Ambroxol 30mg 20 tab Loratadine 10mg 7 tab
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada	S 3dd1 caps
Tanggal penulisan resep :	Ada	10-2-2025
Nama dokter :	Ada	dr. M. Fadjar Widjokongko, Sp.T.H.T.B.K.L
Surat ijin :	Ada	500.16.7.2/2529/B/IP.DS/436.7.15/2023
Alamat dr. :	Tidak Ada	-

b. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Tremenza 14 tab
Methylprednisolone 4mg 20 tab
Ambroxol 30mg 20 tab
Loratadine 10mg 7 tab

c. Perhitungan biaya resep

Tremenza: 35000
Methylprednisolone 4mg: 12000
Ambroxol 30mg: 6000
Loratadine 10mg: 3500
Embalase: 1000
Total: 57500

d. ETIKET

10-02-2025
Nama : Nn. A
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Batuk pilek
Sehari 3 kali 1 kapsul
Sesudah makan


e. *Product knowledge*

Nama Obat : Tremenza Kandungan : pseudoephedrine 60 mg, triprolidine HCl 2.5 mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: flu karena alergi pada saluran nafas atas atau yang memerlukan dekongestan dan antihistamin Kategori: Sistem Pernapasan Dosis: >12 tahun : 3-4 x sehari 1 tablet, 6-12 tahun : 3-4 x sehari 1-2 tablet Penyajian: sesudah makan Cara Penyimpanan: simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung Perhatian: penyakit saluran napas bagian bawah termasuk asma, hipersensitivitas terhadap obat ini, hipertensi, glaukoma, diabetes, penyakit arteri koroner dan pada terapi dengan penghambat monoamin oksidase Efek Samping: mulut, hidung, tenggorokan kering	Nama Obat : Methylprednisolone 4mg Kandungan : Methylprednisolone 4mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: Asma bronkial; Gangguan pada kulit seperti dermatitis , psoriasis , sindrom Stevens-Johnson dan kelainan kulit lainnya yang responsif terhadap kortikosteroid; Gangguan kolagen : Lupus eritematosus sistemik; Kelainan lainnya yang responsif terhadap kortikosteroid Kategori: Hormon Dosis: Parenteral :Dosis yang dianjurkan : 30 mg/kg berat badan, diberikan secara intravena paling tidaklebih dari 30 menit. Dosis ini dapat diulangi setiap 4-6 jam untuk setiap 48 jam. Dosis dapat dikurangi untuk bayi dan anak-anak tapi yang perlu lebih diperhatikan Penyajian: sesudah makan Cara Penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari Perhatian: TBC, ulkus peptikum, infeksi jamur sistemik, herpes simpleks, diabetes melitus, varisela. Hipersensitif terhadap metilprednisolon dan glukokortikoid lainnya.

				Efek Samping: Pemberian jangka pendek jarang menimbulkan efek samping yang serius.Pemberian jangka lama akan menimbulkan efek samping seperti yang ditimbulkan kortikosteroid lainnya, misalnya moon face, bufallo hump, hipertensi, osteoporosis, gangguan toleransi glukos.
			Nama Obat : Ambroxol 30mg Kandungan : Ambroxol 30mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: Meredakan batuk berdahak akibat beberapa kondisi, seperti bronkitis atau emfisema. Kategori: Sistem Pernapasan Dosis: • Mukolitik Dewasa: Sebagai tablet: Dosis biasa: 30 mg 2-3 kali sehari. Dapat ditingkatkan 60 mg 2 kali sehari bila perlu. Penyajian: Dapat diberikan setelah makan. Cara Penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung. Perhatian: Wanita hamil dan menyusui. Efek Samping: Mual, muntah, diare, dispepsia, mulut atau tenggorokan kering, sakit perut, mulas.	Nama Obat : Loratadine 10mg Kandungan : Loratadine 10mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: Mengatasi gejala alergi, seperti bersin-bersin, pilek, hidung tersumbat, dan ruam kulit yang terasa gatal. Kategori: Alergi dan Sistem Imun Dosis: • Kondisi alergi Dewasa: 10 mg sekali sehari atau 5 mg dua kali sehari. Anak: 2-12 tahun 30 kg: 10 mg 1x/hari. > 12 tahun sama dengan dosis dewasa. Penyajian: Dapat dikonsumsi dengan atau tanpa makanan. Cara Penyimpanan: Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung. Perhatian: • Wanita hamil dan menyusui. • Anak-anak. Efek Samping: • Sakit kepala, mengantuk, kelelahan, gugup. • Gangguan gastrointestinal: Mulut kering, nyeri perut, mual, muntah, diare, gastritis. • Gangguan metabolisme dan nutrisi: Nafsu makan meningkat

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>f. Tahap pembuatan
1. Melakukan skrining resep Nn. A
2. Mengecek kesetersediaan obat
3. Menghitung harga obat dan embalase
4. Meracik obat kapsul Tremenza 14 tab Methylprednisolone 4mg 20 tab Ambroxol 30mg 20 tab Loratadine 10mg 7 tab menjadi 20 kapsul
5. Menulis etiket batuk pilek sehari 3 kali 1 kapsul sesudah makan
6. Memasukkan obat & etiket kedalam plastik klip
7. Dilakukan KIE oleh apoteker

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)
A = Apoteker
P = Pasien
A : Atas nama Nn. A dari poli THT.
P : Iya, saya.
A : Boleh disebutkan tanggal lahir dan alamatnya mbak?
P : dd-mm-yyyy, jalan xxx
A : Baik, ini mbak mendapatkan obat racikan kapsul batuk pilek diminum sehari 3 kali 1 kapsul sesudah makan. Apakah sudah paham mbak?
P : Oh, begitu. Iya mbak, terima kasih.
A : Sama-sama pak, semoga lekas sembuh.</td>
</tr>
<tr>
<td>21.</td>
<td>Jenis Resep : Resep asli (DM)
Resep obat : Non racikan
Jumlah obat dalam resep : 2
Pengulangan resep : Neiter
Tempel Resep/salin resep disini!</td>
<td>a. Skrinning Administrasi
<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada</td><td>Ny. G</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada</td><td>59 Th</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada</td><td>49 kg</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada</td><td>Glimepiride
Metformin</td></tr>
<tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada</td><td>Glimepiride 4mg
Metformin 500mg</td></tr>
<tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada</td><td>Glimepiride 4mg tablet
Metformin 500mg tablet</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>


RUMAH SAKIT ISLAM DARUS SYIFA` SURABA
Jl. Raya Benowo No.5, Benowo, Kec. Pakal, Kota Su
Telp. (031) 7406293, Fax. (031) 7422842

Dokter : dr. UMAR NUR RACHMAN, Sp.PD
SIP/SIK Dokter : 503.446/861/B/IP.DS/436.7.17/2021
Poli / Ruang : Poli Spesialis Penyakit Dalam
Riwayat Alergi : Tidak Ada

R/ GLIMEPIRIDE 4 mg TAB
S 1 dd 1 Tab ac Po
R/ METFORMIN 500 mg TAB
S 2 dd 1 Tab pc Po

Surabaya, 12-02-2025
NO XXX
NO LX

Nama : [redacted]
Umur : 59 thn 1 bln 6 hr
Berat Badan : 49 Kg
Alamat : [redacted]
No. RM : [redacted]
Penjamin : BPJS

Jumlah obat :	Ada	Glimepiride 4mg 30 tab Metformin 500mg 60 tab
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	Glimepiride dan metformin sebagai antidiabetic
Aturan pakai :	Ada	Glimepiride s 1dd1 tab ac po Metformin s 2dd1 tab pc po
Tanggal penulisan resep :	Ada	12-2-2025
Nama dokter :	Ada	dr. Umar Nur Rachman, Sp.PD
Surat ijin :	Ada	503.446/861/B/IP.DS/436.7.17/2021
Alamat dr. :	Tidak Ada	-

b. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Glimepiride 4mg 30 tab
Metformin 500mg 60 tab

c. Perhitungan biaya resep

Glimepiride 4mg : 9000
Metformin 500mg: 24000
Embalase: 1000
Total: 34000

d. ETIKET

12-02-2025
Nama : Ny. G
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Glimepiride 4mg
Sehari 1 kali 1 tab
Sebelum makan

12-02-2025
Nama : Ny. G
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Metformin 500mg
Sehari 1 kali 1 tab
Sesudah makan


e. *Product knowledge*

Nama Obat : glimepiride 4mg Kandungan : glimepiride 4mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: terapi diabetes tipe 2 dimana kadar gula darah	Nama Obat : metformin 500mg Kandungan : metformin 500mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: Penurun gula darah bagi penderita kencing manis

tidak dapat dikontrol dengan diet dan olahraga Kategori: Sistem Endokrin dan Metabolik Dosis: 1x3 Sehari Penyajian: segera sebelum makan Cara Penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari Perhatian: hipersensitif terhadap glimepirid, pasien ketoasidosis dengan atau tanpa koma Efek Samping: hipoglikemia, gangguan penglihatan, mual, muntah, nyeri perut, diare, kelainan darah, reaksi alergi atau pseudoalergi	(diabetes mellitus). Metformin juga sangat cocok untuk penderita diabetes dengan tubuh gemuk. Kategori: Sistem Endokrin dan Metabolik Dosis: 1x1 Sehari Penyajian: Dapat dikonsumsi bersamaan dengan makanan. Cara Penyimpanan: Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung. Perhatian: • Wanita hamil dan menyusui. • Lanjut usia. Efek Samping: Diare, banyak buang gas, rasa lelah, nyeri-nyeri otot, gula darah rendah (hipoglikemia), penurunan kadar vitamin B-12 dalam tubuh, sulit buang air besar, sakit maag.		

f. Tahap pembuatan

1. Melakukan skrining resep
2. Mengecek kesetersediaan obat
3. Menghitung harga obat dan embalase
4. Mengambil obat Glimepiride 4mg 30 tab, dan Metformin 500mg 60 tab di rak masing-masing
5. Menulis etiket Glimepiride s 1dd1 tab ac, Metformin s 2dd1 tab pc
6. Memasukkan obat & etiket kedalam plastik
7. Dilakukan KIE oleh apoteker

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)
A = Apoteker
P = Pasien
A : Atas nama Ny. G dari poli penyakit dalam.
P : Iya, saya.
A : Boleh disebutkan tanggal lahir dan alamatnya bu?
P : dd-mm-yyyy, jalan xxx
A : Baik, ini bu mendapatkan obat antidiabetes glimepiride 4 mg diminum sehari 1 kali 1 tab sebelum makan dan metformin 500mg sehari 2 kali 1 tablet sesudah makan. Apakah sudah paham bu?
P : Oh, begitu. Iya mbak, terima kasih.
A : Sama-sama bu, semoga lekas sembuh.</td>
</tr>
<tr>
<td>22.</td>
<td>Jenis Resep : Resep asli (HT)
Resep obat : Non racikan
Jumlah obat dalam resep : 5
Pengulangan resep : Neiter
Tempel Resep/salin resep disini!
 
</td>
<td>a. Skrinning Administrasi
<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada</td><td>Ny. H</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada</td><td>73 Th</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada</td><td>60 kg</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada</td><td>Bisoprolol 5mg
Furosemid 40mg
Amlodipine 10mg
Spironolactone 25mg
Candesartan 8mg</td></tr>
<tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada</td><td>Bisoprolol 5mg
Furosemid 40mg
Amlodipine 10mg
Spironolactone 25mg
Candesartan 8mg</td></tr>
<tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada</td><td>Bisoprolol 5mg tab
Furosemid 40mg tab
Amlodipine 10mg tab
Spironolactone 25mg tab
Candesartan 8mg tab</td></tr>
<tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada</td><td>Bisoprolol 5mg 30 tab
Furosemid 40mg 30 tab
Amlodipine 10mg 30 tab</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>

		Spironolactone 25mg 30 tab Candesartan 8mg 30 tab
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	Semua obat merupakan golongan antihipertensi
Aturan pakai :	Ada	Bisoprolol s 1dd1 jantung Furosemid s 1dd1 pc pagi bengkak Amlodipine s 1dd1 pc malam Spironolactone s 1dd1 pc pagi sesak Candesartan s 1dd1 pc darah tinggi
Tanggal penulisan resep :	Ada	21-2-2025
Nama dokter :	Ada	Dr. Nisa Kurnia Ramadani, Sp.JP
Surat ijin :	Ada	503.446/878/B/IP.DS/436.7.15/2022
Alamat dr. :	Tidak Ada	-

b. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Bisoprolol 5mg 30 tab
Furosemid 40mg 30 tab
Amlodipine 10mg 30 tab
Spironolactone 25mg 30 tab
Candesartan 8mg 30 tab

c. Perhitungan biaya resep

Bisoprolol 5mg : 30000
Furosemid 40mg: 7500
Amlodipine 10mg: 54000
Spironolactone 25mg: 13500
Candesartan 8mg : 60000
Embalase:1000
Total: 166000

d. ETIKET

21-02-2025 Nama : Ny. H No. RM : xxxxxx Tgl Lahir : dd-mm-yyyy Bisoprolol 5mg sehari 1 kali 1 tab Sesudah makan jantung	21-02-2025 Nama : Ny. H No. RM : xxxxxx Tgl Lahir : dd-mm-yyyy Furosemid 40mg sehari 1 kali 1 tab Sesudah makan – pagi bengkak
21-02-2025 Nama : Ny. H No. RM : xxxxxx Tgl Lahir : dd-mm-yyyy Amlodipine 10mg sehari 1 kali 1 tab Sesudah makan - malam Darah tinggi	21-02-2025 Nama : Ny. H No. RM : xxxxxx Tgl Lahir : dd-mm-yyyy Spironolactone 25mg sehari 1 kali1 tab Sesudah makan – pagi sesak
21-02-2025 Nama : Ny. H No. RM : xxxxxx Tgl Lahir : dd-mm-yyyy Candesartan 8mg sehari 1 kali 1 tab Sesudah makan darah tinggi	

e. *Product knowledge*

Nama Obat : Bisoprolol 5mg Kandungan : Bisoprolol 5mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: hipertensi, baik sebagai monoterapi ataupun sebagai kombinasi dengan obat antihipertensi yang lain Kategori: Sistem Kardiovaskuler & Hematopoietik Dosis: 1x1 Sehari	Nama Obat : Furosemid 40 mg Kandungan : Furosemid 40 mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: Pengobatan edema pada jantung, sirosis hati dan gangguan ginjal. Pengobatan hipertensi, baik diberikan dosis tunggal atau kombinasi dengan obat antihipertensi

		Penyajian: sebelum / sesudah makan, pagi hari Cara Penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari Perhatian: gagal jantung kronis dgn asma bronkial yg parah, metabolik asidosis, hipersensitif thd bisoprolol Efek Samping: rasa dingin pada jari kaki dan tangan, lemah, kejang otot, bradikardi, halusinasi, reaksi hipersensitif	Kategori: Sistem Kardiovaskuler & Hematopoietik Dosis: 1x1 Sehari Penyajian: Diberikan bersamaan dengan makanan Cara Penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari Perhatian: Insufisiensi ginjal atau hati, hipertrofi prostat, riwayat gout, hiperurisemia, pankreatitis, diabetes melitus, hamil. Efek Samping: Gangguan saluran cerna minor, hipotensi ortostatik, pusing, dan sakit kepala
		Nama Obat : amlodipine 10mg Kandungan : amlodipine 10mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: untuk hipertensi dan angina Kategori: Sistem Kardiovaskuler & Hematopoietik Dosis: 1x1 Sehari Penyajian: sesudah makan Cara Penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari Perhatian: hipersensitivitas Efek Samping: sakit kepala, edema, kelelahan yang menyeluruh, mual, rasa panas & kemerahan pada wajah, pusing	Nama Obat : spironolactone 25mg Kandungan : spironolactone 25mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: Hipertensi esensial, hipertensi berat, Edema jantung, edema karena sirosis hati, edema karena sindroma nefrotik Kategori: Sistem Kardiovaskuler & Hematopoietik Dosis: 1x1 Sehari Penyajian: 10 tablet/ strip
		Nama Obat : Candesartan 8mg Kandungan : Candesartan 8mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: hipertensi, pengobatan pada pasien gagal jantung dan gangguan fungsi sistolik ventrikel kiri ketika obat penghambat ACE tidak ditolerir	


		Kategori: Sistem Kardiovaskuler & Hematopoietik Dosis: 1x1 Sehari Penyajian: sebelum / sesudah makan Cara Penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari Perhatian: hipersensitif terhadap komponen, wanita hamil, menyusui, gangguan hati berat dan/atau kolestasia Efek Samping: back pain, pusing, infeksi saluran pernafasan atas, faringitis, rinitis		

f. Tahap pembuatan

1. Melakukan skrining resep Ny. H
2. Mengecek kesetersediaan obat
3. Menghitung harga obat dan embalase
4. Mengambil obat Bisoprolol 5mg 30 tab Furosemid 40mg 30 tab Amlodipine 10mg 30 tab Spironolactone 25mg 30 tab Candesartan 8mg 30 tab di rak masing-masing
5. Menulis etiket obat Bisoprolol sehari 1 kali 1 tablet jantung, Furosemid sehari 1 kali 1 tab sesudah makan pagi bengkak, Amlodipine sehari 1 kali 1 tablet sesudah makan malam darah tinggi, Spironolactone sehari 1 kali 1 tablet sesudah makan pagi sesak, Candesartan sehari 1 kali 1 tablet sesudah makan darah tinggi
6. Memasukkan obat & etiket kedalam plastik
7. Dilakukan KIE oleh dokter

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

A = Apoteker
P = Pasien
A : Atas nama Ny. H dari poli jantung.
P : Iya, saya.
A : Boleh disebutkan tanggal lahir dan alamatnya bu?
P : dd-mm-yyyy, jalan xxx
A : Baik, ini ibu mendapatkan obat Bisoprolol diminum sehari 1 kali 1 tablet untul jantung, Furosemid sehari 1 kali 1 tab sesudah makan waktu pagi untuk bengkak, Amlodipine sehari 1 kali 1 tablet sesudah makan waktu malam untuk darah tinggi, Spironolactone sehari 1 kali 1 tablet sesudah makan waktu pagi untuk sesak, Candesartan sehari 1 kali 1 tablet sesudah makan untuk darah tinggi. Apakah sudah paham bu?
P : Oh, begitu. Iya mbak, terima kasih.
A : Sama-sama bu, semoga lekas sembuh.</td>
</tr>
<tr>
<td>23.</td>
<td>Jenis Resep : Resep asli (Pasien syaraf)
Resep obat : Non racikan
Jumlah obat dalam resep : 4
Pengulangan resep : Neiter
Tempel Resep/salin resep disini!</td>
<td>a. Skrinning Administrasi
<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada</td><td>Ny. I</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada</td><td>75 kg</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada</td><td>Alprazolam 0.5 mg
Mecobalamin 500mg
Na diklofenak 50mg
Fenofibrate 100mg</td></tr>
<tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada</td><td>Alprazolam 0.5 mg
Mecobalamin 500mg
Na diklofenak 50mg
Fenofibrate 100mg</td></tr>
<tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada</td><td>Alprazolam 0.5 mg tab
Mecobalamin 500mg kapsul
Na diklofenak 50mg tab
Fenofibrate 100mg kapsul</td></tr>
<tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada</td><td>Alprazolam 0.5 mg 20 tab
Mecobalamin 500mg 20 kapsul</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>



RUMAH SAKIT ISLAM DARUS SYIFA' SURAB
Jl. Raya Benowo No.5, Benowo, Kec. Pakal, Kota
Telp. (031) 7406293, Fax. (031) 7422842

Dokter : dr. ROXANTIN UTAMI, Sp.S
SIP/SIK Dokter : 500.16.7.2/2505/B/IP.DS/436.7.15/2024
Poli / Ruang : Poli Spesialis Saraf
Riwayat Alergi : Tidak Ada

Surabaya, 12-02-2025

R/ ALPRAZOLAM 05 mg TAB NO XXX 20
S 1 dd 1 Tab pc Po MALAM / SUSAH TIDUR
R/ MECOBALAMIN 500 mg KAP NO LX 20
S 2 dd 1 Caps pc Po VIT SARAF
R/ NA DIKLOFENAK 50 mg TAB NO XX
S 2 dd 1 Tab pc Po kp nyeri
R/ FENOFIBRATE 100 mg KAP NO XX 20
S 1 dd 1 MALAM /TG

Nama :
Umur :
Berat Badan : 75 Kg
Alamat :
No. RM :
Penjamin : BPJS

		Na diklofenak 50mg 20 tab Fenofibrate 100mg 20 kapsul
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada	Alprazolam 0.5 mg s 1dd1 pc malam Mecobalamin 500mg s 2dd1 pc Na diklofenak 50mg s 2dd1 kp nyeri Fenofibrate 100mg s 1dd1 malam
Tanggal penulisan resep :	Ada	12-2-2025
Nama dokter :	Ada	dr. Roxantin Utami, Sp.S
Surat ijin :	Ada	500.16.7.2/2505/B/IP.DS/436.7.15/2024
Alamat dr. :	Tidak Ada	-

b. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Alprazolam 0.5 mg 20 tab
Mecobalamin 500mg 20 kapsul
Na diklofenak 50mg 20 tab
Fenofibrate 100mg 20 kapsul

c. Perhitungan biaya resep

Alprazolam 0.5 mg: 52000
Mecobalamin 500mg: 26000
Na diklofenak 50mg :10000
Fenofibrate 100mg : 60000
Embalase:1000
Total: 149000

d. ETIKET

12-02-2025
Nama : Ny. I
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Alprazolam 0.5 mg
sehari 1 kali 1 tab
Sesudah makan
malam


12-02-2025
Nama : Ny. I
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Mecobalamin 500mg
sehari 2 kali1 kapsul
Sesudah makan

		12-02-2025 Nama : Ny. I No. RM : xxxxxx Tgl Lahir : dd-mm-yyyy Na diklofenak 50mg sehari 2 kali 1 tab Sesudah makan Bila nyeri 12-02-2025 Nama : Ny. I No. RM : xxxxxx Tgl Lahir : dd-mm-yyyy Fenofibrate 100mg sehari 1 kali 1 kapsul Sesudah makan malam e. *Product knowledge* Nama Obat : alprazolam 0,5mg Kandungan : alprazolam 0,5mg Golongan Obat resep Kategori Benzodiazepine Manfaat Mengatasi gangguan kecemasan dan gangguan panik Dikonsumsi oleh Dewasa Alprazolam untuk ibu hamil Kategori D: Ada bukti bahwa kandungan obat berisiko terhadap janin manusia, tetapi besarnya manfaat yang diperoleh mungkin lebih besar daripada risikonya, misalnya untuk mengatasi situasi yang mengancam nyawa. Nama Obat : Mecobalamin 500mg Kandungan : Mecobalamin 500mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: • Neuropati perifer. Kategori: Sistem Saraf Pusat Dosis: • Dapat dikonsumsi dengan atau tanpa makan. Penyajian: • Dewasa: 1 kapsul 3xsehari. Cara Penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung. Perhatian: • Hentikan penggunaan jika tidak ada respons sesudah beberapa bulan terapi. • Penggunaan jangka lama dosis besar tidak dianjurkan untuk pasien yang terpapar okupasi atau berhubungan dengan merkuri. • Alkohol dapat mengurangi efek dari vitamin B12. Efek Samping: • Mual. • Muntah. • Diare. • Ruam kulit. • Anoreksia. Nama Obat : Natrium Diklofenak 50mg Kandungan : Natrium Diklofenak 50mg Nama Obat : Natrium Diklofenac 50mg Kandungan : Natrium Diklofenac 50mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: pengobatan akut dan kronis gejala-gejala Nama Obat : Fenofibrate 100mg Kandungan : Fenofibrate 100mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: Mengontrol kadar kolesterol dan mengontrol lemak darah.

		reumatoid artritis, osteoartritis dan ankilosing spondilitis Kategori: Sistem Saraf Pusat Dosis: osteoartritis : 2-3 kali sehari 50 mg , reumatoid artritis : 3-4 kali sehari 50 mg, ankilosing spondilitis : 4 kali sehari 25 mg Penyajian: sesudah makan , sebelum makan, sebelum tidur. Cara Penyimpanan: Simpan di tempat yang sejuk dan kering, serta terlindung dari panas dan sinar matahari langsung Perhatian: penderita yang hipersensitif terhadap diklofenac atau menderita asma, urtikaria, penderita tukak lambung. Efek Samping: nyeri kram perut, sakit kepala, retensi cairan, diare mual, konstipasi,flatulen kelainan pada fungsi hati indigesti, tukak lambung,ruam tinnitus	Kategori: Sistem Kardiovaskuler & Hematopoietik Dosis: 1x1 Sehari Penyajian: Dapat diberikan bersama dengan makan. Cara Penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung. Perhatian: Anak Wanita hamil dan menyusui. Efek Samping: Sembelit, mual, nyeri perut, sakit kepala, nyeri punggung, rhinitis.

f. Tahap pembuatan

1. Melakukan skrining resep
2. Mengecek kesetersediaan obat
3. Menghitung harga obat dan embalase
4. Mengambil obat Alprazolam 0.5 mg 20 tab Mecobalamin 500mg 20 kapsul Na diklofenak 50mg 20 tab Fenofibrate 100mg 20 kapsul di rak masing-masing
5. Menulis etiket Alprazolam 0.5 mg s 1dd1 pc malam Mecobalamin 500mg s 2dd1 pc Na diklofenak 50mg s 2dd1 kp nyeri Fenofibrate 100mg s 1dd1 malam
6. Memasukkan obat & etiket kedalam plastik klip
7. Dilakukan KIE oleh dokter

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)
A = Apoteker
P = Pasien
A : Atas nama Ny. I dari poli syaraf.
P : Iya, saya.
A : Boleh disebutkan tanggal lahir dan alamatnya bu?
P : dd-mm-yyyy, jalan xxx
A : Baik, ini bu mendapatkan obat Alprazolam 0.5 mg sehari 1kali 1 tablet sesudah makan waktu malam, Mecobalamin 500mg sehari 2 kali 1 kapsul sesudah makan, Na diklofenak 50mg sehari 2 kali 1 tablet bila nyeri Fenofibrate 100mg sehari 1 kali 1 tab malam. Apakah sudah paham bu?
P : Oh, begitu. Iya mbak, terima kasih.
A : Sama-sama bu, semoga lekas sembuh.</td>
</tr>
<tr>
<td>24.</td>
<td>Jenis Resep : Resep asli (Iter)
Resep obat : Non racikan
Jumlah obat dalam resep : 3
Pengulangan resep : Iter 2x
Tempel Resep/salin resep disini!
 

</td>
<td>a. Skrinning Administrasi
<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada</td><td>Tn. J</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>Tidak Ada</td><td>58 Th</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>Tidak Ada</td><td>74 kg</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada</td><td>Candesartan 8mg
Acarbose 100mg
Adalat oros 30mg</td></tr>
<tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada</td><td>Candesartan 8mg
Acarbose 100mg
Adalat oros 30mg</td></tr>
<tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada</td><td>Candesartan 8mg tab
Acarbose 100mg tab
Adalat oros 30mg tab</td></tr>
<tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada</td><td>Candesartan 8mg 30 tab
Acarbose 100mg 60 tab
Adalat oros 30mg 30 tab</td></tr>
<tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Tidak Ada</td><td>Candesartan dan acarbose sebagai antihipertensi</td></tr>
<tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada</td><td>Candesartan 8mg s 1 dd1</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

		Acarbose 100mg s 2dd1 pc Adalat oros 30mg s 1dd1
Tanggal penulisan resep :	Ada	10-2-2025
Nama dokter :	Ada	dr. Umar Nur Rachman, Sp.PD
Surat ijin :	Ada	503.446/861/B/IP.DS/436.7.17/2021
Alamat dr. :	Tidak Ada	-

b. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Candesartan 8mg 30 tab
Acarbose 100mg 60 tab
Adalat oros 30mg 30 tab

c. Perhitungan biaya resep

Candesartan 8mg : 60000
Acarbose 100mg : 150000
Adalat oros 30mg: 360000
Embalase: 1000
Total: 571000

d. ETIKET

10-02-2025
Nama : Tn. J
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Candesartan 8mg
Sehari 1 kali 1 tab
Sesudah makan

10-02-2025
Nama : Tn. J
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Acarbose 100mg
Sehari 2 kali 1 tab
Sesudah makan

10-02-2025
Nama : Tn. J
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Adalat oros 30mg
Sehari 1 kali 1 tab
Sesudah makan


<table>
<tr><td></td><td></td><td>e. Product knowledge
<table>
<tr><td>Nama Obat : candesartan 8mg
Kandungan : candesartan 8mg
Indikasi / Manfaat / Kegunaan: hipertensi, pengobatan pada pasien gagal jantung dan gangguan fungsi sistolik ventrikel kiri ketika obat penghambat ACE tidak ditolerir
Kategori: Sistem Kardiovaskuler & Hematopoietik Dosis: 1x1 Sehari Penyajian: sebelum / sesudah makan
Cara Penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari Perhatian: hipersensitif terhadap komponen, wanita hamil, menyusui, gangguan hati berat dan/atau kolestasia Efek Samping: back pain, pusing, infeksi saluran pernafasan atas, faringitis, rinitis</td><td>Nama Obat : acarbose 100mg
Kandungan : acarbose 100mg
Indikasi / Manfaat / Kegunaan: Terapi kombinasi dengan diet untuk DM
Kategori: Sistem Endokrin dan Metabolik
Dosis: 1x1 Sehari Penyajian: Berikan bersama dengan suapan pertama makanan utama Cara Penyimpanan: Simpan di tempat yang kering dan terlindung dari cahaya Perhatian: Monitor fungsi hati selama 6-12 bulan pertama terapi, anak < 18 tahun Efek Samping: Sering terjadi : kembung, bising usus meningkat. Kadang terjadi : diare dan nyeri abdomen. Gejala pada lambung dan abdomen yang tidak spesifik</td></tr>
<tr><td>Nama Obat : adalat oros 30mg
Kandungan : adalat oros 30mg
Indikasi / Manfaat / Kegunaan: pengobatan hipertensi dan angina pectoris kronik stabil, angina pectoris pasca infark (kecuali 8 hari pertama paska infark miokard akut) Kategori: Sistem Kardiovaskuler & Hematopoietik Dosis: 1x1 Sehari Penyajian: Telan utuh, jangan dikunyah/dihancurkan. Hindari jus buah anggur. Cara Penyimpanan: Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari Perhatian: Hamil, Laktasi, Infark miokard akut, termasuk 8 hari pertama setelah infark miokard. Hipersensitif terhadap golongan dihidropiridin. Terapi bersama Rifampisin Efek Samping: Astenia, edema</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>perifer, palpitasi, sakit kepala, konstipasi, pusing, edema dan vasodilatasi</td><td></td></tr>
</table>

f. Tahap pembuatan

Melakukan skrining resep
Mengecek kesetersediaan obat
Menghitung harga obat dan embalase
Mengambil obat Candesartan 8mg 30 tab Acarbose 100mg 60 tab Adalat oros 30mg 30 tab di rak masing-masing
Menulis etiket Candesartan 8mg s 1 dd1 Acarbose 100mg s 2dd1 pc Adalat oros 30mg s 1dd1
Memasukkan obat & etiket kedalam plastik klip

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)
A = Apoteker
P = Pasien
A : Atas nama Tuan J dari poli penyakit dalam.
P : Iya, saya.
A : Boleh disebutkan tanggal lahir dan alamatnya Pak?
P : dd-mm-yyyy, jalan xxx
A : Baik, ini bapak mendapatkan obat Candesartan 8mg sehari 1 kali 1 tablet untuk darah tinggi, Acarbose 100mg sehari 2 kali 1 tablet sesudah makan untuk diabetes, Adalat oros 30mg sehari 1 kali 1 tablet untuk darah tinggi. Apakah sudah paham bapak?
P : Oh, begitu. Iya mbak, terima kasih.
A : Sama-sama pak, semoga lekas sembuh.
</td>
</tr>
<tr>
<td>25.</td>
<td>Jenis Resep : Resep asli (Iter)
Resep obat : Non racikan
Jumlah obat dalam resep : 4
Pengulangan resep : Iter 2x
Tempel Resep/salin resep disini!</td>
<td>c. Skrinning Administrasi
<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada</td><td>Tn. K</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada</td><td>56kg</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada</td><td>Glucosamine 500mg
Vit b complex</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>



RUMAH SAKIT ISLAM DARUS SYIFA` SURABAYA
Jl. Raya Benowo No.5, Benowo, Kec. Pakal, Kota Surab
Telp. (031) 7406293, Fax. (031) 7422842

Dokter : dr. Nisa Kurnia Ramadani, Sp. JP
SIP/SIK Dokter : 503.446/878/B/IP.DS/436.7.15/2022
Poli / Ruang : Poli Spesialis Jantung
Riwayat Alergi : Tidak Ada

Surabaya, 10-02-2025
ITER 2X

R| BISOPROLOL 5 mg TAB NO
S 1 dd 1 Tab pc Po JANTUNG
R| GLUCOSAMIN 500 mg TAB NO V
S 1 dd 1 Tab pc Po SENDI
R| VIT B COMPLEX NO XXX
S 1 dd 1 Tab pc Po VITAMIN
R| NITROKAF RETARD 25 mg KAP NO LX
S 2 dd 1 Caps pc Po NYERI DADA
R| SIMVASTATIN 20 mg TAB NO XXX
S 1 dd 1 Tab pc Po KOLESTEROL, MALAM

Nama : [redacted]
Umur : [redacted]
Berat Badan : 58 Kg
Alamat : [redacted]
No. RM : [redacted]
Penjamin : BPJS

		Nitrokaf retard 25mg Simvastatin 20mg
Kekuatan :	Ada	Glucosamine 500mg Vit b complex Nitrokaf retard 25mg Simvastatin 20mg
Bentuk sed. :	Ada	Glucosamine 500mg tab Vit b complex tab Nitrokaf retard 25mg kapsul Simvastatin 20mg tab
Jumlah obat :	Ada	Glucosamine 500mg 5 tab Vit b complex 30 tab Nitrokaf retard 25mg 60 kapsul Simvastatin 20mg 30 tab
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada	Glucosamine s 1dd1 pc Vit b complex s 1dd1 pc Nitrokaf retard s 2dd1 pc Simvastatin s 1dd1 pc malam
Tanggal penulisan resep :	Ada	10-2-2025
Nama dokter :	Ada	Dr. Nisa Kurnia Ramadani, Sp.JP
Surat ijin :	Ada	503.446/878/B/IP.DS/436.7.15/2022
Alamat dr. :	Tidak Ada	-

d. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Glucosamine 500mg 5 tab
Vit b complex 30 tab
Nitrokaf retard 25mg 60 kapsul
Simvastatin 20mg 30 tab

c. Perhitungan biaya resep

Glucosamine 500mg :24000
Vit b complex : 9000
Nitrokaf retard 25mg : 300000
Simvastatin 20mg :21000

Embalase: 1000
Total: 355000

d. ETIKET

10-02-2025
Nama : Tn. K
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Glucosamine 500mg
sehari 1 kali 1 tab
Sesudah makan

10-02-2025
Nama : Tn. K
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Vit b complex
sehari 1 kali 1 tab
Sesudah makan

10-02-2025
Nama : Tn. K
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Nitrokaf retard 25mg
sehari 2 kali 1 tab
Sesudah makan

10-02-2025
Nama : Tn. K
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Simvastatin 20mg
sehari 1 kali 1 tab
Sesudah makan
malam

e. *Product knowledge*


Nama Obat : simvastatin 20mg Kandungan : simvastatin 20mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: mengurangi kadar kolesterol total dan ldl, sebagai anti hipertensi primer maupun sekunder Kategori: Sistem Kardiovaskuler & Hematopoietik Dosis: 1x1 Sehari Penyajian: malam hari sebelum tidur Cara Penyimpanan: simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung Perhatian: gangguan hepatik akut, peningkatan sgot/sgpt tanpa penjelasan, hamil dan laktasi Efek	Nama Obat : glucosamine 500mg Kandungan : glucosamine 500mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: memelihara kesehatan persendian Kategori: Sistem Muskuloskeletal Dosis: 1x1 Sehari Penyajian: sesudah makan Cara Penyimpanan: Simpan pada suhu 30 derajad Celcius, terhindar drai cahaya matahari secara langsung. Perhatian: hipersensitif terhadap bahan aktif obat, Pasien dengan / toleransi glukosa terganggu, DM tidak terkontrol, risiko penyakit CV, asma. Kehamilan dan menyusui. Efek Samping: Eksaserbasi

		Samping: kejang otot, mialgia, tremor, pusing, vertigo, gangguan kulit, hilangnya daya ingat	asma, hiperkolesterolemia, peningkatan resistensi insulin. Sakit kepala, kelelahan, kantuk. Mulas, perut kembung, sakit perut, diare, sembelit, dispepsia. Pruritus, ruam, angioedema, urtikaria.
		Nama Obat : vit b complex Kandungan : vit b complex Indikasi / Manfaat / Kegunaan: Mendukung kesehatan sel, meningkatkan energi, fungsi saraf dan kesehatan jantung. Kategori: Vitamin dan Mineral Dosis: 1x1 Sehari Penyajian: Dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Cara Penyimpanan: Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung. Perhatian: Hentikan pemakaian jika terjadi efek yang tidak diinginkan.	Nama Obat : nitrokaf retard 25mg Kandungan : Glyceryl trinitrate 25 mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: Pencegahan dan terapi jangka panjang angina pektoris Kategori: Sistem Kardiovaskuler & Hematopoietik Dosis: 1x2 Sehari Penyajian: Berikan 1 jam sebelum makan Perhatian: Anemia berat, trauma kepala, peningkatan TIK, pendarahan otak, glaukoma, kegagalan sirkulasi akut, hipotensi, syok kardiogenik, pemberian bersama sildenafil. Hamil Efek Samping: Hipotensi ortostatik, refleks takikardi, kolaps yang dapat disertai dengan aritmia bradikardi, sakit kepala, mengantuk, kemerahan pada kulit. Dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi dan menjalankan mesin

f. Tahap pembuatan

1. Melakukan skrining resep
2. Mengecek kesetersediaan obat
3. Menghitung harga obat
4. Mengambil obat Glucosamine 500mg 5 tab Vit b complex 30 tab Nitrokaf retard 25mg 60 kapsul Simvastatin 20mg 30 tab di rak maisng-masing
5. Menulis etiket Glucosamine s 1dd1 pc Vit b complex s 1dd1 pc Nitrokaf retard s 2dd1 pc Simvastatin s 1dd1 pc malam
6. Memasukkan obat & etiket kedalam plastik klip
7. Dilakukan KIE oleh dokter

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

A = Apoteker
P = Pasien
A : Atas nama Tuan K dari poli jantung.
P : Iya, saya.
A : Boleh disebutkan tanggal lahir dan alamatnya Pak?
P : dd-mm-yyyy, jalan xxx
A : Baik, ini bapak mendapatkan obat Glucosamine sehari 1 kali 1 tablet sesudah makan untuk vitamin sendi, Vit b complex sehari 1 kali 1 tablet sesudh makan, Nitrokaf retard sehari 2 kali 1 tablet sesudah makan untuk nyeri dada, Simvastatin sehari 1 kali 1 sesudah makan waktu malam. Apakah sudah paham bapak?
P : Oh, begitu. Iya mbak, terima kasih.
A : Sama-sama pak, semoga lekas sembuh.</td>
</tr>
<tr>
<td>26.</td>
<td>Jenis Resep : Resep asli (Iter)
Resep obat : Non racikan
Jumlah obat dalam resep : 3
Pengulangan resep : Iter 1x
Tempel Resep/salin resep disini!
 
</td>
<td>a. Skrinning Administrasi
<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada</td><td>Tn. L</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada</td><td>55 kg</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada</td><td>Cetirizine 10mg
Desoximetasone cr 15g
Acarbose 50mg</td></tr>
<tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada</td><td>Cetirizine 10mg
Desoximetasone cr 15g
Acarbose 50mg</td></tr>
<tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada</td><td>Cetirizine 10mg tablet
Desoximetasone cream
Acarbose 50mg tablet</td></tr>
<tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada</td><td>Cetirizine 10mg 10 tablet
Desoximetasone cr 15g 1 tube
Acarbose 50mg 30 tablet</td></tr>
<tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada</td><td>Cetirizine s 1dd1 pc</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>

		Desoximetasone cr 15g s 3dd ue Acarbose 50mg 1 dd1 pc
Tanggal penulisan resep :	Ada	11-3-2025
Nama dokter :	Ada	Dr. Chyntiadewi Maharani Putri, Sp.PD
Surat ijin :	Ada	500.16.7.2/2035/B/IP.DS/436.7.15/2024
Alamat dr. :	Tidak Ada	-

b. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Cetirizine 10mg 10 tablet
Desoximetasone cr 15g 1 tube
Acarbose 50mg 30 tablet

c. Perhitungan biaya resep

Cetirizine 10mg : 6000
Desoximetasone cr 15g : 20000
Acarbose 50mg : 75000
Embalase: 1000
Totall: 102000

d. ETIKET

11-03-2025
Nama : Tn. L
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Cetirizine 10mg
Sehari 1 kali 1 tab
Sesudah makan

17-02-2025
Nama : Ny. A
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Desoximetasone cr 15g
Sehari 3 kali oles tipis
OBAT LUAR

11-03-2025
Nama : Tn. L
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Acarbose 50mg
Sehari 1 kali 1 tab
Sesudah makan

		e. *Product knowledge* Nama Obat : cetirizine 10mg Kandungan : cetirizine 10mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: Rinitis musiman atau tahunan, urtikaria idiopatik kronik. Kategori: Alergi dan Sistem Imun Dosis: • Usia >12 th: 10 mg (1 tablet per hari). • Anak 6-11 tahun: 5-10 mg (1/2-1 tablet per hari). • Anak 2-5 th: 2,5-5 mg (1/4-1/2 tablet per hari). Penyajian: Dikonsumsi sebelum atau setelah makan. Cara Penyimpanan: Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung. Perhatian: • Wanita hamil dan menyusui. • Anak-anak. Efek Samping: • Gangguan jantung: Takikardia. • Gangguan pencernaan: Nyeri perut, mulut kering, mual, diare, muntah. • Gangguan umum dan kondisi tempat administrasi: Kelelahan, asthenia, malaise, edema. • Gangguan sistem saraf: Pusing, sakit kepala, kejang-kejang, agitasi.
		Nama Obat : desoximethasone cr 15 g Kandungan : desoximethasone Indikasi / Manfaat / Kegunaan: Meredakan gejala peradangan dan gatal pada dermatitis yang responsif terhadap kortikosteroid. Kategori: Kulit Dosis: Sesuai dengan petunjuk dokter atau 1-2 kali sehari pada area kulit yang terinfeksi. Penyajian: Oleskan tipis pada area yang membutuhkan. Cara Penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung. Perhatian: -Hanya untuk penggunaan luar, tidak untuk mata. -Konsultasikan kepada dokter jika akan digunakan untuk anak-anak atau bayi, ibu menyusui dan wanita hamil. -Penggunaan jangka panjang -Hindari penggunaan sekitar mata. Efek Samping: Sensasi perih, terbakar, dan gatal pada kulit, kulit kering, iritasi, pertumbuhan rambut yang tidak diinginkan, pembengkakan.
		Nama Obat : acarbose 50mg Kandungan : acarbose 50mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: Terapi kombinasi dengan diet untuk DM Kategori: Sistem Endokrin dan Metabolik Dosis: 1x1 Sehari Penyajian: Berikan bersama dengan suapan pertama makanan utama Cara Penyimpanan: Simpan di tempat yang kering dan terlindung dari cahaya Perhatian: Monitor fungsi hati selama 6-12 bulan pertama terapi, anak < 18 tahun Efek Samping: Sering terjadi : kembung, bising usus meningkat. Kadang terjadi :

		diare dan nyeri abdomen. Gejala pada lambung dan abdomen yang tidak spesifik |

f. Tahap pembuatan

1. Melakukan skrining resep
2. Mengecek kesetersediaan obat
3. Menghitung harga obat dan embalase
4. Mengambil obat Cetirizine 10mg 10 tablet Desoximetasone cr 15g 1 tube Acarbose 50mg 30 tablet di rak masing-masing
5. Menulis etiket Cetirizine s 1dd1 pc Desoximetasone cr 15g s 3dd ue Acarbose 50mg 1 dd1 pc
6. Memasukkan obat & etiket kedalam plastik
7. Dilakukan KIE oleh dokter

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)


A = Apoteker
P = Pasien

A : Atas nama Tn. L dari poli penyakit dalam.
P : Iya, saya.
A : Boleh disebutkan tanggal lahir dan alamatnya Pak?
P : dd-mm-yyyy, jalan xxx
A : Baik, ini bapak mendapatkan obat Cetirizine sehari 1 kali 1 tablet sesudah makan, Desoximetasone cr 15g sehari 3 kali 1 oles tipis di kulit, Acarbose 50mg sehari 1 kali 1 tablet sesudah makan untuk diabetes. Apakah sudah paham bapak?
P : Oh, begitu. Iya mbak, terima kasih.
A : Sama-sama pak, semoga lekas sembuh.

27.	Jenis Resep : Resep asli (Lainnya) Resep obat : Non racikan Jumlah obat dalam resep : 1 Pengulangan resep : Neiter	c. Skrinning Administrasi

Nama Pasien :	Ada	Nn. B
Umur pasien :	Ada	23 Th
Berat Badan :	Ada	64 kg

Tempel Resep/salin resep disini!



RUMAH SAKIT ISLAM DARUS SYIFA` SURA
Jl. Raya Benowo No.5, Benowo, Kec. Pakal, Kot
Telp. (031) 7406293, Fax. (031) 742284

Dokter : dr. UMAR NUR RACHMAN, Sp.PD
SIP/SIK Dokter : 503.446/861/B/IP.DS/436.7.17/2021
Poli / Ruang : Poli Spesialis Penyakit Dalam
Riwayat Alergi : Ada, Tidak ada

Surabaya, 12-02-2025

R/ CURCUMA TAB NO VII
S 1 dd 1 Tab pc Po

Nama : [redacted]
Umur : 23 thn 9 bln 5 hr
Berat Badan : 64 Kg
Alamat : [redacted]
No. RM : [redacted]
Penjamin : BPJS

Nama Obat :	Ada	Curcuma tab
Kekuatan :	Ada	-
Bentuk sed. :	Ada	Curcuma tablet
Jumlah obat :	Ada	Curcuma 7 tablet
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada	S 1dd1 pc
Tanggal penulisan resep :	Ada	12-2-2025
Nama dokter :	Ada	dr. Umar Nur Rachman, Sp.PD
Surat ijin :	Ada	503.446/861/B/IP.DS/436.7.17/2021
Alamat dr. :	Tidak Ada	-

d. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Curcuma 7 tablet

c. Perhitungan biaya resep

Curcuma tab: 56000
Embalase: 1000
Total: 57000


d. ETIKET

17-02-2025
Nama : Ny. A
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Curcuma tab
Sehari 1 kali 1 tab
Sesudah makan

e. *Product knowledge*

Nama Obat : curcuma tab Kandungan : ekstrak curcuma xanthorrhiza 20 mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: memperbaiki nafsu makan dan	

		memelihara fungsi hati Kategori: Nutrisi Dosis: 3 x sehari 1-2 tablet f. Tahap pembuatan 1. Melakukan skrining resep 2. Mengecek kesetersediaan obat 3. Menghitung harga obat dan embalase 4. Mengambil obat curcuma 7 tablet di rak 5. Menulis etiket s 1dd1 pc 6. Memasukkan obat & etiket kedalam plastik 7. Dilakukan KIE oleh dokter **A = Apoteker** **P = Pasien** A : Atas nama Nn. B dari poli penyakit dalam. P : Iya, saya. A : Boleh disebutkan tanggal lahir dan alamatnya mbak? P : dd-mm-yyyy, jalan xxx A : Baik, ini mbak mendapatkan obat curcuma sehari 1 kali 1 tablet sesudah makan untuk menambah nafsu makan. Apakah sudah paham mbak? P : Oh, begitu. Iya mbak, terima kasih. A : Sama-sama pak, semoga lekas sembuh.
28.	Jenis Resep : Resep asli (Lainnya) Resep obat : Non racikan Jumlah obat dalam resep : 1 Pengulangan resep : Neiter Tempel Resep/salin resep disini!	a. Skrinning Administrasi Nama Pasien : Ada — Tn. M Umur pasien : Ada — 45 Th Berat Badan : Ada — 59 kg Nama Obat : Ada — Santa E 100mg Kekuatan : Ada — Santa E 100mg Bentuk sed. : Ada — Santa E 100mg tablet Jumlah obat : Ada — Santa E 100mg 30 tablet Duplikasi terapi : Tidak Ada — - Aturan pakai : Ada — S 1dd1 pc Tanggal penulisan resep : Ada — 11-3-2025



Nama dokter :	Ada	dr. Chairun Nur Prasetya, Sp.B
Surat ijin :	Ada	503.446/02351/II/IP.DS/436.7.2/2020
Alamat dr. :	Tidak Ada	-

b. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Santa E 100mg 30 tablet

c. Perhitungan biaya resep

Santa E 100mg: 30000
Embalase: 1000
Total: 31000

d. ETIKET


11-03-2025
Nama : Tn. M
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Santa E 100mg
Sehari 1 kali 1 tab
Sesudah makan

e. *Product knowledge*

Nama Obat : santa e 100mg Kandungan : vitamin E Indikasi / Manfaat / Kegunaan: Defisiensi vitamin E. Kategori: Vitamin dan Mineral Dosis: 1x1 Sehari Penyajian: Sebaiknya diberikan bersama makanan. Cara Penyimpanan: simpan di tempat yang sejuk dan kering, serta terlindung dari panas dan sinar matahari langsung Perhatian: Hamil.	

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>f. Tahap pembuatan
1. Melakukan skrining resep
2. Mengecek kesetersediaan obat
3. Menghitung harga obat
4. Mengambil obat santa E 100mg 30 tab di rak
5. Menulis etiket s 1dd1 pc
6. Memasukkan obat & etiket kedalam plastik klip
7. Dilakukan KIE oleh dokter

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)
A = Apoteker
P = Pasien
A : Atas nama Tuan M dari poli bedah.
P : Iya, saya.
A : Boleh disebutkan tanggal lahir dan alamatnya Pak?
P : dd-mm-yyyy, jalan xxx
A : Baik, ini bapak mendapatkan obatsanta e sehari 1 kali 1 tablet sesudah makan untuk vitamin. Apakah sudah paham bapak?
P : Oh, begitu. Iya mbak, terima kasih.
A : Sama-sama pak, semoga lekas sembuh.</td>
</tr>
<tr>
<td>29.</td>
<td>Jenis Resep : Resep asli (Lainnya)
Resep obat : Non racikan
Jumlah obat dalam resep : 3
Pengulangan resep : Neiter
Tempel Resep/salin resep disini!</td>
<td>a. Skrinning Administrasi
<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada</td><td>Ny. J</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada</td><td>28 Th</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada</td><td>59 kg</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada</td><td>Inbion
Kalnek 500mg
Mefinter 500mg</td></tr>
<tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada</td><td>Inbion -
Kalnek 500mg
Mefinter 500mg</td></tr>
<tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada</td><td>Inbion kapsul</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>



RUMAH SAKIT ISLAM DARUS SYIFA` SURABAYA
Jl. Raya Benowo No.5, Benowo, Kec. Pakal, Kota Sura
Telp. (031) 7406293, Fax. (031) 7422842

Dokter : dr. RINI YULIANTI, Sp.OG
SIP/SIK Dokter : 503.446/01338/I/IP.DS/436.7.2/2021
Poli / Ruang : Poli Spesialis Kandungan
Riwayat Alergi : Tidak Ada

Surabaya, 21-02-2025

R| INBION KAP NO XX
S 2 dd 1 Caps pc Po
R| KALNEK 500 mg TAB NO XX
S 3 dd 1 Tab pc Po
R| MEFINTER 500 TAB NO XX
S 3 dd 1 Tab pc Po

Nama : [redacted]
Umur : 28 thn 8 bln 14 hr
Berat Badan : 89.9 Kg
Alamat : [redacted]
No. RM : [redacted]
Penjamin : UMUM

		Kalnek 500mg tab Mefinter 500mg tab
Jumlah obat :	Ada	Inbion 20 kapsul Kalnek 500mg 20 tab Mefinter 500mg 20 tab
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	
Aturan pakai :	Ada	Inbion s 2dd1 caps pc Kalnek 500mg s 3dd1 pc Mefinter 500mg s 3dd1 pc
Tanggal penulisan resep :	Ada	21-2-2025
Nama dokter :	Ada	Dr. Rini Yulianti, Sp.OG
Surat ijin :	Ada	503.446/01338/I/IP.DS/436.7.2/2021
Alamat dr. :	Tidak Ada	-

b. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Inbion 20 kapsul
Kalnek 500mg 20 tab
Mefinter 500mg 20 tab

c. Perhitungan biaya resep

Inbion : 96000
Kalnek 500mg : 120000
Mefinter 500mg: 70000
Embalase: 1000
Total: 287000

d. ETIKET

21-02-2025
Nama : Ny. J
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Inbion
Sehari 2 kali 1 capsul
Sesudah makan

21-02-2025
Nama : Ny. J
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Kalnek 500mg
Sehari 3 kali 1 tab
Sesudah makan

21-02-2025
Nama : Ny. J
No. RM : xxxxxx
Tgl Lahir : dd-mm-yyyy
Mefinter 500mg
Sehari 3 kali 1 tab
Sesudah makan

e. *Product knowledge*

Nama Obat : inbion kap Kandungan : Fe gluconate 250 mg, Manganese sulfate 200 mcg, Copper sulfate 200 mcg, Vit C 50 mg, Folic acid 1 mg, Vit B12 dengan faktor intrinsik 7,5 mcg, Sorbitol 25 mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: Anemia akibat kekurangan zat besi, selama masa pertumbuhan, hamil, menyusui, malnutrisi, & lain-lain. Kategori: Vitamin dan Mineral Dosis: 1x1 Sehari Penyajian: Sebaiknya diberikan bersama makanan.	Nama Obat : kalnek 500mg Kandungan : asam traneksamat 500 mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: pendarahan abnormal sesudah operasi, pendarahan sesudah operasi gigi pada penderita hemofilia, pendarahan abnormal pada saat menstruasi Kategori: Sistem Kardiovaskuler & Hematopoietik Dosis: dewasa : 3 - 4 x 1 tablet Penyajian: sebelum / sesudah makan Cara Penyimpanan: simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung Efek Samping: gangguan pencernaan, mual, pusing, muntah, hilang nafsu makan, sakit kepala
Nama Obat : mefinter 500mg Kandungan : asam mefenamat 500mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: demam, sakit gigi, mialgia, nyeri telinga, nyeri pasca operasi, reumatik, bursitis, dan dismenore Kategori: Sistem Saraf Pusat Dosis: dewasa dan anak >14th awal 500mg. dilanjutkan 250mg setiap 6jam. maksimal 7 hari Penyajian: diminum segera sesudah makan Perhatian: hamil, dehidrasi, epilepsi, asma Efek Samping: gangguan dan pendarahan pada gastrointestinal, tukak peptik, sakit	

		kepala, mengantuk, pusing,cemas, gangguan penglihatan, ruam kulit, diskrasia darah (gangguan sel plasma), nefropati (kerusakan pada ginjal)		

f. Tahap pembuatan

1. Melakukan skrining resep
2. Mengecek kesetersediaan obat
3. Menghitung harga obat
4. Mengambil obat Inbion 20 kapsul Kalnek 500mg 20 tab Mefinter 500mg 20 tab di rak masing-masing
5. Menulis etiket Inbion s 2dd1 caps pc Kalnek 500mg s 3dd1 pc Mefinter 500mg s 3dd1 pc
6. Memasukkan obat & etiket kedalam plastik klip
7. Dilakukan KIE oleh dokter


g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

A = Apoteker
P = Pasien

A : Atas nama Ny. J dari poli kandungan.
P : Iya, saya.
A : Boleh disebutkan tanggal lahir dan alamatnya bu?
P : dd-mm-yyyy, jalan xxx
A : Baik, ini bu mendapatkan obat Inbion sehari 2 kali 1 caps sesudah makan, Kalnek 500mg sehari 3 kali 1 tab sesudah makan, Mefinter 500mg sehari 3 kali 1 tab sesudah makan. Apakah sudah paham bu?
P : Oh, begitu. Iya mbak, terima kasih.
A : Sama-sama bu, semoga lekas sembuh.

30.

Jenis Resep : Resep asli (Lainnya)
Resep obat : Non racikan
Jumlah obat dalam resep : 2
Pengulangan resep : Neiter
Tempel Resep/salin resep disini!



RUMAH SAKIT ISLAM DARUS SYIFA' SURABAYA
Jl. Raya Benowo No.5, Benowo, Kec. Pakal, Kota Su
Telp. (031) 7406293, Fax. (031) 7422842

: dr. ULULIL CHUSAIDA WANUDYAHATI, Sp.M
SIK Dokter : 503.446/674/B/IP.DS/436.7.15/2022
/ Ruang : Poli Spesialis Mata
ayat Alergi : Tidak Ada

Surabaya, 11-02-2025

R/ CENDO CATARLENT 15ml NO I
S 4 dd 1 ods
R/ BERRY VISION NO V
S 1 dd 1

Nama : [redacted]
Umur : 60 thn 5 bln 27 hr
Berat Badan : 78 Kg
Alamat : [redacted]
No. RM : [redacted]
Penjamin : BPJS

a. Skrinning Administrasi

Nama Pasien :	Ada	Ny. K
Umur pasien :	Ada	60 Th
Berat Badan :	Ada	78 kg
Nama Obat :	Ada	Cendo catarlent 15ml Berry vision
Kekuatan :	Ada	Cendo catarlent 15ml - Berry vision -
Bentuk sed. :	Ada	Cendo catarlent 15ml tetes mata Berry vision tab
Jumlah obat :	Ada	Cendo catarlent 15ml 1 tube Berry vision 5 tab
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada	Cendo catarlent s 4dd1 mata kanan dan kiri Berry vision s 1dd1
Tanggal penulisan resep :	Ada	11-2-2025
Nama dokter :	Ada	Dr. Ululil Chusaida Wanudyahati, Sp.M
Surat ijin :	Ada	503.446/674/B/IP.DS/436.7.15/2022
Alamat dr. :	Tidak Ada	-

b. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Cendo catarlent 15ml 1 tube
Berry vision 5 tab

c. Perhitungan biaya resep

Cendo catarlent 15ml: 43000
Berry vision tab: 15000
Embalase: 1000
Total: 59000

d. ETIKET

11-02-2025 Nama : Ny. K No. RM : xxxxxx Tgl Lahir : dd-mm-yyyy Berry vision sehari 1 kali 1 tablet Sesudah makan	11-02-2025 Nama : Ny. K No. RM : xxxxxx Tgl Lahir : dd-mm-yyyy Cendo catarlent sehari 4 kali 1 tetes Mata kanan dan kiri

e. *Product knowledge*

Nama Obat : cendo catarlent 15ml Kandungan : K-iodida 5 mg, k-klorida 5 mg, na-tiosulfat 0,5 mg, timerosal 0,0002 mg/ml Indikasi / Manfaat / Kegunaan: katarak lentikularis, pendarahan dalam vitreous humour, opesifikasi vitreous humour Kategori: Mata Dosis: 3 x sehari 1-2 tetes pada mata Penyajian: diteteskan pada mata	Nama Obat : berry vission Kandungan : Ekstr bilberry kering 40 mg, retinol 800 IU, beta-carotene 2,5 mg, Vitamin E 20 mg Indikasi / Manfaat / Kegunaan: Terapi suportif untuk memelihara kesehatan mata Kategori: Nutrisi Dosis: 2-3 kali sehari 1 tablet Penyajian: Diberikan sesudah atau bersama dengan makan Cara Penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung

f. Tahap pembuatan

1. Melakukan skrining resep
2. Mengecek kesetersediaan obat
3. Menghitung harga obat dan embalase
4. Mengambil obat Cendo catarlent 15ml 1 tube Berry vision 5 tab di rak maisng-masing
5. Menulis etiket Cendo catarlent s 4dd1 mata kanan dan kiri Berry vision s 1dd1
6. Memasukkan obat & etiket kedalam plastik
7. Dilakukan KIE oleh dokter

		g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal) **A = Apoteker** **P = Pasien** A : Atas nama Ny. K dari poli mata. P : Iya, saya. A : Boleh disebutkan tanggal lahir dan alamatnya bu? P : dd-mm-yyyy, jalan xxx A : Baik, ini bu mendapatkan obat berry vision vitamin mata diminum sehari 1 kali 1 tablet dan cendo catarlent sehari 4 kali 1 tetes di mata kiri dan kanan. Apakah sudah paham bu? P : Oh, begitu. Iya mbak, terima kasih. A : Sama-sama bu, semoga lekas sembuh.

B. *PRODUCT KNOWLEDGE* BERDASARKAN KELAS TERAPI

(1) ANALGETIK- ANTIPIRETIK- ANTIINFLAMASI

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Analgetik-Antipiretik-Antiinflamasi	acetaminophen,	sanmol	Alergi terhadap paracetamol, gangguan fungsi hati berat	Demam, nyeri ringan hingga sedang (sakit kepala, nyeri otot, dll.)	Dewasa: 500–1000 mg setiap 4–6 jam; maks. 4 g/hari	Mual, ruam kulit, kerusakan hati jika overdosis	Simpan di **suhu ruang** (15–30°C), kering, dan terlindung dari cahaya
	metampiron,	Antalgin, santagesik	Alergi terhadap metamizole, gangguan sumsum tulang, porfiria akut	Nyeri sedang hingga berat, demam tinggi yang tidak responsif	Dewasa: 500–1000 mg, 3–4 kali/hari; maksimal 4 g/hari	Alergi, agranulositosis (jarang tapi serius), tekanan darah rendah	Simpan di **suhu ruang** (15–25°C), terlindung dari cahaya
	ibuprofen,	Ibuprofen	Alergi NSAID, tukak lambung aktif, gagal ginjal berat	Nyeri, peradangan, demam, nyeri haid	Dewasa: 200–400 mg setiap 4–6 jam; maksimal 1200–2400 mg/hari	Mual, gangguan lambung, pusing, sakit maag	Simpan di **suhu ruang** (15–30°C), tempat kering dan tidak lembap
	diklofenak,	Diflam, sodium diclofenac	Alergi NSAID, tukak lambung, gagal jantung/gagal ginjal berat	Nyeri sendi, nyeri otot, arthritis (radang sendi)	Dewasa: 25–50 mg, 2–3 kali/hari; maksimal 150 mg/hari	Gangguan lambung, tekanan darah naik, gangguan hati	Simpan di **suhu ruang** (15–30°C), jauh dari sinar matahari langsung
	asam mefenamat,	Mefinal, mefinter	Tukak lambung, asma yang dipicu NSAID, gangguan ginjal berat	Nyeri ringan hingga sedang, nyeri haid	**Dewasa**: 500 mg awal, lalu 250 mg setiap 6 jam; maks. 1 g/hari **Anak** (≥14 tahun): Sama seperti dewasa	Gangguan lambung, mual, pusing, diare	Simpan di **suhu ruang** (15–30°C), kering dan terlindung dari cahaya

	piroxicam,	Piroxicam	Tukak lambung, gagal ginjal/ jantung berat, alergi NSAID	Osteoartritis, rheumatoid arthritis, nyeri muskuloskeletal	**Dewasa**: 10–20 mg/hari sekali minum	Mual, dispepsia, tukak lambung, sakit kepala	Simpan di **suhu ruang** (15–30°C), tempat kering
	aspirin,	Proxime	Tukak lambung, gangguan perdarahan, anak dengan demam (risiko Reye syndrome)	Nyeri, demam, antiplatelet (dosis rendah)	**Dewasa**: 325–650 mg tiap 4–6 jam (analgesik); 75–325 mg/hari (antiplatelet) **Anak**: Tidak disarankan untuk demam	Iritasi lambung, perdarahan, tinnitus, bronkospasme	Simpan di **suhu ruang** (15–30°C), terlindung dari kelembapan
	meloksikam,	Meloxicam	Tukak lambung, gagal ginjal/hati berat, alergi NSAID	Osteoartritis, rheumatoid arthritis	**Dewasa**: 7.5–15 mg sekali sehari **Anak** (≥2 tahun, bentuk suspensi): 0.125 mg/kg/hari	Dispepsia, sakit kepala, peningkatan enzim hati	Simpan di **suhu ruang** (15–30°C), kering dan tertutup rapat
	celecoxib,	Celecoxib	Alergi sulfonamida, gagal jantung/renal/hepatik berat	Osteoartritis, rheumatoid arthritis, nyeri akut	**Dewasa**: 100 mg 2x/hari atau 200 mg 1x/hari **Anak** (≥2 tahun, juvenile arthritis): 50–100 mg 2x/hari tergantung berat badan	Hipertensi, gangguan lambung, ruam, edema	Simpan di **suhu ruang** (15–30°C), tempat kering dan tertutup
	etoricoxib.	acnopain	Hipertensi tidak terkontrol, tukak lambung aktif, gangguan ginjal berat	Nyeri otot, arthritis, asam urat akut	**Dewasa**: 60–120 mg 1x/hari tergantung indikasi **Anak**: Tidak direkomendasikan	Hipertensi, gangguan lambung, sakit kepala, retensi cairan	Simpan di **suhu ruang** (15–30°C), terlindung dari cahaya dan kelembapan

(2) ANTIMIKROBA

(2.a) ANTIBIOTIK

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Penisilin	Ampicillin,	Ampicillin	Alergi terhadap penisilin, gangguan fungsi hati berat	Infeksi saluran napas, saluran kemih, infeksi saluran cerna, meningitis	Dewasa: 250–500 mg tiap 6 jam Anak: 50–100 mg/kgBB/hari terbagi tiap 6 jam	Diare, ruam, reaksi alergi	Simpan di suhu ruang (15–30°C); sediaan suspensi simpan di kulkas (2–8°C), habiskan dalam 7 hari
	amoksisilin,	Intermoxil	Alergi terhadap penisilin	Infeksi saluran napas, telinga, urin	Dewasa: 250–500 mg tiap 8 jam Anak: 20–40 mg/kg/hari terbagi dalam 3 dosis	Diare, ruam, mual	Simpan di suhu ruang (15–30°C), terlindung dari cahaya
Cephalosporin	cefadroxil,	Cefat	Alergi terhadap sefalosporin	Faringitis, tonsilitis, infeksi kulit	Dewasa: 1–2 g/hari dalam 1–2 dosis Anak: 30 mg/kgBB/hari	Mual, muntah, diare	Simpan di suhu ruang (15–30°C), suspensi di kulkas (2–8°C)
	cefixime,	Sporetik, cefilla	Alergi terhadap sefalosporin	Infeksi saluran kemih, otitis media	Dewasa: 200 mg/hari Anak: 8 mg/kgBB/hari	Sakit kepala, gangguan GI, ruam	Simpan di suhu ruang (15–30°C), suspensi di suhu dingin (2–8°C)
	cefotaxime	Cefotaxime	Alergi sefalosporin, hipersensitivitas	Infeksi berat (sepsis, meningitis)	Dewasa: 1–2 g tiap 6–8 jam (IV/IM) Anak: 50–180 mg/kgBB/hari terbagi dosis	Reaksi injeksi, ruam, diare	Simpan di suhu ruang sebelum rekonstitusi; setelah dilarutkan, simpan dingin (2–8°C),

							gunakan <24 jam
Chloramphenicol	*kloramfenikol,	kloramfenikol	Hipersensitivitas, neonatus	Infeksi berat, tifoid	Dewasa: 500 mg tiap 6 jam Anak: 50–100 mg/kgBB/hari	Anemia aplastik, gray baby syndrome (bayi)	Simpan di suhu ruang (15–25°C), jauh dari cahaya
	thiamfenicol	Biothicol, solatim	Gangguan sumsum tulang	Tifoid, infeksi saluran napas	Dewasa: 500 mg tiap 6–8 jam Anak: 25–50 mg/kgBB/hari	Mual, diare, penurunan sel darah	Simpan di suhu ruang (15–30°C)
Macrolides dan Lincosamide	eritromisin,	Erysanbe	Gangguan hati berat	Infeksi saluran napas, kulit	Dewasa: 250–500 mg tiap 6 jam Anak: 30–50 mg/kgBB/hari	Mual, muntah, diare	Simpan di suhu ruang (15–30°C), suspensi di kulkas
	azitromisin,	Azithromicyn	Alergi makrolida	ISPA, infeksi kulit, klamidia	Dewasa: 500 mg hari 1, lalu 250 mg/hari selama 4 hari Anak: 10 mg/kgBB hari 1, lalu 5 mg/kgBB 4 hari	Gangguan GI, sakit kepala	Simpan di suhu ruang (15–30°C)
	*klaritromisin,	klaritromisin	Gangguan hati berat, QT panjang	Faringitis, bronkitis, sinusitis	Dewasa: 250–500 mg tiap 12 jam Anak: 7.5 mg/kgBB tiap 12 jam	Gangguan pencernaan, rasa logam di mulut	Simpan di suhu ruang, suspensi di kulkas
	klindamisin	clindamicyn	Alergi lincosamida, diare kolitis	Infeksi anaerob, abses, tulang	Dewasa: 150–450 mg tiap 6–8 jam Anak: 8–25 mg/kgBB/hari terbagi	Diare, kolitis, ruam	Simpan di suhu ruang (15–30°C)
Aminoglikosida	neomisin,	Betason-n	Alergi aminoglikosida,	Infeksi saluran cerna (oral),	**Dewasa (oral)**: 1 g tiap 6 jam (dalam persiapan	Nefrotoksik, ototoksik, dermatitis kontak (topikal)	Simpan di suhu ruang (15–25°C), jauh dari

			gangguan ginjal, obstruksi usus	topikal untuk infeksi kulit	operasi usus) **Topikal**: 2–4 kali sehari **Anak**: tidak direkomendasikan secara sistemik		cahaya dan kelembapan
	gentamisin	sagestam	Gangguan ginjal, hamil (trimester awal), alergi aminoglikosida	Infeksi berat: sepsis, infeksi saluran kemih	**Dewasa**: 3–5 mg/kg/hari IV/IM terbagi dosis **Anak**: 2–2.5 mg/kg tiap 8 jam	Nefrotoksik, ototoksik	Simpan di suhu ruang (15–25°C)
Quinolones	ciprofloxacin,	Baquinor	Alergi quinolon, anak <18 tahun (kecuali kondisi khusus)	Infeksi saluran kemih, prostat, saluran napas	**Dewasa**: 250–750 mg tiap 12 jam **Anak**: 10–20 mg/kg tiap 12 jam (kasus spesifik)	Gangguan GI, pusing, fotosensitif	Simpan di suhu ruang (15–30°C), jauh dari cahaya
	levofloxacin	Levocin	Alergi, epilepsi, gangguan tendon	Pneumonia, infeksi kulit, saluran kemih	**Dewasa**: 500–750 mg 1x/hari	Gangguan tidur, mual, tendonitis	Simpan di suhu ruang (15–30°C)
Tetrasiklin	Tetrasiklin,	Tetrasiklin	Anak <8 tahun, hamil, gangguan hati	Jerawat, infeksi saluran napas, kolera	**Dewasa**: 250–500 mg tiap 6 jam **Anak**: tidak disarankan	Dispepsia, fotosensitivitas, perubahan warna gigi	Simpan di suhu ruang (15–30°C),
	doksisiklin,	Interdoxin	Anak <8 tahun, kehamilan	Malaria, infeksi saluran napas, ISK	**Dewasa**: 100 mg tiap 12 jam hari pertama, lalu 100 mg/hari **Anak** (>8 tahun): 2.2 mg/kg tiap 12 jam	Gangguan GI, fotosensitivitas	Simpan di suhu ruang (15–30°C)
	*minosiklin	minosiklin	Alergi tetrasiklin, gangguan hati	Jerawat, infeksi kulit	**Dewasa**: 100 mg tiap 12 jam **Anak**: tidak	Pusing, pigmentasi kulit, fotosensitif	Simpan di suhu ruang (15–30°C)

					direkomendasikan <8 tahun		
Sulfa	sulfametoksazol-trimetoprim	cotrimoxazol	Alergi sulfa, gangguan hati/ ginjal berat	ISK, bronkitis, otitis media	**Dewasa**: 2 tab (960 mg) tiap 12 jam **Anak**: 6–12 mg/kg/hari trimetoprim, terbagi 2 dosis	Ruam, mual, Stevens-Johnson syndrome	Simpan di suhu ruang (15–30°C), hindari cahaya

(2.b) ANTIJAMUR

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Polyenes	*amphotericin B,	amphotericin B	Gagal ginjal, hipokalemia, alergi obat	Kandidiasis sistemik, aspergilosis	Dewasa: 0,25–1 mg/kg/hari IV Anak: 0,5–1 mg/kg/hari IV	Nefrotoksik, demam, menggigil	Simpan di kulkas (2–8°C), lindungi dari cahaya
	Nistatin	Nystatin	Alergi nistatin	Kandidiasis oral, kulit, vagina	Dewasa: 100.000–400.000 IU 4x/hari (oral) Anak: 100.000 IU 4x/hari	Mual, diare, iritasi mulut	Simpan di suhu ruang (15–30°C)
Imidazole	ketoconazol,	interzol	Gangguan hati berat, hamil	Infeksi jamur kulit dan sistemik	Dewasa: 200–400 mg/hari oral Topikal: 1–2x sehari	Gangguan GI, hepatotoksik	Simpan di suhu ruang (15–30°C)
	mikonazol,	Miconazole	Alergi imidazole	Kandidiasis kulit, vagina	Topikal: 1–2x sehari, 7–14 hari	Iritasi, rasa terbakar	Simpan di suhu ruang (15–25°C)
	klotrimazol	klotrimazol	Alergi terhadap imidazole	Kandidiasis kulit, panu, jamur kaki	Topikal: 2–3x sehari selama 2–4 minggu	Iritasi lokal, kemerahan	Simpan di suhu ruang (15–30°C)

Triazole	flukonazol,	Fluconazole	Alergi azole, gangguan hati berat	Kandidiasis oral, vagina, sistemik	Dewasa: 150 mg dosis tunggal (vagina) Anak: 3–12 mg/kg/hari	Sakit kepala, ruam, hepatotoksik	Simpan di suhu ruang (15–30°C)
	Itraconazole	spirocon	Gagal jantung, gangguan hati	Jamur kuku, kandidiasis, aspergilosis	Dewasa: 100–200 mg/hari oral	Gangguan GI, hepatotoksik	Simpan di suhu ruang (15–30°C), hindari kelembaban
Lainnya	Griseofulvin	griseofulvin	Hamil, porfiria, gagal hati	Infeksi jamur kulit dan kuku	Dewasa: 500–1000 mg/hari Anak: 10–20 mg/kg/hari	Ruam, sakit kepala, fotosensitivitas	Simpan di suhu ruang (15–30°C)

(2.c) ANTIVIRUS

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
*Obat HIV-AIDS	NRTI (zidovudine, abacavir),	zidovudine, abacavir	Alergi obat, gangguan hati berat	HIV/AIDS	Dewasa: Zidovudine 300 mg 2x/hari; Abacavir 300 mg 2x/hari Anak: sesuai berat badan	Anemia, neutropenia, mual	Simpan di suhu ruang (15–25°C)
	NNRTI (efavirenz, nevirapine),	efavirenz, nevirapine	Alergi NNRTI, gangguan hati berat	HIV/AIDS	Efavirenz 600 mg/hari; Nevirapine 200 mg 1–2x/hari	Ruam, hepatotoksik, pusing	Simpan di suhu ruang (15–30°C)
	PI (saquinavir, indinavir)	saquinavir, indinavir	Alergi PI, gangguan hati	HIV/AIDS	Saquinavir 1000 mg 2x/hari; Indinavir 800 mg 3x/hari	Gangguan GI, batu ginjal	Simpan di suhu ruang (15–30°C)

Herpes virus	acyclovir	zoter	Alergi acyclovir	Herpes simpleks, herpes zoster	Dewasa: 200–800 mg 5x/hari Anak: 20 mg/kg, max 800 mg 4x/hari	Mual, sakit kepala	Simpan di suhu ruang (15–25°C)
Hepatitis B dan C	*interferon,	interferon	Gangguan hati berat, autoimun	Hepatitis B dan C kronis	3–10 juta IU 3x/minggu (subkutan)	Flu-like symptoms, depresi	Simpan di kulkas (2–8°C), jangan dibekukan
	lamivudine	lamivudine	Alergi lamivudine	Hepatitis B, HIV	100–300 mg/hari oral	Sakit kepala, mual, kelelahan	Simpan di suhu ruang (15–30°C)
*Influenza A dan Bvirus	amantadine,	amantadine,	Gangguan ginjal, kejang, hamil	Pencegahan dan terapi influenza A	Dewasa: 100 mg 2x/hari Anak: 5 mg/kg/hari, max 150 mg	Pusing, insomnia, mual	Simpan di suhu ruang (15–30°C)
	rimantadine,	rimantadine,	Sama seperti amantadine	Influenza A	100 mg 2x/hari	Insomnia, gangguan GI	Simpan di suhu ruang (15–30°C)
	oseltamivir	oseltamivir	Alergi oseltamivir	Influenza A dan B	Dewasa: 75 mg 2x/hari selama 5 hari Anak: 2–12 mg/kg 2x/hari	Mual, muntah, sakit perut	Simpan di suhu ruang (15–25°C)

(2.d) ANTIPROTOZOA

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antiamoeba	metronidazole	tricodazole	Hipersensitivitas, trimester 1 hamil	Amebiasis, giardiasis, trikomoniasis	Dewasa: 500 mg 2–3x/hari Anak: 30–50 mg/kg/hari dibagi 3 dosis	Mual, rasa logam, sakit kepala	Suhu ruang (15–30°C)

Antimalaria	*primaquine,	primaquine	Defisiensi G6PD, hamil	Malaria vivax dan ovale (hipnozoit)	Dewasa: 15 mg/hari selama 14 hari Anak: 0,3–0,5 mg/kg/hari selama 14 hari	Hemolisis, mual	Suhu ruang (15–30°C)
	*artemisinin,	artemisinin	Hipersensitivitas	Malaria falciparum	Dewasa: artesunate 100–200 mg/hari Anak: 4 mg/kg/hari	Pusing, mual, gangguan GI	Suhu ruang (15–30°C)
	doksisiklin	interdoxin	Anak <8 tahun, hamil trimester 2–3	Malaria (kombinasi), infeksi bakteri	Dewasa: 100 mg 2x/hari Anak >8 tahun: 2–4 mg/kg/hari	Fotosensitivitas, mual	Suhu ruang (15–30°C), di tempat yang kering

(2.e) ANTELMINTIK

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antelmintik	*albendazole,	albendazole	Hipersensitivitas, gangguan hati	Cacing gelang, tambang, pita, kremi	Dewasa & anak >2 tahun: 400 mg sekali sehari Anak 1–2 tahun: 200 mg sekali	Nyeri perut, pusing, mual	Suhu ruang (15–30°C)
	*mebendazole,	mebendazole	Hipersensitivitas	Cacing gelang, kremi, tambang	Dewasa & anak >2 tahun: 100 mg 2x/hari selama 3 hari/ 500 mg dosis tunggal	Sakit perut, diare, pusing	Suhu ruang (15–30°C)
	pirantel pamoat,	Combantrin	Miastenia gravis, hati berat	Cacing kremi, gelang, tambang	Dewasa: 10–20 mg/kg (max 1 g) Anak: 10 mg/kg	Mual, pusing, kram perut	Suhu ruang (15–30°C)

					(min usia 2 thn) sekali dosis		
	dietilkarbamazine (DEC),	Carbamazepine	Gangguan ginjal, alergi	Filariasis, toksokariasis	Dewasa: 6 mg/kg/hari dibagi 3 dosis selama 12 hari Anak: 3 mg/kg/hari selama 12 hari	Demam, nyeri otot, pusing	Suhu ruang (15–30°C)
	*piperazine	piperazine	Epilepsi, gangguan ginjal berat	Cacing kremi, gelang	Dewasa: 3.5 g/hari selama 2 hari Anak: 75–100 mg/kg/hari selama 2 hari	Pusing, mual, gangguan koordinasi	Suhu ruang (15–30°C)

(2.f) OBAT TB

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat TB	Rifampisin,	Rifampicin	Hipersensitivitas, gangguan hati	TB paru & ekstra paru	Dewasa: 10 mg/kg (max 600 mg/hari) Anak: 10–20 mg/kg/hari	Hepatotoksik, urin kemerahan, ruam	Suhu ruang (15–30°C), di tempat yang kering
	etambutol,	Etambutol	Neuritis optik, anak <5 tahun	TB kombinasi	Dewasa: 15–25 mg/kg/hari Anak: 15–25 mg/kg/hari	Gangguan penglihatan, ruam	Suhu ruang (15–30°C)
	isoniazid,	Isoniazid	Gangguan hati berat, epilepsi	TB aktif/latent	Dewasa: 5 mg/kg/hari (max 300 mg)	Neuropati perifer, hepatotoksik	Suhu ruang (15–30°C)

					Anak: 10–15 mg/kg/hari		
	pirazinamid,	Pirazinamid	Gangguan hati berat, asam urat tinggi	TB kombinasi	Dewasa: 20–25 mg/kg/hari Anak: 30–35 mg/kg/hari	Hiperurisemia, hepatotoksik	Suhu ruang (15–30°C)
	*streptomisin	streptomisin	Gangguan ginjal, hamil, tuli	TB (kombinasi awal)	Dewasa: 15 mg/kg/hari IM (max 1 g) Anak: 15–20 mg/kg/hari	Ototoksik, nefrotoksik	Suhu dingin (2–8°C), hindari cahaya

(3) ANTIHISTAMIN DAN ANTIALERGI

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Generasi I	chlorpheniramine,	CTM	Hipersensitivitas	Rhinitis alergi, urtikaria	Dewasa: 4 mg setiap 4–6 jam (max 24 mg) Anak: 1 mg tiap 4–6 jam (max 12 mg/hari)	Mengantuk, mulut kering	Suhu ruang (15–30°C)
	diphenhyramine	diphenhyramine	Asma akut, neonatus	Alergi, mual, mabuk perjalanan	Dewasa: 25–50 mg tiap 6–8 jam Anak: 5 mg/kg/hari dibagi 3 dosis	Sedasi, pusing, mulut kering	Suhu ruang (15–30°C)
Generasi II	*Ketotifen,	Ketotifen,	Hipersensitivitas	Rhinitis alergi, asma	Dewasa: 1 mg 2x/hari Anak: 0,05 mg/kg 2x/hari	Mengantuk, mulut kering	Suhu ruang (15–30°C)
	loratadine,	Loratadine	Hipersensitivitas	Rhinitis alergi, urtikaria kronis	Dewasa: 10 mg/hari	Mengantuk ringan, sakit kepala	Suhu ruang (15–30°C)

					Anak: 5 mg/hari (2–12 thn)		
	cetirizine	cetirizine	Gangguan ginjal berat	Alergi, rhinitis, urtikaria	Dewasa: 10 mg/hari Anak: 5 mg/hari (6–12 thn)	Mengantuk, pusing, mulut kering	Suhu ruang (15–30°C)
Generasi III	*Desloratadin	Desloratadin	Hipersensitivitas	Rhinitis alergi, urtikaria kronis	Dewasa: 5 mg/hari Anak: 1,25–2,5 mg/hari tergantung usia	Sakit kepala, mulut kering	Suhu ruang (15–30°C)

(4) SITOSTATISTIKA

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
*Sitostatika	siklofosfamid,	siklofosfamid,	Hipersensitivitas, infeksi berat	Kanker ovarium, leukemia, limfoma, kanker payudara	Dewasa: 1–5 mg/kg/hari IV/PO tergantung protokol Anak: sesuai protokol onkologi khusus	Mual, muntah, hematuria, mielosupresi	Simpan di suhu 2–8°C, terlindung cahaya
	doksorubisin,	doksorubisin,	Gagal jantung berat, hipersensitivitas	Kanker payudara, limfoma, leukemia	Dewasa: 60–75 mg/m² IV tiap 21 hari Anak: 25 mg/m² IV seminggu sekali atau sesuai protokol	Kardiotoksisitas, alopecia, mielosupresi, mual muntah	Simpan di suhu 2–8°C, terlindung cahaya
	5- fluorourasil,	5- fluorourasil,	Hipersensitivitas, supresi sumsum tulang berat	Kanker kolorektal, payudara,	Dewasa: 12–15 mg/kg/hari IV bolus atau infus	Diare, stomatitis, leukopenia, neurotoksisitas	Simpan di suhu 2–8°C

				lambung, pankreas	Anak: sesuai protokol kemoterapi		
	carboplatin,	carboplatin,	Hipersensitivitas terhadap platinum	Kanker ovarium, paru-paru, testis	Dewasa: 300–400 mg/m² IV tiap 4 minggu Anak: sesuai protokol	Nefrotoksisitas, mual muntah, trombositopenia	Simpan di suhu 15–25°C, terlindung dari cahaya
	metroteksat	metroteksat	Kehamilan, gangguan hati/GIN berat	Leukemia, artritis reumatoid, psoriasis	Dewasa: 7.5–25 mg/minggu PO/IM/IV Anak: 10–30 mg/m² tergantung indikasi/protokol	Hepatotoksisitas, stomatitis, mielosupresi	Simpan di suhu 15–25°C, jauh dari cahaya

(5) OBAT SISTEM SARAF

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat hipnotik sedatif/antiansietas	benzodiazepin (alprazolam, diazepam,),	Valisanbe	Miastenia gravis, insufisiensi pernapasan berat	Gangguan cemas, insomnia, kejang	Dewasa: 0,25–0,5 mg 2–3x/hari; Anak: sesuai petunjuk dokter	Mengantuk, pusing, gangguan memori	Simpan suhu 20–25°C, terlindung dari cahaya
	barbiturat (fenobarbital),	sibital	Porfiria, gangguan fungsi hati berat	Sedatif, antikonvulsan	Dewasa: 50–100 mg/hari; Anak: 3–5 mg/kg BB/hari	Sedasi, depresi pernapasan	Simpan suhu 15–30°C

Obat analgetik sentral	fentanil,	Fentanyl	Depresi pernapasan, hipersensitivitas	Nyeri akut dan kronik berat	Dewasa: 25–100 mcg IV setiap 1–2 jam; Anak: sesuai berat badan	Bradikardia, depresi napas	Simpan suhu 20–25°C
	petidin,	Petidin	Asma berat, gagal napas, gangguan fungsi hati berat	Nyeri sedang hingga berat	Dewasa: 50–150 mg IM/IV setiap 3–4 jam; Anak: 1–1,5 mg/kg IM	Mual, pusing, ketergantungan	Simpan suhu 15–30°C
	morfin,	Morfin	Depresi pernapasan, trauma kepala	Nyeri berat akut/kronik	Dewasa: 5–10 mg IV/IM; Anak: 0,05–0,2 mg/kg	Mual, konstipasi, depresi napas	Simpan suhu 20–25°C
	*nalokson.	nalokson.	Hipersensitivitas	Antidot opioid, overdosis opioid	Dewasa: 0,4–2 mg IV setiap 2–3 menit; Anak: 0,01 mg/kg	Hipertensi, takikardia	Simpan suhu 15–30°C
Obat antidepresan	amitriptilin,	Amitriptilin	Glaukoma sudut tertutup, retensi urin	Depresi, nyeri neuropatik	Dewasa: 25–150 mg/hari; Anak: tidak dianjurkan <12 tahun	Mulut kering, kantuk, hipotensi ortostatik	Simpan suhu 20–25°C
	fluoksetin,	elizap	MAOI dalam 14 hari terakhir	Depresi, gangguan obsesif-kompulsif	Dewasa: 20–40 mg/hari; Anak: ≥8 tahun 10–20 mg/hari	Insomnia, mual, gelisah	Simpan suhu 20–25°C
Obat anestesi lokal	*bupivakain,	bupivakain,	Alergi terhadap anestesi amid	Anestesi lokal/regional	Dewasa: 0,25–0,5%, 2–20 ml tergantung lokasi; Anak:	Neurotoksisitas, kardiotoksisitas	Simpan suhu 15–30°C

					sesuai berat badan		
	lidokain	lidokain	Blok AV derajat 2–3, syok	Anestesi lokal, aritmia	Dewasa: 1–5 mg/kg IV; Anak: 1 mg/kg	Pusing, kesemutan, kejang	Simpan suhu 15–30°C
Obat sistem sarafotonom (antikholinergik, kholinergik)	prostigmin,	Prostigmin	Obstruksi saluran kemih/GI, asma	Miastenia gravis, antidot	Dewasa: 0,5–2,5 mg IM/IV; Anak: sesuai usia	Diare, bradikardia, mual	Simpan suhu 20–25°C
	atropin,	Atropin	Glaukoma sudut sempit, obstruksi usus	Bradikardia, premedikasi anestesi	Dewasa: 0,5–1 mg IV setiap 5 menit; Anak: 0,01–0,03 mg/kg	Mulut kering, takikardia	Simpan suhu 15–30°C
	*ipratropium,	ipratropium,	Alergi terhadap atropin	Asma, PPOK	Dewasa: 2 isapan (40 mcg) 3–4x/hari; Anak: 1–2 isapan	Batuk, mulut kering	Simpan suhu 15–30°C
	*skopolamin,	skopolamin,	Glaukoma, myasthenia gravis	Mual/muntah akibat gerakan	Dewasa: 0,3–0,6 mg IM/IV setiap 6–8 jam	Pusing, mulut kering	Simpan suhu 15–30°C
	triheksifenidil	triheksifenedil	Glaukoma sudut tertutup	Parkinson, efek EPS akibat antipsikotik	Dewasa: 1–15 mg/hari terbagi; Anak: tidak dianjurkan	Mulut kering, penglihatan kabur	Simpan suhu 20–25°C
Obat sistem sarafotonom (adrenergik, antiadrenergik)	*klonidin,	klonidin,	Hipotensi berat, depresi berat	Hipertensi, gejala putus obat	Dewasa: 0,1–0,3 mg 2x/hari; Anak: sesuai petunjuk dokter	Pusing, sedasi, mulut kering	Simpan suhu 20–25°C

	*fenilefrin,	fenilefrin,	Hipertensi berat, hipertiroid	Hipotensi, kongesti hidung	Dewasa: 10–200 mcg IV; nasal: 2–3 tetes 0,25–1%	Hipertensi, bradikardia, nyeri kepala	Simpan suhu 15–30°C
	*noradrenalin,	noradrenalin,	Hipotensi karena hipovolemia	Syok, hipotensi akut	Dewasa: 8–12 mcg/min IV; Anak: sesuai berat badan	Hipertensi, takikardia, gangguan perfusi perifer	Simpan suhu 2–8°C
	*adrenalin,	adrenalin,	Hipersensitivitas, glaukoma sudut sempit	Anafilaksis, henti jantung	Dewasa: 0,3–0,5 mg IM/SQ; IV resusitasi: 1 mg/3–5 menit	Tremor, takikardia, gelisah	Simpan suhu 2–8°C
	*fenoterol,	fenoterol,	Aritmia berat, hipertiroidisme	Asma bronkial, bronkospasme	Dewasa: Inhalasi 100–200 mcg; Anak: sesuai usia	Palpitasi, tremor, hipokalemia	Simpan suhu <30°C, hindari cahaya
	*terbutalin,	terbutalin,	Hipertiroid, aritmia	Asma, bronkospasme	Dewasa: 2,5–5 mg oral 3x/hari; Anak: 0,05–0,1 mg/kg	Tremor, takikardia	Simpan suhu 15–30°C
	salbutamol,	Salbutamol	Aritmia, hipertiroidisme	Asma, bronkospasme	Dewasa: 2–4 mg oral 3–4x/hari atau inhalasi 100–200 mcg; Anak: sesuai usia	Tremor, palpitasi	Simpan suhu 15–30°C
	propanolol,	propanolol	Bradikardia, asma bronkial	Hipertensi, angina, migrain	Dewasa: 40–160 mg/hari terbagi; Anak: sesuai berat badan	Bradikardia, hipotensi, bronkospasme	Simpan suhu 15–30°C

	*atenolol,	atenolol,	Bradikardia, syok kardiogenik	Hipertensi, angina	Dewasa: 25–100 mg/hari; Anak: sesuai berat badan	Bradikardia, pusing, kelelahan	Simpan suhu 15–30°C
	*prazosin	prazosin	Hipotensi, sinkop	Hipertensi, BPH	Dewasa: mulai 0,5 mg 2–3x/hari → 1–20 mg/hari	Hipotensi ortostatik, pusing	Simpan suhu 20–25°C

(6) OBAT KARDIOVASKULAR

(6.a) Obat antihipertensi

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Diuretik	furosemid,	Furosemid	Anuria, hipokalemia berat	Hipertensi, edema	Dewasa: 20–80 mg/hari; Anak: 1–2 mg/kg BB	Hipokalemia, dehidrasi, hipotensi	Simpan suhu 20–25°C
	HCT,	HCT	Anuria, hipersensitif tiazid	Hipertensi, edema	Dewasa: 12,5–50 mg/hari	Hipokalemia, hiperglikemia	Simpan suhu 20–25°C
	spironolakton,	Spironolactone	Hiperkalemia, gagal ginjal berat	Hipertensi, hiperaldosteronisme	Dewasa: 25–100 mg/hari; Anak: 1–3 mg/kg/hari	Hiperkalemia, ginekomastia	Simpan suhu <30°C
CCB	Amlodipine,	Amlodipine	Hipotensi berat	Hipertensi, angina	Dewasa: 5–10 mg/hari; Anak: ≥6 th 2.5–5 mg/hari	Edema, sakit kepala	Simpan suhu <30°C
	nifedipin,	Nifedipine	Syok kardiogenik, hipotensi berat	Hipertensi, angina	Dewasa: 10–30 mg 2–3x/hari	Pusing, edema perifer	Simpan suhu 20–25°C

	*verapamil,	verapamil,	Gagal jantung, bradikardia berat	Hipertensi, aritmia	Dewasa: 80–120 mg 3x/hari	Konstipasi, hipotensi	Simpan suhu 15–30°C
	nicardipine	nicardipine	Hipotensi, gagal jantung	Hipertensi emergensi	IV: 5 mg/jam → titrasi max 15 mg/jam	Flushing, takikardia	Simpan suhu 20–25°C
ARB	valsartan,	Valsartan	Kehamilan, angioedema	Hipertensi, gagal jantung	Dewasa: 80–160 mg/hari	Pusing, hiperkalemia	Simpan suhu <30°C
	candesartan,	Candesartan	Kehamilan, gangguan hati berat	Hipertensi	Dewasa: 8–32 mg/hari	Pusing, hiperkalemia	Simpan suhu 20–25°C
	irbesartan,	Irbesartan	Kehamilan, hipersensitivitas	Hipertensi, nefropati diabetik	Dewasa: 150–300 mg/hari	Hiperkalemia, pusing	Simpan suhu 15–30°C
	telmisartan	Telmisartan	Kehamilan, angioedema	Hipertensi	Dewasa: 20–80 mg/hari	Hipotensi, hiperkalemia	Simpan suhu <30°C
ACEI	Kaptropil,	Captopril	Angioedema, kehamilan	Hipertensi, gagal jantung	Dewasa: 12,5–50 mg 2–3x/hari	Batuk kering, ruam, hipotensi	Simpan suhu <25°C
	lisinopril,	Lisinopril	Angioedema, kehamilan	Hipertensi, gagal jantung	Dewasa: 10–40 mg/hari	Batuk, hiperkalemia	Simpan suhu 20–25°C
	ramipril	Ramipril	Kehamilan, angioedema	Hipertensi, gagal jantung	Dewasa: 2,5–10 mg/hari	Batuk, pusing, hiperkalemia	Simpan suhu 15–30°C
Beta blocker	*Atenolol,	Atenolol	Bradikardia, syok kardiogenik	Hipertensi, angina	Dewasa: 25–100 mg/hari	Bradikardia, kelelahan	Simpan suhu 15–30°C

	propanolol,	Propanolol	Asma, bradikardia	Hipertensi, migrain	Dewasa: 40–160 mg/hari; Anak: 1–2 mg/kg	Pusing, bradikardia	Simpan suhu 15–30°C
	bisoprolol	concor	Bradikardia berat, syok kardiogenik	Hipertensi, gagal jantung	Dewasa: 2,5–10 mg/hari	Pusing, kelelahan	Simpan suhu <30°C
Alfa blocker	*Prazosin,	Prazosin,	Hipotensi, sinkop	Hipertensi, BPH	Dewasa: 0,5–5 mg 2–3x/hari	Hipotensi ortostatik	Simpan suhu 20–25°C
	*hidralazin	hidralazin	Lupus, penyakit jantung iskemik	Hipertensi emergensi	Dewasa: 25–100 mg/hari; IV: 10–20 mg	Takikardia, sakit kepala	Simpan suhu 15–30°C
Sentral	Metildopa,	Dopamet	Hepatitis aktif, depresi	Hipertensi kehamilan	Dewasa: 250–500 mg 2–3x/hari	Sedasi, anemia hemolitik	Simpan suhu 20–25°C
	*klonidin	klonidin	Depresi berat, hipotensi	Hipertensi, putus zat	Dewasa: 0,1–0,3 mg 2x/hari	Mulut kering, pusing	Simpan suhu 20–25°C

(6.b) OBAT ANTIANGINA

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat antiangina	Isosorbide dinitrate,	ISDN	Hipotensi, anemia berat	Angina pektoris, gagal jantung	Dewasa: 5–20 mg 2–3x/hari oral	Sakit kepala, hipotensi	Simpan suhu 15–30°C

	nitrogliserin	nitrokaf	Hipotensi berat, anemia	Angina pektoris, gagal jantung akut	Sublingual: 0,3–0,6 mg, ulang tiap 5 menit (maks 3x)	Sakit kepala, pusing, flushing	Simpan suhu <25°C, hindari cahaya

(6.c) OBAT GAGAL JANTUNG KONGESTIF

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat gagal jantung kongestif	Digoksin	fargoxin	Fibrilasi ventrikel, blok AV total	Gagal jantung, fibrilasi atrium	Dewasa: 0,125–0,25 mg/hari; Anak: 0,01–0,05 mg/kg	Mual, gangguan irama jantung, penglihatan kabur	Simpan suhu 15–30°C

(6.d) ANTIPLATELET

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antiplatelet	Asetosal,	Proxime	Tukak lambung aktif, asma	Pencegahan infark miokard, stroke	Dewasa: 80–325 mg/hari	Iritasi lambung, perdarahan	Simpan suhu <30°C
	klopidogrel	CPG	Perdarahan aktif, gangguan hati berat	Sindrom koroner akut, pencegahan stroke	Dewasa: 75 mg/hari oral	Perdarahan, ruam kulit	Simpan suhu 15–30°C

(6.e) OBAT DYSLIPIDEMIA

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan

Obat dyslipidemia	Simvastatin,	Simvastatin	Penyakit hati aktif, kehamilan	Hiperlipidemia, pencegahan penyakit jantung koroner	Dewasa: 10–40 mg/hari malam hari	Nyeri otot, gangguan hati	Simpan suhu <30°C
	atorvastatin,	atovar	Penyakit hati aktif, kehamilan	Dislipidemia, pencegahan penyakit kardiovaskular	Dewasa: 10–80 mg/hari	Mialgia, peningkatan enzim hati	Simpan suhu <25°C
	fenofibrate,	Fenofibrate	Gangguan hati/ ginjal berat, kehamilan	Hipertrigliseridemia, dislipidemia campuran	Dewasa: 145–200 mg/hari	Gangguan GI, miopati	Simpan suhu <30°C
	gemfibrozil,	Hipofil	Gangguan hati, batu empedu	Hiperlipidemia tipe IV dan V	Dewasa: 600 mg 2x/hari 30 menit sebelum makan	Gangguan GI, nyeri otot	Simpan suhu <30°C
	*ezetimib	ezetimib	Penyakit hati aktif, kehamilan	Hiperlipidemia primer (kombinasi statin)	Dewasa: 10 mg/hari	Diare, nyeri otot	Simpan suhu <30°C

(6.f) OBAT ANTIARITMIA

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat antiaritmia	Amiodaron	amiodaron	Bradikardia berat, blok AV derajat 2–3	Aritmia ventrikel dan supraventrikel	IV: 150–300 mg, lanjut infus; Oral: 200–400 mg/hari	Hipotensi, gangguan tiroid, fibrosis paru	Simpan suhu 15–30°C, hindari cahaya

7. OBAT SALURAN CERNA

(7.a) Obat gastritis dan tukak lambung

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antasida	$Al(OH)_3$, $Mg(OH)_2$,	Antasida doen	Obstruksi usus, gagal ginjal berat	Dispepsia, gastritis, tukak lambung	Dewasa: 5–15 ml oral, 1 jam setelah makan & sebelum tidur	Konstipasi (Al), diare (Mg)	Simpan suhu <30°C
	natrium bikarbonat	meylon	Hipernatremia, alkalosis metabolik	Dispepsia, hiperkalemia	Dewasa: 0,5–1 g per dosis, max 4x/hari	Alkalosis, retensi natrium	Simpan suhu <25°C
H_2 Bloker	*Simetidin,	Simetidin,	Hipersensitivitas, gangguan ginjal berat	Tukak lambung, tukak duodenum, GERD	Dewasa: 800 mg malam hari atau 400 mg 2x/hari. Anak: 20–40 mg/kgBB/hari dibagi dalam 4 dosis	Diare, sakit kepala, ginekomastia	Simpan pada suhu <30°C, terlindung dari cahaya
	ranitidin,	rantidine	Hipersensitivitas, gangguan ginjal berat	Tukak lambung, GERD, hipersekresi asam lambung	Dewasa: 150 mg 2x/hari atau 300 mg malam hari. Anak: 2–4 mg/kgBB 2x/hari	Sakit kepala, konstipasi, ruam kulit	Simpan pada suhu <30°C, dalam wadah tertutup rapat
	*famotidin	famotidin	Hipersensitivitas, gangguan ginjal berat	Tukak lambung, GERD	Dewasa: 20 mg 2x/hari atau 40 mg sebelum tidur	Sakit kepala, konstipasi	Simpan suhu <25°C
PPI	Omeprazol,	pumpitor	Iipersensitivitas	Tukak lambung, GERD, H. pylori	Dewasa: 20–40 mg/hari	Sakit kepala, diare	Simpan suhu <30°C

					sebelum makan		
	lansoprazol,	Lancid	Hipersensitivitas	Tukak lambung, GERD	Dewasa: 15–30 mg/hari	Nyeri perut, mual	Simpan suhu <30°C
	Pantoprazol	pantopump	Hipersensitivitas	GERD, tukak lambung	Dewasa: 40 mg/hari	Diare, sakit kepala	Simpan suhu <30°C
Pelindung mukosa	Sukralfat	Epysan	Gagal ginjal kronis (waspada)	Tukak lambung, gastritis	Dewasa: 1 g 4x/hari (sebelum makan & malam)	Konstipasi, mulut kering	Simpan suhu <30°C
Antiflatulen	Dimetilpolisiloksan	Dimetilpolisiloksan	Hipersensitivitas	Kembung, perut bergas	Dewasa: 40–125 mg, 3–4x/hari	Kembung ringan	Simpan suhu <30°C
Analog prostaglandin	Misoprostol	nisoprostol	Kehamilan, penyakit radang usus	Profilaksis ulkus karena NSAID	Dewasa: 200 mcg 2–4x/hari	Diare, kram perut	Simpan suhu <25°C
				Profilaksis ulkus karena NSAID	Dewasa: 200 mcg 2–4x/hari	Diare, kram perut	Simpan suhu <25°C

(7.b) Obat antidiare

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antimotilitas	Loperamid	Lodia	Ileus paralitik, diare karena infeksi bakteri	Diare akut dan kronik	Dewasa: 4 mg awal, lalu 2 mg tiap BAB cair (maks 16 mg/hari); Anak >12 tahun: 2 mg tiap BAB cair (maks 8 mg/hari)	Konstipasi, pusing, kram perut	Simpan <30°C
Adsorben	Kaolin pektin,	Diagit	Obstruksi usus, demam tinggi	Diare ringan	Dewasa: 60–120 mL per	Konstipasi, distensi abdomen	Simpan <30°C

					hari dalam 3–4 dosis		
	attapulgit,	Attapulgit	Alergi, ileus	Diare nonspesifik	Dewasa: 1.2–1.5 g tiap BAB cair (maks 8.4 g/hari)	Konstipasi, perut kembung	Simpan <30°C
	*carbo adsorben	carbo adsorben	Obstruksi usus, perforasi	Diare, keracunan ringan	Dewasa: 520–780 mg tiap 4 jam	Feses hitam, konstipasi	Simpan <30°C, kering

(7.c) Obat laksatif

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Laksatif osmotikgaram	Mg sulfat	Mg sulfat	Gagal ginjal, obstruksi usus	Konstipasi, persiapan kolonoskopi	Dewasa: 10–30 g dilarutkan dalam air	Diare, ketidakseimbangan elektrolit	Simpan <30°C
Laksatif osmotic alkohol/gula tdk dicerna	Gliserin,	Gom borax	Alergi, perdarahan rektum	Konstipasi	Dewasa: 1 supositoria rektal	Iritasi rektum	Simpan <25°C
	laktulosa	lactulose	Galaktosemia, obstruksi usus	Konstipasi kronis, ensefalopati hepatik	Dewasa: 15–30 mL/hari, anak: 5–10 mL/hari	Perut kembung, diare	Simpan <30°C
Laksatif stimulan	Turunan difenilmetan (bisakodil)	dulcolax	Ileus, dehidrasi berat	Konstipasi akut, persiapan prosedur	Dewasa: 5–10 mg oral atau supositoria	Kram perut, diare	Simpan <30°C

(7.d) Antiemetik

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan

Antiemetik	Dimenhidrinat,	Ramadrinat	Alergi, epilepsi	Mual dan muntah akibat mabuk perjalanan	Dewasa: 50–100 mg tiap 4–6 jam (maks 400 mg/hari)	Kantuk, mulut kering	Simpan <30°C
	ondansetron,	Invomit, vameron	Iipersensitivitas, emanjangan QT	Mual pasca operasi/ kemoterapi	Dewasa: 4–8 mg per oral tiap 8 jam	Sakit kepala, sembelit	Simpan <30°C
	metoklorpramide	metoklopramide	Epilepsi, perdarahan GI	Mual-muntah, gastroparesis	Dewasa: 10 mg tiap 6–8 jam; Anak: 0.1–0.15 mg/kg	Ekstrapiramidal, kantuk	Simpan <30°C

(8) OBAT SALURAN NAPAS

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat Batuk	codein,	Codikaf	Depresi napas, asma berat	Batuk kering yang mengganggu	Dewasa: 10–20 mg tiap 4–6 jam (maks 120 mg/hari)	Mengantuk, mual, ketergantungan	Simpan <30°C
	gliseril guaikolat	Gg	Hipersensitivitas	Batuk produktif	Dewasa: 200–400 mg tiap 4 jam	Mual, muntah	Simpan <30°C
	*amonium klorida,	amonium klorida,	Gagal ginjal, gangguan hati	Ekspektoran batuk berdahak	Dewasa: 300 mg tiap 6–8 jam	Iritasi GI, asidosis	Simpan <30°C
	bromheksin,	Mucohexin	Tukak lambung, hipersensitivitas	Batuk berdahak	Dewasa: 8 mg 3×/hari	Mual, diare	Simpan <30°C

	ambroksol,	Ambroxol	Ulkus peptikum, hamil trimester awal	Batuk berdahak	Dewasa: 30 mg 2–3×/hari	Mulut kering, nyeri perut	Simpan <30°C
	asetilsistein	Acetylcisteine	Ulkus peptikum aktif	Batuk berdahak kental, antidot paracetamol	Dewasa: 200 mg 2–3×/hari	Mual, bau belerang	Simpan <30°C
Obat asma	*terbutaline,		Hipertiroid, hipertensi berat	Asma bronkial, bronkitis obstruktif	Dewasa: 2.5–5 mg 3×/hari	Takikardia, tremor	Simpan <30°C
	salbutamol,	Salbutamol	Aritmia, hipertensi	Asma, PPOK	Dewasa: 2–4 mg 3–4×/hari	Tremor, palpitasi	Simpan <30°C
	budesonid,	Budesma	Infeksi sistemik aktif	Asma persisten	Inhalasi: 200–800 mcg/hari	Kandidiasis mulut, suara serak	Simpan <30°C
	*ipratropium bromida,	ipratropium bromida,	Glaukoma, hipertrofi prostat	PPOK, asma	Inhalasi: 2 semprotan tiap 6 jam	Mulut kering, iritasi tenggorokan	Simpan <30°C
	teofilin,	Teobron	Aritmia, tukak lambung	Asma, bronkitis kronis	Dewasa: 200–400 mg 2×/hari	Mual, insomnia	Simpan <30°C
	Aminofilin	aminofilin	Aritmia berat, hipertensi	Asma berat, bronkospasme	Dewasa: injeksi 250–500 mg IV pelan	Palpitasi, hipotensi	Simpan <30°C

(9) VITAMIN, MINERAL, ENZIM

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Vitamin	Vitamin A, D, E, K, B1 (thiamin), B6(piridoksin), asam folat, B12, C	Neurosanbe, folavit	Hipervitaminosis, alergi	Defisiensi vitamin, kehamilan	Sesuai jenis vitamin, misal Vit C: 500–1000 mg/hari	Gangguan GI, alergi	Simpan <30°C
Mineral	Ca, P, K, Mg, Na, Cl, Fe, Zn, Mn, Cu, I_2	Interzinc, tablet tambah darah	Hemokromatosis (Fe), hiperkalsemia	Defisiensi mineral, anemia	Fe: 200 mg/hari; Ca: 500–1000 mg/hari	Sembelit, mual	Simpan <30°C

(10) OBAT SISTEM ENDOKRIN

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat Diabetes melitus	Sulfonilurea (glibenclamide, glimepiride),	Glibenclamide	Hamil, gagal ginjal	DM tipe 2	2.5–10 mg/hari	Hipoglikemia, mual	Simpan <30°C
	metformin,	Metformin	Asidosis laktat, gagal ginjal	DM tipe 2	500–2000 mg/hari	Gangguan GI, asidosis laktat	Simpan <30°C
	pioglitazone,	Pioglitazone	Gagal jantung, hamil	DM tipe 2	15–45 mg/hari	Retensi cairan, peningkatan BB	Simpan <30°C
	acarbose,	Acarbose	Gangguan pencernaan kronis	DM tipe 2	50–100 mg 3×/hari	Flatulensi, diare	Simpan <30°C

	insulin	sansulin	Hipoglikemia, alergi insulin	DM tipe 1 dan 2	SC sesuai kebutuhan (individu)	Hipoglikemia, iritasi lokal	Lemari es (2–8°C)
Obat hipertiroid danhipotiroid	Propiltiourasil,	Propiltiouracil	Gangguan hati berat	Hipertiroidisme	50–150 mg 3×/hari	Ruam, hepatotoksisitas	Simpan <30°C
	levotiroksin.	levotiroksin	MI akut, tirotoksikosis	Hipotiroidisme	25–100 mcg/hari	Takikardia, insomnia	Simpan <30°C
Kortikosteroid	hidrokortison,	Hidrokortison	Hipersensitivitas, infeksi tanpa pengobatan	Alergi, insufisiensi adrenal	20–240 mg/hari dalam dosis terbagi	Retensi cairan, hipertensi, hipokalemia	Simpan suhu ruang, kering
	betametason,	Betason	Infeksi sistemik tanpa terapi antimikroba	Inflamasi berat, alergi, gangguan kulit	Tergantung sediaan (oral/topikal/injeksi)	Atrofi kulit (topikal), ulkus lambung	Simpan <30°C
	prednison,	Prednison	Infeksi jamur sistemik, hipertensi berat	Alergi, inflamasi, gangguan autoimun	5–60 mg/hari, dosis disesuaikan	Nafsu makan ↑, moon face, osteoporosis, gangguan GI	Simpan suhu ruang, kering
	metilprednisolon	Lameson, sanexon	Infeksi aktif, hipertensi berat	Radang sendi, lupus, asma	4–48 mg/hari tergantung indikasi	Gangguan tidur, hipertensi, gula darah naik	Simpan <30°C
Obat KB	*levonorgestrel,	levonorgestrel,	Kehamilan, trombosis vena, kanker payudara	Kontrasepsi	1 tablet/hari	Mual, pusing, spotting, perubahan mood	Simpan <30°C, kering

	*etinilestradiol,	etinilestradiol,	Riwayat stroke, gangguan hati berat	Kontrasepsi	1 tablet/hari (kombinasi)	Nyeri payudara, sakit kepala	Simpan <30°C, tertutup
	*lynestrenol	lynestrenol	Kehamilan, trombosis aktif	Kontrasepsi	1 tablet/hari	Mual, pusing, spotting	Simpan <30°C

C. PRODUCT KNOWLEDGE ALAT KESEHATAN

(1) ALKES PERAWATAN

No	Alkes perawatan	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Bandage gauze (kasa hidrofil)		Menutup luka, menyerap cairan luka.	Bersihkan luka, letakkan kasa di atas luka, rekatkan dengan plester.
2.	Elastic bandage		Menahan sendi, mengurangi pembengkakan, fiksasi.	Lilitkan pada area yang membutuhkan, atur kekencangan.
3.	Kapas pembalut		Membersihkan luka, melindungi luka.	Ambil secukupnya, gunakan untuk membersihkan atau menutup luka.

4.	Kasa berisi obat (sufra tulle, daryant tulle, bacti grass, actisorb, paronet)		Mengobati luka infeksi, luka bakar, luka kronis.	Letakkan kasa obat langsung pada luka, tutup dengan kasa steril.
5.	Kasa dressing		Menutup luka setelah dibersihkan.	Letakkan kasa dressing di atas luka, rekatkan dengan plester.
6.	Kasa steril		Menutup luka steril, mencegah infeksi.	Buka kemasan steril, letakkan kasa di atas luka, rekatkan dengan plester.
7.	Pembalut gips (gypsona)		Fiksasi patah tulang.	Basahi gips, lilitkan pada area yang patah, tunggu mengeras.

8.	Pembalut leher/cervical collar		Menahan leher, mengurangi gerakan.	Pasang pada leher, atur kekencangan.
9.	Plester Elastik (handyplas, band aid, elastikon)		Menutup luka kecil, fiksasi ringan.	Tempelkan plester pada luka atau area yang membutuhkan.
10.	Plester kertas (leukopor, dermilite)		Fiksasi selang infus, fiksasi ringan.	Tempelkan plester pada area yang membutuhkan.
11.	Plester plastik (leukofix, transfor)		Fiksasi selang, fiksasi luka.	Tempelkan plester pada area yang membutuhkan.

12.	Plester plastik waterprof (setonplast, blenderm)		Menutup luka tahan air, fiksasi.	Tempelkan plester pada area yang membutuhkan.
13.	Plester rayon (microfore, dermisel)		Fiksasi kulit sensitif, fiksasi ringan.	Tempelkan plester pada area yang membutuhkan.
14.	Plester sutera (leukosilk)		Fiksasi kuat, fiksasi selang.	Tempelkan plester pada area yang membutuhkan.
15.	Plester ZnO (leukoplas)		Fiksasi sendi, fiksasi kuat.	Tempelkan plester pada area yang membutuhkan.

(2) PERAWATAN PASIEN

No	Perawatan pasien	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan

1.	Bedpan		Tempat buang air besar/kecil di tempat tidur.	Letakkan di bawah bokong pasien, bantu pasien untuk buang air.
2.	Breast pump		Memerah ASI.	Tempelkan corong pada payudara, nyalakan alat.
3.	Colostomy bag		Menampung feses setelah operasi kolostomi.	Tempelkan kantong pada stoma, kosongkan secara berkala.
4.	Ihsjap/eskap		Membasuh area perineum setelah buang air.	Isi dengan air hangat, semprotkan ke area perineum.
5.	Kruk		Alat bantu jalan untuk pasien cedera kaki.	Letakkan di bawah ketiak, gunakan untuk menopang berat badan.

6.	Pus basin/emesis basin		Tempat muntah atau nanah.	Dekatkan ke mulut pasien saat muntah, tempatkan di dekat luka untuk menampung nanah.
7.	Spalk		Fiksasi sementara patah tulang.	Pasang pada area yang patah, ikat dengan perban.
8.	Tapelhoed/nipple shield		Melindungi puting lecet saat menyusui.	Tempelkan pada puting, bantu bayi menyusu.
9.	Tongkat pyramide/elbow		Alat bantu jalan untuk pasien lemah.	Pegang tongkat, gunakan untuk menopang berat badan.
10.	Urinal		Tempat buang air kecil untuk pasien pria di tempat tidur.	Berikan pada pasien, bantu pasien buang air kecil.

11.	Walker		Alat bantu jalan untuk pasien lemah atau lansia.	Pegang walker, gunakan untuk menopang berat badan saat berjalan.
12.	Warm waterzak		Kompres air hangat.	Isi dengan air hangat, tempelkan pada area yang membutuhkan.
13.	Windring/air cusion		Bantal anti-decubitus.	Letakkan di bawah bokong pasien untuk mencegah luka tekan.


(3) ALKES TINDAKAN MEDIS

No	Alkes tindakan medis	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Ballon/folley cathether		Mengalirkan urin dari kandung kemih.	Masukkan kateter ke uretra, kembangkan balon di dalam kandung kemih.

2.	Condom cathether		Mengalirkan urin pada pria inkontinensia.	Pasang kondom kateter pada penis, hubungkan ke kantong urin.
3.	Disposible syringe		Menyuntikkan obat atau cairan.	Isi spuit dengan obat, suntikkan ke tubuh.
4.	Endotracheal		Memastikan jalan napas terbuka saat anestesi atau ventilasi mekanis.	Masukkan tabung ke trakea.
5.	Enema syringe		Memasukkan cairan ke rektum untuk membersihkan usus.	Isi spuit dengan cairan enema, masukkan ke rektum.
6.	Feeding syringe		Memberikan makanan cair melalui selang NGT.	Isi spuit dengan makanan cair, masukkan ke selang NGT.

7.	Feeding tube		Memberikan makanan cair langsung ke lambung atau usus.	Masukkan selang ke hidung atau perut, hubungkan ke sumber makanan.
8.	Gliserin syringe		Melembabkan rektum dan melunakkan feses.	Isi spuit dengan gliserin, masukkan ke rektum.
9.	Gloves/handschoen		Melindungi tangan dari kontaminasi.	Kenakan sarung tangan sebelum melakukan tindakan medis.
10.	Infusion set dewasa		Memberikan cairan infus pada pasien dewasa.	Hubungkan set infus ke botol infus, masukkan jarum ke pembuluh darah.

11.	Infusion set pediatrik		Memberikan cairan infus pada pasien anak-anak.	Hubungkan set infus ke botol infus, masukkan jarum ke pembuluh darah.
12.	Insulin syringe		Menyuntikkan insulin pada pasien diabetes.	Isi spuit dengan insulin, suntikkan ke jaringan subkutan.
13.	Intra vena catheter		Memberikan cairan atau obat langsung ke pembuluh darah.	Masukkan kateter ke pembuluh darah.
14.	Masker oksigen		Memberikan oksigen tambahan.	Pasang masker pada wajah, atur aliran oksigen.

15.	Masker nebulizer anak-anak		Memberikan obat hirup pada anak-anak.	Pasang masker pada wajah anak, nyalakan nebulizer.
16.	Masker nebulizer dewasa		Memberikan obat hirup pada orang dewasa.	Pasang masker pada wajah, nyalakan nebulizer.
17.	Metal cathether		Mengalirkan urin pada pasien dengan sumbatan uretra.	Masukkan kateter logam ke uretra.
18.	Mucus extractor		Menyedot lendir dari saluran pernapasan bayi.	Masukkan selang ke hidung atau mulut bayi, sedot lendir.

19.	Nasal gastric tube		Memberikan makanan atau obat langsung ke lambung.	Masukkan selang ke hidung, dorong ke lambung.
20.	Nebulizer set		Mengubah obat cair menjadi uap untuk dihirup.	Hubungkan selang nebulizer ke kompresor udara, nyalakan alat.
21.	Needle		Menyuntikkan obat atau mengambil sampel darah.	Tusukkan jarum ke kulit atau pembuluh darah.
22.	Nelaton cathether		Mengalirkan urin sementara.	Masukkan kateter ke uretra, kosongkan kandung kemih.

23.	Oxygen nasal canula		Memberikan oksigen tambahan melalui hidung.	Pasang kanula di lubang hidung, atur aliran oksigen.
24.	Rectal tube		Memasukkan obat atau mengeluarkan gas dari rektum.	Masukkan selang ke rektum.
25.	Spinal needle		Mengambil cairan serebrospinal atau memberikan anestesi spinal.	Tusukkan jarum ke tulang belakang.
26.	Stomach tube		Mengosongkan lambung atau memberikan makanan/obat.	Masukkan selang ke mulut atau hidung, dorong ke lambung.

27.	Suction cathether		Menyedot lendir dari saluran pernapasan.	Masukkan selang ke saluran pernapasan, sedot lendir.
28.	Suction connecting		Menghubungkan kateter suction ke mesin suction.	Hubungkan selang ke kateter dan mesin suction.
29.	Tranfusion set		Memberikan transfusi darah.	Hubungkan set transfusi ke kantong darah, masukkan jarum ke pembuluh darah.
30.	Tuberculin syringe		Menyuntikkan tuberkulin untuk tes Mantoux.	Isi spuit dengan tuberkulin, suntikkan ke kulit.

31.	Urine bag		Menampung urin dari kateter.	Hubungkan kantong urin ke kateter.
32.	Wing needle		Menyuntikkan obat atau mengambil sampel darah pada pembuluh darah kecil.	Tusukkan jarum ke pembuluh darah kecil.


(4) ALAT-ALAT BEDAH

No	**Alat-alat bedah**	**Gambar**	**Kegunaan**	**Cara menggunakan**
1.	Arterie klem/artery forceps		Menjepit pembuluh darah arteri untuk menghentikan perdarahan.	Jepit pembuluh darah dengan klem, kunci klem.
2.	Bandage scissors		Menggunting perban atau plester.	Gunakan gunting untuk memotong perban atau plester.

3.	Benang jahit catgut chromic		Menjahit luka dalam yang membutuhkan waktu lama untuk sembuh.	Gunakan jarum jahit yang sesuai, jahit luka dengan teknik yang benar.
4.	Benang jahit catgut plain		Menjahit luka dalam yang cepat sembuh.	Gunakan jarum jahit yang sesuai, jahit luka dengan teknik yang benar.
5.	Benang jahit silk		Menjahit luka luar atau dalam.	Gunakan jarum jahit yang sesuai, jahit luka dengan teknik yang benar.
6.	Bisturi		Membuat sayatan pada kulit atau jaringan.	Pegang bisturi dengan mantap, buat sayatan sesuai kebutuhan.
7.	Forceps/pinset anatomis		Memegang jaringan lunak.	Pegang pinset dengan mantap, jepit jaringan dengan hati-hati.

8.	Forceps/pinset cilia		Mengambil benda asing kecil dari mata.	Pegang pinset dengan mantap, ambil benda asing dengan hati-hati.
9.	Forceps/pinset sirugis		Memegang jaringan yang lebih kasar.	Pegang pinset dengan mantap, jepit jaringan dengan hati-hati.
10.	Forceps/pinset splinter		Mengambil serpihan kecil dari kulit.	Pegang pinset dengan mantap, ambil serpihan dengan hati-hati.
11.	Gunting bedah mayo		Memotong jaringan tebal.	Gunakan gunting untuk memotong jaringan dengan gerakan yang tepat.
12.	Gunting bedah metzenbaum		Memotong jaringan halus.	Gunakan gunting untuk memotong jaringan dengan gerakan yang tepat.

13.	Gunting bedah runcing		Memotong jaringan atau benang.	Gunakan gunting untuk memotong jaringan atau benang dengan hati-hati.
14.	Gunting tali pusar		Memotong tali pusar bayi baru lahir.	Gunakan gunting steril, potong tali pusar dengan hati-hati.
15.	Hecting set		Set alat untuk menjahit luka.	Gunakan alat-alat dalam set sesuai kebutuhan untuk menjahit luka.
16.	Jarum jahit		Menjahit luka.	Gunakan jarum jahit yang sesuai, jahit luka dengan teknik yang benar.
17.	Klem mosquito		Menjepit pembuluh darah kecil.	Jepit pembuluh darah dengan klem, kunci klem.
18.	Klem tali pusat/umbilical cord clem		Menjepit tali pusar bayi baru lahir.	Jepit tali pusar dengan klem, kunci klem.

19.	Needle hoolders		Memegang jarum jahit.	Pegang jarum jahit dengan needle holder, jahit luka.
20.	Peritoneum forceps		Memegang peritoneum saat operasi perut.	Pegang peritoneum dengan forceps, lakukan tindakan operasi.
21.	Skalpel		Membuat sayatan pada kulit atau jaringan.	Pegang skalpel dengan mantap, buat sayatan sesuai kebutuhan.

(5) Disinfektan

No	Disinfektan	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Alkohol 70%		Antiseptik kulit, disinfeksi alat medis.	Usapkan pada kulit atau alat medis yang akan didisinfeksi.
2.	Alkohol swab		Antiseptik kulit sebelum suntikan atau pengambilan darah.	Usapkan pada kulit yang akan disuntik atau diambil darahnya.
3.	H_2O_2 3%		Membersihkan luka, disinfeksi alat medis.	Tuangkan pada luka untuk membersihkan, rendam alat medis dalam larutan.
4.	Povidone iodine		Antiseptik kulit sebelum operasi, disinfeksi luka.	Usapkan pada kulit sebelum operasi, oleskan pada luka.

5.	Rivanol		Antiseptik luka, membersihkan luka bernanah.	Tuangkan pada luka untuk membersihkan, kompres luka dengan rivanol.

(6) APD

No	APD	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Apron		Melindungi tubuh dari cairan tubuh pasien atau bahan kimia.	Kenakan apron, ikat tali di belakang.
2.	Masker		Melindungi pernapasan dari droplet atau percikan cairan tubuh.	Tutup hidung dan mulut dengan masker, kaitkan tali di belakang telinga.

3.	Masker N95 disposible		Melindungi pernapasan dari partikel kecil di udara.	Tutup hidung dan mulut dengan masker, sesuaikan penjepit hidung.
4.	Non woven/surgical cap		Melindungi rambut dari kontaminasi.	Kenakan surgical cap untuk menutupi rambut.
5.	Sarung tangan		Melindungi tangan dari kontaminasi.	Kenakan sarung tangan sebelum melakukan tindakan medis.
6.	Shoe cover		Melindungi alas kaki dari kontaminasi.	Kenakan shoe cover untuk menutupi sepatu.
7.	Kaca mata google		Melindungi mata dari percikan cairan tubuh atau bahan kimia.	Kenakan kaca mata google untuk melindungi mata.

(7) ALKES UNTUK DIAGNOSA

No	**Alkes untuk diagnosa**	**Gambar**	**Kegunaan**	**Cara menggunakan**
1.	Anaroid spygmomanometer		Mengukur tekanan darah.	Lilitkan manset pada lengan, pompa udara, baca tekanan darah pada jarum.
2.	Electrical sphygmomanometer		Mengukur tekanan darah secara otomatis.	Lilitkan manset pada lengan, nyalakan alat, baca tekanan darah pada layar.
3.	Mercurial sphygmomanometer		Mengukur tekanan darah (standar emas).	Lilitkan manset pada lengan, pompa udara, baca tekanan darah pada kolom merkuri.
4.	Chart vision Snellen		Mengukur ketajaman penglihatan.	Minta pasien membaca huruf pada chart dari jarak tertentu.

5.	Ear speculum		Memeriksa bagian dalam telinga.	Pasang speculum pada otoskop, masukkan ke liang telinga.
6.	Ear thermometer		Mengukur suhu tubuh melalui telinga.	Masukkan probe thermometer ke liang telinga, tekan tombol.
7.	Gelang pasien		Mengidentifikasi pasien.	Pasangkan gelang pada pergelangan tangan pasien.
8.	Head lamp		Memberikan penerangan saat pemeriksaan atau tindakan medis.	Kenakan head lamp di kepala, nyalakan lampu.

9.	Hemometer		Mengukur kadar hemoglobin dalam darah.	Ambil sampel darah, masukkan ke hemometer, baca hasilnya.
10.	Ishihara's test for coulour blindnesss		Mendeteksi buta warna.	Minta pasien melihat pola titik-titik berwarna pada buku tes.
11.	Laringeal mirror		Memeriksa laring dan pita suara.	Panaskan cermin, masukkan ke tenggorokan, gunakan cahaya untuk melihat.
12.	Nasal speculum		Memeriksa bagian dalam hidung.	Pasang speculum pada otoskop, masukkan ke lubang hidung.

13.	Pen needle		Menyuntikkan insulin menggunakan pen insulin.	Pasang jarum pada pen, putar dosis, suntikkan ke kulit.
14.	Percussion hammer		Memeriksa refleks tendon.	Ketuk tendon dengan hammer, amati respons.
15.	Pulse meter		Mengukur denyut nadi.	Pasang sensor pada jari, baca denyut nadi pada layar.
16.	Rectum speculum		Memeriksa bagian dalam rektum.	Lumasi speculum, masukkan ke rektum.

17.	Reflex hamer		Memeriksa refleks tendon.	Ketuk tendon dengan hammer, amati respons.
18.	Spirometer		Mengukur fungsi paru-paru.	Minta pasien meniup alat spirometer.
19.	Stethoscope binaural		Mendengarkan suara jantung, paru-paru, dan organ dalam lainnya.	Pasang earpiece di telinga, letakkan diafragma pada tubuh pasien.
20.	Stethoscope monoaural		Mendengarkan suara jantung, paru-paru, dan organ dalam lainnya.	Pasang earpiece di telinga, letakkan diafragma pada tubuh pasien.

21.	Stopwatch		Mengukur waktu.	Tekan tombol start dan stop.
22.	Termometer digital		Mengukur suhu tubuh.	Letakkan termometer di mulut, ketiak, atau rektum, baca hasilnya.
23.	Termometer oral		Mengukur suhu tubuh melalui mulut.	Letakkan termometer di bawah lidah, tutup mulut.
24.	Termometer rektal		Mengukur suhu tubuh melalui rektum.	Lumasi termometer, masukkan ke rektum.
25.	Timer lab		Mengukur waktu dalam laboratorium.	Atur waktu, tekan tombol start.

26.	Tongue depressor		Menekan lidah saat memeriksa tenggorokan.	Tekan lidah dengan tongue depressor, periksa tenggorokan.
27.	Tourniquet		Menahan aliran darah vena untuk pengambilan darah.	Ikat tourniquet di atas area yang akan diambil darahnya.
28.	Vaginal speculum		Memeriksa bagian dalam vagina.	Lumasi speculum, masukkan ke vagina.

D. SWAMEDIKASI

Buatlah studi kasus setiap harinya dengan katagori obat yang berbeda dan wajib menelesaikan 20 jenis Obat yang tertera dalam tabel

No	Nama obat	Kategori	Studi Kasus	Patient assesment	Pemilihan Obat dan alasannya	Pelayanan informasi obat
*1.	Analgetik dan antipiretik	paracetamol; ibuprofen	Seorang pasien dewasa mengeluh demam disertai nyeri sakit kepala dan sudah dialami selama 1 hari, dan belum ada tindakan pengobatan dari pasien dan meminta obat kemasan tablet	W : Pasien dewasa 25 tahun W : Demam dan nyeri sakit kepala H : Sudah 1 hari A : Tidak memiliki alergi obat M : Belum ada tindakan	Obat yang terpilih Farsifen plus Alasannya karena dalam Farsifen plus terdapat kandungan paracetamol dan ibuprofen yang dapat meredakan demam disertai nyeri sakit kepala	Indikasi : Mengobati Demam dan nyeri Cara penggunaan:1 kaplet 3 kali sehari sesudah makan Kapan berhenti:Setelah demam dan sakit kepala hilang Kapan harus ke dokter :Jika masih mengalami demam selama 3 hari ESO yang sering :Gangguan saluran cerna Cara menyimpan : Disimpan pada suhu dibawah 30°C

*2.	Batuk	gliseril guaiakolat (guafenisin), bromheksin, diphenhidramin, asetilsistein, noskapin	Seorang pasien datang dengan keluhan batuk berdahak selama dua hari dan pasien sudah melakukan tindakan dengan minum konidin	W : Pasien dewasa 30 tahun W :Batuk berdahak H : Sudah 2 hari A : Tidak memiliki alergi obat M : Minum konidin	Obat yang terpilih *Dextral (Dextrometh orphan ,Guaifenesin, Phenylpropa nolamine,* Alasannya	Indikasi : untuk meringankan gejala batuk berdahak Cara penggunaan: 3x sehari 1 tablet Kapan berhenti:jika batuk sudah berhenti Kapan harus ke dokter :jika batuk terus menerus selama 3 hari ESO yang sering :Menyebabkan ngantuk dan gangguan pencernaan Cara menyimpan : Dibawah suhu 30°C
*3.	Obat Flu	Sediaan kombinasi parasetamol, dekstrometorfan, gliseril guaiakolat (guafenisin), CTM, dan efedrin/pseudoefedrin/ fenilpropanolamin	Seorang pasien datang ke apotek dengan keluhan demam dan pilek serta bersin secara terus menerus, pasien mengalami baru baru ini	W : Pasien 18 tahun W : Flu H : Baru-baru ini A : Tidak memiliki alergi	Obat yang terpilih *Demacolin (Paracetamo l, Pseudoephed rine HCL,*	Indikasi : Untuk meredahkan flu disertai bersin bersin dan demam Cara penggunaan: 1 tablet 3 kali sehari

				obat M : Belum ada tindakan	*Chlorpenamine maleate)* Alasannya untuk meredahkan pilek dan panas	Kapan berhenti: Jika flu sudah berhenti Kapan harus ke dokter : Bila lebih dari 3 hari ESO yang sering :Mengantuk Cara menyimpan : Disimpan pada suhu dibawah 30°C
*4.	Obat Maag	Antasida, antagonis H2 (ranitidine, famotidine)	Seorang pasien datang mengalami sakit bagian ulu hati Pasien mengalami mual saat makan Pasien sakit perut selama 2 hari Pasien sudah minum obat mylanta	W : Paien remaja 15 tahun W :Asam lambung H : Sudah 2 hari A : Tidak memiliki alergi obat M : Minum Mylanta tablet	Obat yang terpilih *HUFAMAG plus (Aluminium Hydroxide 200 mg, magnesium hydroxide 200 mg, Simethicone 50 mg)* Alasannya untuk meredakan nyeri bagian ulu hati	Indikasi :Mengurangi nyeri ulu hati, mengurangi asam lambung Cara penggunaan: 3-4 kali sehari satu kaplet Kapan berhenti:Jika nyeri asam lambungnya sudah reda Kapan harus ke dokter :melebihi 3 hari ESO yang sering

						:Sembelit diare Cara menyimpan :Suhu dibawah 30°C
*5.	Kecacingan	Pirantel pamoat, piperazin, mebendazol	Seorang pasien mengalami keluhan gatal dibagian anus selama 3 hari	W : Kerabat beliau W : Gatal-Gatal dibagian anus H : Sudah 3 hari A : Tidak memiliki alergi obat M : Belum ada	Obat yang terpilih Combantrin Alasannya Untuk mengatasi gatal gatal dibagian anus atau infeksi gatal gatal yang disebabkan oleh cacing	Indikasi :untuk infeksi gatal gatal yang disebabkan oleh cacing Cara penggunaan:1-2 tablet sekali minum Kapan berhenti:Jika gatal gatal sudah berhenti Kapan harus ke dokter :Apabila gatal gatal masih terus menerus setelah minum obat ESO yang sering :Kehilangan nafsu makan Cara menyimpan : Suhu dibawa 30°C
*6.	Diare	Attalpugit, kaolin pectin, oralit, Norit	Seorang pasien mengalami diare cair	W : Sodara beliau	Obat yang terpilih	Indikasi : Membantu

			dan bab nya 4 kali dan bisa lebih dalam sehari, sudah berlangsung selama 2 hari	W : Diare cair H : Sudah 2 Hari A : Tidak memiliki alergi obat M : Belum ada	Diapet Alasannya mengobati diare terus menerus dan memadatkan fases	mengurangi frekuensi buang air besar Cara penggunaan: 2 x 2 sehari Kapan berhenti: ketika diare sudah normal Kapan harus ke dokter : Diare masih cair dan lebih dari 4 kali masa diare nya dalam sehari ESO yang sering :pusing mual mutah Cara menyimpan : simpan dibawah 30°C
*7.	Laksatif	Bisakodil, laktulosa, Na lauril sulfat.	Pasien datang dengan keluhan susah buang air besar selama 1 hari	W : Adik beliau W : susah BAB H : Sudah 1 hari A : Tidak memiliki alergi obat M : diolesi minyak kayu putih	Obat yang terpilih Microlax gel Alasannya memliki efek cepat melunakkan fases	Indikasi :obat pencahar buat sulit BAB Cara penggunaan:Dima sukkan kedalam anus Kapan

						berhenti:dapat buang air besar dengan lancar Kapan harus ke dokter :ketika masih sulit bab selama 3 hari ESO yang sering :kekurangan cairan dan sembelit Cara menyimpan :tempat sejuk dan kering
*8.	Biang keringat, pruritus, antihistamintopikal	Salisil talk dan sediaan yang mengandung kalamin; difenhidramin 2%, prometazin HCl 2%.	Seorang anak umur 6 tahun mengalami gatal-gatal kulit dan biang keringat dibagian leher dan punggung , sudah berlangsung selama 3 hari Sebelumnnya dikasih caladine	W : Anak beliau W :biang keringat H : Sudah 3 hari A : Tidak memiliki alergi obat M : Caladine	Obat yang terpilih bedak Salicyl menthol Alasannya mengurangi biang keringat	Indikasi :Untuk mencegah biang keringat Cara penggunaan: bedak ditaburkan pada area kulit yang terkena biang keringat Kapan berhenti:setelah biang keringat pada kulit hilang Kapan harus ke dokter :bila biang keringat semakin

						parah setelah dikasih salycl ESO yang sering : panas pada kulit Cara menyimpan :suhu dibawah 30°C
*9.	Jerawat	Obat yang mengandung sulfur; resorsinol; asam salisilat; benzoil peroksida; triclosan, minosiklin1%.	Seorang pasien anak sekolah SMA mengalami jerawat an di bagian wajah dan sudah berlangsung selama 7 hari , jerawat nya merah	W :Pasien sekolah SMA W :Wajah berjerawat H : Selama 1 minggu A : Tidak memiliki alergi obat M : belum ada tindakan	Obat yang terpilih Vitacid Alasannya mencegah terbentuknya jerawat yang baru di wajah	Indikasi : untuk pengobatan jerawat secara topikal Cara penggunaan: dioleskan sehari sebelum tidur ke seluruh permukaan wajah Kapan berhenti: ketika jerawat sudah tidak muncul Kapan harus ke dokter :Bila jerawat makin banyak dan parah ESO yang sering :Kemerahan dan kulit mengelupas Cara menyimpan : Suhu dibawah

						30°C
*10.	Kadas/kurap, antifungi	Obat yang mengandung klotrimazol 1%, mikonasol nitrat 2%, ketoconazole nitrat	Seorang pasien mengalami gatal dan ada bercak bulat berwarna putih dibagian belakang leher	W : Kakak beliau W : Kadas H : 3 hari A : Tidak memiliki alergi obat M : Belum ada penanganan apapun	Obat yang terpilih Miconazole Nitrate Krim 2% Alasannya memiliki efek antifungi	Indikasi :menghilangkan rasa gatal dan bercak putih di kulit Cara penggunaan:dioleskan sehari dua kali pada kulit yang gatal Kapan berhenti: ketika sudah tidak gatal Kapan harus ke dokter :Gatal bertambah parah dan panu tambah banyak ESO yang sering :iritasi kulit Cara menyimpan : Suhu dibawah 30°C
*11.	Ketombe	*Shampoo* yang mengandung Selenium sulfid, Zincpyrithione.	Seorang pasien mengalami gatal pada rambut dan adanya	W : Pasien dewasa 27 tahun	Obat yang terpilih Selsun	Indikasi : Menghilangkan ketombe yang

			ketombe yang rontok, sudah berlangsung 5 hari dan memakai shampo anti ketombe	W : Gatal rambut karena ketombe H : Sudah 5 hari A : Tidak memiliki alergi obat M : Shampo anti ketombe	Shampo warna biru Alasannya memiliki efek anti ketombe	berat Cara penggunaan: 2 kali dalam seminggu saat pemakaian diamkan selama 2-3 menit Kapan berhenti: ketika ketombe sudah hilang Kapan harus ke dokter :bila ketombe makin parah dan rambut merasa gatal ESO yang sering :kekeringan kulit kepala Cara menyimpan : simpan dibawah suhu 30°C
*12.	Kutil	obat yang mengandung asam salisilat 2 g, asam laktat 0,5 g.	Pasien mengalami bentolan di tangan berwarna cokelat dan sudah hampir satu bulan, belum melakukan tindakan apapun	W : Saudara beliau W : Bentolan warna cokelat ditangan H : Sudah 1 bulan	Obat yang terpilih callusol Alasannya menghilangkan kutil ditangan	Indikasi : untuk menghilangkan kutil di area kulit Cara penggunaan:dioleskan pada area kulit yang ada kutil nya

				A : Tidak memiliki alergi obat M : Belum ada penanganan apapun		Kapan berhenti:ketika kutil sudah hilang Kapan harus ke dokter : ketika obat sudah habis dan kutil masih belum hilang ESO yang sering :- Cara menyimpan : Suhu dibawah 30°C
*13.	Luka bakar	Obat yang mengandung perak sulfadiazin; oleum iecoris aselli (minyak ikan,"*levertraan*").	Seorang pasien ibu ibu habis terkena wajan yang panas saat habis memasak, belum ada tindakan apapun selama 2 hari setelah terkena luka bakar	W : Pasien wanita 37 tahun W : Tangan terkena wajan yang panas H : Sudah 2 hari A : Tidak memiliki alergi obat M : Belum ada penanganan apapun	Obat yang terpilih Bioplacenton Alasannya untuk pengobatan luka bakar	Indikasi : untuk luka terkena benda yang panas atau terbakar Cara penggunaan: dioleskan 4x6 sehari pada area luka Kapan berhenti: ketika luka bakar sudah tidak sakit dan kering Kapan harus ke dokter : apabila luka bakar makin parah dan basah

						ESO yang sering : Gatal dan Bengkak Cara menyimpan : Simpan di suhu dibawah 30°C
*14.	Luka iris	Povidon iodine	Seorang pasien wanita mengalami luka iris akibat pisau sesudah memotong sayuran , pasien ingin luka tersebut cepat kering	W : Pasien lansia W : Luka iris H : Baru baru ini A : Tidak memiliki alergi obat M : Belum ada penanganan apapun	Obat yang terpilih Betadine Alasannya pencegahan infeksi karena luka iris tersebut	Indikasi : untuk luka iris agar cepat kering dan tidak infeksi Cara penggunaan: diteteskan seckupnya ke luka Kapan berhenti: ketika luka sudah kering Kapan harus ke dokter : apabila terjadi infeksi ESO yang sering : Rasa perih Cara menyimpan : Suhu dibawah 30°C
*15.	Alergi	Klorfeniramin maleat, prometazine, diphenhidramine, deksklorfeniramin maleat,loratadine, cetirizine.	Seorang pasien remaja mengeluhkan biduran dan gatal gatal setelah memakan kepiting , sudah berlangsung selama 1 hari dan	W : Pasien lansia W : Alergi kepiting H : 1 hari A : Tidak	Obat yang terpilih Xilergy Alasannya antihistamin dan memiliki	Indikasi :gatal gatal biduran Cara penggunaan:1 tablet perhari ketika malam

			sudah dikasih bedak Salycl	memiliki alergi obat M : bedak salycl	efek anti alergi	Kapan berhenti: ketika biduran hilang Kapan harus ke dokter : apabila biduran makin parah dan gatal ESO yang sering :Sakit kepala Cara menyimpan : Suhu dibawa 30°C
*16.	Vitamin dan mineral	Vit C, Vit A, Vit B1, Vit B6, Vit B12, Vitamin D,Asam folat, Mn, Zn, Fe, dll	Pasien datang dengan mengalami keluhan mudah lelah dan sering kesemutan kurang lebih selama 2 minggu ini	W : Pasien remaja 17 tahun W : mudah lelah dan kesemutan H : 14 hari A : Tidak memiliki alergi obat M : Belum ada penanganan apapun	Obat yang terpilih NEUROBION Alasannya Neurobion mengandung vitamin neurotropik	Indikasi :pencegahan dan pengobatan Neuropati dan kesemutan Cara penggunaan:1 tablet sehari sesudah makan Kapan berhenti: jika kesemutan sudah hilang Kapan harus ke dokter : jika timbul kondisi pusing dan mudah berkeringat

						ESO yang sering : mual mutah dan sakit perut Cara menyimpan : Suhu dibawah 25°C
*17.	Antiseptik dan disinfektan	Alkohol 70%, povidone iodine 10%, klorheksidin,setrimida 0,5%, serbuk PK.	Seorang pasien datang mencari alkohol untuk membersihkan luka temannya akibat kecelakaan	W : saudara beliau kecelakaan W :luka kecelakaan H : baru terjadi A : Tidak memiliki alergi obat M : Belum ada penanganan apapun	Obat yang terpilih Alkohol 70% Alasannyan membersihkan luka kecelakaan	Indikasi : membersihkan luka akibat kecelakaan agar steril Cara penggunaan: teteskan secukupnya pada luka kecelakaan Kapan berhenti: ketika sudah dikasih pertolongan pertama Kapan harus ke dokter : apabila terjadi infeksi ESO yang sering : Rasa perih Cara menyimpan : Suhu dibawah 30°C

*18.	Antiinflamasi topikal	sediaan topikal yang mengandung flusinolon asetonida; hidrokortison asetat 1%; desoksimetason 2,5 mg.	Seorang pasien datang dengan keluhan nyeri akibat peradangan sendi akibat cedera , sudah kurang lebih 2 minggu hanya dikasih minyak oles untuk sendi	W : Pasien 46 tahun W : Peradangan sendi H : 14 hari A : Tidak memiliki alergi obat M : Minyak oles untuk sendi	Obat yang terpilih Flamar tab Alasannya pengobatan akut	Indikasi : untuk pengobatan peradangan nyeri sendi, nyeri sakit kepala dan kronis Cara penggunaan: 100 mg perhari,2-3 kali sehari Kapan berhenti: apabila nyeri peradangan sendi hilang Kapan harus ke dokter :- ESO yang sering : nyeri perut atau sendi Cara menyimpan : Suhu dibawah 30°C
*19.	Obat topikal penghilang rasa sakit	sediaan yang mengandung mentol, campor, metil salisilat, oleum mentae; kayu puti; lotion lidokainHCl 3%, natrium diklofenak 1% gel.	Seorang pasien mengeluh sakit keseleo pergelangan kaki akibat habis olahraga , sudah diberi minyak gosok dan berlangsung selama 3 hari	W : Pasien remaja 14 tahun W :sakit keseleo pergelangan kaki H : 3 hari A : Tidak	Obat yang terpilih Counterpain Alasannya untuk keseleo bagian pergelangan kaki	Indikasi :meringankan sakit nyeri sendi dan otot Cara penggunaan: dioleskan pada bagian yang nyeri Kapan

				memiliki alergi obat M : minyak gosok kseleo		berhenti:ketika nyeri sendi sudah hilang Kapan harus ke dokter :Apabila nyeri semakin parah dan sakit ESO yang sering : panas di kulit Cara menyimpan :Simpan di suhu 30°C
*20.	Terapi komplementer / obat tradisional	Jamu, OHT, Fitofarmaka	Seorang pasien mencari obat untuk masuk angin disertai flu	W : Pasien usia 18 tahun W : Masuk angin dan flu H : Memiliki riwayat flu ringan A : Tidak memiliki alergi obat M : Tidak sedang meminum obat lain	Obat yang terpilih Tolak angin flu (Biru) Alasannya Mengandung kandungan herbal untuk flu	Indikasi : Mengobati masuk angin disertai flu Cara penggunaan: Diminum 3 sachet setelah makan Kapan berhenti:ketika masuk angin dan flu hilang Kapan harus ke dokter : Flu makin parah ESO yang sering : Mual dan sendawak

*20.	Terapi komplementer / obat tradisional	Jamu, OHT, Fitofarmaka	Seorang pasien mencari obat untuk masuk angin disertai flu	W : Pasien usia 18 tahun W : Masuk angin dan flu H : Memiliki riwayat flu ringan A : Tidak ada alergi M : Tidak sedang meminum obat lain	Obat yang terpilih Tolak angin flu (Biru) Alasannya Mengandung kandungan herbal untuk flu	Indikasi : Mengobati masuk angin disertai flu Cara penggunaan: Diminum 3 sachet setelah makan Kapan berhenti:ketika masuk angin dan flu hilang Kapan harus ke dokter : Flu makin parah ESO yang sering : Mual dan sendawak Cara menyimpan : Simpan dibawah suhu 30°C

Sabtu, 10 Mei 2025
Dosen Pembimbing

apt. Anindi Lupita Nasyanka, M.Farm
NIP. 1181 1907 247

Sabtu, 10 Mei 2025
Dosen Pembimbing Lapangan RS Islam Darus Syifa'

apt. Nur Suci R, S.Farm
SIPA. 35.78/2013/2780

INSTALASI FARMASI
RSI DARUS SYIFA' SURABAYA
Jl. Raya Bengkel 05 Surabaya
Telp. (031) 7406293

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 10. Tugas Khusus PL

TUGAS KHUSUS PEMBIMBING LAPANGAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
DI RSI DARUS SYIFA' SURABAYA

DANU PRASTIYO

NIM. 221105035

PROGRAM STUDI DIPLOMA III FARMASI

FAKULTAS KESEHATAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

2025

1. **Sebutkan macam-macam obat LASA minimal 5!**

LOOK A LIKE	
Elkana syr	Elkana CL syr
Sanmol drop	Sanmol syr
Cetirizin drop	Cetirizine syr
Histapan 50 mg	Heptasan 4 mg
Kalnex 500 mg	Kaltrofen 100 mg
Neurosanbe	Neurosanbe 5000
Allopurinol 100 mg	Allopurinol 300 mg
Amlodipin 5 mg	Amlodipin 10 mg
Atorvastatin 10 mg	Atorvastatin 20 mg
Bisoprolol 2,5 mg	Bisoprolol 5 mg
Candesartan 8 mg	Candesartan 16 mg
Lisinopril 5 mg	Lisinopril 10 mg
SOUND A LIKE	
Becom c	Becom zet
Mefinal	Mefinter
Omeprazol	Lansoprazol
Meiact	Meixam
Kalium diklofenak	Natrium diklofenak
Osteosan 1000	Osteopor
Inerson cream	Intercon cream
Ketomed cream	Ketomed ss
Desolex cream	Desolex lotion
Interdoxin	Intermoxyl
Ketokonazole cream	Myconazole cream
Desoximetason cream	Mometason cream

2. Sebutkan macam-macam obat High alert minimal 5!

NO.	GOLONGAN OBAT	NAMA BAHAN AKTIF	NAMA OBAT
1.	Adrenergik agonis	Epineprin	Epineprin inj
		Norepineprin	Norepineprin inj
2.	Anti aritmia	Amiodaron	Amiodarone tab Amiodaron inj
		Lidocain	Lidocain inj Lidodex inj Pehacain inj Xylocain pump spray
3.	Anastesi umum	Ketamin	Kemidex inj
		Midazolam	Sedacum inj
		Propofol	Propofol inj
		Isoflurane	Isoflurane
		Sevoflurane	Sevoflurane
		Levobupivacain	Levica inj
		Bupivacain	Regivell inj
4.	Antikoagulan	Heparin	Inviclot inj
		Fondaparinux sodium	Diviti inj
		Streptokinase	Fibrion inj
		Rivaroxaban	Lixiana 30 mg tab
		Warfarin	Warfarin 2 mg tab
5.	Calcium antagonis	Diltiazem	Farmabes inj

3. Sebutkan obat-obat yang tergolong fast moving dan slow moving!

Fast moving	Slow moving
Gabapentin	Fargoxin inj
Pioglitazone	Gemfibrazil
Acarbose	Tiamcinolon
Santagesik inj	Zine tab
Ondansetron inj	Teosal
Ketorolac inj	Neozidin

Alpentin	Levocin
Adalat oros	Mayo
Mefinal	Ett
Sanmol	

4. Sebutkan obat-obat emergency kit!

a. Daftar obat emergency di Ruang ICU
   1. Amiodaron inj
   2. Ephineprin inj (dalamkulkas)
   3. Atropininj
   4. Ca-Gluconas inj
   5. Clopidogrel tablet

b. Daftar obat emergency di Ruang Bersalin
   1. AminophyllinInj
   2. AsamtraneksamatInj
   3. Epineprin Inj (dalamkulkas)
   4. Dopamine inj(Indop)
   5. Atropin Sulfas Inj

c. Daftar obat emergency di Ruang NICU
   1. Ca Glukonas Inj
   2. Aminophilin Inj
   3. Dexamethason Inj
   4. Atropininj
   5. Ephinephrininj (dalamkulkas)

d. Daftar obat emergency di Ruang Nifas
   1. Vit K Inj
   2. Oxitocin Inj (dalamkulkas)
   3. PosparginInj (dalamkulkas)
   4. Dexamethason Inj
   5. Asam tranexamat Inj

e. Daftar obat emergency di Ruang Anak
   1. Pamol 250mg
   2. Dexamethason Inj
   3. Antrain Inj
   4. Epineprin Inj (dalamkulkas)
   5. Phenitoin Inj


f. Daftar obat emergensi di Ruang VIP
   1. Aminophilin Inj
   2. Phenitoin Inj
   3. Epineprin Inj (dalam kulkas)
   4. Atropin Inj
   5. Dobutamin Inj

g. Daftar obat emegensi di Ruang Dewasa
    1. Amiodaroninj
    2. Antraininj
    3. Asamtranexamatinj
    4. Atropininj
    5. Dexamethasoninj
h. Daftar obat emergensi di Ruang Bedah
    1. Atropininj
    2. Dexamethasoninj
    3. Dobutamininj
    4. Ephinephrininj (dalamkulkas)
    5. Dopamine/ indopinj
i. Daftar obat emergensi di Ruang IGD (Code Blue)
    1. Amiodaroninj
    2. Ephineprininj (dalamkulkas)
    3. Atropininj
    4. Ca-Gluconasinj
    5. Clopidogrel tablet
j. Daftar obat emergensi PONEK
    1. Vit K Inj
    2. Dexamethason Inj
    3. Asam tranexamat Inj
    4. Atropinsulfatinj
    5. Ephedrine inj
k. Daftar obat emergensi di Ruang RR
    1. Atropininj
    2. Dexamethasoninj
    3. Ephinephrininj (dalamkulkas)
    4. Dopamine/ indopinj
    5. ISDN tablet

5. Sebutkan sediaan injeksi narkotika!

1. Fentanex inj
2. Morfina 10 mg/ml inj
3. Pethidin 50 mg/ml inj

6. Hitung berapa obat yang dibutuhkan untuk Resep racikan tersebut!


S 2 dd 1 Tab pc Po

R/ PARACETAMOL 500 mg TAB 400 mg

VALISANBE 5 mg TAB 2 mg

AMITRIPTILIN 25 mg TAB 6.25 mg

KETOPROFEN 100 mg 75 mg

Mf da in dtd NO. X

S 2 dd 1

1. Paracetamol 500 mg tab : $\frac{400\ mg}{500\ mg}$ X 10 = 8 tab
2. Valisanbe 5 mg tab : $\frac{2\ mg}{5\ mg}$ X 10 = 4 tab
3. Amitriptilin 25 mg tab : $\frac{6.25\ mg}{25\ mg}$ X 10 = 2.5 tab
4. Ketoprofen 100 mg : $\frac{75\ mg}{100\ mg}$ X 10 = 7.5 tab