LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Bimbingan Dosen Pembimbing



PRODI FARMASI
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Formulir PKL-003

B

LEMBAR BIMBINGAN PKL
DOSEN PEMBIMBING PKL (DPP)*

TAHUN AKADEMIK : 2024/2025

Nama Mahasiswa : Sasti Amilia Putri
NIM : 22105023
Nama instansi PKL : Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik
Nama Dosen Pembimbing PKL : Apt. Siti Nur Aisyah M. Farm. Klin.

No.	Tanggal	Bimbingan dan Saran	Paraf Pembimbing
1.	15 Februari 2025	Diskusi bimbingan PKL melalui via WA	
2.	17 Februari 2025	Bimbingan logbook minggu ke-1	
3.	24 Februari 2025	Bimbingan logbook minggu ke-2	
4.	4 Maret 2025	Bimbingan logbook minggu ke-3	
5.	12 Maret 2025	Bimbingan logbook minggu ke-4	
6.	19 Maret 2025	Bimbingan logbook minggu ke-5	

*)MINIMAL BIMBINGAN 6 KALI

UNIVERSITAS BAIK PT
0633/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2018

The Power of Islamic Entrepreneurship
Jl. Sumatera 101 Gresik Kota Baru (GKB) Gresik. 61121 Telp. (031) 3951414, Fax. (031) 3952585 Website: http://www.umg.ac.id, Email: info@umg.ac.id

Lampiran 2 Lembar Bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan



PRODI FARMASI
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Formulir PKL-004

Lembar ke :

LEMBAR BIMBINGAN PKL*)
PEMBIMBING PKL (PL)

TAHUN AKADEMIK : 2024/2025

Nama Mahasiswa : Sasti Amira Putri
NIM : 221105023
Nama instansi PKL : Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik
Nama Pembimbing Lapangan : Apt. Alifiyah Hsnm, S.Si.

No.	Tanggal	Bimbingan dan Saran	Paraf Pembimbing
1.	22 Februari 2025	Bimbingan logbook minggu ke - 1	
2.	24 Februari 2025	Bimbingan logbook minggu ke - 2	
3.	25 Februari 2025	Diskusi dengan pembimbing laporan mengenai Pertambahan & Pengadaan	
4.	1 Maret 2025	Bimbingan logbook minggu ke - 3	
5.	10 Maret 2025	Bimbingan logbook minggu ke - 4	
6.	17 Maret 2025	Bimbingan logbook minggu ke - 5	

*)MINIMAL BIMBINGAN 6 KALI

[redacted]

The Power of Islamic Entrepreneurship

Lampiran 3. Surat Pesanan

Lampiran 4. Copy Resep

Lampiram 5. Faktur

Lampiran 6. Etiket

Lampiran 7. Kegiatan PKL

Lampiran 8. Kartu Stok

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

AGENDA HARIAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
DI RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH GRESIK

Sasti Amilia Putri
NIM. 221105023

PROGRAM STUDI DIPLOMA III FARMASI
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK
2025

AGENDA HARIAN (*LOG BOOK*)

Minggu ke : 1 (Rawat Jalan)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Senin, 10 Feb 2025 (07.30 - 08.00)	• Penyerahan dokumen kepada pihak Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik • Pengenalan Instalasi Farmasi di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik	 Mahasiswa menyerahkan kelengkapan dokumen kepada pihak direksi Farmasi rumah sakit muhammadiyah Gresik. mahasiswa melakukan tour pengenalan instansi yang ada di rumah sakit muhammadiyah Gresik.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
2.	Senin, 10 Feb 2025 Shift 1 (08.00 - 14.00)	• Mempelajari dan melaksanakan kegiatan pemboagian puyer dan membungkus puyer • Mempelajari dan melaksanakan kegiatan menuliskan pada kemasan obat	 mempelajari & melaksanakan kegiatan pemboagian puyer & membungkus puyer. - mengambil obat puyer sesuai dengan resep dokter - masukkan ke dalam blender obat - letakkan obat ditengah kertas puyer - masukkan puyer ke dalam alat pres puyer - tekan alat hingga lipatan menjadi lebih rapi dan tertutup rapat - periksa kembali semua puyer apakah sudah terpres dengan baik - masukkan ke dalam plastik klip - beri etiket sesuai nama pasien dan aturan pemakaian mempelajari & melaksanakan kegiatan memberi menetiketi pada kemasan obat - mengambil etiket putih - menuliskan ED obat, aturan pemakaian obat, warna pembungkus obat, No. RM, Tgl lahir dan nama obat - menempelkan etiket putih pada kemasan obat

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Selasa, 11 Feb 2025 Shift 1 (08.00 - 14.00)	• melakukan & mempelajari kegiatan meracik sediaan salep • melakukan & mempelajari kegiatan meracik sediaan kapsul	 Melakukan & mempelajari kegiatan meracik sediaan resep - mempersiapkan sediaan salep sesuai resep - Masukkan sediaan salep yang sesuai dengan resep dokter ke dalam pot salep - Aduk ad homogen salep - Berikan etiket biru yang berisi tgl pembuatan, nama sediaan Melakukan & mempelajari kegiatan meracik sediaan kapsul - menyiapkan obat sesuai dengan resep - haluskan obat ke dalam blender - masukkan cangkang kapsul ke dalam alat pengisi kapsul sesuai dengan jumlah yang diminta - tutup penutup cangkang - masukkan cangkang kapsul ke dalam plastik klip - beri etiket putih yang berisi_ No. RM, Tgl. lahir, nama obat, tgl, ED, aturan pemakaian dan waktu pemakaian - kemudian kapsul dimasukkan ke dalam plastic klip

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Rabu, 12 Feb 2025 Shift I (08.00 - 14.00)	• Mempelajari macam-macam etiket di rumah sakit Muhammadiyah gresik	Mampu membedakan macam-macam etiket seperti etiket biru, putih dan etiket antibiotik 1) etiket putih terdiri dari No RM, TGL. Lahir, Nama obat, TGL, ED, Aturan pakai, waktu pemakaian obat (06-07, 09-10, 11-12, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 18-19, 20-21, 21-23). Digunakan untuk obat yang akan diminum / peroral 2) etiket biru terdiri dari No RM. TGL lahir, Nama obat, TGL ED, Aturan pakai, waktu pemakaian obat (06-09, 09-10, 11-12, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 18-19, 20-21, 21-23). Digunakan untuk obat luar etiket biru untuk salep dan ktim terdiri dari No. RM. TGL Nama pasien 3). etiket dengan penandaan antibiotik terdiri dari No. RM. TGL lahir, Nama Obat, TGL, ED, Aturan pakai, waktu pemakaian obat (06-07, 09-10, 11-12, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 18-19, 20-21, 21-23). Digunakan hanya menggunakan resep dokter. Diberikan dan di minum sesuai jadwal

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
		• mempelajari teknik penyimpanan obat di Farmasi rawat jalan	Obat high alert merupakan obat yang bisa menyebabkan efek samping serius jika terjadi kesalahan dalam pemberian dosis. obat high alert perlu adanya pengawasan khusus. contoh : Dopamine Hcl, Lidocain, pethidina, morfin. Obat-obatan tersebut ditandai dengan sticer warna merah dan label peringatan " High Alert caution" warna merah Obat lasa merupakan obat yang tampilannya mirip / nama nya hampirsama contoh : Amlodipin 5 mg, Amlodipin 10 mg, Ciprofloxacin, cefadroxil Obat-obatan tersebut ditandai dengan etiket warna kuning dan label " Norum " warna kuning.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Kamis, 13 Feb. 2025 Shift 2 (14.00 - 21.00)	• Mempelajari tentang lemari B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik	*Lemari B3 adalah tempat khusus untuk menyimpan bahan - bahan yang berpotensi membahayakan kesehatan [redacted] Fungsi lemari B3 : 1. mencegah paparan bahaya mengurangi risiko paparan zat beracun terhadap tenaga medis & pasien [redacted] 2. menghindari kontaminasi menyimpan bahan dengan aman untuk mencegah pencemaran udara, air / permukaan lainnya 3. menjaga keamanan & keamanan bahan 4. memastikan kepatuhan regulasi penyimpanan B3 harus mengikuti aturan dari kementrian kesehatan, Standar pelayanan farmasi di rumah sakit [redacted]

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Jum'at 14 Feb 2025 Shift 2 (14.00 - 18.00)	• Mempelajari dan melakukan kegiatan penyiapan obat • Mempelajari dan melakukan kegiatan stock opname obat golongan NAPZA	 Mempelajari dan melakukan kegiatan penyiapan obat - memeriksa nama obat, bentuk sediaan dan tanggal kadaluwarsa pada obat - memasukkan obat kedalam plastik bening dan beri etiket pada masing-masing obat yang berisi No. RM, Tgl lahir, Nama obat, Tgl, ED, Aturan pakai, Waktu pemakaian obat (06-07, 09-10, 11-12, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 18-19, 20-21, 21-23). Mempelajari dan melakukan kegiatan stok akhir shift obat golongan NAPZA * Memahami cara menghitung, mencatat, dan mengecek persediaan obat narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sesuai aturan yang berlaku. Kegiatan ini mencakup pemeriksaan jumlah fisik obat, pencatatan di buku stok / sistem elektronik, serta pelaporan ke instansi untuk mencegah penyalahgunaan / memastikan ketersediaan obat secara aman.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Sabtu, 15 Feb 2025 Shift 2 (14.00 - 21.00)	• Melayani penyimpanan narkotika, psikotropika, OOT dan prekursor	Penyimpanan HAPZA harus mengikuti aturan ketat untuk mencegah penyalah gunaan & memastikan keamanan pasien. terdapat persyaratan penyimpanan lemari HAPZA : 1. Bahan kuat & tahan bongkar 2. Dilengkapi kunci ganda yg boleh diakses Apoteker penanggung jawab 3. Dilengkapi cctv / pengawasan ketat u/ mencegah pencurian 4. Diadakan pencatatan pada kartu stok harian & bulanan 5. lemari ditandai adanya stiker atau garis merah 6. Adanya rak pembeda narkotika dengan prekursor, psikotropika

Gresik, 22 Februari 2025
Dosen Pembimbing,

Apt. Siti Nur Asiyah, M. Fram. Klin.
NIDN. 0711088504

Gresik, 22 Februari 2025
Pembimbing Lapangan RS Muhammadiyah Gresik

RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH GRESIK

Apt. Alifyah Hnum, S.Si.
SIPA. 19720607/ SIPA.35.25/ 2022/ 2527

AGENDA HARIAN (*LOG BOOK*)

Minggu ke : 2 (Rawat Inap)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Senin, 17 Feb 2025 (14.00 - 21.00) Shift 2	• Mempelajari thetnic penyimpanan obat di instansi farmasi rawat inap • Mempelajari penyimpanan sediaan insulin dan macam-macam sediaan insulin yang ada di instansi farmasi rawat inap	* penyimpanan obat dinstansi farmasi rawat inap berdasarkan pengelompokan obat sesuai jenis dan penggunaannya yang berguna untuk mencegah kesalahan dalam pengambilan obat, serta memastikan keamanan & efektivitas obat. Dalam penyimpanan ini terdapat perbedaan warna rak penyimpanan yaitu: 1). Rak warna coklat => menyimpan Alkes (Alat kesehatan) tujuan untuk memisahkan alat kesehatan dari obat-obatan, menghindari kontaminasi silang & memastikan alat alat tersebut tersimpan dg baik. 2). Rak warna kuning => menyimpanan obat injeksi paten tujuan untuk memudahkan mengambil obat injeksi dengan cepat 3). Rak warna hijau => menyimpanan obat Generic golongan high alert & norum D High Alert —> obat perlu pengawasan khusus / ketat D Norum —> obat dg nama / tampilan mirip tujuan untuk mencegah kesalahan dalam pengambilan obat dan memastikan penggunaannya sesuai dengan standar keamanan yang ketat.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			4). Rak warna putih ⟹ menyimpan obat paten tujuan untuk membedakan obat paten dengan obat generic 5). Rak warna putih terpisah ⟹ menyimpan obat sirup obat sirup memiliki karakteristik cair yang lebih rentan terhadap perubahan suhu dan kontaminasi. Oleh karena itu disimpan dalam rak khusus.  Rak penyimpanan alkes Rak penyimpanan obat generik

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			 Rak penyimpanan obat paten Rak penyimpanan sediaan syrup Rak penyimpanan Obat HAM generik / paten

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
2.	Senin, 17 Feb 2025 (14.00 - 21.00) Shift 2		* penyimpanan obat sediaan Ineus di instansi farmasi rawat inap berdasarkan pengelompokannya yang terdiri : 1). Ineus Dextrose monohydrate Sodium Chloride Digunakan untuk mengatasi dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit serta memberikan energi tambahan bagi pasien yg membutuhkan asupan glukosa 2). Ineus Trider 27 B Digunakan sebagai pengganti cairan tubuh pasien yang mengalami kehilangan cairan akibat muntah, diare, / kondisi medis lainnya 3). Ineus Ringer Acetate Digunakan sebagai pengganti cairan tubuh mengandung elektrolit pada pasien yg mengalami kehilangan cairan / dehi- dari berat 4). Ineus Otsu RD 5 Digunakan untuk mengatasi dehidrasi ringan hingga sedang serta memberikan sumber energi bagi pasien yg mem butuhkan asupan kalori 5). Ineus otsu RD 10 Digunakan untuk memberikan energi tambahan kepada pasien dengan kebutuhan metabolik tinggi seperti pasien malnutrisi / dalam kondisi pasca operasi.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			Rak penyimpanan macam - macam sediaan infus

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
2.	Selasa, 18 Februari (14.00 - 21.00) Shift 2	• Mempelajari obat Emergency di rumah sakit muhammadiyah gresik	*Obat emergency merupakan obat yang digunakan dalam situasi darurat untuk menangani kondisi medis yang mengancam nyawa / memerlukan penanganan segera. Obat emergency biasanya tersedia di berbagai fasilitas kesehatan seperti ruang gawat darurat (IGD), ambulans, unit perawatan intensif (ICU), serta ruang operasi. penyimpanan obat emergency harus diatur dengan baik agar selalu siap digunakan. Biasanya obat ini di simpan dalam kotak khusus atau lemari darurat yang mudah dijangkau oleh tenaga medis.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Selasa, 18 Feb 2025 (14.00 - 21.00) Shift 2	• mempelajari alat pengiriman obat / Transponet dan bagaimana cara kerjanya	*Transponet merupakan sistem alat transportasi yang digunakan untuk mengirim obat dengan aman dan efisien di lingkungan rumah sakit. Sistem ini biasanya berbentuk tabung yang bergerak melalui jalur tertentu. cara kerja pengiriman obat menggunakan transponet 1). Obat dimasukkan kedalam wadah tabung 2). tekan nomor ruangan yang akan dituju pada monitor transponet 3). tekan gambar pesawat warna hijau pada monitor sehingga bisa diberikan penggiriman 4). Jika sudah maka obat tersebut akan terkirim ke ruangan yang akan dituju

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Rabu, 19 Feb 2025 (14.00 - 21.00) Shift 2	• Mempelajari penyimpan an sediaan obat di lemari pendingin	* penyimpanan obat di lemari pendingin bertujuan untuk menjaga stabilitas, efektivitas dan keamanan obat yang memerlukan suhu rendah. Beberapa jenis obat yang disimpan di lemari pendi ngin diantaranya jenis obat vaksin, insulin, albumin dan antibiotic. obat - obatan ini disimpan agar tidak mengalami degradasi. Suhu ideal untuk penyimpanan obat di lema ri pendingin pada suhu 2 - 8 °C karena dapat mencegah obat mengalami perubahan kimia yang dapat mengurangi efektivitasnya, menghambat pertumbuhan bakteri atau jamur dapat merusak kandungan obat dan memastikan obat tetap aman digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
2.	Rabu, 19 Februari (14.00 - 21.00) Shift 2	• Mempelajari resep alkes dan permintaan alkes (alat kesehatan) di rumah sakit muhammadiyah gresik pada instansi farmasi rawat inap	Resep alat kesehatan (alkes) merupakan dowumen resmi yang diterbitkan oleh dokter / tenaga medis yang berwenang untuk meresepkan penggunaan alat kesehatan bagi pasien dirumah sakit. Tugas resep alkes adalah untuk menentukan alat kesehatan yang sesuai dengan kondisi pasien, memastikan pasien mendapatkan alat kesehatan yg aman & berkualitas,  RS MUHAMMADIYAH GRESIK Pemberi : dr. FELISA NUR KHAYANA (IGD) No. Resep : 2025021700357 RESEP R/ BL NO 1 INJ RANITIDIN NO 1 SPUIT 3CC NO 1 INFUS SET NO 1 ALKOHOL SWAB NO 2 VERBAN 3CM NO 1 HANSAPLAS NO 1 POLYFLEX 2G NO 1 Gresik, 17-02-2025

Scanned with CamScanner

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Kamis, 20 Feb 2025 (07.00 - 14.00) Shift 1	• mempelajari dan melaksanakan kegiatan Ancar/ mencocokkan sediaan obat Napza dengan System komputer berdasarkan jumlahnya dan mengetahui penggolonggan obat yang termasuk Napza di Instansi Farmasi rawat inap	kegiatan mencocokkan jumlah obat narcotica dan psikotropika yang tersedia secara fisik dengan data yang tercatat di komputer atau pada buku catatan napza disebut rekonsiliasi stok napza. tujuan kegiatan ini untuk memastikan jumlah obat agar sesuai dengan pencatatan sehingga dapat mencegah kecelakaan, kehilangan / penyalahgunaan. proses rekonsiliasi dimulai dengan memeriksa data dari komputer kemudian di tulis di buku pencatatan napza untuk mengetahui jumlah obat yang seharusnya tersedia. kemudian dilakukan perhitungan langsung terhadap stok fisik di kamar penyimpanan napza. Hasil perhitungan fisik kemudian dibandingkan dengan catatan di sistem komputer untuk memastikan jumlahnya. Jika ditemukan perbedaan ketidaksesuaian antara jumlah obat yang tercatat dengan jumlah fisik yang tersedia maka harus segera melapor kepada kepala instansi farmasi untuk ditindak lanjuti.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
2.	Kamis, 20 Feb 2025 (07.00 - 14.00) Shift 1	• Melakukan distribusi Obat ke unit lain di rumah sakit muhammadiyah gresik	Distribusi obat merupakan proses pengiriman obat dari instalasi Farmasi rumah sakit (IFRS) ke unit pelayanan seperti ruang IGD, ICU, RDU, RA, GPT dll. kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pasien mendapatkan obat yang tepat, dalam jumlah yang sesuai dan tepat waktu. kegiatan distribusi farmasi disesuaikan dengan permintaan obat dari unit pelayanan ke instalasi farmasi. kemudian teraga farmasi / apoteker menyiapkan obat sesuai kebutuhan, diaturkan pengecekan dan mencatatnya di sistem. Obat kemudian dikirim / diantar ke unit yang membutuhkan. Distribusi obat dapat diaturkan dengan sistem UDD (Unit Dose Dispensing) untuk dose tunggal. Beberapa obat disediakan dalam floor stock system / stok terbatas di setiap unit pelayanan untuk penggunaan segera. kegiatan distribusi obat harus diaturkan dengan teliti agar obat yang dikirim sesuai dengan permintaan dan tidak terjadi kesalahan, sehingga pasien mendapat pengobatan yang optimal.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			melakukan kegiatan pendistribusian obat ke berbagai unit lain di rumah sakit muhammadiyah Gresik

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Jum'at, 21 Feb 2025 (07.00 – 14.00) Shift 1	• Mempelajari obat-obatan ERAC (Enhanced Recovery After Cesarean Surgery) jaminan BPJS	Dalam layanan BPJS kesehatan, operasi persalinan sesar termasuk dalam prosedur yang ditanggung jika memenuhi indikasi medis. Untuk mendukung tindakan ini diberikan obat-obatan dan alat kesehatan (alkes) yang sesuai dengan standar medis dan masuk dalam formularium nasional (fornas). Obat yang digunakan dalam persalinan sesar umumnya meliputi: 1). obat anastesi / untuk pembiusan 2). obat antibiotik / untuk mencegah infeksi 3) obat anti nyeri / untuk mengurangi rasa sakit 4). obat oksitosin / untuk membantu kontraksi rahim pasca operasi 5). obat antiemetik / untuk mencegah mual muntah akibat anestesi Alat kesehatan yang dibutuhkan dalam operasi sesar meliputi: 1). set alat bedah operasi 2). kateter urin 3). alat anastesi 4). infus 5). alat resusitasi bayi. melalui ERAC, pasien yang sudah terjadwal untuk operasi sesar dapat mengambil obat / alkes lebih awal yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan obat dan alat kesehatan sehingga operasi dapat dilakukan tepat waktu.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			Sediaan obat - obatan dan alat kesehatan (acces) ERAC jaminan BPJS

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Sabtu, 22 Feb 2025 (07.00 - 14.00) Shift 1	• Menganalisa resep obat dan alkes pinjaman OK yang ada di Instansi Farmasi Rawat Inap	Resep obat dan alat kesehatan (alkes) pinjaman OK (operasi kamar atau OK) merupakan permintaan obat / alkes untuk keperluan tindakan operasi di ruang bedah. Dari resep obat & alkes pinjaman OK terdapat formulir resep yang meliputi : 1.) Aspek Administrasi 2.) Aspek Farmasetik 3.) Aspek Klinis. Dari aspek - aspek tersebut resep harus diperiksa oleh dokter penanggung jawab pasien berdasarkan : 1). kejelasan tulisan resep → jika tulisan tidak terbaca dapat menyebabkan kesalahan dalam pemberian obat 2). Tepat obat, Dosis, rute dan waktu → Harus sesuai dengan kebutuhan pasien dan indikasinya. 3). Duplikasi obat → jika ada dua obat dg zat aktif yang sama 4). Alergi & interaksi obat → Harus diperiksa agar tidak menyebabkan efek samping yg berbahaya 5). Berat badan → Dosis obat dihitung berdasarkan berat badan 6). kontraindikasi → jika obat bertentangan dengan kondisi pasien

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			Adapun macam-macam golongan obat Napza yang ada di instansi Farmasi rawat inap yaitu : 1). Alprazolam 0,5 mg tab 2). Analsik tab 3). Besanmag tab 4). Braxidin tab 5). Codein 10 mg tab 6). Obbazam 10 mg tab 7). Diazepam crema 8). Fentanex injeksi 9). Morphin injeksi 10). pethidin injeksi 11). Stesolid injeksi 12). Valisanbe 5 mg tab 13). Valisanbe injeksi 14). Miloz injeksi

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1	Sabtu, 22 Februari (07.00 – 14.00) Shift 1	• mempelajari alur pelayanan resep di instalasi farmasi rawat inap dan mempelajari formularium resep jaminan (Bpjs, umum & asuransi)	Alur pelayanan farmasi rawat inap berdasarkan jaminan 1). Bpjs kesehatan menggunakan Formularium Nasional (Fornas) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah 2). umum (pasien mandiri / tanpa asuransi) menggunakan formularium rumah sakit sesuai dengan kebijakan masing - masing 3). Asuransi swasta menggunakan Formularium Inhealt / formularium yang sesuai dengan ketentuan asuransi yang digunakan pasien Alur pelayanan Farmasi rawat inap 1). Resep manual / resep elektronik Dokter menuliskan resep obat berdasarkan jenis jaminan pasien. resep dalam bentuk manual / tertulis atau resep elektronik (e - resep) langsung terhubung ke sistem farmasi rumah sakit 2). Data dari resep kemudian di input ke komputer 3). setelah data sudah diinput ke komputer selanjutnya penyiapan obat yang diambil sesuai dengan resep

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			 Resep obat pinjaman ok golongan NAPZA
			Resep alkes pinjaman ok

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			 Resep obat penjaman OK golongan obat oral
			Resep obat penjaman OK golongan obat high alret

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			konfirmasi perubahan resep meliputi : 1). perubahan dosis / jenis obat → indikasi medis yg lebih tepat 2). perbaikan tulisan resep → jika sulit dibaca 3). koreksi identitas pasien → jika terjadi kesalahan pencatatan. konfirmasi perubahan resep jika ada ketidaksesuaian maka apoteker harus mengonfirmasi dengan DPJP.  Formulir resep obat pinjaman OK  Formulir resep alkes pinjaman OK

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			1). Dilakukan pengecekan kembali sebelum obat diberikan 2). Pemodan pemberian etiket pada obat 3). Penyerahan obat beserta KIE mengenai aturan peng-gunaan obat, efek samping dan indikasi obat.

Gresik, 29 Februari 2025
Dosen Pembimbing,

Apt. Siti Nur Asiyah, M. Fram. Klin.
NIDN. 0711088504

Gresik, 29 Februari 2025
Pembimbing Lapangan RS Muhammadiyah Gresik

RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH GRESIK
INSTALASI FARMASI

Apt. Alifiyah Hnum, S.Si
SIPA. 19720607/ SIPA_35.25/ 2022/ 2527

AGENDA HARIAN (*LOG BOOK*)

Minggu ke : 3 (logistik)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Senin, 24-2-2025 (07.00 - 14.00) Shift 1	• Mempelajari penyimpanan alat kesehatan (alkes) logistik inap di gudang Farmasi	Penyimpanan alkes / alat kesehatan logistik inap masing-masing jenis alat kesehatan disimpan di tempat dengan masing-masing diberi label nama alkes seperti feeding tube, IV catheter, needle, soet band, & stenscrepe. barang-barang dikelompokkan sesuai dengan fungsinya. Alkes / alat kesehatan di susun di rak kayu agar tidak langsung bersentuhan dengan lantai, sehingga lebih bersih dan aman. ruangan di logistik farmasi harus bersih, rapi sehingga dapat mengurangi risiko kontaminasi. Setiap kardus memiliki label yang jelas untuk memudahkan pencatatan stok dan pencarian barang. Selain itu penyusunan rapi membuat pengambilan barang lebih mudah dan efisien.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
2.	Selasa, 25-Feb 2025 (07.00 - 14.00) Shift 1	• Mempelajari penyimpanan Sediaan salep dan cream di logistik farmasi	Obat dalam bentuk sediaan salep dan cream disusun dengan rapi secara horizontal dengan kemasan obat masih dalam kondisi baik, tidak rusak dan tidak terbuka, dan disusun dengan posisi nama produk terlihat sehingga mudah diidentifikasi. untuk menjaga kualitas sediaan salep dan cream harus di simpan pada suhu 15 - 30 °C dan dijauhkan dari paparan sinar matahari langsung. tempat penyimpanan juga harus kering agar kelembaban tidak merusak kandungan sediaan obat. penyimpanan diaturkan dengan sistem FEFO (First Expired, First out). merupakan produk sediaan obat dengan masa kadaluwarsa lebih cepat yang harus digunakan lebih dahulu. LD dan FIFO (First In First Out) pencatatan pada sediaan salep dan cream stok masuk dan keluar harus dicatat baik secara manual / digital untuk mencegah kelebihan / kekurangan stok

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Rabu, 26 Feb 2025 (07.00 - 14.00) Shift 1	• Mempelajari pengadaan alat kesehatan dari tiap - tiap unit instansi ke gudang logistik farmasi di rumah sakit muhammadiyah gresik.	Pengadaan alat kesehatan (alkes) dilakukan setiap bulan agar stok tetap tersedia dan tidak terjadi kekurangan yang bisa menghambat pelayanan pasien. Dalam pengadaan melibatkan beberapa tahap mulai dari pengecekan kebutuhan hingga pemesanan ke PBF (pedagang Besar Farmasi.). Adapun tahapan pengadaan alat kesehatan (alkes) di setiap bulan 1). pengecekan kebutuhan di setiap unit, misalnya IGD, ICU, rawat jalan, rawat inap dll melakukan pengecekan terhadap stok alkes yang tersedia dan yang hampir habis. Jika barang stoknya menipis / sudah habis maka unit tersebut membuat daftar kebutuhan untuk dikirim ke logistik farmasi. 2). pengajuan permintaan ke logistik farmasi Daftar kebutuhan dari tiap unit dikumpulkan di logistik farmasi untuk dicek apakah barang masih tersedia di gudang. setiap permintaan dicatat sepetti nama barang, jumlah yang diperlukan dan satuan barang (box , pcs , botol dll). 3). Pengecekan stok di gudang farmasi Jika barang masih tersedia dalam jumlah cukup maka barang tersebut akan didistribusikan ke unit yang membutuhkan. Jika stok kurang / habis maka logistik farmasi akan mengajukan pemesanan ulang ke PBF agar stok bisa dipenuhi. 4). Pemesanan ke PBF logistik farmasi akan memesan alat kesehatan (alkes) ke PBF sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. PBF akan mengirimkan barang yang sesuai pesanan & memastikan barang dalam kondisi baik dan belum kadaluwarsa.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			5). penerimaan & penyimpanan di gudang farmasi petugas farmasi akan memeriksa jumlah pesanan, kondisi barang & tanggal kadaluwarsa yg sesuai dengan surat pesanan dan dicocokkan juga dengan faktur barang. penyimpanan dilakukan dengan sistem FEFO (First Expired, First Out) dan FIFO (First In First Out) 6). Distribusi ke unit yang membutuhkan logistik farmasi akan redistribusikan ke unit-unit yang telah menggunakan permintaan. 7). pencatatan stok melalui sistem elektronik pencatatan stok dilakukan setiap bulan agar jumlah pengadaan bisa disesuaikan dengan kebutuhan untuk menghindari kelebihan / kekurangan stok. 

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Kamis, 20 Feb 2025 (09.00 - 14.00) Shift 1	• Mempelajari surat pemesanan / SP obat di logistik farmasi rumah sakit muhammadiyah gresik ke PBF / pedagang Besar Farmasi	Surat pemesanan obat merupakan dokumen yang digunakan oleh petugas logistik farmasi untuk memesan obat dari pedagang Besar Farmasi (PBF). Surat pesanan berisi seperti nama obat, jumlah obat / sediaan yang dipesan, satuan kemasan, identitas penerima dan pengirim, nomor surat dan tanggal pemesanan. Dalam daftar obat terdapat ketentuan khusus seperti masa kadaluwarsa minimun yang bertujuan untuk menjaga kualitas obat dan menghindari pemberian produk obat yang melebihi tanggal kadaluwarsa. selain itu surat pemesan harus di tanda tangani oleh apoteker / pihak yang bertanggung jawab sebagai bukti bahwa pesanan sudah diperiksa dan sesuai dengan kebutuhan. Tujuan surat pemesanan ini untuk memastikan stok obat yang tersedia dalam jumlah cukup tidak berlebihan / kekurangan. Dengan adanya surat pemesanan ini, pengelolaan obat menjadi lebih tertata dan apabila ada masalah dalam pengiriman maka surat pesanan ini bisa dijadikan bukti untuk di tindaklanjuti. 

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
2.	kamis, 20 Feb 2015 (07.00 - 14.00) Shift 1	• mempelajari Surat pemesanan / SP sediaan Obat Narkotika di logistik farmasi ke PBF	Surat pemesanan narkotika merupakan dokumen resmi yang digunakan oleh fasilitas kesehatan untuk memesan obat golongan narkotika dari pedagang Besar Farmasi (PBF). Pemesanan ini harus mengikuti aturan ketat karena narkotika berisiko tinggi jika disalahgunakan. Surat pemesanan ini berisi nama, alamat instansi kesehatan, Alamat dan nama pengirim PBF, jenis dan jumlah narkotika yang akan di pesan. Dokumen ini harus ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab dan dilengkapi izin praktik (SIPA / STR). Surat pemesanan narkotika dibuat menjadi empat rangkap yaitu : 1). lembar pertama untuk PBF sebagai dasar pengeluaran narkotika 2). lembar kedua untuk dinas kesehatan setempat sebagai bahan pengawasan 3). lembar ketiga untuk fasilitas kesehatan sebagai arsip 4). lembar keempat untuk BPOM sebagai bagian dari sistem pelaporan Setelah menerima pesanan fasilitas kesehatan wajib mencatat penerimaan dan penggunaan narkotika serta melaporkannya ke BPOM atau dinas kesehatan untuk memastikan kepatuhan dan mencegah penyalahgunaan.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
3.	kamis, 20 Feb 2025 (07.00 - 14.00) 8 jam	• mempelajari Surat pemesanan LSP sediaan Obat psikotropika di logistik farmasi ke PBF	Surat pemesanan psikotropika merupakan dokumen resmi yang di gunakan oleh fasilitas kesehatan untuk memesan obat golongan psikotropika dari pedagang Besar Farmasi (PBF). karena psikotropika dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan dapat berresiko jika disalahgunakan. pemesannya harus mengikuti aturan ketat yang sudah ditetapkan pemerintah. Surat pemesanan ini berisi nama, alamat instansi kesehatan nama dan alamat pengirim PBF, jenis dan jumlah obat psikotropika yang akan di pesan. Dokumen ini harus di tanda tangani oleh apoteker penanggung jawab dengan disertai bapi izin praktik (SIPA / STR). pemesanan diawasi ketat oleh pihak khusus dari kementrian kesehatan. Surat pesanan psikotropika dibuat menjadi tiga rangkap yaitu: 1). lembar pertama untuk PBF sebagai dasar pengiriman psikotropika 2). lembar kedua untuk Dinas kesehatan setempat sebagai bahan pengawasan 3). lembar ketiga untuk fasilitas kesehatan sebagai arsip Setelah pesanan diterima, fasilitas kesehatan wajib mencatat penerimaan dan penggunaan psikotropika serta melaporkan-nya secara berkala ke Dinas kesehatan / BPOM untuk memastikan kepatuhan & mencegah penyalahgunaan.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Kamis, 20 Feb 2025 (07.00 - 14.00) Shift 1	• Mempelajari Surat pemesanan / SP Sediaan Obat Prekusor di logistik farmasi ke PBF	Surat pemesanan prekusor merupakan dokumen resmi yang digunakan oleh fasilitas kesehatan untuk memesan obat yang mengandung Prekusor farmasi dari pedagang Besar Farmasi (PBF). Prekusor merupakan zat yang mengandung ephedrine, pseudoephedrine, norephedrine, ergotamine, ergometrine / potassium permanganat sehingga pemesanannya diatur dengan ketat oleh pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan. Surat pemesanan prekusor ini harus mencantumkan nama, alamat instansi kesehatan, nama dan alamat pengirim PBF, jenis dan jumlah obat prekusor yang akan di pesan. Dokumen ini harus ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab dengan dicantumkan izin praktik (SIPA / STR). Pemesanan diatur menggunakan blanko khusus dari kementrian kesehatan dan harus mengikuti sistem FEFO (First Expired, First out) agar obat digunakan sebelum kedaluwarsa. Surat pemesanan obat prekusor dibuat dalam tiga rangkap: 1). lembar pertama untuk PBF sebagai dasar pengeluaran obat prekusor 2). lembar kedua untuk dinas kesehatan sebagai bahan pengawasan 3). lembar ketiga untuk arsip di fasilitas kesehatan. Setelah pemesanan diterima, fasilitas kesehatan wajib mencatat penerimaan dan penggunaan obat prekusor dalam pembukuan khusus serta melaporkannya secara berkala ke dinas kesehatan / BPOM untuk memastikan kepatuhan dan mencegah penyalahgunaan.



No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
5.	kamis, 20 Feb 2025 (07.00 - 14.00) Shift I	• Mempelajari surat pemesanan (SP) sediaan obat - obatan tertentu (OOT) di logistik farmasi ke PBF	Surat pemesanan obat - obatan tertentu (OOT) merupakan dokumen tertulis yang digunakan oleh fasilitas kesehatan untuk memesan obat - obat tertentu dari pedagang Besar Farmasi (PBF). OOT merupakan obat yang memiliki potensi penyalahgunaan tetapi bukan termasuk narkotika / psikotropika. Oleh karena itu, pemesanya tetap diawasi secara ketat oleh pemerintah. Surat pemesanan obat - obatan tertentu ini harus mencantumkan nama, alamat instansi kesehatan, nama dan alamat pengirim PBF, jenis dan jumlah obat OOT yang akan dipesan. Dokumen ini harus oleh apoteker penanggung jawab dengan izin praktik (SIPA / STR) yang masih berlaku. Surat pemesanan OOT dibuat menjadi tiga rangkap yaitu : 1) lembar pertama untuk PBF sebagai dasar pengeluaran obat 2) lembar kedua untuk Dinas kesehatan sebagai bahan pengawasan 3) lembar ketiga untuk arsip fasilitas kesehatan. Setelah pemesanan diterima. fasilitas kesehatan wajib mencatat penerimaan dan penggunaan obat - obat tertentu dalam pembukuan khusus serta melaporkannya secara berkala ke dinas kesehatan / BPOM untuk memastikan kepatuhan dan mencegah pengalahgunaan.



No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Jum'at, 21 Feb 2025 (07.00 - 14.00) Shift 1	• Mempelajari jenis faktur dan bagian-bagian faktur pembelian obat dari PBF	Faktur merupakan dokumen resmi yang digunakan sebagai bukti transaksi dalam pembelian dan penjualan obat antara pedagang Besar Farmasi (PBF) dan fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit. Bagian-bagian faktur : 1). Identitas penerima berisi nama & alamat fasilitas kesehatan, termasuk NPWP dan nomor izin fasilitas kesehatan 2). Identitas PBF berisi nama & alamat PBF dilengkapi dengan nomor izin usaha dan no telepon PBF 3). Tanggal / nomor faktur berisi tanggal transaksi dan nomor faktur sebagai pencatatan 4). Detail obat berisi nama obat, bentuk sediaan dan kekuatan dosis, jumlah pesanan, satuan kemasan, no batch dan tanggal kadaluwarsa 5). Harga & total pembayaran berisi harga satuan per obat & total harga berdasarkan jumlah pesanan. PPN dan total akhir pembayaran dicantumkan 6). tanda tangan & stempel berisi tanda tangan apoteker penanggung jawab & stempel PBF sebagai bukti transaksi. Faktur harus disimpan dengan baik. sebagai arsip untuk pelaporan & pengawasan oleh Dinas kesehatan dan BPOM.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
2	[redacted]		Contoh Faktur PT. Kimia Farma (Narcotika) Contoh Faktur PT Bina San Prima (Psikotropika) Contoh Faktur PT. Bina San Prima (Obat-Obatan Tertentu) Contoh Faktur PT. Anugrah Argon Medika (Prekusor)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Sabtu, 1 Mar 2025 (07.00 - 14.00) Shift 1	• Mempelajari dan mengetahui daftar nama PBF pengirim obat narkotika di rumah sakit muhammadiyah gresik	PT kimia farma merupakan salah satu perusahaan farmasi terbesar diindonesia yang memiliki pedagang Besar Farmasi (PBF) bertanggung jawab atas distribusi obat - obatan ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Beberapa obat yang didistribusikan oleh kimia farma yaitu fentanex, codicat, pentidina Hcl, dan morfina yang merupakan golongan opioid. 1) fentanex 0.05 mg / ml 2 ml mengandung fentanil yaitu obat pereda nyeri yang sangat kuat. biasanya digunakan untuk pasien dengan nyeri berat. 2). codicat 10 mg tab mengandung kodein yang sering digunakan untuk obat batuk / pereda nyeri ringga sedang. 3). pentidina Hcl 50 mg / ml mengandung petidina (meperidin) merupakan obat pereda nyeri yang sering digunakan, misalnya sebelum operasi atau saat melahirkan. 4). morfina 10 mg / ml obat pereda nyeri paling kuat digunakan untuk mengatasi nyeri kronis / nyeri berat. obat - obatan ini termasuk kategori narkotika yang memiliki aturan ketat dalam distribusi dan penggunaannya harus menggunakan resep dokter.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			Daftar PBF Sediaan Obat narkotika PT. Kimia Farma Faktur obat Fentanek 0,05 mg / ml 2ml Faktur obat morfina 10 mg Faktur obat petidina HCl 50 mg (ml) Faktur obat Morfina 10mg (ml)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
2.	Sabtu, 1 Maret 2025 (07-00 - 14.00) Shift-1	• mempelajari dan mengetahui daftar nama PBF pengirim obat psikotropika di rumah sakit muhammadiyah gresik	Psikotropika merupakan obat yang mempengaruhi sistem saraf pusat dan dapat menyebabkan perubahan suasana hati, kesadaran, dan perilaku. karena memiliki potensi penyalahgunaan, distribusi obat psikotropika diawasi ketat oleh pemerintah dan hanya PBF tertentu yang memiliki Izin untuk mendistribusikannya ketasiltas kesehatan. Beberapa PBF yang mendistribusikan obat psikotropika : 1). PT. Anugrah Argon Medica > obat Alprazolam > obat clobazam 2). PT. Antarmitra sebada > obat Midaz injeksi 3) PT. Bina san prima > obat Analsik caps > obat Valisanbe > obat Valisanbe injeksi > obat Braxidin karena sleatnya yang bisa menyebabkan ketergantungan dalam penggunaan obat psikotropika.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			Daftar PBF sediaan obat psikotropika Faktur PT. Anugrah Argon Medika (Alprazolan, Clobazam) Faktur PT. Antarmitra sebada (Midz injeksi) Faktur PT Bina San Prima (Analsic caps, Valisanbe tab, Valisanbe injeksi, Braxidin)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
3.	Sabtu, 1 Maret 2025 (07.00 - 14.00) Shift 1	• mempelajari dan mengetahui daftar nama PBF pengirim obat Prekusor dan OOT di rumah sakit mitra madiyan greisic	pedagang besar farmasi (PBF) merupakan perusahaan yang memiliki izin untuk mengadakan, menyimpan, menyalurkan obat ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit. Berikut beberapa PBF Prekusor dan PBF OOT 1. PT Ensevai putra megatrading > Obat alco oral drops > Obat alco plus DMP syr > Tramadol injeksi > Promadex 2. PT Bin San Prima > Obat Santramol film coated caplet > obat Tremenza tab > Obat Tremenza syr > Obat Tuzalos caplet > Obat Analsik caplet > Obat braxidin tab > Obat Besanmag tab > Valsnanbe injeksi 3. PT. Millennium Pharmacon Internat > Obat analtram caplet > Obat Lapteed dm syr > Obat Lapteed Exp 4. PT. Adya Artha Abadi > Obat tramadol TLS 5. PT. Anugrah Argon Medica > Obat Rhinos AR > Obat Rhinofed 6. PT. Parit Padang Global > Obat Amitriptyline 7. PT. Daya Anugrah Dewata Sakti > Obat Analtram cap 8. PT. Antarmitra Sembada > Obat Eodol cap 9. PT. Daya Muda Agung > Vasodilen 1 ml 10. PT. Tiara Kencana > Obat Trihexyphenidyl 11. PT. Tempo > Obat Etical 12. PT. Mensa Bina Sukses > Obat tramadol Hexcaps Semua obat termasuk prekusor dan OOT yang penggunaannya harus diawasi dan harus menggunakan resep dokter.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			Daftar nama PBF Sediaan Obat Prekusor & OOT Faktur PT. Enseval putra megatrading (Alco Oral Drops, Alco Plus DMP Syr, Tramadol Injeksi, Promadex)  Faktur PT. Millenium Pharmacon Internat (Analtram, Lapixid DM Syr, Lapixid Exp) Faktur PT. Bina San Prima (Cantramol, Tremenza 2mg, Tremenza Syr, Tulalos Kaplet, Analsik Kaplet, Braxidin, Becanmag, Vascanbe Injeksi)  Faktur PT. Adya Artha Abadi (Tramadol TSS)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			Faktur PT. Anugrah Argon Medica (Rhinos SR, Rinofed) Faktur PT. Parit Padang Global (Amitriptyline) Faktur PT. Daya Anugrah Sejahtera Kimia (Analtram caps)  Faktur PT. Antarmitra Sembada (Radol caps) Faktur PT. Daya Muda Agung (Dasodilin INJ) Faktur PT. Tiara Kencana (Nirexypendyl)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			Faktur PT. Tempo (Etacet) Faktur PT. Mensa Bina Sukses (Tramadol HCl caps) 

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
4.	Sabtu, 1 Maret 2025 (07.00 - 14.00) Shift 1	• Memperjari dan melakukan kegiatan mencocokkan barang dengan faktur serta mengevaluasi kualitas fisik barang datang dari PBF	Langkah - langkah mencocokkan barang dengan faktur 1). Periksa nama obat → pastikan sesuai dengan faktur 2). Periksa jumlah obat & satuan obat → pastikan sesuai dg faktur 3) Periksa no. batch & tanggal kadaluwarsa → pastikan sesuai dengan faktur dan barang yg diterima 4) Periksa harga & total biaya → pastikan harga sesuai dengan pesanan agar tidak ada kesalahan total pembayaran Langkah - langkah Evaluasi Fisik barang datang 1) Periksa kemasan obat → tidak boleh ada kemasan rusak, sobek dan bocor 2). Periksa label obat → harus jelas dan sesuai standar (nama obat, dosis, kandungan, tgl kadaluwarsa, no. batch dll) 3). Periksa kondisi obat → jangan menerima obat yang berubah warna, bau tidak normal / menunjukkan tanda - tanda degradasi 4). Periksa segel obat utuh → untuk obat cair / injeksi segel tidak boleh terbuka / bocor 5). Periksa kondisi penyimpanan → obat harus disimpan dalam kondisi khusus (misal obat yg harus disimpan di suhu dingin).

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			Jika terdapat ketidaksesuaian dalam mencocokkan barang & mengecek kualitas fisik barang maka : 1) catat perbedaan dalam laporan penerimaan barang 2) Hubungi PBF untuk penggantian / retur barang 3) pisahkan barang yang tidak sesuai agar tidak tercampur dengan barang lain

Gresik, 1 Maret 2025
Dosen Pembimbing,

Apt. Siti Nur Asiyah, M. Fram. Klin.
NIDN. 0711088504

Gresik, 1 Maret 2025
Pembimbing Lapangan RS Muhammadiyah Gresik

RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH GRESIK
INSTALASI FARMASI

Apt. Alifiyah Hnum, S.Si
SIPA. 19720607/ SIPA_35.25/ 2022/ 2527

AGENDA HARIAN (*LOG BOOK*)

Minggu ke : 4 (Rawat Jalan)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Senin, 3 mar 2025 (14.00 - 21.00) Shift 2	• mempelajari prosedur dispensing obat melalui tahan peracikan membuat sediaan puyer	tahapan melakukan kegiatan peracikan dan pemberian sediaan obat puyer : 1). mengambil obat sesuai dengan resep dokter 2). masukkan obat ke dalam blender obat 3). meletakkan sediaan puyer yang sudah di blender ke dalam kertas 4). Bagi rata puyer pada kertas puyer 5). masukkan kertas puyer pada alat siling puyer (pres puyer 6). tekan alat hingga menjadi lebih rapi dan tertutup rapat 7). pastikan kembali semua puyer apakah sudah terpres dengan baik dan tidak bocor 8). masukkan sediaan puyer / kertas puyer ke plastik klip 9). Beri etiket warna putih lengkapi identitas pada etiket putih yang terdiri dari no. rm pasien, tgl. lahir, nama obat, tgl penulisan, ED obat, Aturan pakai, waktu pemakaian obat (06-07; 09-10; 11-12; 13-14; 14-15; 15-16; 16-17; 18-19; 20-21; 21-23).

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Selasa, 4 mar 2025 (14.00 - 21.00) Shift 2	• Melayani sistem perencanaan dan permintaan obat / alkes ke gudang farmasi di instansi rawat jalan	Sistem perencanaan obat / alkes di rawat jalan dilakukan agar stok tetap tersedia sesuai kebutuhan tanpa kekurangan / kelebihan. Dalam sistem perencanaan permintaan barang terdapat : 1). kode barang & nama barang menasttikan jenis obat / alkes yang diminta 2). jumlah barang yang diminta berdasarkan estimasi kebutuhan di unit pelayanan 3). Harga satuan & total perkiraan anggaran yang dibutuhkan 4). Tanggal permintaan menunjukkan kapan obat / alkes dipesan untuk keperluan pencatatan distribusi Perencanaan dilakukan berdasarkan : - Data penggunaan obat sebelumnya - prediksi kebutuhan berdasarkan jumlah pasien dan pola penyakit - Sistem menejemen stok (FIFO & FEFO) Sistem permintaan obat / alkes ke gudang farmasi. Documen permintaan obat dari unit layanan rawat jalan ke gudang farmasi yang terdiri : 1). kolom "Dari" dan "ke" menunjukkan asal dan tujuan distribusi 2). Status ANFRA dan MUTASI ANFRA → permintaan obat / alkes ke gudang farmasi MUTASI → perpindahan stok obat / alkes dari satu unit ke unit lain 3). kode barang kombinasi huruf, angka atau simbol digunakan untuk mengidentifikasi suatu barang ke sistem.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			Proses permintaan dilakukan untuk memastikan unit pelayanan memiliki stok obat paliber yang cukup tanpa terjadi kekosongan atau penumpukan.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Rabu, 5 Mar 2025 (14.00 - 21.00) Shift 2	• Mempelajari sistem penataan dan penyimpanan obat injeksi di instansi farmasi rawat jalan	Penyimpanan obat injeksi di instansi farmasi rawat jalan dikelompokkan berdasarkan jenisnya yaitu obat injeksi disusun sesuai bentuknya (ampul & vial) agar mudah diambil. terdapat label obat pada kemasan obat yang terdiri nama obat, dosis obat, tanggal kadaluwarsa obat. Dalam penyimpanan obat injeksi di rawat jalan tertata rapi yang mempermudah dalam pengambilan obat. penyimpanan obat injeksi menggunakan sistem FIFO (First In, First Out) dan FEFO (First Expired First Out) yaitu obat kadaluwarsa lebih cepat ditempatkan di depan supaya dapat digunakan terlebih dahulu.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Kamis, 6 Mar 2025 (07.00 - 14.00) Shift 1	• Memperajari dan mengetahui perhitungan dosis / jumlah obat pada resep racikan.	Perhitungan jumlah obat dalam resep racikan dilakukan dengan cara mengalikan dosis obat per kapsul yang akan diobat. Jika resep menuliskan dosis per kapsul, maka total obat yang dibutuhkan merupakan dosis tersebut dikali dengan jumlah kapsul yang akan diobat. Sedangkan perhitungan harga obat racikan dilakukan dengan menjumlahkan harga masing-masing bahan yang digunakan. Harga obat dihitung berdasarkan jumlah yang dipakai dalam racikan. Contoh resep racikan Perhitungan resep racikan  Struk total harga 

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Jum'at 7 Mar 2025 (07.00 - 14.00) Shift 1	• Mempelajari prosedur dispensing obat melalui peracikan membuat sediaan kapsul	Tahapan melakukan kegiatan peracikan dan pembuatan sediaan obat kapsul sebagai berikut : 1) Menyiapkan obat sesuai dengan resep dokter 2). Masukkan obat ke dalam blender obat 3). Masukkan sediaan obat kapsul ke dalam cangkang kapsul pada alat pengisi kapsul sesuai dengan jumlah yang diminta 4). Tutup penutup penutup cangkang kapsul 5). Masukkan sediaan kapsul ke dalam plastic klip 6). Berikan etiket putih yang berisi NO. RM, Tgl lahir pasien, Nama obat, Tgl penulisan, ED obat, aturan pakai dan waktu pemakaian (06-07; 09-10; 11-12; 13-14; 14-15; 15-16; 16-17; 18-19; 20-21; 21-23). 7). Masukkan etiket yang sudah terisi ke dalam plastic klip 

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Sabtu, 8 mar 2025 (07.00 - 14.00) Shift 1	• Mempelajari pelayanan resep dan melakukan penulisan turunan resep atau salinan resep	Pelayanan resep merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh tenaga farmasi untuk mengambil obat pada resep dokter dan memberikan obat kepada pasien. Langkah - langkah pelayanan resep : 1) penerimaan resep Resep diberikan oleh pasien / dikirim langsung dari dokter - resep berupa resep fisik (tertulis) atau resep elektronik 2) Verifikasi & evaluasi resep Dilakukan pengecekan mengenai kemungkinan interaksi obat, kesalahan penulisan obat, penulisan dosis / indikasi yang tidak sesuai. Apabila tidak jelas pada resep segera menghubungi dokter untuk klarifikasi. 3). penyiapan & peracikan obat mengambil obat sesuai dengan resep. Apabila dalam resep terdapat racikan maka dilakukan proses peracikan 4). Penyerahan obat & KIE kepada pasien masing - masing obat diberi etiket yang terdiri nama obat, dosis obat, cara pemakaian, waktu pemakaian. pada saat KIE pasien disampaikan masing - masing indikasi obat, efek samping obat dll. Penulisan turunan resep merupakan salinan dari resep asli untuk kepentingan dokumentasi / sebagai bukti jika diperlukan & kemudian hari. Berikut penulisan turunan resep : 1) Judul " turunan resep atau Apograph" 2) Identitas dokter 3) Identitas pasien 4) Tanggal resep (tanggal yg dibuat dokter) 5) Tanggal penulisan salinan resep 6) penulisan resep yg sesuai dengan resep asli jika resep diambil semua "Det" " " tidak diambil " Nedet" 7). Tandatangan dan stempel apoteker 8). Nomor resep / Nomor Belcam medis

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			Contoh resep asli Contoh salinan resep

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
2.	Sabtu, 8 maret 20[illegible] (07.00 - 14.00) Shift 1	• Mempelajari alur pelayanan obat di instansi farmasi rawat jalan (umum, BPJS, dan ansuransi lainnya).	Alur pelayanan obat umum 1) resep diterima melalui sistem elektronik (E-resep) 2) pasien menyerahkan bukti pembayaran 3). resep diperiksa secara administratif, farmasetis & klinis 4). Data resep dimasukkan ke sistem rumah sakit & dicatat stikar pasien 5). obat disiapkan dan diperiksa kembali 6). Diserahkan KIE kepada pasien dan diserahkan obat Alur pelayanan obat BPJS 1) resep masuk melalui sistem elektronik (E-resep) 2) Dilakukan pemeriksaan secara administratif, farmasetis & klinis [illegible] 4) Data diinput ke sistem BPJS & rumah sakit 5) obat disiapkan, diperiksa & diserahkan ke pasien Alur pelayanan obat ansuransi 1) resep diterima melalui sistem elektronik (E-resep) 2) pasien menyerahkan kartu asuransi / surat pengantar 3) pemeriksaan administratif, farmasetis dan klinis 4) Data resep dimasukkan ke sistem rumah sakit & dicatat stikar 5) obat di siapkan, diperiksa kemudian diserahkan KIE kepada pasien 6) obat diserahkan ke pasien

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			gambar pelayanan instansi farmasi rawat jalan

Gresik, 10 Maret 2025
Dosen Pembimbing,

Apt. Siti Nur Asiyah, M. Fram. Klin.
NIDN. 0711088504

Gresik, 10 Maret 2025
Pembimbing Lapangan RS Muhammadiyah Gresik

RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH GRESIK
INSTALASI FARMASI

Apt. Alifiyah Hnum, S.Si
SIPA. 19720607/ SIPA_35.25/ 2022/ 2527

AGENDA HARIAN (*LOG BOOK*)

Minggu ke : 5 (logistic)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Senin, 10 maret (07.00 - 14.00) shift 1	• mempelajari penyimpanan obat narkotika, dan psikotropika di gudang farmasi	Penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di gudang farmasi harus memenuhi persyaratan ketat untuk keamanan dan pengawasan. penyimpanan obat narkotika, dan psikotropika harus disimpan di dalam lemari / ruangan khusus yang terkunci dengan akses terbatas hanya untuk petugas berwenang seperti apoteker dan tenaga kefarmasian yang ditunjuk. sistem penggunaan ganda dan pemantauan keamanan ccTV perlu diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan. Setiap penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran obat harus dicatat dalam buku kapsa dan pencatatan ke sistem komputer. kegiatan ini harus dilakukan setiap hari. pencatatan dan pelaporan wajib dilakukan secara berkala ke dinas kesehatan melalui aplikasi "SIHAP". suhu dan kelembaban ruangan harus disesuaikan standar penyimpanan farmasi berkisar 15-25°C. lemari dalam penyimpanan obat narkotika, psikotropika dan prekusor harus bermaterial yang tahan bongkar, kuat / kokoh dan menempel pada dinding. Lb berdasarkan FIFO & FEFO



No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Selasa, 11 Maret 2025 (07.00 - 14.00) Shift 1	• Mempelajari penyimpanan penandaan Obat High Alert Medication (HAM) dan penyimpanan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di gudang farmasi.	Obat High Alert Medication (HAM) merupakan obat berisiko tinggi yang memerlukan penyimpanan khusus dengan label peringatan yang bertuliskan "High Alert Caution" berwarna merah. Obat HAM bisa menyebabkan efek samping serius jika terjadi kesalahan dalam pemberian dosis. Obat HAM perlu adanya pengawasan khusus / ketat. Penyimpanan lemari B3 merupakan tempat untuk menyimpan bahan berbahaya dan beracun yang memerlukan keamanan tinggi, seperti material tahan korosi, ventilasi baik, dan adanya pengunci. Setiap bahan dalam lemari B3 harus diberi label sesuai standar keselamatan dan diletakkan berdasarkan sifat kimianya untuk mencegah reaksi berbahaya, yang bertujuan untuk menjaga keamanan pasien.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Rabu 12 Mar 2025 (07.00 - 14.00) Shift 1	• Mempelajari dan melaksanakan kegiatan pengarsipan dokumen faktur pembelian obat di gudang farmasi	Pengarsipan dokumen faktur pembelian obat merupakan proses menyimpan dan mengatur faktur agar mudah ditemukan / di butuhkan. Faktur berisi informasi penting seperti nama obat, jumlah, harga dan tanggal pembelian. Cara pengarsipan faktur pembelian obat : 1. mengumpulkan faktur semua faktur pembelian obat harus dikumpulkan setelah transaksi selesai 2. menyusun berdasarkan bulan pembelian Faktur diurutkan sesuai bulan agar lebih rapi dan mudah dicari. 3. masukkan kedalam map Gunakan map dengan label bulan pembelian untuk memudahkan pencarian 4. menyimpan dokumen di tempat yang aman dan terkunci Dokumen disimpan di tempat yang terlindung dari kerusakan dan lemari penyimpanan harus terkunci untuk mencegah pencurian.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Kamis, 13 Maret (07-00 - 14.00) Shift 1	• mempelajari dan melaksanakan tagihan mendistribusikan barang ke unit pemesan	pendistribusian barang ke unit instansi merupakan proses pengiriman barang dari gudang ke unit membutuhkan seperti rawat inap, rawat jalan dll. tahapan pendistribusian barang : 1. permintaan barang menggunakan permintaan berdasarkan kebutuhan 2. pengecekan stok memastikan barang di gudang sebelum diterima 3. pengemasan / labeling barang dikemas dalam kotak dan diberi label sesuai tujuan 4. pengiriman ke unit tujuan menggunakan alat bantu troli untuk mempermudah transportasi 5. verifikasi barang mencocokkan barang / fisik barang dengan lembar ARFRA

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Jum'at 14 Maret 25 (07.00 – 14.00) Shift 1	• mempelajari dan melaksanakan kegiatan menerima permintaan barang dari unit di rumah sakit muhammadiyah gresik	permintaan barang di gudang farmasi ke unit rs merupakan proses pengajuan obat / alat kesehatan dari unit pelayanan rumah sakit (rs) ke gudang farmasi. cara permintaan barang di gudang 1) unit rs mengajukan permintaan setiap unit (rawat inap , rawat jalan , igd , dll) mengajukan permintaan obat atau alkes berdasarkan kebutuhan) 2) pembuatan surat permintaan permintaan dicatat dalam komputer / sistem komputer mencantumkan nama barang dan jumlah 3) Gudang farmasi memeriksa stok petugas gudang mengecek ketersediaan barang sesuai permintaan unit 4) persiapan & pengambilan barang barang disiapkan & dikemas sesuai standar sebelum dikirim ke unit yang membutuhkan 5) Distribusi & penerimaan Barang dikirim ke unit rs , kemudian dicek ulang dan diterima petugas unit

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
2.	Sabtu, 15 maret (07.00 – 14.00) Staf 1	• Mempelajari dan melakukan kegiatan distribusi barang dengan segera sediaan vaksin ke instansi farmasi rawat jalan	Distribusi segera obat vaksin dari gudang ke rawat jalan merupakan proses pengiriman vaksin dengan cepat agar tetap aman dan efektif saat digunakan. Vaksin merupakan obat yang sensitif terhadap suhu, sehingga distribusinya harus dilakukan dengan hati-hati. cara distribusi segera vaksin : 1. pengecekan ketersediaan & permintaan memastikan jumlah vaksin sesuai dengan kebutuhan di rawat jalan 2. pengiriman cepat & aman vaksin dengan segera menggunakan coolbox / plastik yang sudah di letakkan di lemari pendingin 3. penerimaan & pengecekan di rawat jalan vaksin diperiksa ulang untuk memastikan tidak ada kerusakan / perubahan suhu 4. Verifikasi barang mencocokkan barang / fisik barang dengan lembar ARFEA

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Sabtu, 15 Maret (08.00 - 14.00) Shift 1	• memperjari dan mata-turan kegiatan monito-ring kadaluwarsa obat	Monitoring obat kedaluwarsa merupakan kegiatan memeriksa masa berlaku obat agar tidak digunakan setelah melewati tanggal kedaluwarsa. Obat yang sudah kedaluwarsa dapat kehilangan efektivitasnya / menjadi bahaya bagi pasien. Cara monitoring obat kadaluwarsa : 1. pemeriksaan rutin pengecekan tanggal kedaluwarsa obat secara berkala biasanya setiap bulan 2. penyimpanan berdasarkan FEFO (First Expired, First Out) Obat dengan tanggal kedaluwarsa lebih dekat harus digunakan lebih dahulu 3. Pencatatan & labeling Obat yang mendekati tanggal kedaluwarsa diberi tanda khusus agar mudah dikenali 4. pelaporan & pemisahan Obat yang hampir kedaluwarsa dilaporkan ke penanggung jawab dan dipisahkan dari stok utama 5. Pengembalian Obat kedaluwarsa ke PBF Obat yang sudah kedaluwarsa dikembalikan ke PBF untuk ditindaklanjuti sesuai regulasi agar obat tidak di salahgunakan.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas (Sesuaikan pada poin di buku panduan PKL)	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			gambar vaksin ato ke rotoat jalan

Gresik,
Dosen Pembimbing,

Apt. Siti Nur Asiyah, M. Fram. Klin.
NIDN. 0711088504

Gresik,
Pembimbing Lapangan RS Muhammadiyah Gresik

Apt. Alifiyah Hnum, S.Si
SIPA. 19720607/ SIPA_35.25/ 2022/ 2527

A. TUGAS KHUSUS RESEP

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (3), resep polifarmasi (3), resep obat mata/telinga (1), resep obat kulit (1), resep mengandung sediaan inhaler (1), resep obat KB (1), Resep mengandung insulin (1), resep kudis/kurap (1), Resep obat saluran cerna (1), Resep saluran nafas (1), resep racikan anak (3), Resep racikan dewasa (3), resep pasien DM (1), Resep pasien HT (1), Resep pasien syaraf (1), resep yang ada pengulangan /iter (3), dan resep lainnya (4)
Total : 30 Resep

<table>
<tr><th>No</th><th>Resep</th><th>Tahapan Pengerjaan Resep</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Jenis Resep : Resep asli
Resep obat : non racikan
Jumlah obat dalam resep : 1
Pengulangan resep : Neiter
Resep Saluran Pernafasan
  </td><td>A. Skrinning Administrasi
<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>An. Devin Athalla Mahendra</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>3 tahun</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>11 Kg</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>R1: OL Nasalin Isotonic nasal spray</td></tr>
<tr><td>Kekuatan :</td><td>~~Ada/~~Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Bentuk sed. :</td><td>~~Ada/~~Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>R1: OL Nasalin Isotonic nasal spray No.I</td></tr>
<tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>~~Ada/~~Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada~~/Tidak Ada~~</td><td>R1: OL Nasalin Isotonic nasal spray
S 3 X 1 Kanan Kiri</td></tr>
<tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada~~/Tidak Ada~~</td><td>11 – 02 -2025</td></tr>
<tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada~~/Tidak Ada~~</td><td>dr. Bastu Edo Hermandy, Sp. THT-KL</td></tr>
<tr><td>Surat ijin :</td><td>~~Ada/~~Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Alamat dr. :</td><td>~~Ada/~~Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Nasalin Isotonic nasal spray 1 botol

C. Perhitungan biaya resep

(Harga sudah termasuk PPN 11%)

1. Nasalin Isotonic Nasal Spray: Rp. 153.180

D. ETIKET

- Nama Obat /warna etiket :

  Nasalin Isotonic Nasal Spray

  (Etiket biru)

E. *Product knowledge*

1. Nasalin Isotonic Nasal Spray

- **Nama obat:** Nasalin Isotonic Nasal Spray
- **Kandungan:** Larutan saline (larutan garam isotonik)
- **Dosis lazim:**
  - **Dewasa & Anak-anak:** 1–2 semprotan ke setiap lubang hidung, 2–3 kali sehari atau sesuai

kebutuhan

- **Kegunaan:** Membersihkan rongga hidung dari debu, alergen, dan lender, Melembapkan hidung kering akibat udara kering, Membantu meredakan hidung tersumbat akibat flu atau alergi
- **Efek Samping yang Potensial (ESO):** Iritasi ringan pada saluran hidung jika digunakan berlebihan
- **Kontraindikasi (KI):** Alergi terhadap komponen larutan saline (sangat jarang terjadi), Infeksi hidung berat yang memerlukan pengobatan khusus
- **PERHATIAN:** Jangan berbagi pemakaian dengan orang lain untuk menghindari infeksi, Jika terjadi iritasi atau reaksi tidak biasa, hentikan penggunaan dan konsultasikan dengan dokter, Untuk penggunaan jangka panjang, konsultasikan dengan dokter
- **Cara Penyimpanan:** Simpan pada suhu ruangan (di bawah 30°C), Jauhkan dari sinar matahari langsung dan sumber panas, Tutup rapat setelah digunakan .

F. Tahap pembuatan

1. Diambil 1 strip braxidin di lemari double lock
2. Diberi etiket dan Dimasukkan ke dalam plastik
3. Dilakukan double check
4. Dilakukan penyerahan obat dan KIE obat

G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal) A: Apoteker P: Pasien

A: (Berada di loket 4 penyerahan obat untuk memanggil pasien)Atas nama Anak Devin Athalla Mahendra ke loket empat

P: (pasien datang ke loket 4)

A:Silahkan duduk bu (wajah senyum ramah)

P: (Keluarga pasien duduk di kursi yang disediakan)

A: Atas nama siapa? (wajah senyum)

P: Atas nama Anak Devin Athalla Mahendra

		A: Mohon maaf, untuk tanggal lahir nya berapa? Bisa disebutkan? P: 20 Mei 2022 A: Baik, atas nama Anak Devin Athalla Mahendra ada keluhan apa nggih bu? P: Ini bu anak saya mengeluhkan hidungnya sakit dan hidungnya seperti tersumbat A: Baik ini obat nya satu macam (memegang plastik obat) obat ini semprot ya bu, apakah tadi sudah dijelaskan oleh dokter untuk cara pakai nya? P: Sudah bu, tapi apa bisa diulangi lagi? Karena saya lupa A: Baik, akan saya jelaskan. Izin saya buka ya bu (membuka plastik dan dus kemasan obat) P: Iya bu, silhakan A: (Menunjukkan cara pegang nasalin spray) minta anak untuk embuskan napas secara perlahan untuk membuang lendir di dalam hidung sebelum menggunakan obat. jadi gini ya bu (sambil membuka botol) Buka penutup botol obat semprot hidung dan kocok beberapa kali. Semprotkan ke udara hingga mengeluarkan cairan. Miringkan kepala Anak ke depan dan embuskan napas perlahan. Pegang botol dengan posisi jempol di bagian bawah, sedangkan telunjuk dan jari tengah di bagian atas. Gunakan jari tangan satunya untuk menutup lubang hidung yang tidak menerima obat. Tekan pompa dengan telunjuk dan jari tengah hingga cairan keluar Lakukan langkah yang sama untuk lubang hidung satunya. A: Apakah sudah jelas dari penjelasan saya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? (sambil senyum) P: Sudah bu, Tidak ada A: Baik, semoga lekas sembuh nggih P: Baik bu, Terimakasih.

<table>
<tr><th>No</th><th>Resep</th><th>Tahapan Pengerjaan Resep</th></tr>
<tr><td>2</td><td>Jenis Resep : Resep asli
Resep obat : non racikan
Jumlah obat dalam resep : 7
Pengulangan resep : Neiter
Resep Cerna
 </td><td>A. Skrinning Administrasi
<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>Ny. Astrianingsih</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>38 tahun</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>~~Ada/~~Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>R1: Braxidin
R2: Lansoprazole
R3: Ondancetron
R4: Sanmol
R5: Antrain inj
Ranitidine inj
Ondancetron inj
Alcohol swab
Needle
Spuit</td></tr>
<tr><td>Kekuatan :</td><td>~~Ada/~~Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Bentuk sed. :</td><td>~~Ada/~~Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>R1: Braxidin: No. X
R2: Lansoprazole: No. X
R3: Ondancetron: No. X
R4: Sanmol: No. X
R5: Antrain inj: No. 1
Ranitidine inj: No. 1
Ondancetron inj: No. 1
Alcohol swab No. 1</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		Needle 25G No. 1 Spuit 5 cc No. 1
Duplikasi terapi :	~~Ada/~~Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada~~/Tidak Ada~~	**R1:** Braxidin *S 3×1* **R2:** Lansoprazole *S 2×1* **R3:** Ondancetron *S 2×1 mual* **R4:** Sanmol *S 3×1* **R5:** Antrain inj Ranitidine inj Ondancetron inj Alcohol swab Needle 25G Spuit 5 cc *S imm*
Tanggal penulisan resep :	Ada~~/Tidak Ada~~	11 – 02 -2025
Nama dokter :	Ada~~/Tidak Ada~~	dr. Rizky Putri Purwanti
Surat ijin :	~~Ada/~~Tidak Ada	-
Alamat dr. :	~~Ada/~~Tidak Ada	-

		B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi **R1:** Braxidin: 10 tab **R2:** Lansoprazole: 10 tab **R3:** Ondancetron: 10 tab **R4:** Sanmol: 10 tab **R5:** Antrain inj: 1 Ranitidine inj: 1 Ondancetron inj: 1 Alcohol swab : 1 Needle 25G: 1 Spuit 5 cc: 1 **C. Perhitungan biaya resep** (Harga sudah termasuk PPN 11%) 2. Braxidin: 10 tab → → harga per tab Rp. 5.500. Pada resep yang diminta adalah 10 tablet sehingga 10 x 5.500 = 55.000 3. Lansoprazole: 10 tab → harga per tab Rp. 1.932. Pada resep yang diminta adalah 10 kapsul sehingga 10 x 1.932 = 19.320 4. Ondancetron: 10 tab → harga per tab Rp. 2.188, pada resep yang diminta adalah 10 tab sehingga 10 x 2.188 = 21.880 5. Sanmol: 10 tab → harga per tab Rp. 600, pada resep yang diminta adalah 10 tab sehingga 10 x 600 = 6.000 6. Antrain inj: 1 amp → harga per ampul Rp. 17.300 7. Ranitidine inj: 1 amp → harga per ampul Rp. 6.600

8. Ondancetron inj: 1 amp → harga per ampul Rp. 11.435
9. Alcohol swab : 1 pcs → harga per pcs Rp. 200
10. Needle 25G: 1 pcs → harga per pcs Rp. 2.198
11. Spuit 5 cc: 1 pcs → harga per pcs Rp. 809

TOTAL: Rp. 140.742

D. ETIKET

- Nama Obat /warna etiket :

1. Braxidin / etiket putih

2. Lansoprazole/ etiket putih

3. Ondancetron / etiket putih

4. Sanmol / etiket putih

A. Antrain inj/ Ranitidine inj/ Ondancetron inj/ Alcohol swab / Needle 25G/ Spuit 5 cc (Etiket biru)



E. *Product knowledge*

1. Braxidin

- **Nama Obat** : Braxidin
- **Kandungan** : Chlordiazepoxide-clidnium
- **Dosis lazim** : 1 tablet, 3-4 kali sehari
- **Kegunaan** : Meredakan kram perut akibat gangguan pencernaan, seperti sindrom iritasi usus besar, tukak lambung, dispepsia, atau radang usus, Mengurangi kram perut saat menstruasi.
- **ESO potensial** : Mual, perut kembung, sembelit atau konstipasi, mata kering, pusing, lemas atau lelah.
- **Kontraindikasi** : Hamil, laktasi, gangguan fungsi hati berat, riwayat iketrus idiopatik atau pruritus selama hamil, sindrom rotor, tumor hati, anemia sel sabit, dalam pengobatan kanker payudara, dan DM berat.
- **PERHATIAN** : Obat dalam kategori ini tidak boleh dikonsumsi wanita yang sedang hamil atau memiliki kemungkinan untuk hamil dan ibu menyusui.
- **Cara penyimpanan** : Simpan di tempat bersuhu ruangan. Jangan menyimpannya di tempat yang lembab dan

		panas, jauhkan obat dari jangkauan anak-anak. **2. Lansoprazole** ▪ **Nama obat:** Lansoprazole ▪ **Kandungan:** Lansoprazole (termasuk dalam golongan penghambat pompa proton/PPI) ▪ **Dosis lazim:** o **Dewasa:** ➢ Tukak lambung & duodenum: 15–30 mg sekali sehari selama 4–8 minggu ➢ GERD (refluks asam): 15–30 mg sekali sehari selama 4–8 minggu ➢ Sindrom Zollinger-Ellison: Dosis awal 60 mg sekali sehari, dapat disesuaikan sesuai respons pasien o **Anak-anak:** Dosis disesuaikan berdasarkan berat badan dan kondisi medis ▪ **Kegunaan:** Mengatasi tukak lambung dan tukak duodenum, Mengobati GERD (gastroesophageal reflux disease), Mengurangi produksi asam lambung berlebih, dan Mengatasi sindrom Zollinger-Ellison. ▪ **Efek Samping yang Potensial (ESO):** Sakit kepala, Diare atau sembelit, Mual dan muntah, Nyeri perut, Ruam kulit (reaksi alergi). ▪ **Kontraindikasi (KI):** Alergi terhadap lansoprazole atau obat sejenis (PPI lain seperti omeprazole), Pasien dengan riwayat penyakit hati berat (hati-hati dalam penggunaan), Tidak dianjurkan untuk ibu hamil atau menyusui tanpa rekomendasi dokter ▪ **PERHATIAN:** Tidak boleh dihancurkan atau dikunyah, harus ditelan utuh, Penggunaan jangka panjang dapat meningkatkan risiko osteoporosis dan defisiensi vitamin B12, Hati-hati pada pasien dengan gangguan hati dan ginjal, Dapat berinteraksi dengan obat lain seperti warfarin, digoxin, dan obat antijamur ▪ **Cara Penyimpanan:** Simpan pada suhu ruangan (di bawah 30°C), Jauhkan dari sinar matahari langsung dan kelembaban, Simpan di tempat yang tidak dapat dijangkau anak-anak. **3. Ondancetron** ▪ **Nama obat:** Ondansetron ▪ **Kandungan:** Ondansetron (termasuk dalam golongan antagonis reseptor serotonin 5-HT3) ▪ **Dosis lazim:**

- **Dewasa:** Mual dan muntah akibat kemoterapi: 8 mg, 30 menit sebelum kemoterapi, dapat diulang setiap 8 jam jika diperlukan. Mual dan muntah pascaoperasi: 16 mg sekali sebelum anestesi
- **Anak-anak:** Dosis disesuaikan berdasarkan berat badan dan usia, umumnya 0,15 mg/kg setiap 8 jam

- **Kegunaan:** Mengatasi mual dan muntah, Mencegah mual dan muntah pascaoperasi
- **Efek Samping yang Potensial (ESO):** Sakit kepala, Sembelit atau diare, Pusing, Reaksi alergi (ruam, gatal, atau pembengkakan).
- **Kontraindikasi (KI):** Alergi terhadap ondansetron atau obat sejenisnya, Pasien dengan gangguan jantung berat, Penggunaan bersamaan dengan apomorfin (dapat menyebabkan tekanan darah rendah yang berbahaya).
- **PERHATIAN:** Hati-hati pada pasien dengan gangguan hati, Dapat menyebabkan perpanjangan interval QT pada EKG (berisiko menyebabkan aritmia jantung), Hati-hati jika digunakan bersamaan dengan obat lain yang memengaruhi jantung atau serotonin.
- **Cara Penyimpanan:** Simpan pada suhu ruangan (di bawah 30°C), Lindungi dari cahaya dan kelembaban, Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

4. Sanmol

Sanmol Tablet

- **Nama obat:** Sanmol
- **Kandungan:** Paracetamol 500 mg
- **Dosis lazim:**
  - **Dewasa:** 1–2 tablet (500–1000 mg) setiap 4–6 jam jika diperlukan, maksimal 4000 mg per hari
  - **Anak-anak:**
    - **6–12 tahun:** ½–1 tablet setiap 4–6 jam, maksimal 4 tablet per hari
    - **Di bawah 6 tahun:** Disarankan menggunakan bentuk sirup dengan dosis sesuai berat badan
- **Kegunaan:** Meredakan demam, dan Mengatasi nyeri ringan hingga sedang (sakit kepala, nyeri otot, sakit gigi, nyeri haid)
- **Efek Samping yang Potensial (ESO):** Reaksi alergi (ruam, gatal, atau pembengkakan), Gangguan hati jika

dikonsumsi dalam dosis tinggi atau jangka Panjang, Mual atau gangguan pencernaan ringan

- **Kontraindikasi (KI):** Alergi terhadap paracetamol, Pasien dengan gangguan hati berat, Konsumsi alkohol berlebihan (dapat meningkatkan risiko kerusakan hati)
- **PERHATIAN:** Jangan melebihi dosis maksimal 4000 mg per hari, Gunakan dengan hati-hati pada pasien dengan gangguan hati atau ginjal, Hindari konsumsi bersamaan dengan obat lain yang mengandung paracetamol untuk mencegah overdosis
- **Cara Penyimpanan:** Simpan pada suhu ruangan (di bawah 30°C), Lindungi dari cahaya dan kelembaban, Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

F. Tahap pembuatan

5. Diambil 1 strip braxidin di lemari double lock
6. Diambil 1 strip lansoprazole dan 1 strip ondancetron di rak obat generik
7. Diambil 3 strip sanmol di rak obat HAM
8. Diberi etiket pada masing masing obat dan dimasukkan ke dalam plastik
9. Diambil 1 ampul antrain injeksi, 1 ampul ranitidine injeksi, 1 ampul ondancetron di rak injeksi
10. Diambil 1 alcohol swab, 1 needle 25G, 1 Spuit 5 cc di rak alat Kesehatan
11. Dimasukkan ke dalam plastik dan diberi etiket serahkan ke dokter atau perawat.
12. Dilakukan double check
13. Dilakukan penyerahan obat dan KIE obat

G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal) A: Apoteker P: Pasien

A: (Berada di loket penyerahan obat untuk memanggil pasien)Atas nama Nyonya Astrianingsih

P: (pasien datang ke loket)

A: Atas nama siapa? (wajah senyum ramah)

P: Atas nama Astrianingsih

A: Mohon maaf, untuk tanggal lahir nya berapa? Bisa disebutkan?

		P: 5 Februari 1987 A: Baik, atas nama Ibu Astrianingsih mendapat beberapa obat (memegang plastik obat minum) obat lansoprazole diminum dua kali sehari sebelum makan untuk lambung, obat ondancetron dua kali sehari untuk mualnya diminum jika mual aja nggih, lalu obat braxidin diminum tiga kali sehari sesudah makan, dan sanmol juga diminum tiga kali sehari sesudah makan nggih jika sudah tidak demam sanmol nya tidak perlu diminum. (memberikan plastik obat injeksi) untuk injeksi nya ini diserahkan ke perawat atau dokter yang ada di IGD nggih bu. P: Baik bu, A: Apakah sudah jelas dari penjelasan saya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? (sambil senyum) P: Sudah bu, Tidak ada A: Baik, semoga lekas sembuh nggih P: Baik bu, Terimakasih.

<table>
<tr><th>No</th><th>Resep</th><th>Tahapan Pengerjaan Resep</th></tr>
<tr><td>3</td><td>Jenis Resep : Resep asli
Resep obat : racikan
Jumlah obat dalam resep : 7 obat
Pengulangan resep : Neiter
Resep Racikan Anak
  </td><td>A. Skrinning Administrasi
<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/<s>Tidak Ada</s></td><td>An. Amelia Aurel</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/<s>Tidak Ada</s></td><td>5 tahun</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td><s>Ada</s>/Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/<s>Tidak Ada</s></td><td>R1: Cefixime
R2: Sanmol
Mefinal
R3: Epexol
Tremenza
Cortidex
Cetirizine</td></tr>
<tr><td>Kekuatan :</td><td><s>Ada/</s>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/<s>Tidak Ada</s></td><td>R1: Cefixime tab
R2: Sanmol tab
Mefinal tab
R3: Epexol tab
Tremenza tab
Cortidex tab
Cetirizine tab</td></tr>
<tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/<s>Tidak Ada</s></td><td>R1: Cefixime tab 1/3
R2: Sanmol tab 1/3
Mefinal tab 1/3
R3: Epexol tab 1/3
Tremenza tab 1/3</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		Cortidex tab 1/3 Cetirizine tab 1/3
Duplikasi terapi :	~~Ada/~~Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada~~/Tidak Ada~~	**R1:** Cefixime tab 1/3 *m.f.pulv dtd No. X* *S 2 x 1* **R2:** Sanmol tab 1/3 Mefinal tab 1/3 *m.f.pulv dtd No. X* *S 3 x 1* **R3:** Epexol tab 1/3 Tremenza tab 1/3 Cortidex tab 1/3 Cetirizine tab 1/3 *m.f.pulv dtd No. X* *S 3 x 1*
Tanggal penulisan resep :	Ada~~/Tidak Ada~~	11 – 02 -2025
Nama dokter :	Ada~~/Tidak Ada~~	dr., Lailatul Inayah
Surat ijin :	~~Ada/~~Tidak Ada	-
Alamat dr. :	~~Ada/~~Tidak Ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R1: (Dibuat sediaan puyer sebanyak 10 puyer)

Cefixime tab 1/3 = 1/3 x 10 = 3,3= 3,5 tab

R2: (Dibuat sediaan puyer sebanyak 10 puyer)

Sanmol tab 1/3 = 1/3 x 10 = 3,3= 3,5 tab

Mefinal tab 1/3 = 1/3 x 10 = 3,3= 3,5 tab

R3: (Dibuat sediaan puyer sebanyak 10 puyer)

Epexol tab 1/3 = 1/3 x 10 = 3,3= 3,5 tab

Tremenza tab 1/3 = 1/3 x 10 = 3,3= 3,5 tab

Cortidex tab 1/3 = 1/3 x 10 = 3,3= 3,5 tab

Cetirizine tab 1/3 = 1/3 x 10 = 3,3= 3,5 tab

C. Perhitungan biaya resep

(Harga sudah termasuk PPN 11%)

1. Cefixime tab 100 mg = 3,5 tab = 4 tab = 4 x Rp. 2.053 = Rp. 8.212
2. Sanmol tab = 3,5 tab = 4 tab = 4 x Rp. 600 = RP. 2.400
3. Mefinal tab = 3,5 tab = 4 tab = 4 x Rp. 1.998 = Rp. 7.992
4. Epexol tab 30 mg = 3,5 tab = 4 tab = 4 x Rp. 1.311 = Rp. 5.244
5. Tremenza tab = 3,5 tab = 4 tab = = 4 x Rp. 2.797 = Rp. 11.188
6. Cortidex tab = 3,5 tab = 4 tab 4 x Rp. 550 = RP. 2.200
7. Cetirizine tab = 3,5 tab = 4 tab x Rp. 552 = RP. 2.208
8. Tus kertas puyer = 30 x Rp. 100 = Rp. 3.000

TOTAL: Rp. 42. 444

D. ETIKET

- Nama Obat /warna etiket :

1. Racikan 1 (Cefixime)/ Etiket Putih
2. Racikan 2 (Sanmol dan mefinal) / etiket putih



Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur | Transparan | Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 | P: +62 31 3981275 | F: +62 31 3945459

Nama: An. Amelia Aurel TGL: 11/02/25
No.RM: [redacted] ED: 25/02/2025
Tgl.Lahir: 2020-03-30 (4 Th 10 Bl 11 Hr) Nama obat:
Cefixime

ANTIBIOTIK, Diminum TERATUR
SAMPAI HABIS

2 x sehari 1 biji
Sesudah makan

Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur | Transparan | Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 | P: +62 31 3981275 | F: +62 31 3945459

Nama: An. Amelia Aurel TGL: 11/02/25
No.RM: [redacted] ED: 11/03/2025
Tgl.Lahir: 2020-03-30 (4 Th 10 Bl 11 Hr)
(Demam)

3 x sehari 1 biji
Sesudah makan

Kesembuhan dari ALLAH SWT
Berdoalah sebelum minum obat

3. Racikan 3/ Etiket putih



Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur | Transparan | Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 | P: +62 31 3981275 | F: +62 31 3945459

Nama: An. Amelia Aurel TGL: 11/02/25
No.RM: [redacted] ED: 11/03/2025
Tgl.Lahir: 2020-03-30 (4 Th 10 Bl 11 Hr)
(BAPIL)

3 x sehari 1 biji
Sesudah makan

Kesembuhan dari ALLAH SWT
Berdoalah sebelum minum obat

E. *Product knowledge*

1. Cefixime

- **Nama Obat:** Cefixime
- **Kandungan:** Cefixime trihydrate 100 mg
- **Dosis Lazim:** Dewasa & anak >12 tahun atau ≥50 kg: 200–400 mg per har
- **Kegunaan:** Cefixime tablet digunakan untuk mengobati berbagai infeksi bakteri
- **Efek Samping yang Potensial (ESO):** Gangguan saluran cerna (mual, muntah, diare, sakit perut), Reaksi

		hipersensitivitas (ruam, gatal, urtikaria, anafilaksis – jarang), Sakit kepala, pusing ▪ **Kontraindikasi (KI):** Alergi terhadap cefixime, antibiotik golongan sefalosporin, atau beta-laktam lainnya ▪ **PERHATIAN:** Gunakan sesuai anjuran dokter untuk menghindari resistensi bakteri, Hati-hati pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal – mungkin perlu penyesuaian dosis, Hentikan penggunaan jika timbul gejala alergi berat, Tidak untuk mengobati infeksi virus (seperti flu biasa) ▪ **Cara Penyimpanan:** Simpan pada suhu di bawah 30°C, Jauhkan dari panas, kelembaban, dan sinar matahari langsung, Simpan di tempat yang tidak dapat dijangkau anak-anak. 2. Sanmol ▪ **Nama obat:** Sanmol ▪ **Kandungan:** Paracetamol 500 mg ▪ **Dosis lazim:** o **Dewasa:** 1–2 tablet (500–1000 mg) setiap 4–6 jam jika diperlukan, maksimal 4000 mg per hari o **Anak-anak:** ➢ **6–12 tahun:** ½–1 tablet setiap 4–6 jam, maksimal 4 tablet per hari ➢ **Di bawah 6 tahun:** Disarankan menggunakan bentuk sirup dengan dosis sesuai berat badan ▪ **Kegunaan:** Meredakan demam, dan Mengatasi nyeri ringan hingga sedang (sakit kepala, nyeri otot, sakit gigi, nyeri haid) ▪ **Efek Samping yang Potensial (ESO):** Reaksi alergi (ruam, gatal, atau pembengkakan), Gangguan hati jika dikonsumsi dalam dosis tinggi atau jangka Panjang, Mual atau gangguan pencernaan ringan ▪ **Kontraindikasi (KI):** Alergi terhadap paracetamol, Pasien dengan gangguan hati berat, Konsumsi alkohol berlebihan (dapat meningkatkan risiko kerusakan hati) ▪ **PERHATIAN:** Jangan melebihi dosis maksimal 4000 mg per hari, Gunakan dengan hati-hati pada pasien dengan gangguan hati atau ginjal, Hindari konsumsi bersamaan dengan obat lain yang mengandung paracetamol untuk mencegah overdosis ▪ **Cara Penyimpanan:** Simpan pada suhu ruangan (di bawah 30°C), Lindungi dari cahaya dan kelembaban, Jauhkan dari jangkauan anak-anak. 3. Mefinal

		▪ **Nama Obat:** Mefinal ▪ **Kandungan:** Asam mefenamat 500 mg ▪ **Dosis Lazim:** o **Dewasa:** 500 mg sebagai dosis awal, dilanjutkan dengan 250 mg setiap 6 jam sesuai kebutuhan o Dalam beberapa kasus, 500 mg dapat diberikan 3 kali sehari (tergantung kondisi dan anjuran dokter) o **Anak-anak:** Umumnya tidak dianjurkan untuk anak <14 tahun tanpa pengawasan medis ▪ **Kegunaan:** Mefinal (asam mefenamat) adalah obat antiinflamasi non-steroid (NSAID) yang digunakan untuk: o Meredakan nyeri ringan hingga sedang (sakit gigi, nyeri haid, nyeri otot) o Mengurangi peradangan dan demam ▪ **Efek Samping yang Potensial (ESO):** o Gangguan pencernaan (nyeri lambung, mual, muntah, diare) o Pusing, sakit kepala o Reaksi alergi (ruam kulit, gatal) o Gangguan fungsi ginjal atau hati (pada penggunaan jangka panjang atau dosis tinggi) o Risiko perdarahan saluran cerna ▪ **Kontraindikasi (KI):** o Alergi terhadap asam mefenamat atau NSAID lainnya (misal: aspirin) o Riwayat tukak lambung atau perdarahan saluran cerna o Gangguan ginjal atau hati berat o Wanita hamil trimester ketiga ▪ **PERHATIAN:** Gunakan setelah makan untuk meminimalkan iritasi lambung, Hati-hati pada pasien dengan riwayat asma, hipertensi, atau gangguan jantung, Tidak dianjurkan untuk penggunaan jangka panjang tanpa pengawasan medis, Hindari konsumsi alkohol selama pengobatan ▪ **Cara Penyimpanan:** Simpan pada suhu di bawah 30°C, Lindungi dari cahaya dan kelembapan, Simpan di tempat aman, jauh dari jangkauan anak-anak

		4. Epexol 30 mg ▪ **Nama Obat:** Epexol ▪ **Kandungan:** Ambroxol HCl 30 mg ▪ **Dosis Lazim:** o **Dewasa dan anak >12 tahun:** 30 mg, 2–3 kali sehari ▪ **Kegunaan:** Epexol digunakan sebagai mukolitik, yaitu untuk: o Mengencerkan dahak agar lebih mudah dikeluarkan o Membantu meredakan batuk berdahak akibat infeksi saluran napas atas maupun bawah (bronkitis, bronkopneumonia, asma bronkial, dan lain-lain) ▪ **Efek Samping yang Potensial (ESO):** o Gangguan saluran cerna (mual, muntah, nyeri perut, diare) o Pusing, sakit kepala o Reaksi alergi (ruam, gatal, sangat jarang: anafilaksis) o Mulut atau tenggorokan kering ▪ **Kontraindikasi (KI):** o Alergi terhadap ambroxol atau komponen lain dalam obat o Tidak dianjurkan pada trimester pertama kehamilan ▪ **PERHATIAN:** o Hati-hati pada pasien dengan tukak lambung atau gangguan fungsi hati dan ginjal o Tidak dianjurkan digunakan bersamaan dengan obat antitusif (penekan batuk) o Konsultasikan dengan dokter jika digunakan pada ibu hamil atau menyusui ▪ **Cara Penyimpanan:** Simpan di tempat kering dan sejuk, suhu di bawah 30°C o Jauhkan dari sinar matahari langsung dan jangkauan anak-anak

		5. Tremenza • **Nama Obat:** Tremenza • **Kandungan:** Tiap tablet Tremenza mengandung kombinasi: o Pseudoephedrine 60mg o Triprolidine HCl 2.5 mg • **Dosis Lazim:** o Dewasa dan anak >12 tahun: 1 tablet, 3 kali sehari setelah makan • **Kegunaan:** Tremenza digunakan untuk meredakan gejala flu dan pilek, seperti: o Demam o Sakit kepala o Hidung tersumbat o Bersin dan gejala alergi ringan • **Efek Samping yang Potensial (ESO):** o Kantuk o Mulut kering o Pusing o Gangguan saluran cerna (mual, sakit perut) o Reaksi alergi (ruam, gatal – jarang) • **Kontraindikasi (KI):** o Alergi terhadap salah satu kandungan obat o Gangguan fungsi hati berat o Pasien dengan hipertensi berat, penyakit jantung, atau glaukoma o Penggunaan bersamaan dengan MAOI (obat antidepresan tertentu) • **PERHATIAN:**

		○ Dapat menyebabkan kantuk, hindari mengemudi atau mengoperasikan mesin ○ Hati-hati digunakan pada penderita tekanan darah tinggi atau diabetes ○ Jangan digunakan bersama obat lain yang mengandung paracetamol ○ Konsultasikan ke dokter jika digunakan lebih dari 3 hari • **Cara Penyimpanan:** ○ Simpan di tempat sejuk dan kering, suhu di bawah 30°C ○ Lindungi dari cahaya langsung ○ Jauhkan dari jangkauan anak-anak 6. Cortidex ▪ **Nama Obat:** Cortidex ▪ **Kandungan:** Dexamethasone 0,5 mg (kortikosteroid) ▪ **Dosis Lazim:** 0,5–10 mg per hari tergantung kondisi ▪ **Kegunaan:** Mengatasi peradangan, alergi berat, gangguan autoimun, dan kondisi inflamasi lainnya ▪ **Efek Samping:** Gangguan lambung, peningkatan gula darah, insomnia, perubahan mood, penurunan daya tahan tubuh ▪ **Kontraindikasi:** Infeksi jamur sistemik, alergi terhadap dexamethasone ▪ **Perhatian:** Hindari penggunaan jangka panjang tanpa pengawasan medis Hati-hati pada pasien dengan diabetes, hipertensi, gangguan hati, ginjal, atau infeksi aktif ▪ **Penyimpanan:** Simpan di tempat sejuk (di bawah 30°C), kering, dan terlindung dari cahaya 7. Cetirizine ▪ **Nama Obat:** Cetirizine ▪ **Kandungan:** Cetirizine dihydrochloride 10 mg

		▪ **Dosis Lazim:** o Dewasa dan anak ≥12 tahun: 10 mg sekali sehari o Anak 6–12 tahun: 5 mg dua kali sehari atau 10 mg sekali sehari ▪ **Kegunaan:** o Cetirizine adalah antihistamin yang digunakan untuk mengatasi: o Rinitis alergi (seperti pilek karena alergi, bersin, hidung tersumbat/gatal) o Urtikaria (biduran/gatal-gatal) o Reaksi alergi ringan pada kulit ▪ **Efek Samping yang Potensial (ESO):** o Mengantuk ringan (lebih jarang dibanding antihistamin generasi pertama) o Mulut kering o Pusing ▪ **Kontraindikasi (KI):** o Alergi terhadap cetirizine, hydroxyzine, atau derivat piperazine lainnya o Gangguan ginjal berat (clearance kreatinin <10 mL/menit) ▪ **PERHATIAN:** o Hati-hati penggunaan bersamaan dengan alkohol atau obat penekan sistem saraf pusat o Efek kantuk bisa berbeda-beda pada setiap orang, hindari aktivitas yang butuh konsentrasi tinggi jika belum tahu reaksi tubuh o Gunakan sesuai dosis yang dianjurkan untuk mencegah overdosis ▪ **Cara Penyimpanan:** o Simpan di tempat sejuk dan kering, suhu di bawah 30°C o Jauhkan dari cahaya langsung dan jangkauan anak-anak **E. Tahap pembuatan**

1. Diambil 3, 5 tab cefixime dan ditambahkan sedikit lactosa
2. Digerus dengan blender
3. Diayak dengan saringan
4. Dibagi sama rata pada kertas puyer sesuai jumlah puyer (10 puyer)
5. Diberi etiket dan dimasukkan klip
6. Diambil 3, 5 tab sanmol dan 3,5 tab mefinal ditambahkan sedikit lactosa
7. Digerus dengan blender
8. Diayak dengan saringan
9. Dibagi sama rata pada kertas puyer sesuai jumlah puyer (10 puyer)
10. Diberi etiket dan dimasukkan klip
11. Diambil 3, 5 tab cortidex, 3,5 tab tremenza, 3,5 tab cetirizine dan 3,5 tab Epexol
12. Digerus dengan blender
13. Diayak dengan saringan
14. Dibagi sama rata pada kertas puyer sesuai jumlah puyer (10 puyer)
15. Diberi etiket dan dimasukkan klip
16. Dilakukan double check
17. (5) + (10) + (15) Dimasukkan ke dalam plastik

14. Dilakukan penyerahan obat dan KIE obat

F. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal) A: Apoteker P: Pasien

A: (Berada di loket 4 penyerahan obat untuk memanggil pasien) Atas nama Anak Amelia Aurel ke loket empat

P: (pasien datang ke loket 4)

A: Silahkan duduk bu (wajah senyum ramah)

P: (Keluarga pasien duduk di kursi yang disediakan)

		A: Atas nama siapa? (wajah senyum) P: Atas nama Anak Amelia Aurel A: Mohon maaf, untuk tanggal lahir nya berapa? Bisa disebutkan? P: 30 Maret 2020 A: Baik ini obat nya Racikan puyer ya bu ada 3 puyer (memegang plastik obat) obat yang ini untuk demam diminum tiga kali sehari 1 bungkus setelah makan, lalu ini untuk batuk dan pilek nya diminum tiga kali sehari 1 bungkus setelah makan juga, dan ini ada antibiotik diminum dua kali sehari 1 bungkus setelah makan harus diminum sampai habis ya bu yang puyer ini. P: Baik bu A: Apakah sudah jelas dari penjelasan saya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? (sambil senyum) P: Sudah bu, Tidak ada A: Baik, semoga lekas sembuh nggih P: Baik bu, Terimakasih.

<table>
<tr><th>No</th><th>Resep</th><th>Tahapan Pengerjaan Resep</th></tr>
<tr><td>4</td><td>Jenis Resep : Resep asli
Resep obat : non racikan
Jumlah obat dalam resep : ~~Polifarmasi (>/~~Tidak
Pengulangan resep : -
Resep KB
  </td><td>A. Skrinning Administrasi
<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada</td><td>Sri Indah Lestari</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>Tidak Ada</td><td>29 tahun</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada</td><td>57 kg</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada</td><td>Diane</td></tr>
<tr><td>Kekuatan :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada</td><td>Diane</td></tr>
<tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada</td><td>Diane No. I</td></tr>
<tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada</td><td>S 1 x 1</td></tr>
<tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada</td><td>28-01-2025</td></tr>
<tr><td>Nama dokter :</td><td>Tidak Ada</td><td>Diberikan oleh Bidan</td></tr>
<tr><td>Surat ijin :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Alamat dr. :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
</table>
B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi
Diane (1) → diambil sebanyak 1 box diane tab
C. Perhitungan biaya resep
Diane 1 box Rp.186.000
Total semua : Rp. 186.000</td></tr>
</table>

D. ETIKET

Nama Obat /warna etiket :

E. *Product knowledge*

Nama Obat : Diane.

Kandungan : Cyproterone dan etinil estradiol.

Dosis lazim : 1 kali sehari 1 tablet, dimulai pada hari ke-1 siklus haid selama 21 hari diikuti masa istirahat selama 7 hari.

Kegunaan : Kontrasepsi oral dan dapat juga digunakan untuk mengobati permasalahan jerawat yang parah, serta menangani seborrhea atau hirsutisme ringan

ESO potensial : Mual dan kram perut, sakit kepala, adanya bercak selang jadwal haid, payudara menjadi lembut, perubahan nafsu makan, dan berat badam jadi bertambah atau kurang

KI : Hamil, laktasi, gangguan fungsi hati berat, riwayat iketrus idiopatik atau pruritus selama hamil, sindrom rotor, tumor hati, anemia sel sabit, dalam pengobatan kanker payudara, dan DM berat.

PERHATIAN : Obat dalam kategori ini tidak boleh dikonsumsi wanita yang sedang hamil atau memiliki kemungkinan untuk hamil dan ibu menyusui.

Cara penyimpanan : Simpan Diane tablet dalam wadah tertutup di tempat yang sejuk dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak.

F. Tahap pembuatan

1. Diambil obat diane pada rak obat sebanyak 1 box yang berisi 21 tab
2. Ditempel etiket pada kemasan obat
3. Dimasukkan ke dalam plastik
4. Diperiksa kembali kesesuain obat, jumlah, dan etiket pada resep
5. Dipastikan etiket dapat terbaca jelas oleh apoteker saat KIE kepada pasien

G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

Ket :
P : Pasien dan A : Apoteker

A : Atas nama Ibu Sri Indah Lestari silahkan menuju loket 4
P : (duduk di tempat pengambilan obat)
A : Atas nama siapa Bu ? (dengan wajah ramah)
P : Atas nama Bu Sri Indah Lestari
A : Mohon maaf Bu, bisa disebutkan tanggal lahir nya?
P : 31 Januari 1996 Bu
A : Baik atas nama Ibu Sri Indah Lestari nggih, ini untuk obat diane dapat 1 box nggih Bu, diminum sehari satu kali satu tablet, dimulai secara rutin waktu hari ke-1 siklus haid selama 21 hari diikuti masa istirahat selama 7 hari bisa diminum mulai di hari ibunya dapat obat jadi dilihat sekarang hari apa lalu minum pilnya yang bertuliskan hari ini, lalu Ibu bisa melanjutkan minum sesuai tanda panahnya ya Bu , kalau nanti sudah habis obatnya, kan ini ada 21 tab ditunggu dulu dalam 1 minggu biasanya haid,jika dalam 1 minggu belum haid bisa kembali lagi kesini diminum sesudah makan (sambil memberikan obat diane).
P : Baik Bu.
A : Apakah ada yang ditanyakan Bu ?
P : Sudah tidak ada Bu

		A : Baik semoga sehat selalu Bu (sambil senyum) P : Terima Kasih Bu A : Sama-sama.

<table>
<tr><th>No</th><th>Resep</th><th>Tahapan Pengerjaan Resep</th></tr>
<tr><td>5</td><td>Jenis Resep : Resep asli
Resep obat : non racikan
Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak
Pengulangan resep : -
Resep Insulin
 
</td><td>A. Skrinning Administrasi
<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada</td><td>Lailatul Khusnah</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>Tidak Ada</td><td>49 tahun</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>Tidak Ada</td><td>- kg</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada</td><td>R1 : Amlodipine 10 mg
R2 : Gabapentin 100 mg
R3 : Galvus
R4 : Glucosamin
R5 : Lansoprazole
R6 : Nadic Gel
R7 : NR
R8 : Sansulin
R9 : Sucralfat</td></tr>
<tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada</td><td>R1 : Amlodipine 10 mg
R2 : Gabapentin 100 mg</td></tr>
<tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada</td><td>R1 : Amlodipine 10 mg
R2 : Gabapentin 100 mg
R3 : Galvus
R4 : Glucosamin
R5 : Lansoprazole
R6 : Nadic Gel
R7 : NR
R8 : Sansulin
R9 : Sucralfat</td></tr>
<tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada</td><td>R1 : Amlodipine 10 mg No.XXX
R2 : Gabapentin 100 mg No.XXX
R3 : Galvus No.XXX
R4 : Glucosamin No.X
R5 : Lansoprazole No.X
R6 : Nadic Gel No.I
R7 : NR No.IX</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		R8 : Sansulin No.III R9 : Sucralfat No.I
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada	R1 : Amlodipine 10 mg S 0-0-1 R2 : Gabapentin 100 mg S 1x1 R3 : Galvus S 1-0-0 R4 : Glucosamin S 1x1 R5 : Lansoprazole S 2x1 R6 : Nadic Gel S UE R7 : NR S 3x30 R8 : Sansulin S 0-0-30 R9 : Sucralfat S 3x1 CTH
Penulisan resep :	Ada	14-02-2025
Nama dokter :	Ada	dr. Nuri Indah Hapsanti, Sp.PD
Surat ijin :	Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Tidak Ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R1 : Amlodipin 10 mg → Diambil sebanyak 30 tablet/3 strip
R2 : Gabapentin 100 mg → Diambil sebanyak 30 kapsul/3 strip
R3 : Galvus atau Vildagliptin → Diambil sebanyak 30 tablet/ 3 strip
R4 : Glucosamine MPL 250 mg → Diambil sebanyak 10 tablet/ 1 strip
R5 : Lansoprazole → diambil sebanyak 10 kapsul/ 1 strip
R6 : Nadic gel → DIambil sebanyak 1 tube
R7 : NR → Diambil sebanyak 9 pcs, dengan perhitungan :
Pada resep aturan pakai NR adalah 3x sehari 30 unit → 3 x 30 = 90
Kemudian dikali dengan 1 bulan karena untuk penggunaan selama 1 bulan → 90 x 30 hari = 2.700
Lalu dibagi dengan jumlah isi dalam NR (100 IU/ 3 ml) sehingga 100 x 3 = 300 → maka 2.700/300 = 9 pcs insulin NR yang harus diambil
R8 : Sansulin → Diambil sebanyak 3 pcs
Pada resep aturan pakai sansulin adalah 1x sehari saat malam hari 30 unit → 1 x 30 = 30
Kemudian dikali dengan 1 bulan karena untuk penggunaan selama 1 bulan → 30 x 30 hari = 900
Lalu dibagi dengan jumlah isi dalam sansulin (100 IU/ 3 ml) sehingga 100 x 3 = 300 → maka 900/300 = 3 pcs insulin sansulin yang harus diambil
R9 : Sucralfat → Diambil sebanyak 1 botol

C. Perhitungan biaya resep

R1 : Amlodipin 10mg → harga per tab Rp. 926,5. Pada resep yang diminta adalah 30 tab sehingga 30 x 926,5 = 27.795
R2 : Gabapentin 100 mg → harga per kapsul Rp. 1.068. Pada resep yang diminta adalah 30 kapsul sehingga 30 x 1.068 = 32.040
R3 : Galvus → harga per tab Rp. 2.105. Pada resep yang diminta adalah 30 tab sehingga 30 x 2.105 = 63.150
R4 : Glucosamine MPL 250 mg → harga per tab Rp. 1.502, 3. Pada resep yang diminta adalah 10 tab sehingga 10 x 1.502,3 = 15.023

R5 : Lansoprazole → harga per tab Rp. 1.932. Pada resep yang diminta adalah 10 kapsul sehingga 10 x 1.932 = 19.320
R6 : Nadic gel → harga 1 tube Rp. 17.150. Pada resep yang diminta adalah 1 tube sehingga 17.150
R7 : NR → harga per 1 pcs Rp. 107.021
R8 : Sansulin → harga per 1 pcs Rp.106.571

D. ETIKET

Nama Obat /warna etiket :

Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur | Transparan | Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 | P: +62 31 3981275 F: +62 31 3945459

14/02/2025
Ny. Lailatul Khusnah
Amlodipine 10 Mg
1x1(Malam)
Diminum Setelah Makan

Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur | Transparan | Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 | P: +62 31 3981275 F: +62 31 3945459

14/02/2025
Ny. Lailatul Khusnah
Gabapentin 100 Mg
1x1
Diminum Setelah Makan

Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur | Transparan | Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 | P: +62 31 3981275 F: +62 31 3945459

14/02/2025
Ny. Lailatul Khusnah
Glucosamine
1x1
Diminum Setelah Makan

Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur | Transparan | Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 | P: +62 31 3981275 F: +62 31 3945459

14/02/2025
Ny. Lailatul Khusnah
Galvus
1x1(Pagi)
Diminum setelah Makan

		Rumah Sakit **Muhammadiyah Gresik** Jujur | Transparan |Kekeluargaan Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 | P: +62 31 3981275 F: +62 31 3945459 14/02/2025 Ny. Lailatul Khusnah Lansoprazole 2x1 Diminum Sebelum Makan ***Rumah Sakit*** **Muhammadiyah Gresik** Jujur | Transparan | Kekeluargaan Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 | P: +62 31 3981275 | F: +62 31 3945459 14/02/2025 Ny. Lailatul Khusnah Nadic Gel Dioleskan Pada Bagian Nyeri Obat Luar ***Rumah Sakit*** **Muhammadiyah Gresik** Jujur | Transparan | Kekeluargaan Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 | P: +62 31 3981275 | F: +62 31 3945459 14/02/2025 Ny. Lailatul Khusnah NR 3 X 30 Unit (Disuntikkan sebelum makan) Obat Luar ***Rumah Sakit*** **Muhammadiyah Gresik** Jujur | Transparan | Kekeluargaan Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 | P: +62 31 3981275 | F: +62 31 3945459 14/02/2025 Ny. Lailatul Khusnah Sansulin 1 X 30 Unit (Disuntikkan Sebelum Tidur) Obat Luar *Rumah Sakit* **Muhammadiyah Gresik** Jujur | Transparan |Kekeluargaan Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 | P: +62 31 3981275 F: +62 31 3945459 14/02/2025 Ny. Lailatul Khusnah Sucralfate 3 X 1 Sendok Teh (5 ml) Diminum Sebelum Makan

E. *Product knowledge*

Nama Obat : Amlodipine 10 mg. Kandungan : Amlodipine 10 mg. Dosis lazim : Dewasa → dosis awal 1 kali sehari 2,5 mg, dapat ditingkatkan hingga dosis maksimal 10 mg. Anak usia 6 – 17 tahun → dosis awal 1 kali sehari 2,5 mg, dapat ditingkatkan mejadi 5 mg sekali sehari setelah inteval 4 minggu sesuai dengan respon klinis. Lansia → dosis awal 2,5 mg sekali sehari. Dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Kegunaan : Mengatasi tekanan darah tinggi atau hipertensi. ESO potensial : Kegerahan, merasa lelah, pusing, mual, pembengkakan tungkai, dan jantung berdebar. KI : Hipersensitif. PERHATIAN : Gagal jantung, T berkepanjangan pada pasien dengan atau gangguan fungsi hati, kehamilan, dan laktasi. Cara penyimpanan : Simpan tablet di tempat tertutup dalam suhu ruangan, serta terhindar dari hawa panas dan sinar matahari langsung. Jauhkan juga dari jangkauan anak-anak.	Nama Obat : Gabapentin 100 mg. Kandungan : Gabapentin 100 mg. Dosis lazim : - Kejang epilepsi : Dewasa → 300 mg 1 kali sehari pada hari pertama, 300 mg 2 kali sehari pada hari kedua, dan 300 mg 3 kali sehar pada hari ketiga. Dosis harian umumnya 900 – 3.000 mg per hari, dibagi dalam 3 dosis. Anak usia > 6 tahun → Dosis awal 10 – 15 mg/kgBB. Dosis dapat ditingkatkan setiap 3 hari hingga mencapai dosis yang efektif. - Nyeri saraf setelah herpes : Dewasa → 300 mg 1 kali sehari pada hari pertama, 300 mg tiap 12 jam pada hari kedua, dan 300 mg tiap 8 jam pada hari ketiga. - Sindrom kaki gelisah : Dewasa → 100 – 300 mg per hari, diminum 2 jam sebelum tidur. Dosis dapat ditambahkan setiap 2 minggu sampai gejala berkurang. Dapat diberikan sebelum atau sesudah makan. Kegunaan : Meredakan kejang pada penderita epilepsi, nyeri saraf akibat herpes, dan sindrom kaki gelisah. ESO potensial : Kantuk, pusing, tubuh mudah lelah, mual, diare, konstipasi, bola mata bergerak cepat dan berulang di luar kendali, penglihatan buram, serta gemetar. KI : Jangan diberikan pada pasien yang hipersensitif terhadap komponen obat. PERHATIAN : Hati-hati penggunaan pada penderita gangguan fungsi pernafasan, gangguan ginjal, kejang campuran, pada anak-anak, orang tua, wanita hamil dan menyusui, jangan menghentikan terapi secara mendadak, kurangi dosis secara bertahap selama minimal 7 hari.

			Cara penyimpanan : Simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius, terlindung dari cahaya.
		Nama Obat : Galvus 50 mg Kandungan : Vildagliptin 50 mg Dosis lazim : 1 kali sehari pada pagi hari atau 2 kali pada pagi dan malam hari. dapat dikombinasikan dengan obat antidiabetes lain, seperti metformin, sulfinilurea, atau insulin. Dapat dikonsumsi sebelum atau setelah makan Kegunaan : Mengobati diabetes tipe 2 ESO potensial : Pusing, sakit kepala, konstipasi, mual, diare, hipertensi, nyeri sendi, pilek dan nyeri tenggorokan, tremor, lemas KI : Gangguan ginjal sedang atau berat, gangguan hati, kelainan herediter yang jarang berupa intoleransi galaktosa, defisiensi laktase atau malabsorpsi glukosa-galaktosa, DM tipe 1 atau terapi diabetik keotasidosis, anak < 18 tahun, laktasi PERHATIAN : Hamil, dapat mengganggu kemampuan mengemudi atau menjalankan mesin Cara penyimpanan : Simpan pada suhu ruangan, di tempat yang kering, terhindar dari sinar matahari langsung. Jauhkan dari jangkauan anak-anak	Nama Obat : Glucosamine MPL 250 mg. Kandungan : Glucosamine 250 mg. Dosis lazim : 1 kali sehari, dapat diberikan sesudah makan. Kegunaan : Memelihara kesehatan sendi. ESO potensial : Sakit kepala, kelelahan, kantuk, mules, perut kembung, sakit perut, diare, sembelit, ruam, mual muntah, angioderma. KI : - PERHATIAN : Hipersensitif terhadap bahan aktif obat, pasien dengan atau toleransi glukosa terganggu, DM tidak terkontrol, risiko penyakit CV, asma, kehamilan, dan menyusui. Cara penyimpanan : Simpan pada suhu 30 derajat Celcius, terhindar dari cahaya matahari secara langsung.
		Nama Obat : Lansoprazole 30 mg Kandungan : Lansoprazole 30 mg Dosis lazim : - GERD : Dewasa → 15 – 30 mg, 1 kali sehari selama 4 – 8 minggu. Anak-anak → 15 – 30 mg/kgBB, 1 kali sehari selama 8 – 12 minggu. - Tukak lambung : Dewasa → 15 – 30 mg, 1 kali sehari selama 4 – 8 minggu. - Sindrom Zollinger-Ellison : Dewasa → Dosis awal 60 mg sehari pada pagi hari. Jika diperlukan, dosis dapat ditingkatkan menjadi 60 mg, 2 kali sehari. Dapat dikonsumsi dengan perut kosong atau	Nama Obat : Diclofenac Diethylamine 1% Gel 50 gr. Kandungan : Diclofenac diethylamine 10 mg. Dosis lazim : Dewasa → 2 – 4 gram pada bagian sendi yang sakit, 2 – 4 kali sehari. Dosis maksimal 8 gram per hari dan lama pengobatan maksimal 7 hari. bersihkan bagian yang akan diolesi obat, oleskan obat pada bagian yang terasa nyeri. Kegunaan : Mengatasi nyeri dan peradangan, misalnya pada nyeri otot, nyeri sendi, keseleo, pengapuran sendi. ESO potensial : Kulit kering, kemerahan, gatal, bengkak, nyeri, iritasi, atau mati rasa pada area yang diolesi obat, pusing

		sebelum makan pagi. Kegunaan : Mengatasi gangguan lambung, seperti tukak lambung, GERD, atau sindrom Zollinger-Ellison ESO potensial : Diare, sakit kepala, sakit perut, mual, pusing, sembelit KI : Penderita yang hipersensitif terhadap lansoprazole, serta pasien yang mengonsumsi rilpivirine dan atazanavir. PERHATIAN : Pasien dengan keganasan lambung, faktor risiko, berkurangnya penyerapan vitamin B12 atau berkurangnya simpanan tubuh, risiko osteoporosis, gangguan hati sedang sampai berat, kehamilan, dan menyusui Cara penyimpanan : Simpan pada suhu 30 derajat Celcius, terhindar dari cahaya matahari secara langsung.	KI : Alergi terhadap kandungan obat, gagal jantung, penyakit jantung, tukak lambung, pendarahan, gangguan fungsi hati atau ginjal, kehamilan pada trimester ketiga. PERHATIAN : Tekanan darah tinggi, kadar kolesterol tinggi, diabetes, asma, infeksi saluran pernapasan, kelainan darah, infeksi mata, anak-anak, ibu hamil pada trimester pertama dan kedua, ibu menyusui, pengobatan, jangka panjang Cara penyimpanan : Simpan pada suhu 30 derajat Celcius, terhindar dari cahaya matahari secara langsung.
		Nama Obat : Novorapid Flexpen 3 ml. Kandungan : Insulin Aspart IU. Dosis lazim :0,5 – 1 IU/kg BB per hari. injeksi secara subkutan. Disuntikkan segera sebelum atau setelah makan. Kegunaan : Terapi atau pengobatan untuk DM. ESO potensial : Kemerahan pada area yang disuntikkan, pusing, kantuk, sakit kepala,pandangan kabur, sesak napas, ruam, berkeringat, mual. KI : Obat ini tidak boleh diberikan kepada pasien yang mengalami, alergi atau hipersensitif terhadap komponen obat ini. PERHATIAN : Hipoglikemia, hipertensi, hipokalemia, penggunaan bersama obat diabetes yang diminum. Cara penyimpanan : Sebelum digunakan untuk pertama kali (simpan pada suhu antara 2 – 8 derajat Celcius, terhindar dari cahaya langsung dan jangan dibekukan), setelah dibuka dan digunakan	Nama Obat : Sansulin Log G Catridge 3 ml. Kandungan : Insulin Glargine 100 IU. Dosis lazim : Dosis bersifat individual, 1 kali sehari diinjeksi secara subkutan, diberikan pada waktu yang sama tiap harinya. Disuntikkan secara subkutan pada area perut, lengan atas atau paha. Kegunaan : Pengobatan diabetes mellitus pada dewasa dank anak 6 tahun ke atas, dimana pengobatan insulin diperlukan. ESO potensial : Hipoglikemia, gangguan penglihatan sementara, perubahan pembentukan lemak tubuh, reaksi di area injeksi dan alergi, serta terbentuknya antibodi insulin. KI : Hipersensitivitas terhadap komponen obat. PERHATIAN : Pasien dengan gangguan ginjal dan hati, wanita hamil dan ibu menyusui, anak usia kurang dari 6 tahu Cara penyimpanan : Sebelum digunakan untuk pertama kali (simpan pada suhu antara 2 – 8 derajat

		(pen dapat disimpan sampai 28 hari di bawah suhu ruang atau 25 derajat Celcius. Jangan kembalikan pen ke lemari es dan jangan dibekukan, jangan simpan pen dengan jarum terpasang).	Celcius, terhindar dari cahaya langsung dan jangan dibekukan), setelah dibuka dan digunakan (pen dapat disimpan sampai 28 hari di bawah suhu ruang atau 25 derajat Celcius. Jangan kembalikan pen ke lemari es dan jangan dibekukan, jangan simpan pen dengan jarum terpasang).
		Nama Obat : Sucralfate 500 mg/5 ml. Kandungan : Tiap sendok takar (5 ml) mengandung sucralfate 500 mg. Dosis lazim : 2 sendok takar (10 ml) empat kali sehari pada kondisi perut kosong (1 jam sebelum makan dan sebelum tidur). Kegunaan : Tukak lambung dan usus, gastritis kronik dan profilaksis perdarahan gastrointestinal. ESO potensial : Sembelit dan mulut kering, diare, mual, muntah, rasa tidak nyaman pada lambung, kembung, ruam kulit, rasa kantuk, vertigo, nyeri pinggang, dan sakit kepala. KI : Tidak boleh diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak. PERHATIAN : Hati-hati penggunaan pada penderita DM, kondisi yang dapat mengganggu proses menelan, pasien yang sakit parah terutama dengan pengosongan lambung yang tertunda, gangguan ginjal, lansia, kehamilan, dan menyusui. Cara penyimpanan : Simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius, hanya dapat dipakai selama 3 hari setelah tutup dibuka, kocok dahulu sebelum dipakai.	

F. Tahap pembuatan

1. Dimbil amlodipine 10 mg sebanyak 30 tablet atau 3 strip pada rak obat, lalu diberi etiket putih (diminum satu kali sehari pada malam hari setelah makan).
2. Diambil gabapentin 100 mg sebanyak 30 kapsul atau 3 strip pada rak obat, lalu diberi etiket putih (diminum satu kali sehari setelah makan).
3. Diambil galvus atau vildagliptin 50 mg sebanyak 30 pil atau 3 strip pada rak obat, lalu diberi etiket putih (diminum satu kali sehari pada pagi hari setelah makan).
4. Diambil glucosamin sebanyak 10 tablet atau 1 strip pada rak obat, lalu diberi etiket putih (diminum satu kali sehari setelah makan).
5. Diambil lansoprazole sebanyak 10 kapsul atau 1 strip pada rak obat, lalu diberi etiket putih (diminum dua kali sehari sebelum makan).
6. Diambil nadic gel sebanyak 1 tube pada rak obat, lalu diberi etiket biru (dioleskan pada bagian yang nyeri).
7. Diambil NR sebanyak 9 pen pada lemari pendingin, lalu diberi etiket biru (disuntikkan tiga kali sehari masing-masing 30 unit sebelum makan).
8. Diambil sansulin sebanyak 3 pen pada lemari pendingin, lalu diberi etiket biru (disuntikkan satu kali sehari 30 unit sebelum makan).
9. Diambil sucralfate sebanyak 1 botol, lalu diberi etiket putih (diminum tiga kali sehari satu sendok teh sebelum makan).
10. Semua etiket yang telah ditulis ditempel sesuai obatnya.
11. Dicek kembali kesesuaian obat pada resep serta etiket, seperti nama obat, jumlah obat, dan aturan pakai.
12. Obat dimasukkan ke dalam plastik bening, dipastikan obat dan etiket terlihat semua oleh apoteker saat melakukan KIE.

G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

Ket :
P : Pasien dan A : Apoteker

A : “Atas nama Ibu Lailatul Khusnah, silahkan menuju loket 4 !”
P : “(duduk di tempat pengambilan obat)”
A : “Atas nama siapa Bu ? (dengan wajah ramah)”
P : “Atas nama Bu Lailatul Khusnah”
A : “Mohon maaf Bu, bisa disebutkan tanggal lahir nya?”
P : “30 september 1996 Bu”
A : “Baik atas nama Ibu Lailatul Khusnah nggih, Ibu mendapatkan obat rutin nggih. Saya jelaskan satu per satu supaya Ibu lebih paham cara penggunaannya dan apa saja yang perlu diperhatikan." (Apoteker tersenyum ramah dan mempersilakan pasien duduk).
P : “Iya mbak, ini banyak sekali obatnya, saya jadi bingung.” (Pasien tampak sedikit khawatir).
A : “ Tidak apa-apa, Bu. Kita mulai dari yang pertama ya, ini Amlodipine 10 mg. Obat ini untuk menurunkan tekanan darah Ibu. Diminum satu kali sehari, pada malam hari sebelum tidur. Usahakan diminum di jam yang sama setiap harinya ya, Bu.” (Apoteker menunjukkan obat Amlodipine dan memberikan informasi dengan jelas).
P : “Oh, jadi malam hari ya minumnya. Kalau lupa bagaimana, Mbak?”
A : “Jika Ibu lupa minum, segera minum saat Ibu ingat, kecuali jika sudah dekat dengan jadwal minum berikutnya. Jika sudah dekat, lewati saja dosis yang terlupa, jangan menggandakan dosis ya, Bu.”
A : “Selanjutnya, ini Gabapentin 100 mg. Obat ini untuk mengatasi nyeri saraf yang Ibu rasakan. Diminum satu kali sehari, bisa pagi atau malam, yang penting konsisten setiap hari.” (Apoteker menunjukkan obat Gabapentin).
P : “Nyeri saraf saya memang sering kambuh, Mbak.”
A: “Betul, Bu. Gabapentin ini akan membantu mengurangi nyerinya. Lalu ini Galvus, untuk membantu mengontrol gula darah Ibu. Diminum satu kali sehari pada pagi hari sebelum makan.” (Apoteker menunjukkan obat Galvus).
P : “Saya memang punya diabetes, Mbak.”

		A : “Iya, Bu. Galvus ini akan membantu menjaga kadar gula darah Ibu tetap stabil. Kemudian ini Glucosamin, untuk membantu mengurangi nyeri sendi. Diminum satu kali sehari.” (Apoteker menunjukkan obat Glucosamin). P : “Sendi saya juga sering sakit, Mbak, terutama lutut.” A : “Glucosamin ini akan membantu mengurangi peradangan dan nyeri pada sendi Ibu. Selanjutnya, ini Lansoprazole, untuk mengatasi masalah asam lambung. Diminum dua kali sehari, sebelum makan pagi dan makan malam.” (Apoteker menunjukkan obat Lansoprazole). P : “Asam lambung saya sering naik, Mbak, apalagi kalau telat makan.” A : “Betul, Bu. Lansoprazole ini akan membantu mengurangi produksi asam lambung. Lalu ini Nadic Gel, obat oles untuk meredakan nyeri otot atau sendi. Dioleskan tipis-tipis pada area yang sakit, secukupnya saja.” (Apoteker menunjukkan obat Nadic Gel). P : “Ini untuk pegal-pegal ya, Mbak?” A : “Betul, Bu. Dioleskan pada area yang pegal atau nyeri. Lalu ini NR dapat 9 pen disimpan pada lemari pendingin, disuntikkan tiga kali sehari masing-masing dosisnya 30 unit sebelum makan.” (Apoteker menunjukkan NR). A : “Kemudian ini Sansulin, insulin yang harus disuntikkan. Dosisnya 30 unit setiap malam sebelum tidur. Apakah Ibu sudah tahu cara menyuntik insulin?” (Apoteker menunjukkan insulin Sansulin)” P : “Belum, Mbak. Saya belum pernah pakai insulin.” A : “Baik, Bu. Saya akan jelaskan cara menyuntik insulinnya. (Apoteker memberikan penjelasan dan memperagakan cara menyuntik insulin dengan benar). Pastikan Ibu menyuntikkan di area yang berlamak dan pada bagian yang berbeda ya Bu, untuk menghindari iritasi.” P : “Oh, begitu ya, Mbak. Terima kasih sudah diajari.” A : “Sama-sama, Bu. Dan yang terakhir, ini Sucralfat. Diminum 3 kali sehari, satu sendok teh sebelum makan. Obat ini berfungsi untuk melindungi lapisan lambung Ibu.” (Apoteker menunjukkan obat Sucralfat). P : “Baik, Mbak. Saya mengerti.” A: “Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Pastikan Ibu minum obatnya secara teratur sesuai anjuran ya, Bu. Jika ada efek samping yang tidak nyaman, segera konsultasikan dengan dokter.” (Apoteker memberikan kesempatan bertanya dan mengingatkan pasien). P : “Tidak ada, Mbak. Terima kasih banyak atas penjelasannya.”

		A : “Sama-sama, Ibu. Semoga lekas sembuh. Jika ada pertanyaan lagi, jangan ragu untuk menghubungi kami.” (Apoteker tersenyum dan memberikan obat kepada pasien).

<table>
<tr><th>No</th><th>Resep</th><th>Tahapan Pengerjaan Resep</th></tr>
<tr><td>6.</td><td>Jenis Resep : Resep asli
Resep obat : Racikan
Jumlah obat dalam resep : ~~Polifarmasi (>/~~Tidak
Pengulangan resep : -
Resep Kudis/Kurap
 
</td><td>A. Skrinning Administrasi
<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada</td><td>Iva Andriati</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada</td><td>41 tahun</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>Tidak Ada</td><td>- kg</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada</td><td>R1 : Carmed 20%
R2 : Cetirizin 10 mg
R3 : Klobetasol 0,05 % 40 g
Sal acid 5%</td></tr>
<tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada</td><td>R2 : Cetirizin 10 mg
R3 : Klobetasol 0,05 % 40 g</td></tr>
<tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada</td><td>R1 : Carmed 20% (Cream)
R2 : Cetirizin 10 mg (Tablet)
R3 : Klobetasol 0,05 % 40 g
Sal acid 5% (Cream)</td></tr>
<tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada</td><td>R1 : Carmed 20% No.I
R2 : Cetirizin 10 mg No.X
R3 : Klobetasol 0,05% 40 g
Sal acid 5 %
No. I</td></tr>
<tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada</td><td>R1 : Carmed 20%No. I
S pelembab 3x1
R2: Cetirizin 10 mg No.X
S 1x1
R3: Klobetasol 0,05% 40 g
Sal acid 5 % No. I
Mfa cream da in pot No.I
S 3x1 setelah pelembab</td></tr>
<tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada</td><td>10 – 02 - 2025</td></tr>
<tr><td>Nama dokter :</td><td>Tidak Ada</td><td>dr. Nurina Dhani Rahmayanti, Sp.DV, M. Ked. Klin</td></tr>
<tr><td>Surat ijin :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Alamat dr. :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R1 : Carmed 20% → Diambil sebanyak 1 tube
R2 : Cetirizin 10 mg → Diambil sebanyak 10 tablet/ 1 strip
R3 : Klobetasol 0,05 % 40 g dan sal acid 5 % → diracik menjadi krim dalam 1 pot cream

C. Perhitungan biaya resep

R1 : Carmed 20% → harga per tube Rp. 54.658. pada resep yang diminta adalah 1 tube sehingga 1 x 54.658 = 54.658
R2 : Cetirizine 10 mg → harga per tablet Rp. 448. Pada resep yang diminta adalah 10 tablet sehingga 10 x 448 = 4.480
R3 : Klobetasol 0,05 % 40 g → harga per tube Rp. 15.984
Sal acid 5% → Rp. 20.000
Pot salep → Rp. 2.398

Total Semua : 54.658 + 4.480 + 15.984 + 20.000 + 2.398
= Rp. 97.520

D. ETIKET

Nama Obat /warna etiket :

E. *Product knowledge*

Nama Obat : Carmed 20% Krim 40 g. Kandungan : Urea 20%, Natrium Pidolat (NaPCA), natirum laktat, dan minyak nabati. Dosis lazim : 2 kali sehari oleskan tipis. Kegunaan : Mengatasi berbagai kondisi kulit, seperti kulit kering, iktiosis, hiperkeratosis, psoriasis, dan dermatitis atopik. ESO potensial : Rasa pedih dan iritasi. KI : Hipersensitif. PERHATIAN : Hindari kontak dengan mata, kulit yang terluka, kulit yang meradang, kulit muda, membran mukosa, fisura. Cara penyimpanan : Simpan krim di dalam suhu ruangan dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak.	Nama Obat : Cetirizine 10 mg. Kandungan : Cetirizine HCl 10 mg. Dosis lazim : Dewasa dan anak-anak > 6 tahun (5 – 10 mg sekali sehari), serta anak-anak usia 2 – 6 tahun (2,5 sekali sehari). Kegunaan : Mengatasi gejala rinitis alergi, rinitis parennial atau rinitis alergi yang bersifat kronis, dan urtikaria atau biduran. ESO potensial : Kantuk, pusing, mulut kering, sakit perut, dan diare. KI : Hipersensitif, gangguan ginjal berat. PERHATIAN : Antihistamin yang menyebabkan kantuk mempunyai aktivitas antimuskarinik yang nyata dan harus digunakan dengan hati-hati pada pasien dengan peningkatan risiko retensi urine, pasien epilepsi dan pasien dengan risiko kejang. Gangguan hati dan ginjal ringan samapai sedang. Anak dan lansia lebih mudah mendapat efek samping. Penggunaan pada anak di bawah 2 tahun tidak dianjurkan kecuali atas petunjuk dokter dan tidak boleh digunakakan pada neonatus. Cara penyimpanan : simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius, terlindung dari cahaya matahari.

		Nama Obat : Clobetasol 0,05 % 40 g. Kandungan : Clobetasol propionate 0,05% Dosis lazim : 1 – 2 kali sehari. Kegunaan : Meredakan gatal, kemerahan, dan rasa tidak nyaman pada kulit yang disebabakan peradangan. ESO potensial : Rasa terbakar, gatal, atopsi kulit, iritasi, kekeringan. KI : Rosasea, dermatitis perioral, infeksi virus kutaneus primer, lesi kulit terinfeksi oleh bakteri atau jamur, acne. PERHATIAN : Harus dengan resep dokter, bayi dan anak, hindari kontak dengan mata, hamil dan laktasi, terapi jangka lama, pemakaian pada muka Cara penyimpanan : Simpan di tempat kering dan terhindar dari cahaya matahari	Nama Obat : Sal acid 5% . Kandungan : Salicylic acid 5%. Dosis lazim : 1 – 2 kali sehari. Kegunaan : Mengobati kutil atau kapalan, dermatitis seboroik, psoriasis. ESO potensial : Kulit kemerahan, rasa terbakar di bagian yang diobati, kulit mengelupas, iritasi, ruam, kulit kering. KI : Hipersensitivitas PERHATIAN : Penggunaan jangka panjang pada area kulit yang luas terutama pada anak-anak dan pasien dengan gangguan ginjal atau hati dapat menyebabkan salisilisme, pada anak usia di bawah 12 tahum dengan gangguan ginjal atau hati perlu dipantau dan dibatasi penggunaannya untuk mencegah keracunan salisilat, pemakaian berlebihan tidak dapat mempercepat penyembuhan, untuk mencegah timbulnya Reyes's Syndrome obat ini tidak dianjurkan untuk anak yang mengalami varisela atau influenza. Cara penyimpanan : Simpan dalam wadah tertutup pada suhu ruangan. Hindari dari pembekuan dan hindari dari jangkauan anak-anak.

F. Tahap pembuatan

1. Diambil Carmed 20% sebanyak 1 tube pada rak obat, lalu diberi etiket biru (pelembab dioleskan tipis 3 kali sehari)
2. Dimbil Cetirizin 10 mg sebanyak 10 tablet atau 1 strip pada rak obat, lalu diberi etiket putih (diminum satu kali sehari setelah makan).
3. Diambil Clobetasol 0,05 % dan sal acid 5%, masing masing cream sebanyak 1 tube lalu masukkan ke dalam mortir di aduk ad homogen
4. Setelah homogen lalu dimasukkan kedalam pot No. I dan beri etiket warna biru (dioleskan setelah pelembab 3 kali sehari)
5. Semua etiket yang telah ditulis ditempel sesuai obatnya.
6. Dicek kembali kesesuaian obat pada resep serta etiket, seperti nama obat, jumlah obat, dan aturan pakai.
7. Obat dimasukkan ke dalam plastik bening, dipastikan obat dan etiket terlihat semua oleh apoteker saat melakukan KIE.

G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

Ket :
P : Pasien dan A : Apoteker

A : "Atas nama Ibu Iva Andriati silahkan menuju loket 4 !"
P : (duduk di tempat pengambilan obat)
A : "Atas nama siapa Bu ?" (dengan wajah ramah)
P : "Atas nama Ibu Iva Andriati"
A : "Mohon maaf Bu, bisa disebutkan tanggal lahir nya?"
P : "21 Maret 1984 mbak"
A : "Baik atas nama Ibu Iva Andriati nggih, ini saya lihat di resep Ibu dapat 3 obat. ini Carmed 20% untuk melembabkan kulit Ibu yang kering. Dipakai tiga kali sehari." (Apoteker menunjukkan obat Carmed dan memberikan informasi dengan jelas).
P : "Oh, pelembab ya, Mbak. Kulit saya memang kering sekali."
A: "Betul, Bu. Pelembab ini akan membantu menjaga kelembaban kulit Ibu. Selanjutnya, ini Cetirizine 10 mg. Ini adalah obat alergi, diminum satu kali sehari. Biasanya diminum kalau Ibu merasa gatal-gatal. Obat ini bisa menyebabkan kantuk, jadi sebaiknya diminum malam hari sebelum tidur ya." (Apoteker menunjukkan obat Cetirizine)
P : "Oh, begitu ya, Mbak. Baik."
A : "Kemudian yang terakhir, ini ada racikan krim yang berisi Klobetasol 0,05% dan Asam Salisilat 5%. Krim ini digunakan tiga kali sehari penggunaannya dioleskan diarea ruam gatal, setelah Ibu menggunakan pelembab. Jadi, pakai pelembab dulu, baru krim ini." (Apoteker menunjukkan krim racikan).
P : "Krim ini untuk apa ya, Mbak?"
A : "Krim ini untuk mengobati gatal yang dirasakan Ibu."
P : "Baik, Mbak. Saya mengerti."
A : "Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Pastikan Ibu menggunakan obat-obatan ini secara teratur sesuai anjuran ya, Bu. Jika ada efek samping seperti kulit menjadi lebih tipis atau iritasi, segera konsultasikan dengan dokter." (Apoteker memberikan kesempatan bertanya dan mengingatkan pasien).

		P : “Tidak ada, Mbak. Terima kasih banyak atas penjelasannya.” A : “Sama-sama, Ibu. Semoga lekas sembuh.” (Apoteker memberikan obat kepada pasien). P : Baik Bu. A : Apakah ada yang ditanyakan Bu ? P : Sudah tidak ada Bu A : Baik semoga sehat selalu Bu (sambil senyum) P : Terima Kasih Bu A : Sama-sama.

<table>
<tr><th>No</th><th>Resep</th><th>Tahapan Pengerjaan Resep</th></tr>
<tr><td>7.</td><td>Jenis Resep : Resep asli
Resep obat : non racikan
Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak
Pengulangan resep : -
Resep Inhaler
</td><td>A. Skrinning Administrasi
<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada</td><td>Maryam</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>Tidak Ada</td><td>48 Tahun</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada</td><td>- kg</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada</td><td>R1 : FG Troches
R2 :Seretide Diskus</td></tr>
<tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada</td><td>R1 : FG Troches
R2 :Seretide Diskus</td></tr>
<tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada</td><td>R1 : FG Troches
R2 :Seretide Diskus</td></tr>
<tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada</td><td>R1 : FG Troches No.X
R2 :Seretide Diskus No.I</td></tr>
<tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada</td><td>R1 : FG Troches No. X
S 4 x 1
R2 :Seretide Diskus No.I
S 2x1</td></tr>
<tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada</td><td>11-02-2025</td></tr>
<tr><td>Nama dokter :</td><td>Tidak Ada</td><td>dr. Muzaijadah Retno Arimbi,Sp.P</td></tr>
<tr><td>Surat ijin :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Alamat dr. :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
</table>
B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi
R1 : FG TRC → Diambil sebanyak 10 tablet atau 1 strip
R2 : Seret DISC → Diambil sebanyak 1 pcs</td></tr>
</table>

C. Perhitungan biaya resep

R1 : FG Troches → harga per tablet Rp. 2.775. Pada resep yang diminta adalah 10 tablet sehingga 10 x 2.775 = 27.750
R2 : Seretide Diskus → harga per pcs Rp. 418.026. Pada resep yang diminta adalah 1 pcs sehingga 1 x 418.026 = 418.026

Total Semua : 27.750 + 418.026
= 445.776

D. ETIKET

Nama Obat /warna etiket :

E. *Product knowledge*

Nama Obat : FG Troches. Kandungan : Fradiomycin sulfate 2,5 mg dan gramicidin-S HCl 1,0 mg. Dosis lazim : 1 - 2 tablet isap, 4 – 5 kali sehari. Kegunaan : Mengobati radang tenggorokan, radang amandel, atau radang pada mulut dan gusi akibat infeksi bakteri. ESO potensial : Tidak nafsu makan, mual, atau gangguan pada saluran pencernaan. KI : Tidak boleh digunakan pada penderita yang hipersensitif atau alergi terhadap komponen FG	Nama Obat : Seretide Diskus 50/250 mcg. Kandungan : Salmaterol 50 mcg, Fluticasone Propionate 250 mcg. Dosis lazim : 2 kali sehari. Kegunaan : Mengobati gangguan pernapasan, seperti asma dan gejala penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). ESO potensial : Suara serak, sakit kepala, kram otot, nyeri sendi, serta candidiasis mulut dan tenggorokan. KI : Penderit yang hipersensitif terhadap

			Troches, atau penderita yang mempunyai riwayat alergi terhadap obat dari golongan aminoglikosida seperti streptomisin, kanamisin, gentamisin, fradiomisin, atau bacitracin. PERHATIAN : Harus dengan resep dokter. Jangan mengonsumsi dalam waktu lebih dari 1 minggu. Hentikan pengobatan dalam waktu lebih dari 1 minggu. Hentikan pengobatan apabila terjadi reaksi hipersensitivitas atau alergi. Cara penyimpanan : Simpan di tepat yang kering, sejuk, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak.	komponen obat. PERHATIAN : Harus dengan resep dokter. Tidak untuk meredakan gejala asma akut. TB paru, gangguan jantung berat, diabetes mellitus, hipokalemia yang tidak diterapi, tirotosikosis. Lakukan pengawasan berkala terhadap laju pertumbuhan pada anak yang mendapat terapi jangka panjang. hamil dan laktasi. Cara penyimpanan : Simpan pada suhu ruangan, di tempat yang kering dan terhindar dari sinar matahari langsung. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
			F. Tahap pembuatan 1. Diambil FG Troches sebanyak 10 tablet atau 1 strip pada rak obat, lalu diberi etiket putih (diminum 4 kali sehari 1 tablet setelah makan) 2. Dimbil Seretide Diskus sebanyak 1 pcs pada rak obat, lalu diberi etiket biru (dihisap 2 kali sehari lewat mulut). 3. Semua etiket yang telah ditulis ditempel sesuai obatnya. 4. Dicek kembali kesesuaian obat pada resep serta etiket, seperti nama obat, jumlah obat, dan aturan pakai. 5. Obat dimasukkan ke dalam plastik bening, dipastikan obat dan etiket terlihat semua oleh apoteker saat melakukan KIE.	

		G. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal) Ket : P : Pasien dan A : Apoteker A : "Atas nama Ibu Maryam silahkan menuju loket 4 !" P : (duduk di tempat pengambilan obat) A : "Atas nama siapa Bu ?" (dengan wajah ramah) P : "Atas nama Bu Maryam" A : "Mohon maaf Bu, bisa disebutkan tanggal lahir nya?" P : "8 Juli 1978 Bu". A : "Baik atas nama Ibu Maryam nggih, ini Saya Ibu mendapatkan dua resep obat. ini FG Troches, tablet hisap untuk mengatasi sakit tenggorokan. Dihisap perlahan, jangan langsung ditelan. diminum empat kali sehari satu tablet setelah makan dan dihabiskan nggih Bu." (Apoteker menunjukkan obat FG Troches dan memberikan informasi dengan jelas) P : "Oh, tablet hisap ya, Mbak. Kalau langsung ditelan tidak boleh ya?" A : "Sebaiknya dihisap perlahan, Bu, supaya obatnya bekerja lebih efektif di area tenggorokan yang sakit. Beri jeda waktu antara setiap penggunaan ya, Bu, jangan langsung dihisap sekaligus." P : "Baik, Mbak." A: "Selanjutnya, ini Seretide Diskus. Ini inhaler untuk mengatasi sesak napas Ibu. Digunakan dua kali sehari, pagi dan malam. Apakah Ibu sudah pernah menggunakan inhaler sebelumnya?" (Apoteker menunjukkan inhaler Seretide Diskus). P : "Belum pernah, Mbak. Saya baru pertama kali pakai inhaler." A: "Baik, Bu. Saya akan jelaskan cara menggunakan inhaler ini dengan benar. (Apoteker memberikan penjelasan dan demonstrasi cara menggunakan inhaler Seretide Diskus dengan benar, termasuk cara membuka, menarik napas, dan menahan napas). Dileatkkan seretide diskus secara horizontal, buka penutup sampai berbunyi klik, dorong tuas kemudian arahkan tegak lurus pada mulut, hirup serbuk inhaler dalam dalam, tahan napas 10 detik kemudian buang napas sedikit demi sedikit melalui mulut"

		P : “Oh, begitu ya, Mbak.” A: “Betul, Bu. Penting untuk diingat bahwa jangan menghentikan penggunaan obat ini secara tiba-tiba. Ikuti saja kontrol yang ditetapkan oleh dokter dan pastikan Ibu sudah kontrol sebelum obat ini habis, serta jangan menambah atau mengurangi dosis yang telah diberikan dokter”. P: “Baik, Mbak. Saya mengerti.” A: “Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Pastikan Ibu menggunakan obat-obatan ini secara teratur sesuai anjuran ya, Bu. Jika ada efek samping seperti jantung berdebar atau mulut kering, segera konsultasikan dengan dokter.” (Apoteker memberikan kesempatan bertanya dan mengingatkan pasien). P: “Tidak ada, Mbak. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Sekarang saya jadi lebih jelas” A : “Sama-sama, Ibu. Semoga lekas sembuh. Jika ada pertanyaan lagi, jangan ragu untuk menghubungi kami.” (Apoteker tersenyum dan memberikan obat kepada pasien).

8.

Jenis Resep : Resep asli
Resep obat : Racikan
Jumlah obat dalam resep : ~~Polifarmasi (>/~~Tidak
Pengulangan resep : -

Resep racikan anak 1

A. Skrining Administrasi

Nama Pasien :	Ada	Rayfal Hafiz Putranto
Umur pasien :	Tidak Ada	-
Berat Badan :	Tidak Ada	- kg
Nama Obat :	Ada	**R1 :** Sanmol 150 mg, Mefinal 70 mg **R2 :** Ranitidin 20 mg, Ondan 1,5 mg, Heptasan 1/3 tab
Kekuatan :	Ada	**R1 :** sanmol 500 mg, mefinal 500 mg **R2 :** Ranitidin 150 mg, Ondan 4 mg, Heptasan 4 mg
Bentuk sed. :	3Ada	Melakukan peracikan menjadi serbuk terbagi (pulvers)
Jumlah obat :	Ada	**R1 :** Sanmol 150 mg x 10: 500 mg =3 tab Mefinal 70 mg x 10 : 500 = 1,4 tab → 2 tab. **R2 :** Ranitidin 20 mg x 10 :100 mg = 1,3 tab → 2 tab. Ondan 1,5 x 10 : 4 mg = 3,7 tab → 4 tab. Heptasan 1/3 x 10 = 3,3 tab → 4 tab.
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada	**R1 :** Sanmol, Mefinal S 3x1 prn demam **R2 :** Ranitidin, Ondan, Heptasan S 3x1 prn muntah ac
Penulisan resep :	Ada	10-02-2025
Nama dokter :	Ada	dr. Muhammad Mughny
Surat ijin :	Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Tidak Ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

(R1)

1. Sanmol diambil sebanyak 3 tab

> 150 mg x 10: 500 mg =3 tab

2. Mefinal diambil sebanyak 1,4 tab → 2 tab

> 70 mg x 10 : 500 = 1,4 tab → 2 tab

(R2)

1. Ranitidin diambil sebanyak 1,3 tab → 2 tab

> 20 mg x 10 :100 mg = 1,3 tab → 2 tab.

2. Ondansetron diambil sebanyak 3,7 tab →4 tab

> 1,5 x 10 : 4 mg = 3,7 tab → 4 tab.

3. Heptasan diambil sebanyak 3,3 tab → 4 tab

> 1/3 x 10 = 3,3 tab → 4 tab.

C. Perhitungan Biaya Resep

(R1)

1. Sanmol 500 mg → harga per tab Rp. 2.552, pada resep yang diminta adalah 3 tab sehingga 3 x 2.552 = 7.656
2. Mefinal 500 mg → harga per tab Rp. 2.144, pada resep yang diminta adalah 2 tab sehingga 2 x 2.144 = 4.288
3. Ranitidin 100 mg → harga per tab Rp. 404, pada resep yang diminta adalah 2 tab sehingga 2 x 3.090 = 6.180
4. Ondansetron 4 mg → harga per tab Rp. 2.188, pada resep yang diminta adalah 4 tab sehingga 4 x 2.188 = 8.752
5. Heptasan → harga per tab Rp. 598, pada resep yang diminta adalah 4 tab sehingga 4 x 598 = 2.392
6. TUS kertas puyer = 100 x 10 = 1.000

Total semua = Rp. 30.268

D. Etiket

Nama Obat /warna etiket :





e. *Product knowledge*

1. Nama obat = Sanmol

Kandungan = Tablet paracetamol 500 mg

Dosis Lazim = Dewasa dan anak >12 tahun: 1 tablet, 3-4 kali per hari. Anak: 1/2 - 1 tablet, 3-4 kali sehari.

Kegunaan = rasa sakit termasuk sakit kepala, gigi, demam disertai *influenza* dan demam setelah imunisasi.

ESO = reaksi hemotologi, reaksi kulit & reaksi alergi lainnya; kerusakan hati (penggunaan jangka lama dan overdosis).

KI = hipersensitivitas, gangguan fungsi hati berat dan ginjal.

		PERHATIAN = HARUS DENGAN RESEP DOKTER Cara penyimpanan = Simpan Sanmol pada suhu di bawah 25° Celsius, ditempat yang kering dan lembab serta hindarkan dari paparan sinar matahari langsung. **2. Nama obat = Mefinal** Kandungan = Asam mefenamat 500 mg Dosis Lazim = Dewasa dan anak usia >14 tahun: Dosis awal 500 mg, kemudian 250 mg setiap 6 jam. Anak usia >6 bulan: 3–6,5 mg/kgBB setiap 6 jam. Kegunaan = Nyeri pada kondisi rematik, cedera jaringan lunak, kondisi muskuloskeletal menyakitkan lainnya, dismenorea, sakit kepala, sakit gigi, nyeri pasca operasi. ESO = Nyeri dada, lelah, napas pendek, dan kurang jelas berbicara. Muncul masalah dengan penglihatan atau keseimbangan tubuh. Tinja berwarna hitam, berdarah, batuk berdarah, atau muntah seperti bubuk kopi. KI = Orang yang memiliki volume darah rendah atau hipovolemia. PERHATIAN = HARUS DENGAN RESEP DOKTER Cara penyimpanan = impan Mefinal pada suhu dibawah 30 derajat Celcius, di tempat yang sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak. **3. Nama obat = Ranitidin** Kandungan = Ranitidin HCl 150 mg Dosis Lazim = 300 mg 1 kali sehari dikonsumsi sebelum tidur atau 150 mg 2 kali sehari, setidaknya selama 4 minggu. Kegunaan = menghambat produksi asam lambung. ESO = Sakit kepala,Sembelit,Diare,Mual,Muntah,Sakit perut KI = Tidak dianjurkan untuk orang yang memiliki riwayat atau mengalami porfiria akut PERHATIAN = HARUS DENGAN RESEP DOKTER Cara penyimpanan = dalam wadah tertutup rapat, tahan cahaya, dan pada suhu ruangan, antara 20°C dan 25°C (68°F hingga 77°F). **4. Nama Obat = Ondansetron** Kandungan = ondansetron hcl dihydrate 4 mg; 8 mg Dosis Lazim = ○ **Dewasa:** Mual dan muntah akibat kemoterapi: 8 mg, 30 menit sebelum kemoterapi, dapat diulang setiap 8 jam jika diperlukan. Mual dan muntah pascaoperasi: 16 mg sekali sebelum anestesi ○ **Anak-anak:** Dosis disesuaikan berdasarkan berat badan dan usia, umumnya 0,15 mg/kg setiap 8 jam Kegunaan = mencegah serta mengobati mual dan muntah yang bisa disebabkan oleh efek samping kemoterapi, radioterapi, atau operasi. Efek samping (ESO) = Sakit kepala. • Sembelit. • Diare. • Mual.

		• Muntah. • Sakit perut. Kontraindikasi (KI) **=** Tidak dianjurkan untuk orang yang memiliki riwayat atau mengalami porfiria akut. Tidak dianjurkan untuk orang yang memiliki riwayat alergi terhadap kandungan obat tertentu. Perhatian = HARUS DENGAN RESEP DOKTER Cara penyimpanan = cara penyimpanan obat ini yang dianjurkan ialah pada suhu 4 derajat celsius jika ingin digunakan dalam jangka waktu 30 hari, dan -20 derajat celcius jika ingin digunakan dalam jangka waktu 60 hari atau lebih. Dengan dijaga stabilitas kandungan obatnya, maka efektifitas obat dalam mengatasi peningkatan asam lambung pun akan lebih optimal. **5. Nama Obat = Heptasan** Kandungan = Cyproheptadine Dosiz Lazim = Dewasa : 1-5 tablet per hari Dosis harus disesuaikan dan tidak melebihi 0,5 mg/kg/hari atau maksimal 32 mg/hari. Rasa kantuk, mulut kering. Gangguan koordinasi, eksitasi, gelisah, histeri, insomnia, konvulsi, halusinasi. Kegunaan = meredakan gejala alergi, seperti gatal, bentol di kulit, bersin-bersin, mata berair, atau pilek. Efek samping (ESO) = Rasa kantuk, mulut kering. Gangguan koordinasi, eksitasi, gelisah, histeri, insomnia, konvulsi, halusinasi. Mual, muntah, diare, retensi urin, konstipasi. Sakit kepala, anoreksia, gangguan penglihatan. PERHATIAN = Penderita hipertensi, hipertiroid, peningkatan tekanan intra okuler, penyakit kardiovaskuler dan pada penderita asma bronkial, kehamilan dan menyusui, Cara penyimpanan = Simpat di tempat yang kering dan terhindar dari sinar matahari langsung. **F. Tahap pembuatan** (R1) 1. Diambil Sanmol sebanyak 3 tablet, mefinal 2 tablet 2. Disiapkan Blender/ Mortir dan stamper 3. Gerus tablet ad homogen 4. Dilakukan pengayakan pada serbuk puyer yang sudah di haluskan 5. Disiapkan kertas puyer sesuai dengan nomero yang diminta bagi serbuk puyer hingga jumlah setara 6. Diberi etiket pada puyer 7. Dilakukan double cek kembali pada obat, pastikan sesuai dengan resep 8. Dilakukan KIE kepada pasien/ keluarga yang mewakili. g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal) (R2) 1. Diambil Ranitdin 2 tab, Ondansetron 4 tab, Heptasan 4 tab. 2. Disiapkan Blender/ Mortir dan stamper 3. Gerus tablet ad homogen 4. Dilakukan pengayakan pada serbuk puyer yang sudah di haluskan 5. Disiapkan kertas puyer sesuai dengan nomero yang diminta bagi serbuk puyer hingga jumlah setara

		6. Diberi etiket pada puyer 7. Dilakukan double cek kembali pada obat, pastikan sesuai dengan resep 8. Dilakukan KIE kepada pasien/ keluarga yang mewakili. g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal) Ket : P : pasien A : Apoteker A : atas nama anak rayfal hafiz putranto silahkan menuju ke loket 4 P : (duduk di tempat pengambilan obat) A: atas nama siapa bu ? (dengan wajah ramah) P : atas nama anak rayfal hafiz putranto saya ibunya bu. A : baik bu, mohon maaf sebelumnya bisa disebutkan tanggal lahirnya? P : 14/09/2022 A : baik, atas nama anak rayfal hafiz putranto ini mendapatkan puyer 2 ya ibu, yang pertama mendapatkan obat sanmol dan mefinal puyer ini untuk mengatasi keluhan demam pada anak ibu. Untuk cara minumnya cukup diminum 3 kali sehari sesudah makan bila demam saja ya bu. Lalu untuk puyer yang kedua mendapatkan obat ranitidin, ondansertron, heptasan puyer ini untuk mengatasi mual/ muntah pada anak ibu. Untuk cara minumnya diminum 3 kali sehari sebelum makan bila mual/ mutah saja, apabila sudah tidak mual/ muntah bisa untuk tidak meminumnya lagi. P : baik bu A : apakah ada yang ditanyakan lagi bu? P : sudah bu, tidak ada A : Baik bu, ini obatnya terima kasih semoga anaknya lekas sembuh P : Terima kasih A : sama – sama P : (pasien perlahan meninggalkan tempat pengambilan obat)

9.

Jenis Resep : Resep asli
Resep obat : Racikan
Jumlah obat dalam resep : ~~Polifarmasi~~
(~~>~~/Tidak
Pengulangan resep : -

Resep racikan anak 2

A. Skrining Administrasi

Nama Pasien :	Ada	Muhammad ihsan setiawan
Umur pasien :	Tidak ada	-
Berat Badan :	Tidak ada	-
Nama obat :	Ada	**R1** : paracetamol 80 mg, asmef 30 mg **R2** : tremenza 1/6 tab, ambroxol ¼ tab, dextamin ¼ tab.
Kekuatan :	Ada	**R1** : Paracetamol 500 mg, asmef 500 mg. **R2** : tremenza, ambroxol 30 mg, dextamin.
Bentuk sediaan :	Ada	Melakukan peracikan menjadi serbuk terbagi (pulvers)
Jumlah obat :	Ada	**R1** : paracetamol 500 mg : 8 mg x 10 = 1,6 → 2 tab Asmef 500 mg : 30 mg x 10 = 0,6 → 1 tab. **R2** : tremenza 1/6 x 10 = 1,6 tab → 2 tab Ambroxol ¼ x 10 = 2,5 tab → 3 tab Dextamine ¼ x 10 = 2,5 tab → 3 tab.
Duplikasi terapi :	Tidak ada	-
Aturan pakai :	Ada	**R1** : paracetamol, asam mefenamat S 3x 1 demam **R2** : tremenza, ambroxol. Dextamine S 3x 1 Bapil
Tanggal penulisan resep :	Ada	11-02-2025
Nama dokter :	Ada	Dr. Rizky putri purwanti

Surat ijin :	Tidak ada	-
Alamat dr. :	Tidak ada	-

B. Perhitungan perbekalan farmasi

(R1)

1. Paracetamol diambil sebnayak 1,6 tab →2 tab
2. Asam mefenamat diambil sebanyak 0,6 tab → 1 tab

(R2)

1. Tremenza diambil sebanyak 1,6 tab →2 tab
2. Ambroxol diambil sebanyak 2,5 tab →3 tab
3. Dextamine diambil sebanyak 2,5 tab →3 tab

C. Perhitungan biaya resep

(Harga sudah termasuk PPN 10%)

(R1)

1. Paracetamol 500 mg → harga pertablet Rp. 5.762, pada resep yang diminta adalah 2 tab sehingga 2x 5.762 = 11.524
2. Asam mefeamat 500 mg → harga per tablet Rp. 681, pada resep yang diminta 1 tab sehingga 1 x 681= 681
3. TUS kertas puyer = 10 x 100 = 1.000
   TOTAL = Rp. 13.205

(R2)

1. Tremenza → harga per tablet Rp. 2.377, pada resep yang diminta 2 tab sehingga 2x 2.377 =4.754
2. Ambroxol 30 mg → harga per tablet Rp. 9,86 pada resep yang diminta 3 tab sehigga 3x 9,86 = 2.958
3. Dextamine →harga per tablet Rp. 2.415, pada resep yang diminta 3 tab sehingga 3x 2.415 = 7.245
4. TUS kertas puyer = 10 x 100 = 1.000
   TOTAL = Rp. 15.957

D. Etiket





E. Product Knowledge

1. Nama Obat = Paracetmol

Kandungan = acetaminophen

Dosis Lazim = Dewasa: 500–1.000 mg, diberikan setiap 4–6 jam sekali. Dosis maksimal 4.000 mg per hari. Pada anak-anak, paracetamol oral dapat diberikan setiap 4–6 jam sekali dengan dosis maksimal 4 kali sehari.

Kegunaan = meredakan rasa nyeri dan menurunkan demam.

Efek samping (ESO) = Sakit Kepala.

- Nyeri Otot.
- Memburuknya Fungsi Hati.
- Mual.

Kontraindikasi = Kontraindikasi paracetamol adalah pada pasien dengan riwayat hipersensitivitas dan penyakit hepar aktif derajat berat.

PERHATIAN =

–Hati-hati penggunaan obat ini pada penderita penyakit ginjal

– Bila setelah 2 hari demam tidak menurun atau setelah 5 hari nyeri tidak menghilang, segera hubungi Unit Pelayanan Kesehatan

– Penggunaan obat ini pada penderita yang mengkonsumsi alkohol, dapat meningkatkan resiko kerusakan fungsi hati.

Cara penyimpanan = Simpan pada suhu dibawah 30 C dan terlindung dari Cahaya.

		2. Nama obat = Asam Mefenamat Kandungan = Asam 2-(2,3-dimetilfenil)aminobenzoat. Dosis Lazim = Dewasa dan anak >14 tahun : 3 x sehari 500 mg. Lansia : Mulailah dengan dosis yang lebih rendah dan durasi sesingkat mungkin. Kegunaan = Obat ini dapat digunakan untuk meredakan nyeri haid, sakit gigi, nyeri otot, sakit kepala, hingga nyeri yang timbul setelah operasi. Asam mefenamat juga bisa dimanfaatkan untuk mengurangi gejala radang sendi pada *osteoarthritis* atau *rheumatoid arthritis*. ESO = • Mengalami sariawan; • Sakit maag; • Mual dan muntah; • Diare; • Mengalami masalah pencernaan; • Munculnya ruam di kulit; • Terasa kelelahan dan mengantuk • Nafsu makan berkurang; Kontraindikasi = hipersensitivitas, riwayat ulkus peptikum atau perdarahan saluran cerna, reaksi alergi, dan penggunaan pada pasien yang menjalani coronary artery bypass graft (CABG). PERHATIAN = • Konsumsi setelah makan untuk mengurangi iritasi lambung • Penggunaan jangka panjang harus diawasi oleh dokter karena dapat memengaruhi fungsi ginjal dan hati • Hindari penggunaan lebih dari 7 hari kecuali atas anjuran dokter. Cara penyimpanan = Asam mefenamat merupakan senyawa obat yang rentan baik terhadap cahaya maupun udara atau kelembapan, sehingga penyimpanannya tidak lebih dari 30˚C dan terlindung dari cahaya. **3. Nama Obat = Tremenza** Kandungan **=** 60 mg pseudoephedrine HCl dan 2,5 mg triprolidine Dosis Lazim = Dewasa dan anak >12 tahun: 1 tablet, 3-4 kali sehari. Anak 6 - 12 tahun : 1/2 tablet, 3-4 kali sehari. Kegunaan = meredakan gejala batuk pilek, flu, dan rhinitis alergi, seperti hidung tersumbat, bersin-bersin, pilek, mata berair, dan tenggorokan gatal. ESO = • Pusing. • Kantuk atau malah sulit tidur. • Sakit kepala. • Sakit perut. • Sembelit.

		Kontraindikasi = Jangan gunakan obat ini jika memiliki riwayat alergi terhadap parasetamol, fenilefrin, klorfeniramin, atau bahan aktif lainnya dalam obat ini PERHATIAN = Tremenza adalah obat yang mengandung kombinasi triprolidine dan pseudoephedrine, digunakan untuk meredakan gejala flu dan alergi. Meskipun efektif, terdapat beberapa perhatian yang perlu diambil sebelum menggunakan obat ini untuk menghindari risiko efek samping dan komplikasi. Cara Penyimpanan = disimpan pada suhu ruangan, jauhkan dari cahaya langsung dan tempat yang lembap. Jangan menyimpan di kamar mandi atau membekukannya. **4. Nama Obat = Ambroxol** Kandungan = ambroxol hydrochloride. Dosis Lazim = Dewasa dan anak usia ≥12 tahun: Sediaan sirup atau tablet, dosis anjuran 30 mg 2–3 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan menjadi 60 mg 2 kali sehari jika diperlukan. Dosis maksimal 120 mg per hari Kegunaan = mengencerkan dahak. Obat ini dapat digunakan pada berbagai kondisi dengan batuk berdahak, termasuk batuk pilek (common cold), bronkitis, emfisema, atau bronkiektasis. ESO = • Mual dan muntah. • Perut terasa mulas dan diare. • Hipestesia (mati rasa). • Mulut dan tenggorokan terasa kering. • Rasa tidak nyaman di perut (dispepsia). Kontraindikasi = Memiliki riwayat reaksi alergi terhadap ambroxol atau zat lain dalam komposisi obat ini. Pasien dengan riwayat ulkus peptikum atau masalah gastrointestinal lainnya. Ambroxol harus digunakan dengan hati-hati karena dapat meningkatkan produksi lendir lambung. PERHATIAN = Ambroxol adalah obat yang digunakan sebagai ekspektoran untuk membantu meredakan batuk dengan meningkatkan sekresi dahak. Meskipun bermanfaat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan ambroxol untuk menghindari risiko efek samping dan komplikasi. Cara Penyimpanan = pada suhu di bawah 30 derajat Celsius, di tempat kering, dan sejuk. **5. Nama Obat = Dextamin** Kandungan = Dexamethasone (glukokortikoid) dan Dexchlorpheniramine Maleate Dosis Lazim = Dewasa: 5 ml dikonsumsi 3 kali sehari. Anak usia 6–11 tahun: 2,5 ml dikonsumsi 3 kali sehari. Kegunaan = meredakan pilek, urtikaria, rhinitis alergi, dermatitis, atau konjungtivitis akibat alergi. Dextamine mengandung dexamethasone yang dapat meredakan peradangan, dan dexchlorpheniramine yang dapat meredakan gejala alergi. ESO = • Rasa tidak enak di lambung. • Sulit tidur pada malam hari. • Pusing.

		• Sakit kepala. • Kantuk setelah minum **obat**. • Sembelit. • Penglihatan kabur. Kontraindikasi = Penggunaan Dextamine sebaiknya dihindari pada pasien dengan riwayat hipersensitif terhadap komponen yang terkandung dalam obat. Penderita penderita tukak lambung, TBC, dan infeksi berat juga tidak dianjurkan mengonsumsi obat ini. PERHATIAN = Gunakan obat sesuai dengan dosis yang telah ditentukan. Hindari menggandakan atau mengurangi dosis tanpa pengawasan medis. Beri tahu dokter jika kamu memiliki riwayat alergi terhadap kandungan obat tertentu. Cara penyimpanan = Simpan Dextamine pada suhu di bawah 30 derajat Celsius. F. Tahap Pembuatan (R1) 1. Diambil Paracetamol sebanyak 2 tab, asam mefenamat 1 tab 2. Disiapkan Blender/ Mortir dan stamper 3. Gerus tablet ad homogen 4. Dilakukan pengayakan pada serbuk puyer yang sudah di haluskan 5. Disiapkan kertas puyer sesuai dengan nomero yang diminta bagi serbuk puyer hingga jumlah setara 6. Diberi etiket pada puyer 7. Dilakukan double cek kembali pada obat, pastikan sesuai dengan resep 8. Dilakukan KIE kepada pasien/ keluarga yang mewakili. (R2) 1. Diambil Tremenza 2 tab, Ambroxol 3 tab, Dextamine 3 tab 2. Disiapkan Blender/ Mortir dan stamper 3. Gerus tablet ad homogen 4. Dilakukan pengayakan pada serbuk puyer yang sudah di haluskan 5. Disiapkan kertas puyer sesuai dengan nomero yang diminta bagi serbuk puyer hingga jumlah setara 6. Diberi etiket pada puyer 7. Dilakukan double cek kembali pada obat, pastikan sesuai dengan resep 8. Dilakukan KIE kepada pasien/ keluarga yang mewakili. **g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)** Ket : P : pasien A : Apoteker A : panggilan obat atas nama anak Muhammad Ihsan setiawan, silahkan menuju ke loket 4 P : (duduk di tempat pengambilan obat) A: atas nama siapa bu ? (dengan wajah ramah) P : atas nama anak Muhammad Ihsan setiawan saya ibunya bu.

		A : baik bu, mohon maaf sebelumnya bisa disebutkan tanggal lahirnya? P : 02-03-2024 A : baik, atas nama Muhammad Ihsan setiawan ini mendapatkan puyer 2 ya ibu, yang pertama mendapatkan obat paracetamol dan asam mefenamat puyer ini untuk mengatasi keluhan demam pada anak ibu. Untuk cara minumnya cukup diminum 3 kali sehari sesudah makan bila demam saja ya bu. Lalu untuk puyer yang kedua mendapatkan obat tremenza, ambroxol ,dan heptasan sediaan puyer ini untuk mengatasi batuk pilek pada anak ibu. Untuk cara minumnya diminum 3 kali sehari sesudah makan, apabila sudah tidak batuk pilek bisa untuk tidak meminumnya lagi. P : baik bu A : apakah ada yang ditanyakan lagi bu? P : sudah bu, tidak ada A : Baik bu, ini obatnya terima kasih semoga anaknya lekas sembuh P : Terima kasih A : sama – sama P : (pasien perlahan meninggalkan tempat pengambilan obat)

<table>
<tr><th>No</th><th>Resep</th><th>Tahapan Pengerjaan Resep</th></tr>
<tr><td>10.</td><td>Jenis Resep : Resep asli
Resep obat : non racikan
Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi
~~(>/Tidak~~
Pengulangan resep : -
Resep polifarmasi

</td><td>A. Skrinning Administrasi
<table><tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada</td><td>Eko Nurdiansyah, Tn</td></tr><tr><td>Umur pasien :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr><tr><td>Berat Badan :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr><tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada</td><td>R1 : Braxidin
R2 : Neurodex
R3 : Meloxicam
Sanexon
Diazepam
Eperisone</td></tr><tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada</td><td>R1 : Braxidin -
R2 : Neurodex -
R3 : Meloxicam 15 mg
Sanexon 4 mg
Diazepam 2 mg
Eperisone -</td></tr><tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada</td><td>R1 : Braxidin -
R2 : Neurodex -
R3 : Meloxicam 15 mg tab
Sanexon 4 mg tab
Diazepam 2 mg tab
Eperisone - tab</td></tr><tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada</td><td>R1 : Braxidin No. X
R2 : Neurodex No. X
R3 : (Dilakukan peracikan)
Meloxicam 15 mg ½ tab → ½ tab x 10 → 5 tab
Sanexon 4 mg tab 1 tab → 1 tab x 10 → 10 tab
Diazepam 2 mg tab ½ tab → ½ tab x 10 → 5 tab
Eperisone tab ½ tab → ½ tab x 10 →5 tab
(caps No. X)</td></tr><tr><td>Duplikasi terapi</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr><tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada</td><td>R1 : Braxidin</td></tr></table></td></tr>
</table>

				S 2X1 **R2** : Neurodex S 1x1 **R3** : (Racikan Kapsul) Meloxicam 15 mg tab Sanexon 4 mg tab Diazepam 2 mg tab Eperisone tab S 2x1 Jika nyeri
			Tanggal penulisan resep :	Ada	12-03-2025
			Nama dokter :	Ada	Dr. M Fakhrudin Fakhry, Sp.PD
			Surat ijin :	Tidak Ada	-
			Alamat dr. :	Tidak Ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R1 : Braxidin → 10 tab
R2 : Neurodex → 10 tab
R3 : (Dilakukan peracikan)
Meloxicam 15 mg ½ tab → ½ tab x 10 → 5 tab
Sanexon 4 mg tab 1 tab → 1 tab x 10 → 10 tab
Diazepam 2 mg tab ½ tab → ½ tab x 10 → 5 tab
Eperisone tab ½ tab → ½ tab x 10 →5 tab

C. Perhitungan biaya resep

R1 : Braxidin → Harga per tablet adalah Rp. 4.500 , jumlah obat dalam resep yaitu 10 tab, sehingga → Rp. 4.500 x 10 tab = Rp. 45.000
R2 : Neurodex → Harga pertablet adalah Rp. 600, jumlah obat dalam resep yaitu 10 tab, sehingga → Rp. 600 x 10 tab = Rp. 6000
R3 : (Dilakukan peracikan)
Meloxicam 15 mg → 5 tab, maka 5 tab x Rp. 700 (hara pertablet)= Rp. 7000

Sanexon 4 mg → 10 tab, maka 10 tab x Rp. 3.500 (harga pertablet) = Rp. 35.000
Diazepam 2 mg → 5 tab, maka 5 tab x Rp. 127 (harga pertablet) = Rp. 635
Eperisone →5 tab. Maka 5 tab x Rp. 2000 (harga obat pertablet) = Rp. 10000
Kapsul kosong → 10 capsul, maka 10 caps x 100 (harga perkapsul) = 1000
Total biaya resep yang harus di bayar pasien adalah Rp. 104.635

d. ETIKET

Braxidin

Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur | Transparan | Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 | P: +62 31 3981275 F: +62 31 3945459

Nama : Eko Nurdiansyah, Tn TGL : 11/02/2025
No. RM : ED 05/04/26
Tgl. Lahir :
2 X 1 sehari
Sesudah makan

Neurodex

Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur | Transparan | Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 | P: +62 31 3981275 F: +62 31 3945459

Nama : Eko Nurdiansyah, Tn TGL : 11/02/2025
No. RM : ED 04/01/27
Tgl. Lahir :
2 X 1 sehari
Sesudah makan

Racikan kapsul

Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur | Transparan | Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 | P: +62 31 3981275 F: +62 31 3945459

Nama : Eko Nurdiansyah, Tn TGL : 11/02/2025
No. RM : ED 30/02/26
Tgl. Lahir :
2 X 1 sehari
Sesudah makan (bila nyeri)

		e. *Product knowledge* 1. Nama Obat : Braxidin Kandungan : Chlordiazepoxide-clidnium Dosis lazim : 1 tablet, 3-4 kali sehari Kegunaan : Meredakan kram perut akibat gangguan pencernaan, seperti sindrom iritasi usus besar, tukak lambung, dispepsia, atau radang usus. Mengurangi kram perut saat menstruasi. ESO potensial : Mual, perut kembung, sebelit atau konstipasi, mata kering, pusing, lemas atau lelah. KI : Hamil, laktasi, gangguan fungsi hati berat, riwayat iketrus idiopatik atau pruritus selama hamil, sindrom rotor, tumor hati, anemia sel sabit, dalam pengobatan kanker payudara, dan DM berat. PERHATIAN : Obat dalam kategori ini tidak boleh dikonsumsi wanita yang sedang hamil atau memiliki kemungkinan untuk hamil dan ibu menyusui. Cara penyimpanan : Simpan di tempat bersuhu ruangan. Jangan menyimpannya di tempat yang lembab dan panas, jauhkan obat dari jangkauan anak-anak. 2. Nama Obat : Neurodex Kandungan : Vitamin B1, Vitamin B6, dan Vitamin B12 Dosis lazim : Sehari 1 kali 1 tablet Kegunaan : Mengatasi gejala gangguan saraf tepi akibat kekurangan Vit B1, Vit B6, dan Vit B12 ESO potensial : Mual atau muntah, diare, pusing, kantuk, kesemutan pada tangan atau kaki KI : anemia atau gangguan sistem pencernaan, seperti radang usus, divertikulitis, atau gangguan pankreas. PERHATIAN : Jangan memberikan neurodex kepada anak tanpa berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu Cara penyimpanan : Simpan pada tempat yang kering dan sejuk, jangan disimpan pada tempat yang lembab atau terkena sinar matahari langsung, serta jaukan dari jangkauan anak-anak. 3. Nama Obat : Meloxicam 15 mg Kandungan : Meloxicam 15 mg Dosis lazim : sehari 1 kali 1 tablet Kegunaan : Meredakan nyeri dan gejala radang pada beberapa kondisi, seperti radang sendi ESO potensial : Mual atau muntah, diare, pusing atau vertigo, dan perut kembung. KI : pendarahan saluran cerna, tukak lambung, maag, asam lambung, hipertensi, penyakit jantung, liver, asma, polip hidung, gagguan pembekuan darah atau poliderma. PERHATIAN : Tidak boleh dibeli tanpa resep dokter, Tidak boleh diberikan pada pasien yang akan atau baru saja menjalani operasi atau bedah. Cara penyimpanan : Simpan pada tempat yang kering dan sejuk, jangan disimpan pada tempat yang lembab atau terkena sinar matahari langsung, serta jaukan dari jangkauan anak-anak.

		4. Nama Obat : Sanexone 4 mg Kandungan : Methylprednisolone 4 mg Dosis lazim : 4-8 mg perhari atau 1;2 kali sehari 1 tablet Kegunaan : Mengatasi alergi dan menguangi peradangan atau supresi inflamasi ESO potensial : tukak lambung, katarak subkapsular, atrofi kulit, jerawat, kelemahan otot, retardasi pertumbuhan, penurunan K darah KI : Infeksi jamur sistemik kecuali terapi antiinfeksi spesifik digunakan; Admin IM pada purpura trombositopenik idiopatik. Admin intratekal. Pemberian vaksin hidup atau hidup yang dilemahkan secara bersamaan (pada pasien yang menerima dosis imunosupresif). PERHATIAN : Hati-hati pada Pasien dg gagal jantung, hipertensi, DM, penyakit GI (misalnya divertikulitis, anastomosis usus, tukak lambung, kolitis ulserativa), sklerosis multipel, miastenia gravis, infark miokard akut, katarak, glaukoma, osteoporosis, riwayat gangguan kejang, penyakit tiroid. Hindari perubahan dosis mendadak. Gangguan ginjal dan hati (termasuk sirosis). Anak. Kehamilan dan menyusui Cara penyimpanan : Simpan pada tempat yang kering dan sejuk, jangan disimpan pada tempat yang lembab atau terkena sinar matahari langsung, serta jaukan dari jangkauan anak-anak. 5. Nama Obat : Diazepam Kandungan : Vitamin B1, Vitamin B6, dan Vitamin B12 Dosis lazim : Sehari 1 kali 1 tablet Kegunaan : Mengatasi gejala gangguan saraf tepi akibat kekurangan Vit B1, Vit B6, dan Vit B12 ESO potensial : Mual atau muntah, diare, pusing, kantuk, kesemutan pada tangan atau kaki oi8 KI : anemia atau gangguan sistem pencernaan, seperti radang usus, divertikulitis, atau gangguan pankreas. PERHATIAN : Jangan memberikan neurodex kepada anak tanpa berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu Cara penyimpanan : Simpan pada tempat yang kering dan sejuk, jangan disimpan pada tempat yang lembab atau terkena sinar matahari langsung, serta jaukan dari jangkauan anak-anak. 6. Nama Obat : Eperisone Kandungan : Eperisone HCl 50 mg Dosis lazim : Sehari 3 kali 1 tablet Kegunaan : Untuk pengobatan simtomatik pada kondisi yang berhubungan dengan spasme muskuloskeletal ESO potensial : Lemah, pusing, insomia, mengantuk, rasa kebas atau gemetar pada ekstremitas, gangguan fungsi hati dan ginjal, dan ruam kulit. KI : Ibu menyusui, keadaan melemahnya oto tubuh akibat gangguan pada saraf dan otot (Myasthenia

		gravis). PERHATIAN : Harus denga resep dokter, gangguan hati, kehamilan, dan lanjut usia. f. Tahap pembuatan R1 : 1. Diambil Braxidin sebanyak 10 tab pada rak penyimpanan obat 2. Diberikan etiket putih pada obat sesuai dengan aturan pakai pada resep dokter 3. Dimasukkan kedalam plastik R2 : 1. Diambil Neurodex sebanyak 10 tab pada rak penyimpanan obat 2. Diberikan etiket putih pada obat sesuai dengan aturan pakai pada resep dokter 3. Dimasukkan kedalam plastik R3 : 1. Dihitung dosis dan kebutuhan obat pada resep racikan 2. Diambil obat pada rak obat sesuai dengan nama obat, kekuata obat, dan jumlah yang dibutuhkan dalam resep 3. Obat di gerus hingga halus dan homongen 4. Disiapkan cangkang kapsul sebanyak 10 cangkang kapsul 5. Obat di bagi merata dalam 10 kapsul yang telah disiapkan 6. Ditutup cangkang kapsul hingga rapat 7. Di hitung kembali jumlah kapsul 8. Jika jumlah sudah sesuai dengan permintaan reserp maka dimasukkan kapsul dalam plastik klip 9. Diberikan etiket putih sesuai dengan aturan pakai pada resep doker 10. g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal) Ket : P : Pasien dan A : Apoteker A : Atas nama bapak Eko Nurdiansyah silahkan menuju loket 4 (loket penerimaan obat) P : (duduk di tempat pengambilan obat) A : Atas nama siapa pak? (dengan wajah ramah) P : Atas nama bapak Eko Nurdiansyah A : Mohon maaf pak, bisa disebutkan tanggal lahir nya? P : 31 Januari 1996 Bu A : iya bapak, jadi ini dapat tiga macam obat, ini ada obat braxidin untuk nyeri perutnya diminum sehari dua kali satu tablet setelah makan, obat Neurodex untuk Vitamin tambahan ya pak diminum sehari sekali setelah makan dan kapsulnya ini untuk nyeri otot akibat peradangan diminum sehari 2 kali satu kapsul setelah makan. Semua obat diminum setelah makan ya pak.

		P : Baik Bu. A : Obat ini ada efek samping mual, pusing, kantuk, dan lemes ya pak, nanti kalau efek sampingnya menganggu aktivitas bapak silahkan konsultasi kembali dengan dokter B : baik bu A : Apakah ada yang ditanyakan pak ? P : Sudah tidak ada Bu A : Baik semoga sehat selalu Bu (sambil senyum) P : Terima Kasih Bu A : Sama-sama.

<table>
<tr><th>No</th><th>Resep</th><th>Tahapan Pengerjaan Resep</th></tr>
<tr><td>11</td><td>Jenis Resep : ~~Salinan~~/Resep asli
Resep obat : Racikan/~~non racikan~~
Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi
Pengulangan resep : ~~Iter~~... ~~kali~~/Neiter
Resep Polifarmasi
 </td><td>A. Skrinning Administrasi
<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>An. Arsyila Azzahra A.</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>~~Ada~~/Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>10.8kg</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>R/ (1)
Sanmol
As. Mefenamat
R/ (2)
Ambroxol
Salbutamol
Tremenza
Dextamin
Cetirizin
R/ (3)
Cefixime</td></tr>
<tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>R/ (1)
Sanmol : 120 mg
R/ (2)
As. Mefenamat : 60 mg
Ambroxol : 4 mg
Salbutamol : 0,6 mg
Cetirizin : 2 mg
R/ (3)
Cefixime : 35 mg</td></tr>
<tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>Seluruh obat dalam bentuk tablet kemudian akan dilakukan peracikan menjadi serbuk terbagi (pulveres)</td></tr>
<tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>R/ (1)
• Sanmol = 120 mg x 15 : 500 mg = 3,6 tab
• As mefenamat 60 mg x 15 : 500 mg = 1,8 tab
R/ (2)
• Ambroxol = 4 mg x 15 : 30 mg = 2 tab
• Salbutamol = 0,6 mg x 15 : 4 mg = 2,25 tab
• Tremenza 1/5 tab = 1/5 x 15 = 3 tab
• Dextamin 1/3 tab = 1/3 x 15 = 5 tab
• Cetirizin : 2 mg x 15 : 10 mg = 3 tab
R/ (3)</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		• Cefixime = 35 mg x 10 : 100 mg = 3,5 tab
Duplikasi terapi :	~~Ada~~/Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada/~~Tidak Ada~~	R/ (1) : 3 x sehari R/ (2) : 3 x sehari R/ (3) : 2 x sehari
Tanggal penulisan resep :	Ada/~~Tidak Ada~~	10 Feruari 2025
Nama dokter :	Ada/~~Tidak Ada~~	dr. Arif Fakhruddin, Sp. A
Surat ijin :	~~Ada~~/Tidak Ada	-
Alamat dr. :	~~Ada~~/Tidak Ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ (1)
- Sanmol = 120 mg x 15 : 500 mg = 3,6 tab
- As mefenamat 60 mg x 15 : 500 mg = 1,8 tab

R/ (2)
- Ambroxol = 4 mg x 15 : 30 mg = 2 tab
- Salbutamol = 0,6 mg x 15 : 4 mg = 2,25 tab
- Tremenza 1/5 tab = 1/5 x 15 = 3 tab
- Dextamin 1/3 tab = 1/3 x 15 = 5 tab
- Cetirizin : 2 mg x 15 : 10 mg = 3 tab

R/ (3)
- Cefixime = 35 mg x 10 : 100 mg = 3,5 tab

- Kertas puyer = 15 + 15 + 10 = 40 pcs

		c. Perhitungan biaya resep R/ (1) Sanmol : Rp 1.450/tablet x 4 tab = Rp 5.800 As Mefenamat : Rp 371,00/ tablet x 2 tab = Rp 742 R/ (2) Ambroxol : Rp 439/ tablet x 2 tab = Rp 878 Salbutamol : Rp 237/tablet x 3 tab = Rp 711 Tremenza : Rp 2.377/tablet x 3 tab = Rp 7.131 Dextamin : Rp 2.415 / tablet x 5 tab = Rp 12.075 Cetirizne : Rp 552 / tablet x 3 tab = Rp 1.656 R/ (3) Cefixime : Rp 1.375 / tablet x 4 tab = Rp 5.500 Kertas puyer : Rp 100 / pcs x 40 pcs = Rp 4.000 Total biaya : Rp 38.493

d. ETIKET

Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur| Transparan | Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 | P: +62 31 3981275 |F: +62 31 3945459

Nama: An. Arsyila Azzahra A. TGL: 10/02/25
No.RM: [redacted] ED:
10/03/2025
Tgl.Lahir: 2022-10-08

(PANAS)

3 x sehari 1 biji
Sesudah makan

Kesembuhan dari ALLAH SWT
Berdoalah sebelum minum obat

Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur| Transparan | Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 | P: +62 31 3981275 |F: +62 31 3945459

Nama: An. Arsyila Azzahra A. TGL: 10/02/25
No.RM: [redacted] ED:
10/03/2025
Tgl.Lahir: 2022-10-08

(BAPIL)

3 x sehari 1 biji
Sesudah makan

Kesembuhan dari ALLAH SWT
Berdoalah sebelum minum obat

Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur | Transparan |Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 | P: +62 31 3981275 |F: +62 31 3945459

Nama: An. Arsyila Azzahra A. TGL: 10/02/25
No.RM: [redacted] ED:
10/03/2025
Tgl.Lahir: 2022-10-08

ANTIBIOTIK, Diminum TERATUR
SAMPAI HABIS

2 x sehari 1 biji
Sesudah makan

e. *Product knowledge*

Nama Obat : Sanmol **Kandungan :** Paracetamol 500 mg **Dosis lazim :** Dewasa: 1 tablet, 3–4 kali sehari. Anak usia 6–12 tahun: ½–1 tablet, 3–4 kali sehari. **Kegunaan :** Meredakan demam dan nyeri **ESO potensial :** Memar atau perdarahan yang tidak biasa, perut bagian atas kanan terasa sakit, hilang nafsu makan, urine berwarna gelap **KI :** Penderita gangguan fungsi hati yang berat. Hipersensitivitas terhadap paracetamol. **PERHATIAN :** Sanmol sediaan oral dapat digunakan bila perlu untuk mengatasi demam dan nyeri ringan hingga sedang. Apabila gejala yang dirasakan telah hilang, penggunaan obat dapat dihentikan. Namun bila gejala tidak berkurang dalam 2-3 hari, segera konsultasikan kepada dokter. **Cara penyimpanan :** Simpan Sanmol pada suhu di bawah 25° Celsius, ditempat yang kering dan lembab serta hindarkan dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan.	**Nama Obat :** Asam Mefenamat **Kandungan :** Asam mefenamat 500 mg **Dosis lazim :** Dosis asam mefenamat untuk orang dewasa dan anak usia ≥14 penggunaan untuk meredakan nyeri akut, seperti sakit gigi; atau nyeri akibat radang sendi, dosis awal 500 mg, lalu dilanjutkan dengan 250 mg tiap 6 jam, selama dibutuhkan. Lama pengobatan maksimal 7 hari. Meringankan nyeri haid : dosis awal 500 mg, lalu dilanjutkan dengan 250 mg tiap 6 jam, selama dibutuhkan. Asam mefenamat dikonsumsi sejak hari pertama haid. Lama pengobatan biasanya tidak lebih dari 3 hari. **Kegunaan :** Meredakan nyeri akut, seperti sakit gigi; atau nyeri akibat radang sendi, seperti *osteoarthritis* dan *rheumatoid arthritis.* Meringankan nyeri haid **ESO potensial :** Perut kembung, nyeri ulu hati atau rasa panas di dada (*heartburn*)al dan muntah, diare **KI :** Hipersensitivitas. Pasien dengan aktif atau riwayat tukak/perdarahan peptikum berulang, riwayat perdarahan gastrointestinal atau perforasi (terkait dengan terapi NSAID sebelumnya), penyakit radang usus, gagal jantung berat, riwayat asma, bronkospasme, rinitis, angioedema, urtikaria, atau tipe alergi reaksi setelah minum aspirin atau NSAID lainnya. **PERHATIAN :** Obat Wajib Apotek, Obat ini dapat dibeli dan diserahkan apoteker tanpa resep dengan maksimum 2 Strip. Pembelian melebihi batas ini WAJIB RESEP DOKTER. Hati-hati penggunaan pada pasien dengan faktor risiko kejadian KV (misalnya hipertensi,

			hiperlipidemia, diabetes mellitus, merokok), gagal jantung ringan hingga sedang, hipovolemia, dehidrasi, Pasien yang lemah, gangguan ginjal dan hati, lansia, Ibu hamil (trimester 1-2) dan menyusui. **Cara penyimpanan :** Simpan Asam Mefenamat pada suhu di bawah 25° Celsius, ditempat yang kering dan lembab serta hindarkan dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan.
		Nama Obat : Ambroxol **Kandungan :** Ambroxol 30 mg **Dosis lazim :** Dewasa dan anak usia di atas 12 tahun: 1 tablet, 2-3 kali sehari. Anak usia 6-12 tahun: ½ tablet, 2-3 kali sehari. **Kegunaan :** Mengatasi batuk berdahak dan gangguan pernapasan lain akibat produksi dahak yang berlebihan, seperti pada penyakit bronkiektasis. **ESO potensial :** Mual dan muntah, diare, sakit maag, perut kembung, ruam merah pada kulit, bibir atau tenggorokan kering **KI :** Hipersensitivitas **PERHATIAN :** Harus dengan resep dokter. Hati-hati penggunaan pada pasien dengan tukak lambung atau duodenum, diskinesia silia, dan kondisi bronkial, gangguan ginjal dan hati. **Cara penyimpanan :** Simpan obat ini pada suhu di bawah 30 C. Usahakan tempat penyimpanan harus sejuk, kering, tidak terkena paparan sinar matahari langsung, dan yang terpenting jauh dari jangkauan anak-anak.	**Nama Obat :** Salbutamol **Kandungan :** Salbutamol sulfat 4 mg **Dosis lazim :** Dewasa dan anak usia >12 tahun: 2-4 mg (1-2 tablet), 3-4 kali sehari. Dosis bisa ditingkatkan sampai dosis maksimal 8 mg (4 tablet), 3-4 kali sehari. Anak usia 6-12 tahun: 2 mg (1 tablet), 3-4 kali sehari. Anak usia 2-6 tahun: 1-2 mg (0,5-1 tablet), 3-4 kali sehari. **Kegunaan :** Mengatasi sesak napas akibat penyempitan saluran udara di paru-paru (bronkospasme). **ESO potensial :** Jantung berdebar atau denyut jantung tidak teratur. Tungkai, lengan, tangan, atau kaki gemetaran. Sakit kepala. Nyeri atau kram otot Cemas, gugup, dan berkeringat **KI :** Hipersensitif salbutamol **PERHATIAN :** Jangan menggunakan salbutamol jika Anda alergi terhadap obat ini dan obat golongan beta2-agonist lainnya, seperti terbutaline. Beri tahu dokter bila Anda sedang menggunakan obat-obatan lain, termasuk vitamin, suplemen, atau produk herbal. **Cara penyimpanan :** Simpan Salbutamol 4 mg dalam kemasannya, di tempat yang tidak terkena paparan cahaya matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak.

		Nama Obat : Tremenza **Kandungan :** Tiap tablet Tremenza mengandung 60 mg pseudoephedrine HCl dan 2,5 mg triprolidine. **Dosis lazim :** Dewasa dan anak usia >12 tahun: 1 tablet, 3–4 kali sehari. Anak usia 6–12 tahun: ½ tablet, 3–4 kali sehari. **Kegunaan :** Meredakan gejala batuk pilek, flu, dan rhinitis alergi, seperti hidung tersumbat, bersin-bersin, pilek, mata berair, dan tenggorokan gatal. ESO potensial : Mulut kering, hidung terasa kering, atau tenggorokan kering, pusing, kantuk atau malah sulit tidur **KI :** Jangan gunakan obat ini jika memiliki riwayat alergi terhadap parasetamol, fenilefrin, klorfeniramin, atau bahan aktif lainnya dalam obat ini. Obat ini bisa meningkatkan tekanan pada mata, yang dapat memperburuk kondisi pasien dengan glaukoma sudut tertutup. Tidak dianjurkan bagi mereka yang memiliki penyakit jantung koroner atau hipertensi berat. **PERHATIAN :** Pengidap gangguan ginjal atau masalah fungsi hati wajib berkonsultasiterlebih dahulu dengan dokter sebelum menggunakan tremenza. Sebab, kandungan di dalamnya dikhawatirkan bisa memperburuk penyakit yang sudah ada. Kandungan dalam tremenza bisa meningkatkan tekanan darah, sehingga harus dihindari atau digunakan dengan hati-hati pada pasien dengan hipertensi atau penyakit jantung. **Cara penyimpanan :** Simpan Tremenza pada suhu di bawah 25° Celsius, ditempat yang kering dan lembab serta hindarkan dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan.	**Nama Obat :** Dextamin **Kandungan :** Dexamethasone 0,5 mg, dexchlorpheniramine maleate 2 mg per kaplet **Dosis lazim :** Dewasa: 1 kaplet dikonsumsi 3 kali sehari. Anak usia 6–11 tahun: ½ kaplet dikonsumsi 3 kali sehari, **Kegunaan :** Meredakan gejala alergi yang disertai peradangan **ESO potensial :** Nyeri ul hati, rasa tidak enak di lambung, sulit tidur pada malam hari, pusing **KI :** Hiprsensitif **PERHATIAN :** Harus dengan resep dokter. Hati-hati pada penderita gagal jantung kongestif, hipertensi, diabetes melitus, infeksi, gagal ginjal kronik **Cara penyimpanan :** Simpan Dextamin pada suhu di bawah 25° Celsius, ditempat yang kering dan lembab serta hindarkan dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan.
		Nama Obat : Cetirizin	**Nama Obat :** Cefixime

		Kandungan : Cetirizine hydrochloride 10 Mg **Dosis lazim :** Dewasa dan anak-anak lebih dari 6 tahun: 5–10 mg sekali sehari. Anak-anak usia 2¬–6 tahun: 2,5 mg sekali sehari. Dosis dapat ditingkatkan oleh dokter menjadi 5 mg sekali sehari, atau 2,5 mg 2 kali sehari. **Kegunaan :** Mengatasi gejala rinitis alergi, rinitis perennial atau rinitis alergi yang bersifat kronis, dan urtikaria atau biduran. **ESO potensial** : Kantuk, pusing atau sakit kepala, mulut kering, sakit perut, diare **KI :** Hipersensitif, gangguan ginjal berat **PERHATIAN :** Jangan memberikan Cetirizine HCL Tablet Salut Selaput 10 Tablet 10 Mg pada anak-anak usia kurang dari 6 tahun tanpa berkonsultasi dengan dokter, konsultasikan dengan dokter sebelum menggunakan Cetirizine HCL Tablet Salut Selaput 10 Tablet 10 Mg , jika Anda sedang hamil, menyusui, atau sedang merencanakan kehamilan. **Cara penyimpanan :** Simpan Cetirizine pada suhu di bawah 25° Celsius, ditempat yang kering dan lembab serta hindarkan dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan.	**Kandungan :** Cefixime 100 mg **Dosis lazim :** Gonore tanpa komplikasi : Dewasa: 400 mg sebagai dosis tunggal. Infeksi saluran pernapasan : Dewasa dan anak usia >10 tahun dengan BB>50 kg: 200–400 mg dibagi dalam 1–2 jadwal konsumsi. Lama pengobatan 7–14 hari. Anak usia 6 bulan hingga 10 tahun dengan BB <50 kg: 8 mg/kgBB per hari. Lama pengobatan 7–14 hari. **Kegunaan :** Jenis infeksi bakteri yang dapat diobati dengan cefixime antara lain infeksi saluran pernapasan, infeksi tenggorokan dan amandel, infeksi telinga, infeksi saluran kemih, dan infeksi menular seksual. **ESO potensial :** Sakit kepala atau pusing, sakit maag atau sakit perut, mual, perut kembung, diare **KI :** Pasien dengan riwayat syok atau hipersensitif terhadap beberapa bahan obat ini. **PERHATIAN :** Harus dengan resep dokter. Hati-hati terhadap reaksi hipersensitif karena reaksi seperti syok dapat terjadi **Cara penyimpanan :** Simpan Cefixime pada suhu di bawah 25° Celsius, ditempat yang kering dan lembab serta hindarkan dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan.

		f. Tahap pembuatan 1. Dilakukan pemeriksaan resep yang sudah diterima (identitas pasien, nama dan kekuatan obat, jumlah obat). 2. Dilakukan perhitungan pengambilan obat 3. Diambil Sanmol sebanyak 3,6 tab, As mefenamat sebanyak 1,8 tab, Ambroxol sebanyak 2 tab, Salbutamol sebanyak 2,25 tab, Tremenza sebanyak 3 tab, Dextamin 1 sebanyak 5 tab, Cetirizin sebanyak 3 tab, Cefixime sebanyak 3,5 tab 4. Digerus obat sanmol dan as mefenamat yang telah diambil, kemudian dimasukkan ke dalam kertas puyer dengan cara dibagi menjadi 15 puyer. Diberi etiket putih "An. Arsyila A. obat panas 3 x sehari 1 biji sesudah makan" tanggal penyiapan obat, tanggal kadaluarsa, dan ditempel stiker identitas pasien, serta dimasukkan ke dalam plastik klip. 5. Digerus ambroxol, salbutamol, tremenza, dextamin, dan cetirizine yang telah diambil, kemudian dimasukkan ke dalam kertas puyer dengan cara dibagi menjadi 15 puyer. Diberi etiket putih "An. Arsyila A. obat batuk pilek 3 x sehari 1 biji sesudah makan" tanggal penyiapan obat, tanggal kadaluarsa, dan ditempel stiker identitas pasien, serta dimasukkan ke dalam plastik klip. 6. Digerus cefixime yang telah diambil, kemudian dimasukkan ke dalam kertas puyer dengan cara dibagi menjadi 10 puyer. Diberi etiket putih "An. Arsyila A. obat antibiotik harus habis 2 x sehari 1 biji sesudah makan" tanggal penyiapan obat, tanggal kadaluarsa, dan ditempel stiker identitas pasien, serta dimasukkan ke dalam plastik klip. 7. Dilakukan *double check* dan diserahkan kepada pasien serta dilakukan KIE.

		g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal) A : Apoteker P : Pasien A : "Atas nama An. Arsyila, loket 4" (Pasien datang) A : "Atas nama siapa, Ibu?" (sembari tersenyum) P : "An. Arsyila" A: "Baik, dari dokter anak ya, Bu?" P : "Iya" (Pasien mengangguk). A: "Baik, tanggal lahirnya?" P : "8 Oktober 2022" A: "Baik, An. Arsyila mendapatkan tiga obat. Obat panasnya diminum 3 x sehari 1 puyer sesudah makan, obat batuk pileknya 3 x sehari juga 1 puyer sesudah makan, dan obat antibiotik harus habis ya, diminum 2 x sehari sesudah makan." (TVF menunjukkan masing-masing obatnya) P : "Oke, terima kasih" A: "Ada yang ditanyakan?" P : "Tidak." A : "Baik, silahkan tandatangan dan nama terang ya, di sini" (TVF menunjukkan tempat tandatangan) A : "Semoga lekas sembuh" (Obat diserahkan ke pasien)

<table>
<tr><th>No</th><th>Resep</th><th>Tahapan Pengerjaan Resep</th></tr>
<tr><td>12</td><td>Jenis Resep : ~~Salinan~~/Resep asli
Resep obat : ~~Racikan~~/non racikan
Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi
Pengulangan resep : ~~Iter~~ ....~~kali~~/Neiter
Resep Polifarmasi

</td><td>A. Skrinning Administrasi<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>Tn. Dharmawan Tri H.</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>~~Ada~~/Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>~~Ada~~/Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>Bisoprolol tab
Fenofibrat tab
Furosemide tab
Amlodipine tab
Isososorbid dinitrat tab
Clopidogrel tab
Warfarin tab</td></tr>
<tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>Bisoprolol tab 2.5 mg
Fenofibrat tab 300 mg
Furosemide tab 40 mg
Amlodipine tab 5 mg
Isososorbid dinitrat tab 5 mg
Clopidogrel tab 75 mg
Warfarin tab 2 mg</td></tr>
<tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>Semua bentuk sediaan adalah tablet</td></tr>
<tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>Semua obat adalah 30 tab, kecuali isosorbid dinitrat yaitu 90 tab</td></tr>
<tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>~~Ada~~/Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>Bisoprolol tab = 1 x sehari (siang)
Fenofibrat tab = 1 x sehari (malam)
Furosemide tab = 1 x sehari (pagi)
Amlodipine tab = 1 x sehari (pagi)
Isososorbid dinitrat tab = 3 x sehari
Clopidogrel tab = 1 x sehari (pagi)
Warfarin tab = 1 x sehari (malam)</td></tr>
<tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>Dr. Rachfita Chandra Gresiyana Dewi, Sp. JP.</td></tr>
<tr><td>Surat ijin :</td><td>~~Ada~~/Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Alamat dr. :</td><td>~~Ada~~/Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Bisoprolol tab 2.5 mg = 30 tab
Fenofibrat tab 300 mg = 30 tab
Furosemide tab 40 mg = 30 tab
Amlodipine tab 5 mg = 30 tab
Isososorbid dinitrat tab 5 mg = 90 tab
Clopidogrel tab 75 mg = 30 tab
Warfarin tab 2 mg = 30 tab

c. Perhitungan biaya resep

Bisoprolol tab 2.5 mg = Rp 17.280/ strip x 3 = Rp 51.840
Fenofibrat tab 300 mg = Rp 38.500/ strip x 3 = Rp 115.500
Furosemide tab 40 mg = Rp 16.500/ strip x 3 = Rp 49.500
Amlodipine tab 5 mg = Rp 4.257 / strip x 3 = Rp 12.771
Isososorbid dinitrat tab 5 mg = Rp 2.300/ strip x 9 = Rp 20.700
Clopidogrel tab 75 mg = Rp 12.300/strip x 3 = Rp 36.900
Warfarin tab 2 mg = Rp 12.540/ strip x 3 = Rp 37.620
Total biaya : Rp 324. 831

d. ETIKET



Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur | Transparan | Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 | P: +62 31 3981275 | F: +62 31 3945459

Nama: Tn. Dharmawan Tri H. TGL: 10/02/25
No.RM: [redacted] ED: 10/03/2027
Tgl.Lahir: 1976-12-16

Furosemide 40 mg

Pagi x Sehari 1 Biji
Sesudah makan

Kesembuhan dari ALLAH SWT

Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur | Transparan | Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 | P: +62 31 3981275 | F: +62 31 3945459

Nama: Tn. Dharmawan Tri H. TGL: 10/02/25
No.RM: [redacted] ED: 11/03/2027
Tgl.Lahir: 1976-12-16

Amlodipine 5 mg

Pagi x Sehari 1 Biji
Sebelum makan

Kesembuhan dari ALLAH SWT
Berdoalah sebelum minum obat

Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur | Transparan | Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 | P: +62 31 3981275 | F: +62 31 3945459

Nama: Tn. Dharmawan Tri H. TGL: 10/02/25
No.RM: [redacted] ED: 14/04/2027
Tgl.Lahir: 1976-12-16

ISDN 5 mg

3 x Sehari 1 Biji
Sebelum makan

Kesembuhan dari ALLAH SWT
Berdoalah sebelum minum obat

Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur | Transparan | Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 | P: +62 31 3981275 | F: +62 31 3945459

Nama: Tn. Dharmawan Tri H. TGL: 10/02/25
No.RM: [redacted] ED: 16/04/2026
Tgl.Lahir: 1976-12-16

Clopidogrel 75 mg

Pagi x Sehari 1 Biji
Sesudah makan

Kesembuhan dari ALLAH SWT
Berdoalah sebelum minum obat

Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur | Transparan | Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 | P: +62 31 3981275 | F: +62 31 3945459

Nama: Tn. Dharmawan Tri H. TGL: 10/02/25
No.RM: [redacted] ED: 13/02/2027
Tgl.Lahir: 1976-12-16

Wardarin 2 mg

Malam x Sehari 1 Biji
Sesudah makan

Kesembuhan dari ALLAH SWT
Berdoalah sebelum minum obat

e. *Product knowledge*

Nama Obat : Bisoprolol tab 2.5 mg **Kandungan :** Bisoprolol 2,5 mg **Dosis lazim :** Dosis Bisoprolol Fumarate Tablet untuk pasien dewasa adalah 1,25-10 mg, 1 kali sehari. **Kegunaan :** Mengobati hipertensi atau tekanan darah tinggi, angina pektoris, aritmia, dan gagal jantung. **ESO potensial :** Pusing, mual, muntah, kelelahan, denyut jantung lambat **KI :** Obat tidak boleh diberikan kepada pasien dengan kondisi : hipersensitif terhadap bisoprolol, gagal jantung akut ata selama episode dekomposisi gagal jantung yang memerlukan terapi intravena inotropik, syok kardiogenik. **PERHATIAN :** Beri tahu dokter jika Anda memiliki brakikardiaa, riwayat asma atau gangguan pernapasan lainnya, gagal jantung kongestif, diabetes, hipertiroidisme, gangguan hati, gangguan ginjal, myasthenia gravis, psoriasis, sindrom raynaud atau penyakit arteri perifer **Cara penyimpanan :** Simpan obat pada suhu dibawah 30°C, di tempat yang sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak.	**Nama Obat :** Fenofibrat tab 300 mg **Kandungan :** Fenofibrate 300 mg **Dosis lazim :** Fenofibrate kapsul 100 mg, 160 mg, 200 mg, 300 mg Dosisnya adalah 160–200 mg, 1 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan hingga 300 mg, 1 kali sehari. Dosis maksimal 400 mg per hari tergantung respons pasien terhadap pengobatan. **Kegunaan :** Menurunkan kadar trigliserida dan kolesterol jahat (LDL), serta meningkatkan kadar kolesterol baik (HDL) di dalam darah. **ESO potensial :** Mual atau muntah, diare, sembelit, heratburn, sakit kepala **KI :** Wanita hamil dan menyusui **PERHATIAN :** Harus dengan resep dokter. Tidak dianjurkan untuk digunakan pada anak karena bukti keamanan penggunaan pada anak belum cukup. **Cara penyimpanan :** Simpan obat pada suhu dibawah 30°C, di tempat yang sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak.
Nama Obat : Furosemide tab 40 mg **Kandungan :** Furosemide 40 mg **Dosis lazim :** 40–80 mg per hari. Bisa dikombinasikan dengan obat antihipertensi **Kegunaan :** Mengatasi penumpukan cairan di dalam tubuh atau edema. **ESO potensial :** Pusing, sakit kepala, mual dan muntah, diare, penglihatan buram **KI :** Obat ini tidak boleh diberikan kepada pasien dengan kondisi hipersensitif terhadap furosemide dan sulfonamide. Anuria atau gagal ginjal.	**Nama Obat :** Amlodipine tab 5 mg **Kandungan :** Amlodipine 5 mg **Dosis lazim :** Dewasa: Dosis awal 5 mg, 1 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan berdasarkan kondisi dan respons pasien terhadap pengobatan setelah 1–2 minggu. Dosis maksimal 10 mg 1 kali sehari. Anak-anak usia 6–17 tahun: Dosis awal 2,5 mg, 1 kali sehari. Jika perlu, dosis dapat ditingkatkan menjadi 5 mg, 1 kali sehari, setelah 4 minggu. Peningkatan dosis ditentukan berdasarkan kondisi dan respons pasien terhadap

		PERHATIAN : Harus dengan resep dokter. Hati-hati penggunaan obat ini pada pasien dengan kondisi pasien dengan pradiabetes atau diabetes mellitus, sirosis hati, gout. **Cara penyimpanan :** Simpan obat pada suhu dibawah 30°C, di tempat yang sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak.	pengobatan. Lansia: Dosis awal 2,5 mg 1 kali sehari. **Kegunaan :** Menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. **ESO potensial :** Kantuk, pusing, lelah, sakit perut **KI :** Hipersensitif **PERHATIAN :** Harus dengan resep dokter. Beri tahu dokter jika Anda pernah atau sedang menderita diabetes, penyakit liver, gagal jantung, penyakit jantung koroner atau serangan jantung, penyempitan katup aorta jantung (stenosis aorta), atau tekanan darah rendah. **Cara penyimpanan :** Simpan obat pada suhu dibawah 30°C, di tempat yang sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak.	
		Nama Obat : Isosorbid dinitrat tab 5 mg **Kandungan :** Isosorbid dinitrat 5 mg **Dosis lazim :** Tablet : Angina pektoris, dosisnya adalah 20–120 mg per hari yang dibagi menjadi beberapa dosis. Dosis dapat ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan respons pasien. Dosis maksimal 240 mg per hari. Gagal jantung, dosisnya adalah 40–160 mg per hari yang dibagi menjadi beberapa dosis. Dosis maksimal 240 mg perhari. Tablet lepas lambat : Angina pektoris, dosisnya adalah 20 mg, 2 kali sehari, dengan jarak antar dosis 6–8 jam. Dosis dapat ditingkatkan menjadi 20 mg, 3 kali sehari, tergantung respons pasien terhadap pengobatan. **Kegunaan :** Mencegah dan meredakan angina pektoris (nyeri dada) akibat penyakit jantung koroner. **ESO potensial :** sakit kepala, mual, sensasi panas di	**Nama Obat :** Clopidogrel tab 75 mg **Kandungan :** Clopidogrel 75 mg **Dosis lazim :** Untuk penanganan angina dan non-ST-elevation myocardial infarction (NSTEMI), dosis awal adalah 300 mg, 1 kali sehari. Setelah kondisi pasien stabil, dokter akan memberikan dosis perawatan sebanyak 75 mg, 1 kali sehari. Lama pengobatan ditentukan oleh dokter. Untuk penanganan *ST-elevation myocardial infarction* (STEMI), dosis awal adalah 300 mg, 1 kali sehari (dapat berubah tergantung kondisi pasien). Dosis perawatan adalah 75 mg, 1 kali sehari. Pada pasien yang baru mengalami stroke iskemik atau serangan jantung atau baru didiagnosis penyakit arteri perifer, dosisnya adalah 75 mg, 1 kali sehari. **Kegunaan :** Mencegah penyumbatan	

		sekitar wajah dan leher **KI :** Infark miokard akut, hipertensi, syok, hipovolemia, trauma serebral, anemia **PERHATIAN :** Beri tahu dokter jika Anda sedang menggunakan obat lain, terutama obat untuk impotensi, seperti sildenafil atau tadalafil. Isosorbide dinitrate tidak boleh digunakan pada pasien yang sedang menjalani pengobatan dengan obat-obat tersebut. Beri tahu dokter jika Anda baru saja mengalami serangan jantung atau jika Anda memiliki penyakit jantung lainnya, terutama stenosis mitral, perikarditis kronis, atau kardiomiopati **Cara penyimpanan :** Simpan obat pada suhu dibawah 30°C, di tempat yang sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak.	pembuluh darah dan membantu melancarkan peredaran darah, sehingga obat ini dapat menurunkan risiko terjadinya stroke atau serangan jantung. **ESO potensial :** Diare, mudah mengalami memar atau perdarahan, sembelit **KI :** Obat ini tidak boleh diberikan pada pasien dengan kondisi hipersensitif terhadap clopidogrel **PERHATIAN :** Clopidogrel harus digunakan dengan hati-hati pada pasien yang mungkin berisiko mengalami peningkatan perdarahan akibat trauma, pembedahan. **Cara penyimpanan :** Simpan obat pada suhu dibawah 30°C, di tempat yang sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak.	
		Nama Obat : Warfarin tab 2 mg **Kandungan :** Warfarin 2 mg **Dosis lazim :** Dosis awal warfarin adalah 5–10 mg per hari, selama 1–2 hari pertama. Dosis perawatan 3–9 mg per hari, tergantung hasil tes darah saat evaluasi rutin. **Kegunaan :** Mencegah atau mengatasi bekuan darah yang bisa menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah **ESO potensial :** Mual, kehilangan selera makan, sakit perut atau abdomen, ruam kulit ringan **KI :** Kondisi potensial perdarahan, pembedahan segera, anestesi lumbalis **PERHATIAN :** Harus dengan resep dokter. Beri tahu dokter jika Anda pernah atau sedang menderita kelainan darah seperti anemia atau hemofilia, atau gangguan perdarahan, seperti perdarahan saluran cerna atau otak. Beri tahu dokter jika Anda baru menjalani operasi, baru mengalami cedera berat, sering jatuh, atau sering cedera.		

		Cara penyimpanan : Simpan obat pada suhu dibawah 30°C, di tempat yang sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak.	

		f. Tahap pembuatan 1. Dilakukan pemeriksaan resep yang sudah diterima (identitas pasien, nama dan kekuatan obat, jumlah obat) 2. Disiapkan obat yaitu Bisoprolol tab 2.5 mg sebanyak 30, Fenofibrate tab 300 mg sebanyak 30, Furosemide tab 40 mg sebanyak 30, Amlodipine tab 5 mg sebanyak 30, Isosorbid Dinitrat tab 5 mg sebanyak 90, Clopidogrel tab 75 mg sebanyak 30, dan Warfarin tab 2 mg sebanyak 30 3. Dilakukan penulisan etiket pada etiket putih untuk masing-masing obat 4. Penulisan etiket obat Bisoprolol tab 2.5 mg yaitu "Tn. Dharmawan Tri H. Siang x sehari 1 biji sesudah makan", nama obat, tanggal penyiapan obat, tanggal kadaluarsa, dan ditempel stiker identitas pasien. 5. Penulisan etiket obat Fenofibrate tab 300 mg yaitu "Tn. Dharmawan Tri H. Malam x sehari 1 biji bersama makan", nama obat, tanggal penyiapan obat, tanggal kadaluarsa, dan ditempel stiker identitas pasien. 6. Penulisan etiket obat Furosemide tab 40 mg yaitu "Tn. Dharmawan Tri H. Pagi x sehari 1 biji sesudah makan", nama obat, tanggal penyiapan obat, tanggal kadaluarsa, dan ditempel stiker identitas pasien. 7. Penulisan etiket obat Amlodipine tab 5 mg yaitu "Tn. Dharmawan Tri H. Pagi x sehari 1 biji sebelum makan", nama obat, tanggal penyiapan obat, tanggal kadaluarsa, dan ditempel stiker identitas pasien. 8. Penulisan etiket obat Isosorbid Dinitrat tab 5 mg yaitu "Tn. Dharmawan Tri H. 3 x sehari 1 biji sebelum makan", nama obat, tanggal penyiapan obat, tanggal kadaluarsa, dan ditempel stiker identitas pasien. 9. Penulisan etiket obat Clopidogrel tab 75 mg yaitu "Tn. Dharmawan Tri H. Pagi x sehari 1 biji sesudah makan", nama obat, tanggal penyiapan obat, tanggal kadaluarsa, dan ditempel stiker identitas pasien.

		g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal) A: Apoteker P : Pasien A : "Atas nama Tn. Dharmawan Tri H., loket 4" (Pasien datang) A : "Atas nama siapa, Bapak?" (sembari tersenyum) P : "Tn. Dharmawan Tri H." A : "Baik, tanggal lahirnya?" P : "16 Desember 1976" A : "Baik, dari poli jantung ya, Pak?" P : "Iya, betul" A : "Obat rutin, ya Pak. Bapak mendapatkan 7 obat. Yang pertama obat Bisoprolol tab 2.5 mg dimium saat siang 1 tablet sesudah makan, kemudian obat Fenofibrate tab 300 mg diminum saat malam 1 tablet bersama makan, obat Furosemide tab 40 mg diminum pagi hari 1 tablet sesudah makan, ini obat Amlodipine tab 5 mg diminum saat pagi 1 tablet sebelum makan. Selanjutnya obat Isosorbid Dinitrat diminum 3 x sehari 1 tablet sebelum makan dan cara minumnya dihisap di bawah lidah ya, Pak. Kemudian obat Clopidogrel tab 75 mg diminum pagi 1 tablet sesudah makan, yang terakhir obat Warfarin tab 2 mg diminum malam hari 1 tablet sesudah makan." (TVF menunjukkan masing-masing obat) P : "Yang untuk darah tinggi mana ya, Mbak?" A : "Untuk darah tinggi ada Bisoprolol dan Amlodipine ya, Pak" P : "Baik, Mbak terima kasih" A : "Iya Pak, ada yang ditanyakan lagi?" P : " Tidak."

		A : “Baik, silahkan tandatangan dan nama terang ya, di sini” (TVF menunjukkan tempat tandatangan) A : “Semoga lekas sembuh” (Obat diserahkan ke pasien)

<table>
<tr><th>No</th><th>Resep</th><th>Tahapan Pengerjaan Resep</th></tr>
<tr><td>13</td><td>Jenis Resep : ~~Salinan~~/Resep asli
Resep obat : Racikan/~~non racikan~~
Jumlah obat dalam resep : Tidak polifarmsi
Pengulangan resep : ~~Iter~~... ~~kali~~/Neiter
Resep Kulit
  </td><td>A. Skrinning Administrasi
<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>Ny. Risfamin Armaydia Yonanda</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>~~Ada~~/Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>~~Ada~~/Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>R/ (1) : Mefinal tab 500 mg R/ (2) : Metcor tab 8 mg
R/ (3) Lanakeloid cream, dan Fusipar cream 2%</td></tr>
<tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>R/ (1) Mefinal tab : 500 mg R/ (2) Metcor tab : 8 mg
R/ (1) Lanakloid Cream : -Fusipar cream : 2%</td></tr>
<tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>Mefinal dan Metcor : tablet
Lanakeloid dan Fusipar : cream</td></tr>
<tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>R/ (1) Mefinal : 2 tab, R/ (2) metcor : 10 tab, R/ (3) lanakeloid : 1 tube, fusipar : 1 tube</td></tr>
<tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>~~Ada~~/Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>R/ (1) Mefinal : 2 x sehari 1 tablet sesudah makan
R/ (2) Metcor : 2 x sehari 1 tablet sesudah makan
R/ (3) Cream Lanakeloid dan Fusipar : 3 x sehari dioleskan pada area keloid</td></tr>
<tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>11 Maret 2025</td></tr>
<tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>dr. Ryski Meilia Novarina, Sp.KK</td></tr>
<tr><td>Surat ijin :</td><td>~~Ada~~/Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Alamat dr. :</td><td>~~Ada~~/Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ (1)
Mefinal tab 500 mg : 2 tablet

R/ (2)
Metcor tab 8 mg : 10 tablet

R/ (3)
Fusipar Cream 2% : 1 tube
Lanakeloid Cream : 1 tube
Pot salep : 1 pcs

c. Perhitungan biaya resep

R/ (1)
Mefinal tab 500 mg (2 Tab) : Rp3.996

R/ (2)
Metcor tab 8 mg (10 tab) : Rp42.100

R/ (3)
Fusipar Cream 2% (1 tube) : Rp62.604
Lanakeloid Cream (1 tube) : Rp206.460
Pot salep (1 pcs) : Rp4.200

Total biaya : Rp319.360

d. ETIKET

Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur | Transparan | Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 | P: +62 31 3981275 | F: +62 31 3945459

Nama: Ny. Risfamin Armaydia Y. TGL: 11/03/25
No.RM: [redacted] ED: 14/01/2027
Tgl.Lahir: 1998-05-28
Mefinal (nyeri)

2 x Sehari 1 Biji
Sesudah makan

Kesembuhan dari ALLAH SWT
Berdoalah sebelum minum obat

Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur | Transparan | Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 | P: +62 31 3981275 | F: +62 31 3945459

Nama: Ny. Risfamin Armaydia Y. TGL: 11/03/25
No.RM: [redacted] ED: 19/01/2027
Tgl.Lahir: 1998-05-28
Metcor (alergi)

2 x Sehari 1 Biji
Sesudah makan

Kesembuhan dari ALLAH SWT
Berdoalah sebelum minum obat

Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur | Transparan | Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 | P: +62 31 3981275 | F: +62 31 3945459

Nama: Ny. Risfamin Armaydia Y. Tgl: 11/03/2025
No. RM: [redacted]
Tgl Lahir: 28/05/1998 ED: 11/04/2025

3 X Sehari
Oleskan pada area keloid

e. *Product knowledge*

Nama Obat : Mefinal tab 500 mg **Kandungan :** Asam mefenamat 500 mg **Dosis lazim :** Anak usia > 6 bulan : 3-6,5 mg/kgBB setiap 6 jam. Dewasa dan anak > 14 tahun : Dosis awal 500 mg, kemudian 250 mg setiap 6 jam. **Kegunaan :** Nyeri pada kondisi rematik, cedera jaringan lunak, sakit kepala, sakit gigi, nyeri pasca operasi. **ESO potensial :** Sakit perut, nyeri atau perih di ulu hati, mual atau muntah, pusing, kantuk, penglihatan kabur, vertigo **KI :** Hipersensitivitas, peradangan atau tukak pada saluran pencernaan **PERHATIAN :** Hindari penggunaan apabila kamu punya alergi terhadap asam mefenamat dan golongan OAINS lainnya. Informasikan dokter jika sedang mengonsumsi obat lain, baik herbal maupun kimia, untuk mencegah interaksi obat **Cara penyimpanan :** Simpan Mefinal pada suhu dibawah 30°C, di tempat yang sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak.	**Nama Obat :** Metcor tab 8 mg **Kandungan :** Metilprednisolon 8 mg **Dosis lazim :** Dosis awal berkisar antara 4-48 mg sehari. Terapi dosis tinggi : 160 mg/hari selama 1 minggu dilanjutkan dengan 64 mg setiap dua hari sekali (selang sehari) selama 1 bulan. **Kegunaan :** Obat untuk mengatasi kondisi alergi & inflamasi, penyakit reumatik yang memberi respon terhadap terapi kortikosteroid, penyakit kulit & saluran napas, penyakit endokrin, penyakit autoimun, gangguan hematologik, sindroma nefrotik, Asma bronkhial, rinitis alergika, dermatitis kontak, dermatitis atopik, lupus eritematosus sistemik, sindroma Steven-Johnson. **ESO potensial :** Gangguan cairan & elektrolit, kelemahan otot, osteonekrosis aseptik, osteoporosis, ulkus peptikum dengan perlubangan, perdarahan, peregangan perut, gangguan penyembuhan luka, peningkatan tekanan dalam mata **KI :** Tuberkulosa, ulkus peptikum, infeksi jamur sistemik, herpes simpleks, diabetes melitus, dan cacar air, osteoporosis berat **PERHATIAN :** Hamil, stres, psikosis (penyakit jiwa atas dasar kelainan organik atau gangguan emosi yang ditandai dengan kehancuran kepribadian dan kehilangan kontak dengan kenyataan, seringkali dengan delusi, halusinasi, atau ilusi), insufisiensi ginjal, hipertensi. **Cara penyimpanan :** Simpan obat ditempat yang sejuk (tidak lebih dari 30°C) dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

		Nama Obat : Lanakeloid Cream **Kandungan :** Vitamin E 20 mg, Centella asiatica 100 mg **Dosis lazim :** 1-2 kali sehari **Kegunaan :** Mengurangi tampilan bekas luka dan keloid sehingga kulit tampak lebih halus, membantu mempercepat proses regenerasi kulit agar bekas luka cepat memudar, melembabkan kulit sehingga area bekas luka tidak kering dan gatal. **ESO potensial :** Belum ada laporan mengenai efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan Lanakeloid-E cream, tetapi bila mempunyai sensitifitas terhadap salah satu kandungan bahan yang ada, maka sebaiknya hindari menggunakan produk ini **KI :** Hipersensitif **PERHATIAN :** Hindari penggunaan pada luka terbuka atau kulit yang mengalami iritasi parah, jika terjadi reaksi alergi atau iritasi sesudah penggunaan, segera hentikan pemakaian dan konsultasikan dengan dokter. **Cara penyimpanan :** Simpan krim ini di tempat yang sejuk dan kering, jauh dari jangkauan anak-anak.	**Nama Obat :** Fusipar Cream **Kandungan :** Fusidic acid / Asam Fusidat 2% **Dosis lazim :** Gunakan 2-3 kali sehari, umumnya selama 7 hari **Kegunaan :** Pengobatan infeksi kulit yang disebabkan *Staphylococcus*, *Streptococcus* atau organisme lain yang peka terhadap Fusidin seperti impetigo, bisul, karbunkel/bisul batu, paronikia (radang jaringan sekitar kuku), luka yang terinfeksi, folikulitis, sikosis barbae (penyakit kulit di tempat janggut karena jamur), eritrasma hidradenitis, jerawat. **ESO potensial :** Hiipersensitifitas (jarang) **KI :** Pengguna yang hipersensitivitas atau alergi dari komponen produk ini **PERHATIAN :** Hanya untuk pemakaian luar. Hentikan penggunaan jika terjadi iritasi & jika gejala terus berlanjut, segera konsultasi ke dokter. **Cara penyimpanan :** Simpan obat ditempat yang sejuk (tidak lebih dari 30°C) dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

		f. Tahap pembuatan 1. Dilakukan pemeriksaan resep yang sudah diterima (identitas pasien, nama dan kekuatan obat, jumlah obat). 2. Disiapkan obat yaitu mefinal tab 500 mg (2 tab), metcor tab 8 mg (10 tab), fusipar cream 2% (1 tube), dan lanakeloid cream (1 tube) serta pot salep 3. Dimasukkan fusipar cream 2% dan lanakeloid cream ke dalam pot salep kemudian dicampur menggunakan alat pengaduk. 4. Sesudah tercampur, disiapkan etiket biru dan ditulis “Ny. Risfamin A. Oleskan 3 x sehari pada area keloid”, nama obat, tanggal penyiapan obat, tanggal kadaluarsa, dan ditempel stiker identitas pasien. 5. Disiapkan etiket putih untuk obat mefinal dan ditulis “Ny. Risfamin A. 2 x sehari 1 tablet sesudah makan”, nama obat, tanggal penyiapan obat, tanggal kadaluarsa, dan ditempel stiker identitas pasien. 6. Disiapkan etiket putih untuk obat metcor dan ditulis “Ny. Risfamin A . 2 x sehari 1 tablet sesudah makan”, nama obat, tanggal penyiapan obat, tanggal kadaluarsa, dan ditempel stiker identitas pasien. 7. Dilakukan *double check*, dikemas ke dalam plastik, dan diserahkan kepada pasien serta dilakukan KIE.

		g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal) A: Apoteker P : Pasien A: "Atas nama Ny. Risfamin, loket 4" (Pasien datang) A : "Atas nama siapa, Ibu?" (sembari tersenyum) P : "Ny. Risfamin" A : "Baik, tanggal lahirnya?" P : "28 Mei 1998" A : "Baik, dari dokter kulit ya, Bu?" P : "Iya" (Pasien mengangguk). A : "Baik, Ibu mendapatkan obat mefinal untuk nyeri, diminum 2 x sehari 1 tablet sesudah makan, pagi dan sore. Lalu untuk radangnya, obat metcor diminum 2 x sehari juga 1 tablet sesudah makan, pagi dan sore. Ini salepnya dioleskan di area keloid ya, Bu. Dioleskannya sehari 3 x, dioles tipis." (TVF sambil menunjukkan masing-masing obatnya). P : "Oke, terima kasih" A: "Ada yang ditanyakan?" P : " Tidak." A : "Baik, silahkan tandatangan dan nama terang ya, di sini" (TVF menunjukkan tempat tandatangan) A : "Semoga lekas sembuh" (Obat diserahkan ke pasien)

<table>
<tr><th>No</th><th>Resep</th><th>Tahapan Pengerjaan Resep</th></tr>
<tr><td>14</td><td>Jenis Resep ~~: Salinan~~/Resep asli
Resep obat : ~~Racikan~~/non racikan
Jumlah obat dalam resep : Tidak Polifarmasi
Pengulangan resep : ~~Iter~~... ~~kali~~/Neiter
Resep Mata

</td><td>A. Skrinning Administrasi
<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>Ny. Anggi</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>~~Ada~~/Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>~~Ada~~/Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>R/ (1) Cendo xitrol eye drop
R/ (2) Ibuprofen tab</td></tr>
<tr><td>Kekuatan :</td><td>~~Ada~~/Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Bentuk sed. :</td><td>~~Ada~~/Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>R/ (1) Cendo xitrol eye drop : 1 botol
R/ (2) Ibuprofen 1 tab</td></tr>
<tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>~~Ada~~/Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>R/ (1) Cendo xitrol : 1-2 tetes mata kanan dan kiri setiap 4-6 jam
R/ (2) Ibuprofen : 3 x sehari 1 tablet</td></tr>
<tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>11 Februari 2025</td></tr>
<tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>dr. Rizky Putri Purwanti</td></tr>
<tr><td>Surat ijin :</td><td>~~Ada~~/Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Alamat dr. :</td><td>~~Ada~~/Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
</table>
B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi
R/ (1)
Cendo xitrol eye drop : 1 botol

R/ (2)
Ibuprofen tab : 10 tablet</td></tr>
</table>

c. Perhitungan biaya resep

R/ (1)
Cendo xitrol eye drop (1 botol) : Rp36.298

R/ (2)
Ibuprofen tab (10 tab) : Rp5.120

Total biaya : Rp41.418

d. ETIKET



e. *Product knowledge*

Nama Obat : Cendo Xitrol **Kandungan :** Deksametason 0.1%, Neomisin (sulfat) 3.5mg, Polimiksin-B-Sulfat 10000 UI **Dosis lazim :** 1-2 tetes setiap 1-2 jam. Dosis dapat dikurangi menjadi 1-2 tetes setiap 4-6 jam sekali jika keluhan sudah membaik. **Kegunaan :** Kondisi inflamasi mata yang responsif terhadap steroid disertai infeksi bakteri atau adanya reaksi infeksi mata karena bakteri **ESO potensial :** Mata merah, mata gatal, iritasi ringan, penglihatan kabur	**Nama Obat :** Ibuprofen Tab **Kandungan :** Ibuprofen 400 mg **Dosis lazim :** Dewasa : Dosis: 200-400mg setiap 4-6 jam sesuai kebutuhan. Anak-anak : Dosis: 5-10 mg/kg berat badan setiap 6-8 jam sesuai kebutuhan. Kegunaan : Nyeri ringan sampai sedang **ESO potensial :** Sensasi panas di dada atau nyeri ulu hati, perut kembung, mual dan muntah, diare **KI :** Penderita dengan ulkus

		KI : Hipersensitif, infeksi jamur sistemik, glaukoma, simplex keratitis **PERHATIAN** : HARUS DENGAN RESEP DOKTER. Jangan dipergunakan 30 hari setelah dibuka. **Cara penyimpanan** : Simpan dalam kemasannya, di tempat yang tidak terkena paparan cahaya matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak.	peptikum (tukak lambung dan duodenum) yang berat dan aktif. Penderita dengan riwayat hipersensitif terhadap Ibuprofen dan obat anti inflamasi non steroid lain. **PERHATIAN :** Obat wajib apotek, obat ini dapat dibeli dan diserahkan apoteker tanpa resep dengan maksimum 1 strip. **Cara penyimpanan :** Simpan dalam kemasannya, di tempat yang tidak terkena paparan cahaya matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak.	

f. Tahap pembuatan

1. Dilakukan pemeriksaan resep yang sudah diterima (identitas pasien, nama dan kekuatan obat, jumlah obat).
2. Disiapkan obat yaitu cendo xitrol eye drop (1 Botol) dan ibuprofen tab (10 tab).
3. Disiapkan etiket putih untuk obat ibuprofen dan ditulis “Ny. Anggi 3 x sehari 1 tablet setelah makan”, nama obat, tanggal penyiapan obat, tanggal kadaluarsa, dan ditempel stiker identitas pasien.
4. Disiapkan etiket biru untuk obat cendo xitrol dan ditulis “Ny. Anggi sehari 1-2 tetes tiap 4-6 jam pada mata kanan dan kiri”, nama obat, tanggal penyiapan obat, tanggal kadaluarsa, dan ditempel stiker identitas pasien.
5. Dilakukan *double check*, dikemas ke dalam plastik, dan diserahkan kepada pasien serta dilakukan KIE.

		g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal A : Apoteker P : Pasien A: "Atas nama Ny. Anggi, loket 4" (Pasien datang) A : "Atas nama siapa, Ibu?" (sembari tersenyum) P : "Ny. Anggi" A : "Baik, tanggal lahirnya?" P : "2 Mei 2002" A : "Baik, dari poli umum ya, Bu?" P : "Iya, betul" A : "Keluhannya sakit mata?" P : "Iya, Bu" A : "Baik, ibu mendapatkan obat cendo xitrol, diteteskan 1-2 tetes mata kanan dan kiri setiap 4-6 jam, nanti setelah diteteskan, ibu tetap memejamkan mata selama 30 detik -1 menit ya agar obatnya masuk. Kemudian ini obat Ibuprofen untuk nyerinya diminum 3 x sehari 1 tablet sesudah makan" (TVF sambil menunjukkan obatnya) P : "Baik, terima kasih" A : "Baik, ada yang ditanyakan lagi, Bu? P : " Tidak." A : "Baik, silahkan tandatangan dan nama terang ya, di sini" (TVF menunjukkan tempat tandatangan) A : "Semoga lekas sembuh" (Obat diserahkan ke pasien)

<table>
<tr><th>No</th><th>Resep</th><th>Tahapan Pengerjaan Resep</th></tr>
<tr><td>15</td><td>Jenis Resep ~~: Salinan~~/Resep asli
Resep obat : ~~Racikan~~/non racikan
Jumlah obat dalam resep : Tidak Polifarmasi
Pengulangan resep : ~~Iter~~... ~~kali~~/Neiter
Resep Racikan Dewasa 1
 </td><td>A. Skrinning Administrasi
<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>Tn. Bustari</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>~~Ada~~/Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>~~Ada~~/Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>R/ Codein 10 mg
Methylprednisolone 4 mg
Cetirizine ½ tab</td></tr>
<tr><td>Kekuatan :</td><td>~~Ada~~/Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Bentuk sed. :</td><td>~~Ada~~/Tidak Ada</td><td>Capsul</td></tr>
<tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>R/
1. Codein 10 mg x 10 : 20 mg = 4,7 → 5 tab
2. MP 4 mg : 4 mg x 10 = 10 tab
3. Cetirizine ½ x 10 = 5 tab</td></tr>
<tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>~~Ada~~/Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>R/
Codein 10 mg
Methylprednisolone 4 mg
Cetirizine ½ tab
3x sehari 1 capsul bila batuk</td></tr>
<tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>14-02-2025</td></tr>
<tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>dr. Lailatul Inayah</td></tr>
<tr><td>Surat ijin :</td><td>~~Ada~~/Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Alamat dr. :</td><td>~~Ada~~/Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
</table>
B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi
R/
1. Codein diambil sebanyak 5 tab
2. Methylprednisolone diambil sebanyak 10 tab
3. Cetirizine diambil sebanyak 5 tab</td></tr>
</table>

c. Perhitungan biaya resep

R/ (1)
Harga obat sudah termasuk PPN 10%
1. Codein 20 mg → harga per tab Rp. 2.992, pada resep yang diminta adalah 5 tab sehingga 5x 2.992 = 14. 960
2. MP 4 MG → harga per tab Rp. 1.606, pada resep yang diminta dalah 10 tab sehingga 10 x 1.606 = Rp. 16.060
3. Cetirizine 10 mg → harga per tab Rp. 5.565, pada resep yang diminta adalah 5 tab, sehingga 5 x 5.565 = Rp. 27.825
4. cangkang kapsul 10 x 131 = 1.310
TOTAL = Rp. 60.155

d. ETIKET

Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur | Transparan |Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 | P: +62 31 3981275 F: +62 31 3945459

Nama: Tn. Bustari TGL: 14/02/25
No.RM: [redacted] ED:
14/03/2026
Tgl.Lahir: 1951-09-18

Bila batuk
3 x Sehari 1 kapsul
Sesudah makan

Kesembuhan dari ALLAH SWT
Berdoalah sebelum minum obat

e. *Product knowledge*

Nama Obat : Codein tab
Kandungan : golongan opioid
Dosis lazim : Dewasa: 10-20 mg setiap 4-6 jam sesuai kebutuhan. Beberapa sumber menyebutkan 15-30 mg 3-4 kali sehari.
Anak-anak (12-17 tahun): 5-10 mg setiap 4-6 jam sesuai kebutuhan. Beberapa sumber menyebutkan 15-30 mg 3-4 kali sehari.
Kegunaan : untuk meredakan nyeri berat yang

Nama Obat : Methylprednisolone 4 mg
Kandungan : Methylprednisolone 4 mg, 8 mg, 16 mg
- **Dosis lazim :** Dewasa: 4 - 48 mg per hari
- Anak-anak: 0.4 - 1.6 mg/kg berat badan per hari

Kegunaan : untuk mengatasi alergi, peradangan, serta mengatasi reaksi imunitas

		tidak dapat diatasi dengan pereda nyeri lain. Selain itu, obat ini juga bisa digunakan untuk meredakan batuk. odeine dapat ditemukan dalam bentuk sediaan tunggal atau dalam kombinasi dengan obat lain. **ESO potensial :** sembelit. sakit kepala atau pusing. kelelahan atau kantuk **KI :** Penggunaan codeine pada anak-anak berusia <12 tahun dikontraindikasikan karena ada bukti surveilans tentang risiko depresi napas dan kematian. Risiko ini diperkirakan berhubungan dengan peningkatan proporsi *ultrarapid metabolizer* pada kelompok usia tersebut. Selain itu, anak-anak berusia 12–18 tahun pascaoperasi tonsil dan adenoid juga memiliki risiko lebih tinggi terhadap depresi napas terkait codeine **PERHATIAN :** HARUS DENGAN RESEP DOKTER. **Cara penyimpanan :** Simpan obat di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak dan hewan peliharaan untuk mencegah konsumsi yang tidak disengaja. Disimpan di dalam lemari khusus. **Nama Obat** : Cetirizine tab **Kandungan** : cetirizine hydrochloride. **Dosis Lazim** : Dewasa & anak umur >12 tahun: 10 mg sekali sehari. Anak umur 2-6 tahun: 2,5 mg dua kali sehari. Anak umur 6-12 tahun: 5 mg dua kali sehari. Lansia: Belum ada data untuk menurunkan dosis pada pasien lansia. **Kegunaan** : meredakan gejala akibat reaksi alergi, seperti mata berair, bersin-bersin, hidung meler, atau gatal di kulit, tenggorokan, maupun hidung **ESO potensial** : • Kelelahan • Mulut kering	yang merugikan. **ESO potensial :** untuk mengatasi alergi, peradangan, serta mengatasi reaksi imunitas yang merugikan. **KI :** Penggunaan methylprednisolone kontraindikasi pada pasien hipersensitivitas dan penggunaan pada pasien yang akan melakukan vaksinasi virus hidup **PERHATIAN :** Metilprednisolon sebaiknya digunakan dalam dosis dan durasi yang direkomendasikan oleh dokter. Penggunaan jangka panjang atau dosis yang tinggi dapat meningkatkan risiko efek samping serius. **Cara penyimpanan :** Simpan dalam kemasannya, di tempat yang tidak terkena paparan cahaya matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak.	

- Sakit perut, terutama pada anak-anak
- Mual
- Pusing atau sakit kepala
- Batuk atau sakit tenggorokan
- Sembelit
- Kantuk

KI : Penggunaan obat ini harus dihindari terutama pada orang yang memiliki riwayat hipersensitif atau alergi terhadap cetirizine
PERHATIAN : Penggunaan obat ini harus dengan petunjuk dokter.
Cara Penyimpanan : Simpan Cetirizine pada suhu di bawah 25 derajat Celsius di tempat sejuk, kering, dan jauh dari jangkauan anak.

f. Tahap pembuatan

1. Diambil codein5 tab, MP 10 tab, Cetirizine 5 tab
2. Disiapkan Blender/ Mortir dan stamper
3. Gerus tablet ad homogen
4. Dilakukan pengayakan pada serbuk puyer yang sudah di haluskan
5. Disiapkan cangkang kapsul sesuai dengan nomero yang diminta bagi serbuk puyer hingga jumlah setara dan dimasukkan ke dalam cangkang kapsul hingga penuh
6. Diberi etiket pada kapsul
7. Dilakukan double cek kembali pada obat, pastikan sesuai dengan resep
8. Dilakukan KIE kepada pasien/ keluarga yang mewakili.

		g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal P : pasien A : Apoteker A : panggilan obat atas nama Tn. Bustari silahkan menuju ke loket 4 P : (duduk di tempat pengambilan obat) A: atas nama siapa pak ? (dengan wajah ramah) P : atas nama Tn. Bustari dengan saya sendiri bu. A : baik pak, mohon maaf sebelumnya bisa disebutkan tanggal lahirnya? P : 18/09/1951 A : baik, atas nama Tn. Bustari ini mendapatkan obat kapsul ya pak, untuk cara minumnya cukup 3 x sehari 1 kapsul ya pak sesudah makan diminum jika batuk saja. Bila bapak tidak ada keluhan batuk diharap jangan meminumnya lagi ya pak, obat ini juga mengandung efek samping mengantuk. Jika bapak sedang mengendarai harap diminum sesudah berkendara nggeh pak. P : baik bu A : apakah ada yang ditanyakan lagi pak? P : sudah bu, tidak ada A : Baik pak, ini obatnya terima kasih jaga Kesehatan dan semoga lekas sembuh pak (dengan wajah ramah). P : Terima kasih A : sama – sama P : (pasien perlahan meninggalkan tempat pengambilan obat)

<table>
<tr><th>No</th><th>Resep</th><th>Tahapan Pengerjaan Resep</th></tr>
<tr><td>16</td><td>Jenis Resep ~~: Salinan~~/Resep asli
Resep obat : ~~Racikan~~/non racikan
Jumlah obat dalam resep : Tidak Polifarmasi
Pengulangan resep : ~~Iter~~... ~~kali~~/Neiter
Resep Racikan Dewasa 2
 </td><td>A. Skrinning Administrasi
<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>Ny. Nur Fitriyanah</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>~~Ada~~/Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>~~Ada~~/Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>R/ (1) Lapibal
R/ (2) Prelin 75
R/(3) Sanmol 500 mg
Valisanbe 1 mg
Amitriptilin 5 mg</td></tr>
<tr><td>Kekuatan :</td><td>~~Ada~~/Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Bentuk sed. :</td><td>~~Ada~~/Tidak Ada</td><td>R/(1) Lapibal : tablet
R/(2) Prebalin : tablet
R/ (3) Sanmol, Valisanbe,Amitripilin : kapsul</td></tr>
<tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>R/ (1) Lapibal 15 tablet
R/(2) Prelin 75 15 tablet
R/ (3)Sanmol 500 mg : 500 mg x 10 = 10 tablet
Valisanbe 1 mg x 10 : 2 mg = 5 tab
Amitriptilin 5 mg x 10 : 25 mg = 2 tab</td></tr>
<tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>~~Ada~~/Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>R/(1) Lapibal : 1 x 1 sehari setelah makan
R/ (2) Prelin : 1x1 sehari pada malam hari
R/ (3) Sanmol 500 mg
Valisanbe 1 mg
Amitripilin 5 mg
1 x sehari 1 kapsul setelah makan</td></tr>
<tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>01-02-2025</td></tr>
<tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>dr. Firman Prayudi, Sp.N</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Surat ijin :	~~Ada~~/Tidak Ada	-
Alamat dr. :	~~Ada~~/Tidak Ada	-

B.Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ (3)
Sanmol diambil sebanyak 10 tablet
Valisanbe diambil sebanyak 5 tablet
Amitriptilin diambil sebanyak 2 tablet

C. Perhitungan biaya resep

(Harga obat sudah termasuk PPN (10%)
R/ (1)
Lapibal → harga per tab Rp. 4.253, pada resep diminta 15 tab, sehingga 15 tab x 4.253 = 63.795
R/(2)
Prelin 75 → harga per tab Rp. 12.862, pada resep diminta 15 tab, sehingga 15 x 12.862 = 192.930
R/(3)
Sanmol 500 mg → harga per tab Rp. 2.552, pada resep diminta 10 tab, sehingga 10 x 2.552 = 25.520
Valisanbe 2 mg → harga per tab Rp. 2.556, pada resep diminta 5 tab, sehingga 5 x 2.556 = 12.780
Amitripilin 25 mg → harga per tab Rp. 5.454, pada resep diminta 2 tab, sehingga 2 x 5.454 = 10.906
Cangkang kapsul = 10 x 131 = 1.310
TOTAL = Rp. 307. 241

D. ETIKET



e. *Product knowledge*

Nama Obat : Lapibal **Kandungan :** mecobalamin 500 mg **Dosis lazim :** Dosis lazim untuk orang dewasa adalah 500 mcg (1 kapsul), diminum 3 kali sehari. **Kegunaan :** untuk mengobati neuropati perifer (saraf tepi) dengan memperbaiki gangguan metabolisme asam nukleat dan protein di dalam jaringan saraf serta memperbaiki gangguan saraf sensoris dan motoris Lapibal mengandung senyawa aktif Mecobalamin yaitu koenzim	**Nama Obat :** Prelin 75 mg **Kandungan :** Pregabalin 75 mg **Dosis lazim :** Dosis lazim awal pregabalin (termasuk Prelin 75 mg) adalah 150 mg per hari, dibagi dalam dua dosis (misalnya, 1 kapsul 75 mg dua kali sehari) **Kegunaan** : mengurangi aktivitas listrik yang tidak normal di sistem saraf **ESO potensial :** ertigo, gangguan keseimbangan, inkoordinasi, ataksia, penglihatan kabur, dan diplopia.

		vitamin B12 yang aktif secara neurologik (bekerja di syaraf). Mecobalamin bekerja dengan menstimulai sel-sel Schwan untuk meningkatkan sintesis protein dan regenerasi saraf. **ESO potensial :** nafsu makan berkurang, mual, diare atau gangguan pencernaan lainnya, gangguan pada kulit **KI :** Hindari penggunaan apabila memiliki riwayat hipersensitif pada mecobalamin. Konsultasikan pada dokter sebelum menggunakan obat ini. **PERHATIAN :** HARUS DENGAN RESEP DOKTER. **Cara penyimpanan :** Simpan dalam kemasannya, di tempat yang tidak terkena paparan cahaya matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak. **Nama obat = Sanmol** **Kandungan** = Tablet paracetamol 500 mg **Dosis Lazim** = Dewasa dan anak >12 tahun: 1 tablet, 3-4 kali per hari. Anak: 1/2 - 1 tablet, 3-4 kali sehari. **Kegunaan** = rasa sakit termasuk sakit kepala, gigi, demam disertai *influenza* dan demam setelah imunisasi. **ESO** = reaksi hemotologi, reaksi kulit & reaksi alergi lainnya; kerusakan hati (penggunaan jangka lama dan overdosis). **KI** = hipersensitivitas, gangguan fungsi hati berat dan ginjal. **PERHATIAN** = HARUS DENGAN RESEP DOKTER **Cara penyimpanan** = Simpan Sanmol pada suhu di bawah 25° Celsius, ditempat yang kering dan lembab serta hindarkan dari paparan sinar matahari langsung **Nama obat** = Valisanbe **Kandungan** = Diazepam 2 mg	**KI :** pasien dengan hipersensitivitas terhadap obat ini karena dapat menimbulkan reaksi yang tidak dapat diprediksi dan fatal walaupun diaplikasikan pada dosis terapeutik. Reaksi dapat berupa ruam kulit ringan hingga angioedema yang berpotensi fatal. **PERHATIAN :** HARUS DENGAN RESEP DOKTER. **Cara penyimpanan :** Simpan pada suhu antara 15-30 derajat Celcius. Jauhkan dari jangkauan anak anak.	

		Dosis Lazim = Dosis lazim awal: 2-5 mg, 2-3 kali sehari. **Kegunaan** = Meredakan Kecemasan (Ansiolitik), Mengatasi Insomnia (Hipnotik), Mengatasi Kejang (Antikonvulsan), Meredakan Spasme Otot (Relaksan Otot), Mengatasi Gejala Sindrom Putus Alkohol, Sebagai Premedikasi Sebelum Prosedur Medis atau Operasi. **ESO potensial** = Gangguan pencernaan: sembelit, mual, gangguan gastrointestinal, perubahan air liur, Gangguan umum: kelelahan, ataksia, sakit di area suntikan, Gangguan sistem saraf: tremor, sakit kepala, vertigo, Gangguan kejiwaan: kebingungan, depresi, bicara cadel, Gangguan ginjal dan saluran kemih: inkontinensia urin, retensi urin, Sistem reproduksi dan gangguan payudara: perubahan libido, Gangguan pembuluh darah: hipotensi **KI** = Valisanbe tidak dianjurkan untuk digunakan dalam kondisi tertentu, seperti: Alergi terhadap valisanbe maupun kandungan yang serupa dengan obat ini. Punya riwayat penyalahgunaan zat karena valisanbe berisiko menyebabkan ketergantungan. **PERHATIAN** = Berikan informasi lengkap kepada dokter mengenai riwayat kesehatan kamu secara keseluruhan. Terutama bagi pengidap penyakit jantung, gangguan liver, atau riwayat penyalahgunaan zat. Ibu hamil dan ibu menyusui juga wajib berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi valisanbe. Dokter dapat merekomendasikan alternatif yang lebih aman untuk wanita dengan kondisi ini. **Cara penyimpanan** = Simpan Valisanbe pada suhu ruangan yang sejuk dan kering, idealnya antara 15°C - 25°C (59°F - 77°F). Hindari penyimpanan di tempat yang panas atau lembap,		

		seperti kamar mandi atau dekat jendela yang terkena sinar matahari langsung. Simpan pada lemari khusus. **Nama Obat :** Amitripilin 25 mg **Kandungan :** Escitalopram oxalate yang termasuk golongan SSRI **Dosis lazim :** Dewasa: Dosis awal 25 mg, 2 kali sehari selama 2 minggu hingga 6 bulan. Dosis dapat ditingkatkan secara bertahap menjadi 50–150 mg per hari dalam dosis terbagi. Lansia: 10–25 mg per hari, dikonsumsi pada malam hari. **Kegunaan :** mengobati depresi **ESO potensial :** mulut kering, konstipasi, mual, muntah, anoreksia, stomatitis, diare. Kondisi umum: demam, hipertermia, ataksia, edema. Saraf: nyeri kepala, kejang, inkoordinasi, tremor, neuropati perifer, kebas, gejala ekstrapiramidal. **KI :** Kontraindikasi pemberian amitriptyline adalah pada pasien dengan hipersensitivitas terhadap amitriptyline. Efikasi dan keamanan obat ini juga belum diketahui pada anak kecuali untuk tujuan penanganan enuresis nokturnal.. **PERHATIAN :** Beri tahu dokter mengenai apa saja kondisi kesehatan lain yang Anda miliki, seperti penyakit jantung, glaukoma, pembesaran prostat, kesulitan buang air kecil, hipertiroidisme, diabetes, skizofrenia, penyakit hati, dan penyakit ginjal. **Cara penyimpanan :** Simpan dalam kemasannya, di tempat yang tidak terkena paparan cahaya matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak.	

		f. Tahap pembuatan 1. Diambil Sanmol 10 tab, valisanbe 5 tab, amitripilin 2 tab 2. Disiapkan Blender/ Mortir dan stamper 3. Gerus tablet ad homogen 4. Dilakukan pengayakan pada serbuk puyer yang sudah di haluskan, ayak mengunakan ayakan no 20 5. Disiapkan cangkang kapsul sesuai dengan nomero yang diminta bagi serbuk puyer hingga jumlah setara dan dimasukkan ke dalam cangkang kapsul hingga penuh 6. Diberi etiket pada kapsul 7. Dilakukan double cek kembali pada obat, pastikan sesuai dengan resep 8. Dilakukan KIE kepada pasien/ keluarga yang mewakili.

		g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal P : pasien A : Apoteker A : panggilan obat atas nama Ny. Nur Fitriyanah silahkan menuju ke loket 4 P : (duduk di tempat pengambilan obat) A: atas nama siapa bu? (dengan wajah ramah) P : atas nama Ny, Nur Fitriyanah dengan saya sendiri bu. A : baik pak, mohon maaf sebelumnya bisa disebutkan tanggal lahirnya? P : 07-07-1989 A : baik, atas nama Ny. Nur Fitriyanah ini mendapatkan obat 3 obat ya bu, yang satunya berupa capsul racikan. Baik bu akan saya jelaskan. Untuk obat yang pertaman ibu mendapatkan obat lapibal obat ini seperti vitamin ya bu, ibu mendapatkan 15 tablet diminum 1 x 1 biji sehari ya bu, untuk obat keduanya ibu mendapatkan obat prelim 75 mg untuk mengatasi nyeri saraf diminum 1x1 biji sehari pada malam hari, untuk obat yang ketiga ibu mendapatkan kapsul racikan untuk mengatasi kecemasan berlebih. kapsul ini diminum 1x1 kapsul sehari kapsul ini juga ada efek samping mengantukya ibu, diharapkan jika ibu sedang mengendarai motor harap diminum setelah berkendara ya bu…. P : baik bu A : apakah ada yang ditanyakan lagi bu? P : sudah bu, tidak ada A : Baik bu, ini obatnya terima kasih jaga Kesehatan dan semoga lekas sembuh pak (dengan wajah ramah). P : Terima kasih

<table>
<tr><th>No</th><th>Resep</th><th>Tahapan Pengerjaan Resep</th></tr>
<tr><td>17.</td><td>Jenis Resep : Resep asli
Resep obat : non racikan
Jumlah obat dalam resep : 3 macam obat
Pengulangan resep : -
Resep Syaraf
</td><td>A. Skrinning Administrasi
<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada</td><td>TN. Khamsun</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>Tidak Ada</td><td>- kg</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada</td><td>R1: Analsik tab
R2: OL gel flamar
R3: Osteopor tab</td></tr>
<tr><td>Kekuatan :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada</td><td>R1: Analsik tab
R2: OL gel flamar
R3: Osteopor tab</td></tr>
<tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada</td><td>R1: Analsik tab No. X
R2: OL gel flamar No. I
R3: Osteopor tab No. X</td></tr>
<tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada</td><td>R1: Analsik tab
S 2x1 jika nyeri
R2: OL gel flamar
S 2x1 punggung
R3: Osteopor tab
S 1x1</td></tr>
<tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada</td><td>13-02-2025</td></tr>
<tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada</td><td>dr. Ilham Pratamanugroho, Sp.OT</td></tr>
<tr><td>Surat ijin :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada</td><td>Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jl. KH. Kholil 88 Gresik</td></tr>
</table>
B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi
Analsik (10) = diambil sebanyak 1 strip analsik
OL gel flamar (1) = diambil sebanyak 1 tube gel flamar
Osteopor (10) = diambil sebanyak 10 tablet osteopor</td></tr>
</table>

c. Perhitungan biaya resep

Analsik 1 strip Rp. 26.000
Gel flamar 20 gr 1 tube Rp. 27.000
Osteopor 10 tab (4.000/tab x 10) Rp. 40.000
Total biaya Rp. 93.000

d. ETIKET

Analsik tab/putih

Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur |Transparan| Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 P: +62 31 3981275|

TGL: 13/02/2025
ED: 18/09/2027

Tn. Khamsun
Analsik tab
2x sehari 1 biji (jika nyeri)
Sesudah makan

Flamar gel/biru

Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur |Transparan| Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 P: +62 31 3981275|

TGL: 13/02/2025
ED: 15/05/2027

Tn. Khamsun
Flamar gel
2x1 (punggung)
Oleskan pada bagian yang nyeri

Untuk Pemakaian Luar

Osteopor tab/putih

Rumah Sakit

Muhammadiyah Gresik

Jujur |Transparan| Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 P: +62 31 3981275

TGL: 13/02/2025

ED: 10/07/2026

Tn. Khamsun
Osteopor tab (vitamin tulang)
1x sehari 1 biji
Sesudah makan

e. *Product knowledge*

Nama Obat : Analsik **Kandungan** : Diazepam 2 Mg Dan Methampyrone (Metamizole) 500 Mg **Dosis lazim** : 1 kali sehari 1 kaplet, dengan hitungan 6-8 jam sekali, sampai gejala hilang **Kegunaan** : untuk meredakan nyeri yang disebabkan oleh kondisi seperti migrain, nyeri pasca operasi, nyeri otot, dan nyeri akibat peradangan **ESO potensial** : mengantuk, sakit kepala, pusing, vertigo, tekanan darah rendah, mengalami konstipasi, timbul reaksi alergi (bagi pasien yang memiliki alergi terhadap kandungan di dalam obat ini) **KI** : orang dengan riwayat hipersensitif dengan kandungan metampiron dan diazepam, atau kandungan lain dalam obat, penderita yang mengalami depresi pernapasan. **PERHATIAN** : HARUS DENGAN RESEP	**Nama Obat** : Gel flamar **Kandungan** : Diclofenac Diethylamine **Dosis lazim** : 3-4 kali sehari, maksimal 8 gr perhari **Kegunaan** : untuk meredakan gejala nyeri dan bengkak pada lutut, pergelangan kaki, siku, atau pergelangan tangan yang mengalami peradangan **ESO potensial** : gatal, kemerahan, atau iritasi lokal, eritema, pruritus atau dermatitis **KI** : Hipersensitif terhadap natrium diklofenak, Urtikaria, Asma, Rinitis akut akibat salisilat atau obat NSAID lainnya, Kehamilan trimester ketiga **PERHATIAN** : HARUS SESUAI DENGAN PETUNJUK DOKTER**,** hanya untuk penggunaan luar, wanita hamil (trimester 1-2) dan menyusui, Hati-hati penggunaan pada pasien dengan riwayat

		DOKTER, obat dalam katagori ini tidak boleh dikonsumsi wanita yang sedang hamil dan ibu yang menyusui. **Cara penyimpanan** : Simpan dalam suhu ruangan di bawah 30° C. Hindari paparan sinar matahari langsung dan tempat lembap. Tidak boleh menyimpan obat di freezer, disimpan pada lemari double lock	perdarahan gastrointestinal atau ulkus peptikum, koagulopati, faktor risiko saat ini atau risiko penyakit KV (misalnya CHF, penyakit jantung iskemik, CVA, hipertensi, edema, hiperlipidemia, diabetes mellitus) **Cara penyimpanan** : Simpan flamar gel pada suhu 20-25° C, di tempat sejuk, kering, dan terhindar dari cahaya matahari langsung. Pastikan untuk hindarkan obat dari jangkauan anak-anak.
		Nama Obat : Osteopor tab **Kandungan** : Calcium Phosphate Dibasic 400 mg, Soy Isoflavone (Glycine max) 30 mg, Vitamin D3 250 IU, Magnesium dioxide 100 mg, Zinc Sulphate 5 mg. **Dosis lazim** : 1 kali sehari, 1 kapsul **Kegunaan** : Membantu memelihara kesehatan tulang dan mempertahankan massa tulang **ESO potensial** : Mual, Diare, Muntah, Sakit kepala **KI** : Hindari penggunaan pada pasien yang memiliki riwayat hipersensitif terhadap salah satu komposisi dari Osteopor. **PERHATIAN** : - **Cara penyimpanan** : Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung	

		f. Tahap pembuatan 1. Diambil obat pada rak obat analsik sebanyak 1 strip, gel glamar 1 tube, osteopor 10 tab 2. Ditempel etiket pada kemasan obat 3. Dimasukkan kedalam plastik 4. Cek kembali kesesuaian obat yang di ambil dengan resep serta etiket yang tertempel pada kemasan obat, pastikan etiket dapat terbaca jelas oleh apoteker saat KIE kepada pasien

		g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal) Apt: Apoteker, P: Pasien Apt: atas nama Tn. Khamsun, silahkan menuju loket 4 P: (duduk di loket pengambilan obat) Apt: atas nama bapak siapa? (dengan wajah ramah) P: atas nama pak khamsun Apt: mohon maaf pak , bisa disebutkan tanggal lahirnya? P: 05 Mei 1969 bu Apt: Baik bapak saya jelaskan obatnya dulu ya, bapak ini obatnya ada 3 macam pak yaitu analsik tablet untuk nyeri diminum 2 kali sehari 1 tablet sesudah makan , ostepor untuk suplemen tulang diminum 1 kali sehari 1 tablet sesudah makan , dan flamar gel untuk mengurangi nyeri pada punggungnya bisa dioleskan 2 kali sehari . Apa ada yang di tanyakan atau kurang jelas pak dari penjelasan saya ? P: sudah tidak ada bu Apt: baik, semoga sehat selalu pak (sambil senyum) P: terima kasih bu Apt: Sama-sama pak

<table>
<tr><th>No</th><th>Resep</th><th>Tahapan Pengerjaan Resep</th></tr>
<tr><td>21</td><td>Jenis Resep : Resep asli
Resep obat : non racikan
Jumlah obat dalam resep : 6 macam obat
Pengulangan resep : -
Resep DM
</td><td>A. Skrinning Administrasi
<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada</td><td>NY. Nimatul Khusnah</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>Tidak Ada</td><td>-kg</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada</td><td>R1: Allopurinol 300mg
R2: Amlodipine 5mg
R3: Gabapentine 100mg
R4: Glimipiride 2mg
R5:Metformin
R6: Nadic gel</td></tr>
<tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada</td><td>R1: Allopurinol 300mg
R2: Amlodipine 5mg
R3: Gabapentine 100mg
R4: Glimipiride 2mg
R5:Metformin
R6: Nadic gel</td></tr>
<tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada</td><td>R1: Allopurinol 300mg No. XXX
R2: Amlodipine 5mg No. XXX
R3: Gabapentine 100mg No. XXX
R4: Glimipiride 2mg No. XXX
R5: Metformin No. XC
R6: Nadic gel No. I</td></tr>
<tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada</td><td>R1: Allopurinol 300mg
S 0-0-1
R2: Amlodipine 5mg
S 0-0-1
R3: Gabapentine 100mg
S 1x1
R4: Glimipiride 2mg
S 1-0-0 AC
R5: Metformin
S 3X1
R6: Nadic gel No. I
S UE</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Tanggal penulisan resep :	Ada	21-02-2025
Nama dokter :	Ada	dr. Nuri Indah Hapsanti, Sp. PD
Surat ijin :	Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Ada	Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jl. KH. Kholil 88 Gresik

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Allopurinol 300 yang dibutuhkan 3 strip
Amlodipine 5 yang dibutuhkan 3 strip
Gabapentine 100 yang dibutuhkan 3 strip
Glimipiride2 yang dibutuhkan 3 strip
Metformin yang dibutuhkan 9 strip
Nadic gel yang dibutuhkan 1 tube

c. Perhitungan biaya resep

Allopurinol 300 3 strip 77.000
Amlodipine 5 3 strip 5.880
Gabapentine 100 3 strip 34.653
Glimipiride 2 3 strip 7.320
Metformin 9 strip 23.380
Nadic gel 1 tube 18.000

d. ETIKET

allopurinol 300mg/putih

Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur |Transparan| Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 P: +62 31 3981275|

TGL: 21/02/2025
ED: 25/10/2027

NY. Nimatul Khusnah
Allopurinol 300mg (asam urat)
Malam x sehari 1 biji
Sesudah makan

amlodipine 5mg/putih

Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur |Transparan| Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 P: +62 31 3981275|

TGL: 21/02/2025
ED: 20/09/2027

NY. Nimatul Khusnah
Amlodipine 5 mg (hipertensi)
Malam x sehari 1 biji
Sesudah makan

gabapentine 100mg/putih

Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur |Transparan| Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 P: +62 31 3981275|

TGL: 21/02/2025
ED: 20/05/2027

NY. Nimatul Khusnah
Gabapentine 100mg (antikejang)
1x sehari 1 biji
Sesudah makan

glimipiride 2mg/putih

Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur |Transparan| Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 P: +62 31 3981275|

TGL: 21/02/2025
ED: 19/03/2027

NY. Nimatul Khusnah
Glimipiride 2mg (diabetes)
Pagi x sehari 1 biji
Sebelum makan

metformin/putih

Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur |Transparan| Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 P: +62 31 3981275|

TGL: 21/02/2025
ED: 07/05/2027

NY. Nimatul Khusnah
Metformin (diabetes)
3x sehari 1 biji

		Nadic gel/biru Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jujur |Transparan| Kekeluargaan Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 P: +62 31 3981275| TGL: 13/02/2025 ED: 15/03/2027 NY. Nimatul Khusnah Nadic gel (nyeri) Untuk Pemakaian Luar

e. *Product knowledge*

Nama Obat : Allopurinol **Kandungan** : allopurinol 300mg **Dosis lazim** : 100-300 mg sehari, dosis pemeliharaan : 200-600 mg sehari, dosis tunggal maksimum 300 mg. bila diperlukan dapat diberikan dosis yang lebih tinggi, maksimal 900 mg sehari. **Kegunaan** : Hiperurisemia primer: gout. Hiperurisemia sekunder: mencegah pengendapan asam urat dan kalsium oksalat. Produksi asam urat yang berlebihan antara lain disebakan karena polisitemia vera dan terapi sitostatik. **ESO potensial** : Hipersensitivitas. Gangguan kulit dan jaringan subkutan: pruritus, urtikaria, alopecia. Gangguan gastrointestinal: Mual, muntah, diare, sakit perut, dispepsia, kehilangan indera perasa, gastritis, mengantuk, sakit kepala. **KI** : pasien dengan kondisi Hipersensitif terhadap Allopurinol. Serangan asam urat akut. **PERHATIAN** : HARUS DENGAN RESEP DOKTER. Jangan diberikan pada keadaan gout akut. Hentikan pengobatan jika timbul ruam atau alergi kulit, dapat mengganggu kemampuan mengemudi atau mengoperasikan mesin, sebiknya hindari kegiatan-kegiatan tersebut selama mengkonsumsi obat ini. Hati-hati pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal, ibu hamil dan/atau menyusui. **Cara penyimpanan** : Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung	**Nama Obat** : Amlodipine **Kandungan** : Amlodipine 5mg **Dosis lazim** : 5 mg diminum sekali sehari **Kegunaan** : untuk pengobatan lini pertama hipertensi dan dapat digunakan sebagai agen tunggal untuk mengontrol tekanan darah pada sebagian besar pasien. Pasien yang tidak cukup terkontrol dengan obat antihipertensi tunggal (selain amlodipin) dapat memperoleh manfaat dari penambahan amlodipin, yang telah digunakan dalam kombinasi dengan diuretik thiazide, blocker, adrenoceptor blocking agent, atau ACE inhibitor. **ESO potensial** : Sakit kepala, pusing, mengantuk, debaran jantung, sakit perut, mual, edema, kelelahan. Pasien (6-17 thn): Vasodilatasi, epistaksis, kelemahan. **KI** : Hipersensitif **PERHATIAN** : HARUS DENGAN RESEP DOKTER, Gagal jantung. T berkepanjangan pada pasien dengan/gangguan fungsi hati. Kehamilan dan laktasi **Cara penyimpanan :** disimpan pada suhu ruangan 15–30°C dengan tempat yang tertutup rapat. Penyimpanan amlodipine sebaiknya terhindar dari cahaya dan tidak disimpan ditempat yang lembab atau basah

			Nama Obat : Gabapentine **Kandungan** : gabapentine 100mg **Dosis lazim** : 100–300 mg per hari, diminum 2 jam sebelum tidur. Dosis dapat ditambahkan setiap 2 minggu sampai gejala berkurang. **Kegunaan** : antikonvulsan atau anti kejang dan juga diberikan sebagai pereda nyeri neuropatik **ESO potensial** : vertigo, mulut kering, mual, pusing **KI** : pasien yang hipersensitif terhadap komponen obat **PERHATIAN** : Hati-hati penggunaan pada penderita gangguan fugsi pernafasan, gangguan ginjal, kejang campuran, pada anak-anak, orang tua, wanita hamil dan menyusui. Jangan menghentikan terapi secara mendadak, kurangi dosis secara bertahap selama minimal 7 hari **Cara penyimpanan**: Simpan gabapentin pada suhu ruangan antara 20°C dan 25°C	**Nama Obat** : Glimipiride **Kandungan** : glimipiride 2mg **Dosis lazim** : 1-2 mg, satu kali sehari **Kegunaan** : Diabetes Melitus Tipe 2 atau Non-Insulin-Dependent (type II) Diabetes Melitus (NIDDM) dimana kadar glukosa darah tidak dapat hanya dikontrol dengan diet dan olahraga saja. **ESO potensial** : -Gangguan pada saluran cerna, seperti muntah, nyeri lambung dan diare. - Reaksi alergi, bersifat sementara dan akan hilang meskipun penggunaan glimipiride dilanjutkan, jika tetap terjadi maka penggunaan glimepiride harus dihentikan. -Gangguan metabolisme berupa hiponatremia. Perubahan pada akomodasi dan/atau kaburnya penglihatan. Reaksi hematologik seperti leukopenia, agranulositosis, trombositopenia, anemia hemolitik, anemia aplastik, dan pansitopenia. **KI** : Hipersensitivitas. Pasien ketoasidosis diabetik, dengan atau tanpa koma. **PERHATIAN** : HARUS DENGAN RESEP DOKTER. Risiko hipoglikemia Tidak terkendalinya kadar glukosa darah: Bila seorang pasien, yang kondisi penyakit DM-nya stabil dengan menggunakan regimen antidiabetik tertentu, terpapar stress seperti demam, trauma, infeksi, pembedahan, kadar gluosa darah bisa tidak terkendali. **Cara penyimpanan** : Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya

		Nama Obat : Metformin **Kandungan** : metformin HCL 500mg **Dosis lazim** : Dosis awal 500–850 mg, 1–3 kali sehari, dapat ditingkatkan secara bertahap. **Kegunaan** : mengontrol dan menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Metformin termasuk ke dalam obat antidiabetes golongan Biguanide, yang bekerja dengan cara menghambat produksi glukosa (glukoneogenesis) di hati. **ESO potensial** : Gangguan saluran cerna yang bersifat sementara, namun dapat dihindari dengan cara konsumsi Metformin HCI bersamaan dengan makanan. Anoreksia, mual, muntah, daire. Berkurangnya absorpsi vitamin B12. Mialgia, kepala terasa ringan. Ruam kulit. Keringat berlebihan, dan gangguan daya pengecapan **KI** : Obat ini tidak boleh diberikan kepada pasien dengan kondisi: Penyakit ginjal dengan kadar kreatinin serum lebih dari 1.5 mg/dl. (pria) dan lebih dari 1.4 mg/dL (wanita). Infark miokard akut, septikemia, gagal jantung kongestif. Penyakit hati kronik, alkoholik, hipoksia. Asidosis metabolik akut atau kronik atau memiliki riwayat asidosis laktat, termasuk ketoasidosis dibetes dengan atau tanpa disertai koma. **PERHATIAN** : wanita hamil dan/menyusui **Cara penyimpanan** : disimpan pada kisaran suhu 20-25℃. Jauhkan dari lingkungan yang lembap, panas, atau sinar matahari **Nama Obat** : Nadic gel **Kandungan** : Diclofenac Diethylamine 1% **Dosis lazim** : 2-4 kali sehari dioles pada bagian sendi yang sakit **Kegunaan** : antiradang yang digunakan untuk mengurangi nyeri sendi ringan hingga sedang, serta meredakan gejala *arthritis* **ESO potensial** : Iritasi kulit yang ditandai dengan kulit kering kemerahan, dan gatal, pada bagian yang dioleskan, kulit kering, rasa terbakar **KI** : Alergi terhadap komposisi obat **PERHATIAN** : HARUS DENGAN RESEP DOKTER. Hentikan terapi bila terjadi kulit kering berlebihan , iritasi atau sensitisasi, hindari kontak dengan mata dan membran mukosa Cara penyimpanan : simpan ditempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung

f. Tahap pembuatan

1. Ambil obat allopurinol 300mg 3 strip, amlodipine 5mg 3 strip, gabapentine 100mg 3 strip, glimipiride 2mg 3 strip, metformin 3 strip, nadic gel 1 tube pada rak obat
2. Ditempel etiket pada kemasan obat
3. Masukkan kedalam kemasan plastik
4. Cek kembali kesesuaian obat yang di ambil dengan resep serta etiket yang tertempel pada kemasan obat, pastikan etiket dapat terbaca jelas oleh apoteker saat

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

Apt: Apoteker, P: Pasien

Apt: atas nama NY Nimatul Khusnah, silahkan menuju loket 4

P: (duduk di loket pengambilan obat)

Apt: atas nama ibu siapa? (dengan wajah ramah)

P: atas nama ibu nimatul

Apt: mohon maafbu, bisa disebutkan tanggal lahirnya?

P: 07 Juli 1972

Apt: Baik bu saya jelaskan obatnya dulu ya, bu ini obatnya ada 6 macam bu yaitu allopurinol tablet untuk asam urat diminum malam sehari 1 kali sesudah makan, amlodipine tab untuk darah tinggi diminum malam sehari 1 kali seusdah makan, gabapentine untuk nyeri diminum 1x1 sesudah makan, glimipiride untuk gula darah diminum pagi sehari 1 kali sebelum makan, metformin untuk mengontrol gula darah diminum 3x1 sesudah makan, dan nadic gel ini dioleskan pada bagian yang nyeri. Apa ada yang di tanyakan atau kurang jelas pak dari penjelasan saya?

		P: sudah tidak ada bu Apt: baik, semoga sehat selalu bu (sambil senyum) P: terima kasih bu Apt: Sama-sama bu

<table>
<tr><th>No</th><th>Resep</th><th>Tahapan Pengerjaan Resep</th></tr>
<tr><td>22.</td><td>Jenis Resep : Resep asli
Resep obat : non racikan
Jumlah obat dalam resep : 3 macam obat
Pengulangan resep : -
Resep HT
</td><td>A. Skrinning Administrasi
<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada</td><td>TN. Eko Madya Budi Utomo</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada</td><td>70 kg</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada</td><td>R1: Amlodipine
R2: KSR
R3: Neurodex</td></tr>
<tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada</td><td>Amlodipine 5 mg</td></tr>
<tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada</td><td>R1: Amlodipine 5 mg no X
R2: KSR no X
R3: Neurodex no X</td></tr>
<tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada</td><td>R1: Amlodipine 5 mg
S 1x1
R2: KSR
S 1x1
R3: Neurodex
S 1x1</td></tr>
<tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada</td><td>13-02-2025</td></tr>
<tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada</td><td>dr. M. FAKHRUDIN FAKHRY, Sp.PD</td></tr>
<tr><td>Surat ijin :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada</td><td>Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jl. KH. Kholil 88 Gresik</td></tr>
</table>
B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi
Amlodipine 5mg dibutuhkan 1 strip
KSR dibutuhkan 1 strip
Neurodex dibutuhkan 1 strip</td></tr>
</table>

c. Perhitungan biaya resep

Amlodipine 5mg tab 1.960
KSR tab 23.540
Neurodex tab 7.330
Total biaya Rp. 32.830

d. ETIKET

Amlodipine 5 mg tab/putih

Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur |Transparan| Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 P: +62 31 3981275|

TGL: 13/02/2025
ED: 23/02/2027

Tn. Eko Madya Budi Utomo
Amlodipine 5mg tab (hipertensi)
1x sehari 1 biji
Sesudah makan

KSR tab/putih

Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur |Transparan| Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 P: +62 31 3981275|

TGL: 13/02/2025
ED: 11/02/2027

Tn. Eko Madya Budi Utomo
KSR tab (suplemen)
1x sehari 1 biji
Sesudah makan

Neurodex tab/putih

Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur |Transparan| Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 P: +62 31 3981275|

TGL: 13/02/2025
ED: 13/02/2027

Tn. Eko Madya Budi Utomo
Neurodex tab (vitamin)
1x sehari 1 biji
Sesudah makan

e. *Product knowledge*

Nama Obat : Amlodipine
Kandungan : Amlodipine 5mg
Dosis lazim : 5 mg diminum sekali sehari
Kegunaan : untuk pengobatan lini pertama hipertensi dan dapat digunakan sebagai agen tunggal untuk mengontrol tekanan darah pada sebagian besar pasien. Pasien yang tidak cukup terkontrol dengan obat antihipertensi tunggal (selain amlodipin) dapat memperoleh manfaat dari penambahan amlodipin, yang telah digunakan dalam kombinasi dengan diuretik thiazide, blocker, adrenoceptor blocking agent, atau ACE inhibitor.
ESO potensial : Sakit kepala, pusing, mengantuk, debaran jantung, sakit perut, mual, edema, kelelahan. Pasien (6-17 thn): Vasodilatasi, epistaksis, kelemahan.
KI : Hipersensitif
PERHATIAN : HARUS DENGAN RESEP DOKTER, Gagal jantung. T

Nama Obat : KSR tab
Kandungan : kalium klorida 600mg
Dosis lazim : 2-3 kali sehari, 1-2 tablet
Kegunaan ; pengobatan dan pencegahan hipokalemia
ESO potensial : mual, muntah, diare, nyeri perut
KI : gagal ginjal tahap lanjut, penyaki addison yang tidak diobati, dehidrasi akut, hiperkalemia
PERHATIAN : HARUS DENGAN RESEP DOKTER. Gagal jantung kongestin, gangguan fungsi ginjal
Cara penyimpanan : Simpan KSR 600 pada suhu ruang, di tempat yang kering dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung serta jauhkan dari jangkauan anak-anak.

			berkepanjangan pada pasien dengan/gangguan fungsi hati. Kehamilan dan laktasi **Cara penyimpanan** : disimpan pada suhu ruangan 15–30^{o}C dengan tempat yang tertutup rapat. Penyimpanan amlodipine sebaiknya terhindar dari cahaya dan tidak disimpan ditempat yang lembab atau basah	
			Nama Obat : Neurodex tab **Kandungan** : vitamin B1 mononitrate 100mg, vitamine B6 HCl 200mg, vitamin B12 mcg **Dosis lazim** : 1 tablet sehari **Kegunaan** : untuk pengobatan kekurangan vitamin B1, B6, B12 seperti pada polineuritis **ESO potensial** : pemakaian vitamin B6 dosis besar dalam jangka panjang dapat menyebabkan sindrom neuropati **KI** : hipersensitif terhadap kandungan obat ini **PERHATIAN** : setidaknya tidak digunakan untuk pasien yang sedang menerima terapi kevodopa **Cara penyimpanan** : disimpan di tempat kering dan sejuk serta jauhkan dari cahaya sinar matahari langsung dan tempat yang lembap.	

f. Tahap pembuatan

1. Diambil obat pada rak obat aamlodipine 5mg sebanyak 1 strip, KSR tab sebanyak 1 strip, Neurodex sebanyak 1 strip
2. Ditempel etiket pada kemasan obat
3. Dimasukkan kedalam plastik
4. Cek kembali kesesuaian obat yang di ambil dengan resep serta etiket yang tertempel pada kemasan obat, pastikan etiket dapat terbaca jelas oleh apoteker saat KIE kepada pasien

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

Apt: Apoteker, P: Pasien

Apt: atas nama Tn. Eko Madya Budi Utomo, silahkan menuju loket 4

P: (duduk di loket pengambilan obat)

Apt: atas nama bapak siapa? (dengan wajah ramah)

P: atas nama pak eko madya

Apt: mohon maaf pak , bisa disebutkan tanggal lahirnya?

P: 18 November 1980 bu

Apt: Baik bapak saya jelaskan obatnya dulu ya, bapak ini obatnya ada 3 macam pak yaitu amlodipine 5mg tablet untuk hipertemsi diminum 1 kali sehari 1 tablet sesudah makan, KSR tab untuk suplemen kalium diminum 1 kali sehari 1 tablet sesudah makan , dan Neurodex tab untuk kekurangan vitamin B1, B6, dan B12 diminum 1 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Apa ada yang di tanyakan atau kurang jelas pak dari penjelasan saya?

P: sudah tidak ada bu

Apt: baik, semoga sehat selalu pak (sambil senyum)

P: terima kasih bu

<table>
<tr><th>No</th><th>Resep</th><th>Tahapan Pengerjaan Resep</th></tr>
<tr><td>23.</td><td>Jenis Resep : Resep asli
Resep obat : racikan
Jumlah obat dalam resep : ~~Polifarmasi (>/~~Tidak
Pengulangan resep : -
Resep racikan dewasa
</td><td>A. Skrinning Administrasi
<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada</td><td>Lisnur Aini</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>Tidak Ada</td><td>- kg</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada</td><td>Na Diclofenac Gel
Meloxicam
Eperisone
Valisanbe
Parasetamol</td></tr>
<tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada</td><td>Meloxicam 15mg
Eperisone 50mg
Valisanbe 2mg
Parasetamol 200mg</td></tr>
<tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada</td><td>Na Diclofenac gel
Meloxicam tab
Eperisone tab
Valisanbe tab
Parasetamol tab</td></tr>
<tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada</td><td>Na Diclofenac Gel No. I
Meloxicam 15mg
Eperisone 50mg
Valisanbe 2mg
Parasetamol 200mg</td></tr>
<tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada</td><td>Na Diclofenac Gel
Sue

Meloxicam 15mg
Eperisone 50mg
Valisanbe 2mg
Parasetamol 200mg
mfla pulv da in cap No. X
S 2x1</td></tr>
<tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada</td><td>12-03-2025</td></tr>
<tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada</td><td>dr. YULI INDAH KURNIASARI,</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		Sp.KFR
Surat ijin :	Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Ada	Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jl. KH. Kholil 88 Gresik

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

Na diclofenac 1 gel
Meloxicam tab 15mg = 15 x 10 : 15 = 10 tab
Eperisone tab 50mg = 50 x 10 : 50 = 10 tab
Valisanbe tab 2 mg = 2 x 10 : 5 = 4 tab
Parasetamol tab 200mg = 200 x 10 : 500 = 4 tab
Tus capsul kosong 131/pcs x 10 caps = 1.310

c. Perhitungan biaya resep

Na Diclofenac Gel = 15.984
Meloxicam = 2.090
Eperisone = 9.670
Valisanbe = 3.000
Paracetamol = 8.00
Capsul kosong = 1.310
Total semua = 32.854

d. ETIKET

Nadic gel/biru

Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur |Transparan| Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 P: +62 31 3981275|
TGL: 12/03/2025
ED: 14/03/2027
Lisnur Aini
Nadic gel (nyeri)
Untuk Pemakaian Luar

Puyer (racikan)/putih

Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur |Transparan| Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 P: +62 31 3981275|

TGL: 12/03/2025
ED: 12/04/2025

Lisnur Aini
Obat Nyeri
2x sehari 1biji

e. *Product knowledge*

Nama Obat : Nadic gel **Kandungan** : Diclofenac Diethylamine 1% **Dosis lazim** : 2-4 kali sehari dioles pada bagian sendi yang sakit **Kegunaan** : antiradang yang digunakan untuk mengurangi nyeri sendi ringan hingga sedang, serta meredakan gejala *arthritis* **ESO potensial** : Iritasi kulit yang ditandai dengan kulit kering kemerahan, dan gatal, pada bagian yang dioleskan, kulit kering, rasa terbakar **KI** : Alergi terhadap komposisi obat **PERHATIAN** : HARUS DENGAN RESEP DOKTER. Hentikan terapi bila terjadi kulit kering berlebihan , iritasi atau sensitisasi, hindari kontak dengan mata dan membran mukosa Cara penyimpanan : simpan ditempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung	**Nama Obat** : Meloxicam **Kandungan** : Meloxicam 15 mg **Dosis lazim** : Dewasa: Rhematoid Astritis dan Ankylosing Spondylitis: 15 mg, 1 kali per hari. Dapat diturunkan menjadi 7.5 mg, 1 kali per hari berdasarkan respon terapetik. Osteo Astritis: 7.5 mg, 1 kali per hari. Dapat ditingkankan s/d 15 mg, 1 kali per hari. Anak >60 kg: Artritis idiopatik juvenil: 7,5 mg sekali sehari. Lansia dan pasien ginjal: 7.5 mg, 1 kali per hari **Kegunaan** : Meredakan gejala-gejala arthritis, misalnya peradangan, pembengkakan, serta kaku dan nyeri otot. Contoh penyakit radang persendian yang biasanya ditangani dengan meloxicam adalah osteoartritis (jangka pendek), rheumatoid arthritis, dan ankylosing spondylitis. **ESO potensial** : Retensi cairan, edema, insufisiensi ginjal, gagal ginjal akut,

			nekrosis papiler ginjal (penggunaan jangka panjang), hiperkalemia, penglihatan kabur, anemia, jarang, agranulositosis, trombositopenia, leukopaenia. Gangguan sistem darah dan limfatik: Anemia, jarang, agranulositosis, trombositopenia, leukopaenia. Gangguan jantung: Gagal jantung, jarang, palpitasi. Gangguan gastrointestinal: Dispepsia, mual, muntah, sakit perut, sembelit, perut kembung, diare, melena, hematemesis, stomatitis ulserativa, jarang, gastritis. Gangguan umum dan kondisi situs admin: Malaise, **KI** : Hipersensitif terhadap meloxicam, aspirin atau NSAID lainnya. Riwayat atau perdarahan gastrointestinal aktif, ulserasi atau perforasi yang berhubungan dengan penggunaan NSAID. Penyakit radang usus aktif (misalnya penyakit Crohn pada kolitis ulserativa), gagal jantung berat. Pengobatan nyeri perioperatif dalam pengaturan operasi CABG. Kerusakan hati yang parah. Kehamilan (trimester ke-3) dan menyusui. **PERHATIAN** : Hati-hati peggunaan pada pasien dengan asma, riwayat penyakit maag atau perdarahan gastrointestinal baru-baru ini, hipertensi, MI baru-baru ini, faktor risiko CV lainnya (misalnya hiperlipidemia, diabetes mellitus, merokok), retensi cairan dan edema, hipovolemia, koagulopati. Pasien dehidrasi dan lemah. Ginjal dan

				gangguan hati ringan sampai sedang. Anak-anak dan orang tua. Kehamilan (trimester 1-2). Penggunaan bersama NSAID lainnya, kortikosteroid, antiplatelet, antikoagulan. Kategori kehamilan: Kategori C: Mungkin berisiko. Obat digunakan dengan hati-hati apabila besarnya manfaat yang diperoleh melebihi besarnya risiko terhadap janin. Penelitian pada hewan uji menunjukkan risiko terhadap janin dan belum terdapat penelitian langsung terhadap wanita hamil. **Cara penyimpanan** : Simpan pada suhu dibawah 30℃
			Nama Obat: Eperisone **Kandungan**: Eperisone HCl 50 mg **Dosis Lazim**: 1 tablet, diminum 3 kali per hari **Kegunaan**: Untuk pengobatan simtomatik pada kondisi yang berhubungan dengan spasme muskuloskeletal **ESO Potensial**: Lemah, pusing, insomnia, mengantuk, rasa kebas atau gemetar pada ekstremitas, gangguan fungsi hati dan ginjal, kelainan hematologi, ruam kulit, gangguan Gl, gangguan pada saluran kemih **KI** : Ibu menyusui. Myasthenia gravis (keadaan melemahnya otot tubuh akibat gangguan pada saraf dan otot).	**Nama Obat**: Valisanbe **Kandungan** : Diazepam **Dosis lazim** : Dewasa : 5 - 15 mg sebelum tidur, Lansia : Berikan setengah dosis **Kegunaan** : Obat valisanbe digunakan untuk premedikasi atau pemeliharaan dan pemulihan anestesi serta untuk memberikan efek tenang dalam prosedur bedah dan medis minor. Selain itu, manfaat valisanbe juga dapat dirasakan pasien dengan kondisi berikut: Kecemasan parah Kejang otot Sindrom penarikan alkohol Insomnia yang berhubungan dengan kecemasan **ESO potensial** : efek samping yang dapat terjadi setelah pemakaian

		Cara Penyimpanan: Simpan pada suhu dibawah 30℃	valisanbe: Gangguan mata: penglihatan kabur, diplopia Gangguan pencernaan: sembelit, mual, gangguan gastrointestinal, perubahan air liur. Gangguan umum: kelelahan, ataksia, sakit di area suntikan. Gangguan sistem saraf: tremor, sakit kepala, vertigo Gangguan kejiwaan: kebingungan, depresi, bicara cadel. Gangguan ginjal dan saluran kemih: inkontinensia urin, retensi urin Sistem reproduksi dan gangguan payudara: perubahan libido Gangguan pembuluh darah: hipotensi **KI** : - **PERHATIAN** :- **Cara penyimpanan** : Simpan pada suhu dibawah 30℃	
		Nama obat : Paracetamol **Kandungan** : paracetamol 500mg **Dosis lazim** : Dewasa: 500 – 1.000 mg atau 10 – 15 mg/kgBB, setiap 4 – 6 jam. Pada usia dewasa, dosis maksimal paracetamol sebesar 4.000 mg per hari. ·Bayi dan anak-anak: 10 – 15 mg/kgBB, dengan lebih dari 4 – 6 jam. Dosis paracetamol pada bayi dan anak tidak boleh melebihi 15 mg/kgBB per dosis. **Kegunaan** : meredakan rasa nyeri dan menurunkan demam **ESO Potensial** : reaksi hipersensitifitas/alergi **KI** : hipersensitif/alergi pada paracetamol, penderita gangguan fungsi hati berat **PERHATIAN** : hati hati penggunaan pada pasien dengan gagal ginjal, gangguan fungsi hati, dan alergi atau mengalami hipersensitif terhadap paracetamol **Cara penyimpanan** : disimpan dalam tempat yang rapat dan terlindung dari sinar matahari dengan suhu < 25 C.			

f. Tahap pembuatan

1. Ambil obat natrium diklofenac gel 1 buah, siapkan meloxicam,valisanbe,eperisone, paracetamol dan blender
2. masukkan kedalam cangkang kapsul bagi menjadi 10 kapsul beri etiket
3. Tempelkan etiket pada kemasan obat
4. Masukkan kedalam kemasan plastic
5. Cek kembali kesesuaian obat yang di ambil dengan resep serta etiket yang tertempel pada kemasan obat, pastikan etiket dapat terbaca jelas oleh apoteker saat KIE kepada pasien

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

Apt: Apoteker, P: Pasien
Apt: atas nama Lisnur Aini , silahkan menuju loket 4
P: (duduk di loket pengambilan obat)
Apt: atas nama ibu siapa? (dengan wajah ramah)
P: atas nama bu lisnur aini
Apt: mohon maaf bu, bisa disebutkan tanggal lahirnya?
P: 28 April 1967 bu
Apt: Baik bu saya jelaskan obatnya dulu ya, ini obatnya ada 2 macam bu yaitu, diclofenac gel untuk nyeri oleskan pada bagian yang nyeri, dan kapsul untuk nyeri diminum 2 kali sehari 1 kapsul sesudah makan. Apa ada yang di tanyakan atau kurang jelas bu dari penjelasan saya?
P: sudah tidak ada bu
Apt: baik, semoga sehat selalu bu (sambil senyum)
P: terima kasih bu
Apt: Sama-sama pak

<table>
<tr><th>No</th><th>Resep</th><th>Tahapan Pengerjaan Resep</th></tr>
<tr><td>24.</td><td>Jenis Resep : ~~Salinan~~/Resep asli
Resep obat : ~~Racikan~~/non racikan
Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/~~Tidak~~
Pengulangan resep : Iter 2 kali/~~Neiter~~
Tempel Resep/salin resep disini!

Resep iter
 
</td><td>A. Skrinning Administrasi<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>Alik Sumartawanto</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>~~Ada~~/Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>60 kg</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>1. Adalat Oros
2. Allopurinol
3. Mecobalamin</td></tr>
<tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>1. Adalat Oros 30 mg
2. Allopurinol 100 mg
3. Mecobalamin 500 mg</td></tr>
<tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>Tablet</td></tr>
<tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>1. Adalat Oros 30 mg No. XXX
2. Allopurinol 100 mg No. XXX
3. Mecobalamin 500 mg No. XXX</td></tr>
<tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>~~Ada~~/Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>1. Adalat Oros 30 mg
S1 dd I
2. Allopurinol 100 mg
S0-0-1
3. Mecobalamin 500 mg
S1 dd 1</td></tr>
<tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>17 – 01 – 25</td></tr>
<tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>Dr. Atika Mira, Sp.N</td></tr>
<tr><td>Surat ijin :</td><td>~~Ada~~/Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Alamat dr. :</td><td>~~Ada~~/Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

1. Adalat Oros 30 mg No. XXX

2. Allopurinol 100 mg No. XXX

3. Mecobalamin 500 mg No. XXX

c. Perhitungan biaya resep

1. Adalat Oros 30 mg No. XXX
Adalat Oros 30 mg = Rp. 12.703,- / tab
= Rp. 12.703,- X 30 tab
= Rp. 381.090

2. Allopurinol 100 mg No. XXX
Allopurinol 100 mg = Rp. 445,- / tab
= Rp. 445,- X 30 tab
= Rp. 13.350

3. Mecobalamin 500 mg No. XXX
Mecobalamin 500 mg = Rp. 1.358,- / tab
= Rp. 1.358,- X 30 tab
= Rp. 40.740

d. ETIKET

Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik
Jujur | Transparan | Kekeluargaan
Jl. KH. Khalil 86 Gresik 61115 P: +62 31 3981275 | F: +62 31 3995459

No. RM : 220220 TGL : 06/5/25
TGL LAHIR : - ED : 05/6/26
NAMA OBAT : Adalat oros 30 mg

1 x SEHARI 1 BUI / ML / SENDOK TAKAR / MAKAN
SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN

06-07	09-10	11-12	13-14	14-15
15-16	16-17	18-19	20-21	21-23

Kesembuhan dari ALLAH SWT.
Berdo'alah sebelum minum obat

Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik
Jujur | Transparan | Kekeluargaan
Jl. KH. Khalil 86 Gresik 61115 P: +62 31 3981275 | F: +62 31 3995459

Agam Utat

No. RM : 220220 TGL : 06/5/25
TGL LAHIR : - ED : 06/6/26
NAMA OBAT : Allopurinol 100 mg

malam

1 x SEHARI 1 BUI / ML / SENDOK TAKAR / MAKAN
SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN

06-07	09-10	11-12	13-14	14-15
15-16	16-17	18-19	20-21	21-23

Kesembuhan dari ALLAH SWT.
Berdo'alah sebelum minum obat

Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik
Jujur | Transparan | Kekeluargaan
Jl. KH. Khalil 86 Gresik 61115 P: +62 31 3981275 | F: +62 31 3995459

Utt

No. RM : 220220 TGL : 06/5/25
TGL LAHIR : - ED : 06/6/26
NAMA OBAT : Mecobalamin 500 mg

1 x SEHARI 1 BUI / ML / SENDOK TAKAR / MAKAN
SEBELUM / SAAT / SESUDAH MAKAN

06-07	09-10	11-12	13-14	14-15
15-16	16-17	18-19	20-21	21-23

Kesembuhan dari ALLAH SWT.
Berdo'alah sebelum minum obat

e. *Product knowledge*

Nama Obat : Adalat Oros 30 mg Kandungan : Nifedipine 30 mg Dosis lazim : 1. Untuk Raynaud's syndrome Dosis dewasa immediate – release : 5 – 20 mg (3 x sehari) 2. Untuk hipertensi atau tekanan darah tinggi Dosis dewasa Immediate – release Dosis awal : 5 mg (3x sehari) Pemeliharaan : 10- 20 mg (3x sehari) Extended-release Dosis awal : 10 – 40 mg (2x sehari) atau 20- 90 mg (1 x sehari) 3. untuk angina pectoris Dosis dewasa Dosis awal : 10 – 40 mg (2 x sehari) atau 30 – 90 mg (1 x sehari) Kegunaan : Hipertensi (tekanan darah tinggi), angina pektoris (nyeri dada akibat suplai darah ke jantung berkurang) ESO potensial : Sakit kepala, wajah kemerahan (flushing), pusing atau lemes, edema (bengkak, di pergelangan kaki, palpitasi (jantung berdebar), mual KI : Alergi terhadap nifedipin,	Nama Obat : Mecobalamin 500 mg Kandungan : Mecobalamin 500 mg Dosis lazim : Dewasa : Umumnya 500 mcg 1–3 kali sehari**,** tergantung pada kebutuhan dan respon pasien. Dosis dapat berbeda tergantung indikasi (oral atau injeksi) Kegunaan : Neuropati perifer, neuropati diabetik, defisiensi vitamin B12, membantu regenerasi dan perlindungan saraf ESO potensial : mual ringan, diare, reaksi alergi (ruam dan gatal) KI : alergi terhadap mecobalamin atau bentuk vitamin B12 lainnya PERHATIAN : gunakan hati – hati pasien gangguan fungsi ginjal berat, tidak menggantikan terapi utama jika ada penyebab lain neuropati, tidak untuk digunakan jangka panjang tanpa evaluasi medis Cara penyimpanan : Mecobalamin 500 mg disimpan di tempat yang kering dengan suhu di bawah 30°C, dijauhkan dari paparan sinar matahari langsung dan kelembapan, serta disimpan di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak

		syok kardiogenik, stenosis aorta berat, serangan jantung akut (dalam 1- 2 minggu terakhir) PERHATIAN : Adalat OROS 30 mg harus digunakan dengan hati-hati, terutama pada lansia, penderita hipotensi, atau gangguan hati, dan tidak boleh dihentikan mendadak. Konsultasi diperlukan jika dikombinasikan dengan obat lain, serta penggunaannya saat hamil harus mempertimbangkan manfaat dan risiko Cara penyimpanan : Obat Adalat OROS 30 mg disimpan di tempat yang kering dengan suhu di bawah 30°C, dijauhkan dari paparan sinar matahari langsung dan kelembapan, serta disimpan di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak		
		Nama Obat : Allopurinol 100 mg Kandungan : Allopurinol 100 mg Dosis lazim : Dewasa (asam urat tinggi/gout): Awal: 100 mg per hari, ditingkatkan secara bertahap sesuai kadar asam urat darah. Dosis pemeliharaan: 100–300 mg per hari (bisa dibagi 1–3 kali sehari). Dosis maksimal: 800 mg per hari, tergantung kondisi klinis dan fungsi ginjal.		

		Kegunaan : Gout (asam urat tinggi), batu ginjal akibat asam urat, hiperurisemia sekunder (msl akibat kanker atau kemoterapi) ESO potensial : Ruam kulit ringan, gangguan pencernaan (mual, muntah atau diare), pusing, sakit kepala KI : alergi terhadap allopurinol, serangan gout akut sedang berlangsung (harus ditunda sampai serangan mereda) PERHATIAN : gunakan hati – hati pada pasien dengan gangguan ginjal atau hati, awal terapi bisa memicu serangan gout ringan (biasanya diberikan bersamaan colchicine atau NSAID saat awal pengobatan), pastikan hidrasi cukup untuk mencegah batu ginjal, pemantauan kadar asam urat dan fungsi ginjal secara berkala penting Cara penyimpanan : Allopurinol 100 mg disimpan di tempat yang kering dengan suhu di bawah 30°C, dijauhkan dari paparan sinar matahari langsung dan kelembapan, serta disimpan di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak	

f. Tahap pembuatan

Tahapan pengambilan obat dimulai dari skrining resep, yaitu memeriksa identitas pasien dan memastikan resep lengkap serta sesuai, mulai dari nama obat, dosis, bentuk obat, jumlah, dan aturan pakainya. Setelah itu, dicek juga apakah obat tersebut cocok untuk kondisi pasien, serta memastikan tidak ada obat yang sama, alergi, atau interaksi yang bisa membahayakan. Jika ada yang kurang jelas, petugas akan menghubungi dokter untuk klarifikasi. Setelah resep jelas, obat disiapkan sesuai kebutuhan, diperiksa tanggal kedaluwarsanya, dan diberi label berisi nama obat, aturan pakai, dan nama pasien. Obat kemudian diserahkan kepada pasien disertai penjelasan melalui KIE, yaitu memberi informasi tentang nama dan fungsi obat, cara pakai yang benar, efek samping yang mungkin muncul, serta cara penyimpanan obat. Pasien juga diingatkan untuk menghubungi tenaga kesehatan bila muncul keluhan atau tidak ada perbaikan selama penggunaan obat.

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

A : Selamat siang, dengan Bapak Alik Sumartawanto?
P : Iya, saya sendiri.
A : Baik, Pak. Bapak mendapatkan tiga obat, saya jelaskan secara singkat ya.
(Sambil menunjukkan obat satu per satu dengan senyum ramah)
A : Yang pertama, Adalat Oros 30 mg, untuk menurunkan tekanan darah. Diminum satu kali sehari, jangan dikunyah atau dihancurkan ya, Pak.
P : Baik, satu kali ya Bu.
A : Lalu Allopurinol 100 mg, untuk mengontrol kadar asam urat. Diminum satu kali sehari setelah makan.
P : Oke, setelah makan ya.
A : Dan yang terakhir, Mecobalamin 500 mg, untuk membantu perbaikan saraf. Diminum sesuai anjuran dokter, biasanya satu kali sehari.
(Apoteker memberikan obat dengan etiket lengkap dan senyum)
A : Semua obat disimpan di tempat yang sejuk dan kering ya, Pak. Kalau ada keluhan atau efek samping, silakan segera konsultasi ke dokter.
P : Siap, terima kasih banyak, Bu.
A : Sama-sama, Pak Alik. Semoga lekas sehat, ya.

<table>
<tr><th>No</th><th>Resep</th><th>Tahapan Pengerjaan Resep</th></tr>
<tr>
<td>25.</td>
<td>Jenis Resep : ~~Salinan~~/Resep asli
Resep obat : ~~Racikan~~/non racikan
Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/~~Tidak~~
Pengulangan resep : Iter 2 kali/~~Neiter~~
Tempel Resep/salin resep disini!

Resep iter
 </td>
<td>A. Skrinning Administrasi
<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>Achmad Masrur Ansori</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>52 tahun</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>~~Ada~~/Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>1. Amlodipine 10 mg
2. Analsik 10 mg
3. Bisoprolol 2,5 mg
4. Ramipril 10 mg
5. Caviplex
6. CPG 75 mg
7. Fenitoin 100 mg
8. Fonylin MR 60 mg
9. Galvus
10. Sucralfat</td></tr>
<tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>1. Amlodipine 10 mg
2. Analsik 10 mg
3. Bisoprolol 2,5 mg
4. Ramipril 10 mg
5. Caviplex
6. CPG 75 mg
7. Fenitoin 100 mg
8. Fonylin MR 60 mg
9. Galvus 50 mg
10. Sucralfat syr</td></tr>
<tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>Tablet dan syirup</td></tr>
<tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>1. Amlodipine 10 mg No. XXX
2. Analsik 10 mg No. X
3. Bisoprolol 2,5 mg No. XXX
4. Ramipril 10 mg No. XXX
5. Caviplex No. X
6. CPG 75 mg No. VII
7. Fenitoin 100 mg No. VII
8. Fonylin MR 60 mg No. XXX
9. Galvus 50 mg No. LX
10. Sucralfat syr No. I</td></tr>
<tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>~~Ada~~/Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

Aturan pakai :	Ada/~~Tidak Ada~~	1. Amlodipine 10 mg S 1X1 2. Analsik 10 mg S 3X1 3. Bisoprolol 2,5 mg S 1X1 4. Ramipril 10 mg S 1X1 5. Caviplex S 1X1 6. CPG 75 mg S 1X1 7. Fenitoin 100 mg S 1X1 8. Galvus 50 mg S 0-1-1 9. Sucralfat syr S 3X1 CTH
Tanggal penulisan resep :	Ada/~~Tidak Ada~~	21- 02 – 2025
Nama dokter :	Ada/~~Tidak Ada~~	dr. Nuri Indah H, Sp.PD
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-
Alamat dr. :	~~Ada~~/Tidak Ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

1. Amlodipine 10 mg	No. XXX
2. Analsik 10 mg	No. X
3. Bisoprolol 2,5 mg	No. XXX
4. Ramipril 10 mg	No. XXX
5. Caviplex	No. X
6. CPG 75 mg	No. VII
7. Fenitoin 100 mg	No. VII
8. Fonylin MR 60 mg	No. XXX
9. Galvus 50 mg	No. LX
10. Sucralfat syr	No. I

c. Perhitungan biaya resep

1. Amlodipine 10 mg No. XXX
   Amlodipine 10 mg = Rp. 926,5 / tab
   = Rp. 926,5 X 30 tab
   = Rp. 27.795
2. Analsik 10 mg No. X
   Analsik 10 mg = Rp. 2.531,- / tab
   = Rp. 2.531,- X 10 tab
   = Rp. 25.310
3. Bisoprolol 2,5 mg No. XXX
   Bisoprolol 2,5 mg = Rp. 726,-/ tab
   = Rp. 726,- X 30 tab
   = Rp. 21.780
4. Ramipril 10 mg No. XXX
   Ramipril 10 mg = Rp. 1.500 / tab
   = Rp. 1.500 X 30
   = Rp. 45.000
5. Caviplex No. X
   Caviplex = Rp. 9.844 / strip (isi 10 tab)
6. CPG 75 mg No. VII
   CPG 75 mg = Rp. 30.686 / tab
   = Rp. 30.686 X 7
   = Rp. 214.802
7. Fenitoin 100 mg No. VII
   Fenitoin 100 mg = Rp. 1.136 / caps
   = Rp. 1.136 X 7
   = Rp. 7.952
8. Fonylin MR 60 mg No. XXX
   Fonylin MR 60 mg = Rp. 7.203 / tab
   = Rp. 7.203 X 30
   = Rp. 216.090
9. Galvus 50 mg No. LX
   Galvus 50 mg = Rp. 11.011 / tab
   = Rp. 11.011 X 60
   = Rp. 660.660

		10. Sucralfat syr No. I Sucralfat syr = 26.458 / botol d. ETIKET

e. *Product knowledge*

Nama Obat : Amlodipine 10 mg Kandungan : Amlodipine besylate 10mg (golongan Calcium Channel Blocker) Dosis lazim : Dewasa: 5–10 mg sekali sehari. Dosis dapat disesuaikan tergantung respons dan kondisi pasien Kegunaan : Untuk mengobati tekanan darah tinggi (hipertensi) dan angina (nyeri dada akibat penyakit jantung koroner)	Nama Obat : Bisoprolol 2,5 mg Kandungan : Bisoprolol fumarate 2,5 mg, termasuk dalam golongan beta blocker selektif Dosis lazim : hipertensi atau angina: mulai dari 2,5 mg sekali sehari, dapat ditingkatkan bertahap sesuai kondisi pasien (umumnya hingga 5–10 mg/hari). Untuk gagal jantung: biasanya dimulai dari dosis rendah, misalnya 1,25 mg kemudian ditingkatkan perlahan Kegunaan : mengobati tekanan darah tinggi

		ESO potensial : Pusing, sakit kepala, bengkak di pergelangan kaki (edema), jantung berdebar, atau kelelahan KI : Alergi terhadap amlodipine atau obat golongan CCB lain, gagal jantung berat, hipotensi (tekanan darah sangat rendah) PERHATIAN : Gunakan dengan hati-hati pada pasien dengan gangguan hati, penderita gagal jantung, dan lansia. Hindari menghentikan obat secara mendadak tanpa anjuran dokter Cara penyimpanan : Amlodipine 10 mg disimpan di tempat yang kering dengan suhu di bawah 30°C, dijauhkan dari paparan sinar matahari langsung dan kelembapan, serta disimpan di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak	(hipertensi), angina pektoris (nyeri dada), dan gagal jantung kronik stabil ESO potensial : Pusing, kelelahan, denyut jantung melambat (bradikardia), tekanan darah rendah, dingin di tangan/kaki, atau gangguan tidur KI : Alergi terhadap bisoprolol, gagal jantung akut, asma berat, gangguan irama jantung berat (blok AV), atau syok kardiogenik PERHATIAN : Gunakan dengan hati-hati pada pasien dengan asma ringan, diabetes, gangguan hati atau ginjal, dan lansia. Jangan dihentikan secara mendadak karena bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah atau gejala jantung memburuk Cara penyimpanan : bisoprolol 2,5 mg disimpan di tempat yang kering dengan suhu di bawah 30°C, dijauhkan dari paparan sinar matahari langsung dan kelembapan, serta disimpan di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak	
		Nama Obat : Analsik 10 mg Kandungan :Kombinasi Metampiron (metamizole) dan Antispasmodik (seperti Diazepam atau Pitofenone) Dosis lazim : Dewasa: 1 tablet, 2–3 kali sehari sesuai kebutuhan. Dosis disesuaikan dengan intensitas nyeri dan respon pasien Kegunaan : Untuk meredakan nyeri sedang hingga berat, seperti nyeri haid,	Nama Obat : Ramipril 10 mg Kandungan : Ramipril 10 mg Dosis lazim : Dosis awal biasanya 2,5–5 mg sekali sehari, kemudian dapat ditingkatkan hingga maksimal 10 mg per hari, tergantung kondisi pasien dan respons terhadap pengobatan Kegunaan : Untuk menurunkan tekanan darah tinggi (hipertensi), mengobati gagal jantung, dan mencegah komplikasi	

		nyeri otot, sakit gigi, atau nyeri akibat kejang otot ESO potensial : Mual, pusing, kantuk, reaksi alergi, atau gangguan pencernaan. Jarang, bisa terjadi gangguan darah (seperti agranulositosis) KI : Alergi terhadap Metampiron atau komponen lain, gangguan fungsi hati atau ginjal berat, kehamilan trimester akhir, atau gangguan darah tertentu PERHATIAN : Gunakan hati-hati pada penderita asma, gangguan hati atau ginjal. Hindari penggunaan jangka panjang tanpa pengawasan medis Cara penyimpanan : Analsik 10 mg disimpan di tempat yang kering dengan suhu di bawah 30°C, dijauhkan dari paparan sinar matahari langsung dan kelembapan, serta disimpan di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak	kardiovaskular seperti serangan jantung atau stroke pada pasien berisiko tinggi ESO potensial : Batuk kering, pusing, sakit kepala, kelelahan, peningkatan kadar kalium, atau gangguan fungsi ginjal. Jarang, bisa menyebabkan reaksi alergi atau angioedema (pembengkakan wajah/tenggorokan KI : Tidak boleh digunakan pada pasien dengan hipersensitivitas terhadap ACE inhibitor, riwayat angioedema, kehamilan, atau gangguan ginjal berat PERHATIAN : Hati-hati digunakan pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal, hati, atau pasien lanjut usia. Monitor tekanan darah, fungsi ginjal, dan elektrolit selama penggunaan. Hindari digunakan bersamaan dengan suplemen kalium atau diuretik hemat kalium tanpa pengawasan Cara penyimpanan : Ramipril 10 mg disimpan di tempat yang kering dengan suhu di bawah 30°C, dijauhkan dari paparan sinar matahari langsung dan kelembapan, serta disimpan di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak
		Nama obat : caviplex Kandungan : Kombinasi vitamin dan mineral, yaitu vitamin a, vitamin b kompleks (b1, b2, b6, b12), vitamin c, d, e, serta mineral seperti kalsium, fosfor, dan nikotinamid (niacinamide) Dosis lazim : 1 kapsul per hari atau sesuai anjuran dokter	Nama Obat : CPG 75 mg Kandungan : Clopidogrel bisulfate 75 mg**,** termasuk golongan antiplatelet (anti agregasi trombosit) Dosis lazim : 75 mg sekali sehari, bisa ditambah dosis awal 300 mg pada kasus akut (misalnya sindrom koroner akut), sesuai anjuran dokter	

		Kegunaan : Membantu memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral, meningkatkan daya tahan tubuh, mengatasi kelelahan, serta menunjang pemulihan setelah sakit ESO potensial : Mual, nyeri perut ringan, atau reaksi alergi ringan seperti gatal. Jika dikonsumsi berlebihan bisa menimbulkan hipervitaminosis (kelebihan vitamin tertentu) KI : Alergi terhadap salah satu komponen dalam caviplex. Hati-hati pada pasien dengan gangguan ginjal berat (karena kandungan vitamin tertentu, seperti vitamin a atau d) PERHATIAN : Gunakan sesuai dosis. Hindari konsumsi bersamaan dengan suplemen lain yang mengandung vitamin serupa agar tidak berlebihan. Konsultasikan dengan dokter bila sedang hamil, menyusui, atau memiliki kondisi medis khusus Cara penyimpanan : Caviplex disimpan di tempat yang kering dengan suhu di bawah 30°c, dijauhkan dari paparan sinar matahari langsung dan kelembapan, serta disimpan di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak	Kegunaan : Mencegah pembekuan darah, terutama pada pasien dengan penyakit jantung koroner, stroke, atau setelah pemasangan stent jantung ESO potensial : Pendarahan (gusi berdarah, mimisan, lebam), gangguan pencernaan, ruam kulit, atau sakit kepala. Efek samping serius yang jarang trombositopenia atau reaksi alergi berat KI : Tidak boleh digunakan pada pasien dengan perdarahan aktif (misalnya tukak lambung berdarah), gangguan hati berat, atau alergi terhadap clopidogrel PERHATIAN : Gunakan dengan hati-hati pada pasien dengan riwayat perdarahan, cedera baru, atau pasien yang sedang minum obat pengencer darah lain. Hentikan sementara sebelum operasi besar (sesuai arahan dokter). Pantau tanda-tanda perdarahan Cara penyimpanan : Clopidogrel disimpan di tempat yang kering dengan suhu di bawah 30°c, dijauhkan dari paparan sinar matahari langsung dan kelembapan, serta disimpan di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak
		Nama Obat : Fenitoin 100 mg Kandungan : Fenitoin sodium 100 mg per kapsul/tablet	Nama Obat : Fonylin MR 60 mg Kandungan : Theophylline anhydrous 60 mg dalam bentuk modified release (MR) tablet

		Dosis lazim : Dewasa : Awal: 300 mg per hari (dalam dosis terbagi 3 x 100 mg). Pemeliharaan: 300–400 mg per hari, tergantung respons pasien Anak – anak : 5 mg/kg berat badan per hari, dibagi dalam 2–3 dosis Kegunaan : Mengontrol kejang pada epilepsi, mencegah kejang selama atau setelah operasi otak, dan aritmia jantung ESO potensial : Pusing, mengantuk, mual, gusi bengkak, ruam kulit, ataksia, nistagmus KI : Alergi terhadap fenitoin atau turunan hidantoin lainnya, riwayat gangguan hati parah akibat penggunaan fenitoin sebelumnya, blok jantung tinggi PERHATIAN : Hati – hati pada pasien dengan gangguan fungsi hati, ginjal, atau diabetes, wanita hamil berisiko terhadap janin, bisa menurunkan efektivitas kontrasepsi hormonal Cara penyimpanan : Fenitoin disimpan di tempat yang kering dengan suhu di bawah 30°c, dijauhkan dari paparan sinar matahari langsung dan kelembapan, serta disimpan di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak	Dosis lazim : Dewasa dan anak – anak > 12 tahun : 150–300 mg per hari dalam dosis terbagi (biasanya setiap 12 jam, tergantung formulasi dan respons pasien) Anak – anak 6-12 tahun : 12–18 mg/kg berat badan per hari, dibagi dalam 2 dosis Kegunaan : Mengatasi dan mencegah asma bronkial dan terapi tambahan untuk PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronik) ESO potensial : Mual, muntah, sakit kepala, gelisah, insomia, jantung berdebar, tremor KI : Alergi terhadap theophylline atau xanthine lain, riwayat kejang yang tidak terkontrol, gangguan jantung berat PERHATIAN : Pemantauan kadar darah diperlukan karena rentang terapi sempit, hati – hati pada penderita gangguan hati, jantung, atau tukak lambung, interaksi dengan banyak obat seperti antibiotik (eritomisin), antiepilepsi dan rokok dapat mempengaruhi kadar theophylline, tidak dianjurkan untuk anak <6 tahun tanpa pengawasan dokter Cara penyimpanan : Fonylin MR 60 mg disimpan di tempat yang kering dengan suhu di bawah 30°c, dijauhkan dari paparan sinar matahari langsung dan kelembapan, serta disimpan di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak	
		Nama Obat : Galvus 50 mg Kandungan : Vildagliptin 50 mg per	Nama Obat : Sucralfat syr Kandungan : Sucralfate 1 gram per 5 mL sirup (kadar bisa sedikit berbeda tergantung merek).	

		tablet Dosis lazim : Monoterapi atau kombinasi dengan metformin/ sulfonilurea/ tiazolidindion/ insulin : 50 mg 1-2 kali sehari (maksimal 100 mg per hari) Bila digunakan dengan sulfoniurea : dosis biasanya 50 mg sekali sehari Kegunaan : Mengontrol kadar gula darah pada pasien diabetes melitus tipe 2 sebagai tambahan siet dan olahraga, bisa digunakan sebagai monoterapi atau dalam kombinasi dengan obat antidiabetik lain (metformin, sulfonilurea, insulin) ESO potensial : Sakit kepala, mual, pusing, nyeri sendi KI : Alergi terhadap vildagliptin atau komponen lain dalam obat, diabetes tipe 1 atau ketoasidosis diabetik PERHATIAN :Gunakan hati – hati pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau hati, tidak direkomdasikan pada ibu hamil atau menyusui kecuali sangat dibutuhkan, hati – hati bila digunakan bersamaan dengan obat yang dapat menyebabkan hipoglikemia Cara penyimpanan : Galvus disimpan di tempat yang kering dengan suhu di bawah 30°c, dijauhkan dari paparan sinar matahari langsung dan	Dosis lazim : Dewasa : 1 gram (5 ml) 4 kali sehari**,** 1 jam sebelum makan dan sebelum tidur. Atau sesuai anjuran dokter Anak – anak : Dosis ditentukan oleh dokter berdasarkan usia dan berat badan Kegunaan : mengobati tukak lambung dan tukak duodenum, melindungi lapisan lambung dan usus dari asam lambung, digunakan untuk gastritis atau iritasi lambung akibat obat NASAID ESO potensial : sembelit, mulut kering, mual, gangguan pencernaan, kembung atau rasa penuh KI : alergi terhadap sucralfate, pasien dengan obstruksi usus berat (penyumbatan saluran cerna) PERHATIAN : hati –hati pada pasien dengan gangguan ginjal, karena risiko penumpukan aluminium, dapat mengganggu penyerapan obat lain diberi jarak 2 jam antar obat, tidak untuk jangka panjang tanpa pengawasan medis Cara penyimpanan : Sucralfat Syrup disimpan di tempat yang kering dengan suhu di bawah 30°c, dijauhkan dari paparan sinar matahari langsung dan kelembapan, serta disimpan di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak	

		kelembapan, serta disimpan di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak		

f. Tahap pembuatan

Tahapan pengambilan obat dimulai dari skrining resep, yaitu memeriksa identitas pasien dan memastikan resep lengkap serta sesuai, mulai dari nama obat, dosis, bentuk obat, jumlah, dan aturan pakainya. Setelah itu, dicek juga apakah obat tersebut cocok untuk kondisi pasien, serta memastikan tidak ada obat yang sama, alergi, atau interaksi yang bisa membahayakan. Jika ada yang kurang jelas, petugas akan menghubungi dokter untuk klarifikasi. Setelah resep jelas, obat disiapkan sesuai kebutuhan, diperiksa tanggal kedaluwarsanya, dan diberi label berisi nama obat, aturan pakai, dan nama pasien. Obat kemudian diserahkan kepada pasien disertai penjelasan melalui KIE, yaitu memberi informasi tentang nama dan fungsi obat, cara pakai yang benar, efek samping yang mungkin muncul, serta cara penyimpanan obat. Pasien juga diingatkan untuk menghubungi tenaga kesehatan bila muncul keluhan atau tidak ada perbaikan selama penggunaan obat.

		g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal) A : Selamat pagi, Bapak Ahmad Mansur Ansori? P : Ya, saya sendiri, Bu. A : Baik, Pak. Di sini Bapak mendapatkan 10 obat. Saya jelaskan singkat ya. (Sambil menunjukkan obat satu per satu) A : Amlodipine, Bisoprolol, dan Ramipril diminum sekali sehari untuk tekanan darah, pagi hari ya, Pak. Analsik untuk nyeri, hanya diminum jika diperlukan. Caviplex suplemen vitamin, diminum sekali sehari setelah makan. CPG 75 mg untuk mencegah penggumpalan darah, sekali sehari. Fenitoin untuk mencegah kejang, diminum sesuai jadwal dokter. Fonylin MR membantu pernapasan, diminum rutin. Galvus untuk gula darah, diminum 1–2 kali sehari sesuai anjuran. Sucralfat sirup untuk lambung, diminum 1 jam sebelum makan. (Apoteker menyerahkan obat dengan etiket lengkap) A : Semua obat disimpan di tempat sejuk, kering, dan jauh dari jangkauan anak-anak. Bila ada keluhan, segera konsultasikan ke dokter ya, Pak. P : Baik, terima kasih banyak, Bu. A : Sama-sama, Pak. Semoga lekas sehat.

<table>
<tr><th>No</th><th>Resep</th><th>Tahapan Pengerjaan Resep</th></tr>
<tr><td>26.</td><td>Jenis Resep : ~~Salinan/~~Resep asli
Resep obat : ~~Racikan~~/non racikan
Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi ~~(>/Tidak~~
Pengulangan resep : Iter...kali/Neiter
Tempel Resep/salin resep disini!

Resep iter
 </td><td>A. Skrinning Administrasi
<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>Musriah</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>58 tahun 7 bulan 26 hari</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>74 kg</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>1. Glucosamin
2. Candesartan
3. Acarbose
4. Adalat Oros
5. Simvastatin</td></tr>
<tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>1. Glucosamin 500 mg
2. Candesartan 8 mg
3. Acarbose 100 mg
4. Adalat Oros 30 mg
5. Simvastatin 20 mg</td></tr>
<tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>Tablet</td></tr>
<tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>1. Glucosamin 500 mg No. XXX
2. Candesartan 8 mg No. XXX
3. Acarbose 100 mg No. LX
4. Adalat Oros 30 mg No. XXX
5. Simvastatin 20 mg No. XXX</td></tr>
<tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>~~Ada~~/Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/~~Tidak Ada~~</td><td>1. Glucosamin 500 mg No. XXX
S 1 dd 1 Tab pc Po

2. Candesartan 8 mg No. XXX
S 1 dd 1 darah tinggi

3. Acarbose 100 mg No. LX
S 2 dd 1 Tab pc Po

4. Adalat Oros 30 mg No. XXX
S 1 dd 1 darah tinggi

5. Simvastatin 20 mg No. XXX</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		S1 dd 1 Tab pc Po malam hari
Tanggal penulisan resep :	Ada/~~Tidak Ada~~	10 – 02 – 2025
Nama dokter :	Ada/~~Tidak Ada~~	dr. Umar Nur Rachman, Sp.PD
Surat ijin :	Ada/~~Tidak Ada~~	503.446/861/B/IP.DS/436.7.17/2021
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

1. Glucosamin 500 mg No. XXX
2. Candesartan 8 mg No. XXX
3. Acarbose 100 mg No. LX
4. Adalat Oros 30 mg No. XXX
5. Simvastatin 20 mg No. XXX

c. Perhitungan biaya resep

1. Glucosamin 500 mg No. XXX
Glucosamin 500 mg = 2.355,2/ tablet
= 2.355,2 X 30 tablet
= Rp. 70.656

2. Candesartan 8 mg No. XXX
Candesartan 8 mg = 2.058/ tablet
= 2.058 X 30 tablet
= Rp. 61.740

3. Acarbose 100 mg No. LX
Acarbose 100 mg = 2.504/ tablet
= 2.504 X 60 tablet
= Rp. 150.240

4. Adalat Oros 30 mg No. XXX
Adalat Oros 30 mg = 12.703/ tablet
= 12.703 X 30 tablet
= Rp. 381.090

		5. Simvastatin 20 mg No. XXX Simvastatin 20 mg = 777/ tablet = 777 X 30 tablet = Rp. 23.310

d. ETIKET



e. *Product knowledge*

Nama Obat : Glucosamin 500 mg Kandungan : Glucosamine sulfate 500 mg per tablet Dosis lazim : Dewasa : 500 mg tiga kali sehari atau 1500 mg sekali sehari. Dosis dapat berbeda tergantung kondisi dan anjuran dokter Kegunaan : membantu mengurangi nyeri dan memperbaiki fungsi sendi pada pasien osteoartritis (radang sendi), membantu memperbaiki kerusakan tulang rawan ESO potensial : gangguan pencernaan, mjal, diare, konstipasi, sakit kepala, mengantuk, lelah KI : alergi terhadap glucosamine atau produk kerang (karena sering berasal dari cangkang kerang), anak- anak, ibu hamil dan ibu menyususi (kecuali atas anjuran dokter) PERHATIAN : hati – hati pada pasien dengan diabetes karena glucosamine dapat mempengaruhi kadar gula darah, gunakan dengan hati – hati pada pasien dengan gangguan hati atau ginjal, efek terapeutik biasanya terlihat setelah beberapa minggu penggunaan rutin Cara penyimpanan : glucosamine 500 mg disimpan di tempat yang kering dengan suhu di bawah 30°c, dijauhkan dari	Nama Obat : Candesartan 8 mg Kandungan : candesartan cilexetil 8 mg per tablet Dosis lazim : Dewasa (hipertensi) : awal = 8 mg sekali sehari dapat ditingkatkan hingga 16- 32 mg per hari sesuai respons Dewasa (gagal jantung) : awal = 4 mg sekali sehari ditingkatkan bertahap hingga dosis maksimum 32 mg per hari Kegunaan : hipertensi (tekanan darah tinggi), membantu mengelola gagal jantung kronik, menurunkan risiko komplikasi kardiovaskular seperti stroke atau serangan jantung ESO potensial : pusing atau sakit kepala, kelelahan, hipotensi, peningkatan kadar kalium darah, gangguan fungsi ginjal KI : alergi terhadap candesartan atau komponen obat lainnya, kehamilan (terutama trimester kedua dan ketiga), pasien dengan angioedema akibat penggunaan obat golongan ARB/ACE- inhibitor PERHATIAN : monitor tekanan darah secara berkala, periksa fungsi ginjal dan kadar kalium darah secara rutin terutama pada pasien dengan penyakit ginjal atau mengonsumsi diuretik, hati – hati pada pasien dengan hipovolemia atau gangguan elektrolit , tidak dianjurkan digunakan bersamaan dengan suplemen kalium atau diuretik kalium tanpa pengawasan dokter

		paparan sinar matahari langsung dan kelembapan, serta disimpan di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak	Cara penyimpanan : candesartan 8 mg disimpan di tempat yang kering dengan suhu di bawah 30°c, dijauhkan dari paparan sinar matahari langsung dan kelembapan, serta disimpan di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak	
		Nama Obat : Acarbose 100 mg Kandungan : acarbose 100 mg per tablet Dosis lazim : Dewasa (diabetes tipe 2) : dosis awal = 25 mg 3 kali sehari ditingkatkan bertahap menjadi 50- 100 mg 3 kali sehari tergantung respons dan toleransi pasien. Diminum bersamaan dengan suapan pertama saat makan utama Kegunaan : mengontrol kadar gula pada pasien diabetes militus tipe 2 terutama setelah makan (gula darah postprandial), sering dikombinasikan dengan obat diabetes lain seperti metformin atau insulin ESO potensial : perut kembung, diare, nyeri perut, gas berlebih (efek ini biasanya berkurang seiring waktu) KI : alergi terhadap acarbose, penyakit usus kronis, gangguan fungsi hati berat, kehamilan dan menyusui PERHATIAN : monitor kadar gulah darah secara teratur, hati – hati pada pasien usia lanjut dan memiliki gangguan pencernaan, bila terjadi hipoglikemia dan pasien menggunakan acrabose bersamaan dengan obat lain	Nama Obat : Adalat Oros 30 mg Kandungan : nifedipine 30 mg dalam bentuk sediaan lepas lambat (OROS = osmotic-controlled release oral delivery system) Dosis lazim : Dewasa (hipertensi dan angina pektoris) = 30-60 mg sekali sehari ditelan utuh (jangan dikunyah atau dihancurkan). Dosis disesuaikan dokter sesuai respons pasien Kegunaan : mengobati hipertensi, mengatasi angina pektoris ESO potensial : sakit kepala, wajah kemerahan, pusing, kaki bengkak, jantung berdebar KI : alergi terhadap nifedipine, syok kardiogenik, stenosis arota berat, ibu hamil trimester pertama PERHATIAN : jangan mengahancurkan atau mengunyah tablet OROS karena dapat menyebabkan efek samping berat, hati – hati pada pasien dengan gangguan hati, gagal jantung, atau pasien lanjut usia, hindari konsumsi jus grapefruit karena dapat meningkatkan kadar nifedipine dalam darah, monitor tekanan darah secara rutin Cara penyimpanan : adalat oros 30 mg disimpan di tempat yang kering dengan suhu di	

		maka gunakan glukosa (bukan sukrosa/ gula biasa) karena penyerapan sukrosa terganggu oleh acarbose Cara penyimpanan : acarbose disimpan di tempat yang kering dengan suhu di bawah 30°c, dijauhkan dari paparan sinar matahari langsung dan kelembapan, serta disimpan di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak	bawah 30°c, dijauhkan dari paparan sinar matahari langsung dan kelembapan, serta disimpan di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak	
		Nama Obat : Simvastatin 20 mg Kandungan : simvastatin 20 mg per tablet Dosis lazim : Dewasa (hiperkolesterolemia) : dosis awal umum = 10 – 20 mg sekali sehari diminum pada malam hari. Dosis dapat ditingkatkan hingga 40 mg/ hari sesuai respon pasien dan arahan dokter Kegunaan : menurunkan kadar kolesterol total, LDL dan trigliserida, meningkatkan kadar HDL, mencegah risiko penyakit jantung dan stroke pada pasien berisisko tinggi ESO potensial : nyeri otot, lemas, sakit kepala, gangguan pencernaan, penigkatan enzim hati KI : alergi terhadap simvastatin, penyakit hati aktif, wanita hamil atau menyusui, penggunaan bersamaan dengan obat tertentu seperti ketoconazole, erythromycin atau gemfibrozil		

		PERHATIAN : lakukan pemeriksaan fungsi hati secara berkala saat penggunaan jangka panjang, hati – hati pada pasien dengan riwayat penyakit otot, usia lanjut atau penggunaan obat lain yang berisiko interaksi, segera laporkan bila mengalami nyeri otot, lemas, atau urine berwarna gelap Cara penyimpanan : simvastatine 20 mg disimpan di tempat yang kering dengan suhu di bawah 30°c, dijauhkan dari paparan sinar matahari langsung dan kelembapan, serta disimpan di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak		

f. Tahap pembuatan

Tahapan pembuatan resep dimulai dari pemeriksaan kelengkapan resep, seperti nama pasien, tanggal, nama dan jumlah obat, serta dosis yang sesuai. Setelah itu, dilakukan penyiapan obat sesuai permintaan resep, yaitu Glucosamin 30 tablet, Candesartan 30 tablet, Acarbose 60 tablet, Adalat Oros 30 tablet, dan Simvastatin 30 tablet. Obat-obat tersebut kemudian diberi etiket yang memuat nama obat, aturan pakai, serta identitas pasien. Selanjutnya, obat dikemas sesuai bentuk sediaannya dengan kemasan yang aman dan bersih. Setelah dikemas, obat diserahkan kepada pasien disertai edukasi mengenai cara penggunaan, efek samping yang mungkin terjadi, serta cara penyimpanan yang benar. Terakhir, dilakukan pencatatan dan dokumentasi resep sesuai prosedur pelayanan kefarmasian.

		g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal) A : Selamat pagi, Pak. Apakah benar dengan Nyonya Musriah? P : Iya, Bu. Saya Ahmad. A : Baik, Pak. Hari ini Bapak mendapatkan lima jenis obat. Saya bantu jelaskan satu per satu, ya. (Apoteker menatap pasien dengan ramah dan menunjukkan obat satu per satu) A : Pertama, Glucosamin 500 mg, ini suplemen untuk membantu menjaga kesehatan sendi. Diminum satu kali sehari setelah makan. A : Kedua, Candesartan 8 mg, obat untuk menurunkan tekanan darah. Diminum satu kali sehari, sebaiknya pada waktu yang sama setiap hari. A : Ketiga, Acarbose 100 mg, ini untuk membantu mengontrol gula darah. Diminum tiga kali sehari, bersama gigitan pertama saat makan. P : Oh, jadi Acarbose diminum pas mulai makan ya, Bu? A : Betul, Pak. Obat ini bekerja di saluran cerna, jadi harus diminum saat mulai makan. A : Keempat, Adalat Oros 30 mg, untuk tekanan darah tinggi juga. Diminum satu kali sehari, jangan dikunyah atau dihancurkan. A : Dan terakhir, Simvastatin 20 mg, untuk menurunkan kolesterol. Diminum malam hari sebelum tidur, karena tubuh memproduksi kolesterol paling banyak di malam hari. (Apoteker menyerahkan obat sambil menunjuk etiketnya masing-masing) A : Semua obat ini disimpan di tempat yang sejuk dan kering, serta jauh dari jangkauan anak-anak. Kalau ada keluhan seperti pusing, mual, atau keluhan lain, segera hubungi dokter. P : Siap Bu, terima kasih atas penjelasannya. A : Sama-sama Pak Ahmad, semoga sehat selalu ya.

<table>
<tr><th>No</th><th>Resep</th><th>Tahapan Pengerjaan Resep</th></tr>
<tr><td>27.</td><td>Jenis Resep : ~~Salinan~~/Resep asli
Resep obat : ~~Racikan~~/non racikan
Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak
Pengulangan resep : ~~Iter... kali~~/~~Neiter~~
Tempel Resep/salin resep disini!

Resep lainnya

</td><td>A. Skrinning Administrasi
<table>
<tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Agus Salim</td></tr>
<tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>1. Cefixime
2. Orinox
3. Sagestam Cream</td></tr>
<tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>1. Cefixime 200 mg
2. Orinox 60 mg
3. Sagestam cream</td></tr>
<tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tablet dan cream</td></tr>
<tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>1. Cefixime 200 mg No. XIV
2. Orinox 60 mg No. VIII
3. Sagestam cream No. I</td></tr>
<tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>1. Cefixime 200 mg No. XIV
S 2 DD 1

2. Orinox 60 mg No. VIII
S 1 DD 1

3. Sagestam cream No. I
S UE</td></tr>
<tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>13 - 02 – 2025</td></tr>
<tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>dr. Dono Marsetio Wibiseno, Sp.B</td></tr>
<tr><td>Surat ijin :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

1. Cefixime 200 mg	No. XIV
2. Orinox 60 mg	No. VIII
3. Sagestam cream	No. I

c. Perhitungan biaya resep

1. Cefixime 200 mg No. XIV
Cefixime 200 mg = 4.497/ tablet
= 4.497 X 14 tablet
= Rp. 62.958

2. Orinox 60 mg No. VIII
Orinox 60 mg = 11.058/ tablet
= 11.058 X 8 tablet
= Rp. 88.464

3. Sagestam cream No. I
Sagestam cream = 19.984/ tube
= 19.984 X 1
= 19.984

		d. ETIKET  Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik No. RM : 222400 TGL : 6/5/25 TGL LAHIR : 1984-8-15 ED : 6/5/25 NAMA OBAT : 1 x SEHARI BUTIR/ML/ SENDOK TAKAR / MAKAN SEBELUM / SESUDAH MAKAN 06-07 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 14-15 15-16 | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 21-23 Kesembuhan dari ALLAH SWT. Berdo'alah sebelum minum obat Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik No. RM : 222400 TGL : 6/5/25 TGL LHR : 1984-8-15 ED : 6/5/25 NAMA OBAT : ANTIBIOTIK, DIMINUM TERATUR SAMPAI HABIS 2 x SEHARI 1 BUTIR/ML/SENDOK TAKAR/MAKAN SEBELUM / SESUDAH MAKAN 06-07 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 15-16 | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik No. RM / ID : 221400 TGL : 6/5/25 NAMA OBAT : Sagestam oralam ED : 6/6/25 INDIKASI : bisul Tn. Agus Sanen OBAT LUAR 1 x SEHARI 06-07 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 15-16 | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 21-22 | 22-23 |

e. *Product knowledge*

Nama Obat : Cefixime 200 mg Kandungan : cefixime 200 mg per tablet Dosis lazim : Dewasa dan anak – anak : 200 mg- 400 mg per hari bisa dalam dosis tunggal atau dibagi dua (misalnya 200 mg setiap 12 jam). Durasi pemakaian biasanya 5-10 hari tergantung jenis dan berat infeksi Kegunaan : mengobati infeksi bakteri seperti infeksi saluran kemih, infeksi saluran napas atas dan bawah, otitis media, gonore tanpa komplikasi, infeksi kulit dan jaringan lunak ESO potensial : gangguan pencernaan, mual, diare, sakit perut, reaksi alergi, ruam, gatal, sakit kepala KI : alergi terhadap cefixime, sefalosporin, atau penisilin, pasien dengan riwayat reaksi hipersensitivitas berat terhadap antibiotik beta- laktam PERHATIAN : hati – hati pada pasien dengan gangguan ginjal (dosis perlu disesuaikan), gunakan hingga habis sesuai anjuran, meskipun gejala sudah membaik, tidak efektif untuk infeksi virus seperti flu dan batuk, bisa mempengaruhi hasil tes gula urin Cara penyimpanan : cefixime 200 mg disimpan di tempat yang kering dengan suhu di bawah 30°c, dijauhkan dari	Nama Obat : Sagestam cream Kandungan : fusidic acid 2 % Dosis lazim : dioleskan tipis pada area kulit yang terinfeksi 2 – 3 kali sehari. Durasi penggunaan umumnya 5-7 hari atau sesuai petunjuk dokter Kegunaan : impetigo, folikulitis, furunkel (bisul), luka kecil atau goresan yang terinfeksi, infeksi kulit ringan lainnya yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus ESO potensial : iritasi ringan di kulit (kemerahan, gatal, rasa terbakar), ruam, reaksi alergi KI : alergi terhadap fusidic acid atau komponen lain dalam krim, jangan digunakan pada mata, dalam hidung atau mulut, tidak dianjurkan untuk luka luas tanpa petunjuk dokter PERHATIAN : gunakan hanya pada area yang terinfeksi, hindari penggunaan jangka panjang tanppa pengawasan karena dapat menimbulkan resistensi bakter, bila tidak membaik dalam beberapa hari, konsultasikan kembali ke dokter, tidak untuk penggunaan dalam jangka panjang atau luas tanpa petunjuk medis Cara penyimpanan : Sagestam cream disimpan di tempat yang kering dengan suhu di bawah 30°c, dijauhkan dari paparan sinar matahari langsung dan kelembapan, serta disimpan di

		paparan sinar matahari langsung dan kelembapan, serta disimpan di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak	tempat yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak	
		Nama Obat : Orinox 60 mg Kandungan : Etoricoxib 60 mg per tablet Dosis lazim : osteoartritis 60 mg sekali sehrai, artritis reumatoid atau ankylosing spondylitis 60-90 mg per hari (dosis tergantung anjuran dokter), nyeri akut atau nyeri gigi 60-120 mg per hari untuk jangka pendek (maksimal 8 hari) Kegunaan : osteoartritis, artritis reumatoid, ankylosing spondylitis, nyeri otot dan sendi, nyeri gigi akut ESO potensial : sakit kepala, pusing, gangguan pencernaan, mual, sakit perut, diare, tekanan darah meningkat, retensi cairan (pembengkakan) KI : alergi terhadap etoricoxib atau obat golongan NSAID lainnya, pasien dengan gagal jantung, penyakit jantung iskemik, stroke atau hipertensi tidak terkontrol, pasien dengan gangguan hati atau ginjal berat, kehamilan dan menyusui PERHATIAN : gunakan dengan hati – hati pada pasien lanjut usia atau dengan riwayat penyakit jantung, tidak boleh digunakan jangka panjang tanpa pengawasan dokter, hindari konsumsi bersamaan dengan alkohol atau obat lain yang mempengaruhi lambung dan ginjal,		

		priksa tekanan darah secara berkala saat penggunaan Cara penyimpanan : Orinox disimpan di tempat yang kering dengan suhu di bawah 30°c, dijauhkan dari paparan sinar matahari langsung dan kelembapan, serta disimpan di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak		

f. Tahap pembuatan

Tahapan pembuatan resep dimulai dengan memeriksa kelengkapan resep, seperti nama pasien, tanggal, nama obat, jumlah, dan dosis. Setelah itu, disiapkan obat sesuai resep, yaitu Cefixime 200 mg sebanyak 10 tablet, Orinox 60 mg sebanyak 10 tablet, dan Sagestam cream 1 tube. Masing-masing obat diberi etiket yang mencantumkan nama pasien, aturan pakai, dan identitas obat. Obat lalu dikemas sesuai bentuk sediaannya dengan kemasan yang bersih dan aman. Selanjutnya obat diserahkan kepada pasien disertai edukasi tentang cara pakai, efek samping, dan penyimpanan.

		g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal) A : Selamat siang, Pak. Dengan Tuan Agus Salim, betul ya? P : Iya, betul Bu. Saya Agus Salim. A : Baik, Pak Agus. Di sini Bapak mendapatkan tiga jenis obat ya, saya jelaskan satu per satu. (Apoteker menatap pasien dengan ramah dan menunjukkan masing-masing obat) A : Obat pertama adalah Cefixime 200 mg, antibiotik untuk infeksi. Diminum dua kali sehari setelah makan, pagi dan malam. Obat ini harus dihabiskan meskipun Bapak merasa sudah membaik. P : Baik, dua kali ya Bu, dan tetap dihabiskan. A : Benar, Pak. Lalu yang kedua, Orinox 60 mg, ini obat untuk nyeri atau peradangan. Diminum sekali sehari setelah makan. P : Satu kali sehari, ya? A : Betul, Pak. Dan yang terakhir adalah Sagestam cream, ini untuk infeksi kulit. Dioleskan tipis-tipis pada bagian yang sakit, dua sampai tiga kali sehari. (Apoteker tersenyum dan menyerahkan obat sambil menunjuk etiket pada masing-masing kemasan) A : Semua obat disimpan di tempat yang kering dan sejuk, serta jauh dari jangkauan anak-anak ya, Pak. Kalau ada keluhan seperti gatal, mual, atau reaksi kulit yang tidak biasa, segera konsultasikan ke dokter. P : Siap, Bu. Terima kasih banyak atas penjelasannya. A : Sama-sama, Pak Agus. Semoga lekas sembuh, ya.

28

Jenis Resep : Resep salinan
Resep obat : Non Racikan
Jumlah obat dalam resep : ~~Polifarmasi~~
(~~>~~/Tidak
Pengulangan resep : -

Resep salinan 1

E. Skrining Administrasi

Nama Pasien :	Ada	Siti Kholifah Ny
Umur pasien :	Ada	50 tahun
Berat Badan :	Tidak Ada	- kg
Nama Obat :	Ada	**R1 :** Adalat Orros **R2 :** Bisoprolol 2,5 g **R3** : Candarin 16 mg **R4** : Pepsol **R5** : Sanmag
Kekuatan :	2 Ada 3 Tidak ada	**R1 :** Adalat Orros - **R2 :** Bisoprolol 2,5 g **R3** : Candarin 16 mg **R4** : Pepsol - **R5** : Sanmag -
Bentuk sed. :	Tidak Ada	-
Jumlah obat :	Ada	**R1 :** Adalat Orros No. 30 : 2= 15 **R2 :** Bisoprolol 2,5 g No. 30 : 2 = 15 **R3** : Candarin 16 mg No. 30 : 2 = 15 **R4** : Pepsol No. 10 : 2 = 5 **R5** : Sanmag (Sudah diambil semua) = 0
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada	**R1 :** Adalat Orros S 0-0-1 (sehari sekali dimalam hari) **R2 :** Bisoprolol 2,5 g S 1X1 **R3** : Candarin 16 mg S 1X1 **R4** : Pepsol S 2x1 **R5** : Sanmag S 2x1
Penulisan resep :	Tidak Ada	-
Nama dokter :	Ada	dr. Nuri Indah Hapsanti, Sp. PD
Surat ijin :	Tidak Ada	-

Alamat dr. :	Tidak Ada	-

F. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R1 : Adalat Orros No. 30 : 2= 15
R2 : Bisoprolol 2,5 g No. 30 : 2 = 15
R3 : Candarin 16 mg No. 30 : 2 = 15
R4 : Pepsol No. 10 : 2 = 5
R5 : Sanmag (Sudah diambil semua) = 0

G. Perhitungan Biaya Resep

R1 : Adalat Orros No. 30 : 2= 15 → Jumlah obat yang dibutuhkan x harga obat per tablet → 15 tab x Rp. 5.500 = Rp. 82.500
R2 : Bisoprolol 2,5 g No. 30 : 2 = 15 → Jumlah obat yang dibutuhkan x harga obat per tablet → 15 tab x Rp. 726 = Rp. 10.890
R3 : Candarin 16 mg No. 30 : 2 = 15 → Jumlah obat yang dibutuhkan x harga obat per tablet → 15 tab x Rp. 13.000 = Rp. 195.000
R4 : Pepsol No. 10 : 2 = 5 → Jumlah obat yang dibutuhkan x harga obat per tablet → 5 tab x Rp. 2.400 = Rp. 12.000
R5 : Sanmag (Sudah diambil semua) = 0
Maka, biaya keseluruhan resep adalah Rp. 300.390

H. Etiket

Nama Obat /warna etiket :

R/ Adalat orros

Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur | Transparan | Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 | P: +62 31 3981275 F: +62 31 3945459

Nama : Ny. Siti Kholifah TGL : 26/02/25
No. RM : ED 03/03/27
Tgl. Lahir : 1974-09-05
1 X 1 malam hari
Sesudah makan

R/ Bisoprolol 2,5

Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur Transparan Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 | P: +62 31 3981275 F: +62 31 3945459

Nama : Ny. Siti Kholifah TGL : 26/02/25
No.RM : ED
10/04/26
Tgl. Lahir : 1974-09-05
1 X 1 sehari
Sesudah makan

R/ Candarin 16

Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 , P: +62 31 3981275 F: +62 31 3945459

Nama : Ny. Siti Kholifah TGL : 26/02/25
No.RM : ED
04/01/27
Tgl. Lahir : 1974-09-05
1 X 1 sehari
Sesudah makan

R/ Pepsol

Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur| Transparan |Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 |P: +62 31 3981275 |F: +62 31 3945459

Nama : Ny. Siti Kholifah TGL : 26/02/25
No.RM : ED
03/03/27
Tgl. Lahir : 1974-09-05
2 X 1 malam hari
Sesudah makan

e. *Product knowledge*

1. Nama obat = Adalat Orros
Kandungan = Nifedipine GITS (Gastro Intestial Therapeutic System) 30 mg
Dosis Lazim = 30 mg dalam 1 hari
Kegunaan = Hipertensi, angina pectoris kronik stabil.
ESO = Sakit kepala, adema perifer
KI = Hiper sensitifitas, syok kardiovaskular.
PERHATIAN = HARUS DENGAN RESEP DOKTER
Cara penyimpanan = Simpan Sanmol pada suhu ruang, ditempat yang kering dan lembab serta hindarkan dari paparan sinar matahari langsung.

2. Nama obat = Bisoprolol 2,5
Kandungan = Bisoprolol furumate 2,5 mg
Dosis Lazim = 2,5 mg dalam sehari
Kegunaan = Hipertensi dan angina pectoris, gagal jantung kronis, diuretic, atau Glikosida jantung.
ESO = kram abdomen, diare, pusing, sakit kepala, mual, denyut jantung lambat, tekanan darah rendah, keadaan mati rasa, ekstremitas dingin, nyeri tenggorokan, dan sesak napas.
KI = Hipersensitif, gagal jantung akut, sindrom sinus, blockade sinoatrial.
PERHATIAN = HARUS DENGAN RESEP DOKTER
Cara penyimpanan = Simpan Sanmol pada suhu ruang, ditempat yang kering dan lembab serta hindarkan dari paparan sinar matahari langsung

3. Nama obat = Canderin 16
Kandungan = Candesartan cilexetil 16 mg
Dosis Lazim = 4 mg perhari dapat ditingkatkan hingga 16 mg perhari
Kegunaan = Hipertensi dan gagal jantung

		ESO = infeksi saluran pernapasan bagian atas, nyeri punggung, dan pusing. KI = hypersensitive, ganguan hari, wanita hamil dan menyusui PERHATIAN = HARUS DENGAN RESEP DOKTER Cara penyimpanan = Simpan Sanmol pada suhu ruang, ditempat yang kering dan lembab serta hindarkan dari paparan sinar matahari langsung **4.Nama Obat = Pepsol** Kandungan = Pantoprazole 40 mg Dosis Lazim = 40 mg 2 kali sehari dalam terapi kombinasi Kegunaan = Tukak lambung dan duodenum, reflux esophagitis, sindrom zollinger-ellison Efek samping (ESO) = Diare, sakit kepala, konstipasi, pusing. Kontraindikasi (KI) **=** Hipersensitivitas Perhatian = HARUS DENGAN RESEP DOKTER Cara penyimpanan = Simpan Sanmol pada suhu ruang, ditempat yang kering dan lembab serta hindarkan dari paparan sinar matahari langsung **F. Tahap pembuatan** 1. Diambil obat sesuai dengan bentuk sediaan, nama obat, dosis obat, dan jumlah obat yang terdapat dalam resep dokter 2. Diberikan etiket sesuai cara penggunakan yang terdapa pada resep 3. Dilakukan double cek kembali pada obat, pastikan sesuai dengan resep 4. Dilakukan KIE kepada pasien/ keluarga yang mewakili. 5. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal) ket: P : pasien A : Apoteker A : atas nama ibu siti kholifah silahkan menuju ke loket 4 P : (duduk di tempat pengambilan obat) A: atas nama siapa bu ? (dengan wajah ramah) P : atas nama ibu siti kholifah bu A : baik bu, mohon maaf sebelumnya bias lihat kartu antrian dan disebutkan tanggal lahirnya? P : ini bu kartu antriannya, tanggal lahir saya tanggal 5 bulan 9 1974 A : baik ibu mendapatkan 4 jenis obat ya ibu, yang pertama mendapatkan obat adalat untuk mengatasi hipertensi diminum sehari sekali setelah makan di malam hari, yang kedua ini obat bisprolol untuk hpertensi juga diminum sehari sekali setelah makan, obat ketiga ada obat canderin untuk hipertensi diminum sehari sekali setelah makan, dan ini obat orros untuk tukak lambungnya di minum sehari dua kali setelah makan. P : baik bu A : apakah ada yang ditanyakan lagi bu? P : sudah bu, tidak ada

		A : Baik bu, ini obatnya terima kasih semoga anaknya lekas sembuh P : Terima kasih A : sama – sama P : (pasien perlahan meninggalkan tempat pengambilan obat)

29.	Jenis Resep : Resep salinan Resep obat : Non Racikan Jumlah obat dalam resep : ~~Polifarmasi (>/~~Tidak Pengulangan resep : - **Resep salinan 2**  	I. Skrining Administrasi

Nama Pasien :	Ada	Nurus Rohmah Ny
Umur pasien :	Ada	-
Berat Badan :	Tidak Ada	- kg
Nama Obat :	Ada	**R1 :** Cormega **R2 :** Folavit **R3 :** Vossecal
Kekuatan :	Tidak ada	-
Bentuk sed. :	Tidak Ada	-
Jumlah obat :	Ada	**R1 :** Cormega No. XXX (30 tab) **R2 :** Folavit No. XXX (30 tab) **R3 :** Vossecal No. XXX (30 tab)
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada	**R1 :** Cormega : S 1 dd1 (Sehari sekali) **R2 :** Folavit : S 1 dd1 (Sehari sekali) **R3 :** Vossecal : S 1 dd1 (Sehari sekali)
Penulisan resep :	Tidak Ada	-
Nama dokter :	Ada	dr. Rini Andriya, SP. OG
Surat ijin :	Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Tidak Ada	-

J. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R1 : Cormega No. XXX (30 caps) diambil separuhnya, maka 30 : 2 = 15 caps
R2 : Folavit No. XXX (30 tab) diambil separuhnya, maka 30 : 2 = 15 tab
R3 : Vossecal No. XXX (30 tab) diambil separuhnya, maka 30 : 2 = 15 tab

K. Perhitungan Biaya Resep

R1 : Cormega 15 caps = 15 x Rp. 12.400 (harga per kapsul) = Rp. 186.000
R2 : Folavit 15 tab = 15 x Rp. 1.200 (Harga per tab) = Rp. 18.000
R3 : Vossecal 15 tab = 15 x Rp. 7.600 (harga per tab0 = Rp. 114.000
Maka, biaya keseluruhan resep adalah Rp. 318.000

L. Etiket

Nama Obat /warna etiket :

R/ Cormega

Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur| Transparan | Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 | P: +62 31 3981275 F: +62 31 3945459

Nama : Ny. Nurus Rohmah TGL : 06/03/2025
No. RM : ED 05/04/26
Tgl. Lahir :
1 X 1 sehari
Sesudah makan

R/ Volafit

Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur| Transparan |Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 | P: +62 31 3981275 F: +62 31 3945459

Nama : Ny. Nurus Rohmah TGL : 06/03/2025
No. RM : ED 05/04/26
Tgl. Lahir :
1 X 1 sehari
Sesudah makan

R/ Vossecal

Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur| Transparan |Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 | P: +62 31 3981275 F: +62 31 3945459

Nama : Ny. Nurus Rohmah TGL : 06/03/2025
No. RM : ED 05/04/26
Tgl. Lahir :
1 X 1 sehari
Sesudah makan

		e. *Product knowledge* **1. Nama obat = Cormega** Kandungan = Omega-3-acid ethyl esters 90% 1 g, EPA min 440 mg, DHA min 370 mg. Dosis Lazim = 1 kali sehari 2 kapsul Kegunaan = membantu memelihari kesehatan ESO = - KI = Hiper sensitivitas. Cara penyimpanan = Simpan Sanmol pada suhu ruang, ditempat yang kering dan lembab serta hindarkan dari paparan sinar matahari langsung. **2. Nama obat = Folavit** Kandungan = Folic Acid 400 mg Dosis Lazim = 400-500 mg perhari Kegunaan = memenuhi kebutuhan asam folat KI = Terapi jangka panjang pada defiensi kobalamin yang tidak diobat PERHATIAN = Tidak untuk sebagai obat tunggal pada terapi anemia pernisiosa dan defiensi Vit B12 Cara penyimpanan = Simpan Sanmol pada suhu ruang, ditempat yang kering dan lembab serta hindarkan dari paparan sinar matahari langsun **3. Nama obat = Vossecal** Kandungan = Microcrysralline Hydroxyapatite, Phosphorus, Vit. C, Vit D3, Mg, Zn Dosis Lazim = 2 kali sehari satu kapsul Kegunaan = memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral KI = - PERHATIAN = - Cara penyimpanan = Simpan Sanmol pada suhu ruang, ditempat yang kering dan lembab serta hindarkan dari paparan sinar matahari langsun **F. Tahap pembuatan** 1. Diambil obat sesuai dengan bentuk sediaan, nama obat, dosis obat, dan jumlah obat yang terdapat dalam resep dokter 2. Diberikan etiket sesuai cara penggunakan yang terdapa pada resep 3. Dilakukan double cek kembali pada obat, pastikan sesuai dengan resep 4. Dilakukan KIE kepada pasien/ keluarga yang mewakili. 5. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

		ket: P : pasien A : Apoteker A : atas nama ibu Nurus Rohmah silahkan menuju ke loket 4 P : (duduk di tempat pengambilan obat) A: atas nama siapa bu ? (dengan wajah ramah) P : atas nama ibu Nurus Rohmah A : baik bu, mohon maaf sebelumnya bias lihat kartu antrian? P : ini bu kartu antriannya. A : baik ibu mendapatkan 3 jenis, ketiganya sama-sama suplemen, yang pertama obat cormega diminum sehari satu kapsul setelah makan, yang kedua obat Folavit diminum sehari sekali satu tablet setelah makan. Obat ketiga Vossecal diminu sehari sekali setelah makan P : baik bu A : apakah ada yang ditanyakan lagi bu? P : sudah bu, tidak ada A : Baik bu, ini obatnya terima kasih semoga anaknya lekas sembuh P : Terima kasih A : sama – sama P : (pasien perlahan meninggalkan tempat pengambilan obat)

30.

Jenis Resep : Resep salinan
Resep obat : Non Racikan
Jumlah obat dalam resep : ~~Polifarmasi~~
~~(>/~~Tidak
Pengulangan resep : -
Resep salinan 3



M. Skrining Administrasi

Nama Pasien :	Ada	Ummi Syafiqah Ny
Umur pasien :	Ada	-
Berat Badan :	Tidak Ada	- kg
Nama Obat :	Ada	**R1 :** Formical **R2 :** inbion
Kekuatan :	Tidak ada	-
Bentuk sed. :	Tidak Ada	-
Jumlah obat :	Ada	**R1 :** Formical No. XXX (30) **R2 :** inbion No, XXX (30)
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada	**R1 :** Formical : S 1 x1 (sehari sekali) **R2 :** inbion : S 1X1 (Sehari sekali
Penulisan resep :	Tidak Ada	-
Nama dokter :	Ada	dr. Mayaria Novrika Lestari, SP. OS
Surat ijin :	Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Tidak Ada	-

N. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R1 : Formical No. XXX (30 tab)
R2 : inbion No, XXX (30 tab)

O. Perhitungan Biaya Resep

R1 : Formical 30 tab = 30 x Rp. 6000 (harga per kaplet) =Rp. 180.000
R2 : inbion 30 tab 30 x Rp. 4.600 (harga per kapsul) = Rp. 138.000
Maka, biaya keseluruhan resep adalah Rp. 318.000

R/ Formical

Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur| Transparan |Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 | P: +62 31 3981275 F: +62 31 3945459

Nama : Ny. Ummi syafiqag TGL : 11/02/2025
No. RM : ED 01/03/27
Tgl. Lahir :
1 X 1 sehari
Sesudah makan

R/ inbion

Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik
Jujur| Transparan |Kekeluargaan
Jl. KH.Kholil 88 Gresik 61115 | P: +62 31 3981275 F: +62 31 3945459

Nama : Ny. Ummi syafiqag TGL : 11/02/2025
No. RM : ED 05/04/26
Tgl. Lahir :
1 X 1 sehari
Sesudah makan

e. *Product knowledge*

1. Nama obat = Formical

Kandungan = Calcium carbonate, magnesium hydroxide, zinc sulphate monohydrate, Vit D3, boron glycinate.
Dosis Lazim = 1 kaplet sehari
Kegunaan = Suplemen untuk memenuhi kebutuhan kalsium
ESO = Hiperkalsemia
KI = Hiper sensitivitas, hipetkalsemia, kerusakan ginjal berat dan gagal ginjal.
Cara penyimpanan = Simpan Sanmol pada suhu ruang, ditempat yang kering dan lembab serta hindarkan dari paparan sinar matahari langsung.

2. Nama obat = Inbion

Kandungan = Fe Gluconate, manganese sulfate, copper sulfate, Vit. C, Folic acid, Vit B12, Sorbitol
Dosis Lazim = 1-2 kapsul perhari
Kegunaan = Suplementasi Vitamin dan mineral
ESO =Mual, muntah,konstipasi, neuropati, reaksi alergi sampai syok anafilaksi.
KI = Anemia persiniosa.
PERHATIAN = Fases berwarna hitam
Cara penyimpanan = Simpan Sanmol pada suhu ruang, ditempat yang kering dan lembab serta hindarkan dari paparan sinar matahari langsun

F. Tahap pembuatan

1. Diambil obat sesuai dengan bentuk sediaan, nama obat, dosis obat, dan jumlah obat yang terdapat dalam resep dokter
2. Diberikan etiket sesuai cara penggunakan yang terdapa pada resep
3. Dilakukan double cek kembali pada obat, pastikan sesuai dengan resep
4. Dilakukan KIE kepada pasien/ keluarga yang mewakili.

TUGAS KHUSUS PKL D3 FARMASI UMG_SASTI AMILIA PUTRI__221105023 _RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH GRESIK

		5. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal) ket: P : pasien A : Apoteker A : atas nama ibu siti ummi syafiqah silahkan menuju ke loket 4 P : (duduk di tempat pengambilan obat) A: atas nama siapa bu ? (dengan wajah ramah) P : atas nama ibu ummi syafiqah A : baik bu, mohon maaf sebelumnya bias lihat kartu antrian? P : ini bu kartu antriannya. A : baik ibu mendapatkan 2 jenis, keduanya sama-sama suplemen, yang pertama obat formical diminum sehari satu kaplet setelah makan, yang kedua obat inbion diminum sehari sekali satu kapsul setelah makan. P : baik bu A : apakah ada yang ditanyakan lagi bu? P : sudah bu, tidak ada A : Baik bu, ini obatnya terima kasih semoga anaknya lekas sembuh P : Terima kasih A : sama – sama P : (pasien perlahan meninggalkan tempat pengambilan obat)

Gresik, 13 Juni 2025
Dosen Pembimbing PKL,

Apt Siti Nur Asiyah, M. Farm. Klin.
NIDN. 0711088504

Gresik, 13 Juni 2025
Pembimbing Lapangan Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik

Apt. Alfiyah Hanum, S.Si
SIPA.19720607/SIPA_35.25/2022/2527

Dipindai dengan CamScanner

B. *PRODUCT KNOWLEDGE* BERDASARKAN KELAS TERAPI

(1) ANALGETIK- ANTIPIRETIK- ANTIINFLAMASI

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Analgetik-Antipiretik-Antiinflamasi	Acetaminophen	Sanmol Forte	Penderita gangguan fungsi hati yang berat, hipersensitivitas terhadap paracetamol	Meredakan demam serta nyeri. Rasa sakit yang bisa diatasi dengan obat ini meliputi sakit kepala, sakit gigi, atau nyeri sesudah operasi.	Sanmol tablet • Dewasa: 1 tablet, 3–4 kali sehari. • Anak usia 6–12 tahun: ½–1 tablet, 3–4 kali sehari. Dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan	Sanmol dapat menyebabkan efek samping berikut: • Memar atau perdarahan yang tidak biasa • Perut bagian atas kanan terasa sakit • Hilang nafsu makan • Urine berwarna gelap • Feses berwarna seperti tanah liat (abu-abu pucat) • Penyakit kuning, yang ditandai dengan mata atau kulit yang menguning	Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung
	Metampiron	Antalgin	Hipersensitif, hamil dan laktasi, gangguan pendarahan, Pasien dengan riwayat gangguan hati dan ginjal. Anak usia < 3	Meredakan rasa nyeri serta menurunkan panas. Obat ini bisa digunakan untuk mengatasi sakit kepala, sakit gigi, dan	Dewasa :1-2 kaplet 3 x sehari, anak 6-12 tahun 1/2-1 kaplet 3 x sehari, 1-6 tahun 1/4-1/2 kaplet 3 x sehari.	Pusing, sakit kepala, mual dan muntah, diare, anemia, tekanan darah rendah (hipotensi), turunnya sel darah putih (leukopenia).	Simpan pada tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung

			bulan dan/atau berat badan < 5 kg.	nyeri menstruasi.	Berikan saat makan atau sesudah makan sesuai dosis yang dianjurkan.		
	Ibuprofen	Ibuprofen	Hipersensitivitas terhadap ibuprofen, pada pasien yang mengalami asma, urtikaria, atau reaksi alergi setelah mengonsumsi.	Meredakan nyeri haid, sakit kepala, migrain, sakit gigi, sakit pinggang, nyeri terkilir, atau demam saat flu maupun pilek. Ibuprofen juga memiliki efek antiperadangan sehingga bisa digunakan untuk mengatasi gejala radang sendi.	Dewasa : 3 kali sehari 1-2 tablet. Anak-anak : 20 mg/kg berat badan/hari dibagi menjadi beberapa kali pemberian. Dikonsumsi bersamaan dengan makanan.	Mual, muntah, diare, konstipasi, nyeri kambung, ruam kulit, sakit kepala, pusing.	Simpan ditempat sejuk dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung
	Diklofenak	Flamar	Riwayat hipersensitivitas dengan obat ini, dan peringatan pemberian obat ini pada pasien yang mengalami gangguan gastrointestinal seperti perdarahan atau iritasi lambung.	Pengobatan akut dan kronis gejala-gejala reumatoid artritis, osteoartritis dan ankilosing spondilitis	Dewasa : 2-3 kali sehari 25 mg atau 50 mg. Diberikan sesudah makan , sebelum makan, sebelum tidur.	Nyeri kram perut, sakit kepala, retensi cairan, diare mual, konstipasi,flatulen kelainan pada fungsi hati indigesti, tukak lambung,ruam tinnitus	Simpan di tempat yang sejuk dan kering, serta terlindung dari panas dan sinar matahari langsung
	Asam mefenamat	Mefinal 500 mg	Hipersensivitas. Pasien dengan aktif atau riwayat	Meredakan nyeri ringan hingga sedang pada	• Dewasa dan anak usia >14 tahun: Dosis	Sakit perut, nyeri atau perih di ulu hari, mual atau muntah,	Simpan dalam wadah tertutup di ruangan

			tukak/pendarahan peptikum berulang, riwayat perdarahan gastrointestinal, penyakit radang ususu, gagal jantung berat, riwayat asma, angioedema, urtikaria, atau tipe alergi reaksi setelah minum aspirin atau NSAID lainnya.	sakit kepala, sakit gigi, nyeri haid primer, termasuk nyeri karena trauma, nyeri otot, dan nyeri pasca operasi.	awal 500 mg, kemudian 250 mg setiap 6 jam. • Anak usia >6 bulan**:** 3–6,5 mg/kgBB setiap 6 jam. Pengobatan maksimal selama 7 hari. Diberikan sesudah makan	gangguan pencernaan (perut kembung, diare atau sembelit), pusing, kantuk, penglihatan kabur, vertigo, gugup, dan sulit tidur.	bersuhu sejuk atau di suhu ruangan sekitar 20-25° Celsius. Jangan disimpan di tempat yang lembap atau terkena paparan sinar matahari secara langsung. Jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak.
	Piroxicam	Piroxicam	Hipersensitivitas: Pasien dengan riwayat alergi terhadap piroxicam atau obat NSAID lainnya tidak boleh mengonsumsinya, termasuk mereka yang mengalami reaksi alergi berat seperti angioedema atau urtikaria setelah menggunakan aspirin atau NSAID lain.	obat antiradang untuk meredakan nyeri sendi dan gejala lain dari radang sendi.	Untuk pasien osteoarthritis: 20 mg sehari sekali atau 10 mg sehari dua kali. Maksimal dosis harian yang dianjurkan adalah 20 mg. Untuk meredakan rasa sakit/nyeri: 20 mg sehari sekali atau 10 mg sehari dua kali.	Gangguan pencernaan: mual, muntah, diare, sembelit, nyeri perut, perut kembung, dan mulas.	Simpan pada suhu ruangan, idealnya antara 20-25°C.
	Aspirin	Aspilet thrombo	Gangguan Pembekuan Darah: Aspirin memiliki efek antiplatelet yang dapat menghambat pembekuan darah.	Mengurangi risiko trombosis koroner lebih lanjut selama fase pemulihan dari infark	pada dewasa digunakan dosis 325-650 mg per oral 4 kali sehari, atau 500-1000 mg per oral 3-4 kali	Gatal-gatal.Ruam. Pembengkakan pada mata, wajah, bibir, lidah, atau tenggorokan.Mengi atau kesulitan	Simpan aspirin pada suhu ruangan, di bawah 25 derajat Celcius, Jauhkan

			Pasien dengan gangguan pembekuan darah seperti hemofilia atau trombositopenia harus menghindari penggunaan aspirin karena dapat meningkatkan risiko perdarahan.	miokard. Kurangi resiko berulangnya serangan iskemik sepintas & stroke pada pasien, untuk meringankan rasa nyeri,	sehari. Dosis maksimum dewasa 4 g/hari. Pada anak digunakan dosis 10-15 mg/kg/dosis sebanyak 4-6 kali sehari. Dosis maksimal 60-70 mg/kg/hari.	bernapas.Suara serak.Jantung berdebar.Pernapasan cepat.Kulit dingin dan lembap	dari tempat yang lembap, seperti kamar mandi, Simpan di tempat yang kering dan sejuk, Hindari paparan sinar matahari langsung, Simpan dalam wadah tertutup, Jauhkan dari jangkauan anak-anak, Perhatikan tanggal kedaluwarsa yang tertera pada kemasan.
	Meloksikam	Meloxicam	Penyakit Radang Usus Aktif: Meloxicam tidak dianjurkan untuk pasien dengan penyakit radang usus aktif seperti kolitis ulserativa atau penyakit Crohn.	meredakan nyeri, nyeri tekan, pembengkakan, dan kekakuan yang disebabkan oleh artritis reumatoid juvenil	Dewasa usia : 7,5–15 mg per hari. Lansia: 7,5 mg perhari. Anak dengan berat badan ≥60 kg: 7,5 mg per hari.	nyeri perut, diare, sensasi panas pada dada, mual, pusing, sakit kepala, ruam kulit, hingga kulit gatal.	Simpan meloxicam pada suhu ruangan, idealnya di bawah 25°C atau di bawah 30°C, tergantung pada jenis sediaan. Hindarkan dari paparan cahaya matahari langsung dan tempat yang lembap.

	Celecoxib	Celecoxib	Hipersensitivitas: Celecoxib tidak boleh digunakan oleh pasien yang memiliki alergi terhadap celecoxib atau obat sulfonamid, serta mereka yang pernah mengalami reaksi alergi berat terhadap aspirin atau NSAID lainnya. Penyakit Jantung Iskemik: Pasien dengan riwayat penyakit jantung iskemik, stroke, atau penyakit arteri perifer harus menghindari penggunaan celecoxib karena dapat meningkatkan risiko kardiovaskular. Perdarahan Gastrointestinal: Penggunaan celecoxib dikontraindikasikan pada pasien dengan ulkus peptikum aktif atau riwayat perdarahan gastrointestinal.	meredakan gejala dan tanda OA (Osteoarthritis), RA (Rheumatoid Arthritis), dan AS (Ankylosing Spondylititis).	Untuk mengobati nyeri akut, dosis celecoxib adalah 400 mg di awal, diikuti dengan 200 mg jika diperlukan pada hari pertama. Kemudian 200 mg dua kali sehari sesuai kebutuhan. Pemberian dosis akan bergantung pada kondisi setiap pasien.	Pusing, Kantuk, Perut kembung, Mual.	disimpan pada suhu ruangan, jauhkan dari cahaya langsung dan tempat yang lembap.
	Etoricoxib	Orinox	Alergi: Pasien yang memiliki alergi	mengurangi nyeri dan	Dosis yang direkomendasikan	mual, muntah, sakit maag, rasa panas pada	Simpan Orinox 90 mg Tablet di

			terhadap kandungan obat Orinox. Bronkospasme dan Rinitis Akut: Pasien dengan kondisi bronkospasme atau rinitis akut. Serebrovaskular: Pasien dengan gangguan pembuluh darah yang memasok ke otak (serebrovaskular).	bengkak pada sendi dan otot penderita osteoarthritis, rematik, ankylosing spondylitis, dan asam urat.	yaitu 120 mg sekali sehari. Etoricoxib 120 mg hanya digunakan pada saat gejala nyeri akut. Nyeri kronis muskuloskeletal: Dosis yang direkomendasikan yaitu 60 mg sekali sehari.	dada (heartburn), diare, bengkak pada tungkai, insomnia, kantuk, cemas, perubahan rasa pada lidah, tekanan darah meningkat, atau sariawan.	tempat sejuk dan terhindar dari sinar matahari secara langsung, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak.

(2) ANTIMIKROBA

(2.a) ANTIBIOTIK

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Penisilin	Ampicillin	Ambiopi*	Penggunaan obat ampicillin dikontraindikasikan pada pasien dengan riwayat alergi terhadap obat ampicillin, atau komponennya, atau dengan derivat penisilin lainnya seperti golongan sefalosporin	mengobati infeksi saluran pernapasan, saluran kemih dan kelamin yakni gonore tanpa komplikasi, septikemia dan meningitis, yang disebabkan bakteri gram positif atau negatif.	Untuk infeksi saluran kemih: Dewasa: 500 mg setiap 8 jam. Untuk tipes (tifoid) dan paratifoid: Dewasa: 1.000–2.000 mg setiap 6 jam selama 2 minggu. Untuk pembawa penyakit (carrier),	reaksi alergi seperti ruam kulit, gatal atau gatal-gatal, pembengkakan pada wajah, bibir, atau lidah. diare berdarah atau berair. masalah pernafasan. merasa pingsan; pusing, jatuh.	paling baik disimpan pada suhu ruangan, jauhkan dari cahaya langsung dan tempat yang lembap

					pengobatan dilakukan selama 4–12 minggu. Untuk bronkitis, endokarditis, gastroenteritis, infeksi listeria, infeksi streptokokus perinatal, otitis media, infeksi saluran empedu, peritonitis: Dewasa: 250–1.000 mg setiap 6 jam. Anak-anak usia di bawah 10 tahun: Setengah dosis dewasa.		
	Amoksisilin	Amoxsan	Obat Amoxan tidak boleh diberikan kepada: Orang yang alergi pada amoxicillin serta antibiotik golongan penisilin lain, seperti ampicillin dan oksacillin. Pasien infeksi mononukleosis atau infeksi menular yang	obat antibiotika yang digunakan untuk mengatasi infeksi pada saluran pernafasan atas, infeksi saluran kemih, saluran cerna, kulit dan jaringan lunak serta demam tifoid pada anak.	Dewasa & anak-anak dengan berat badan 20 kg atau lebih : 250-500 mg tiap 8 jam. Anak-anak dengan berat badan lebih dari 8 kg : 125-250 mg tiap 8 jam. Tifoid & paratifoid : dewasa : 4	Mual atau muntah, Diare. Sakit kepala.	dalam suhu ruangan, terhindar dari panas dan lembap, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak.

			disebabkan virus herpes.		gram/hari dalam dosis terbagi selama 14-21 hari.		
Cephalosporin	Cefadroxil	Cefat	Hipersensitivitas: Tidak boleh diberikan kepada pasien yang hipersensitif terhadap sefalosporin. Jangan gunakan cefat jika alergi terhadap cefadroxil, obat golongan sefalosporin lain, atau obat golongan penisilin.	infeksi saluran pernafasan, saluran kemih dan kelamin serta infeksi kulit dan jaringan lunak	Dewasa: 1–2 gram per hari, diberikan dalam 2 dosis terbagi. Anak usia di atas 6 tahun: 25–50 mg/kgBB per hari, diberikan dalam 2 dosis terbagi	Mual,Muntah, Sakit perut,Diare Sakit kepala.	di tempat yang terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak.

	Cefixime	Sporetik	Hipersensitivitas: Sporetik tidak boleh digunakan pada pasien yang memiliki alergi terhadap cefixime atau antibiotik golongan sefalosporin lainnya, termasuk penisilin. Pasien dengan riwayat reaksi alergi berat, seperti asma bronkial, ruam, atau urtikaria terhadap antibiotik sefalosporin harus menghindari penggunaan obat ini.	Sporetik mengandung cefixime trihydrate, yang bekerja dengan cara menghambat pembentukan dinding sel-sel bakteri. Dengan begitu, pertumbuhan bakteri dapat ditekan sehingga infeksi mereda.	Dewasa: 50–100 mg, 2 kali per hari. Dosis dapat ditingkatkan sampai 200 mg, 2 kali per hari, untuk infeksi berat. Anak usia ≥12 tahun atau berat badan ≥30 kg: 50–100 mg, 2 kali per hari. Dosis dapat ditingkatkan sampai 200 mg, 2 kali per hari, untuk infeksi berat.	Diare atau sembelit Sakit perut Mual muntah Sakit kepala Pusing Rasa terbakar di dada (heartburn) Vagina gatal	di tempat bersuhu ruangan, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak.
	Cefotaxime	Cefotaxime inj	Hipersensitivitas: Cefotaxime tidak boleh digunakan pada pasien yang memiliki riwayat hipersensitivitas (reaksi alergi tipe cepat) terhadap cefotaxime, komponen penyusunnya, atau antibiotik golongan sefalosporin lainnya	Cefotaxime dapat digunakan pada terapi infeksi saluran napas, misalnya pneumonia komunitas, infeksi saluran kemih, misalnya sistitis dan pielonefritis, serta pada pelvic inflammatory disease (PID).Dosis disesuaikan	Dewasa: 1–2 gram tiap 8–12 jam, tergantung pada tingkat keparahan infeksi. Dosis maksimal 12 gram per hari. Anak usia >28 hari sampai 11 tahun dengan berat badan <50 mg: 50–180 mg/kgBB per hari, diberikan	Nyeri atau bengkak di area yang disuntik atau diinfus Diare Demam Sakit kepala Mual atau muntah Gatal pada vagina	Cefotaxime dalam bentuk serbuk untuk injeksi dapat disimpan dalam ruangan dengan suhu di bawah 30°C. Sediaan harus terlindung dari sinar matahari langsung dan tidak disarankan untuk terkena panas berlebih.

				berdasarkan derajat keparahan infeksi, sensitivitas patogen penyebab, dan klinis pasien.	dalam 2–6 dosis terbagi.		
Chloramphenicol	Kloramfenikol	Chloramphenicol 250 mg	Kontraindikasi chloramphenicol adalah pada pasien yang memiliki riwayat hipersensitivitas, misalnya reaksi anafilaksis, terhadap chloramphenicol, maupun komponennya. Tanda-tanda anafilaksis adalah angioedema, bronkospasme, dan urtikaria. Kontraindikasi chloramphenicol yang lain adalah pada porfiria akut.	Indikasi chloramphenicol atau kloramfenikol adalah pada infeksi berat, seperti meningitis, demam tifoid, dan kolera. Chloramphenicol juga diindikasikan pada konjungtivitis bakterialis dan otitis eksterna.	Dosis chloramphenicol untuk infeksi bakterial serius adalah 50 mg/kg/hari secara intravena, dengan jarak pemberian tiap 6 jam. Pada infeksi sangat berat, dapat diberikan dosis hingga 100 mg/kg/hari.	Chloramphenicol dapat menyebabkan efek samping hematologi, seperti supresi sumsum tulang dan anemia aplastik, grey baby syndrome, serta kelainan neurologis.	Simpan chloramphenicol di tempat bersuhu ruangan, terhindar dari sinar matahari langsung, suhu panas, dan kondisi yang lembap. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak.
	Thiamfenicol	Biothicol	Jangan gunakan Biothicol jika Anda memiliki alergi terhadap obat ini atau antibiotik derivat	Infeksi yang disebabkan oleh Salmonella, H. Influenzae (terutama infeksi meningokokal), Rickettsia,	Dewasa, anak-anak, dan bayi berusia lebih dari 2 minggu : 50 mg/kg BB per hari dibagi dalam 3-4 kali	Diskrasia darah terutama anemia aplastik; Reaksi hipersensitif; Gangguan ginjal; Sindroma Gray	Simpan ditempat sejuk dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung

			chloramphenicol lainnya. Orang dengan riwayat depresi sumsum tulang sebaiknya menghindari penggunaan Biothicol. Gangguan Ginjal dan Hati: Biothicol sebaiknya tidak diberikan kepada pasien dengan gangguan fungsi ginjal dan hati	organisme Gram negatif yang menyebabkan bakteremia (beredarnya bakteri dalam darah), meningitis (radang selaput otak).	pemberian. Bayi berusia 2 minggu atau kurang dan bayi prematur : 25 mg/kg BB per hari dibagi dalam 4 kali pemberian		
Macrolides dan Lincosamide	Eritromisin	Erysanbe 500 mg	Hipersensitif	Infeksi saluran pernapasan, kulit, dan jaringan lunak, pneumonia, gonore, infeksi lain yang disebabkan oleh mikroorganisme yang rentan	Dewasa > 20 kg : 1 – 2 kali sehari Anak < 20 kg : 30 – mg/kg/BB/hari. Diberikan dalam dosis terbagi tiap 6 jam Dikonsumsi sesudah makan.	Gangguan GI, reaksi alergi, superinfenksi, ototsisitas, kolitis pseudomembran.	Simpan di tempat bersuhu ruangan, kering, dan terhindar dari sinar matahari. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak.

	Azitromisin	Azitromycin dihydrate 500 mg	Hipersensitif	Infeksi saluran napas atas dan bawah, kulit dan struktur kulit, uretritis dan servisitis non GO karena Chlamydia trachomatis, gonorhea tidak komplikasi, dan otitis media akut.	Dewasa : 1 g dosis tunggal oral. Semua indikasi lainnya 500 mg 1x/hari selama 3 hari. Anak : 10 mg/kg BB/ hari dosis tunggal selama 3 hari. Dapat diberikan bersama makan untuk mengurangi rasa tidak nyaman pada saluran cerna.	Mual, rasa tidak nyaman di perut, muntah, kembung, diare, gangguan pendengaran, nefritis interstisial, gangguan ginjal akut, fungsi hati abnormal, pusing/vertigo, kejang, sakit kepala, somnolen, dan pemanjangan interval QT.	Simpan di tempat kering dan sejuk yang terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jangan memasukkan obat ini ke dalam kulkas atau membekukannya. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak.
	Klaritromisin	Bicrolid 500 mg	-	Faringitis, sinusitus maksilaris akut, bronkitis kronis eksaserbasi akut, infeksi kulit dan strukturnya tanpa komplikasi.	Faringitis dan tonsilitis : 2 kali sehari 250 mg 10 hari. Sinusitus maksilaris akut : 2 kali sehari 250 – 500 mg selama 14 hari. Bronkitis kronis eksaserbasi akut : 2 kali sehari 500 mg selama 14 hari. Infeksi kulit lainnya dan strukturnya	Diare, mual, gangguan rasa, nyeri abdomen, dan sakit kepala.	Simpan di tempat kering dan sejuk yang terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jangan memasukkan obat ini ke dalam kulkas atau membekukannya. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak.

					tanpa komplikasi : 2 kali sehari 250 mg selama 7 – 14 hari. Dikonsumsi bersama makan.		
	Klindamisin	Clindamycin Hcl	Clindamycin dikontraindikasikan pada pasien yang memiliki riwayat hipersensitivitas terhadap clindamycin, lincomycin, atau komponen lain dalam sediaan tersebut	**s**ebagai antibiotik yang banyak digunakan untuk menangani infeksi bakteri sebagai antibiotik yang banyak digunakan untuk menangani infeksi bakteri	Dewasa 150–300 mg atau 400–450 mg (jika infeksi berat) tiap 6 jam. Anak 3–6 mg/kgBB tiap 6 jam.	Gangguan pencernaan, mual, muntah, rasa seperti logam di mulut, atau diare Nyeri saat menelan Nyeri sendi Rasa panas di area dada (heartburn) Bercak putih di dalam mulut Keputihan yang kental dan berwarna putih Bengkak, rasa gatal, atau sensasi terbakar pada vagina Iritasi pada area kulit yang diolesi clindamycin topikal	Simpan pada suhu 20-25 derajat Celcius, di tempat kering dan sejuk
Aminoglikosida	Neomisin	Neomycin tablet	Obstruksi usus dan pasien yang sebelumnya punya riwayat hipersensitivitas terhadap obat ini.	Untuk menurunkan jumlah bakteri di dalam usus sebelum operasi dan pada pengidap	4-12 gram per hari yang bisa kamu bagi menjadi beberapa dosis.	Mual, muntah, dan diare.	Simpan pada suhu ruangan antara 20 dan 25 derajat C

				gangguan fungsi hati.	Pengobatannya bisa berlangsung selama 5-7 hari		
	Gentamisin	Gentamicin Salep Kulit 0,1%	Hipersensitif terhadap gentamisin dan aminoglikosida lainnya	Mengobati infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri, seperti impetigo, folikulitis, atau infeksi ringan pada psoriasis maupun eksim	Gentamicin dioleskan tipis pada daerah yang sakit sebanyak 3 – 4 kali sehari sampai tercapai kesembuhan. Daerah yang sakit boleh ditutupi dengan perban	Gatal, kemerahan, atau iritasi pada kulit yang diolesi obat	Simpan gentamicin salep kulit di tempat sejuk dan terhindar dari sinar matahari langsung serta jauhkan dari jangkauan anak-anak
Quinolones	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin Hcl	Ciprofloxacin tidak boleh digunakan pada pasien yang memiliki alergi terhadap ciprofloxacin atau antibiotik golongan kuinolon lainnya.	digunakan pada berbagai keadaan, seperti sepsis, infeksi intra abdomen, dan pneumonia	Dewasa: Infeksi ringan-sedang 150-300 mg 4x sehari. Infeksi berat 300-450 mg 4x sehari. Anak >1 bulan: Infeksi ringan-sedang 8-16 mg/KgBB/hari dibagi 3-4 dosis. Infeksi berat 16-20 mg/KgBB/hari dibagi 3-4 dosis	Gangguan pencernaan, mual, muntah, rasa seperti logam di mulut, atau diare Nyeri saat menelan Nyeri sendi Rasa panas di area dada (heartburn) Bercak putih di dalam mulut Keputihan yang kental dan berwarna putih Bengkak, rasa gatal, atau sensasi terbakar pada vagina	Simpan pada suhu ruangan dan jauhkan dari panas dan kelembapan yang berlebihan

						Iritasi pada area kulit yang diolesi clindamycin topikal	
	Levofloxacin	Levofloxacin Hemihydrate	Jangan gunakan levofloxacin jika Anda memiliki riwayat hipersensitivitas atau reaksi alergi terhadap levofloxacin atau antibiotik quinolon lainnya. Reaksi alergi yang berat dapat berupa ruam kulit, pembengkakan, atau bahkan anafilaksis	Levofloxacin adalah antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri pada berbagai organ dan jaringan tubuh Obat ini harus digunakan secara tepat sesuai dosis dan indikasi untuk mencegah resistensi bakteri	Dewasa: 500 mg, 1 kali sehari, selama 8 minggu. Anak usia ≥6 tahun dengan BB <50 kg: 8 mg/kgBB sampai maksimal 250 mg, 2 kali sehari. Lama pengobatan 60 hari. Anak usia ≥6 tahun dengan BB ≥50 kg: 500 mg, 1 kali sehari.	Mual, muntah, dispepsia, nyeri perut Diare atau malah sembelit Pusing Sakit kepala Gangguan tidur, misalnya insomnia atau sering bermimpi buruk	levofloxacin dan botol larutan injeksi levofloxacin pada suhu ruangan, 68°F hingga 77°F (20°C hingga 25°C). Simpan larutan oral levofloxacin pada suhu 59°F hingga 86°F (15°C hingga 30°C).
Tetrasiklin	Tetrasiklin	Super tetra*	Kontraindikasi tetrasiklin atau tetracycline adalah pada pasien dengan riwayat hipersensitivitas terhadap obat ini, juga pada wanita hamil. Peringatan penggunaan tetrasiklin diberikan atas potensi tetrasiklin mengakibatkan perubahan warna	untuk mengobati berbagai penyakit akibat infeksi bakteri, seperti jerawat derajat berat, kolera, brucellosis, atau balantidiasis. Di dalam 1 kapsul Super Tetra terkandung 250 mg tetracycline.	Dewasa : 4 kali sehari 1 - 2 kapsul lunak Anak ≥ 8 tahun: 4 kali sehari 25 - 50 mg/kgBB setiap hari	Kulit lebih sensitif terhadap paparan sinar matahari. Sakit kepala atau pusing. Mual atau muntah. Diare	simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung

			gigi, menghambat pertumbuhan tulang, serta mengakibatkan fotosensitivitas dan hipertensi intrakranial.				
	Doksisiklin	Interdoxin	• Pasien yang memiliki riwayat hipersensitif terhadap Doxycycline. • Wanita hamil dan menyusui. • Anak dibawah 8 tahun.	Untuk membantu mengobati berbagai macam infeksi bakteri seperti infeksi infeksi paru-paru, saluran kemih, mulut, kulit (misalnya jerawat dan bisul), mata serta penyakit seksual menular.	Infeksi yang rentan terhadap Doxycycline: Dewasa: 200 mg perhari, diikuti dengan 100-200 mg per hari. Infeksi Sipilis: Dewasa: 300 mg per hari dibagi dalam dosis terbagi selama 10 hari. Pencegahan tifus: Dewasa: 200 mg sebagai dosis tunggal.	Efek samping yang mungkin terjadi apabila mengkonsumsi Interdoxin adalah hipotensi (tekanan darah lebih rendah dari batas normal), Anemia, Anoreksia, sakit kepala, urtikaria (Gatal/biduran), mual, muntah, diare, nyeri perut bagian atas.	Simpan pada suhu di bawah 25 derajat Celcius.
	Minosiklin	Nomika	Pasien yang memiliki riwayat alergi terhadap minocycline atau antibiotik golongan tetrasiklin tidak boleh menggunakan obat ini. Pasien dengan gangguan fungsi	infeksi yang disebabkan oleh Rickettsia. Obat ini dapat digunakan untuk menangani demam kambuh yang disebabkan oleh infeksi bakteri.	Dosis dan Aturan Pakai Nomika Kapsul Kondisi: Infeksi bakteri yang rentan dengan minocycline Dewasa: Dosis awal 200 mg, kemudian 100	Pusing atau rasa melayang Lelah dan lemas Mual atau muntah Diare.	di tempat yang sejuk dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak.

			ginjal yang signifikan harus menghindari penggunaan Nomika, karena dapat memperburuk kondisi ginjal.	Digunakan untuk mengobati uretritis gonokokal tanpa komplikasi pada pria.	mg setiap 12 jam. Anak usia di atas 8 tahun: Dosis awal 4 mg/kgBB kemudian menjadi 2 mg/kg setiap 12 jam. Kondisi: Gonore pada pasien yang alergi terhadap penicillin Dewasa: Dosis awal 200 mg, kemudian 100 mg setiap 12 jam, selama minimal 4 hari Kondisi: Karier bakteri meningococcal Dewasa: 100 mg 12 jam sehari, selama 5 hari. Kondisi: Infeksi kulit karena Mycobacterium marinum Dewasa: 100 mg 2 kali sehari, selama 6-8 minggu. Kondisi: Uretritis gonore		

					tanpa komplikasi Pria Dewasa: 100 mg 2 kali sehari, selama 5 hari. Kondisi: Sifilis Dewasa: 100 mg 2 kali sehari, selama 10-15 hari.		
Sulfa	Sulfametoksazol-trimetoprim	Sanprima forte	Hipersensitivitas: Dilarang bagi individu yang memiliki riwayat alergi terhadap sulfonamide, termasuk trimethoprim dan sulfamethoxazole. Gangguan Hati dan Ginjal: Penggunaan Sanprima tidak dianjurkan untuk pasien dengan gangguan fungsi hati atau ginjal yang berat. Kehamilan dan Menyusui: Sanprima sebaiknya dihindari oleh	Sanprima Forte merupakan obat antibiotika kombinasi yang digunakan untuk mengobati infeksi akibat bakteri pada saluran pernapasan, pencernaan, dan saluran kemih	Dewasa & Anak >12tahun : 1 kaplet forte 2x sehari. Infeksi berat : 1,5 kaplet forte 2x sehari. Infeksi akut berikan sampai dengan minimal 5 hari atau sampai 2 hari bebas gejala. Pneumocytis carinii pneumonitis : 20mg/kg/hr TM & 100mg/kg/hr SMZ dalam dosis terbagi tiap 6 jam selama 14 hari. GO tanpa komplikasi : 2 kaplet Forte 2x	gangguan gastrointestinal, sindroma Steven-Johnson&Lyell, JARANG : hepatitis, gangguan hematologi, kolitis, pseudomembranosa.	Simpan obat ini pada suhu antara 15-30 derajat Celsius, serta terhindar dari paparan cahaya.

			wanita hamil, terutama menjelang kelahiran, serta oleh ibu menyusui, kecuali jika diresepkan dokter untuk kondisi tertentu. Usia Anak: Dilarang untuk anak di bawah usia 2 bulan, kecuali dalam pengobatan khusus seperti pencegahan Pneumocystis jirovecii pneumonia pada bayi berusia 4 minggu ke atas. Diskrasia Darah: Pasien dengan kelainan darah atau diskrasia darah harus menghindari penggunaan Sanprima. Porfiria: Obat ini juga tidak disarankan untuk individu dengan porfiria		sehari selama 2 hari, dilanjutkan dengan 2,5 kaplet 8 hari kemudian. Anak 6-12 tahun: 1/4-1/2 dosis dewasa. Anak 2-6 tahun : 1/4 dosis dewasa		

(2.b) ANTIJAMUR

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Polyenes	Amphotericin B	Cendo Fungicid	Hipersensitivitas, ibu menyusui, dan jangan berikan pada pasien yang menerima antineoplastik atau kemoterapi	Mengobati infeksi pada mata yang disebabkan oleh fungi atau jamur	Dioleskan salep cendo fungicide sebanyak 2 – 3 kali sehari pada area mata yang terinfeksi.	Gangguan mata (iritasi lokal, sensasi menyengat atau terbakar, peradangan), gangguan kulit dan jaringan subkutam (ruam, urtikaria, erupsi vesikular).	Simpan pada suhu 20-25 derajat Celcius, di tempat kering dan sejuk.
	Nistatin	Nystatin	Hipersensitivitas: Pasien yang memiliki riwayat reaksi alergi terhadap nystatin atau obat antifungal lainnya harus menghindari penggunaan nystatin.	infeksi jamur Candida baik kandidiasis oral, kandidiasis intestinal, kandidiasis kutis, dan kandidiasis vulvovaginal.	Bentuk oral (tablet, cairan suspensi, dan tetes) 1. Kondisi: Candidiasis mulut Dewasa: 100.000 unit, 4 kali sehari. Pengobatan bisa dilakukan selama 7–14 hari. Untuk mencegah kekambuhan, tetap konsumsi obat setidaknya hingga 2 hari setelah gejala teratasi. Anak-anak: 100.000 unit, 4 kali sehari.	Iritasi mulut Sakit perut Mual Muntah Diare Ruam kulit	Simpan pada suhu ruangan. Jangan simpan dalam keadaan beku.

					2. Kondisi: Candidiasis usus Dewasa: Untuk bentuk suspensi, dosisnya 500.000 unit, 4 kali sehari. Untuk bentuk tablet, 500.000–1.000.000 unit 3–4 kali sehari. Obat dikonsumsi setidaknya hingga 2 hari setelah tidak ada gejala. Untuk pencegahan, 1.000.000 unit per hari. Anak-anak: 100.000 unit, 4 kali sehari. 3. Kondisi: Pencegahan candidiasis pada bayi baru lahir Diberikan pada bayi yang baru lahir dari ibu yang menderita candidiasis vagina dengan dosis 100.000 unit, 1 kali sehari. Bentuk topikal (salep)		

					4. Kondisi: Infeksi jamur kulit Dewasa dan anak-anak: dioleskan di bagian yang terinfeksi jamur 2–3 kali sehari. Bentuk vaginal (tablet vagina) 5. Kondisi: Candidiasis vagina Dewasa: 100,000–200.000 unit per hari selama 14 hari		
Imidazole	Ketoconazol	Ketoconazole 200 mg	Hipersensitivitas: Ketoconazole tidak boleh digunakan pada pasien yang memiliki riwayat alergi atau hipersensitivitas terhadap ketoconazole atau komponen lainnya12. Gangguan Hati: Penggunaan ketoconazole dikontraindikasikan pada pasien dengan penyakit hati berat atau riwayat	mengatasi infeksi jamur yang menyerang organ dalam tubuh atau infeksi jamur sistemik	Dosis dan Aturan Pakai KetoconazolePada anak usia <12 tahun, dokter akan menyesuaikan dosis ketoconazole berdasarkan berat badan (BB). Dewasa: 200 mg, 1 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan menjadi 400 mg 1 kali sehari jika respons terapi	mual, muntah, pusing, sakit kepala, sakit perut, diare, reaksi alergi, hingga gangguan jantung, gangguan hati.	Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung.

			gangguan hati, karena risiko hepatotoksisitas yang tinggi14. Anak di Bawah 2 Tahun: Keamanan penggunaan ketoconazole pada anak-anak di bawah usia 2 tahun belum terjamin, sehingga perlu dihindari1. Penggunaan Bersama Obat Tertentu: Ketoconazole tidak boleh digunakan bersamaan dengan obat-obatan seperti quinidine, pimozide, cisapride, dan methadone, karena dapat meningkatkan risiko pemanjangan interval QT dan efek samping serius lainnya.		yang diharapkan belum tercapai.		
	Mikonazol	Miconazole 2% cream	Hipersensivitas	Mengatasi infeksi fungi atau jamur pada kulit, seperti kurap, kutu air, panu, kandidiasis kulit, serta dapat juga untuk	Oleskan 2 kali per hari ke area yang sakit selama 2 – 4 minggu. Dioleskan dengan keadaan bersih pada area	Sensasi rasa terbakar, kulit gatal-gatal, kulit kering dan bersisik	Simpan di tempat bersuhu ruangan dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung.

				mengobati infeksi jamur di kuku	kulit yang sakit atau terinfeksi		Jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak.
	Klotrimazol	Dermifar cream 5g	Pasien hipersensitif	Mengatasi infeksi jamur di kulit, mengobati panu, candidiasi, kutu air, kurap, atau infeksi jamur di selangkangan	Oleskan secara tipis-tipis dan merata pada area kulit yang infeksi 2 – 3 kali sehari. Lama pengobatan berkisar antara 2 – 4 minggu	Sensai terbakar atau perih di kulit, bengkak, kulit kemerihan dan nyeri ketika ditekan, muncul bintik seperti jerawat, dan kulit terlupas	Simpan Dermifar di tempat bersuhu ruangan, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak.
Triazole	Flukonazol	Fluxar	Hipersensitivitas: Fluxar tidak boleh digunakan pada pasien yang memiliki riwayat alergi terhadap fluconazole atau obat golongan azole lainnya12. Kehamilan dan Menyusui: Penggunaan Fluxar tidak dianjurkan untuk wanita hamil dan menyusui, karena dapat berdampak negatif pada janin atau bayi14.	Kriptokokosis, kandidiasis mukosal, kandidiasis genital terutama kandidiasis vag, dermatomikosis. Profilaksis infeksi jamur.	Kriptokokosis Hr ke-1: 400 mg. Hr ke-2 & seterusnya: 200-400 mg 1 x/hari. Kandidiasis mukosal 50 mg/hari selama 14 hari. Kandidiasis vag 150 mg sebagai dosis tunggal oral.	Sakit kepala, mual, nyeri perut, diare, dispepsia, pusing, gangguan daya pengekapsulan, kembung; ruam kulit, gangguan fungsi ginjal, kejang, leukopenia.	simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung

			Gangguan Fungsi Hati: Pasien dengan gangguan fungsi hati harus menghindari penggunaan Fluxar, karena dapat meningkatkan risiko hepatotoksisitas23. Gangguan Fungsi Ginjal: Penggunaan pada pasien dengan gangguan ginjal perlu dilakukan dengan hati-hati, dan dosis mungkin perlu disesuaikan34. Gangguan Irama Jantung: Pasien dengan riwayat aritmia atau gangguan irama jantung harus berhati-hati saat menggunakan Fluxar, karena obat ini dapat memperpanjang interval QT dan meningkatkan risiko aritmia serius				

Lainnya	Griseofulvin	Griseofulvin	Hipersensitivitas: Griseofulvin tidak boleh digunakan pada pasien yang memiliki riwayat alergi terhadap obat ini atau komponen formulanya14. Kehamilan: Penggunaan Griseofulvin sangat tidak dianjurkan bagi wanita hamil atau yang berencana untuk hamil dalam waktu dekat, karena dapat berisiko terhadap janin14. Porfiria: Pasien dengan kondisi porfiria harus menghindari penggunaan Griseofulvin, karena dapat memperburuk kondisi ini14. Gagal Hati: Griseofulvin dikontraindikasikan pada pasien dengan gagal hati, karena dapat menyebabkan hepatotoksisitas	untuk terapi infeksi dermatofita, seperti tinea capitis, tinea corporis, tinea cruris, dan tinea pedis yang membutuhkan terapi sistemik, karena tidak berespon dengan terapi topikal	Dewasa: 500 mg per hari, 1 kali sehari, atau 250 mg, 2 kali sehari. Untuk infeksi yang lebih berat, 1000 mg, 1 kali sehari, atau 500 mg, 2 kali sehari. Anak usia ≥2 tahun: 10 mg/kgBB per hari, untuk 1 kali konsumsi atau dibagi ke dalam beberapa kali pemberian.	Mati rasa atau kesemutan pada tangan atau kaki. Penyakit kuning. Urine berwarna gelap. Nyeri sendi atau nyeri otot	Susah tidur Kulit kemerahan Gatal-gatal Sakit kepala Mual, muntah, sakit maag Diare

			dan memperburuk fungsi hati14. Lupus Eritematosus Sistemik (SLE): Penggunaan Griseofulvin tidak disarankan pada pasien dengan SLE atau nefrosis yang berhubungan dengan lupus				

(2.c) ANTIVIRUS

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat HIV-AIDS *	NRTI (zidovudine)	Zidovudine	Neutropenia / anemia berat neonates dengan hipwr bilirubinemia yang memerlukan terapia selain fototerapi atau dneggan peningatkatan transminase	Terapi infeksu HIV, Profilaksis transmisi HIV dari ibu ke janin selama kehamilan, serta profilaksis infeksis HIV pada neonatus	Dewasa dan Anak dengan BB > 30 kg 250mg/300mg 2x sehari dalam Kombinasi dengan agen antiretrovial lainnya Anak-anak dengan BB 8- 13kg: 100mg 2x sehari Anak anak dengan BB 14- 21kg: 100mG diminum Pada pagi hari, 200mg diminum malam hari	Sulit tidur, mual, sembelit, nyeri sendi, sakit kepala	Simpan di tempat yang sejuk dan kering serta terhindar dari cahaya matahari

					Anak dengan BB 22-30kg : 200mg. diminum 2x sehari		
	NRTI (abacavir),	Abacavir	Hipersensitivitas terhadap abacavir	Terapi kombinasi ARV/Antiretroviral untuk infeksi HIV pada orang dewasa, remaja, dan anak anak	Dewasa dan anak usia ≥3 bulan dengan BB ≥25 kg: Dosisnya 300 mg, 2 kali sehari, atau 600 mg, 1 kali sehari. Pengobatan dikombinasikan dengan obat HIV lain. Anak usia ≥3 bulan dengan BB 14–19 kg: Dosisnya 150 mg, 2 kali sehari, atau 300 mg, 1 kali sehari Anak usia ≥3 bulan dengan BB 20–24 kg: Dosisnya 150 mg, dikonsumsi pada pagi hari, dan 300 mg, dikonsumsi pada malam hari, atau 450 mg, dikonsumsi 1 kali sehari.	Mual, muntah, diare	Simpan dalam wadah asli dibawah suhu 30°C
	NNRTI (efavirenz)	Efavirenz	Hipersensitif terhadap efavirenz	Pengobatan HIV-1 pada orang dewasa, anak,	- Dewasa: 600 mg secara oral	Mual	Simpan dibawah suhu 30°C dan

			- Pasien dengan gangguan hati - Wanita hamil - Dikonsusmsi bersama dengan terfenadine, astemizol, cisapride, midazola, triazolam, pimozide, bepridil	remaja dengan BB ≥ 40 kg dan dalam kombinasi dengan obat ARV lain	1x sehari sesudah makan - Remaja dan anak anak 17 tahun kebawah: BB 40 kg 1x sehari 600 mg.		terlindung dari cahaya
	NNRTI (Nevirapine)	Nevirapine	-Hipersensitif terhadap Nevirapin -Pasien dengan gangguan hati -Pasien yang telah berhenti terapi secara permanen karena ruam	Pengobatan HIV-1 yang diguanakan dalam kombinasi dengan obat ARV lain	-Dewasa: 200 mg 1 x sehari selama 14 hari pertama dan didikuti 200 mg 2 x sehari dalam kombinasi 2 obat ARV lain - Untuk pencegahan ibu ke anak: saat persalinan dosis tunggal 200 mg dan dilanjut pemberian pada bayi dosis oral tunggal 2 mg/kg dalam waktu 72 jam setelah kelahiran	Ruam, mual	Simpan dibawah suhu 30°C dan terlindung dari cahaya
	PI (saquinavir, indinavir)	Indinavir	Peningkatan terjadinya hipotensi jika	Infeksi HIV dalam kombinasi dengan pengahmbat	- Dewasa: 800 mg tiap 8 jam. Jika pengobatan	Sakit perut, mual, muntah, nafsu makan hilang	Simpan dibawah suhu 30°C dan

			digunakan dengan alfusozin, peningkatan resiko terjadinya aritmia jika digunakan dengan amiodarone, pimozide atau cisapride	reverse transcriptase nukleosida	digabung dengan ritonavir, dosis indinavir mrnjadi 800 mg tiap 12 jam, sedangkan ritonavir 100 – 200 mg tiap 12 jam - Anak – anak usia 4-17 tahun: 500 mg tiap 8 jam dengan dosis maks 800 mg tiap 8 jam.		terlindung dari cahaya
Herpes virus	acyclovir	Acyclovir 400 mg	Kontraindikasi acyclovir terutama pada pasien yang mengalami hipersensitivitas pada kandungan ini. Penggunaan sebaiknya tidak melalui intravena karena berisiko merusak ginjal. Peringatan juga perlu diberikan dalam penggunaan pada pasien dengan gangguan ginjal karena berisiko sebabkan	Acyclovir adalah obat antivirus untuk menangani infeksi virus herpes, seperti cacar air, cacar ular, atau herpes simplex. Obat ini paling dikenal sebagai salep herpes dan bisa digunakan untuk dewasa maupun anak-anak.	Dewasa: 200 mg, 5 kali per hari selama 10 hari, saat pertama kali terkena. Untuk mencegah kekambuhan, dosisnya adalah 200–400 mg, 5 kali per hari atau 400 mg, 2 kali sehari. Anak usia <2 tahun: Setengah dari dosis orang dewasa.	Mual. Muntah. Diare. Sakit kepala. Pusing. Rasa lelah atau lemah. Nyeri perut.	Simpan obat Acyclovir pada temperatur ruangan, di tempat yang terhindar dari lembab dan cahaya matahari langsung

			toksisitas dan bahkan kematian.				
Hepatitis B dan C	Interferon*	Penginterferon alfa - 2b	Pada pasien riwayat hipersensitivitas terhadap interferon alfa. Penyesuaian dosis diperlukan pada pasien gangguan fungsi ginjal	Terapi tambahan untuk mencegah kekambuhan melanima setelah dilakukan operasi pengangkatan jaringan tumor	- Dewasa: Jika dikombinasikan dengan ribavirin, dosisnya adalah 1,5 mcg/kgBB. Selama 24 minggu. - Anak-anak usia 3- 18 tahun: Jika dikombinasikan dengan ribavirin, dosisnya adalah 60 mcg/m2 luas tubuh, seminggu sekali, selama 24- 48 minggu.	Flu, demam menggigil, lemas dansi pembengkakan diskeitar area suntik.	Simpan dalam lemari es antara 2 - 8 ° C
	lamivudine	Lamivudine	Lamivudin tidak boleh diberikan pada pasien yang memiliki riwayat hipersensitivitas pada lamivudin, maupun komponen formulasi obat lainnya.	Lamivudine adalah obat untuk menangani hepatitis B atau infeksi HIV. Perlu diketahui bahwa obat ini hanya bisa memperlambat perkembangan penyakit, tetapi tidak dapat menyembuhkan atau mencegah	**Kondisi: Hepatitis B kronis** Dewasa: 100 mg, 1 kali sehari. Khusus pada pasien yang menderita hepatitis B bersamaan dengan HIV, dosisnya adalah 150 mg 2 kali sehari, atau 300 mg 1 kali sehari.	Batuk, pilek, atau hidung tersumbat, Sakit kepala, Pusing, Mual, Muntah, Diare Sulit tidur	Simpan dalam suhu ruangan dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak.

				penularan hepatitis B atau infeksi HIV.	Anak usia 2–17 tahun: 3 mg/kgBB, 1 kali sehari. Dosis maksimal adalah 100 mg per hari.		
Influenza A dan B virus	Amantadine*	Amantadine	Pasien gangguan ginjal akut	untuk mengobati atau mencegah influenza A pada orang dewasa dan anak-anak. Obat ini mungkin tidak efektif selama setiap musim flu karena beberapa jenis virus mungkin resistan terhadap amantadine.	Jika mengonsumsi amantadine untuk mengobati influenza A, mulailah mengonsumsi obat tersebut dalam waktu 24 hingga 48 jam setelah gejala flu muncul. Teruskan mengonsumsi obat ini selama jangka waktu yang ditentukan. Gejala mungkin membaik sebelum infeksi benar-benar sembuh, dapat mengonsumsi amantadine dengan atau tanpa makanan. dikonsumsi pada malam hari sebelum waktu tidur. Ikuti petunjuk dokter Anda.	Gatal-gatal, kesulitan bernapas; pembengkakan pada wajah, bibir, lidah, atau tenggorokan.	Simpan dalam suhu ruangan dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak.

	Rimantadine*	Rimantadine hydrochloride 100 mg	Hipersensitif terhadap obat-obatan golongan adamantane, termasuk rimantadine dan amantadine	Tablet rimantadine hidroklorida diindikasikan untuk profilaksis dan pengobatan penyakit yang disebabkan oleh berbagai jenis virus influenza A pada orang dewasa (17 tahun ke atas). Tablet rimantadine hidroklorida diindikasikan untuk profilaksis terhadap virus influenza A pada anak-anak (usia 1 – 16 tahun)	Dosis rimantadine hidroklorida yang dianjurkan untuk orang dewasa adalah 100 mg dua kali sehari selama 7 hari. -profilaksis - Anak-anak (usia 1 tahun hingga 16 tahun) Pada anak usia 1 tahun hingga 9 tahun, rimantadine hidroklorida harus diberikan sekali sehari, dengan dosis 5 mg/kg tetapi tidak melebihi 150 mg. Untuk anak-anak berusia 10 tahun atau lebih, gunakan dosis dewasa.	Mual, insomnia	Simpan pada suhu 20° hingga 25°C
	Oseltamivir	Oseltamivir phosphate	Hipersensitivitas terhadap oseltamivir	Untuk mengatasi infeksi virus influenza tipe A (misalnya flu burung) atau B.	Dewasa, 1 kali per hari selama 10 Hari. Influenza A dan B Treatment: Dewasa, 2 kali per hari selama 5 hari Aturan Pakai:	Sakit perut, sakit kepala, diare, mual dan muntah, sulit tidur.	Simpan dalam suhu ruangan dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat ini

					Sesudah makan		dari jangkauan anak-anak.

(2.d) ANTIPROTOZOA

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antiamoeba	metronidazole	Metronidazole	Metronidazole dikontraindikasikan pada pasien dengan riwayat hipersensitivitas terhadap obat ini atau komponen sediaan. Metronidazole juga tidak diberikan pada wanita hamil trimester pertama.	Metronidazole adalah antibiotik untuk mengobati infeksi bakteri di berbagai organ tubuh, termasuk di saluran pencernaan, paru-paru, darah, saluran kemih, hingga kelamin	Dewasa: 2 gram/hari selama 3 hari, atau 400 mg 3 kali sehari selama 5 hari, atau 500 mg 3 kali sehari selama 7-10 hari. Dosis alternatif, 15-40 mg/kg per hari dalam 2-3 dosis terbagi. Anak usia 1-3 tahun: 50 mg sekali sehari selama 3 hari. Anak usia >3 - 7 tahun: 600-800 mg sekali sehari selama 3 hari.	Efek samping utama metronidazole yang sering terjadi adalah kebingungan (*confusion*), neuropati perifer, parageusia, mual, muntah, dan diare	**Cara Penyimpanan.** Metronidazole disimpan pada suhu 15-30 C dan terhindar dari sinar matahari langsung.
Antimalaria	primaquine, artemisinin, doksisiklin	Primaquine 15 mg	• Wanita hamil • Penyakit sistemik seperti rheumatoid arthritis atau lupus	Mencegah dan mengobati malaria	Tujuan: Mengobati malaria akibat Plasmodium vivax atau	• Mual atau muntah • Pusing • Sakit perut • Kram perut • Ruam ringan	Simpan primaquine di tempat kering dan terhindar dari paparan sinar matahari

			eritematosus sistemik yang berisiko tinggi mengalami granulositopenia • Riwayat reaksi hipersensitivitas (termasuk anafilaksis) terhadap primaquine atau bahan-bahan dalam obat primaquine • Orang yang menggunakan obat yang berpotensi menyebabkan hemolisis atau depresi myeloid, misalnya obat golongan sefalosporin (cefixime dan cefotaxime), levofloxacin, dan dapsone • Mencegah dan mengobati malaria		Plasmodium ovale Dewasa: 15 mg atau 30 mg per hari selama 14 hari. Pengobatan dikombinasikan dengan obat antimalaria lain. Anak-anak: 0,25–0,3 mg/kgBB 1 kali sehari, selama 14 hari. Tujuan: Mencegah terjadinya infeksi malaria P. falciparum pada orang yang akan bepergian ke daerah wabah malaria Dewasa: 30 mg setiap hari, dikonsumsi sejak 1 hari sebelum bepergian ke daerah wabah malaria, selama berada di sana, dan dilanjutkan selama 3–7 hari setelah kembali		langsung. Jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak.

					dari daerah tersebut.		
	Artemisinin*	Artemether	Hipersensitivitas terhadap obat ini maupun komponen penyusunnya.	Indikasi tata laksana malaria, terutama pada penderita malaria falciparum yang resisten klorokuin.	-Dewasa: Minimal 35 kg: 4 tablet secara oral sebagai dosis awal tunggal, diikuti dengan 4 tablet setelah 8 jam, dan kemudian 4 tablet dua kali sehari (pagi dan sore) selama 2 hari berikutnya. - Anak-anak: 2 bulan atau lebih: • Berat badan 5 sampai kurang dari 15 kg: 1 tablet secara oral sebagai dosis awal tunggal, diikuti dengan 1 tablet setelah 8 jam, dan kemudian 1 tablet dua	Mual, muntah, diare, konstipasi, dan dispepsia.	Simpan artemether di tempat yang kering dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak.

					kali sehari (pagi dan sore) selama 2 hari berikutnya.		
	Doksisiklin*	Doxycycline 100 mg	Doxycycline dikontraindikasikan pada pasien dengan reaksi hipersensitivitas terhadap obat ini atau obat golongan tetrasiklin lainnya.	Indikasi doxycycline adalah untuk acne, malaria, rosacea, amebiasis intestinal, dan berbagai infeksi menular seksual seperti uretritis non-gonore dan granuloma inguinal.	Dewasa dan anak usia 8 tahun dengan BB >45 kg: 200 mg pada hari pertama, dilanjutkan dengan dosis perawatan 100 mg per hari. Anak usia 8–11 tahun dengan BB ≤45 kg: 4,4 mg/kgBB pada hari pertama, dilanjutkan dengan dosis 2,2 mg/kgBB per hari.	Mual, muntah, anoreksia	Simpan doxycycline di tempat bersuhu ruangan, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak.

(2.e) ANTELMINTIK

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antelmintik	Albendazole	Albendazole	Kontraindikasi albendazol adalah jika terdapat	Mengobati cacing pita, mengobati cacing gelang,	Kondisi: stiserkosis	• Rambut rontok. • Sakit kepala. • Mual.	Simpan obat dalam wadah

			riwayat hipersensitivitas dengan obat ini. Peringatan terutama pada pasien yang memiliki penyakit liver, karena albendazol dapat berefek meningkatnya enzim-enzim liver.	mengobati cacing tambang.	1. Orang dewasa dengan bobot tubuh di bawah 60 kg: 15 mg/kgBB dalam waktu 8–30 hari. Dosis maksimal penggunaan 800 mg per hari. 2. Orang dewasa dengan bobot tubuh di atas 60 kg: 400 mg, 2 kali sehari, dalam waktu 8–30 hari. Kondisi: Cutaneous larva migran 1. Orang dewasa: 400 mg, sekali sehari, dalam waktu 1–3 hari. Kondisi: Echinococcosis 1. Orang dewasa dengan bobot tubuh di bawah 60 kg: : 15mg/kgBB per hari, 2 kali sehari. Dosis maksimal penggunaan 800 mg per hari.	• Muntah. • Sakit perut.	tertutup pada suhu ruangan. Jauhkan dari panas, kelembapan, dan cahaya matahari langsung. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jangan menyimpan obat yang sudah kedaluwarsa.

					2.Dewasa dengan berat badan ≥60 kg: 400 mg, 2 kali sehari, dalam waktu 28 hari. Kondisi: Giardiasis Anak-anak usia 1–12 tahun: 400 mg, 1 kali sehari, selama 5 hari. Dosis maksimal 400 mg per hari atau 2.000 mg selama 5 hari. Kondisi: Ascariasis, trichuriasis, infeksi cacing tambang dan cacing kremi 1. Anak berusia 1–2 tahun: 200 mg, sekali sehari. Dosis maksimal penggunaan 200 mg per hari. 2. Anak di atas 2 tahun dan orang dewasa: 400 mg, sekali sehari.		

					Kondisi: Infeksi cacing hati atau opisthorchiasis Orang dewasa: 400 mg, 2 kali sehari, dalam waktu 3 hari. Dosis maksimal penggunaan 800 mg per hari.		
	Mebendazole	Mebendazole	Kontraindikasi penggunaan mebendazole adalah pada pasien dengan riwayat hipersensitivitas terhadap obat tersebut. Peringatan mebendazole terutama pada penggunaan jangka panjang dan pada kondisi khusus, seperti pasien gangguan hematopoietik	terapi cacing gilig (Ascaris lumbricoides) maupun cacing cambuk (Trichuris trichiura)	Kondisi: Infeksi cacing kremi (enterobiasis) Dosis 100 mg sebagai dosis tunggal. Jika diperlukan, konsumsi obat dapat diulang 2–3 minggu setelah pengobatan awal. Kondisi: Infeksi cacing gelang (ascariasis), cacing cambuk (trichuriasis), dan cacing tambang Dosis 100 mg, 2 kali sehari, selama 3 hari berturut-turut, atau 500 mg	• Sakit perut atau perut kembung • Mual, muntah, hilang nafsu makan, atau diare • Ruam kulit • Sakit kepala • Pusing • Kantuk	Simpan obat ini pada suhu ruang dan terhindar dari paparan matahari langsung.

					sebagai dosis tunggal.		
	Pirantel pamoat	Combanthrin syr	Hipersensitivitas terhadap mebendazol atau pyrantel pamoate. Kehamilan, terutama pada trimester pertama.	pengobatan infeksi yang disebabkan oleh cacing	2-6 tahun: 5-10 ml, 6-12 tahun: 10-15 ml, > 12 tahun: 15-20 ml	anoreksia, mual, muntah, diare, sakit kepala, pusing	simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung
	Dietilkarbamazine	Diethylcarbamazine 100 mg	• Pasien epilepsi atau riwayat sering kejang • Anak < 2 tahun • Ibu hamil • Riwayat gagal ginjal atau hemodialisis • Riwayat kak	Mengobati kaki gajah atau filariasis	Kondisi: Penyakit kaki gajah (filariasis) Dewasa: • Hari ke-1: 50 mg 1 kali sehari • Hari ke-2: 50 mg 3 kali sehari • Hari ke-3: 100 mg 3 kali sehari • Hari ke-4 hingga hari ke-14: 2 mg/kgBB 3 kali sehari. Anak-anak: • Hari ke-1: 1 mg/kgBB 1 kali sehari	• Mual dan muntah • Sakit kepala atau pusing • Nyeri sendi • Penglihatan kabur • Kantuk	Simpan diethylcarbamazine di tempat bersuhu ruangan, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak.

					• Hari ke-2: 1 mg/kgBB 3 kali sehari • Hari ke-3: 1–2 mg/kgBB 3 kali sehari • Hari ke-4 hingga hari ke-14: 2 mg/kgBB 3 kali sehari.		
	Piperazine	Neo ultraxon syr	Penderita gangguan ginjal berat Penderita epilepsi Wanita hamil	Pengobatan askariasis ntuk mengobati cacingan yang disebabkan oleh cacing gelang, cacing tambang, dan cacing kremi.	Dosis Ascariasis: diberikan dosis 4,5 g sebagai dosis tunggal, diulangi sekali setelah 14 hari. Enterobiasis: diberikan dosis 2,25 g, diminum 1 kali sehari selama 7 hari.	• Mual, muntah • Sakit perut • Diare • Ruam kulit • Sakit kepala Bronkospasme Pusing	Simpan dibawah suhu 30 derajat celcius

(2.f) OBAT TB

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat TB	Rifampisin	RifamTibi	Ikterus, hipersensitif	Tuberkulosis dan lepra.	Dewasa : BB < 50 kg : 450 mg/hari. BB > 50 kg : 600	Gangguan gastorintestinal, fngsi hati abnormal, reaksi demam	Simpan di tempat sejuk dan terhindar dari sinar matahari.

					mg/hari. Diberikan dosis tunggal selama 4 minggu pertama. 5 bulan berikutnya, 600 mg 2 kali seminggu. Dikonsumsi ketika sebelum makan	seperti gejala flu. Perubahan fungsi hati dan ginja (karena hipersensitif). Reaksi kuli, eosinofilia, leukpenia.	Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak
	Etambutol	Etambutol	Ethambutol tidak boleh diberikan kepada pasien yang memiliki riwayat alergi terhadap obat ini atau komponen lainnya	Ethambutol diindikasikan untuk terapi tuberkulosis paru dan ekstraparu. Obat ini biasanya digunakan dalam kombinasi dengan obat antituberkulosis lainnya seperti isoniazid, rifampicin, atau pyrazinamide untuk meningkatkan efektivitas pengobatan	Dewasa: Pengobatan Awal: 15 mg/kg berat badan per hari, diminum 1 kali sehari selama 2 bulan. Perawatan Ulang: Jika sebelumnya telah diobati, dosis dapat ditingkatkan menjadi 25 mg/kg berat badan per hari selama 60 hari, kemudian dilanjutkan dengan dosis 15 mg/kg berat badan per hari.	Neuritis Optik: Ini adalah efek samping paling umum dan serius, yang dapat menyebabkan gangguan penglihatan seperti: Kesulitan melihat warna (buta warna) Penglihatan buram Defek visual Skotoma (area kebutaan di lapangan pandang) Gangguan Pencernaan: Termasuk mual, muntah, sakit perut, dan kehilangan nafsu makan. Gangguan Neurologis: Seperti	Suhu Penyimpanan: Simpan ethambutol pada suhu antara 20-25 derajat Celsius. Beberapa sumber juga menyarankan untuk menyimpannya di tempat sejuk, antara 15-30 derajat Celsius

					Anak-anak: Dosis umum adalah 20 mg/kg berat badan per hari, diminum 1 kali sehari selama 2 bulan. Dosis untuk pencegahan tuberkulosis adalah antara 15-25 mg/kg berat badan per hari.	sakit kepala, pusing, kebingungan mental, dan halusinasi	
	Isoniazid, Pirazinamid	Pehadoxin forte	kontraindikasi pada pasien dengan penyakit hati yang diinduksi oleh obat. Saat mendapat terapi obat ini, sebaiknya dilakukan monitoring fungsi hati karena INH dapat menyebabkan gangguan fungsi hati.	Pencegahan dan pengobatan TBC di dalam maupun di luar paru	1x3 Sehari Berikan saat perut kosong 1 jam sebelum atau 2 jam sesudah makan.	Gangguan gastrointestinal, neuropati perifer, neuritis optikus, kejang, psikosis, gangguan hati, kelainan darah, reaksi kulit, hiperglikemi, asidosis, pelagra.	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung
	Streptomisin	Streptomycin sulfate for injection*	Streptomycin dikontraindikasikan pada pasien dengan hipersensitivitas terhadap streptomycin atau aminoglikosida	Streptomycin dikontraindikasikan pada pasien dengan hipersensitivitas terhadap streptomycin atau aminoglikosida	Dewasa: 15 mg/kgBB, 1 kali sehari, atau 25–35 mg/kgBB, 1–3 kali seminggu. Dosis maksimal	Mual Muntah Pusing Sakit perut Tidak nafsu makan	Streptomycin injeksi disimpan dalam suhu ruang (15–30℃), dan hindari dari paparan sinar matahari

			lainnya. Selain itu, tidak disarankan penggunaan pada pasien dengan hipersensitivitas berat terhadap sulfit, karena sediaan streptomycin paling sering adalah dalam bentuk streptomycin sulfate. Penggunaan bersama cidofovir juga kontraindikasi.	lainnya. Selain itu, tidak disarankan penggunaan pada pasien dengan hipersensitivitas berat terhadap sulfit, karena sediaan streptomycin paling sering adalah dalam bentuk streptomycin sulfate. Penggunaan bersama cidofovir juga kontraindikasi.	1,5 gram per kali pemberian. Anak-anak: 20–40 mg/kgBB, 1 kali sehari, atau 25–30 mg/kgBB, 2–3 kali seminggu. Dosis maksimal 1, 5 gram per kali pemberian.	Nyeri, iritasi, kemerahan di tempat suntikan	langsung. Sementara, larutan yang sudah dicampur dapat bertahan hingga 1 minggu di suhu ruang.

(3) ANTIHISTAMIN DAN ANTIALERGI

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Generasi I	Chlorpheniramine	CTM	penderita glaukoma sudut sempit. pasien obstruksi leher kandung kemih.	untuk mengatasi gejala alergi atau rhinitis alergi.	dosis CTM untuk meredakan gejala alergi: Dewasa: 1 tablet, 3–4 kali sehari. Anak-anak usia 6–12 tahun: ½ tablet, 3–4 kali sehari.	Kantuk Pusing atau sakit kepala Penglihatan kabur Sembelit Sakit perut	Simpan di tempat sejuk dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung

						Mulut, hidung, atau tenggorokan kering Mual atau muntah Diare Lelah atau lemas Selera makan berkurang atau bertambah	
	Diphenhyramine*	Sominal	Hindari penggunaan sominal pada pasien yang hipersensitif terhadap obat ini.	Meredahkan reaksi alergi pada tumbuh, mengatasi mabuk perjalanan dan penyakit parkinson	Alergi dan mabuk perjalanan Dewasa : 1 – 2 tablet, diminum 3 – 4 kali sehari. Dosis maksimal adalah 12 tablet perhari untuk mencegah mabuk perjalanan, konsumsilah30 menit sebelum melakukan perjalanan.	Penglihatan kabur, gelisah, kejang, euforia, rasa kantuk	Simpan pada suhu di bawah 25 ° C. Lindungi dari cahaya dan kelembaban
Generasi II	Ketotifen*	Intifen	Hipersensitif, gangguan bersama antidiabetik oral	Pencegahan jangka panjang untuk asma bronkial	Dewasa : 2 x sehari tablet, bila diperlukan dapat ditingkatkan hingga 2 x sehari 2 tablet	Mulut kering, pusing, mengantuk	Simpan di tempat sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari dan

					Anak > 3 tahun : 2 x sehari 0,5 sesudah makan		jauhkan dari jangkauan anak
	Loratadine	Rhinos SR	Hipersensitivitas terhadap loratadine dan pseudoephedrine Penyakit kardiovaskular, seperti insufisiensi koroner, aritmia, dan hipertensi berat Sedang menjalani terapi dengan monoamine oxidase inhibitors (MAOI) atau dalam waktu 10 hari setelah menghentikan pengobatan ini Retensi urine Glaukoma sudut sempit Hipertiroidisme Hipertensi berat Penyakit arteri koroner berat Kegagalan pernapasan	Rhinos SR adalah obat yang bermanfaat untuk meredakan gejala rhinitis alergi dan pilek (common cold), seperti bersin, gatal di hidung, hidung meler maupun tersumbat, dan mata berair. Obat ini hanya boleh digunakan untuk jangka pendek.	Dewasa dan anak >12 tahun: 2 kali sehari 1 kapsul.	Lemas Anoreksia Gangguan pencernaan seperi mual, muntah, sakit perut, mulut kering Jantung berdebar Takikardia (detak jantung melebihi 100 kali per menit)	Simpan Rhinos SR pada suhu 20 - 25 derajat Celsius, di tempat yang kering, terhindar dari cahaya matahari langsung, dan jauh dari jangkauan anak-anak
	Cetirizine	Cerini	angan menggunakan obat ini untuk pasien	Cerini adalah obat alergi yang mengandung	Dewasa & anak > 6 tahun : 1 kaplet, 1 kali sehari.	Mengantuk, pusing, sakit kepala, gelisah,	Simpan Cerini pada suhu 20 – 25 derajat

			yang memiliki riwayat hipersensitif terhadap Cetirizine.	cetirizine. Obat ini bermanfaat untuk meredakan gejala alergi, seperti bentol-bentol, kulit gatal-gatal, bersin-bersin, hidung gatal atau tersumbat, serta mata merah dan berair.		mulut kering & gangguan saluran cerna. Reaksi hipersensitif pada kulit & angioedema	Celcius, di tempat yang kering, terhindar dari cahaya matahari langsung, dan jauh dari jangkauan anak-anak
Generasi III	Desloratadin	Destavell	Hindari penggunaan Destavell pada pasien yang memiliki indikasi hipersensitif terhadap obat ini atau salah satu komponennya.	Destavell memiliki kegunaan untuk meredakan gejala alergi, seperi gatal-gatal, bersin-bersin, hidung dan mata berair.	Dewasa :1 x sehari 1 tablet, Anak usia 6-11 tahun 1 x sehari 1/2 tablet, anak usia 6-11 bulan 1 mg/hari, anak usia 1-2,5 tahun 1,25 mg/hari.	Kelelahan, mengantuk, dismenore pada penderita rhinitis (iritasi dan pembengkakan selaput hidung). Sakit kepala, mual, kelelahan, pusing, radang tenggorokan, gangguan pencernaan. Takikardia (detak jantung lebih cepat) & hipersensitivitas	Simpan pada suhu 15-30 derajat Celcius.

(4) SITOSTATISTIKA

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Sitostatika	Cyclophosphamide*	Cyclophosphamide*	>Pasien dengan kondisi ini tidak	Cyclophosphamide adalah obat	Kondisi: Kanker, termasuk	Mual atau muntah	disimpan dalam lemari

			boleh menggunakan Cyclophosphamide karena dapat memperburuk kondisi sumsum tulang yang sudah terganggu. > Penggunaan obat ini pada pasien dengan obstruksi saluran kemih dapat menyebabkan komplikasi serius. > Pasien yang mengalami infeksi aktif, termasuk infeksi saluran kemih, harus dihindari dari pemberian Cyclophosphamide	kemoterapi untuk menangani berbagai jenis kanker, termasuk limfoma, leukemia, kanker ovarium, retinoblastoma, atau kanker payudara. Selain itu, cyclophosphamide juga digunakan dalam pengobatan sindrom nefrotik.	limfoma Hodgkin, leukemia, atau kanker ovarium Dewasa: 40–50 mg/kgBB yang dibagi pemberiannya selama 2–5 hari dan akan diulang setelah 2–4 minggu pengobatan. Kondisi: Kanker payudara Dewasa: 600 mg/m2 luas permukaan tubuh (LPT), bisa dikombinasikan dengan obat antikanker lain. Kondisi: Limfoma non-Hodgkin Dewasa: 600–1.500 mg/m2 luas permukaan tubuh (LPT) Kondisi: Sindrom nefrotik Dewasa: 2–3 mg/kgBB, bisa	Hilang nafsu makan Diare Sakit perut Kulit dan kuku berubah warna menjadi lebih gelap Rambut rontok Sariawan di mulut dan lidah	pendingin dalam wadah kaca dan digunakan dalam waktu 14 hari.

					diberikan sampai 12 minggu ketika terapi dengan kortikosteroid tidak berhasil.		
antimetabolit	Fluorouracil*	Fluorouracil*	Fluorouracil tidak boleh diberikan kepada pasien yang hamil pada trimester pertama. Penggunaannya pada trimester kedua dan ketiga hanya diperbolehkan jika manfaatnya lebih besar daripada risiko perinatal	Indikasi fluorouracil atau 5-fluorourasil adalah agen kemoterapi untuk berbagai jenis tumor solid multipel, seperti kanker payudara dan keganasan saluran cerna. Rata-rata pasien akan mendapat 6 siklus kemoterapi dengan fluorouracil	Pada kasus kanker kolon dan rektum, fluorouracil diberikan perinfus dengan dosis 400 mg/m2 hari pertama, yang diikuti dengan 2.800 mg/m2/46 jam. Kemudian, dosis diulang setiap 2 minggu	Mual muntah. Nafsu makan hilang. Kulit kering atau gatal. Rambut rontok (sementara)	tempat yang kering serta terhindar dari sinar matahari langsung.
antrasiklin	Doxorubicin*	Doxorubicin*	>Pasien dengan riwayat reaksi alergi terhadap Doxorubicin atau obat lain dari golongan antrasiklin (seperti daunorubicin) tidak boleh menggunakan obat ini. >Doxorubicin dikontraindikasikan pada pasien dengan	Indikasi doxorubicin adalah sebagai agen kemoterapi untuk kanker payudara, limfoma Hodgkin, limfoma non-Hodgkin, leukemia limfoblastik akut, leukemia mieloblastik akut, dan beberapa	dosis doxorubicin untuk kasus ini adalah 60 mg/m2 (diberikan secara bolus intravena) pada hari pertama dalam setiap 21 hari siklus terapi, dikombinasi	Mual dan muntah Diare Kehilangan selera makan Rambut rontok selama pengobatan Infeksi jamur pada kuku Sariawan atau luka di mulut Urine, air mata, dan keringat	Letakkan produk gel pada suhu ruangan [15ºC hingga 30ºC (59ºF hingga 86ºF)] selama 2 hingga 4 jam untuk mengembalikan produk ke bentuk larutan yang sedikit kental dan

			insufisiensi miokard berat, aritmia berat, atau infark miokard dalam 4-6 minggu terakhir. >Penggunaan pada pasien dengan mielosupresi berat yang diinduksi oleh pengobatan antitumor sebelumnya atau radioterapi harus dihindari	kanker lain. Dosis doxorubicin yang dibutuhkan bervariasi tergantung jenis kanker yang ditangani. Hingga saat ini tidak ada rekomendasi perbedaan dosis berdasarkan usia pasien	dengan siklofosfamid dan diberikan sebanyak total 4 siklus	berwarna kemerahan hingga beberapa hari setelah pengobatan	mudah bergerak
agen antineoplastik	Carboplatin*	Carboplatin*	> Tidak boleh digunakan pada pasien yang memiliki riwayat alergi terhadap Carboplatin, senyawa platinum lainnya, atau manitol. > Pasien dengan kondisi ini harus dihindari dari penggunaan Carboplatin karena dapat memperburuk kondisi mereka. >Penggunaan pada pasien dengan perdarahan yang	Carboplatin adalah obat untuk menangani kanker, seperti kanker ovarium stadium lanjut atau kanker paru sel kecil. Obat ini termasuk ke dalam obat kemoterapi yang mengandung platinum.	>TERAPI AGEN TUNGGAL untuk digunakan dalam pengobatan kanker ovarium berulang: 360 mg/m2 melalui IV pada hari ke-1 setiap 4 minggu (sebagai alternatif, dosis karboplatin dapat dihitung dengan rumus Calvert di bawah). Biasanya, pengobatan tunggal yang	Nyeri atau rasa tidak enak badan. Mual dan muntah. Konstipasi. Nyeri otot, sendi, atau tulang.	carboplatin yang belum dibuka sebaiknya disimpan pada suhu 25°C.

			signifikan tidak dianjurkan.		terputus-putus tidak boleh diulang sampai jumlah neutrofil setidaknya 2000 dan jumlah trombosit setidaknya 100.000. > TERAPI KOMBINASI (dengan siklofosfamid) untuk digunakan dalam pengobatan kanker ovarium stadium lanjut (kombinasi yang efektif untuk pasien yang sebelumnya tidak pernah diobati): ~Karboplatin: 300 mg/m2 melalui IV pada hari ke-1 setiap 4 minggu selama 6 siklus (sebagai alternatif, dosis		

					karboplatin dapat dihitung dengan rumus Calvert di bawah) ~Siklofosfamid 600 mg/m2 IV pada hari ke 1 setiap 4 minggu selama 6 siklus ~Pemberian karboplatin intermiten bersamaan dengan siklofosfamid tidak boleh diulang sampai jumlah neutrofil minimal 2000 dan jumlah trombosit minimal 100.000.		
Sitostatika	Rheu trex*	Rheu trex*	>Pasien yang memiliki riwayat alergi terhadap Methotrexate atau komponen lainnya tidak boleh menggunakan obat ini. > Penggunaan Rheu-Trex	Rheutrex mengandung methotrexate yang digunakan untuk mencegah leukemia meningeal. Kandungan ini juga umum dipakai dalam terapi	Dosis 15-30 mg setiap hari selama 5 hari. Ulangi terapi sebanyak 3-5 kali sesuai kebutuhan hingga gejala toksik mereda.	Mual. Muntah. Kesulitan menelan. Stomatitis. Faringitis. Leukopenia. Trombositopenia.	Simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celsius.

			dikontraindikasikan pada pasien dengan kondisi seperti anemia, leukopenia, dan trombositopenia	pemeliharaan yang dikombinasikan dengan agen kemoterapi lain untuk leukemia meningeal.			

(5) OBAT SISTEM SARAF

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat hipnotik sedatif/antiansietas	Benzodiazepin (alprazolam)	Alprazolam	Alprazolam kontraindikasi pada pasien yang diketahui memiliki hipersensitivitas terhadap obat ini atau obat golongan benzodiazepine lain. Alprazolam disarankan untuk tidak digunakan pada pasien dengan penyakit pulmonal. Penggunaan bersamaan dengan depresan saraf pusat, terutama opioid, akan meningkatkan risiko depresi napas, penurunan tekanan darah, dan kematian.	Indikasi alprazolam adalah untuk gangguan cemas menyeluruh dan gangguan panik dengan atau tanpa agorafobia	Dewasa: Dosis 0,25 – 0,5 mg, diminum 3 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan tiap 3–4 hari, hingga mencapai dosis 3–4 mg per hari. Lama pengobatan tidak boleh lebih dari 12 minggu. Lansia: Dosis 0,25 mg, diminum 2–3 kali sehari.	• Pernapasan lemah atau dangkal. • Perasaan pusing, seperti akan pingsan. • Kejang. • Halusinasi, perilaku pengambilan risiko. • Peningkatan energi, penurunan kebutuh	1. Obat narkotika dan psikotropika harus disimpan dalam lemari khusus yang terbuat dari bahan yang kuat dan tidak mudah dipindahkan. 2. Lemari tersebut harus memiliki kunci ganda yang berbeda, dan kunci-kunci tersebut harus dipegang oleh apoteker atau petugas yang berwenang. 3. Lemari penyimpanan

						an untuk tidur. • Pikiran berpacu, gelisah atau banyak bicara. • Pengliha tan ganda. • Penyakit kuning (mengun ingnya kulit atau mata).	sebaiknya diletakkan di ruang khusus, di sudut ruangan, dan tidak terlihat oleh umum.

	Benzodiazepin (diazepam)	Diazepam	Memiliki masalah hati atau ginjal. Mengidap myasthenia gravis, kondisi yang menyebabkan kelemahan otot. Mengidap sleep apnea, kondisi yang menyebabkan masalah pernapasan saat tidur. Mengalami depresi atau pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri.	menangani ansietas, spasme otot, tetanus, kejang, insomnia, premedikasi sebelum anestesi, sedasi sebelum tindakan, dan gejala putus alkohol.	Dewasa: 0,2–0,5 mg/kgBB, dosis tidak lebih dari 20 mg. Anak-anak: Untuk anak usia 2–6 tahun, dosisnya 0,5 mg/kgBB, sedangkan untuk anak usia 6–11 tahun, dosisnya 0,3 mg/kgBB. Sementara untuk anak usia >12 tahun, dosisnya 0,2 mg/kgBB. Dosis dapat diulang tiap 4–12 jam sesuai kebutuhan	Kantuk Pusing Lelah Penglihatan buram Limbung Sakit kepala Sensasi panas di sekitar wajah dan leher (flushing) Mual, sakit perut, sembelit atau justru diare Otot kedutan	1. Obat narkotika dan psikotropika harus disimpan dalam lemari khusus yang terbuat dari bahan yang kuat dan tidak mudah dipindahkan. 2. Lemari tersebut harus memiliki kunci ganda yang berbeda, dan kunci-kunci tersebut harus dipegang oleh apoteker atau petugas yang berwenang. 3. Lemari penyimpanan sebaiknya diletakkan di ruang khusus, di sudut ruangan, dan tidak terlihat oleh umum.
	Barbiturat (fenobarbital)	Phenobarbital	Kontraindikasi pemberian phenobarbital atau fenobarbital adalah gangguan hepar dan ginjal yang berat. Peringatan	untuk pengobatan kejang, termasuk epilepsi, serta untuk efek sedasi dan hipnotik.	Dewasa: 60–180 mg per hari pada malam hari. Dosis dapat ditambah hingga 350 mg per hari yang	Pusing Kantuk Sakit kepala Mual Muntah	Simpan pada suhu antara 20-25°C.

			diberikan untuk tidak menghentikan phenobarbital secara mendadak, karena dapat menyebabkan efek withdrawal		dibagi dalam beberapa kali jadwal konsumsi. Penambahan dosis dilakukan hingga kejang dapat terkontrol dengan baik. Anak-anak: 5–8 kg/BB per hari atau 3–6 mg/kgBB per hari	Hilang nafsu makan Lelah Suasana hati menurun Euforia (rasa gembira yang berlebihan atau tidak wajar), terutama pada anak kecil dan lansia	
Obat analgetik sentral	Fentanil	Fentanyl Citrate Inj	Pasien yang memiliki riwayat depresi pernafasan, cedera kepala, asma akut, ibu hamil, dan menyusui	Meredakan nyeri hebat, seperti akibat kanker atau operasi, bisa juga digunakan sebagai obat bius atau obat tambahan untuk meningkatkan efek obat bius saat operasi	Dewasa dan anak usia > 2 tahun : 25 – 100 mcg/jam diberikan setiap jam Suntikan bisa diberikan ke otot (IM), pembuluh darah vena (IV), atau dimasukkan ke dalam infus IV	Rasa panas, gatal, perih, bengkak, kesemutan, perubahan warna kulit, atau nyeri di area bekas suntikan, muntah, berkeringat, batuk, dan kulit kemerahan	Simpan pada suhu antara 20 – 25 derajat Celcius dan terhindar dari cahaya
	Petidin	Pethidin HCl Inj	Hipersensivitas, pasien yang mengonsumsi MAOI, seperti selegiline dan phenelzine	Meredakan nyeri sedang hingga parah, membantu meringankan nyeri setelah melahirkan	• Dewasa : sekitar 25 – 150 mg melalui injeksi IM atau SC setiap 4 jam, melalui injeksi IV lambat dengan dosis 25 – 50 mg diulang setiap 4 jam	Kantuk, mual, muntah, sakit kepala, jantung berdebar, kelelahan, kesulitan buang air kecil, terus berkeringat, mulut kering,	Simpan pada suhu antara 20 – 25 derajat Celcius dan terhindar dari cahaya

					• Anak : 0,5 – 2 mg/kg melalui injeksi IM atau SC, dapat diulang setiap 4 jam • Lansia : mulai dari dosis paling rendah	sembelit, dan ruam pada kulit	
	Morfin	Morfina	Kontraindikasi pemberian morfina adalah pasien dengan hipersensitivitas terhadap obat dan pasien dengan gejala depresi pernapasan	Indikasi morfina adalah untuk meredakan nyeri yang tidak bisa diatasi dengan analgesik nonnarkotik. Hal ini mencakup kondisi pre dan pasca operasi, infark miokard, dan nyeri pada pasien kanker. Morfin dapat digunakan pada pasien dengan nyeri hebat atau nyeri yang tidak hilang dengan analgesik nonnarkotik	Morfin sediaan tablet: 5–20 mg tiap 4 jam. Morfin sediaan tablet lepas lambat: 10–30 mg tiap 12–24 jam. Morfin sediaan sirop: 10–20 mg tiap 4 jam.	Mual atau muntah Kepala terasa ringan atau pusing Sembelit Kantuk Keringat berlebih Mulut kering Sakit kepala Kram perut, nyeri lambung, kembung Perubahan suasana hati menjadi lebih senang atau justru makin sedih	Morfin harus disimpan di tempat khusus yang aman, seperti lemari terkunci, untuk mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang. Tempat penyimpanan harus memenuhi standar keamanan yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.
Obat antagonis opioid	Nalokson	Nalokson hidroklorida	Nalokson tidak boleh diberikan kepada individu yang memiliki riwayat alergi atau hipersensitivitas terhadap obat ini. Namun, dalam situasi darurat,	Indikasi naloxone atau nalokson pada keadaan emergensi adalah depresi pernapasan akibat overdosis nalokson.	Orang dewasa, nalokson hidroklorida: 100-200 mcg.	Gatal- gatal. Kesulitan bernapas, pembengkakan pada wajah,	mengganti obat setelah kedaluwarsa dan jika telah terpapar suhu di bawah 3,8 °C (39

			manfaat pemberian nalokson dapat dipertimbangkan meskipun ada risiko hipersensitivitas. Penggunaan nalokson harus dilakukan dengan hati-hati pada pasien dengan riwayat penyakit jantung, seperti aritmia, takikardi ventrikel, fibrilasi ventrikel, atau edema paru, karena dapat memperburuk kondisi ini	Selain itu, nalokson dapat diberikan untuk reversal pernapasan pasca pemberian obat opioid terapeutik dan pasca operasi maupun mengurangi efek samping dari pemberian opioid secara epidural.	Anak anak , nalokson hidroklorida : 10-20 mcg/kg	bibir, lidah dan tenggorokan.	°F) atau di atas 40 °C (104 °F)
Obat antidepresan	Amitriptilin	Amytriptiline Hydrochloride	Kontraindikasi dari amitriptyline adalah pasien yang hipersensitif terhadap amitriptyline dan penggunaan bersamaan dengan antidepresan monoamine oxidase inhibitor (MAOI). Peringatan diperlukan terkait peningkatan risiko bunuh diri.	Indikasi amitriptyline adalah pengobatan depresi pada dewasa, nyeri neuropatik pada dewasa, profilaksis dari *tension type headache* kronis pada dewasa, profilaksis migraine pada dewasa, dan tata laksana eneuresis nokturnal pada anak	1. Depresi: Dewasa: Dosis awal biasanya 75 mg per hari, dibagi dalam beberapa dosis atau diminum sekaligus sebelum tidur. Dosis dapat ditingkatkan secara bertahap hingga 150 mg per hari, tergantung pada respons pasien. Dalam kasus yang parah, dosis hingga 300 mg per hari mungkin diperlukan, tetapi hanya di bawah pengawasan ketat dokter. Lansia:	Kantuk. Pusing. Mulut kering. Pandangan kabur. Konstipasi atau justru diare. Kenaikan berat badan. Sulit buang air kecil. Kulit lebih mudah terbakar matahari (sunburn)	simpan amitriptyline pada suhu ruangan, idealnya antara 20-25 derajat Celsius. Hindari penyimpanan di tempat yang terlalu panas atau terlalu dingin. Simpan obat di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak dan hewan peliharaan.

					Dosis awal yang lebih rendah, seperti 10-25 mg per hari, biasanya direkomendasikan. Dosis dapat ditingkatkan secara bertahap, tetapi dengan hati-hati untuk menghindari efek samping 2. Nyeri Neuropatik: Dosis awal biasanya 10-25 mg per hari, diminum sebelum tidur. Dosis dapat ditingkatkan secara bertahap hingga 75-150 mg per hari, tergantung pada respons pasien. 3. Migrain: Dosis awal biasanya 10-25 mg per hari, diminum sebelum tidur. Dosis dapat ditingkatkan secara bertahap hingga 100-150 mg per hari, tergantung pada respons pasien.		
golongan selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI)	Fluoksetin	NOPRES	Penggunaan Nopres tidak dianjurkan jika pasien memiliki riwayat	Indikasi fluoxetine yang telah disetujui oleh Food and	Dewasa: Dosis awal 20 mg, 1 kali sehari. Dosis dapat	Kantuk atau menguap yang berlebihan	Simpan fluoksetin pada

			hipersensitivitas terhadap fluoxetine atau bahan aktif lainnya dalam obat ini	Drugs Administration atau FDA adalah untuk depresi, gangguan obsesif kompulsif, premenstrual dysphoric disorder, bulimia nervosa, dan gangguan panik. Fluoxetine juga dapat digunakan pada gangguan depresi bipolar, dalam kombinasi bersama olanzapine.	ditingkatkan secara bertahap hingga maksimal 60 mg per hari. Pengobatan dilakukan setidaknya selama 6 bulan. Anak usia ≥8 tahun: Dosis awal 10 mg per hari. Dosis dapat ditingkatkan menjadi 20 mg per hari setelah 1–2 minggu.	Sakit kepala atau pusing Gangguan tidur Hilangnya nafsu makan Tremor Mual atau muntah Diare Mulut kering	suhu 20-25 derajat celcius.
Obat anestesi lokal	Bupivakain	Bupivakain	Pasien dengan riwayat alergi terhadap anestesi lokal jenis amida atau metilparaben tidak boleh menggunakan bupivacaine.	Indikasi bupivacaine adalah sebagai obat anestesi lokal yang digunakan untuk melakukan anestesi secara regional, epidural, spinal, atau infiltrasi lokal. Kebutuhan bupivacaine ini bergantung dari area atau bagian tubuh yang akan dilakukan anestesi, teknik anestesi,	Dosis maksimal untuk dewasa dalam satu kali injeksi adalah 175 mg, sedangkan dosis maksimal untuk 24 jam adalah 400 mg. njeksi dapat diulang sampai maksimal 3 kali pemberian. Pada ibu hamil, dosis bupivacaine 0,5% dapat ditingkatkan 3–4 mL setiap intervalnya, namun dosis maksimal yang diberikan adalah 50–100 mg.	Mual atau muntah. Pusing, sakit kepala. Menggigil atau gemetar seluruh tubuh. Tremor	disimpan di suhu ruang yang terhindar dari cahaya matahari dengan suhu berkisar antara 20–25 C.

				vaskularisasi jaringan, jumlah segmen neural yang akan diblok, kelemahan otot yang diharapkan, durasi anestesia yang diinginkan, toleransi individu, dan kondisi klinis pasien secara keseluruhan			
	Lidokain	Lidocain	Kontraindikasi lidocaine adalah pada pasien dengan hipersensitivitas terhadap komponen obat ini, serta pada kondisi adanya hipovolemia, complete heart block, sindrom Adam-Stokes, dan sindrom Wolff-Parkinson-White. Peringatan penggunaan lidocaine harus berhati-hati pada pasien dengan kelainan hepar, kehamilan, dan pasien menyusui	Lidocaine atau lidokain adalah anestesi lokal yang umum digunakan misalnya pada penjahitan luka, debridemen luka, dan tindakan bedah minor lainnya seperti sirkumsisi.	Dosis maksimal dewasa adalah 7 mg/kgBB dan tidak melebihi 500 mg. Dosis maksimal anak adalah 3 mg/kgBB, dimana berat badan yang digunakan adalah berat badan ideal.	Iritasi, gatal, kemerahan, atau nyeri di area suntikan Mual atau muntah Pusing Kantuk Linglung Penglihatan buram	Simpan di bawah suhu 30°C. Terlindung dari cahaya.
Obat sistem saraf otonom (antikholinergik, kholinergik)	Prostigmin,	Prostigmin	Pasien dengan alergi terhadap neostigmine atau bromida tidak boleh menggunakan obat ini karena risiko reaksi alergi yang serius. Tidak boleh digunakan pada pasien dengan obstruksi mekanis pada	Prostigmin digunakan untuk mengontrol gejala myasthenia gravis, yaitu suatu penyakit autoimun yang menyebabkan kelemahan otot	1.Mengendalikan Gejala Miastenia gravis Dosis: 1 mL (0,5 mg) secara injeksi sub kutan/intra muskular; dosis disesuaikan pada respon individu.	Alergi: Reaksi alergi dan anafilaksis. Neurologis: Pusing, kejang, kehilangan kesadaran, mengantuk, sakit kepala,	Simpan pada suhu ruangan 59-86 derajat F (15-30 derajat C) jauh dari cahaya dan kelembapan

			saluran pencernaan (misalnya usus) atau saluran kemih. Kontraindikasi pada pasien dengan peritonitis, yaitu peradangan serius pada membran yang melapisi organ dalam perut.	akibat gangguan pada saraf dan otot. Obat ini juga digunakan untuk mengobati ileus paralitik, yaitu kondisi di mana usus tidak berfungsi dengan baik dan tidak dapat bergerak secara normal. Prostigmin membantu dalam pengobatan retensi urin setelah operasi, di mana pasien mengalami kesulitan untuk mengeluarkan urin.	2. Pencegahan Distensi dan Retensi Urin Pasca Operasi Dosis: 0.5 mL (0.25 mg) secara injeksi sub kutan/intra muskular, segera sesudah operasi, ulangi tiap 4-6 jam selama 2-3 hari. 3. Retensi Urin Dosis: 1 mL (0-5 mg) secara injeksi sub kutan/intra muskular Jika urin tidak keluar dalam1 jam, pasien harus dikateter. Sesudah pengosongan kandung kemih, lanjutkan dengan injeksi 0.5 mg tiap 3 jam.	disartria, miosis dan perubahan visual.	
	Mestinon*	Mestinon	Pasien yang diketahui memiliki alergi terhadap pyridostigmine atau agen antikolinesterase lainnya tidak boleh menggunakan obat ini, karena dapat menyebabkan reaksi alergi serius. Mestinon tidak boleh diberikan kepada pasien	Mestinon digunakan untuk mengelola gejala myasthenia gravis, yaitu penyakit autoimun yang menyebabkan kelemahan otot akibat gangguan	1. Penyakit autoimun yang menyebabkan kelemahan otot (Myasthenia gravis) Dewasa: di berikan dosis 30-120 mg setiap hari.	Mual, muntah Peningkatan air liur Diare Kram perut	Simpan pada suhu 25 derajat Celcius.

			dengan obstruksi mekanis pada saluran pencernaan (usus) atau saluran kemih. Penggunaan obat ini dapat memperburuk kondisi tersebut dengan meningkatkan aktivitas kolinergik yang berpotensi menyebabkan peningkatan tekanan di dalam saluran tersebut. Pasien dengan peritonitis (peradangan pada selaput perut) juga harus menghindari penggunaan Mestinon, karena dapat memperburuk kondisi.	komunikasi antara saraf dan otot. Digunakan untuk mengembalikan fungsi otot setelah pemberian obat penghambat neuromuskular seperti atracurium dan vecuronium selama operasi. Pyridostigmine dapat digunakan sebagai terapi pencegahan pada personel militer terhadap pajanan gas beracun soman, yang merupakan senjata kimia dalam perang.	Anak usia 6-12 tahun: di berikan dosis 60 mg setiap hari 2. Kelumpuhan pada otot usus(leus paralitik), dan gangguan pada kandung kemih (retensi urin) pasca operasi. Dewasa: di berikan dosis 60-240 mg setiap hari. Anak: di berikan dosis 15-60 mg setiap hari.		
	Atropine*	Atropine	Atropin dapat meningkatkan tekanan intraokular, sehingga tidak boleh digunakan pada pasien dengan glaukoma sudut tertutup atau sudut sempit antara iris dan kornea. Penggunaan atropin pada pasien dengan blok AV	Penggunaan atropin pada pasien dengan blok AV derajat 2 atau 3 dapat memperburuk kondisi jantung dan menyebabkan komplikasi serius.	Kondisi: Divertikulitis, irritable bowel syndrome (IBS), dispepsia Dewasa: 0,6–1,2 mg, 1 kali sehari, dikonsumsi pada malam hari sebelum tidur.	Mulut kering Sembelit Kantuk Hipertemia Sakit kepala Pusing	Simpan pada suhu 15-30 derajat Celcius, di tempat kering dan sejuk.

			derajat 2 atau 3 dapat memperburuk kondisi jantung dan menyebabkan komplikasi serius. Atropin dapat meredakan kejang otot pada saluran pencernaan, termasuk kondisi seperti kolitis, divertikulitis, dan sindrom iritasi usus (IBS).	Obat ini berfungsi sebagai antidot untuk keracunan organofosfat, menghambat efek kolinomimetik dari pestisida ini	Kondisi: Bradikardia Dewasa: 0,5 mg, setiap 3–5 menit. Dosis maksimal 3 mg. Kondisi: Keracunan insektisida jenis organofosfat Anak-anak: 0,05–0,1 mg/kgBB, diberikan setiap 5-10 menit hingga efek racun menghilang.	Penglihatan kabur atau mata yang sensitif terhadap cahaya	
	Skopolamin *	skopolamin	Pasien dengan riwayat alergi atau hipersensitivitas terhadap scopolamin atau alkaloid belladonna lainnya tidak boleh menggunakan obat ini. Scopolamin dapat menyebabkan midriasis (pelebaran pupil), yang dapat memperburuk tekanan intraokular pada pasien dengan glaukoma sudut tertutup.	Indikasi scopolamine atau hyosin digunakan untuk penanganan mual dan muntah terkait mabuk perjalanan (motion sickness) dan pasca operasi	Dewasa dan anak usia ≥ 12 tahun: 10 mg, 3 kali sehari. Jika diperlukan, dosis dapat ditingkatkan hingga 20 mg, 4 kali sehari.	Kulit atau mulut kering Penglihatan kabur Lelah atau kantuk Pusing Sembelit Nyeri atau sulit buang air kecil	Simpan di dalam suhu ruangan dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak

	Arikine*	Arikine	Pasien dengan riwayat alergi terhadap trihexyphenidyl atau komponen lain dalam obat ini tidak boleh menggunakannya. Penggunaan Arikine dapat memperburuk kondisi ini dengan meningkatkan tekanan intraokular, sehingga tidak dianjurkan bagi pasien dengan glaukoma sudut sempit.	mengatasi penyakit Parkinson dan mengatasi gejala ekstrapiramidal akibat obat	Dewasa: dosis awal 1 mg di hari pertama, kemudian ditingkatkan menjadi 2 mg diberikan 2 – 3 kali sehari selama 3 – 5 hari atau sampai tercapainya dosis terapi. Post encephalitic: dosis 12 – 15 mg per hari. Tujuan: gangguan ekstrapiramidal Dewasa: Dosis awal 1 mg yang dapat ditingkatkan perlahan hingga gejala berkurang. Dosis maksimal 5 – 15 mg per hari.	Penglihatan buram, Pusing, sakit kepala, Kulit memerah (flushing) , Mual, muntah , Mulut kering , Kantuk , Konstipasi , Kelelahan, Rasa cemas atau gugup	Simpan Arkine tablet pada suhu 20 - 25 derajat Celsius, di tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya matahari langsung.
Obat sistem saraf otonom (adrenergik, antiadrenergik)	Catapres*	Catapres	Pasien dengan riwayat alergi terhadap clonidine atau komponen lain dalam obat ini tidak boleh menggunakannya. Tidak dianjurkan untuk pasien yang memiliki riwayat bradikardia atau	Catapres digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi (hipertensi) baik sebagai terapi tunggal maupun kombinasi dengan	Dosis awal 75–150 mcg, 3 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan setiap 2–3 hari, sesuai respons tubuh pasien. Dosis pemeliharaan 300–1200 mcg per hari	Kantuk Pusing Mulut kering Rasa lelah Hilang nafsu makan Sembelit	Simpan Catapres di tempat bersuhu ruangan dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat ini

			gangguan irama jantung berat, seperti blok AV derajat 2 atau 3.	obat antihipertensi lainnya. Catapres dapat digunakan untuk mencegah serangan migrain pada pasien yang mengalami sakit kepala berulang. Secara off-label, clonidine digunakan untuk membantu mengelola gejala ADHD dengan memengaruhi bagian otak yang mengontrol perhatian dan impulsif.	yang diberikan dalam dosis terbagi.	Sulit tidur atau mimpi buruk	dari jangkauan anak-anak
	Fenilefrin*	Fenilefrin	Fenilefrin dikontraindikasikan pada pasien dengan hipertensi berat karena dapat meningkatkan tekanan darah lebih lanjut. Penggunaan fenilefrin tidak dianjurkan pada pasien dengan takikardia ventrikel, yang dapat	Fenilefrin digunakan untuk meredakan hidung tersumbat akibat flu, batuk pilek, alergi, atau sinusitis. Ini membantu mengurangi gejala hidung tersumbat dengan menyempitkan	Dewasa dan anak usia ≥12 tahun: 10 mg tiap 4 jam, dikonsumsi sampai 7 hari. Dosis maksimal 60 mg per hari	Sakit kepala dan pusing Sakit perut ringan, Gelisah,sulit tidur,Gemetar Denyut jantung cepat,Tangan atau kaki terasa dingin	Simpan phenylpherine tablet atau sirop di tempat yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari langsung. Simpan pada suhu ruang.

			memperburuk kondisi jantung	pembuluh darah di area nasal. Fenilefrin digunakan sebagai vasopressor untuk meningkatkan tekanan darah pada pasien dengan hipotensi, terutama dalam situasi seperti syok septik atau selama anestesi			
	Noradrenalin*	noradrenalin	Hipersensitivitas: Pasien yang mengalami reaksi hipersensitivitas terhadap norepinefrin atau komponennya tidak boleh menggunakan obat ini Norepinefrin tidak boleh diberikan pada pasien dengan hipotensi yang disebabkan oleh kekurangan volume darah, kecuali dalam keadaan darurat untuk mempertahankan perfusi arteri koroner dan serebral. Penggunaan norepinefrin harus dihindari pada pasien dengan trombosis vaskular mesenterika atau perifer,	Norepinefrin digunakan sebagai vasopressor untuk mengatasi hipotensi akut yang mengancam jiwa, termasuk pada pasien yang mengalami syok septik atau syok neurogenik. Obat ini membantu meningkatkan tekanan darah dengan menyempitkan pembuluh darah perifer. Norepinefrin juga digunakan dalam	Dosis awal: 2 hingga 10 mikron/menit . Titrasi sesuai dengan parameter tekanan darah yang ditentukan – misalnya, dengan penambahan 0,5 hingga 2 mikron/menit. Kisaran dosis biasa: 0,5 hingga 30 mikron/menit. Dosis maksimum: hingga 100 mikron/menit dalam kasus ekstrem	Mati rasa, badan terasa lemas atau dingin Detak jantung lambat, cepat, atau tidak teratur Sesak napas Sianosis atau bibir dan kuku berwarna kebiruan Sakit kepala berat, pandangan kabur, bicara cadel, atau sulit	Simpan dalam wadah yang tertutup rapat dan tahan cahaya karena norepinefrin mudah teroksidasi. Jangan gunakan jika sediaan sudah berubah warna (misalnya merah muda, kuning tua, coklat) atau jika ada endapan

			karena vasokonstriksi dapat memperburuk iskemia dan infark	pengobatan henti jantung sebagai terapi tambahan untuk memulihkan tekanan darah dan curah jantung setelah resusitasi jantung-paru (CPR) yang dilakukan.		menjaga keseimbangan Linglung, cemas, tremor, lelah yang tidak biasa, atau keringat yang berlebihan	
	ephinephrin	Ephedrine	Pasien dengan riwayat alergi terhadap efedrin atau komponen lainnya tidak boleh menggunakan obat ini. Efedrin dikontraindikasikan pada pasien dengan glaukoma sudut tertutup karena dapat meningkatkan tekanan intraokular.	Efedrin berfungsi sebagai dekongestan untuk meredakan hidung tersumbat akibat flu, batuk pilek, atau alergi. Biasanya diberikan dalam bentuk tetes hidung. Efedrin digunakan untuk mencegah atau mengatasi hipotensi yang disebabkan oleh anestesi spinal atau epidural, dengan meningkatkan tekanan darah.	Obat efedrin tersedia dengan rincian berikut ini: kapsul, oral, sebagai sulfat: 25 mg, larutan, suntikan, seperti sulfat: 50 mg / mL (1 mL).	pandangan mata menjadi buram, kepala terasa pusing dan berat, detak jantung berdebar yang kadang terlalu cepat, merasa panik, telinga terasa seperti berdengung, iritasi perut, tremor, kehilangan selera makan,	Simpan obat ini pada suhu ruangan, antara 59 dan 77 derajat F (15 dan 25 derajat C). Jauhkan dari panas, kelembapan, dan cahaya. Jangan simpan di kamar mandi. Jauhkan efedrin dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan.

						tubuh tidak bisa beristirahat, serta gangguan tidur	
	Berotec*	berotec	Pasien yang alergi terhadap bahan aktif ini tidak boleh menggunakan Berotec. Kondisi detak jantung yang tidak teratur dan terlalu cepat, yang dapat meningkatkan risiko gagal jantung. Kelainan jantung yang menyebabkan penebalan dinding jantung dan berisiko menyebabkan kematian mendadak.	mengatasi serangan asma akut dan penyakit paru obstruktid kronis lainnya yang menyebabkan penyempitan jalan napas.	Tujuan: Mengatasi gejala asma akut atau kondisi sesak napas lainnya, seperti PPOK yang kambuh Dewasa: Gunakan sebanyak 1 hirup. Bila gejala tidak membaik dalam 5 menit, berikan dosis kedua. Tujuan: Mencegah gejala asma akibat olahraga Gunakan sebanyak 1–2 hirup, maksimal 8 hirup per hari.	Mual Pusing Sakit kepala Iritasi tenggorokan	Ikuti petunjuk penyimpanan yang tertera pada kemasan. Simpan Berotec pada suhu di bawah 30° Celsius, pada tempat yang sejuk dan kering dan terlindung dari cahaya matahari langsung. Selain itu, jauhkan dari jangkauan anak-anak serta hewan peliharaan.
	terbutalin,	Terbutalin	Terbutalin tidak boleh digunakan pada pasien yang memiliki riwayat alergi terhadap terbutalin atau obat simpatomimetik lainnya.	Terbutaline adalah obat untuk meringankan gejala mengi, batuk, dan sesak napas akibat asma atau penyakit paru obstruktif kronis,	Tujuan: Menangani penyempitan saluran napas (bronkospasme) akibat asma atau PPOK Bentuk obat: Tablet	Gelisah Tubuh gemetar (tremor) Sakit kepala Pusing	impan obat dalam wadah tertutuppada suhu ruangan, jauhkan dari panas, kelembaban, dan cahaya langsung.

			Terbutalin tidak dianjurkan untuk digunakan dalam tokolisis (penghentian persalinan) yang berkepanjangan, terutama lebih dari 48-72 jam, karena dapat meningkatkan risiko efek samping serius bagi ibu dan janin.	termasuk emfisema maupun bronkitis kronis. Obat ini termasuk dalam golongan bronkodilator.	Dewasa: 2,5 mg atau 3 mg, 3 kali sehari. Dosis bisa ditingkatkan hingga 5 mg jika diperlukan. Anak usia >15 tahun: 2,5 mg atau 3 mg, 3 kali sehari. Anak usia 12–15 tahun: 2,5 mg, 3 kali sehari. Anak usia <12 tahun: 0,05 mg/kgBB, 3 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan secara perlahan sesuai keperluan. Dosis maksimal 5 mg per hari. Bentuk obat: Inhaler Dewasa: 0,25–0,5 mg sesuai kebutuhan. Dosis maksimal adalah 2 mg per hari. Tujuan: Menangani gejala penyempitan saluran napas (bronkospasme) berat Bentuk obat: Nebulizer	Mual atau muntah Kantuk	Jauhkan dari pembekuan. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jangan menyimpan obat-obatan yang sudah kedaluwarsa atau obat-obatan yang tidak lagi diperlukan.

					Dewasa: 2,5–10 mg, 2–4 kali sehari. Anak dengan berat badan ≥25 kg: 5 mg, 2–4 kali sehari. Anak dengan berat badan <25 kg: 2–5 mg, 2–4 kali sehari. Bentuk obat: Suntik Dewasa: 0,25–0,5 mg, hingga 4 kali sehari yang disuntikkan ke otot (intramuscular/IM), pembuluh darah (intravena/IV), atau bawah kulit (subkutan/SC). Anak usia 2–15 tahun: 0,01 mg/kgBB. Dosis maksimal 0,3 mg/dosis.		
	Salbutamol	Lasal 2 mg	Orang yang memiliki riwayat alergi terhadap salbutamol atau obat agonis beta-2 lainnya tidak boleh menggunakan Lasal.	Lasal adalah obat yang digunakan untuk mengatasi asma, bronkitis kronis, penyakit obstruktif kronis, atau emfisema. Obat ini dapat	Dewasa : 2-3 x sehari 1-2 sendok takar 5 mL, Anak 6-12 tahun : 2-3 x sehari 1 sendok takar 5 mL, Anak < 6 tahun : 2-3 x sehari 0.5-1 sendok takar 5 mL. Saat perut kosong,	Tremor, palpitasi	Simpan obat Lasal pada suhu di bawah 25° Celsius, di tempat sejuk, kering, dan terhindar dari

				meredakan keluhan, seperti sesak napas, mengi, dan batuk, akibat kondisi tersebut. Lasal tersedia dalam bentuk obat minum dan suntik dengan kandungan salbutamol	1 jam sebelum atau 2 jam sesudah makan.		cahaya matahari langsung
	Propanolol	Propanolol 10 mg	Kontraindikasi dan peringatan penggunaan obat propranolol ditujukan terutama pada pasien dengan riwayat hipersensitivitas terhadap propranolol, pasien dengan asthma, serta risiko hipoglikemia pada bayi	Indikasi propranolol adalah untuk hipertensi, angina, aritmia, infark miokard, dan migraine. Dosis propranolol bergantung pada usia dan indikasi penggunaan	Dewasa dan anak > 12 tahun untuk hipertensi : 20 mg, 3-4 kali sehari; aritmia : 10-20 mg, 3-4 kali sehari; angina : 10-20 mg, 3-4 kali sehari; mencegah migrain : 40 mg,2-3 kali sehari. Anak-anak : aritmia : 0,5 mg/kgBB/hari dibagi 3-4 kali pemberian; hipertensi : 1-3 mg/kgBB/hari dibagi 3 kali pemberian.	Kulit kemerahan, melepuh, terkelupas, atau mengendur, termasuk di dalam mulut. Detak jantung lambat— pusing, merasa pingsan atau pening, kebingungan, kesulitan bernapas, kelemahan atau kelelahan yang tidak biasa. Suasana hati memburuk, perasaan depresi	Harus disimpan pada suhu 20-25ºC serta hindarkan dari paparan sinar matahari langsung
	Betablok*	Betablok	Pasien yang memiliki riwayat alergi terhadap	Betablok adalah obat yang	Tujuan : Hipertensi	Bradikardia	Simpan Betablok pada suhu 20 -

			atenolol atau komponen lain dalam formulasi tidak boleh menggunakan Betablok. Penggunaan Betablok pada pasien dengan kondisi ini dapat memicu bronkospasme yang parah. Pada pasien dengan gagal jantung dekompensata, penggunaan Betablok dapat memperburuk gejala dan fungsi jantung.	digunakan sebagai obat anti hipertensi, angina, serangan jantung, dan penyakit gangguan kardiovaskular lainnya. Betablok mengandung atenolol, obat yang termasuk golongan beta blocker.	Bentuk : Tablet Dewasa: dosis awal: 25 – 50 mg per hari, dosis dapat ditingkatkan hingga 100 mg per hari disesuaikan dengan respon medis Tujuan : Angina Pektoris Bentuk : Tablet Dewasa: dosis awal: dosis 50 mg per hari. Dosis dapat ditingkatkan menjadi 100 mg per hari dengan jarak pemberian 1 minggu dari dosis awal jika ditoleransi. Dosis dapat ditingkatkan hingga 200 mg per hari disesuaikan dengan respon medis Tujuan : Post Infark Myocard Bentuk : Tablet Dewasa: dosis 100 mg per hari dapat diberikan dalam dosis tunggal atau dalam	Gagal jantung Hipotensi Bronkospasme Gangguan saluran cerna seperti mual, muntah, nyeri perut, diare atau konstipasi Rasa lelah Pusing dan sakit kepala Gangguan tidur Ruam kulit	25 derajat Celcius, di tempat yang kering, terhindar dari cahaya matahari langsung, dan jauh dari jangkauan anak-anak.

					dosis terbagi, durasi terapi 6 – 9 hari setelah kejadian infark miokard		
	Minipres*	Minipres	Minipres tidak boleh digunakan pada pasien yang memiliki riwayat alergi terhadap prazosin atau obat golongan quinazoline lainnya, seperti alfuzosin, doxazosin, dan terazosin. Pasien dengan tekanan darah rendah tidak dianjurkan untuk menggunakan Minipres, karena obat ini dapat menyebabkan penurunan lebih lanjut dalam tekanan darah	pengobatan hipertensi, untuk menurunkan tekanan darah. Menurunkan tekanan darah mengurangi risiko kejadian kardiovaskular yang fatal dan tidak fatal, terutama stroke dan infark miokard.	Dosis Awal: 1 mg, diminum 2 atau 3 kali sehari. Dosis Pemeliharaan: Dapat ditingkatkan secara bertahap hingga 20 mg per hari, dibagi dalam beberapa dosis. Dosis yang umum digunakan berkisar antara 6–15 mg per hari.	Pusing atau sakit kepala: Terjadi pada banyak pasien, sering kali terkait dengan penurunan tekanan darah. Kantuk: Rasa mengantuk dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Kelelahan dan lemas: Beberapa pasien melaporkan merasa kurang energi. Palpitasi: Detak jantung yang terasa lebih cepat atau tidak teratur.	Suhu Penyimpanan: Simpan Minipres pada suhu ruangan, idealnya antara 15°C hingga 30°C. Hindari penyimpanan di tempat yang panas atau lembab. Jauhkan dari Sinar Matahari: Pastikan obat disimpan di tempat yang terlindung dari sinar matahari langsung untuk mencegah kerusakan.

						Mual: Beberapa pasien mungkin mengalami mual atau muntah.	

(6) OBAT KARDIOVASKULAR

(6.a) Obat antihipertensi

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Diuretik	Furosemid	Furosemide	Hipersensitif terhadap furosemid dan sulfonamid, anuria, defisiensi elektrolit misalnya hipoklemia atau hiponatremia, koma hepatik, hipovolemia dengan atau tanpa hipotensi, gagal ginjal, hamil beserta menyusui	Untuk menurunkan tekanan darah tinggi, dan mencegah stroke, serangan jantung, serta gangguan ginjal.		• Pusing, sakit kepala. • Hipotensi. • Lemah dan lesu.	
	HCT	Hydrochlortiazide	Hydrochlorothiazide dan obat diuretik lainnya dikontraindikasikan pada pasien dengan kondisianuria atau memiliki gangguan fungsi ginjal berat. Selain itu, pasien yang	untuk hipertensi, gagal jantung, dan mengurangi edema akibat berbagai penyakit, seperti sirosis hepatis. Obat ini merupakan obat diuretik kerja singkat	Dewasa: 25–100 mg per hari, dapat dibagi dalam 1–2 jadwal konsumsi. Dosis maksimal 200 mg per hari. Obat dapat dikonsumsi 2 hari sekali atau 3–5 kali dalam seminggu.	Pusing Sakit kepala Frekuensi buang air kecil makin sering Sakit maag Hilang nafsu makan Rambut rontok	Menjauhkan obat dari jangkauan anak-anak. Menyimpan obat dalam kemasan asli dan dalam

			memiliki alergi terhadap hydrochlorothiazide atau obat derivat sulfonamid lainnya juga tidak boleh mengonsumsi obat ini				wadah yang tertutup rapat serta etiket yang masih lengkap. Menyimpan obat ditempat yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari langsung atau mengikuti aturan yang tertera pada kemasan
	Spironolakton	Spironolactone 25 mg	Pasien anuria, gangguan ginjal akut, gangguan fungsi ekskresi ginjal yang signifikan, hiperkalemia, sensitif terhadap spironolactone, atau kehamilan	Menurunkan tekanan darah tinggi (hipertnesi), pengobatan hiperaldosteronisme dan kondisi edema pasien gagal jantung, sirosis, atau sindrom nefrotik	• Diagnosis dan pengobatan hiperaldosteronisme primer : jika perlu waktu lama untuk melakukan tes, diberikan dosis 400 mg/hari selama 3 – 4 minggu. Jika perlu waktu singkat untuk melakukan tes, diberikan dosis 400 mg/hari selama 4 hari • Edema jantung : 50 – 100	Perdarahan lambung, tukak, gastritis, diare, kram perut, mual muntah, menstruasi tidak teratur, pembengkakan di payudara, demam, sakit kepala, mengantuk, gangguan fungsi ginjal	Simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius terlindung dari cahaya. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

					mg/hari dalam dosis tunggal atau terbagi • Edema akibat sirosis hati : 300 – 600 mg/hari • Edema akibat sindrom nefrotik : biasanya 100 – 200 mg/hari • Hipertensi esensial : dosis awal 25 mg/hari, kemudian ditingkatkan menjadi 100 mg/hati dalam dosis tunggal atau terbagi dua. Dosis diatur sesuai dengan tekanan darah dan kadar kalium serum Dikonsumsi dengan makan atau setelah makan. Tidak disarankan minum menjelang malam hari karena dapat mengganggu waktu tidur yang disebabkan oleh		

					seringnya buang air kecil		
CCB	Amlodipine	Amlodipine 5 mg	Hipersensitif	Pengobatan lini pertama hipertensi, pengobatan nyeri dada kronis (angina pektoris) akibat penyakit jantung koroner, dan dapat digunakan sebagai agen tunggal untuk mengontrol tekanan darah pada sebagian besar pasien	• Dewasa : hipertensi dan angina : dosis awal 1x sehari 5 mg, dapat ditingkatkan hingga dosis maksimal 10 mg • Anak usia 6 – 17 tahun : dosis awal 1x sehari 2,5 mg, dapat ditingkatkan menjadi 5 mg sekali sehari setelah interval 4 minggu sesuai dengan respons klinis • Lansia : dosis awal 2,5 mg sekali sehari Dikonsumsi sebelum atau sesudah makan	Sakit kepala, pusing, mengantuk, debaran jantung, sakit perut, mual, edema, kelelahan	Simpan obat di tempat yang kering dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhlan obat dari jangkauan anak-anak
	Nifedipin	Adalat Oros 30 mg	Hipersensitivitas, syok kardiovaskuler, 8 hari pertama setelah infark miokard akut, pasien yang menerima terapi rifampisin, hamil dengan usia	Untuk hipertensi, angina pektoris, kronik stabil, angina pektoris pasca infarka	1 kali sehari 1 tablet Dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Obat harus ditelan utuh, jangan	Pusing atau sakit kepala, lemas, rasa hangat (wajah, leher, atau dada), nyeri ulu hati, mual, kram otot, perubahan suara hati, batuk, sakit	Simpat di tempat bersuhu ruangan dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung.

			kurang dari 20 minggu dan/atau menyusui		dikunyah atau dihancurkan	tenggorokan, atau hidung tersumbat	Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak
	Verapamil	IsoptinSR*	Syok kardiogenik Hipotensi dengan tekanan sistolik kurang dari 90 mmHg Bradikardia (denyut jantung lambat) Gagal jantung yang tidak bisa dikompensasi Disfungsi ventrikel berat	Untuk pengobatan hipertensi.	1x1 Sehari	Hipersensitivitas. Sakit kepala. Pusing dan vertigo. Sinus bradikardia (detak jantung lebih lambat) Edema periferal. Palpitasi (jantung berdebar). Takikardia (detak jantung sangat cepat). Hipotensi (tekanan darah rendah)	Simpan pada tempat yang sejuk dan kering, pada suhu 15-25 derajat Celcius.
	Nicardipine*	Cardene IV	Hipersensitivitas terhadap nicardipine. Infark miokard yang belum lama terjadi (dalam 1 bulan terakhir)	Untuk terapi krisis hipertensi. Obat ini juga kadang digunakan untuk terapi stroke iskemik akut, hipertensi perioperatif, dan preeklampsia berat bila antihipertensi	dimulai dari dosis infus 5 mg/jam. Dosis dapat dititrasi setiap 15 menit dengan peningkatan 2,5 mg/jam hingga efek yang diinginkan tercapai. Dosis maksimal adalah 15 mg/jam. Jika pasien	pusing, mual, muntah, dan flushing.	dapat disimpan di tempat perawatan pada suhu ruangan 68-77 o F (20-25 o C)

				intravena lain seperti labetalol tidak tersedia.	membutuhkan efek yang lebih cepat, titrasi dapat dilakukan setiap 5 menit. Jika target tekanan darah sudah tercapai, dosis dapat diturunkan hingga 3 mg/jam.		
ARB	Valsartan	Valsartan 80 mg	Hipersensitivtas, kehamilan, gangguan hati berat, sirosis, obstruksi bilier	Mengatasi hipertensi dan gagal jantung. Terkadang obat ini juga digunakan dalam pengobatan setelah serangan jantung	• Hipertensi : 1 kali sehari 80 mg (maks. 160 mg) • Gagal jantung : dosis awal 2 kali sehari 40 mg, dosis maksimal 320 mg • Pasca serangan jantung : dosis awal 2 kali sehari 20 mg, dosis target 2 kali sehari 160 mg Dikonsumsi sebelum atau sesudah makan	Pusing, sakit kepala, mual muntah, diare, otot atau sendi terasa sakit, rasa lelah	Simpan obat di tempat kering dan tertutup serta terhindar dari paparan sinar matahari secara langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak
	Candesartan	Candesartan cilexetil 16 mg	Pasien hipersensitif pada obat candesartan, dengan gangguan hati yang berat dengan atau tanpa ketoadosis,	Menurunkan tekanan darah pada hipertensi, bisa juga digunakan dalam pengobatan gagal jantung	• Hipertensi : dosis awal 4 mg per hari dan dapat ditingkatkan hingga 16 mg satu kali sehari	Sakit kepala, nyeri punggung, pusing, batuk, bersin, hidung tersumbat, ruam kulit	Simpan di tempat kering, tertutup, dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung.

			wanita hamil, dan menyusui		• Gagal jantung : 4 mg per hari Dikonsumsi sebelum atau sesudah makan		Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak
	Irbesartan	Irvell*	Hipersensitivitas atau alergi terhadap irbesartan atau komponen lain dalam obat tersebut	untuk mengatasi tekanan darah tinggi (hipertensi). Dalam penggunaannya, irbesartan dapat dikonsumsi sebagai terapi tunggal atau dikombinasikan dengan obat lainnya. Obat ini juga dapat digunakan untuk mengatasi kerusakan ginjal, termasuk yang disebabkan oleh diabetes.	Dewasa: 150 mg, sekali sehari. Jika diperlukan, dosis dapat ditingkatkan menjadi 300 mg per hari. Lansia usia >75 tahun atau pasien cuci darah: 75 mg, sekali sehari.	Pusing. Sakit kepala. Mual atau muntah. Nyeri sendi atau otot. Diare. Nyeri punggung. Demam.	Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
	Telmisartan	Telmisartan 40 mg	Kontraindikasi dan peringatan penggunaan telmisartan diperuntukan bagi pasien dengan riwayat hipersensitivitas.	untuk mengatasi tekanan darah tinggi (hipertensi).	Dosis awal adalah 40 mg, 1 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan menjadi 20–80, 1 kali sehari, sesuai dengan respons tubuh pasien. Dosis maksimal adalah 80 mg per hari.	Pusing	Simpan di tempat kering, tertutup dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung.
ACEI	Kaptropil	Captopril 25 mg	Hamil, menyusui	Hipertensi, gagal jantung pasien	• Awal : 3 kali sehari 12,5	Gangguan indera pengecapan, pusing,	Simpan di ruangan

				dengan tekanan darah normal	mg. Ditingkatkan menjadi 25 – 50 mg 2 – 3 hari • Hipertensi berat : sampai 450 mg/hari Dikonsumsi saat perut kosong (1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan)	denyut jantung cepat, tubuh terasa sangat lelah, kemerahan, batuk kering, ruam atau gatal, rasa panas, kesemutan.	bersuhu sejuk dan terhindar dari sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak
	Lisinopril	Lisinopril 5 mg	Hipersensitif, dehidrasi karena sakit atau diare, serangan jantung, ibu menyusui, anak di bawah usia 6 tahun	Menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi	• **Hipertensi : Dosis awal :** 1 kali sehari 1 tablet **Dosis penunjang lazim :** 20 mg sehari **Maksimal :** 80 mg sehari Dikonsumsi sesudah makan	Sakit kepala, mual muntah, diare, batuk kering, pusing, hidung tersumbat atau pilek, merasa lelah, penurunan gairah seksual	Simpan obat di tempat bersuhu ruangan, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak
	Ramipril	Ramipril 5 mg	Hipersensitif terhadap ramipril atau obat-obatan yang termasuk ACE inhibitor lain, ibu hamil, riwayat angioedema, pasien	Mengobati hipertensi (tekanan darah tinggi), nefropati diabetik, dan beberapa jenis gagal jantung kronis	• **Hipertensi :** diawali dengan 2,5 mg sekali sehari. Pemeliharaan : 2,5 – 5 mg/hari. Maksimal : 10mg/hari	Sakit kepala, pusing atau rasa melayang, batuk, tubuh terasa lelah atau lemas	Simpan obat di tempat bersuhu ruangan, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung.

			dengan diabetes melitus		• **Pasien yang diobati dengan diuretika :** jika memungkinkan, diuretika dihentikan 2 – 3 hari sebelum pengobatan dimulai. Maksimal : 2,5 mg/hari • **Pengobatan setelah infark miokardial :** diawali dengan 1,25 – 2,5 mg 2 kali sehari. Maksimal 10mg/hari Dikonsumsi bersama makanan atau tidak		Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak
Beta blocker	Atenolol	Farnormin*	Jangan diberikan pada pasien penderita gagal jantung, asma bronkial, syok kardiogenik dan sinus bradikardia.	Farnormin digunakan untuk menurnkan tekanan darah tinggi dan mengobati angina pektoris	Hipertensi: dosis 50 mg / hari, dosis dapat ditingkatkan hingga 100 mg / hari sesudah 2 minggu, jika diperlukan. Angina Pektoris: 100 mg per hari. Dapat diminum bersamaan dengan makanan atau tanpa makanan.	Hipotensi (tekanan darah rendah) Bradikardia (denyut jantung rendah) Mual dan muntah Mengantuk Lemas Pusing Vertigo (pusing berputar) Diare Depresi.	Simpan pada suhu di bawah 25 derajat Celcius.

	Propanolol	Propanolol 10 mg	Penderita syok kardiogenik, sinus bradikardia, dan asma. Berhati-hati dalam pemberian untuk penderita diabetes, gangguan tiroid, gangguan hati, serta ginjal	Terapi hipertensi, angina aritmia, pencegahan migrain	• Dewasa dan anak > 12 tahun untuk hipertensi : 20 mg, 3 – 4 kali sehari; aritmia : 10 – 20 mg, 3 – 4 kali sehari; angina : 10 – 20 mg, 3 – 4 kali sehari; mencegah migrain : 40 mg, 2 – 3 kali sehari • Anak- anak: aritmia 0,5 mg/kgBB/hari dibagi 3 – 4 kali pemberian ; hipertensi : 1 – 3 mg/kgBB/hari dibagi 3 kali pemberian Dikonsumsi sebelum makan	Pusing, tubuh terasa sangat lelah, mual muntah, kram perut, sembelit, diare, gangguan penglihatan, gangguan tidur	Simpan obat di tempat sejuk dan terhindar dari sinar matahari secara langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak
	Bisoprolol	Bisoprolol 2,5 mg	Hipersensitif terhadap bisoprolol, gagal jantung akut atau selama episode dekomposisi gagal jantung yang memerlukan terapi	Mengobati hipertensi, angina pektoris, aritmia, dan gagal jantung	• Hipertensi dan angina : 5 – 10 mg per hari • Gagal jantung kronik stabil : 1,25 mg per hari pada	Pusing, mual muntah, kelelahan, denyut jantung lambat, sembelit, diare, jari tangan dan kaki terasa dingin	Simpan obat di tempat bersuhu ruangan serta terhindar dari udara lembab dan sinar matahari

			intravena inotropik, syok kardiogenik		minggu pertama • Bronkospastik, gangguan hati (hepatitis), dan gangguan ginjal : dosis awal 2,5 mg sekali sehari Dikonsumsi sebelum atau sesudah makan		langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak
Alfa blocker	Prazosin	Prazosin	pada pasien dengan hipersensitivitas terhadap prazosin atau obat golongan quinazoline. Peringatan diperlukan terkait risiko hipotensi postural selama penggunaan prazosin	untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Selain itu, obat ini juga digunakan dalam pengobatan gagal jantung, penyakit Raynaud, dan untuk meredakan gejala pembesaran kelenjar prostat jinak.	Dosis awal 0,5 mg, 2 atau 3 kali sehari, dikonsumsi sebelum tidur, selama 3–7 hari. Dosis dapat ditingkatkan menjadi 1 mg, 2 atau 3 kali sehari, selama 3–7 hari berikutnya, sesuai dengan kondisi pasien. Dosis maksimal 20 mg per hari, dibagi dalam beberapa jadwal konsumsi.	Kantuk Mual atau muntah Pusing atau sakit kepala Pandangan kabur Diare atau justru konstipasi Lelah dan lemas	dalam wadah tertutup di suhu yang sejuk
	Hidralazin*	Labetolol	dikontraindikasik an pada syok kardiogenik, bradikardia sinus dan blokade lebih besar dari tingkat pertama, asma	untuk mengatasi tekanan darah tinggi atau hipertensi	- Dewasa: Dosis awal 100 mg, 2 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan hingga 200–400 mg, 2 kali sehari, sesuai dengan respons pasien. Dosis	Pusing, lelah yang berat, berkeringat, sakit kepala	Simpan pada suhu ruang, jauhkan dari cahaya langsung dan tempat lembab

			bronkial, gagal jantung kongestif		maksimal 2.400 mg per hari, dibagi menjadi 2–4 kali minum. -Lansia: Dosis awal 40–100 mg, 2 kali sehari. Dosis perawatan 100–200 mg, 2 kali sehari.		
Sentral	Metildopa	Dopamet 250 mg	Hipersensitif, sirosis hati atau riwayat penyakit hati, hepatitis akut	Menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi	Diawali 0,5 – 1 tablet perhari, ditingkatkan secara bertahap dengan 0,5 – 1 tablet setiap 3 hari Dikonsumsi sebelum atau sesudah makan	Ruam kulit, mulut kering, sakit kepala, lesu, pilek, gangguan saluran cerna, pusing, peningkatan berat badan, edema, impotensi	Simpan pada suhu ruangan, jauhkan dari cahaya langsung dan tempat yang lembab. Jangan disimpan di kamar mandi dan jangan dibekukan
	Klonidin	Clodinie*	Clonidine tidak boleh diberikan kepada pasien yang hipersensitivitas terhadap clonidine. Obat ini juga tidak dianjurkan untuk pasien dengan bradiaritmia berat, yang disebabkan oleh sindrom sick sinus atau blok AV (atrioventrikular) derajat 2 atau 3	Hipertensi, sakit kepala vaskular, migrain.	Dewasa: 150–300 mcg, yang diberikan melalui suntikan IV lambat (selama 10–15 menit). Dosis dapat diulangi hingga maksimal 750 mcg selama 24 jam.	Kantuk Sakit kepala atau pusing Mulut kering Sembelit (konstipasi) Mual atau muntah Hilang nafsu makan Kelelahan Mudah tersinggung Insomnia atau mimpi buruk Lemas atau lesu	Simpanlah clonidine pada tempat yang sejuk, bebas dari jangkauan anak-anak, dan hindari paparan sinar matahari langsung.

						Penurunan gairah seksual	

(6.b) OBAT ANTIANGINA

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat antiangina	Isosorbide dinitrate, nitrogliserin	Isosorbide dinitrate	Infark miokard akut, hipotensi, syok, hipovolemia, trauma serebral, anemia.	Pencegahan dan pengobatan angina pektoris yang disebabkan penyakit jantung koroner.	Dosis awal 5 mg, dapat ditingkatkan 10 mg pada hari ke-2 atau ke-3 sesuai anjuran dokter. Dosis pemeliharaan : 1 tablet 2 kali per hari. Dikonsumsi 30 menit sebelum makan atau saat perut kosong.	Sakit kepala, vasodilatasi kutaneus, hipotensi postural, dan ruam kulit.	Simpan isosorbide dinitrate di tempat sejuk dan terhindar dari sinar matahari. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak.
		Nitrokaf Retard	Hindari sildenafil. Glaukoma, syok kardiogen, anemia berat, trauma kepala, pendarahan otak, insipiens, kegagalan	Pencegahan dan terapi jangka panjang angina pektoris.	2 – 3 kali sehari 1 kapsul, kasus berat : 2 – 3 kali sehari 2 kapsul. Dikonsumsi sebelum atau	Sakit kepala, hipotensi ortostatik, takikardi, kolaps yang disertai dengan aritmia bradikardi, mengantuk.	Simpan di tempat sejuk dan terhindar dari sinar matahari. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak.

			sirkulasi akut, dan hipotensi		sesudah makan.		

(6.c) OBAT GAGAL JANTUNG KONGESTIF

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat gagal jantung kongestif	Digoksin	Digoxin 0,25 mg	Blok AV total dan blok AV derajat 2 (2:1), henti sinus, sinus bradikardi yang berlebihan, pemberian kalsium parenteral.	Gagal jantung kongestif akut dan kronik	Untuk digitalisasi cepatt (24 – 36 jam) : 4 –6 tablet, kemudian 1 tablet pada interval tertentu sampai kompensasi tercapai. Untuk digitalisasi lambat (3 – 5 hari) : 2 – 6 tablet/ hari dalam dosis terbagi. Pemeliharaan : 1/ 2 – 3 tablet/ hari. Diberikan sebelum atau sesudah makan	Penurunan segmen ST pada EKG, pruritus, urtikaria, ruam makular, ginekomastia, gangguan SSP, anoreksia, mual, muntah, gangguan kecepatan denyut jantung, kondisi dan irama jantung.	Simpan di tempat sejuk dan terhindar dari sinar matahari. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak

(6.d) ANTIPLATELET

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antiplatelet	Asetosal	Nospirinal	Hipersensitif terhadap kandungan dalam Nospirinal atau NSAID lainnya Riwayat serangan asma, angioedema, urtikaria, atau rhinitis yang dipicu oleh aspirin atau NSAID lainnya	Untuk pencegahan penyakit serebrovaskuler, seperti stroke atau infark miokard (serangan jantung).	Untuk pengobatan awal bagi orang dewasa, dosisnya adalah 150-300 mg	• Bronkospasme • Serangan asma • Percepatan panjang • Mual • Muntah • Diare • Sakit perut • Mulas	Di tempat sejuk, kering, dan terhindar dari cahaya matahari langsung. Selain itu, pastikan untuk menghalangi obat dari jangkauan anak-anak.
	Klopidogrel	Clopidogrel Bisulfate 75 mg	Hipersensitif terhadap clopidogrel, perdarahan patologis aktif seperti tukak lambung	Mencegah penyumbatan pembuluh darah dan membantu melancarkan peredaran darah sehingga dapat menurunkan risiko terjadinya stroke atau serangan jantung	Sehari 1 kali 1 tablet. Dapat dikonsumsi sebelum maupun sesudah makan	Diare, mudah mengalami memar atau perdarahan, perdarahan sulit berhenti, sembelit, rasa terbakar di dada, dan nyeri perut	Simpan di tempat kering dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak

(6.e) OBAT DYSLIPIDEMIA

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat dyslipidemia	Simvastatin	Simvastatin 20 mg	Penyakit hati atau peningkatan transaminase serum persisten, miopati sekunder akibat gen penurun lipid lainnya, penggunaan bersamaan dengan inhibitor CYP3A4 kuat (itrakonazole, ketoconazole, eritromisin), hamil, dan menyusui	Menurunkan kadar kolesterol total, LDL, trigliserida, dan meningkatkan kadar HDL dalam darah	• Kolesterol tinggi : dosis awal 10 – 20 mg 1 kali sehari. Dosis pemeliharaan 5 – 40 mg 1 kali sehari. Untuk pasien dengan kadar LDL yang sangat tinngi, dosisnya bisa dimulai dari 40 mg per hari • *Homozygous familial hypercholesterolemia* : 40 mg 1 kali sehari pada malam hari • *Heterozygous familial hypercholesterolaemia* : anak usia 10 – 17 tahun, dosis awal 10 mg 1 kali sehari pada malam hari. Dosis dapat ditingkatkan	Sakit perut, sembelit, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin, ata sakit tenggorokan	Simpan di tempat bersuhu ruang, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak

					secara bertahap tiap 4 minggu atau lebih. Dosis tidak boleh lebih dari 40 mg per hari • Serangan jantung dan stroke pada pasien yang berisiko tinngi : 5 – 40 mg 1 kali sehari pada malam hari, tergantung dengan kadar kolesterol LDL Dikonsumsi sebelum atau sesudah makan pada malam hari atau sebelum tidur		
	Atorvastatine	Atorvastatine 20 mg	Hipersensitif terhadap komponen dalam obat ini, penyakit hati aktif atau serum transaminase yang menetap melebihi 3 kali lipat dari	Menurunkan kolesterol jahat (LDL) dan trigliserida, serta meningkatkan kadar kolesterol baik (HDL) di dalam darah	• Dosis awal : 10 mg 1 kali sehari. Rentang dosis antara 10 – 80 mg sekali sehari • *Hypercholesterolemia primer* dan	Insomnia, sakit kepala, mual, diare, nyeri perut, asam lambung, perut kembung, lemas	Simpan pada suhu ruangan, di tempat yang kering, dan terhindari dari sinar matahari. Jauhkan dari jangkauan anak-anak

			batas atas normal, ibu hami, menyusui		*hyperlipidemia* campuran : 10 mg, diberikan 1 kali sehari • *Falimilial hypercholesterolemia homozigot* : 10 – 80 mg per hari • *Falimilial hypercholesterolemia heterozigot* : pada anak anak 10 – 17 tahun, dosis awal yang direkomendasikan 10 mg/hari, dosis maksimus yang direkomendasikan 20 mg/hari Dikonsumsi sebelum atau sesudah makan		
	Fenofibrate	Fenofibrate 100 mg	Wanita hamil dan menyusui, hipersensivitas terhadap fenofibrate,	Mengobati hiperkolesterolemia (tipe IIA), hiperlipidemia kombinasi (tipe	• Dewasa : 3 x sehari 100 mg atau 1 x sehari 300 mg	Mual muntah, diare, sembelit, heartburn, sakit kepala, nyeri pada punggung, lengan	Simpan obat dalam wadah tertutup di tempat sejuk dan terhindar dari sinar matahari. Jauhkan

			gangguan fungsi hati yang berat, gangguan fungsi ginjal, penyakit kadung empedu, dan anak-anak	IIB dan III), hipertrigliserida endogen (tipe IV) yang tidak memberikan respon dengan cukup terhadap diet dan tindakan lain yang sesuai	• Bila setelah maka terpai dan diet belum tercapai dan diet belum tercapai respons yang memuaskan, maka dosis dapat ditingkatkan menjadi 4 x 100 mg sehari Dikonsumsi bersama makan	atau kaki, serta hidung tersumbat	obat dari jangkauan anak-anak
	Gemfibrozil	Hypofil 300 mg	Gangguan fungsi hati dan ginjal berat, penyakit kandungan empedu	Menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida berlebih di dalam darah	2 x sehari 2 kapsul. Dikonsumi saat perut kosong (setengah jam sebelum makan pagi atau malam)	Sakit perut, mual, buang gas (kentut), dan diare	Simpan obat dalam suhu ruangan, terhindar dari suhu panas dan sinar matahari langsung. Hindarkan obat dari jangkauan anak-anak
	Ezetimib	Ezetrol 10 mg	Hipersensitif, wanita menyusui	Menurunkan kolesterol total, LDL, apoliprotein b dan trigliserida, serta meningkatkan HDL pada pasien hiperkolesterol primer	1 x sehari 1 tablet. Dikonsumsi dengan atau tanpa makanan dan diminum pada waktu yang sama	Sakit kepala, pilek, bersin, nyeri tenggorokan, nyeri perut, diare, dan nyeri sendi	Simpan obat dalam suhu ruangan, terhindar dari suhu panas dan sinar matahari langsung. Hindarkan obat dari jangkauan anak-anak

(6.f) OBAT ANTIARITMIA

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat antiaritmia	Amiodaron	Amiodaron Hydrochloride 200 mg	Pasien dengan syok kardiogenik, sick sinus syndrome, AV blok derajat dua atau tiga, serta bradikardia yang menyebabkan sinkop.	Sebagai antiaritmia jantung pada kasus fibrilasi ventrikel berulang dan mengancam jiwa, serta pada takikardia ventrikel yang tidak stabil Secara hemodinamik pada individu yang refrakter terhadap terapi lain	Dosis awal 200 mg, 3 kali sehari, selama 1 Dosis selanjutnya dapat dikurangi menjadi 200 mg, 2 kali sehari. Dosis pemeliharaan bisa diturunkan tergantung pada respons tubuh pasien	Mual atau muntah Sembelit Pusing atau sakit kepala Insomnia Sakit perut Nafsu makan hilang Gemetar atau lelah yang tidak biasa	Simpan amiodarone di tempat bersuhu ruangan, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak.

7. OBAT SALURAN CERNA

(7.a) Obat gastritis dan tukak lambung

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antasida	$Al(OH)_3$, $Mg(OH)_2$,	Lagesil tablet	-	Mengatasi gejala akibat asam lambung berlebih, seperti perut kembung, sendawa, atau rasa tidak nyaman di perut	• Dewasa : 3 – 4 kali sehari 1 tablet • Anak-anak : 3 – 4 kali sehari ½ tablet Dikonsumsi 1 – 3 jam sesudah makan dan sebeum tidur malam	Diare, sembelit, mual muntah, dan kram perut	Simpan obat dalam suhu ruangan, terhindar dari suhu panas dan sinar matahari langsung. Hindarkan obat dari jangkauan anak-anak

	Natrium bikarbonat	Sodium Bicarbonate 500 mg	Edema pulmonary	Memperbaiki kondisi asidosis metabolik, yaitu suatu kondisi di mana ada terlalu banyak asam dalam cairan tubuh. Selain itu, digunakan untuk mengatasi asam lambung berlebih	• Asidosis metabolik kronis : 325 – 2.000 mg, 1 – 4 kali sehari • Sakit maag : 1.000 - 5.000 setiap 4 – 6 jam Dikonsumsi 1 – 2 jam setelah makan	Mual, cepat merasa haus, perut kembung, kram perut	Simpan pada suhu ruangan, di tempat yang kering, dan terhindar dari sinar matahari secara langsung. Jauhkan dari jangkauan anak-anak
H2 Bloker	Simetidin	Simetidin 200 mg	Hipersensitif	Mengobati asam lambung berlebih, seperti pada penyakit asam lambung (GERD) atau sindrom Zollinger-Ellison	• Ulkus duodenum : 3 – 4 kali sehari 1 – 2 tablet, minimal 4 minggu • Sindroma zollinger, ellison, dan hipersekresi lambung : 4 kali sehari 1 tablet, maksimal 2400 mg/hari • Esofagitis : 4 kali sehari 2 tablet selama 4 – 8 minggu • Anak : menghambat sekresi lambung 20 – 40 mg/KgBB/hari dalam dosis terbagi	Nyeri otot, pusing, sakit kepala, diare, kantuk, lelah	Simpan dalam wadah tertutup, di tempat yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari. Jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak

					Dikonsumsi bersama dengan makan		
	Ranitidin	Ranitidine HCl 150 mg	Riwayat porfiria akut	Mengatasi penyakit akibat asam lambung berlebih, seperti tukak lambung, sakit maag, penyakit refluks asam lambung (GERD), dan sindrom Zollinger-Ellison	• **Dispepsia** **Dewasa :** 150 mg 2 kali sehari atau 300 mg sekali sehari, dikonsumsi selama 6 minggu. Untuk dispepsia akut, dosis 75 mg bisa sampai 4 kali sehari, selama maksimal 2 minggu. • **GERD** **Dewasa : 1**50 mg 2 kali sehari atau 300 mh sekali sehari, dikonsumsi selama 8 minggu. Pada GERD berat, dapat diberikan dosis 150 mg 4 kali sehari selama 12 minggu. **Anak-anak (1 bulan – 16 tahun) :** 5 – 10 mg/KgBB perhari, dibagi 2 kali pemberian. Dosis	Mual muntah, sakit kepala, insomnia, konstipasi, diare, nyeri perut	Simpan obat dalam suhu ruangan, terhindar dari suhu panas dan sinar matahari langsung. Hindarkan obat dari jangkauan anak-anak

					maksimal 300 mg per hari • **Infeksi Helicobacter pylori** **Dewasa :** 300 mg sebagai dosis tunggal atau 150 mg 2 kali sehari, dikombinasikan dengan amoxcicillin 750 mg dan metronidazole 550 mg selama 2 minggu • **Tukak lambung dan usus halus** **Dewasa :** 150 mg 2 kali sehari atau 300 mg sekali sehari. Dosis pemeliharaan dosis 150 mg sekali sehari **Anak-anak (1 bulan – 16 tahun) :** 2 – 4 mg/KgBB 2 kali sehari. Dosis maksimal 300 mg perhari. Untuk dosis pemeliharaan, 2 – 4 mg/KgBB		

					perhari. Dosis maksimal 150 mg • **Radang esofagus erosif** **Dewasa :** 150 mg 4 kali sehari. Untuk dosis pemeliharaan, 150 mg 2 kali sehari **Anak-anak (1 bulan – 16 tahun) :** 5 – 10 mg/KgBB perhari, dibagi 2 kali pemberian. Dosis maksimum 600 mg perhari • **Tukak akibat penggunaan obat NSAID** **Dewasa :** 150 mg 2 kali sehari atau 300 mg sekali sehari, dikonsumsi selama 8 – 12 minggu. Untuk dosis pencegahan 150 mg 2 kali sehari		

					• **Kelainan hipersekresi** **Dewasa :** 150 mg 2 – 3 kali sehari. Dosis maksimal 6 gram perhari Dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Jika saat mengonsumsi obat pada jam yang sama setiap hari agar obat dapat bekerja lebih efektif		
	Famotidin*	Famocid 20 mg	Hipersensitif terhadap famotidin	Ulkus duodenum, kondisi hipersekresi patologis, seperti sindrom Zollinger-Ellison, adenoma endokrin	• Ulkus duodenum terapi akut : 40 mg 1x/hari sebelum tidur atau 20 mg 2x/hari biasanya dilakukan selama 4 minggu • Terapi pemeliharaan : 20 mg 1x/hari sebelum tidur • Hipersekresi patologis : 20 mg/6 jam	Demam, ederma orbita karena hipersensitif, diare, sesak, perdarahan atau memar, sakit kepala, konstipasi, sembelit	Simpan obat dalam suhu ruangan, terhindar dari suhu panas dan sinar matahari langsung. Hindarkan obat dari jangkauan anak-anak

					Dikonsumsi sekitar 15 – 60 menit sebelum makan		
PPI	Omeprazol	Pumpitor 20 mg	Hipersensitif terhadap omeprazole atau bahan lain yang terdapat dalam formulasi, penggunaan dengan nelfinavir	Mengatasi gangguan lambung, seperti penyakit asam lambung, sakit maag, atau tukak lambung	• **GERD :** 20 – 40 mg sekali sehari, selama 4 – 8 minggu • **Tukak lambung :** 20 – 40 mg sekali sehari, selama 4 – 8 minggu • **Ulkus duodenum atau tukak usus dua belas jari :** 20 mg sekali sehari, selama 4 – 8 minggu • **Infeksi Helicobacter pylori :** 20 mg, 2 ali sehari, selama 10 hari • **Esofagitis erosif :** 20 mg sekali sehari, selama 4 – 8 minggu • **Sindrom Zollinger-Ellison :** Dosis awal 60 mg per hari. Dosis akan disesuaikan dengan kondisi pasien. Dosis >80	Sakit perut, sakit kepala, lemas, diare yang berkelanjutan, muncul sariawan, mati rasa, atau kesemutan	Simpan di tempat tertutup dan terhindar dari hawa panas dan sinar matahari secara langsung

					mg per hari sebaiknya dibagi menjadi 2 kali pemberian • Dosis pumpitor untuk anak-anak dan penderita gangguan organ hati akan disesuaikan oleh dokter Dapat dikonsumsi dengan atau tanpa makan. Jika jadwal konsumsi hanya sekali sehari dapat diminum pagi, sedangkan jika jadwal konsumsi 2x sehari dapat diminum pada pagi dan sore hari		
	Lansoprazole	Lansoprazole 30 mg	Hipersensitif, pasien yang sedang mengonsumsi rilpivirine dan atazanavir	Mengatasi gangguan lambung, seperti tukak lambung, GERD, atau sindrom Zollinger-Ellison	• GERD Dewasa : 15 – 30 mg, 1 kali sehari selama 4 – 8 minggu Anak-anak : 15 – 30 mg/Kg BB, 1 kali sehari selama 8 – 12 minggu • Tukak lambung	Diare, sakit kepala, sakit perut, mual, pusing, sembelit	Simpat di tempat yang sejuk terhindar dari udara lembab, hawa panas, dan dinar matahari langsung. Jauhkan dari jangkauan anak-anak

					Dewasa : 15 – 30 mg, 1 kali sehari selama 4 – 8 minggu • Sindrom Zollinger-Ellison Dewasa : dosis awal 60 mg sehari pada pagi hari • Infeksi Helicobacter pylori Dewasa : 30 mg, 2 – 3 kali sehari sebelum makan, selama 7 – 14 hari. Bisa dikombinasikan dengan obat eritromycin dan amoxycillin • Esofagitis erosif Dewasa : 30 mg, 1 kali sehari sebelum makan Anak-anak 1 – 11 tahun : 15 mg/Kg BB, 1 kali sehari sebelum makan • Ulkus duodenum Dewasa : 15 mg, 1 kali sehari sebelum makan		

					Dikonsumsi saat perut kosong atau sebelum makan		
	Pantoprazol	Pepzol 40 mg	Hipersensitivitas	Membantu menurunkan jumlah produksi asam di lambung, dapat digunakan untuk mengobati tukak lambung dan duodenum, refluks esofagitis, sindrom Zollinger-Ellison. Selain itu, untuk pertolongan pertama gejala sakit maag	• **Refluks esofagitis sedang hingga berat :** 20 mg/hari • **Tukak duodenum, tukak lambung, serta refluks esofagitis sedang dan berat :** 40 mg/hari • **Terapi eradikasi pada pasien dengan tukak duodenum atau tukak lambung :** 40 mg 2 kali sehari dalam terapi kombinasi • **Sindrom Zollinger-Ellison :** Awal 80 mg kemudian disesuaikan secara individual berdasarkan sekresi asam lambung	Diare, sakit kepala, konstipasi, pusing, sakit kepala	Simpan pada suhu antara 20 – 25 derajat Celcius, terhindar dari sinar matahari langsung. Jauhkan dari jangkauan anak-anak

					Dikonsumsi bersama makan dengan cara ditelan utuh, jangan dikunyah atau dihancurkan		
Pelindung mukosa	Sukralfat	Sucralfate suspensi 500 mg/5 ml	Ibu hamil, menyusui, dan anak-anak	Tukak lambung dan usus (pada nyeri hebat karena tukak lambung), gastritis kronik	2 sendok takar (10 ml) empat kali sehari, dikonsumsi saat kondisi perut kosong (1 jam sebelum makan dan sebelum tidur), kocok dahulu sebelum dipakai	Kontipasi dan mulut kering, diare, mual muntah, rasa tidak nyaman pada lambung, kembung, ruam mulit, rasa kantuk, vertigo, nyeri punggung, dan sakit kepala	Simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius, hanya dapat dipakai selama 3 hari setelah tutup di buka
Antiflatulen	Dimetilpolisiloksan *	Disflatyl 40 mg	Hipersensitif, aritmia, hipokalsemia, hipomagnesia, CHF, jantung iskemik	Meredakan kembung, sendawa, dan rasa tidak nyaman di perut karena gas yang berlebihan	• **Dewasa :** 3x sehari 2 tablet dikunyah sesudah makan dan sebelum tidur sesuai kebutuhan • Dosis maksimal : 500 mg/24 jam dengan anjuran dan pengawan dokter Diberikan sesudah makan. Dikunyah sampai halus	Sendawa, mual muntah, sembelit, heartburn	Simpan obat di tempat bersuhu ruangan, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Jauhkan dari jangkauan anak-anak

Analog prostaglandin	Misoprostol	Misoprostol tablet	Misoprostol dikontraindikasikan pada mereka yang pernah mengalami reaksi alergi atau hipersensitivitas terhadap prostaglandin.	Mengatasi tukak lambung atau ulkus duodenum akibat penggunaan obat antiinflamasi nonsteroid (OAINS).	**Dosis : Mengobati tukak lambung atau ulkus duodenum akibat penggunaan OAINS,** Dosis: 0,2 mg 4 kali sehari atau 0,4 mg 2 kali sehari, selama 4 minggu. Jika diperlukan, pengobatan dapat dilanjutkan hingga 8 minggu. **Mencegah tukak lambung atau ulkus duodenum akibat penggunaan OAINS,** Dosis: 0,2 mg, 2–4 kali sehari. Jika muncul efek samping, dosis dapat dikurangi menjadi 0,1 mg 4 kali sehari.	Daire, kram atau sakit perut, perut kembung atau sering buang angin, mual atau muntah	Simpan obat pada suhu dibawah 30°C, di tempat yang sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak.

					Cara pakai : Saat makan		

(7.b) Obat antidiare

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antimotilitas	Loperamid	Lodia 2 mg	Sembelit, kolitis akut, hamil dan menyusui, serta bagi	Mengobati diare akut dan kronis	• Diare akut nonspesifik : 2 tablet, diikuti 1 tab setelah tinja yang tidak berbentuk • Diare kronis : 2 – 4 tab/hari dalm dosis terbagi • Maksimal 8 tab perhari Dikonsumsi sebelum atau sesudah makan	Sembelit, pusing, kantuk, mual, kram perut	Simpan di tempat kering yang terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan dari jangkauan anak-anak
Adsorben	Kaolin pektin,	NEO KAOLANA Suspense (kaolin pectin)	o Jangan diberikan kepada pasieen dimana konstipasi	Untuk pengobatan simtomatik pada diare non-spesifik	o Dewasa dan anak > 12 tahun : 30 ml maksismim 180	Dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit dengan meningkatkan kehilangan natrium dan kalium dalam fases, terutama pada	Simpan pada suhu dobawah 30°C, terlindung dari cahaya

			harus dihindari o Pada penderita abstruksi usus o Hipersensitif terhadap salah satu komponen dalam neo kaolana		ml perhari o Anak 6-12 tahun : 15 ml, maksismum 90 ml perhari o Pemberian setiap kali sesudah buang air besar.	pasien lansia, anak-anak dan diare berat.	

(7.c) Obat laksatif

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Laksatif osmotik garam	Mg sulfat	Garam inggris	Gagal ginjal, gangguan konduksi jantung, dan kerusakan hepar.	Membantu melancarkan buang air besar	Anak usi 6-12 tahun, digunakan 1-2 sendok the garam. Anank diatas 12 tahun sampai dewasa 2-6 sendok the garam setiap hari	Kram perut, diare, kembung, gas dan mual	Simpan pada suhu dobawah 30°C, terlindung dari cahaya

Laksatif osmotic alkohol/gula tdk dicerna	Gliserin	Laxadine emulsi (phenolphtalein, paraffin liquid, glyserin)	Hipersensifitas terhadap zat aktif dan komponen lain dalam laxadine emulsi, ileus obstruksi, dan abdomen yang belum diketahui penyebabnya	Diberikan pada keadaan konstipasi yang memerlukan: - Perbaikan peristaltic - Pelican jalannya fases - Penambahan volme fases secara sistematis sehingga fases mudah dikeluarkan Persiapan ,emjelang tindakan radiologist dan operasi	Dewasa: 3-6 sendok takar Anak-anak: ½ dosis dewasa diminum sekali sehari pada malam hari menjelang tidur (1 sendok takar + 5 ml)	Reaksi alergi kulit, kehilangan cairan elektroit, diare, mual, dan muntah	Simpan pada suhu dobawah 30°C, terlindung dari cahaya
	laktulosa	Dulcolaxtol	Hipersensitifitas obstruksi intestinal dan galaktosemia	Untuk pengobatan konstipasi pada pasien dengan konstipasi kronis untuk systemic encephalopathy termasuk keadaan	o Anak-anak 1-5 | tahun 2 x 5 ml perhari Anak- anak 5- 10 tahun 2 x 10 ml | perhari Anak-anak 1 tahun 225 ml perharı Dewasa keadaan ringan Dosis awal 15 ml	Kembung, kram perut dan rasa tidak nyaman, diare dalam dosis berlebihan, mual muntah, mulut kering, ketidakseimbangan elektrolit. Jika	Simpan pada suhu dobawah 30°C, terlindung dari cahaya

				pre koma hepatic dan koma hepatik	Dosis penunjang 10 ml Dewasa keadaan sedang Dosis awal 15-30 ml Dosis penunjang 10- 15 ml Dewasa o Keadaan Parah Dosis awal 2x 15 ml per hari. Di minum Sebelum atau sesudah makan, dapat diberikan bersama makanan untuk mengurangi ketidak- nyamanan pencernaan Sebaiknya diminum pada waktu sarapan.	dikonsumsi dalam dosis tinggi	
Laksatif stimulan	Turunan difenilmetan (bisakodil)	Bisacodyl tablet salut enterik 5 mg	Pasien dengan ileus, obstruksi usus, kondisi pembedahan perut (abdomen) akut seperti usus buntu akut, inflammatory bowel disease akut, dehidrasi	Pada persiapan prosedur diagnosis, perawatan sebelum dan sesudah pembedahan pada kondisi memerlukan adanya defekasi, penggunaan yang proses bisacoryl	o tablet harus diminum pada malam hari untuk menghasilkan efek pada besok paginya, telan tablet dengan minum air yang cukup dan jangan meminum tablet	Rasa tidak nyaman diperut termasuk kejang dan nyeri abdomen, diare. Reaksi alergi, termasuk angioderma dan reaksi anafilaktik	Simpan pada suhu dobawah 30°C, terlindung dari cahaya

			berat dan pendarahan pada anus. Pasien diketahui memiliki yang hipersenstivitas terhadap kandungan golongan triarylmethan	harus di bawah pengawasan dokter	bersamaan dengan susu dan antasida. o Dewasa dan anak - anak > 12 tahun: 2-3 tablet (10 – 15 mg) per hari Anak - anak 6-12 tahun: 1 tablet (5 mg) per hari.		

(7.d) Antiemetik

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antiemetik	Dimenhidrinat	ANTIMO Tablet (Dimenhydrinate)	Penderita gangguan hati, hipokalamia, hipersensitif terhadap antihistamin, retensin urin dan glukoma.	Mabuk, muntah dalam perjalanan.	o Dewasa anak dan -anak diatas 12 tahun : 1 tablet (50 mg), sehari tidak lebih dari 8 tablet (400 mg) o Anak berumur 8-12 tahun : 1/2 tablet (25 mg), sehari tidak lebih dari 3 tablet (150 mg) o Diminum ½ jam (30 menit) sebelum berpergian, jika perlu dapat diulang 4 jam.	o Depresi SPP seperti mengantuk, lesu, pusing, dan gangguan koordinasi (terutama pada anak – anak) o Sakit kepala, gangguan psikomotor, efek antimustkarinik seperti mulut kering, pandangan kabur,retensi urin, konstipasi, dan	Simpan pada suhu dibawah 30°C, dalam wadah tertutup rapat, terlindung dari cahaya dan kelembaban.

						peningkatan refluks lambung.	
	ondansetron	Ondansetron HCl	Penderita yang hipersensitif ondansetron	Penanggulangan mual dan muntah karena kemoterapi dan radioterapi serta operasi	o Pencegahan mual muntah dan paska bedah: Dosis pertama: 8 mg diberikan 1 jam sebelum pembiusan dilanjutkan pemberian 2 dosis berikutnya 8 mg tablet dengan interval waktu masing- masing 8 jam. o Pencegahan mual dan muntah karena kemoterapi: - Dewasa: Kemoterapi yang sangat emetogenik, misalnya cisplatin. Mula- mula diberikan injeksi 8 mg ondansetron i.v. secara lambat atau diinfuskan selama 15 menit segera sebelum diberikan kemoterapi, diikuti dengan infus 1 mg ondansetron/jam selama terus-menerus. - Anak- anak > 4 tahun : 5 mg/mL secara i.v. selama 15 menit segera diberikan sebelum	Sakit kepala, Konstipasi, rasa panas pada kepala dan epigastrium, sedasi dan diare	Simpan pada suhu dobawah 30°C, terlindung dari cahaya

				diberikan kemoterapi, diikuti dengan peroral tiap 12 jam selama kurang dari 5 hari.		
metoklorpramide,	Metoclorpramide HCl Inj	Ekstruksi, pendarahan dan performasi saluran cerna, epilepsy, pasien yang sensitive terhadap obat tersebut	Untuk menghilangakan rasa panas sehubungan reflux esophagitis mencegah dan mengurangi muntah akibat radiasi dan pasca bedah	o Reflux Esofagitis Dewasa: 10 mg Metoclopra mide base (I.V.) diberikan secara lambat (1-2 menit) o Anak-anak 6 - 14 tahun : 2,5 mg – 5 mg, Anak < 6 tahun = 0,1 mg/kg BB	o Metoclopramide HCI mempunyai sedikit efek samping pada dosis normal yang umumnya adalah mengantuk, diare, sembelit, gejala ekstrapiramidal dan pusing. o Pada pemberian dosis berlebih,terjadi gejala gejala distrapiramidal dengan segera berikan diazepam	Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya

(8) OBAT SALURAN NAPAS

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat Batuk	Codein	Codikaf 20 mg	Pasien dengan gangguan pernapasan berat seperti asma akut, pasien dengan riwayat alergi	Meredakan nyeri ringan hingga sedang yang tidak dapat diatasi dengan obat pereda nyeri lain. Bisa juga	• **Nyeri ringan hingga sedang :**	Mual muntah, kantuk, sembelit, sakit kepala, pusing, dan keringat berlebih	Simpan obat di tempat bersuhu ruangan dan terhindar dari sinar matahari langsung, serta

			terhadap kodein atau bahan aktif lainnya, dan orang yang mengonsumsi alkohol secara berlebihan	digunakan untuk menangani batuk	**Dewasa :** 30 – 60 mg, 4 kali sehari **Anak usia >12 tahun :** Dosis akan diberikan oleh dokter berdasarkan berat badan anak • **Batuk** **Dewasa dan anak usia > 12 tahun :** 10 – 20 mg, 4 kali sehari. Dosis maksimal 60 mg per hari Dikonsumsi sesudah makan		jauh dari jangkauan anak-anak
	Gliseril guaikolat	Guaifenesin 100 mg	Hipersensitif, diabetes, penyakit liver, fenilketouria, hamil, dan menyusui	Mengatasi batuk berdahak, meredekan penumpukan dahak di saluran pernapasan akibat flu, infeksi, atau alergi	2 – 4 tablet tiap 4 jam. Maksimal : 24 tablet sehari. Dikonsumsi sebelum atau sesudah makan	Pusing, sakit kepala, kantuk, mual muntah, sakit perut, dan diare	Simpan obat di tempat yang kering dan terhindar dari paparan sinar matahari secara langsung. Jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak
	Ammonium klorida*	Sanadryl DMP 120 ml	Hipersensitif	Meringankan gejala batuk tidak	• **Dewasa :** 3 – 4 kali	Mengantuk, pusing, gangguan koordinasi,	Simpan dalam wadah tertutup

				berdahak yang menimbulkan rasa sakit atau batuk karena alergi	sehari 2 sendok takar (10 ml) • **Anak 6 – 12 tahun :** 3 - 4 kali sehari 1 sendok takar (5 ml) atau menurut petunjuk dokter Dikonsumsi bersama atau setelah makan	sekresi saluran napas mengental, mulut kering, kejang epileptiform	di tempat bersuhu ruangan dan tidak terpapar sinar matahari langsung, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak
	Bromheksin	Bromhexine Hcl 8 mg	Hipersensitif, ulkus pada lambung penggunaan obat ini harus dilakukan secara hati-hati	Pengobatan gangguan pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh dahak atau mukus yang berlebihan	• **Dewasa dan anak usia > 12 tahun :** 8 – 16 mg, 3 kali sehari • **Anak usia 6 – 11 tahun :** 4 – 8 mg, 3 kali sehari, dosis maksimal 24 mg perhari • **Anak usia 2 – 5 tahun :** 2 mg, 3 kali sehari atau 4 mg, 2 kali sehari. Dosis	Mual muntah, diare, rasa penuh di perut, dan nyeri pada ulu hati, sakit kepala, vertigo, keringat berlebihan, dan kenaikan enzim transaminase	Simpan obat di tempat sejuk dan terhindar dari sinar matahari, serta jauhkan obat dari jangkauan anak-anak

					maksimal 8 mg perhari Dikonsumsi sebelum atau sesudah makan		
	Ambroxol	Epexol 30 mg	Hipersensitivitas	Mengencerkan dahak kental yang menyumbat saluran pernapasan sehingga napas pun terasa lega	• **Dewasa dan anak > 12 tahun :** 30 mg, 2 – 3 kali sehari. Dapat ditingkatkan hingga 60 mg, maksimal 120 mg per hari • **Anak 5 – 10 tahun** : ½ tablet, 3 kali sehari Dikonsumsi sesudah makan	Sakit perut, perut kembung, sensasi perih atau panas di dada, mual muntah, diare, mulut kering atau tenggorokan kering	Simpan obat di tempat bersuhu ruangan. Jangan menyimpannya di tempat yang lembab dan panas. Jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak
	Asetilsistein	L-Acys	Hipersensitivitas	Mengencerkan dahak pada beberapa kondisi, seperti bronkitis, bronkiektasis, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), atau cystic fibrosis	• **Gangguan saluran napas :** 1 tablet per hari (sebaiknya pada malam hari) • **Intoksikasi parasetamol (secara sengaja**	Mual muntah, sakit perut, pilek, atau sariawan	Simpan obat di tempat sejuk dan terhindar dari sinar matahari langsung. Jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak

					maupun tidak sengaja) : Pada dosis awal diberikan 140 mg/kg berat badan Dikonsumsi bersama makan. Larutkan 1 tablet dalam ½ gelas air minum. Berikan sesudah makan malam		
Obat asma	Terbutaline*	Nairet 2,5 mg	Tokolisis akut dan hipersensitif	Untuk meringankan gejala mengi, batuk, dan sesak napas akibat asma atau penyakit paru obstruktif kronis, termasuk emfisema maupun bronkitis kronis	• **Dewasa :** 2 - 3 kali sehari 1 tablet, maksimum 15 mg sehari. Untuk pemula pengobatan 1 tablet, 2 – 3 kali sehari • **Anak 12 – 15 tahun :** 0,5 – 1 tablet, 2 – 3 kali sehari, maksimum 7,5 mg sehari.	Gelisah, tremor, sakit kepala, pusing, mual. kantuk	Simpan obat di tempat yang kering dan sejuk. Hindarkan obat dari suhu panas dan paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak

					Tidak dianjurkan untuk anak di bawah 12 tahun Dikonsumsi bersama makan		
	Salbutamol	Lasal 2 mg	Hipersensitif terhadap salbutamol atau obat agonis adrenoreseptor beta-2 lainnya	Mengobati penyakit pada saluran pernapasan seperti asma dan penyakit paru obstuktif kronik (PPOK)	• **Dewasa :** 3 – 4 kali sehari 1 – 2 tablet • **Anak-anak berusia 6 – 12 tahun :** 3 kali sehari 1 tablet • **Anak berusia 2 – 6 tahun :** 3 kali sehari ½ tablet Dikonsumsi sebelum makan	Tremor, palpitasi	Simpan obat di tempat sejuk dan terhindar dari sinar matahari langsung. Jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak
	Budesonid	Pulmicort 0,25 mg/ml Respules	Hipersensitivitas	Meredakan dan mencegah gejala serangan asma, seperti sesak napas dan mengi	• **Asma bronkial : Dewasa dan anak usia di atas 12 tahun :** 1 – 2 mg (2 – 4 respule), 2 kali sehari. **Dosis pemeliharaan :** 0,5 – 1 mg, 2 kali sehari	Suara serak, rasa kering di tenggorokan dan mulut, sariawan, batuk, mual muntah, nafsu makan berkurang, sakit kepala, lemas	Disimpan pada suhu ruangan, jauhkan dari cahaya langsung dan tempat yang lembab. Jangan disimpan di kamar mandi, jangan dibekukan

					Anak-anak usia 3 bulan hingga 2 tahun : 0,5 – 1 mg (1 – 2 respule), 2 kali sehari. Dosis pemeliharaan 0,25 – 0,5 mg, 2 kali sehari • **Croup (batuk rejan) pada anak-anak** **Dosis yang Biasa dianjukan :** 2 mg (4 respule) sebagai dosis tunggal. Jika diperlukan, obat dapat digunakan tiap 12 atau 36 jam Diuapkan menggunakan alat nebulizer, kemudian dihirup		
	Ipratropium Bromida	Combivent UDV 10 Vial	Hipersensitif terhadap salbutamol atau obat agonis adrenoreseptor	Meredakan dan mencegah munculnya gejala akibat penyempitan saluran pernapasan,	• **Serangan akut :** 1 ampul dapat ditingkatkan menjadi 2	Sakit kepala, batuk, mual, tremor, iritasi pada tenggorokan, sembelit	Simpan di tempat yang kering, bersuhu ruangan, dan terhindar dari

			beta- 2 lainnya, kardiomiopati obstruktif hipertrofi atau takiaritmia	seperti mengi atau sesak napas, akibat asma dan PPOK	unit vial dosis pada kondisi yang berat atau parah • **Maintenance :** 1 ampul dipakai 3 – 4 kali sehari Diuapkan menggunakan alat nebulizer, kemudian dihirup		sinar matahari langsung. Jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak
	Teofilin	Theobron 130 mg	Tukak peptik, gastritis aktif, gangguan ginjal atau hati berat	Mengatasi gejala sesak napas pada penyakit asma	**Dewasa :** 3 kali sehari 1 kapsul Dikonsumsi sebelum atau sesudah makan, dapat bersama makanan untuk mengurangi ketidaknyaman an pada saluran cerna	Gangguan GI, cemas, sering berkemih, sakit kepala, insomnia, mudah tersinggung, tremor, kesulitan buang air kecil, gangguan irama jantung	Simpan pada suhu antara 20 – 25 derajat Celcius, pada tempat yang sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya matahari langsung
	Aminofilin	Aminophylline 200mg	Penggunaan bersamaan dengan efedrin (pada anak < 6 tahun atau < 22 kg)	Membantu mengendurkan otot bronkial atau saluran udara, sehingg dapat meningkatkan aliran udara di paru-paru	• **Dewasa :** 225 – 450 mg, 2 kali sehari. Dosis dimulai dari yang paling rendah, kemudian	Sakit kepala, mual, tremor, gelisah, insomnia, sakit perut, sulit buang air kecil, diare	Simpan di tempat sejuk dan terhindar dari sinar matahari, serta jauhkan obat dari jangkauan anak-anak

					ditingkatkan secara bertahap • **Anak usia > 6 tahun :** 10 mg/kgBB, 2 kali sehari. Dalam beberapa kasus asma kronis, dosis yang digunakan adalah 11 – 18 mg/kgBB, 2 kali sehari Dikonsumsi sebelum makan		

(9) VITAMIN, MINERAL, ENZIM

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Vitamin	Vitamin A	Elkana CL Emulsion 120 ml	Pasien yang mengalami hipersensitivitas atau alergi terhadap salah satu komponen suplemen ini, tidak boleh digunakan untuk	Suplemen untuk membantu memenuhi kebutuhan vitamin dan kalsium untuk anak-anak pada masa pertumbuhan, wanita hamil, dan menyusui	• **Dewasa dan anak-anak di atas usia 6 tahun :** 5 ml, sekali sehari • **Anak-anak usia di bawah 6 tahun :** 2,5	Reaksi alergi	Simpan obat dalam ruangan dengan suhu yang sejuk, di tempat yang kering, dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung.

			anak di bawah 1 tahun		ml, sekali sehari Dikonsumsi bersama makanan agar diabsorpsi lebih baik serta mencegah timbulnya rasa tidak nyaman pada GI		Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak
	Vitamin D	Hi-D 5000	Penderita hipersensitivitas dengan vitamin D3 atau dengan komponen lain dalam formula, infeksi bakteri atau jamur pada mulut dan tenggorokan, lesi herpetik karena virus atau lesi intraoral	Meningkatkan kadar vitamin D pada pasien dengan kekurangan vitamin D	• **Dewasa dan anak usia lebih dari 12 tahun :** 1 tablet kunyah, 1 kali sehari Dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Dikunyah terlebih dahulu, jangan langsung ditelan	-	Simpan dalam wadah tertutup di ruangan bersuhu yang sejuk dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak
	Vitamim E	Santa E 400 IU	Hipersensitif, fenilketonuria, wanita hamil	Memelihara kesehatan tubuh dan membantu	1 x sehari atau sesuai	Mual, kelemahan otot, sakit kepala	Simpan obat di tempat bersuhu ruang, serta

			dengan kadar fenilalanin tinggi, bayi di bawah usia 1 tahun	memenuhi kebutuhan vitamin E	petunjuk dokter Dikonsumsi dengan cara dikunyah, ditelan, atau dihisap		terhindar dari sinar matahari langsung, suhu panas, dan kondisi yang lembab. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak
	Vitamin K	Phytomenadione 10 mg	Obat ini sebaiknya tidak digunakan pada pasien yang hipersensitif terhadap Phytomenadione	Mencegah perdarahan pada bayi baru lahir akibat kekurangan vitamin K dan mengatasi perdarahan yang disebabkan oleh obat antikoagulan	• **Perdarahan bayi baru lahir akibat defisiensi vitamin K :** **Anak-anak :** Untuk pencegahan 1 – 2 mg saat lahir, diikuti 2 mg pada hari ke 4 – 7, kemudian 2 mg setelah 1 bulan kelahiran • **Perdarahan akibat obat antikoagulan :** **Dewasa :** 2,5 – 5 mg. Frekuensi dan jumlah dosis disesuaikan dengan hasil	Pusing, rasa hangat (wajah, leher, atau dada), perubahan rasa pada lidah, berkeringat, nyeri, bengkak, atau pegal di area bekas suntikan	Simpan obat dalam kemasannya di ruangan bersuhu sejuk, serta terhindar dari panas dan paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak

					pemeriksaan prothrombin time (PT) atau kondisi klinis Dikonsumsi sebelum atau sesudah makan		
	Vitamin B1 (thiamin)	Vitamin B1 50 mg	Pasien alergi terhadap vitamin B1 (thiamin)	Memenuhi kebutuhan vitamin B1	1 tablet, 1 kali sehari atau sesuai kebutuhan atau atas anjuran dokter Dikonsumsi sesudah makan	Mual, diare, atau sakit perut	Simpan obat di tempat yang sejuk, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak
	Vitamin B6 (pyrodixine)	Vit. B6 HCl 10 Mg	Alergi terhadap kandungan dalam obat ini	Mencegah defisiensi vitamin B6 dan anemia sideroblastik	• **Defisiensi B6** **Dewasa :** dosis sesuai kebutuhan pasien. Dapat hingga 150 mg per hari atau 1 tablet 1 kali sehari **Anak-anak :** ½ tablet 1 kali sehari Dikonsumsi sebelum atau Sesudah	Mual, kantuk, sakit perut, kesemutan ringan, hilang selera makn,sakit kepala	Simpan obat di tempat yang sejuk, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak

					makan		
	Asam folat	Folavit 400 mcg	Terapi jangka panjang pada defisiensi kobalamin yang tidak diobati	Membantu memenuhi kebutuhan asam folat terutama untuk ibu hamil dan menyusui	• 400 – 500 mcg per hari • **Defisiensi asam folat :** dosis awal : 0,25 – 1 mg per hari. Dosis pemeliharaan : 0,25 mg per hari • **Ibu hamil dan menyusui :** 2 tablet per hari Dikonsumsi sebelum atau sesudah makan	Mual, nafsu makan menurun, perut kembung atau sakit perut, rasa pahit atau tidak enak di mulut	Simpan di tempat bersuhu ruangan, kering, dan terhindar dari panas dan paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak
	Vitamin B12	Neurosanbe	Penderita yang hipersensitif dengan komponen obat ini	Pengobatan kekurangan vitamin B1, B6, dan B12 yang berkaitan dengan kesehatan saraf, seperti pegal-pegal otot dan kesemutan, serta anemia	1 kali sehari, 1 tablet Dikonsumsi sebelum atau sesudah makan, dapat bersama makanan untuk mengurangi ketidaknyaman	Diare, muntah, tidak nafsu makan, perut kembung, rasa tidak enak di mulut	Simpan di tempat bersuhu ruangan, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak

					an pada saluran cerna		
	Vitamin B	Vitamin B Complex	Hipersensitif	Membantu memenuhi kebutuhan vitamin B yang kurang akibat konsumsi makanan yang tidak sehat, penyakit tertentu, atau kecanduan minuman beralkohol	3 kali sehari 1 tablet Dikonsumsi sesudah makan	Mual ringan, diare, perubahan warna urine menjadi lebih kuning cerah, sakit kepala ringan, kesemutan, nyeri di mulut	Simpan obat di tempat kering, sejuk, dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak
Mineral	Ca	Calcium Lactate 500 mg	Penderita hiperkalemia dan hiperkalsiurea	Kalsium tambahan pada masa pertumbuhan, masa hamil, menyusui, serta untuk pertumbuhan tulang dan gigi	• **Dewasa :** 3 kali sehari, 1 –2 tablet • **Anak :** 2 – 3 kali sehari, 1 tablet atau menurut petunjuk dokter Dikonsumsi setelah makan	Mual, muntah, kehilangan nafsu makan, sembelit, tenggorokan kering, buang gas	Simpan obat di tempat kering yang terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak
	P	Vossecal	Alergi terhadap kandungan di dalam obat ini, hipervitaminosis D, hiperkalsemia, hiperkalsiuria	Membantu menjaga kesehatan tulang dalam tubuh	2 kali sehari, 1 kapsul Dikonsumsi sesudah makan	Sembelit, perut kembung, mual, sakit perut, diare	Simpan obat di tempat kering yang terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak

	K*	Fatigon 6 Kaplet	-	Mencegah dan membantu mengobati kekurangan Vitamin E, B1, B6, B12, serta kekurangan mineral kalium dan magnesium	**Dewasa :** 1 kaplet sehari Dikonsumsi sesudah makan	Perut kembung, mual, muntah, sakit perut, atau diare	Simpan obat di tempat bersuhu ruang, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Jauhkan dari jangkauan anak-anak
	Mg	Formical-B	Penderita dengan hipersensitivitas dengan vitamin D3 dan analognya atau dengan komponen lain dalam formula, hiperkalsemia dan hiperkalsiuria, kalsium nefrolitiasis, nefrokalsinosis, hipervitaminosis D, kerusakan ginjal berat, serta gagal ginjal	Untuk memenuhi kebutuhan kalsium pada remaja dan dewasa muda, wanita hamil dan menyusui, wanita menopause, dan orang lanjut usia	1 kaplet, diminum per hari atau sesuai petunjuk doker Dikonsumsi setelah makan	Mual, sendawa, sakit perut, perut kembung, sembelit, mulut kering	Simpan di tempat bersuhu ruang dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak
	Na	Imunos 4 Kaplet	Tidak boleh digunakan oleh penderita sclerosis multiple, penyakit kolagen, leucosis,	Membantu memelihara kesehatan dan daya tahan tubuh	**Dewasa :** 1 kaplet sekali sehari	Sakit perut, sembelit, diare, rasa panas di dada (heartburn), muntah atau ruam kulit	Simpan di tempat yang kering, terhindar dari sinar matahari langsung, dan

			tuberculosis, AIDS dan penyakit autoimun		Dikonsumsi sesudah makan		pada suhu ruang. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak
	Cl*	Renovit	Hipersensitivitas	Membantu memenuhi kebutuhan multivitamin dan mineral harian dan membantu menjaga kesehatan tubuh	1 kaplet per hari Dikonsumsi setelah makan	Mual, muntah, atau penglihatan kabur jika dikonsumsi dalam dosis yang berlebihan	Simpan di tempat yang kering, terhindar dari sinar matahari langsung, dan pada suhu ruang. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak
	Fe	Queenvit	Pasien hipersensitif terhadap kandungan dalam obat ini	Membantu memenuhi kebutuhan mikronutrien untuk membantu kesehatan pada wanita	2 kali sehari 1 kaplet atau sesuai dengan anjuran dokter Dikonsumsi sesudah makan	-	Simpan obat di tempat yang sejuk (tidak lebih dari 30 derajat Celcius) dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung. Jauhkan dari jangkauan anak-anak
	Zn	Zinc Sulfate Monohydrate 20 mg	Hindari penggunaan pada penderita dengan defisiensi tembaga (Copper)	Membantu memperkuat sistem kekebalantubuh, dan mengatasi defisiensi zinc pada kasus diare	• **Diare akut dewasa :** 10 – 20 mg, diminum satu kali per hari, lama pengobatan	Muntah, diare, muncul rasa seperti logam di mulut, atau sakit perut	Simpan di tempat yang terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat

					10 – 14 hari meskipun diare sudah berhenti • **Anak-anak usia 6 bulan – 5 tahun :** 20 mg, diminum satu kali per hari, lama pengobatan 10 hari meskipun diare sudah berhenti Dikonsumsi sesudah makan		dari jangkauan anak-anak
	Mn	Provital Plus Kapsul	Tidak boleh dikonsumi oleh yang alergi terhadap salah satu kandungan obat ini	Membantu memelihara kesehatan tubuh	1 kali sehari 1 kapsul lunak Dikonsumsi setelah makan	Rasa panas dan kemerahan di wajah, sakit perut ringan, mual muntah, hilang selera makan, sakit kepala, kesemutan, lelah, diare, kantuk	Simpan di tempat kering, sejuk, dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak
	Cu	Folamil Genio	Pasien yang hipersensitif terhadap salah	Suplemen multivitamin dan mineral	1 kapsul lunak per hari	-	Simpan pada suhu ruangan, jauhkan dari

			satu komponen produk	mengandung DHA untuk nutrisi otak ibu hamil dan menyusui	Dikonsumsi sesudah makan		cahaya langsung dan tempat yang lembab. Jangan disimpan di kamar mandi dan jangan dibekukan
	I_2*	Blackmores I-Folic	Tidak boleh dikonsumsi jika mempunyai riwayat alergi pada salah satu kandungan obat ini	Memenuhi kebutuhan asam folat dan yodium selama kehamilan	• **Dewasa :** 1 kapsul sehari sesudah makan, atau sesuai petunjuk dokter Dikonsumsi sesudah makan	Sesak napas, gatal dan ruam, pembengkakan pada wajah, bibir, dan lidah, serta rasa tidak nyaman di perut	Simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius, di tempat yang sejuk dan kering, terhindar dari cahaya matahari langsung, serta jauh dari jangkauan anak-anak

(10) OBAT SISTEM ENDOKRIN

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat Diabetes melitus	Sulfonilurea (Glibenclamide)	Glibenclamide 5 mg	Hipersensitif terhadap sulfonilurea, pasien yang mengalami DM tipe 1, penderita gangguan ginjal dan hati ringan	Mengendalikan kadar gula darah yang tinggi pada diabetes tipe 2	Dosis awal adalah 2,5 – 5 mg per hari. Dosis bisa ditingkatkan setiap minggu sampai maksimal 20	Berat badan naik, mual, sensai terbakar di dada, perut terasa penuh, hipoglikemia	Simpan di tempat bersuhu ruang dan terhindar dari papara sinar matahari secara langsung. Jauhkan obat

			sampai sedang, pasien yang lemah dan kurang gizi, wanita menyusui		mg per hari. Untuk dosis yang lebih dari 10 mg per hari, Glibenclamide tablet bisa dikonsumsi 2 kali sehari Dikonsumsi bersama makan. Diminum bersama sarapan atau makanan utama pertama pada hari itu		dari jangkauan anak-anak
	Sulfonilurea (Glimepiride)	Glimepiride 4 Mg	Hipersensitivitas, pasien ketoasidosis diabetik dengan atau tanpa koma	Mengendalikan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2	• **Dosis awal :** 1 – 2 mg, satu kali sehari • **Dosis pemeliharaan :** 1 – 4 mg, satu kali sehari, dosis maksimum 8 mg, satu kali sehari • Pada saat pemberian telah mencapai dosis 2 mg maka	Pusing, sakit kepala, mual muntah, diare	Simpan pada suhu ruangan, di tempat yang kering, tertutup, serta jauh dari paparan sinar matahari. jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak

					kenaikan dosis tidak boleh melebihi 2 mg dengan interval 1 – 2 minggu tergantung dari respon gula darah Dikonsumsi sebelum makan utama yang pertama pada hari yang sama. Jangan mengurangi jadwal makan		
	Sulfonilurea (Metformin HCl)	Metformin HCl 500 mg	Penyakit ginjal dengan kadar kreatinin serum lebih dari 1,5 mg/dL (pria) dan lebih dari 1,4 mg/dL (wanita), infark miokard akut, septikemia, gagal jantung kongestif, penyakit hati kronik, alkoholik, hipoksia, asidosis metabolik akut atau kronik,	Mengontrol dan menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2	• Dosis awal : Sehari 2 kali 500mg atau 2 kali 850mg. Dosis dapat ditingkatkan sesuai dengan respon pasien • Dosis pemeliharaan : Sehari 2 kali 850mg Dikonsumsi bersamaan dengan makan	Batuk, demam, diare, sakit perut, mual, nafsu makan menurun, rasa logam di mulut, sakit punggung, nyeri otot	Simpan di tempat sejuk dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak

			wanita hamil, dan menyusui		atau sesudah makan dalam dosis terbagi		
	Sulfonilurea (Pioglitazone HCl)	Pioglitazone HCl 30 mg	Pasien yang hipersenstif terhadap pioglitazone atau salah satu bahan yang terdapat dalam formula obat, gagal jantung atau pasien yang mempunyai riwayat gagal jantung, gangguan hati, penderita kanker kandung kemih atau memiliki riwayat kanker kandung kemih, pioglitazone dikontraindikasikan untuk dikombinasi dengan insulin	Menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2	• Monoterapi**:** 15 atau 30 mg sekali sehari, dapat ditingkatkan hingga dosis maksimal menjadi 45 mg sekali sehari • Kombinasi dengan metformin atau sulfonilurea **:** 15 atau 30 mg sekali sehari Dikonsumsi sebelum atau sesudah makan	Sakit kepala, kembung, nyeri tenggorokan, nyeri otot, dan berat badan bertambah	Simpan di tempat bersuhu ruangan, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak
	Sulfonilurea (Acarbose)	Acarbose 100 mg	Pasien yang hipersensitif terhadap acarbose atau komponen dalam obat, pasien dengan gangguan intestinal kronis yang berhubungan	Menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2	• Dosis awal : 3 kali sehari 50 mg (½ tablet) • Dosis selanjutnya **:** 3 kali sehari 100 – 200	Perut kembung, sering buang angin, sakit perut, diare, gatal	Simpan di tempat bersuhu ruangan dan terhindar dari paparan sinar matahari secara langsung. Jauhkan obat ini

			dengan penyerapan dan gangguan pencernaan secara nyata, keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan perburukan sebagai hasil dari peningkatan pembentukan gas di dalam usus, penderita inflammatory bowel disease, pasien dengan gangguan ginjal berat, selama kehamilan		mg (1 – 2 tablet) • Dosis dapat ditingkatkan setelah 4 – 8 minggu, dan bila pasien menunjukkan respon klinis yang inadekuat setelah pengobatan selanjutnya • Dosis rata-rata : 300 mg per hari Dikonsumsi bersama satu suapan pertama makanan atau ditelan utuh dengan sedikit air segera sebelum makan		dari jangkauan anak-anak
	Insulin	Sansulin Log G Catridge 3 ml	Hipersensitivitas terhadap komponen obat	Pasien yang membutuhkan insulin biasanya pada penderita diabetes mellitus	• Dosis bersifat individual, 1 kali sehari diinjeksi secara subkutan, diberikan	Gula darah rendah, gangguan penglihatan sementara, perubahan pembentukan lemak tubuh, reaksi di area injeksi dann alergi,	Simpan pada suhu antara 2 – 8 derajat Celcius, terhindar dari cahaya langsung dan jangan dibekukan

					pada waktu yang sama tiap harinya Ditentukan dokter, disuntikkan secara subkutan pada area perut, lengan atas atau paha	serta terbentuknya antibodi insulin	
Obat Hipertiroid danHipotiroid	Propiltiourasil	Propylthiouracil 100 mg	Wanita hamil trimester III	Menangani gejala-gejala keringat berlebih, berat badan menurun, mudah emosi, pembesaran kelenjar tiroid, serta tremor yang biasa terdapat pada penyakit hipertiroid dimana terdapat banyak hormon tiroid dalam tubuh	• Oral : Dosis awal : 100 – 150 mg secara oral setiap 8 jam, jarang terjadi 200 – 300 mg oral setiap 8 jam Perawatan : 100 – 150 mg/hari dalam dosis yang dibagi rata setiap 8 – 12 jam Dikonsumsi sebelum atau sesudah makan	Mual, muntah, sakit perut, nyeri sendi atau otot, sulit membedakan rasa makanan atau minuman, pusing, rambut rontok, kesemutan	Simpan di tempat sejuk dan terhindar dari sinar matahari, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak

	Levotiroksin	Levothyroxin e Sodium 100 mcg	Hipersensitivitas terhadap obat ini dan insufisiensi adrenal yang tidak terkoreksi	Mengobati hipotiroidisme, yaitu kondisi rendahnya kadar hormon tiroid (gejalanya adalah mudah lelah, sembelit, atau mudah lupa bisa berkurang)	• Hipotiroidisme : Dewasa **:** Dosis awal, 50 – 100 mcg/hari. Dosis dapat ditambah sebanyak 25 – 50 mcg setelah 3 – 4 minggu sesuai dengan respons dan kondisi pasien hungga jumlah hormon tiroid normal. Dosis perawatan 100 – 200 mcg perhari Bayi baru lahir **:** Dosis awal 10 – 15 mcg/kgBB perharu. Dosis dapat disesuaikan setiap 4 – 6 minggu Bayi baru lahir dengan kadar hormon tiroid < 5 mg/dl **:** Dosis awal 50 mcg/kgBB per hari Bayi usia 0 – 3 bulan : 10 – 15	Berat badan turun, sakit kepala, kaki kram, muntah, demam, diare, perubahan siklus menstruasi, rambut rontok, nafsu makan bertambah, tremor	Simpan obat dalam wadah tertutup di tempat sejuk dan terhindar dari sinar matahari secara langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak

					mcg/kgBB per hari Bayi usia 3 – 6 bulan : 8 – 10 mcg/kgBB per hari Bayi usia 6 – 12 bulan : 6 – 8 mcg/kgBB per hari Anak usia 1 – 5 tahun : 5 – 6 mcg/kgBB per hari Anak usia 6 – 12 tahun : 4 – 5 mcg/kgBB per hari Anak usia > 12 tahun : 2 – 3 mcg/kgBB per hari Remaja yang telah memasuki masa pubertas : Dosis mengikuti dosis dewasa • Penekanan TSH (Thyroid Stimuling Hormone) :		

					Dewasa : Dosis 2 mcg/kgBB per hari, diberikan sekali sehari sebagai dosis tunggal untuk menekan TSH pada kanker tiroid atau penyakit gondok Sebaiknya dikonsumsi saat perut kosong, setidaknya 30 menit sebelum makan		
Kortikosteroid	Hidrokortison	Hydrocortison Acetate Cream 2,5%	Hipersensitif, pengobatan dermatitis, penggunaan mata, infeksi mendasar	Mengobati eksim, inflamasi, kemerahan, serta gatal-gatal pada kulit, beberapa jenis infeksi kulit yang dapat diobati (dermatitis alergi, dermatitis kontak, dermatitis atopi, pruritus anogenital, neurodermatitis)	Oleskan pada kulit yang bermasalah 1 – 2 kali per hari, dioleskan tipis pada bagian yang bermasalah	Muncul rasa tersengat atau kemerahan di area kulit yang dioleskan, gangguan kulit (kulit terasa kering, stretch mark, muncul jerawat, atau pembuluh darah kulit pecah)	Simpan di dalam kemasannya, letakkan di tempat tertutup dan terhindar dari hawa panas, tempat yang lembab, serta terkena sinar matahari secara

							langsung. Jauhkan dari jangkauan anak-anak
	Betametason	Betason N Cream	Hipersensitivitas, rosasea, acne vulgaris, dermatitis perioral, infeksi kulit primer oleh virus, hamil, usia lanjut, dermatosis pada anak kurang dari 2 tahun	Mengatasi peradangan kulit yang disertai infeksi	Oleskan tipis pada bagian yang sakit 2 – 3 kali sehari	Rasa terbakar pada kulit, kulit terasa gatal, kulit kering, kemerahan di kulit	Simpan obat di tempat bersuhu ruang, jauh dari kelembaban dan paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak
	Prednison	Prednison 5 mg	Penderita penyakir TB aktif, infeksi akut, infeksi jamur, herpes simpleks mata, ulkus peptikum, hipertensi mengalami osteoporosis, mengalami psikosis maupun psikoneurosis berat, serta sedang menerima vaksin hidup	Membantu meredakan peradangan pada beberapa kondisi, seperti alergi, penyakit autoimun, radang sendi, atau dermatitis kontak	• **Alergi, kondisi peradangan, atau autoimun tertentu Dewasa dan anak-anak :** 5 – 60 mg per hari • **Asma akut Dewasa :** 40 – 60, 1 – 2 kali sehari, selama 3 – 10 hari	Mual muntah, diare, konstipasi, keringat berlebihm jerawat, sulit tidur, hilang nafsu makan	Simpan di tempat yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari. Jauhkan dari jangkauan anak-anak

					Anak usia 0 – 11 tahun : 1 – 2 mg/kgBB per hari, selama 3 – 10 hari. Dosis maksimal 60 mg per hari • **Kekambuhan mutiple sclerosis** **Dewasa :** 200 mg per hari, selama 1 minggu, dilanjutkan dengan 80 mg tiap 2 hari sekali, selama 1 bulan • **Idiopathic Thrombocytopenic Purpura (ITP)**		

					Dewasa : 1 – 2 mg/kgBB per hari. Dosis pemeliharaan dan durasi pengobatan akan disesuaikan dengan respons tubuh pasien terhadap terapi dan kondisi pasien secara umum • **Rheumatoid arthtis** **Dewasa :** 5 – 10 mg per hari, dikonsumsi sebelum tidur. Dosis dapat dikurangi setiap 2 – 4 minggu sesuai dengan respons terapi dan kondisi pasien • **Dermatitis kontak**		

					Dewasa : 40 – 60 mg per hari. Dosis dapat diturunkan secara bertahap setelah 2 minggu Dikonsumsi setelah makan dan sebelum tidur		
	Metilprednisolon	Methylprednisolone 4 mg	Infeksi jamur sistemik kecuali terapi antiinfeksi spesifik digunakan, admin IM pada purpura trombositopenik idiopatik, admin intratekal, pemberian vaksi hidup atau hidup yang dilemahkan secara bersamaan	Mengurangi peradangan atau supresi inflamasi dan reaksi alergi	• **Dosis awal : Dewasa :** 4 – 80 mg/hari **Anak :** 0,8 – 1,1 mg/kgBB • **Dosis pemeliharaan : Dewasa :** 4 – 8 mg/hari dosis ditingkatkan menjadi 16 mg/hari **Anak :** 2 – 4 mg/hari, dapat ditingkatkan	Kenaikan kadar gula dalam darah, sakit kepala, mual muntah, sakit maag, nafsu makan menurun, sulit tidur, keringat berlebih, nyeri otot, rentan terkena infeksi, gangguan emosi dan suasana hati (mudah marah)	Simpan di tempat bersuhu ruang dalam wadah tertutup yang kering untuk menghindari sinar matahari. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak

					sampai 8 mg/hari • **Dosis substitusi :** 4 – 8 mg/hari, dalam keadaan stres ditingkatkan menjadi 16 mg/hari Dikonsumsi sesudah makan		
Obat KB	Levonorgestrel	Microgynon 28 Tablet	- Kontrasepsi Oral Kombinasi (KOK) - Adanya atau riwayat trombotik vena atau arteri yang pernah terjadi atau serangan pada pembuluh darah otak - Adanya atau riwayat prodomi trombosis,	Alat konstrasepsi hormonal yang bermanfaat untuk mencegah terjadinya kehamilan	1 tablet per hari, selama 28 hari berturut-turut Dikonsumsi sebelum atau sesudah makan	Mual, perut kembung, perubahan suasana hati, menstruasi yang tidak teratur, flek pendarahan sebelum periode haid (spotting), sakit kepala, payudara terasa pegal atau nyeri	Simpan di tempat yang kering dan tidak lembab. Hindarkan obat dari paparan sinar matahari langsung dan jauhkan obat dari jangkauan anak-anak

			memiliki risiko tinggi trombosis vena atau arteri - Riwayat migrain dengan gejala-gejala neuroloi fokal diabetes mellitus yang parah selama fungsi hati belum kembali normal - Adanya atau riwayat tumor hati - Diketahui atau dicurigai adanya keganasan yang dipengaruhi oleh hormon seks - Adanya atau diperkirakan adanya kehamilan - Hipersensitivitas, riwayat herpes				

			gestationis sickle cell anemia				
	Etinilestradiol	Diane-35	- Hamil - Laktasi - Gangguan fungsi hati berat - Riwayat iketrus idiopatik atau pruritus selama hamil - Sindroma Dubin-Johnson - Sindrom Rotor - Tromboemboli k - Anemia sel sabit - Dalam pengobatan kanker payudara - DM berat - Gangguan met	Kontrasepsi hormonal yang bermanfaat untuk mencegah kehamilan, mengobati wanita dengan masalah jerawat yang parah, serta dapat menangani masalah lain, seperti seborrhea atau hirsutisme ringan	1 kali sehari 1 tablet, dimulai pada hari ke-1 siklus haid selama 21 hari diikuti masa istirahat selama 7 hari Dikonsumsi sebelum atau sesudah makan	Perlunakan payudara, nyeri pada payudara, sakit kepala, perasaan depresi, mual, nyeri perut, perubahan berat badan, flek atau perdarahan vagina yang terjadi di luar siklus haid, diare	Simpan dalam wadah tertutup di tempat yang sejuk dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak
	Lynestrenol*	Andalan Laktasi	Wanita hamil atau sedang merencanakan kehamilan, penyakit hati	Sebagai kontrasepsi oral untuk mencegah kehamilan	1 kali sehari 1 tablet Bila memberikan ASI secara	Spotting atau flek dari vagina seperti haid pada 3 bulan pertama, pusing,	Simpan di tempat bersuhu ruangan, kering, dan terhindar dari

TUGASKHUSUS PKL D3 FARMASI UMG_SASTI AMILIA PUTRI__221105023_RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH GRESIK

			berat, perdarahan vagina yang tidak terdiagnonsa, riwayat ikterik, pruritus, herpes gestaionis		eksklusif, pil KB laktasi dapat dikonsumsi 6 minggu setelah melahirkan. Untuk efektivitas penuh, pil dapat diminum pada hari pertama haid dan setiap hari seterusnya pada jam yang sama	mual, payudara terasa lebih lembek	paparan sinar matahari langsung, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak

Gresik, 13 juni 2025
Dosen Pembimbing PKL,

Apt Siti Nur Asiyah, M. Farm. Klin.
NIDN. 0711088504

Gresik, 13 juni 2025
Pembimbing Lapangan Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik

Apt. Alfiyah Hanum, S.Si
SIPA. 19720607/SIPA_35.25/2022/2527

C. PRODUCT KNOWLEDGE ALAT KESEHATAN

(1) ALKES PERAWATAN

No	Alkes perawatan	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Bandage gauze (kasa hidrofil)		Membantu menutup luka dan melindungi dari kotoran serta debu penyebab indeksi.	Bersihkan luka dari kotoran, bakteri dan partikel untuk mencegah infeksi. Keringkan kulit sekitar luka dengan lembut. Tutup luka dari kotoran dan bakteri menggunakan kasa dan rekatkan dengan plester atau sejenisnya.
2.	Elastic bandage		Untuk memfiksasi atau menjaga posisi tulang-tulang dan otot anda terutama yang baru saja mengalami cedera (dislokasi) atau patah tulang.	Balutkan FM Crepe atau Policrepe dengan teknik balut sesuai keperluan dan setelah itu pasang pengait yang tersedia di dalam kemasan dengan sebelumnya permukaan kulit yang akan di balut di bersihkan dahulu dari kotoran dan lemak.
3.	Kapas pembalut		Membersihkan dan menutupi luka agar tidak mudah terinfeksi serta dapat digunakan untuk lapisan perban	Ambil kapas secukupnya dan bersihkan area tubuh yang mengalami luka dapat juga dijadikan sebagai alas perban sebelum luka ditutup plester perekat.
4.	Kasa berisi obat (sufra tulle, daryant tulle, bacti grass, actisorb,paronet)		untuk menutup luka yang erinfeksi, infeksi kulit sekunder, dermatitis, dan herpes zoster atau cacar air.	Letakkan selembar dressing pada luka

5.	Kasa dressing		Untuk menutup luka yang terinfeksi, infeksi sekunder, kulit dermatitis, dan herpes zoster atau cacar air.	1. membersinkan dan mengeringkan luka dan kulit di sekitarnya 2. pegang perban di kedua sisi pembalut 3. letakkan pembalut langsung pada luka 4. gulung ujung pendeknya satu kali disekitar dahan dan bantalan (biarkan ujungnya menggantung) 5. gulung ujung lainnya di sekeliling dahan untuk menutupi seluruhbantalan 6. ikat kedua ujungnya di atas bantalan untuk mengencangkannya, dan berikan sedikit tekanan pada luka 7. jika ada darah yang keluar dari balutan, keluarkan dan berikan tekanan menggunakan pembalut baru - bila pendarahan sudah terkendali, kencangkan pembalut di tempatnya dengan pembalut baru.
6.	Kasa steril		Untuk menutup luka yang sebelumnya diberi obat agar terhindar dari kontaminasi. Kasa Kemudian difiksasi dengan pleste atau dibalut perban	Bersihkan luka dari kotoran, bakteri dan Partikel untuk mencegah infeksi. Keringkan kulit sekitar luka dengan lembut. Tutupi luka dari kotoran menggunakan kasa steril.

7.	Pembalut gips (gypsona)		Untuk mencegah immobilisasi persediaan yang patah atau fiksasi dislokasi tulang	1. Pertama, dokter akan memasang stockinette terlebih dahulu, yaitu perban yang ringan dan melar, dibagian tubuh menglami fraktur. 2. Kedua, lapisan bantalan yang terbuat dari kapas atau bahan lembut lainnya akan melapis bagian tubuh tersebut untuk lebih melindungi kulit. Bantalan ini juga memberikan tekanan yang elastis untuk membantu proses penyembuhan tulang. 3. Ketiga, dokter akan membungkus bagian tubuh tersebut dengan lapisan luar dari plester atau fiberglass. Lapisan luar ini memang tampak lembab, tetapi material tersebut akan mulai mengering sekitar 10-15 menit kemudian, dan akan mengeras dalam waktu 1-2 hari. Selama periode ini, Anda perlu lebih berhati-hati, karena plester bisa pecah atau retak saat mulai mengeras. 4. Terakhir, dokter terkadang membuat sayatan kecil di atas lapisan luar perban sehingga ada ruang bila pembengkakan terjadi.
8.	Pembalut leher/cervical collar		Untuk menopang kepala dan membatasi gerak tulang leher (cervical vertebrae)	Penopang kepala pasien. Masukkan Cervical collar secara perlahan lalu rekatkan kedua sisi

9.	Plester Elastik (handyplas, bandaid, elastikon)		Untuk menutup luka yang elastis dan tidak melekat pada luka, steril dan mencegah infeksi pada luka.	Bersihkan dan keringkan kulit di sekitar luka sebelum menempelkan plester. Tutup luka dengan plester tanpa direnggangkan. Gantilah plester secara teratur
10.	Plester kertas (leukopor, dermilite)		Plester untuk menutup luka yang memiliki daya rekat tinggi dan tembus udara sehingga meminimalisir terjaidnya iritasi pada kulit.	1. Gunting atau sobek leukopor sesuai ukuran yang dibutuhkan. 2. Pastikan area yang dipublikasikan bersih, tidak basah atau terkena minyak. 3. Aplikasikan Leukopor pada area yang diinginkan dan rekatkan ke kulit atau alat dengan hati-hati. 4. Pastikan ujung-ujung plester sudah merekat dengan baik.
11.	Plester plastik (leukofix, transfor)		Plester yang digunakan sebagai perekat verban	1. Gunting atau sobek leukofix sesuai ukuran yang dibutuhkan. 2. Pastikan area yang diaplikasikan bersih, tidak basah atau terkena minyak. 3. Aplikasikan leukofix pada area yang diinginkan dan rekatkan ke kulit atau alat dengan hati hati. 4. Pastikan ujung-ujung plester sudah merekat dengan baik.
12.	Plester plastik waterprof (setonplast, blenderm)		Plester penutup luka untuk mencegah infeksi pada luka selama proses penyembuhan	Bersihkan dan keringkan bagian yang sakit, lepaskan plester dari lapisan filmnya dan tempelkan pada daerah yang sakit.

13.	Plester rayon (microfore, dermisel)		Plester berdaya rekat kuat, anti alergi digunakan untuk menutup luka.	1. Gunting atau sobek dermisel sesuai ukuran yang dibutuhkan. 2. Pastikan area yang diaplikasikan bersih, tidak basa atau terkena minyak. 3. Aplikasikan dermisel pada area yang diinginkan dan rekatkan ke kulit atau alat dengan hati-hati. 4. Pastikan ujung-ujung plester sudah merekat dengan baik.
14.	Plester sutera (leukosilk)		Plester berdaya rekat kuat, anti alergi digunakan untuk menutup luka.	1. Gunting atau sobek Leukosik sesuai ukuran yang dibutuhkan. 2. Pastikan area yang diaplikasikan bersih, tidak basa atau terkena minyak. 3. Aplikasikan dermisel pada area yang diinginkan dan rekatkan ke kulit atau alat dengan hati-hati. 4. Pastikan ujung-ujung plester sudah merekat dengan baik.
15.	Plester ZnO (leukoplas)		Plester kain yang dapat digunakan sebagai perekat penutup luka, perekat tube, catheter, dan cannulae	1. Gunting atau sobek Leukoplas sesuai ukuran yang dibutuhkan. 2. Pastikan area yang diaplikasikan bersih, tidak basa atau terkena minyak. 3. Aplikasikan dermisel pada area yang diinginkan dan rekatkan ke kulit atau alat dengan hati-hati. 4. Pastikan ujung-ujung plester sudah merekat dengan baik.

(2) PERAWATAN PASIEN

No	Perawatan pasien	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Bedpan		Sebagai wadah feses	Letalkkan bedpan dibawah pantat, meyakinkan

			untuk pasien yang tidak bisa ke WC	dengan tepat perletakkan bedpan letrakan fraktur pan dengan bagian yang belum klien berguling ke posisi semula. Rendah dekat regio punggung bawah klien, large bedpan bagian yang terbuka berada di dekat paha klien.
2.	Breast pump		Alat pemompa yang dapat membantu mengeluarkan ASI	1. Siapkan alat pompa elektrik, kemudian pasang masing-masing alat sesuai tempatnya. 2. Letakkan pelindung payudara pada 3. posisi yang tepat dan tidak terasa mengganggu atau sakit. Jika pelindung tersebut dirasa kurang pas, Anda bisa menekannya perlahan agar tidak mudah lepas nantinya. 4. Colokkan pompa elektrik ke sumber listrik terdekat atau langsung digunakan saat baterai masih tersedia. 5. Nyalakan tombol "on" dan atur ke intensitas pompa sesuai keinginan Anda. 6. Jika Anda menggunakan pompa elektrik yang hanya memiliki satu pompa, Ulangi tahapan sebelumnya Di kedua Sisi payudara. 7. Lakukan proses memompa ASI dengan cara yang tepat sampai jumlah ASI yang diperoleh telah cukup atau payudara sudah kosong. 8. Cuci bersih tangan dan semua Peralatan setelah selesai digunakan.
3.	Colostomy bag		Kantong penampung	1. Dekatkan alat-alat ke klien, pasang

			feses pada pasien setelah operasi colon (pembedahan usus untuk membuat anus buatan melalui otot dan kulit perut)	selimut mandi, dekatkan bengkok ke klien, pasang sarung tangan. 2. Lepas dan angkat kantong stoma yang lama lalu buang ke kantong sampah 3. Observasi kondisi stoma dan kulit peristomal (pantau tanda komplikasi, seperti infeksi, prolaps, nekrosis, iskemik, dan lain-lain). 4. Bersihkan stoma dan kulit sekitar stoma dengan sabun atau air hangat 5. Bilas sabun dengan air dan keringkan kulit sekitar stoma dengan tissue basah atau kassa 6. Lindungi stoma dengan tissue atau kassa agar feses yang keluar lagi tidak mengotori kulit yang sudah dibersihkan 7. Setelah kering, ukur stoma kembali dengan guide size untuk memilih kantong stoma yang sesuai (membuat pola) 8. Siapkan kantong stoma dengan pelindung kulit. Buat pola sesuai ukuran stoma, kemudian tandai pelindung kulit dengan spidol sesuai dengan ukuran pola, kemudian lubangi pelindung kulit pada kantong stoma. 9. Lepaskan pelapis kertas dari lempengan kantong 10. Tempelkan pelindung kulit pada kantong stoma (dimulai dari arah jam 6 pada jarum jam) tekan secara lembut dan pelan. 11. Pasang kantong stoma Pasang plester hipoalergik. Pastikan kantong stoma

				merekat dengan baik dan tidak bocor. 12. Lipat ujung bagian bawah kantong ke arah atas. Amankan dengan klem/ penjepit kantong stoma. 13. Buka sarung tangan, bereskan alat- alat, cuci tangan.
4.	Ihsjap/eskap		Kantong karet yang diisi kepingan es/air es untuk mengompres dingin bagian tubuh yang demam biasanya pada bagian kepala	Isi eskap dengan es batu yang sudah hancur1/4 volume, kompres pada area yang diinginkan jika selesai gantung eskap dengan posisi tutup dibawah untuk dikeringkan.
5.	Kruk		Tongkat penyangga tubuh pasien yang mengalami cedera pada tungkai kaki	1. Berdiri tegak dengan sepatuAnda. 2. Pastikan sepatu Anda memiliki hak rendah dan penyangga yang baik. 3. Letakkan kruk di bawah lengan Anda. Relakskan lengan Anda dan biarkan Menggantung atas kruk. Harus ada jarak dua inci antara di ketiak dan bagian atas kruk dengan tangan digantung santai. 4. Pegangan tangan harus setinggi pergelangan tangan Anda saat memegang pegangan tangan. 5. Siku Anda harus sedikit ditekuk hingga sekitar tiga puluh derajat.
6.	Pus basin/emesis basin		Tempat menampung / membuang kapas bekas pakai, nanah, dan muntah	Letakkan barang yang keil diatas tray seperti pen bekam dan alcohol pads

7.	Spalk		Untuk pertolongan pertama pada kecelakaan patah tlang tangan dan kaki	1. Pembidian menggunakan pendekatan atau prinsip melalui dua sendi, sendi disebelah proksimal dan distal faktur 2. Pakaian yang menutupi
8.	Tapelhoed/nipple shield		Untuk melindungi puting ibu menyusui yang terluka atau sakit agar anak tetap dapat menghisap asi	Pasang pelindung diatas puting, tahan pelindung puting ditempat dengan jari
9.	Tongkat pyramide/elbow		Sebagai tongkat untuk menyangga tubuh pasien yang mengalami cedera pada tungkai kaki	Pasang tongkat dengan tangan yang berlawanan pastikan tongkat sedikit kesamping, gerakan tongkat kedepan pada saat yang sama maju dengan kaki yang sakit dan pegang tongkat secara stabil.

10.	Urinal		Tempat buang air kecil	Posisikan alat kelamin ke dalam wadah, gunakan untuk menampung urin.
11.	Walker		Alat bantu jalan yang merupakan salah satu alat bantu alan yang dikhususkan untuk lanjut usia, yang mengalami gangguan dalam berjalan ataupun patah kaki	Pegang tongkat dengan tangan yang berlawanan dengan sisi yang sakit. Posisikan tongkat sedikit ke samping. Gerakkan tongkat kedepan pada saat yang sama maju dengan kaki yang sakit dan pegang tongkat secara stabil
12.	Warm waterzak		Kantong karet diisi air panas, untuk mengompres panas sehingga dapat merelaksasi bagian tubuh yang kejang	1. Tidak diperbolehkan masukkan air panas dalam botol keadaan mendidih 2. Masukkan air maksimal 2/3 dari kapasitas botol 3. Keluarkan udara dengan hati-hati hingga air muncul pada permukaan botol 4. Tutup botol dengan rapat 5. Pastikan penutup botol tidak terjadi kebocoran dengan memegangnua dalam posisi terbalik
13.	Windring/air cusion		Alat ini diisi dengan udara, sebaai alas duduk untuk penderita wasir (ambeien)	Menaruh windring diatas tempat duduk sebagai alas duduk

(3) ALKES TINDAKAN MEDIS

No	Alkes tindakan medis	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Ballon/folley cathether		1. keperluan pemeriksaan klinis Untuk mengambil air kencing dalam sistim tertutup, bebas dari udara dan polusi di sekitarnya (biasanya Dihubungkan dengan urinovolumeter dan sebuah urine bag). 2. keperluan di kamar operasi Untuk pasien yang sedang dibedah bila kencing tidak mengganggu suasana. 3. keperluan Perawatan Untuk pasien yang tidak bisa mengendalikan keinginan untuk kencing (incontinentia urinae)	folley cathether dimasukan kedalam kelamin pasien,sebelumnya selang diberi pelumas agar lebih mudah dimasukan selang kateter dimasukan sedalam 5-15 cm kantung akan diisi dengan air steri sebanyak yng tertera selalu kosogkar kantong urin tiap 6-8 jam.
2.	Condom cathether		Alat disarungkan pada penis dan ujung tubenya dihubungkan dengan urine bag, terutama untuk pasien yang suka buang air kecil dengan tidak sadar (incontinentia urinae)	Menghubungkan penis dengan urine bag melalui ujung tube pasien yang tidak bisa ke kamar mandi.
3.	Disposible syringe		Untuk menyuntikkan cairan obat sekali pakai	Dengan menyuntikkan cairan melalui intra vena, intra muscular ataupun subcutan

4.	Endotracheal		Alat yang digunakan di dunia medis untuk menjamin saluran napas tetap bebas	pasien dibius terlebih dahulu, masukan tabung endotrakeal ke batang tenggorokan dengan ventilator.
5.	Enema syringe		Untuk mencegah infeksi silang, model syringe logam / metal yang reusable. Ujung tubing berbentuk curve, sehingga tidak menyebabkan trauma pada mukosa rctum, sudah melalui uji klinis.	Masukkan selang enema hingga kedalaman 10-12,5 cm, serta pastikan bahwa rectal tube atau selang enema sudah mencapai rektum
6.	Feeding syringe		Alat suntuk untuk memberikan/memasukan makanan pada pasien yang penggunaannya disambungkan dengan selang kateter	Isi feeding syringe dengan makanan yang sudah di haluskan. Lalu masukan ke dalam mulut pasien perlahan
7.	Feeding tube		Untuk memasukkan cairan makanan bagi penderita coma, atau tidak bisa menelan, karena kondisi tertentu dari m ulut/tenggorokan, misal nya pada bayi-bayi premature	Masukkan selang melalui hidung/mulut, masukan spuit kedalam lubang bawah untuk memasukkan makanan kedalam tubuh

8.	Gliserin syringe		untuk menyemprotkan lavemen atau clysme melalui anus. Juga untuk menyemprotkan air sabun, dsb. Pada pasien opsitipasi	Letakkan bedpan dibawah anus, lalu masukkan gliserin ke anus secara perlahan dengan tangna kiri melebarkan anus dan tangan kanan memasukkan gliserin ke dalam anus
9.	Gloves/handschoen		Alat yang disarungkan pada tangan dengan objek yang disentuh	Cuci tangan terlebih dahulu lalu pasang gloves sebelum melakukan tindakan

10.	Infusion set dewasa	 	Untuk memberikan cairan infus ke dalam tubuh pasien melalui intravena untuk memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit serta sebagai tindakan pengobatan dan pemberian makanan.	1. Mencuci tangan, kemudian mengenakan sarung tangan steril 2. Meraba tangan pasien, untuk menentukan area pembuluh darah yang akan dipasangi infus 3. Memasang Tali pembendung (tourniquet) di atas pembuluh darah yang akan ditusuk jarum 4. Membersihkan area kulit yang akan dipasang infus menggunakan kapas beralkohol 5. Memasukkan Jarum infus Ke pembuluh darah yang sudah Ditentukan 6. Melepaskan jarum, Kemudian menghubungkan selang ke cairan infus, obat, atau kantong darah 7. Merekatkan plester pada selang infus ke lengan agar tidak bergeser jika pasien bergerak
11.	Infusion set pediatrik		Untuk memberikan cairan infus kedalam tubuh bayi dan balita	Usap tangan pasien anak/ bayi dengan menggunakan alkohol swab, lalu cari intravenanya untuk dipasang selang ingus
12.	Insulin syringe		Alat untuk menyemprotkan enema/clysima pada dubur	Cubit kulit yang akan disuntik, bersihkan dengan alcohol swabs, masukkan jarum suntik dengan posisi 90, kemudian doeong pompa suntik hingga semua dosis insulin masuk

				kedalam tubuh , lalu saat selesai tarik jarum suntik sebelum melepas cubitna.
13.	Intravena catheter		Sebagai perpanjangan vena dimana alat dihubungkan dengan selang transfuse/infuse . dapat digunakan >48 jam	Masukkan jarum infus ke pembuluh darah disiapkan tabung IV, pilih IV kateter yang SCSLUDI
14.	Masker oksigen		Alat bantu pernafasan yang dipasangkan di hidung dan mulut dengan bentuk seperti masker pada umumnya. Masker khusus ini dipakai sebagai pendukung dalam penyaluran oksigen dari dalam tabung oksigen ke saluran pernafasan	Pastikan sudah terpasang selang ke sumber oksigen, pastikan kantung reservoir mengembang, dan pastikan terdapat katup satu arah berfungsi baik, ubah aliran O2 menjadi 10-15 L/menit dan letakkan masker oksigen pada wadah pasien menutupi hidung dan mulut
15.	Masker nebulizer anak-anak		Untuk melegakan saluran napas yang menyempit pada anak-anak. Alat ini terdiri dari mesin kompresor udara, wadah kecil untuk obat cair, dan selang elastis yang menghubungkan kompresor udara ke wadah obat	Masukkan obat ke cangkir nebylizer sesuai aturan dokter, sambungkan corong ke cangkir nebulizer pasang selang penyambung antara mesin kompresor dan cangkir nebulizer, nyalakan mesin, letakkan corong mulut ke mulut dan pastikan tidak ada celah, biasanya membutuhkan waktu 15-20 menit

16.	Masker nebulizer dewasa		Untuk melegakan saluran napas yang menyempit pada orang dewasa. Alat ini terdiri dari mesin kompresor udara, wadah kecil untuk obat cair, dan selang elastis yang menghubungkan kompresor udara ke wadah obat	Masukkan obat ke cangkir nebylizer sesuai aturan dokter, sambungkan corong ke cangkir nebulizer pasang selang penyambung antara mesin kompresor dan cangkir nebulizer, nyalakan mesin, letakkan corong mulut ke mulut dan pastikan tidak ada celah, biasanya membutuhkan waktu 15-20 menit
17.	Metal cathether		Alat ntuk mengeluarkan urine yang terbuat dari besi stainless steel. Metal kateter biasa digunakan di bidan Obsgyn, untuk mengosongkan kandung kemih baik saat distensi, ketidaksabaran, mengukur residu urine	Alat ini biasanya untuk mengeluarkan kencing, dengan memasukkan metal cateter kedalam kelamin lalu tarik ujung bulat metal cateter ke dalam kelamin lalu tarik ujung bulat metal cateter agar bisa mengeluarkan kencing,
18.	Mucus extractor		Alat penghisap lendir pada hidung bayib yang baru lahir supaya lendir pada hidung tidak mengganggu pernafasan bayi	Masukkan selang yang tidak ada tonjolan kedalam hidung/mulut, kemudian ditarik sambil dihisap
19.	Nasal gastric tube		Untuk menyuplai makanan dan minuman pada pasien yang tidak memungkinkan menelan, akibat kondisi medis tertentu	Langkah pertama yang dilakukan dokter, perawat atau petugas kesehatan saat memasukkan nasogatric tube adalah memintamu untuk berbaring di tempat tidur dengan kepala diangkat atau duduk di kursi. Mereka mungkin akan meminta pasien untuk menekuk kepala, leher,

				dan tubuh pada berbagai sudut saat mereka memasang tabung melalui lubang hidung, ke kerongkongan dan ke dalam perut
20.	Nebulizer set		Alat yang mengubha obat cair menjadi uap untuk dihirup ke dalam paru-paru. Fungsi nebulizer yakni untuk melegakan saluran nafas yang menyempit	Masukkan obat ke cangkir nebylizer sesuai aturan dokter, sambungkan corong ke cangkir nebulizer pasang selang penyambung antara mesin kompresor dan cangkir nebulizer, nyalakan mesin, letakkan corong mulut ke mulut dan pastikan tidak ada celah, biasanya membutuhkan waktu 15-20 menit
21.	Needle		Untuk memindahkan sejumlah cairan sebagai alat untuk menembus kulit agar obat dalam sediaan cair dapat dimasukkan ke dalam pembuluh darah atau jaringan kulit tersebut	Buka bungkus jarum suntik masukkan ke dalam spuit, dan siap digunakan
22.	Nelaton cathether		Untuk katerisasi melalui urethra ke bladder, penggunaan jangka waktu singkat	Selang kateter diberi pelumas untuk memudahkan ketika dimasukkan ke dalam sel uretra, dimasukkan sehingga mencapai kandung kemih, setelah itu pasien sudah bisa kencing menggunakan selang kateter

23.	Oxygen nasal canula		Untuk mendukung kebutuhan oksigen pada pasien yang dapat bernafas spontan tapi membutuhkan dukungan oksigen tambahan misalnya pada hipoksia ringan sampi sedang	Posisikan pasien untuk duduk, hubungkan selang kanul ke sumber O2, nyalakan aliran oksigen sesuai dosis yang dibutuhkan pasien
24.	Rectal tube		Untuk membersihkan rectum dengan mengeluarkan gas gas dari usus	Pasang alas bokong, memasang plastik diujung rectal tube dan ikat dengan karet. Olesi dengan pelumas buka anus dengan tangan kiri, masukkan rectal tube perlahan, memfiksasi rectal tube dengan menghilang
25.	Spinal needle		Alat suntik spinal	Masukkan spinal needle ke dalam spuit lalu masukkan obat cairan, suntikkan kedalam tubuh
26.	Stomach tube		Mengumpulkan getah lambung, membilas atau mencuci isi perut, pemberian obat obatan.	Masukkan selang kedalam tubuh, dengan melapisi pelumas dulu, pasang selang dengan stomach tube digunakan untuk membilasi isi perut
27.	Suction cathether		Untuk mengeluarkan lendir atau cairan amniotic dari trachea bayi yang baru lahir dengan cara menyedot	Hidupkan mesin suction, sambungkan cateter dengan tube suction, masukkan suction cateter kedalam tubetrakea tutup lubang cateter dengan ibu jari, gulung cateter diantara ibu jari dan telunjuk agar bisa mengeluarkan lendir
28.	Suction connecting		Untuk tindakan pengeluaran cairan tubuh yang dihubungkan dari alat suction pump ataupun dari regulator outlet vacuum central	Sebagai konektor antara kedua tabung yang terdapat pada mesin suction

29.	Tranfusion set		Untuk membantu pemberian transfusi darah untuk memenuhi volume sirkulasi darah, memperbaiki kadar hemoglobin dan protein serum	Pasang selang ke tangna pasien sebelumnya diusap dengan alkohol swab, cari intervena pasien lalu pasang transfusion set
30.	Tuberculin syringe		Untuk menyuntikan tuberculine guna mengetahui pernah atau tidaknya seseorang terinfeksi penyakit TBC	1. Masukkan cairan napza ke alat suntik, pastikan gelembung udara di alat suntik tidak ada Suntikkan dengan tegakan lurus dan dorong pelan stik di tabung ke dalam
31.	Urine bag		Alat berupa kantong yang dihubungkan dengan catheter untuk menampung air kencing pasien yang sedang berbaring. Selain keperluan drainase (secara umum), juga untuk memeriksa (mengukur volume urin)	2. Mencuci tangan dan memakai sarung tangan, menanggalkan Pakaian bagian bawah pasien memasang selimut mandi perlak dan pengalas bokong 3. Memegang alat kelamin dengan tangan kiri 4. Menarik preputium sedikit kepangkalnya, kemudian membersihkanya dengan kapas 5. Kateter yang telah terpasang pada urine bag ujungnya diberi vaselin 20 cm 6. Masukkan kateter perlahan – lahan kedalam utera 20 cm, jika kateter tertahan jangan dipaksakan. Pasien dianjurkan menarik nafas panjang dan

				masukkan kateter sampai urine keluar, kemudian menampung urine. 7. Bila urine sudah keluar semua anjurkan untuk menarik nafas panjang. Kateter dicabut pelan-pelan dimasukkan kedalam botol berisi larutan klorin.
32.	Wing needle		Sebagai perpanjangan vena untuk transfuse IV (intravena) jangka lama atau yang terputus-putus (tidak boleh digunakan 48 jam)	Tentukan vena pasien, masukkan cairan dalam spuit, pasang wing needle, tusuk bagian yang akan diambil darahnya.

(4) ALAT-ALAT BEDAH

No	**Alat-alat bedah**	**Gambar**	**Kegunaan**	**Cara menggunakan**
1.	Arterie klem/artery forceps		Alat untuk menjepit (memegang/menekan) sesuatu benda. Niasanya klem ini digunakan untuk memasang karet behel oleh dokter gigi atau ahli gigi	Pegang arteri klem dengan jari lalu capit benda yang akan dipakai
2.	Bandage scissors		Untuk menggunting perban, kain kasa	Siapkan perban dan bandage scissors lalu gunting perban dengan bandage scissors sesuai kebutuhan
3.	Benang jahit catgut chromic		Untuk menjahit luka, tidak perlu dicabut	Masukkan benang jahit ke jarum bedah, bius pasien dulu sebelum melakukan operasi

			karena diserap oleh tubuh	
4.	Benang jahit catgut plain		Untuk menjahit luka. Tidak perlu dicabut karena diserap oleh tubuh	Masukkan benang jahit ke jarum bedah, bius pasien dulu sebelum melakukan operasi
5.	Benang jahit silk		Untuk menjahit luka, suture silk harus dicabut	Masukkan benang jahit ke jarum bedah bius pasien dulu sebelum melakukan operasi
6.	Bisturi		Mata pisau operasi	Pegang bisturi dengan menggenggam bagian bawah, pastikan pisau bisturi sudah disterilisasi, lalu arahkan ke tempat yang akan disayat
7.	Forceps/pinset anatomis		Untuk menjepit benda-benda kecil (termasuk keperluan praktek)	Tekan pada bagian tenbgah (bagian yang garis-garis) dengan menggunakan jari
8.	Forceps/pinset cilia		Untuk mencapit dan mencabut rambut alis	Tarik batang rambut secara perlahan dengan pinset

			mata atau janggut pasien	
9.	Forceps/pinset sirugis		Untuk menjepit jaringan pada waktu diseksi dan penjahitan luka dan memberi tanda pada kulit sebeum memulai insisi	Genggam pinset dengan ibu jari dan dua tiga jari lain dalam satu tangan, lalu gunakan untuk menggenggam objek jaringan kecil dengan cepat dan mudah
10.	Forceps/pinset splinter		Untuk mencabut pecahan dan kepingan benda-benda halus yang menancap pada kulit,seperti kesububan bambu	Jika ada pasien yang mengalami kecelakaan seperti terkena pecahan kecil, bisa diambil dengan alat ini (forceps)
11.	Gunting bedah mayo		1. Digunakan dalam pemotongan fasia gerota, uterus, payudara, dan jaringan lainnya 2. Digunakan untuk prosedur hewan dan podriatik 3. Untuk jaringan tubuh di dekat permukaan luka	Selama pembedahan bila ada jaringan atau balutan yang tidak sesuai maka bisa dipotong dengan gunting bedah mayo
12.	Gunting bedah metzenbaum		Gunting yang digunakan dalam instrumen bedah (khitan, bersihkan luka	Pegang gunting dengan tangan kanan lalu gunting perban atau bagian tubuh akan dilakukan pembedahan

			dll) / obgyn yang digunakan untuk menggunting benang, menggunitng jaringan dan menggunting balutan	
13.	Gunting bedah runcing		Untuk memotong organ, membedah jaringan, mengangkat jaringan, memotong perban, melepaskan gips, dan memotong jahitan	Memegang gunting dengan ibu jari dan jari telunjuk untuk memotong organ tubuh
14.	Gunting tali pusar		Alat untuk memotong pusar bayi baru lahir	Genggam alat dengan tangan kanan lalu potong tali pusar pada bayi yang baru lahir
15.	Hecting set		Untuk menjahit atau merawat luka	Membantu saat benang jahit keluar dan masuk ke dalam kulit

16.	Jarum jahit		Untuk menjahit kulit yang terluka	Jahit luka dengan jarum jahit yang sesuai yang akan digunakan
17.	Klem mosquito		Meng-klem/ menjepit jaringan tubuh maupun pembuluh darah untuk menghentikan pendarahan dalam ooperasi serta fungsi-fungsi lainnya	Jepit jaringan dengan memegang klem dengan tangan kanan (dominan)
18.	Klem tali pusat/umbilical cord clem		Untuk menjepit dan memotong tali pusar bayi yang baru lahir	Jepit tali pusar dengan klemtasi pusar pada bayi yang baru lahir
19.	Needle hoolders		Untuk memegang jarum jahit untuk menjahit luksa bekas sayatan, atau luka robek trauma pada kulit, otot, organ, serta jaringan tubuh lainnya	Memotong benang dengan alat ini selama pembedahan
20.	Peritoneum forceps		Untuk menjepit selaput perut	Genggam peritoneum dengan tangan kanan, jepit jaringan dengan peritoneum
21.	Skalpel		Gagancordg pisau operasi	Tentukan lokasi tubuh bagian yang akan dilakukan pembedahan dengan skalpel

(5) Disinfektan

No	Disinfektan	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Alkohol 70%		Sebagai antiseptik (membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme), untuk membersihkan luka dan pembersih alat-alat medis	Dituang pada kasa steril atau kapas, lalu diusapkan pada luka atau alat medis
2.	Alkohol swab		Berupa kapas atau tisu alkohol antiseptik yang digunakan untuk membersihkan luka dan pembersih alat-alat medis	Usapkan pada bagian tubuh sebelum dilakukan injeksi/ pengambilan darah, luka bekas injeksi/pengambilan darah, dan juga alat kesehatan
3.	H2O2 3%		Digunakan sebagai larutan pembersih telinga dan memiliki kemampuan antiseptik yang berguna untuk mencegah infeksi kulit serta membasmi kuman dalam mulut	Bersihkan luka dengan alkohol lalu obati luka dengan hidrogen peroksida dengan kapas

4.	Povidone iodine		Antiseptik yang mampu merusak sel kuman agar mati. Hal ini dapat mencegah terjadinya infeksi pada luka, agar tidak menimblukan gangguan berbahay. Obat ini juga kerap digunakan sebagai cairan pembersih sebelum tindakan medis dilakukan	Bersihkan daerah yang luka, oleskan sedikit karutan povidon iodine ke luka lalu tutup luka dengan perban steril
5.	Rivanol		Cairan disinfektan yang digunakan untuk membersihkan luka	Bubuhkan rivanol pada kapas, kemudian usapkan pada luka, bisa untuk membasuh luka

(6) APD

No	APD	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan

1.	Apron		Untuk melindungi pengguna atau tenaga kesehatan terhadap penyebaran infeksi atau penyakit	Sebelum memasuki laboratoriun tempat yang berbahan kimia, pakai apron terlebih dahulu untuk melindungi diri
2.	Masker		Alat penutup hidung dan mulut untuk mencegah atau mengurangi hirupan udara/gas/zat berbahaya	Pasang masker diwajah sebelum melakukan operasi atau hal lain yang membutuhkan masker
3.	Masker N95 disposible		Untuk melindungi pengguna atau tenaga kesehatan dengan menyaring/menahan cairan darah, aerosol (partikel padat di udara) bakteri/ virus	Pasang masker sesudah memakai masker bedah
4.	Non woven/surgical cap		Sebagai penutup kepala atau rambut pada saat melakukan operasi untuk mencegah jatuhnya rambut pada tempat-tempat yang harusnya steril dari benda apapun	Siapkan surgical cap, pasang di kepala sebelum melakukan tindakan
5.	Sarung tangan		Alat yang disarungkan pada tangan dengan objek yang disentuh	Siapkan gloves, pasang di kedua tangan
6.	Shoe cover		Melindungi sepatu	Pastikan telah memakai sepatu/sandal yang

			pengguna/tenaga kesehatan dari percikan cairan/darah	bersih, pakaikan shoe cover dengan benar
7.	Kaca mata google		Melindungi mata dan area di sekitar mata pengguna/tenaga medis dari percikan cairan atau darah atau droplet	Sebelum melakukan tindakan operasi pasang kacamata google di mata dengan posisi nyaman

(7) ALKES UNTUK DIAGNOSA

No	**Alkes untuk diagnosa**	**Gambar**	**Kegunaan**	**Cara menggunakan**
1.	Anaroid spygmomanometer		Untuk mengetahui tekanan darah, mengetahui angka systole dan diastole jantung	Siapkan spygmamnometer, pasang manset, tempatkan stetoskop, pompa manset periksa tekanan darah sistolik dan diastolik, baca hasil tekanan darah
2.	Electrical sphygmomanometer		Untuk mengetahui detak jantung dan tekanan darah manusia	Gunakan manset pada lengan atas pastikan ujung selang berada di tengah lengan, kencangkan manset saat pengukuran duduk tegak dan kaki tapak lantai
3.	Mercurial sphygmomanometer		Untuk mengukur tekanan	Lengan pasien diminta untuk lurus lalu pasang

			darah, beberapa angka systole (jantung menguncup) dan diastole (jantung mengembang kembali)	masnet dilengan pompa sampai selesai
4.	Chart vision Snellen		Alat bertuliskan huruf-hiuruf dengan ukuran besar tertentu misalnya huruf E harus jelas terlihat pada jarak 200 feet	Pasien diminta duduk/berdiri dengan jarak 6 meter dari kartu snellen, tutup salah satu mata pasien, pasien akan membaca dari baris paling atas ke bawah dan dokter akan memeriksa
5.	Ear speculum		Untuk memperlebar lubang telinga, sehingga dapat melihat dan memeriksa keadaan rongga didalamnya	Spekulum di fiksasi dengan ibu jari dan jari telunjuk, daun telinga dijepit dengan menggunakan jari tengah dan jari manis tangan kiri, sebaliknya dilakukan apambila ingin memeriksa telinga kiri
6.	Ear thermometer		Termometer digital yang berfungsi mengukur suhu tubuh melalui telinga pada pasien dewasa, anak-anak dan neonatus	Tekan tombol ON masukkan perlahan termometer kedalam telinga belakang, ukur suhu tubuh hingga terdengar bunyi yang sebagai penanda pengukuran sudah selesai, lihat hasil di layar termometer dan tekan tombol OFF untuk mematikan
7.	Gelang pasien		Untuk membantu mengidentifikasi pasien	Gunakan gelang pasien dibagian pergelangan tangan lalu kaitkan dengnan kancing gelang agar tidak mudah lepas Pink : perempuan Biru : laki-laki Putih : transgender

8.	Head lamp		Untuk memeriksa rongga telinga, hidung, tenggorokan dan mata (sama dengan head mirror dan head band) tetapi melalui sinar langsung	Memasang di kepala sebelum memulai tindakan
9.	Hemometer		Untuk menentukan kadar hemoglobin darah	Mengisi tabung dengan HCI 0,01N sampai garis batas, mengambil darah dnegan sanli sebanyak 0.02ml, memasukkan darah ke tabng suhu dan aduk, mengencerkjan dengan aquades sedikit dmei sedikit hingga didapatkan warna yang sama dengan warna standar haeomometer
10.	Ishihara's test for coulour blindnesss		Buku tes untuk mengetahui apakah seseorang mengalami buta warna	Pasien disuruh membaca huruf/angka yang ada di buku, ada pula pola untuk pasien ikuti dengan perbedaan warna yang ada
11.	Laringeal mirror		Untuk melihat dan memeriksa keadaan dalam mulut dan kerongkongan apakah ada kelainan	Cermin dimasukkan ke belakang rongga mulut dengan permukaan cermin menghadap keatas
12.	Nasal speculum		Untuk memperlebar lubang hidung, sehingga dapat melihat dan memeriksa keadaan rongga didalamnya	,masukan alat ke rongga hidung dengan posisi vertikalmasukkan speculum 1 cm kedalam vesti bulum
13.	Pen needle		Jarum suntik untuk	Siapkan insulin pen dan pen needle pasang pen

			penggunaan pena insulin yang digunakan untuk mengendalikan kadar gula dalam darah pada penderita diabtes tipe 1 dan 2	needle dibawah lalu insulin pen siap dipakai
14.	Percussion hammer		Untuk mengetuk rongga dada depan dan belakang (punggung) untuk mengetahui keadaan organ di dalamnya	Pegang pada gagang pegangan oleh dokter, kemudian ayunkan alat ke arah bagian tubuh yang sakit/berkelainan
15.	Pulse meter		Untuk mengukur tingkat saturasi atau kadar oksigen dalam darah	Cuci tangan, nyalakan mesin kemudian jari tangan dimasukkan ke oxymeter, tunggu hingga mengeluarkan hasil pada layar, lepaskan klip, bersihkan oxymeter dengan alkohol
16.	Rectum speculum		Untuk memperlebar lubang rectum, sehingga memudahkan pemeriksaan	Cuci tangan, masukkan bagian anoskop ke dalam anus, sisipan itu melebarkan anus hingga dimeter tabung
17.	Reflex hamer		Untuk memeriksa kemampuan refleksi syaraf dengan cara mengetuk bagian tubuh tertentu, misalnya lutut	Dipegang pada bagian gagang pegangan oleh dokter yang bersangkutan kemudian palu tersebut akan diayunkan mengarah ke bagian dari tendon yang disinyalir memiliki kelainan

18.	Spirometer		Untuk mengukur fungsi paru-paru manusia. Alat ini akan mengukur volume statik dan volume dinamik paru-paru	1. Duduklah dengan posisi paling nyaman 2. Kemudian, dokter akan menutup hidung anda menggunakan alat semacam klip tepat diatas hidung 3. Tarik napas dalam-dalam dan tahanlah selama beberapa detik 4. Embusan kedalam mouthpiece pada spirometer sekuat dan secepat yang anda bisa
19.	Stethoscope binaural		Untuk mendengar bunyi organ bayi dalam perut ibu hamil	1. Pastikan alat pendengar menghadap ke depan. Jika anda memakainya menghadap ke belakang. Anda tidak akan bisa mendengar bunyi apa pun 2. Pastikan alat pendengar memiliki bantalan yang ukurannya pas dan dapat mengunci dengan baik di telinga anda untuk menghindari suara0usara dari lingkungan sekitar. Jika ukurannya tidak pas, biasanya bantalan tersbut dapat dilepas 3. Pada beberapa jenis stetoskop anda juga dapat memiringkan atau menekuk gagang alat pendengar ke depan untuk membuatnya pas di telinga
20.	Stethoscope monoaural		Untuk mendengar bunyi jantung bayi dalam perut ibu hamil	Tempelkan bulat besar diperut ibu lalu gunakan untuk mendengar detak jantung bayi dengan bulatan kecil
21.	Stopwatch		Untuk mengukur	Stopwatch sesuai yang diinginkan, lalu letakan

			lamanya waktu yang telah berlalu atau yang di	stopwatch ditempat aman
22.	Termometer digital		Alat yang secara otomatis menunjukkan suhu badan	1. Nyalakan termometer dengan menekan atau menggeser tombol OIN 2. Masukan termometer secara perlahan dan hati-hati ke dalam mulut, lipatan ketiak atau liang telinga anak 3. Biarkan selama 3-5 menit atau tunggu sampai ada bunyi yang menunjukkan pengukuran suhu sudah selesai dilakukan
23.	Termometer oral		Untuk mengukur suhu tubuh/ badan melalui mulut	Meletakkan ujung termometer di bagian bawah lidah dan tutup mulut hingga alat mengeluarkan bunyi tertentu
24.	Termometer rektal		Alat pengukur suhu tubuh digital, yang digunakan dengan memasukkannya ke dalam anus	Bersihakn termometer terlebih dahuliu dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Lalu, lapisi dengan pelumas berbahan dasar air dan masukkan ujung termometer kedalam anus
25.	Timer lab		Sebagai penanda waktu apakah sebuah reaksi telah berjalan sempurna	Pastikan searah jarum jam hingga ke angka 55 kemudian diputar balik ke arah waktu sesuai yang diinginkan

26.	Tongue depressor		Untuk menekan lidah, melihat keadaan tenggorokan apakah ada peradangan seperti pharyngitis, amandel	Pasien disuruh membuka mulut, lalu tekan lidah dengan tongue deperessor
27.	Tourniquet		Untuk mengontrol aliran darah pada vena atau arteri dengan cara menekan dan melepas dalam rentang waktu tertentu	Torniquet dipasang pada 3-4 inci diatas tempat tusukan. Jika terlalu dekat dari tempat tusukan, vena dapat kolaps ketika darah terisap ke dalam tabung dan jika terlalu jauh dari tempat tusukan pengambilan darah tidak efektif
28.	Vaginal speculum		Untuk memperlebar vagina, sehingga memudahkan pemeriksaan dan pemasangan alat-alat KB	Sterilisasi spekulum vagina atau cocor bebek 1. Rendam spekulum di dalam tarutan clorin 0.5% selama 10 menit. Larutan klorin juga disebut dengan kaporit (Kalsium Hipoklorit yang digunakan sebagai agen pemutih atau desinfektan. Senyawa ini adalah komponen yang digunakan dalam pemutih komersial, larutan pembersih, dan disinfektan untuk air minum, sistem pemumian air kolam renang) 2. Setelah Grendam kemudian dibersihkan dengan menggunakan air bersih mengalir 3. Keringkanlah spekulum menggunakni kain bersih 4. Setelah kering masukkan spekulum pada air

TUGAS KHUSUS PKL D3 FARMASI UMG_SASTI AMILIA PUTRI__221105023 _RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH GRESIK

				mendidih dan biarkan sampai 20 menit Cara penggunaan spekulum vagina atau cocor bebek 1. Pegang spekulum vagina pada bagian gagangnya, lalu kunci baut spekulum dibuka Masukkan dalam vagina, dimana spekulum masih dalam keadaan tertutup dan dalam posisi miring 2. Setelah masuk putar spekulum, kemudian buka spekulum (bagian cocor bebek) 3. Kunni baut spekulum (kunci dengan paten jangan sampai longgar), Selanjutnya pemeriksaan siap dilakukan

Gresik, 13 Juni 2025
Dosen Pembimbing PKL,

Apt. Siti Nur Asiyah, M. Farm. Klin.
NIDN. 0711088504

Gresik, 13 Juni 2025
Pembimbing Lapangan Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik

Apt. Alfiyah Hanum, S.Si
SIPA. 19720607/SIPA_35.25/2022/2527

SWAMEDIKASI

Buatlah studi kasus setiap harinya dengan katagori obat yang berbeda dan wajib menelesaikan 20 jenis Obat yang tertera dalam tabel

No	Nama obat	Kategori	Studi Kasus	Patient assesment	Pemilihan Obat dan alasannya	Pelayanan informasi obat
1.	Analgetik dan antipiretik	paracetamol; ibuprofen	Seorang wanita berusia 28 tahun datang ke apotek dengan keluhan demam dan sakit kepala sejak tadi malam. Suhu tubuhnya sekitar 38,5°C, dan ia merasa lemas. Pasien tidak memiliki riwayat alergi obat dan belum mengonsumsi obat apa pun untuk meredakan gejalanya. Selain demam dan sakit kepala, pasien tidak	W : Wanita, 28 tahun W : Demam dan sakit kepala H : Sejak tadi malam A : Belum mengonsumsi obat M : Tidak ada riwayat alergi obat dan tidak	Obat yang terpilih adalah Paracetamol 500 mg. Alasannya : 1. Memiliki efek antipiretik yang efektif untuk menurunkan demam. 2. Memiliki efek analgetik yang dapat meredakan sakit kepala.	Indikasi : Meredakan nyeri ringan hingga sedang seperti sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot, serta menurunkan demam. Cara penggunaan: Dewasa 1-2 kaplet, 2-4 kali per hari. Penggunaan maximum 8 kaplet per hari.

			mengalami gejala lain seperti batuk, pilek, atau nyeri tenggorokan. Ia juga tidak memiliki riwayat penyakit kronis seperti maag, hipertensi, atau gangguan ginjal.	sedang mengonsumsi obat lain	3. Aman digunakan oleh sebagian besar orang, termasuk pasien yang tidak memiliki riwayat alergi atau penyakit penyerta. 4. Tidak menyebabkan iritasi lambung sehingga dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan.	Kapan berhenti: Jika demam sudah turun 3 hari, dan jika nyeri sudah mereda dalam 5 hari untuk nyeri ringan atau 10 hari untuk nyeri lebih berat. Kapan harus ke dokter : Jika demam tidak membaik dalam 3 hari penggunaan, jika nyeri semakin parah atau tidak membaik setelah 5- 10 hari, mucul gejala alergi seperti ruam, gatal,

						atau pembengkakan dan terjadi efek samping obat seperti mual muntah, gangguan hati. ESO yang sering : Ruam kulit yang terasa gatal, sakit tenggorokan, mual muntah diare, tubuh terasa lemas dan penggunaan yang lama dan dosis besar dapat menyebabkan kerusakan hati.

						Cara menyimpan : Simpan di tempat yang kering kering pada suhu dibawah 30ºC, hindari paparan langsung terhadap sinar matahari, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
2.	Batuk	gliseril guaiakolat (guafenisin), bromheksin, diphenhidramin, asetilsistein, noskapin	Seorang pria berusia 35 tahun datang ke apotek dengan keluhan **batuk berdahak sejak 3 hari yang lalu.** Batuknya disertai **lendir kental** yang sulit dikeluarkan,	W : Pria, 35 tahun W : Batuk berdahak dengan lendir kental, tanpa demam atau sesak napas	Obat yang terpilih adalah asetilsistein 200 mg Alasannya : 1. Asetilsistein	Indikasi: Infeksi saluran nafas dengan mukus berlebihan termasuk bronkitis, emfisema&bronkiektasis, profilaksis&terapi

			tetapi tidak ada gejala lain seperti **demam, sesak napas, atau nyeri dada.** Pasien mengatakan bahwa ia merasa sedikit tidak nyaman di tenggorokan karena dahaknya sulit dikeluarkan. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit kronis seperti asma atau oenyakit paru obstruktif kronis (PPOK) dan tidak memiliki riwayat alergi terhadap pasien. Sebelumnya pasien belum mengomsumsi obat	H : Sejak 3 hari yang lalu A : Belum mengonsumsi obat apa pun M : Tidak ada riwayat alergi obat	bekerja dengan **memecah ikatan dalam lendir (mukus),** sehingga dahak yang kental menjadi lebih encer dan mudah dikeluarkan saat batuk. 2. efektif dalam mengencerkan dahak, asetilsistein dapat diberikan	kompilasi bronkopulmonal dengan mukostasis, bronkial catarrh. Juga sebagai anti radikal bebas dan anti oksidan. Cara penggunaan: Dewasa & anak >14 tahun 1 kapsul 2-3 x perhari. Kapan berhenti: Jika batuk berdahak sudah membaik dan dahak mudah

			dalam mengatasi batuknya.		tanpa perlu dikombinasikan dengan obat lain seperti guaifenesin atau bromheksin. 3. Asetilsistein aman untuk pasien tanpa riwayat alergi obat atau gangguan pernapasan serius seperti asma atau PPOK.	dikeluarkan, biasanya dalam **5-7 hari,** Jika batuk hilang lebih cepat. Kapan harus ke dokter : Jika batuk tidak membaik setelah **7 hari** penggunaan, dahak berubah menjadi **kehijauan, berdarah, atau berbau tidak sedap,** muncul **sesak napas atau nyeri dada, dan** terjadi efek samping yang mengganggu,

						seperti reaksi alergi parah atau muntah berlebihan. ESO yang sering : Mual, muntah, takikardi, demam, pusing. Cara menyimpan : Simpan di tempat kering dengan suhu **di bawah 30°C,** Hindari paparan langsung terhadap sinar matahari, dan Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

3.	Obat Flu	Sediaan kombinasi parasetamol, dekstrometorfan, gliseril guaiakolat (guafenisin), CTM, dan efedrin/pseudoefedrin/ fenilpropanolamin	Seorang pria berusia **30 tahun** datang ke apotek dengan keluhan **flu sejak 2 hari yang lalu.** Ia mengalami **demam ringan (sekitar 37,8°C), hidung tersumbat, bersin-bersin, dan batuk kering.** Pasien juga mengeluhkan **pegal-pegal dan sedikit lemas,** tetapi **tidak mengalami sesak napas, nyeri dada, atau riwayat alergi obat.** Pasien tetap bisa beraktivitas tetapi merasa tidak nyaman karena	W : Pria, 30 tahun W : Flu dengan gejala demam ringan, hidung tersumbat, bersin-bersin, batuk kering, dan pegal-pegal H : Sejak 2 hari yang lalu A : Belum mengonsumsi obat apa pun M : Tidak memiliki riwayat alergi obat	Obat yang terpilih adalah Sediaan kombinasi Paracetamol, CTM, dan Pseudoefedrin. Contoh obat : Procold Flu Alasannya : 1. **Paracetamol** Menurunkan **demam ringan** dan meredakan **pegal-pegal** yang	Indikasi : Meredakan **gejala flu** seperti **demam ringan, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan batuk kering,** dan Membantu **meringankan pegal-pegal dan rasa tidak nyaman akibat flu.** Cara penggunaan: 1. paracetamol 500 mg Dewasa 1-2 kaplet, 2-4 kali per hari. Penggunaan maximum 8 kaplet

			hidung tersumbat dan batuknya cukup menganggu saat tidur. Pasien belum mengomsumsi obat apapun dan ingin mendapatkan obat yang bisa meredakan gejalanya agar lebih nyaman saat istirahat.		dirasakan pasien. 2. **CTM (Chlorpheniramine Maleate)** Mengurangi **bersin-bersin** dan hidung meler yang disebabkan oleh reaksi alergi ringan terhadap virus flu. 3. **Pseudoefedrin** Membantu **melegakan**	per hari. 2. CTM Dewasa 1 tablet, 3-4 kali sehari 3. pseudoefedrin Dosis awal: 30–60 mg, tiap 4–6 jam. Dosis maksimal 240 mg per hari. Dosis penggunaan untuk tablet lepas lambat adalah 120 mg, tiap 12 jam sesuai kebutuhan. Kapan berhenti: Jika gejala flu **membaik dalam 5 hari,** batuk atau hidung tersumbat sudah hilang lebih

					hidung tersumbat dengan cara menyempitkan pembuluh darah di rongga hidung, sehingga pasien lebih mudah bernapas.	cepat, obat bisa dihentikan lebih awal. Kapan harus ke dokter : Jika batuk berlangsung lebih dari **2 minggu** atau muncul dahak berwarna hijau/kecoklatan, demam tidak turun dalam **3 hari** atau semakin tinggi, mengalami sesak napas, dada terasa berat, atau terjadi reaksi alergi seperti ruam merah dan gatal.

						ESO yang sering : Kantuk, mual muntah, ruam kulit ringan, jantung berdebar, insomia. Cara menyimpan : Simpan di tempat yang kering dan sejuk dibawah suhu 30ºC, jauhkan dari paparan sinar matahari langsung dan jauhakan dari jangkauan anak-anak.
4.	Obat Maag	Antasida, antagonis H2 (ranitidine, famotidine)	Seorang pria berusia **40 tahun** datang ke apotek dengan keluhan	W : Pria, 40 tahun	Obat yang terpilih adalah	Indikasi : mengurangi nyeri lambung yang

			nyeri ulu hati, perut terasa perih, dan mual yang dialaminya sejak **dua hari terakhir.** gejala ini muncul terutama setelah **terlambat makan atau mengonsumsi makanan pedas dan asam.** Selain itu, pasien juga merasa perutnya sering **kembung** dan kadang terasa panas seperti terbakar. pasien tidak memiliki **riwayat alergi obat,** tidak sedang mengonsumsi obat lain, dan belum mencoba obat apa pun	W : Nyeri ulu hati, perut terasa perih, mual, dan kembung H : Sejak 2 hari terakhir A : Belum mengonsumsi obat apa pun M : Tidak memiliki riwayat alergi obat atau konsumsi obat lain	antasida Alasannya : 1. **Antasida** bekerja dengan cara **menetralkan asam lambung** secara langsung, sehingga dapat **meringankan nyeri ulu hati dan perut perih dengan cepat.** 2. Efeknya **lebih cepat**	disebabkan oleh kelebihan asam lambung, gastritis, ulkus gastritis dan ulkus duodenal dengan gejala seperti mual dan perih. Cara penggunaan: Dewasa 1-2 tablet, 3-4 kali per hari Kapan berhenti: Jika gejala maag **sudah membaik dalam beberapa hari, dan** Tidak boleh digunakan lebih dari 2 minggu tanpa

			untuk meredakan keluhannya. Ia juga tidak mengalami **muntah darah, tinja berwarna hitam, atau penurunan berat badan drastis**, yang bisa menjadi tanda kondisi serius. Pasien ingin mendapatkan obat yang bisa **meringankan nyeri ulu hati dan perut perih dengan cepat** agar bisa kembali beraktivitas dengan nyaman.		**terasa dibandingkan antagonis H2** seperti ranitidine atau famotidine, sehingga cocok untuk pengobatan awal maag ringan. 3. Aman digunakan dalam jangka pendek untuk mengatasi **gejala maag akut yang dipicu oleh**	konsultasi ke dokter. Kapan harus ke dokter : Jika maag tidak membaik setelah **1 minggu pengobatan,** mengalami **muntah darah, tinja berwarna hitam, atau nyeri perut yang semakin parah,** dan sering kambuh meskipun sudah menjaga pola makan.

					pola makan yang tidak teratur.	ESO yang sering : Nyeri perut, konstipasi, diare, mual, muntah dan pada gangguan jangka panjang dapat terjadi hiperfosfatemia dan hipermagnesimia. Cara menyimpan : Simpan di tempat kering dan sejuk di bawah suhu 30ºC, jauhkan dari sinar matahari langsung dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.

5.	Kecacingan	Pirantel pamoat, piperazin, mebendazol	Seorang anak laki-laki **7 tahun** dibawa ibunya dengan keluhan **gatal di area anus, terutama saat malam hari**. Selain itu, anak sering **menggaruk pantatnya** dan mengalami **penurunan nafsu makan** selama beberapa minggu terakhir. Ibu juga memperhatikan bahwa anaknya tampak lebih **lesu dan kurang aktif** dari biasanya. ibu mengatakan bahwa anaknya sering	W : anak laki – laki, 7 tahun W : **Gatal di area anus, terutama saat malam hari,** sering menggaruk pantat, penurunan nafsu makan H : selama **beberapa minggu terakhir** A : **Belum mengonsumsi obat apa pun**	Obat yang terpilih adalah Pirantel pamoat Alasannya : 1. **Pirantel pamoat** efektif untuk mengatasi **cacing kremi, cacing gelang, dan cacing tambang.** **2.** Aman digunakan pada anak-anak dan	Indikasi : Mengatasi infeksi cacing kremi, cacing tambang, dan cacing gelang. Cara penggunaan: Anak: 10 mg/kg sebagai dosis tunggal. Kapan berhenti: **Cukup diminum satu kali dosis** dan dapat diulang **setelah 2 minggu** jika masih ada gejala atau risiko reinfeksi tinggi. Kapan harus ke

			bermain di tanah tanpa alas kaki dan jarang mencuci tangan sebelum makan. Anak ini **memiliki riwayat alergi terhadap mebendazol** (mengalami **gatal-gatal dan ruam merah** setelah konsumsi obat tersebut sebelumnya). Anaknya **belum mendapatkan obat cacing dalam 6 bulan terakhir.**	dalam 6 bulan terakhir M : **Memiliki riwayat alergi terhadap mebendazol,** tetapi **tidak sedang mengonsumsi obat lain**	cukup diminum dalam **satu kali dosis.** **3.** Tidak termasuk dalam kelompok obat yang sering menimbulkan reaksi alergi seperti mebendazol.	dokter : Jika masih mengalami gejala **setelah 2 minggu** meskipun sudah minum obat, muncul gejala **nyeri perut hebat, muntah, atau tinja berdarah dan** ada reaksi alergi obat seperti **ruam merah, sesak napas, atau pembengkakan wajah.** ESO yang sering : Mual, muntah, kram perut,

						mengantuk, insomia, diare, tenesmus, sakit kepala, dan pusing. Cara menyimpan : Simpan di tempat sejuk dan kering dibawah suhu 30°C, terhindar dari sinar matahari langsung dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
6.	Diare	Attalpugit, kaolin pectin, oralit, Norit	Seorang anak laki-laki **usia 5 tahun** dengan **berat badan**	W : **Anak laki-laki, usia 5 tahun, berat**	Obat yang terpilih adalah oralit	Indikasi : Mencegah dan mengobati

			18 kg dibawa ibunya karena mengalami **diare sejak 2 hari yang lalu**. Anak buang air besar lebih dari **4 kali sehari** dengan **tinja cair,** tetapi **tidak ada darah** dalam tinja. Ibu mengatakan bahwa anaknya tampak **lemas dan sedikit rewel,** tetapi masih mau minum. ibu menjelaskan bahwa anaknya sebelumnya makan jajanan di luar rumah. Tidak ada riwayat muntah atau demam tinggi. Anak ini **tidak**	**badan 18 kg** W : **Diare selama 2 hari,** buang air besar **lebih dari 4 kali sehari** dengan **tinja cair,** tetapi **tidak berdarah.** Anak tampak **lemas dan sedikit rewel,** tetapi **masih mau minum** H : sejak 2 hari yang lalu A : **Belum**	Alasannya : 1. **Oralit** efektif untuk **mengganti cairan dan elektrolit yang hilang akibat diare** 2. **Aman untuk anak-anak,** mudah digunakan, dan sangat penting dalam mencegah dehidrasi 3. **menjaga keseimbangan cairan**	dehidrasi akibat diare dan muntah Cara penggunaan: Anak 1-5 tahun 3 jam 3 gelas, selanjutnya 1 gelas tiap kali mencret Kapan berhenti: Jika anak sudah kembali aktif, tidak lemas, dan frekuensi BAB sudah kembali normal dan diare **berhenti dalam waktu 1–2 hari** tanpa tanda dehidrasi lebih lanjut

			memiliki riwayat alergi obat, dan belum mengonsumsi obat untuk mengatasi diarenya.	**diberikan obat apa pun** untuk mengatasi diare M : **Tidak memiliki riwayat alergi obat** dan **tidak sedang mengonsumsi obat lain**	**tubuh**	Kapan harus ke dokter : Jika diare berlangsung **lebih dari 3 hari** tanpa perbaikan, engalami **demam tinggi, muntah terus-menerus, atau BAB berdarah** dan anak tampak **sangat lemas, mata cekung, bibir kering, atau tidak mau minum sama sekali** (tanda dehidrasi berat). ESO yang sering :

						Perut kembung, nyeri perut, dan hipernatremia Cara menyimpan : Simpan ditempat kering dan sejuk, larutan oralit harus digunakan dalam 24 jam setelah dibuat, kemudian dibuang jika masih tersisa.
7.	Laksatif	Bisakodil, laktulosa, Na lauril sulfat.	Seorang **wanita, 45 tahun,** dengan **berat badan 65 kg,** datang dengan keluhan **sulit buang air besar sejak 5 hari terakhir.** Ia merasa **perutnya begah,**	W : **Wanita, 45 tahun, berat badan 65 kg** W : **Sulit buang air besar selama 5 hari,** perut	Obat yang terpilih adalah laktulosa Alasannya : 1. **Laktulosa adalah**	Indikasi : Konstipasi kronik, ensefalopati portal-sistemik Cara penggunaan: Konstipasi kronik Dosis awal untuk

			kembung, dan tidak nyaman, tetapi tidak mengalami **nyeri perut hebat atau perdarahan saat BAB.** Pasien biasanya bisa buang air besar **setiap 2–3 hari sekali,** tetapi belakangan ini ia semakin sulit untuk BAB meskipun sudah mencoba minum lebih banyak air. pasien memiliki **riwayat diabetes mellitus** dan sedang menjalani terapi dengan **metformin.** Ia juga mengatakan pernah mengalami **reaksi**	terasa **begah, kembung, dan tidak nyaman** H : **Sudah berlangsung selama 5 hari** A : **Belum mengonsumsi obat apa pun,** tetapi sudah mencoba minum lebih banyak air M : Ada alergi terhadap bisakodil dan Sedang mengonsumsi	**laksatif osmotik** yang bekerja dengan menarik air ke dalam usus, **melunakkan tinja,** dan mempermudah BAB. **2. Aman untuk penderita diabetes,** karena tidak memengaruhi kadar gula darah **3. Tidak mengandun**	3 hari pertama terapi: Dewasa 15-45 ml. Kapan berhenti: Jika **konstipasi sudah membaik dan BAB kembali normal dan** Jika terjadi **diare atau kram perut berlebihan,** maka dosis perlu dikurangi atau dihentikan. Kapan harus ke dokter : setelah **3 hari penggunaan tidak ada**

			alergi berupa **ruam dan gatal-gatal setelah mengonsumsi bisakodil,** sehingga tidak bisa menggunakan obat tersebut untuk mengatasi konstipasinya. pasien mengatakan bahwa pola makannya **kurang serat** karena sering makan makanan cepat saji dan jarang mengonsumsi sayur serta buah. Ia juga bekerja sebagai pegawai kantor dan sering duduk dalam	**metformin** untuk diabetes	**g bisakodil,** sehingga aman bagi pasien yang memiliki **riwayat alergi terhadap bisakodil**	**perbaikan,** mengalami **sakit perut hebat, muntah, atau BAB berdarah, dan** muncul tanda **ketidakseimbang an elektrolit,** seperti **lemas berlebihan, jantung berdebar, atau pusing terus-menerus**. ESO yang sering : Penggunaan jangka panjang: rasa tidak enak pada perut dan lambung, diare,

			waktu lama, sehingga aktivitas fisiknya terbatas.			kram lambung, rasa haus. Cara menyimpan : Simpan pada suhu ruangan, hindarkan dari sinar matahari langsung dan jahuhkan dari jangkauan anak-anak
8.	Biang keringat, pruritus, antihistamintopikal	Salisil talk dan sediaan yang mengandung kalamin; difenhidramin 2%, prometazin HCl 2%.	Seorang **anak laki-laki, 5 tahun,** dengan **berat badan 18 kg dengan keluhan bintik – bintik merah kecil di leher, punggung, dan dada** sejak **tiga hari terakhir.** Gatal	W : anak laki-laki, **5 tahun,** dengan **berat badan 18 kg** W : **Biang keringat** berupa **bintik merah kecil** yang	Obat yang terpilih adalah salisil talk Alasannya : 1. Menyerap kelembapan berlebih	Indikasi : Mengatasi gangguan gatal pada kulit karena biang keringat atau gangguan lainnya yang bukan infeksi Cara penggunaan:

			terutama muncul saat anak **berkeringat setelah bermain di luar rumah.** Ibunya menjelaskan bahwa anaknya **sangat aktif bermain di luar,** terutama saat cuaca panas, dan sering berkeringat berlebihan. Anak tampak sering menggaruk area yang terkena biang keringat tetapi **tidak ada tanda infeksi** seperti nanah atau luka terbuka dan **tidak memiliki riwayat alergi obat maupun penyakit kulit sebelumnya.** Ibunya ingin mencari	muncul di **leher, punggung, dan dada** dan gatal saat berkeringat H : tiga hari terakhir A : Belum diberikan **obat atau perawatan khusus** sebelumnya. M : tidak memiliki alergi obat atau alergi penyakit kulit	2. Mencegah iritasi 3. **Aman digunakan untuk anak-anak,** tanpa risiko efek samping serius	Taburkan **tipis-tipis pada area kulit yang terkena biang keringat** setelah mandi atau saat berkeringat kemudian Hindari **menaburkan terlalu banyak** agar tidak menyebabkan kulit terlalu kering. Gunakan **2–3 kali sehari atau sesuai kebutuhan** Kapan berhenti: Jika **biang keringat sudah membaik** dalam

			obat yang **aman dan nyaman digunakan sehari-hari untuk mengatasi keluhan ini.**			3–5 hari, apabila muncul **iritasi, kemerahan bertambah, atau kulit semakin kering,** segera hentikan Kapan harus ke dokter : Jika **ruam tidak membaik setelah 5 hari** atau semakin parah, muncul tanda **infeksi seperti nanah, bengkak, atau demam** ESO yang sering : Iritasi, kulit kering, ruam

						kemerahan pada kulit, nyeri, sensai terbakar pada kulit, kulit mengelupas dan rasa gatal yang makin bertambah Cara menyimpan : Simpan di tempat sejuk dan kering jauhkan dari sinar matahari langsung dan tutup rapat pada kemasan setelah digunakan untuk mencegah kontaminasi
9.	Jerawat	Obat yang mengandung sulfur; resorsinol; asam	Seorang remaja laki-laki, 16 tahun, dengan berat badan 55 kg, datang	W : Remaja laki-laki, 16 tahun, berat	Obat yang terpilih benzoil	Indikasi : Mengurangi peradangan,

		salisilat; benzoil peroksida; triclosan, minosiklin1%.	dengan keluhan jerawat meradang di wajah, terutama di dahi dan pipi sejak 2 minggu terakhir. Jerawat tampak merah, ada beberapa yang berisi nanah, dan terasa nyeri saat disentuh. Pasien menjelaskan bahwa ia memiliki kulit berminyak dan sering beraktivitas di luar ruangan, yang membuat wajahnya sering terpapar debu dan kotoran. Ia sudah mencoba mencuci wajah dengan sabun muka, tetapi jerawat masih muncul dan semakin banyak. Setelah ditanya lebih lanjut, pasien	badan 55 kg W : Jerawat meradang, bebrapa jerawat berisi nanah, terasa nyeri, dan kulit berminyak H : 2 minggu terakhir A : belum menggunakan obat sebelumnya hanya mencuci wajah dengan sabun muka M : tidak	peroksida. Contoh obat : Benzolac Alasannya : 1. membantu membunuh bakteri penyebab jerawat 2. mengurangi produksi minyak berlebih di kulit 3. mencegah penyumbatan pori-pori yang	membunuh bakteri penyebab jerawat, serta membuka pori-pori kulit agar kotoran, minyak, dan sel kulit mati yang menyumbat pori mudah dibersihkan Cara penggunaan: 1. Gunakan benzoil peroksida 2,5%–5% sebagai gel atau krim oles. 2. Oleskan tipis-tipis di area yang berjerawat sekali sehari sebelum tidur. 3. Jika kulit terbiasa, dosis dapat

			memiliki riwayat alergi terhadap minosiklin, tetapi tidak memiliki riwayat penyakit kulit lain seperti eksim atau psoriasis.	memiliki riwayat penyakit kulit lain dan memiliki riwayat alergi terhadap minosiklin	menyebabkan jerawat baru 4. tidak mengandung minosiklin	ditingkatkan menjadi 2 kali sehari (pagi dan malam). 4. Hindari menggunakan di area mata, hidung, atau bibir karena dapat menyebabkan iritasi Kapan berhenti: Gunakan secara rutin selama **4–6 minggu** untuk melihat hasilnya, Jika jerawat membaik, penggunaan bisa dikurangi menjadi **hanya saat ada jerawat muncul**

						Kapan harus ke dokter : Jika dalam **6 minggu tidak ada perbaikan atau justru semakin parah,** muncul **reaksi alergi seperti kemerahan parah, gatal berlebihan, atau bengkak di wajah, dan** ada **jerawat batu yang besar, nyeri, dan sulit hilang** ESO yang sering : Kulit mudah merah ketika

						terpapar sinar matahari, kulit kering, kemerahan, mengelupas dan rasa perih atau panas di kulit Cara menyimpan : Simpan di tempat sejuk dan kering di bawah suhu 30°C jauhkan dari sinar matahari langsung, jauhkan dari jangkauan anak – anak
10.	Kadas/kurap, antifungi	Obat yang mengandung klotrimazol 1%, mikonasol nitrat 2%, ketoconazole nitrat	Seorang **pria, 25 tahun,** dengan **berat badan 70 kg datang dengan keluhan kulit bersisik dan gatal** di bagian	W : Pria, 25 tahun, berat badan 70 kg W : Kulit **bersisik, gatal,**	Obat yang terpilih adalah klotrimazol 1%	Indikasi : mengatasi penyakit infeksi jamur, seperti tinea pedis, kurap, candida vaginalis,

			lengan dan paha sejak **1 minggu terakhir.** Keluhan ini semakin parah saat berkeringat dan terasa perih jika digaruk. Pasien **sering menggunakan pakaian ketat** saat berolahraga dan kurang menjaga kebersihan handuk.	**dan kemerahan** di **lengan dan paha dan** Gatal semakin parah saat berkeringat dan terasa perih jika digaruk H : 1 minggu terakhir A : belum menggunakan obat apapun M : tidak memiliki riwayat obat atau tidak memiliki	Alasannya : 1. **Klotrimazol 1%** efektif untuk mengatasi **infeksi jamur kulit seperti kurap (tinea corporis).** **2. Menghentikan pertumbuhan jamur** dengan cara mengganggu struktur membran sel jamur	panu, dan otitis eksterna Cara penggunaan: 1. Oleskan tipis-tipis pada area yang terkena jamur 2 kali sehari (pagi dan malam). 2. Gunakan secara rutin selama 2–4 minggu, meskipun gejala sudah membaik. 3. Cuci tangan sebelum dan sesudah pemakaian agar infeksi tidak menyebar ke area lain Kapan berhenti: Setelah **gejala**

				riwayat penyakit		**hilang sepenuhnya,** tetapi tetap lanjutkan pemakaian selama **1 minggu** untuk mencegah kekambuhan Kapan harus ke dokter : Jika dalam **2 minggu tidak ada perbaikan atau semakin parah,** muncul **reaksi alergi seperti kemerahan berlebihan, bengkak, atau rasa panas yang**

						tidak normal ESO yang sering : Iritasi atau gatal pada kulit, rasa sensasi terbakar atau perih, kulit berubah menjadi kemerahan dan terasa sakit saat disentuh, mengelupasnya kulit, meningkatnya SGOT Cara menyimpan : Simpan Clotrimazole pada suhu ruang, di tempat yang kering dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung.

						Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak
11.	Ketombe	*Shampoo* yang mengandung Selenium sulfid, Zincpyrithione.	Seorang pria, **27 tahun, dengan berat badan 75 kg,** datang keluhan kulit kepala gatal dan muncul serpihan putih seperti ketombe sejak 2 minggu terakhir. Ia merasa kulit kepalanya semakin gatal terutama saat berkeringat. Pasien mengatakan bahwa ia sering menggunakan gel rambut dan jarang mencuci rambut setiap hari. Ia juga mencoba mengganti sampo beberapa kali, tetapi ketombe masih tetap muncul. Tidak ada	W : pria 27 tahun, berat badan 75 kg W : Ketombe dan gatal di kulit kepala H : 2 minggu terakhir A : belum menggunakan sampo khusus antiketombe, hanya menganti sampo biasa tetapi tidak	Obat yang terpilih adalah Selenium sulfid Alasannya : 1. Selenium sulfida efektif mengurangi ketombe dengan cara **menghambat pertumbuhan jamur Malassezia**	Indikasi : Mengobati ketombe tingkat sedang cenderung berat dan sekaligus menghilangkan gatal – gatal karena ketombe Cara penggunaan: 1. Tuangkan selsun secukupnya 2. aplikasikan pada rambut dan kulit kepala secara merata 3. dibiarkan selama 2-3 menit

			keluhan rambut rontok berlebihan atau luka di kulit kepala.	efektif M : tidak ada keluhan rambut rontok belebih atau luka di kulit kepala	yang menyebabkan ketombe 2. Membantu **mengurangi produksi minyak berlebih** di kulit kepala yang dapat memperburuk ketombe 3. Membantu **mengurangi produksi minyak berlebih** di kulit kepala yang dapat memperburuk ketombe	untuk mendapatkan hasil yang maksimal 4. bilas hingga bersih Kapan berhenti: Jika ketombe dan gatal sudah hilang sepenuhnya, bisa dikurangi penggunaannya 1 kali seminggu untuk pencegahan Kapan harus ke dokter : Jika ketombe tidak membaik setelah 4 minggu pemakaian,

						muncul iritasi, kemerahan atau kulit kepala terasa panas setelah pemakaian dan ketombe tebal atau terdapat luka di kulit kepala ESO yang sering : Rambut dan kulit kepala kering atau berminyak, rambut rontok, perubahan warna rambut, iritasi kulit kepala dan iritasi kulit Cara menyimpan : Simpan sampo di

						tempat kering dan sejuk, jauhkan dari sinar matahari langsung, dan pastikan tutup botol tertutup rapat setelah digunakan
12.	Kutil	obat yang mengandung asam salisilat 2 g, asam laktat 0,5 g.	Seorang pria, **32 tahun,** dengan **berat badan 80 kg,** datang keluhan **kutil kecil di telapak tangannya** yang sudah ada selama **3 minggu terakhir.** Awalnya kutil hanya satu, tetapi kini bertambah menjadi dua. Tidak ada rasa nyeri, tetapi terasa kasar saat disentuh. Pasien memiliki riwayat alergi terhadap antibiotik golongan	W : pria 32 tahun, berat badan 80 kg W : terdapat kutil kecil di telapak tangan H : 3 minggu terakhir A : belum menggunakan obat	Obat yang terpilih adalah asam salisilat 2 g Contoh : Salicylic Acid 2% Alasannya : 1. mengangkat lapisan kulit mati sehingga	Indikasi : menghilangkan kapalan dan kutil Cara penggunaan: 1. bersihkan area kutil dengan air hangat dan keringkan 2. oleskan tipis – tipis hanya pada kutil, hindari kulit sehat di sekitarnya 3. biarkan

			penisilin dan riwayat diabetes tipe 2, tetapi kadar gula darahnya terkontrol dengan obat.	sebelumnya M : mempunyai riwayat alergi terdapat antibiotik dengan golongan penisilin dan mempunyai riwayat penyakit diabetes tipe 2, tetapi kadar gula darahnya terkontrol dengan obat	kutil bisa mengelupas secara bertahap 2. efektif untuk kutil biasa yang tidak terlalu besar	mengering selama beberapa menit 4. gunakan 1- 2 kali sehari sehingga kutil menghilang Kapan berhenti: Jika kutil sudah hilang sepenuhnya dan kulit kembali normal, apabila dalam 4 minggu tidak ada perbaikaan segera konsultasi ke dokter Kapan harus ke dokter : Jika kutil

						membesar atau menyebar ke area kulit lain, muncul rasa nyeri, iritasi parah, atau tanda infeksi ESO yang sering : Ruam, gatal- gatal, kesulitan bernapas, sesak di dada, pembekakan mulut, rasa terbakar pada kulit, kemerahan kulit, dan pengelupasan kulit Cara menyimpan : Simpan di tempat kering dan sejuk,

						jauhkan dari sinar matahari langsung dan tutup kembali apabila sudah digunakan
13.	Luka bakar	Obat yang mengandung perak sulfadiazin; oleum iecoris aselli (minyak ikan,"*levertraan*").	Seorang pria, 35 tahun, dengan berat badan 70 kg, datang dengan keluahan luka bakar di lengan akibat terkena air panas saat memasak 2 hari yang lalu. Luka tampak kemerahan, sedikit melepuh, dan terasa perih. Pasien memiliki riwayat asma dan diketahui alergi terhadap sulfa. Ia belum menggunakan obat apa pun selain mencuci luka dengan air mengalir.	W : pria 35 tahun, berat badan 70 kg W : luka bakar di lengan akibat terkena air panas H : 2 hari lalu A : belum menggunakan obat dan hanya memncuci luka dengan air	Obat yang terpilih adalah oleum iecoris aselli (minyak ikan,"*levertraan*") Alasannya : 1. membantu **regenerasi kulit** yang terbakar dan mempercepat penyembuhan luka 2.	Indikasi : membantu proses penyembuhan luka dan luka bakar Cara penggunaan: 1. **Bersihkan luka** dengan air bersih dan keringkan perlahan **2. Oleskan tipis** minyak ikan pada area luka **3. Gunakan 1-2 kali sehari** sampai luka membaik

				mengalir M : mempunyai riwayat penyakit asma dan mempunyai riwayat alergi obat sulfa	**Mengurangi peradangan** serta menjaga kelembaban kulit yang luka 3. **Aman untuk pasien dengan alergi sulfa,** sehingga lebih cocok dibandingkan perak sulfadiazin.	**4. jangan menutupi luka terlalu rapat agar kulit tetap bisa bernapas** Kapan berhenti: Jik akulit sudah mulai pulih dan tidak terasa nyeri lagi, jika luka semakin memburuk atau terinfeksi segera konsultasi ke dokter Kapan harus ke dokter : Jik aluka bertambah besar

						mengeluarkan nanah, semakin nyeri, adanya demam atau infeksi dan dalam 7 hari luka tidak menunjukkan perbaikan ESO yang sering : Gatal – gatal, terbentuk ruam, dan kulit terasa terbakar Cara menyimpan : Simpan di tempat yang sejuk dan kering, dan tutup kembali dengan rapat apabila

						sudah di gunakan
14.	Luka iris	Povidon iodine	Seorang pria, 25 tahun, dengan berat badan 65 kg, datang dengan keluhan jari tangannya teriris pisau saat memotong sayur di dapur 1 jam yang lalu. Luka tampak dangkal, berdarah sedikit, tetapi tidak terlalu dalam. Pasien ingin membersihkan lukanya agar tidak terjadi infeksi.	W : pria 25 tahun, berat badan 65 kg W : jari tangan teriris pisau saat memotong sayur. Luka tampak dangkal, berdarah sedikit, tetapi tidak terlalu dalam. H : 1 jam yang lalu A : sebelumnya tidak diberikan	Obat yang terpilih adalah Povidon iodine Alasannya : 1. **Membunuh bakteri dan mencegah infeksi** pada luka iris **2.** Aman digunakan untuk luka kecil atau goresan	Indikasi : mencegah infeksi pada luka lecet, luka bakar, luka khitan, luka ringan, melindungi luka setelah operasi dari kemungkinan terkena infeksi Cara penggunaan: 1. **Bersihkan luka** dengan air mengalir dan keringkan dengan kain bersih **2. Oleskan povidone iodine** pada luka

				obat M : tidak memiliki riwayat alergi obat atau riwayat penyakit		menggunakan kapas atau kain steril 3. **Tutup luka dengan perban steril** jika diperlukan, terutama jika masih berdarah 4. **Ulangi pemakaian 2-3 kali sehari** sampai luka sembuh Kapan berhenti: Jika luka sudah menutup dan tidak ada tanda infeksi, dan tidak ada kemerahan, nyeri atau bengkak

						setelah beberapa hari Kapan harus ke dokter : Jika luka sangat dalam atau lebar, muncul tanda infeksi seperti bengkak, nanah dan demam, dan apabila luka tidak sembuh selama 7 hari ESO yang sering : Alergi seperti; ruam, gatal kulit merah, demam, kesulitan bernapas dan iritasi parah

						Cara menyimpan : simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung
15.	Alergi	Klorfeniramin maleat, prometazine, diphenhidramine, deksklorfeniramin maleat, loratadine, cetirizine.	Seorang wanita, 30 tahun, dengan berat badan 55 kg, datang dengan keluhan gatal-gatal dan bentol merah di tangan dan leher sejak tadi pagi. Ia mengatakan bahwa gejala muncul setelah ia membersihkan rumah dengan sarung tangan lateks. Pasien memiliki riwayat asma sejak kecil dan pernah mengalami alergi terhadap	W : wanita 30 tahun, berat badan 55 kg W : gatal – gatal dan bentol di tangan dan leher H : sejak pagi tadi A : sudah meminum obat	Obat yang terpilih adalah cetirizine Alasannya : 1. dapat meredakan gatal dan reaksi alergi pada kulit 2. tidak menyebabkan kantuk	Indikasi : Rinitis musiman atau tahunan, urtikaria idiopatik kronik Cara penggunaan: Dewasa 10 mg (1 tablet per hari) diminum pagi atau malam sebelum atau sesudah makan Kapan berhenti:

			klorfeniramin maleat, yang menyebabkan rasa kantuk berlebihan. Sebelumnya, ia sudah mencoba mengonsumsi obat alergi yang biasa ia gunakan, tetapi **tidak memberikan efek yang signifikan.**	anti alergi tetapi tidak memberikan efek yang signifikan M : mempunyai riwayat alegi terhadap obat klorfeniramin maleat dan mempunyai riwayat penyakit asma	berlebihan 3. aman bagi pasien yang mempunyai riwayat penyakit asma	1. jika gejala alergi sudah hilang dalam beberapa hari dan tidak ada paparan pemicu alergi misalnya tidak menggunakan sarung tangan lateks lagi Kapan harus ke dokter : Jika gejala semakin parah atau muncul sesak napas, tidak membaik setelah 3 hari penggunaan obat dan muncul reaksi alergi berat seperti

						pembengkakan di wajah atau kesulitan bernapas ESO yang sering : Kantuk, kelelahan, mulut kering, sakit perut terutama pada anak –anak Cara menyimpan : Simpan pada suhu 25 °C di tempat sejuk, kering dan jauhkan dari jangkauan anak – anak
16.	Vitamin dan mineral	Vit C, Vit A, Vit B1, Vit B6, Vit B12, Vitamin D,Asam folat, Mn, Zn, Fe, dll	Seorang wanita, 27 tahun, dengan berat badan 50 kg, datang dengan keluhan sering lelah,	W : wanita 27 tahun, berat badan 50 kg	Obat yang terpilih adalah suplemen zat	Indikasi : mencegah dan mengatasi anemia defisiensi besi

			pucat, dan pusing sejak beberapa minggu terakhir. Ia juga mengeluhkan kuku rapuh dan rambut mudah rontok. Pasien memiliki riwayat anemia defisiensi zat besi sejak setahun lalu dan sebelumnya diresepkan suplemen zat besi oleh dokter. Saat ini, ia sedang mengonsumsi obat maag (antagonis H2) karena sering mengalami nyeri uluh hati. Pasien juga memiliki riwayat alergi terhadap vitamin B12, yang sebelumnya menyebabkan ruam merah di kulitnya.	W : sering lelah, pucat, pusing, kuku rapuh dan rambut mudah rontok H : beberapa minggu terakhir A : Pasien pernah **menggunakan suplemen zat besi sebelumnya** saat didiagnosis anemia, tetapi saat ini belum mengonsumsi suplemen lagi.	besi (Fe) Contoh obat Ferrous sulfate. Alasannya : 1. Meningkatkan kadar hemoglobin 2. **Membantu mengurangi kelelahan dan meningkatkan daya tahan tubuh**	Cara penggunaan: Ferrous sulfate 200 mg dewasa **1 kali sehari, diminum sebelum makan** untuk penyerapan optimal. Karena pasien sedang mengonsumsi obat maag, sebaiknya **zat besi diminum 2 jam sebelum atau setelah obat maag** agar tidak mengganggu penyerapan Kapan berhenti:

				Ia juga sedang **mengonsumsi obat maag (antagonis H2)** M : pasien **sedang mengonsumsi obat maag** dan memiliki **riwayat alergi terhadap vitamin B12,** yang sebelumnya menyebabkan ruam merah di kulitnya		Jika **hemoglobin sudah kembali normal,** biasanya setelah **3 bulan penggunaan** dan **tidak ada lagi gejala anemia** seperti lemas, pucat, atau pusing Kapan harus ke dokter : Jika **gejala anemia tidak membaik setelah 3 bulan, dan** muncul **efek samping parah** seperti nyeri perut hebat atau tinja berwarna hitam pekat yang tidak

						normal ESO yang sering : Nyeri lambung, mual, tidak nafsu makan, muntah, sembelit atau diare, BAB berwarna hitam Cara menyimpan : Simpan dalam wadah tertutup di tempat yang kering, bersuhu ruangan, dan terhindar dari panas atau paparan sinar matahari langsung. Jauhkan suplemen ini dari

						jangkauan anak-anak
17.	Antiseptik dan disinfektan	Alkohol 70%, povidone iodine 10%, klorheksidin,setrimida 0,5%, serbuk PK.	Seorang pria, 35 tahun, dengan berat badan 70 kg, dengan keluhan luka lecet pada lutut akibat jatuh dari motor kemarin sore. Luka tampak kemerahan, tetapi tidak bernanah. Pasien ingin membersihkan lukanya agar tidak terinfeksi.Ia memiliki riwayat diabetes mellitus, sehingga proses penyembuhan lukanya cenderung lebih lambat. Pasien juga memiliki riwayat alergi terhadap alkohol 70%, yang sebelumnya menyebabkan rasa panas dan iritasi pada	W : pria 35 tahun, berat badan 70 kg W : luka lecet pada lutut akibat jatuh dari motor. Luka tampak kemerahan, tetapi tidak bernanah. Pasien ingin H : kemarin sore A : hanya membersihkan	Obat yang terpilih adalah povidone iodine 10% Alasannya : 1. **Antiseptik yang efektif membunuh kuman** dan mencegah infeksi pada luka terbuka **2. tidak mengandung alkohol** sehingga	Indikasi : mencegah infeksi pada luka lecet, luka bakar, luka khitan, luka ringan, melindungi luka setelah operasi dari kemungkinan terkena infeksi Cara penggunaan: 1. Bersihkan luka dengan air bersih atau **larutan NaCl 0,9%** 2. **Oleskan povidone iodine 10% secara**

			kulitnya.	lukanya agar tidak terinfeksi M : memiliki riwayat diabetes mellitus, sehingga proses penyembuhan lukanya cenderung lebih lambat dan memiliki riwayat alergi terhadap alkohol 70%, yang sebelumnya menyebabkan rasa panas dan iritasi pada kulitnya.	lebih aman bagi pasien yang memiliki alergi terhadap alkohol	**merata pada luka** menggunakan kasa steril atau kapas bersih 3. Biarkan **mengering sebentar,** lalu **tutup luka dengan perban steril** jika diperlukan 4. **Gunakan 2-3 kali sehari,** terutama setelah luka terkena air atau kotoran Kapan berhenti: Jika luka **sudah mengering** dan tidak ada tanda-

						tanda infeksi (kemerahan, bengkak, atau nanah) Kapan harus ke dokter : Jika **luka tidak sembuh dalam 5-7 hari,** muncul **tanda infeksi serius** seperti pembengkakan, nanah, atau nyeri yang semakin parah dan adanya **tanda gangguan penyembuhan luka akibat diabetes,** seperti luka semakin

						melebar atau sulit mengering ESO yang sering : Alergi seperti; ruam, gatal kulit merah, demam, kesulitan bernapas dan iritasi parah Cara menyimpan : simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung
18.	Antiinflamasi topikal	sediaan topikal yang mengandung flusinolon asetonida; hidrokortison asetat 1%;	Seorang wanita, 28 tahun, dengan berat badan 55 kg, dengan keluhan ruam kemerahan, gatal, dan sedikit bengkak pada	W : wanita 28 tahun, berat badan 55 kg W : ruam	Obat yang terpilih adalah hidrokortison asetat 1%	Indikasi : Dermatitis atopik, kontak, alergi; pruritus anogenital,

		desoksimetason 2,5 mg.	tangan sejak 3 hari yang lalu. Keluhan muncul setelah pasien menggunakan sabun cuci baru. Pasien memiliki riwayat dermatitis kontak, yang sering kambuh jika terpapar bahan iritan seperti deterjen atau bahan kimia lainnya. Pasien juga memiliki riwayat alergi terhadap flusinolon asetonida, yang sebelumnya menyebabkan kulitnya semakin merah dan terasa panas saat digunakan.	kemerahan, gatal, dan sedikit bengkak pada tangan. H : sejak 3 hari yang lalu A : Keluhan muncul setelah pasien menggunakan sabun cuci baru M : memiliki riwayat dermatitis kontak, yang sering kambuh jika terpapar bahan iritan	Alasannya : 1. **kortikosteroid ringan**, efektif mengurangi **kemerahan, gatal, dan peradangan** pada kulit **2. aman untuk kulit sensitif**, dibandingkan kortikosteroid yang lebih kuat **3. Cocok untuk**	neurodermatitis Cara penggunaan: 1. **Cuci tangan dan area kulit yang terkena** sebelum mengoleskan obat **2. Oleskan tipis-tipis** pada area yang terkena, **3-4 kali sehari** **3.** Hindari penggunaan pada luka terbuka atau infeksi kulit aktif **4. Gunakan maksimal 7 hari**, kecuali ada anjuran dokter

				seperti deterjen atau bahan kimia lainnya. Pasien juga memiliki riwayat alergi terhadap flusinolon asetonida, yang sebelumnya menyebabkan kulitnya semakin merah dan terasa panas saat digunakan	**dermatitis kontak ringan hingga sedang**	Kapan berhenti: Jika **ruam dan gatal sudah membaik dalam 5-7 hari, dan** terjadi **iritasi atau efek samping lain** Kapan harus ke dokter : **tidak ada perbaikan dalam 7 hari**, ruam semakin menyebar atau muncul **nanah dan luka dan** mengalami **reaksi alergi**, seperti kulit semakin merah atau terasa

						terbakar setelah pemakaian ESO yang sering : Rasa terbakar, gatal, kemerahan atau iritasi pada kulit, jerawat, pertumbuhan rambut yang tidak biasa, perubahan warna kulit dan folikulitis Cara menyimpan : Simpan pada suhu kamar
19.	Obat topikal penghilang rasa sakit	sediaan yang mengandung mentol, campor, metil salisilat, oleum mentae; kayu	Seorang pria, 35 tahun, dengan berat badan 70 kg, dengan keluhan nyeri otot di bahu dan punggung	W : pria 35 tahun, berat badan 70 kg	Obat yang terpilih adalah natrium	Indikasi : Peradangan tendon, ligamen, otot & sendi

		puti; lotion lidokain HCl 3%, natrium diklofenak 1% gel.	setelah bekerja seharian mengangkat barang berat. Keluhan sudah berlangsung 2 hari, dan terasa lebih sakit saat bergerak Pasien memiliki riwayat asam lambung (GERD), sehingga ia menghindari penggunaan obat antiinflamasi non-steroid (NSAID) oral, seperti ibuprofen. Selain itu, pasien memiliki riwayat alergi terhadap mentol, yang sebelumnya menyebabkan rasa panas dan kemerahan pada kulit setelah penggunaan balsem.	W : nyeri otot di bahu dan punggung setelah bekerja seharian mengangkat barang berat H : 2 hari A : Belum menggunakan obat apa pun untuk mengatasi nyeri ini, Menghindari obat NSAID oral karena memiliki riwayat GERD	diklofenak 1% gel Alasannya : 1. **Efektif meredakan nyeri otot dan peradangan lokal** tanpa menyebabkan iritasi lambung seperti NSAID oral **2. Bentuk gel cepat meresap**, bekerja langsung pada area	pasca-trauma akibat keseleo, ketegangan & memar. Tendovaginitis, bursitis, sindrom bahu-tangan, periarthropathy, osteoarthrosis pada sendi perifer & kolom vertebral Cara penggunaan: 1. **Bersihkan dan keringkan area kulit** yang sakit sebelum mengoleskan obat **2. Oleskan gel tipis-tipis** pada area nyeri, **2-3 kali**

				M : memiliki riwayat asam lambung (GERD), sehingga ia menghindari penggunaan obat antiinflamasi non-steroid (NSAID) oral, seperti ibuprofen, memiliki riwayat alergi terhadap mentol, yang sebelumnya menyebabkan rasa panas dan kemerahan pada	nyeri tanpa efek samping sistemik yang berisiko memperburuk GERD **3. Tidak mengandung mentol**, sehingga aman untuk pasien dengan alergi mentol	**sehari** **3. Pijat lembut** agar gel meresap dengan baik **4. Cuci tangan setelah pemakaian**, hindari kontak dengan mata, mulut, atau luka terbuka Kapan berhenti: Jika nyeri sudah **membaik dalam 5-7 hari, dan** terjadi **iritasi kulit atau efek samping lainnya** Kapan harus ke

				kulit setelah penggunaan balsem		dokter : nyeri tidak berkurang setelah 7 hari pemakaian, muncul ruam merah, bengkak, atau gatal di area yang diolesi dan nyeri semakin parah atau menjalar ke bagian tubuh lain ESO yang sering : Rasa terbakar, gatal, iritasi dan kulit kering

TUGAS KHUSUS PKL D3 FARMASI UMG_SASTI AMILIA PUTRI_221105023_RS_ MUHAMMADIYAH GRESIK

						Reaksi alergi ringan pada orang yang sensitif terhadap bahan herbal tertentu Cara menyimpan : Simpan di tempat kering dan sejuk, jauh dari sinar matahari langsung

Gresik, 13 Juni 2025
Dosen Pembimbing

Apt. Siti Nur, M. Farm. Klin.
NIDN. 0711088504

Gresik, 13 Juni 2025
Pembimbing Lapangan Rumah Sakit
Muhammadiyah Gresik

RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH GRESIK INSTALASI FARMASI

Apt. Alfiyah Hapsm, S.Si
No. SIPA : 18920607/SIPA_35.25/2022/2527

Dipindai dengan CamScanner

RESUME KULIAH TAMU PKL P3B

TA. 2024/2025

75

Nama Mahasiswa	:	Sasti Amilia Putri
NIM	:	221105023
Semester/Kelas	:	6 (APG / ~~ASR~~ /~~RPL~~)
Judul Materi	:	Budidaya dan Unit pasca Panen
Hari dan Tanggal	:	Kamis, 22 Mei 2025
Pembicara	:	Atika Fathur Rahmi, S.P., M.Si
Screenshoot Foto Mahasiswa saat Pelaksanaan Kuliah Tamu	:	Tempel foto hasil screenshoot disini (Screenshoot yang ada wajah dan nama mahasiswa) 

Dipindai dengan CamScanner

Profil UPF Yankestrad RSUP dr Sardjito: (dibuat dalam bentuk point dan tulis tangan)

1. UPF merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dg keunggulan di bidang tanaman obat & obat tradisional.
2. Yang dipimpin oleh dewan direksi terdiri dari :
   - Direktur Utama
   - Pit. Direktur Medik & keperawatan
   - Direktur perencanaan dan pengembangan strategi layanan
   - Direktur SDM pendidikan & penelitian
   - Direktur keuangan & BMN
   - Direktur layanan Operasional
3. Sejarah UPF Yankestrad RSUP dr Sardjito dimulai dari tahun 1947 dengan nama Hortus Medicus (lembaga Eijkman, diperbarui oleh Dr. Soetarman & RM. Santoso), kemudian tahun 1975 dengan nama Hortus Medicus (Direktorat pengawasan obat & makanan, Departemen kesehatan RI kemudian tahun 1978 dengan nama BPTO (Balai penelitian Tanaman Obat, pusitbang Farmasi, Baitabangkes, Departemen kesehatan RI), kemudian tahun 2006 dengan nama B2P2TOOT (Balai penelitian & pengembangan tanaman obat dan obat tradisional, Baitbangkes, kemenkes RI) dan tahun 2022 menjadi UPF yankestrad, RSUP Sardjito (Unit pelaksana Fungsional pelayanan kesehatan Tradisional, RSUP Dr. Sardjito, Ditjen pelayanan kesehatan, kemenkes RI
4. Layanan :
   - Klinik pertama Hortus Medicus
   - Klinik utama Hortus & Mare
   - Wisata kebugaran
   - Pendidikan & pelatihan
   - Pengujian laboratorium
   - penyediaan produk
5. penyediaan produk :
   - Hortus Med Merchandise
   - Hortus Med Herbs
   - Hortus Med F & B (Food & Baverage)
   - Hortus Med Nursery (bibit & kotadama tanaman obat)
   - Hortus Med Essential Oil (menyediakan berbagai jenis minyak atsiri murni)
   - Hortus Med care (balsem, lulur, masker, & minyak oles)

B. Kesimpulan Materi : (dibuat dalam bentuk paragraf dan tulis tangan)

Materi Budidaya dan unit pasca panen ini untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pengolahan tanaman obat, mulai dari tahap awal pengenalan jenis tanaman, teknik budaya yang tepat, proses panen dan pengumpulan bahan baku, hingga penanganan pasca panen. Agar kualitas bahan tetap terjaga dan siap digunakan sebagai produk kesehatan tradisional yang efektif dan aman.

Dipindai dengan CamScanner

Ringkasan Materi : (dibuat dalam bentuk point dan tulis tangan)

1. Indonesia kaya akan sumber daya genetik dan pengetahuan lokal. Dengan 10% tumbuhan dunia ada di Indonesia, termasuk 940 jenis tanaman obat, jamu telah digunakan turun - temurun sebagai warisan kesehatan tradisional.

2. Jamu berasal dari tradisi jawa dan tercatat dalam naskah kuno serta relief candi borobudur. Sejak era kolonial, jamu telah diteliti oleh ilmuan Eropa. UNESCO menetapkan budaya jamu sebagai warisan Budaya Takbenda, dan pemerintah RI menetapkan temulawak sebagai tanaman obat unggulan Indonesia.

3. Pentingnya Budidaya Tanaman Obat untuk menjaga ketersediaan bahan baku berkualitas secara berkelanjutan. Tahapan budidaya :
   - tentukan lokasi
   - pilih jenis tanaman
   - siapkan lahan
   - lakukan penanaman
   - rawat tanaman
   - kendalikan hama & penyakit (OPT)

5. Panen merupakan proses mengambil bagian tanaman seperti daun, akar, batang, bunga, atau biji untuk digunakan untuk mendapat bahan baku berkualitas, meminimalkan kerusakan dan pemborosan serta memastikan hasil panen dimanfaatkan optimal

6. Waktu dan umur panen, panen dilakukan saat kandungan senyawa aktif optimal, disesuaikan dengan bagian tanaman serta kondisi iklim untuk mencegah kerusakan seperti jamur / pembusukan.

7. Pengangkutan hasil panen ; pengangkutan harus sesuai karakteristik bahan, hindari sinar matahari, gesekan, dan tekanan berlebih. Bahan segar sebaiknya segera di proses yaitu sortasi basah, pencucian, dan perajangan

8. Pengumpulan & sortasi basah: pastikan identitas tanaman jelas dan tidak tercampur. periksa kesegaran bahan, pisahkan bagian yang digunakan dan tidak, serta buang yg rusak. bersihkan kotoran, timbang hasil & catat jika ada penyimpangan.

9. Pencucian ; Gunakan air bersih mengalir, semprot atau sikat halus untuk kotoran

10. Perajangan ; Setelah dicuci, bahan ditiriskan ditempat teduh & tak berlubang

11. Perajangan ; Potong bahan jadi irisan / serutan tanpa merusak kualitas.

12. pengeringan ; pencapaian kadar air <10 %

13. pengemasan ; pencegahan kontaminan menjaga kestabilan tingkat kekeringan

Dipindai dengan CamScanner

RESUME KULIAH TAMU PKL P3B

TA. 2024/2025

Nama Mahasiswa	:	Sasti Amilia Putri
NIM	:	22110s023
Semester/Kelas	:	6 (APG / ~~ASR~~ / ~~RPL~~)
Judul Materi	:	Evaluasi mutu simplisia dan Ekstrak
Hari dan Tanggal	:	Kamis, 22 Mei 2025
Pembicara	:	Amalia Damayanti, M.Si
Screenshoot Foto Mahasiswa saat Pelaksanaan Kuliah Tamu	:	Tempel foto hasil screenshoot disini (Screenshoot yang ada wajah dan nama mahasiswa)

Dipindai dengan CamScanner

ii) UPF Yankestrad RSUP dr Sardjito: (dibuat dalam bentuk point dan tulis tangan)

1. upf merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dg keunggulan di bidang tanaman obat & obat tradisional

2. yang dipimpin oleh dewan direksi terdiri dari :
   - Direktur utama
   - Dir. Direktur medik & keperawatan
   - Direktur perencanaan & pengembangan strategi layanan
   - Direktur keuangan & BMN
   - Direktur layanan operasional

3. layanan :
   - klinik pertama Hortus Medicus
   - klinik utama Hortus & HARC
   - wisata kebugaran
   - pendidikan & pelatihan
   - pengujian laboratorium
   - penyediaan produk

4. penyediaan produk :
   - Hortus med merchandise
   - Hortus med Herbs
   - Hortus med F & B
   - Hortus med Nursery
   - Hortus med Esential oil
   - Hortus med care

B. Kesimpulan Materi : (dibuat dalam bentuk paragraf dan tulis tangan)

Dalam materi Evaluasi mutu simplisia dan Ekstrak, Quality Control (QC) berperan penting untuk menjaga mutu dan keamanan tanaman obat. QC dilakukan dimulai bahan baku hingga produk akhir melalui pengujian sesuai standar. Peran QC menjaga produk agar tetap berkualitas, aman digunakan dan konsisten hasilnya.

Dipindai dengan CamScanner

gkasan Materi : (dibuat dalam bentuk point dan tulis tangan)

Quality control merupakan proses pemeriksaan dan pengujian untuk memastikan produk memiliki kualitas mutu sesuai standar dan kebenaran identitas, sehingga memenuhi syarat mutu untuk kesehatan.

2. Parameter mutu simplisia meliputi organoleptik, susut pengeringan, angka cemaran microba, cemaran logam berat dan penetapan kadar senyawa. sedangkan parameter mutu kapsul ekstrak mencakup semua itu namun ditambah keseragaman bobot dan waktu hancur.

3. Organoleptik merupakan pengamatan bentuk, rasa, bau dan warna untuk memastikan identitas, mendeteksi penurunan mutu & kebusukan.

   Otentikasi merupakan mencocokan ciri sampel dengan referensi.

4. Susut pengeringan merupakan kadar air yang tersisa setelah pengeringan pada suhu 105°C selama 30 menit. tujuannya mencegah microba - syarat mutu ≤ 10%.

5. Uji cemaran microba meliputi ALT ≤ 5×10^3 koloni/g, AKK ≤ 5×10^2 koloni/g, Escherichia coli ≤ 10^2 AM/g, Enterobacteriaceae ≤ 10^4 AM/g, clostridia; negatif, Salmonella ; negatif ; Shigella ; negatif

   Uji cemaran logam berat meliputi timbal (Pb) ≤ 10 ppm, cadmium (Cd) ≤ 0,3 ppm, Arsen (As) ≤ 5 ppm dan merkuri (Hg) ≤ 0,5 ppm

6. keseragaman bobot menjamin konsistensi ekstrak per kapsul. menggunakan neraca digital. syarat mutu ; dari 20 kapsul maksimal 2 kapsul boleh menyimpang > 10% dari rata-rata, dan tidak ada kapsul yg menyimpang > 25%

7. Waktu hancur mengacu kesesuaian batas waktu hancur kapsul dengan standar menggunakan disintegration tester. syarat mutu ≤ 30 menit.

8. Penetapan kadar senyawa untuk mengukur kandungan kimia dengan berbagai metode. Golongan utama : minyak atsiri, flavonoid, alkaloid, tanin, saponin, steroid dan antrakinon

Dipindai dengan CamScanner

RESUME KULIAH TAMU PKL P3B

TA. 2024/2025

Nama Mahasiswa	:	Sasti Amilia Putri
NIM	:	2211105023
Semester/Kelas	:	6 (APG / ~~ASR~~ /~~RPL~~)
Judul Materi	:	Pembuatan dan registrasi sediaan obat tradisional
Hari dan Tanggal	:	Kamis, 22 Mei 2025
Pembicara	:	Nita Supriyati, M. Biotech., Apt
Screenshoot Foto Mahasiswa saat Pelaksanaan Kuliah Tamu	:	Tempel foto hasil screenshoot disini (Screenshoot yang ada wajah dan nama mahasiswa)

Dipindai dengan CamScanner

Profil UPF Yankestrad RSUP dr Sardjito: (dibuat dalam bentuk point dan tulis tangan)

1. UPF merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dg keunggulan di bidang tanaman obat & obat tradisional
2. yang dipimpin oleh dewan direksi terdiri dari :
   - Direktur utama
   - Dir. Direktur medik & keperawatan
   - Direktur perencanaan & pengembangan strategi layanan
   - Direktur SDM pendidikan & penelitian
   - Direktur keuangan & BMN
   - Direktur layanan operasional
3. layanan :
   - Klinik pertama Hortus Medicus
   - Klinik utama Hortus & HARC
   - Wisata kebugaran
   - pendidikan & pelatihan
   - pengujian laboratorium
   - penyediaan produk
4. penyediaan produk :
   - Hortus med Merchandise
   - Hortus med Herbs
   - Hortus med F A B (Food & Baverage)
   - Hortus med Nursery
   - Hortus med Esential Oil
   - Hortus med care

B. Kesimpulan Materi : (dibuat dalam bentuk paragraf dan tulis tangan)

Pembuatan sediaan obat bahan alam harus diatsikan dengan standar Produksi yang betat untuk menjamin keamanan dan mutu. Registrasi Obat bahan alam merupakan proses/ wajib untuk memastikan bahwa obat tersebut aman dan efektif sebelum dipasarkan.

Dipindai dengan CamScanner

Ringkasan Materi : (dibuat dalam bentuk point dan tulis tangan)

1. Rajangan merupakan obat tradisional dari simplisia tunggal / campuran digunakan dengan cara diseduh / direbus

2. Serbuk merupakan obat tradisional berbentuk bubuk halus dari simplisia / ekstrak digunakan dengan cara diseduh air panas

3. Serbuk instan merupakan obat tradisional dari ekstrak, diseduh air panas / dingin. Isi dari bahan aktif bermacam pengering, pemanis dan perasa

4. Pil merupakan obat tradisional bulat dari ekstrak / simplisia. Isi dari pil terdiri dari ekstrak, gom arab, tragakan, dengan alat timbangan, mixer, cetakan, pengering

5. Kapsul merupakan obat tradisional dalam cangkang keras isi dari kapsul berupa ekstrak kering, pengering dan pencair

6. Bentuk obat luar bahan alam terdiri dari :
   - Losio
   - Krim
   - parem
   - Gel
   - salep
   - serbuk obat luar
   - Tapel
   - pilis
   - plester / koyok
   - Suppositoria

7. Formularium fitofarmaka merupakan panduan berisi pedoman, daftar dan informasi produk fitofarmaka untuk perencanaan, pengadaan, dan penggunaan di fasilitas kesehatan

8. Larangan dalam formula obat Bahan Alam (OBA) :
   - Tidak boleh mengandung etil alkohol > 1 % kecuali tingtur dengan pengenceran
   - Dilarang bahan kimia obat, kosmetik / sintetik
   - Dilarang bahan yang tidak aman, tidak berkhasiat / tidak sesuai BPOM

   Bentuk sediaan OBA yg dilarang :
   Intravaginal, tetes mata, parenteral, suppositoria & bentuk lain berisiko

9. Pembuatan saran obat dalam
   - studi sifat fisika kimia
   - penentuan bentuk sediaan
   - ~~penguji~~ sifat empiris

Dipindai dengan CamScanner

STUDI KASUS
MATERI 1.

1⃣ Studi kasus

- Diketahui kebutuhan daun teh camellia sinensis (L.) kuntze. UPT Yankestrad adalah sbb; Klinik Hort. Med (120 kg), Pusat Ekstrak (60 kg), Gift Shop (33 kg), Griya produksi (6 kg) dan Cafe Jamu (2 kg)
- Data perolehan pascapanen simplisia teh menunjukkan angka konversi 1:7 (kering : segar), yang artinya 1kg simplisia teh kering dihasilkan dari 7 kg teh segar.
- Daun teh dapat dipanen setiap bulan (12 kali dalam satu tahun).
- Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, berapa kg teh segar yang harus dipanen kebun produksi UPT Yankestrad pada satu kali panen?

2⃣ Penyelesaian kasus

→ Total kebutuhan simplisia teh kering per tahun

1. Klinik Hort med : 120kg
2. Pusat ekstrak : 60 kg
3. Gift shop : 33 kg
4. Griya produksi : 6 kg
5. Cafe jamu : 2 kg

Total : 120 + 60 + 33 + 6 + 2 = 221 kg per tahun.

→ Perbandingan teh segar ke teh kering

- kering : segar = 1 : 7

untuk mendapatkan 1 kg teh kering, diperlukan 7kg teh segar.

→ kebutuhan teh segar per tahun

221 kg × 7 = 1.547 kg teh segar

→ kebutuhan teh segar per sekali panen

1.547 : 12 = 128,92 kg.

Dipindai dengan CamScanner

STUDI KASUS
MATERI 2

▶ Soal

Pak Soni seorang peneliti yang sedang mengembangkan kapsul ekstrak tanaman untuk menurunkan gula darah. Pada saat mengajukan ijin penelitian kepada BPOM. Pak soni diminta untuk melampirkan hasil pengujian parameter mutu kapsul ekstrak yang sudah dibuat.

Jelaskan parameter mutu apa saja yang harus diuji dan berikan referensi batas mutunya !

▶ Jawaban

Parameter mutu kapsul ekstrak dan batas mutunya:

1. Uji Organoleptik : Warna, bentuk, bau khas bahan alam
   Batas mutu : sesuai dengan deskripsi produk yang dikembangkan.
2. Kadar air : untuk menjamin kestabilan dan mencegah pertumbuhan mikroba.
   Batas mutu : $\leq 10\%$
3. Bobot rata-rata : menjamin keseragaman dosis tiap kapsul
   Batas mutu : $\pm 7,5\%$ untuk kapsul 300 mg - 500 mg
4. Waktu hancur : menjamin kapsul mudah terurai dalam tubuh
   Batas mutu : Maksimal 30 menit
5. Cemaran mikroba : menjamin keamanan dari mikroorganisme patogen
   Batas mutu : Total mikroba $< 10^5$ CFU/g, E.coli dan Salmonella harus negatif
6. Cemaran logam berat : menilai keamanan dari kontaminasi logam berbahaya
   Batas mutu : Timbal (Pb) $\leq$ 10 ppm, Kadmium (Cd) $\leq 0,3$ ppm.
7. Senyawa penanda / marker : jika ada, untuk menjamin konsistensi bahan aktif
   Batas mutu : sesuai spesifikasi produk dan referensi valid dari yang tertera di label, tergantung metode analisis dan marker yang digunakan.

Dipindai dengan CamScanner

D Study kasus

Saudara ingin memproduksi jamu untuk membantu menurunkan gula darah. Bahan yang dipilih adalah sambiloto dengan rancangan produk jadinya berupa kapsul.

A. Jelaskan secara singkat tahapan pembuatannya produk jadi
B. Sebutkan pengujian apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan
C. Tetapkan kategori jenis usahanya dan jenis obtb-nya
D. Menurut saudara jenis nomor ijin edar apa yang sesuai untuk produk tersebut.

D. Jawaban

A. Tahapan pembuatan jamu kapsul sambiloto
- Seleksi dan penerimaan bahan baku
  Dipastikan mutu organoleptik, bebas dari cemaran, dan sesuai spesifikasi
- pencucian
  sambiloto dicuci bersih untuk menghilangkan kotoran
- pengeringan
  setelah dicuci dikeringkan menggunakan oven atau dijemur ditempat bersih dan terlindung dari kontaminasi
- penggilingan
  Daun kering sambiloto digiling hingga menjadi serbuk halus
- penyaringan
  serbuk diayak agar ukuran partikel seragam
- pencampuran (jika ada bahan tambahan)
  Bila ada tambahan seperti bahan pengisi dicampurkan hingga merata
- pengisian kapsul (filling kapsul)
  serbuk dimasukkan ke dalam cangkang kapsul
- pengecekan mutu in-proses
  Meliputi berat kapsul, homogenitas campuran, tampilan visual
- pengemasan
  kapsul dikemas dalam blister / botol plastik tertutup rapat
- pelabelan
  Diberi label sesuai ketentuan meliputi nama produk, komposisi, khasiat tradisional, cara pakai, No. Batch, tanggal kedaluwarsa, dll
- penyimpanan produk jadi
  Disimpan digudang yang memenuhi syarat yaitu bersih, kering suhu terkendali

CS Dipindai dengan CamScanner

B. Pengujian yang harus dicantumkan

- pengujian bahan baku
  - Uji organoleptik
    warna, bau, rasa
  - Uji kadar air
  - Identifikasi simplisia
  - Uji cemaran mikroba dan logam berat
- pengujian produk antara dan produk jadi
  - Uji keseragaman bobot kapsul
  - Uji kadar air serbuk
  - Uji stabilitas (jika diperlukan)
  - Uji cemaran mikroba, jamur, dan logam berat
  - Uji cemaran pestisida (bila perlu)
  - Uji disintegrasi kapsul
- Uji Efikasi

  karena jamu maka bukti klaim cukup berdasarkan penggunaan empiris, bukan uji klinis.

Dipindai dengan CamScanner

C. Kategori Jenis Usaha dan Jenis CPOTB

- Jenis Usaha :
  Usaha Mikro Obat Tradisional atau Usaha Industri Obat Tradisional (IOT), tergantung dari skala usaha.
- Jenis CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik) :
  CPOTB Jamu (kategori produk jamu).

D. Nomor Izin edar yang sesuai :

- Karena produk berbahan alam (sambiloto) dan klaimnya berdasarkan penggunaan tradisional, maka :
  - Nomor Izin edar : "Nomor Izin Edar Obat Tradisional" dari BPOM (dengan menggunakan format TR - Tradisional
- Format : TR123456789

Dipindai dengan CamScanner