

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dengan menggunakan data-data pasien yang didiagnosis terkena diabetes melitus tipe 2 di Praktek Dokter Umum Trisna Hadi Wijaya, diperoleh kesimpulan bahwa pola penggunaan obat antidiabetes oral yang diresepkan lebih banyak pada obat kombinasi golongan Biguanid dan Sulfonilurea yaitu Metformin dan Glimepirid dengan frekuensi pemakaian 1x1 sehari dengan dosis 500mg/2mg tiap kaplet. Hasil pengamatan berdasarkan karakteristik jenis kelamin lebih banyak pada perempuan dengan jumlah 19 pasien (55%), sedangkan pada karakteristik usia lebih banyak pada usia 46-65 tahun (usia lansia) yaitu 22 pasien (63%).

5.2 Saran

Pada pengembangan pengamatan selanjutnya pada pasien dengan diagnosis Diabetes Melitus tipe 2 di Praktek Dokter Trisna Hadi Wijaya diperlukan data-data tambahan pengamatan yang meliputi tingkat pendidikan, pekerjaan, pola makan dan kepatuhan pasien. Sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi praktisi mengenai profil pasien Diabetes Melitus tipe 2 dalam menjalankan pengobatan.