

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian peresepan tokolitik di Klinik Obsgyn RS Muhammadiyah Lamongan periode Januari – April 2019 diperoleh kesimpulan bahwa:

Diagnosa abortus imminens sebanyak 8.2%, dengan:

- penggunaan obat dan kombinasi Progesteron + Vitamin Kehamilan (Asam Folat/Ca/Vitamin) sebanyak 60.00%
- kombinasi progesteron dan tokolitik serta anti fibrinolitik sebanyak 19.19%
- tokolitik tunggal sebanyak 6.67%
- kombinasi tokolitik dan anti fibrinolitik sebanyak 6.67%
- serta kombinasi progesteron dan dua tokolitik sebanyak 6.67%

Diagnosa Partus Prematurus Imminens sebanyak 2.73%.

- Pada Partus Prematurus Imminens penggunaan obat tidak menggunakan progesteron, tetapi menggunakan tokolitik baik tokolitik tunggal, ataupun kombinasi tokolitik dan vitamin kehamilan.

5.2 Saran

1. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut secara analisa kuantitatif untuk diagnosa abortus imminens dan *Partus Prematurus Imminens*.
2. Penulisan terkait data pasien di *Medical Record Electronic* harus lengkap dan selalu konsisten.
3. Seorang Tenaga Teknis Kefarmasian harus profesional dengan selalu mengikuti perkembangan terkait keilmuan.