

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian dapat disimpulkan dalam dua point, sebagai berikut :

1. . Tingkat Kepatuhan berdasarkan *Kuesioner MMAS-8* dapat diketahui tingkat kepatuhan masing-masing minum obat antidiabetes pasien prolans di Puskesmas Moropelang, 32.25% yang dikatakan “Kepatuhan Rendah”, 38.70% yang dikatakan “Kepatuhan Sedang”, dan 29.04% yang dikatakan “Kepatuhan Tinggi”.
2. Berdasarkan *Uji Pill Count* Tingkat Kepatuhan pengobatan DM di Puskesmas Moropelang sebesar 58% dikatakan “Patuh” dan 42% dikatakan “Tidak Patuh” dalam menjalankan pengobatan.

5.2 Saran

Diharapkan Peneliti berikutnya yang hendak melakukan penelitian tentang pengobatan kepatuhan DM dapat meningkatkan kualitas penelitiannya, dan salah satu Upaya untuk meningkatkan kepatuhan perlu adanya penyuluhan oleh tenaga farmasis tentang kepatuhan pengobatan obat untuk meningkatkan keberhasilan terapi. pengaruh kepatuhan pada kesembuhan sangatlah penting untuk meningkatkan keberhasilan terapi. Hal ini dapat dibantu dengan alarm waktu minum obat. Sehingga Ketidakpatuhan karena lupa dapat diminisir.