

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

- 7.1.1 Pasien angina pektoris yang tidak melakukan perilaku pencegahan sekunder sebanyak 28 (63,6%) di Poli Jantung RSUD Sidoarjo.
- 7.1.2 Pasien angina pektoris yang kambuh sebanyak 28 (63,6%) di Poli Jantung RSUD Sidoarjo.
- 7.1.3 Ada hubungan perilaku pencegahan sekunder dengan kekambuhan angina pektoris $p = 0,001 < \alpha = 0,05$.

7.2 Saran

7.2.1 Teoritis

Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan sekunder agar kekambuhan angina pektoris di Poli Jantung RSUD Sidoarjo tidak meningkat.

7.2.2 Praktis

Dapat dijadikan referensi bagi para perawat atau tenaga kesehatan lain untuk memberikan pengetahuan mengenai deteksi dini perilaku pencegahan sekunder kepada masyarakat.

7.3 Keterbatasan

Didalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang ditemukan oleh peneliti, yaitu penelitian menggunakan kuisioner yang kemungkinan jawaban pasien tidak valid .