


Lampiran Tugas Khusus

A. TUGAS KHUSUS RESEP

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																									
1	<p>Jenis Resep : Salinan</p> <p>Resep obat : non racikan</p> <p>Jumlah obat dalam resep : Tidak</p> <p>Pengulangan resep : Neiter</p> <p>Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="862 502 1731 1321"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Ny Tasripah</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Venaron cap</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>2 kali sehari</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada</td> <td>07/03/2023</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada</td> <td>Dr. Septyana Galuh. Sp.Po</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p>			Nama Pasien :	Ada	Ny Tasripah	Umur pasien :	Tidak Ada	-	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Venaron cap	Kekuatan :	Tidak Ada	-	Bentuk sed. :	Tidak Ada	-	Jumlah obat :	Ada	10	Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada	2 kali sehari	Tanggal penulisan resep :	Ada	07/03/2023	Nama dokter :	Ada	Dr. Septyana Galuh. Sp.Po	Surat ijin :	Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Tidak Ada	-
Nama Pasien :	Ada	Ny Tasripah																																									
Umur pasien :	Tidak Ada	-																																									
Berat Badan :	Tidak Ada	-																																									
Nama Obat :	Ada	Venaron cap																																									
Kekuatan :	Tidak Ada	-																																									
Bentuk sed. :	Tidak Ada	-																																									
Jumlah obat :	Ada	10																																									
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-																																									
Aturan pakai :	Ada	2 kali sehari																																									
Tanggal penulisan resep :	Ada	07/03/2023																																									
Nama dokter :	Ada	Dr. Septyana Galuh. Sp.Po																																									
Surat ijin :	Tidak Ada	-																																									
Alamat dr. :	Tidak Ada	-																																									

Venaron 10 capsule

c. Perhitungan biaya resep

Venaron 10 capsule : 35.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Putih

Nama Obat/warna etiket :

2 x 1

Sesudah makan

e. Product knowledge

Nama Obat : Venaron

Nama Obat :

Kandungan : Sophora Japonica extr.
300 mg

Kandungan :

Dosis lazim : -

Dosis lazim :

Kegunaan :

Kegunaan : Wasir/Hemoroid,
pencegahan Varises

ESO potensial : Rasa yang tidak
nyaman pada lambung yang bersifat
ringan

KI : -

PERHATIAN : -

Cara penyimpanan : Simpan di bawah
suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat,
kering, dan terlindung dari cahaya dan
kelembaban

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskruining
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

		<p>P : mas mau mengambil resep ini. Apa ada? TTK : ada bu, untuk wasir ya P : iya mas TTK : baik bu, mohon ditunggu dulu P : baik mas (TTK sedang mengambil resep) TTK : ini bu obatnya P : berapa mas? TTK : 35.000 bu, ini aturan pakainya sehari 2 kali ya sesudah makan P : baik mas (sambil memberikan uang), Terimakasih mas TTK : sama-sama</p> <p>h. Salinan resep (wajib dikerjakan)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>R/ Venaron caps no X s 2 dd 1 -----det-----</p> </div>
--	--	---

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep												
2	Jenis Resep : Resep asli Resep obat : non racikan Jumlah obat dalam resep : Tidak Pengulangan resep : Neiter Tempel Resep/salin resep disini!	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Ny diana</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Chloramfenicol tetes teliga</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Ny diana	Umur pasien :	Tidak Ada	-	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Chloramfenicol tetes teliga
Nama Pasien :	Ada	Ny diana												
Umur pasien :	Tidak Ada	-												
Berat Badan :	Tidak Ada	-												
Nama Obat :	Ada	Chloramfenicol tetes teliga												



Kekuatan :	Tidak Ada	-
Bentuk sed. :	Tidak Ada	-
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1
Duplikasi terapi :	Ada	Erlamycetine tetes telinga
Aturan pakai :	Ada	3 kali 1 (diteteskan)
Tanggal penulisan resep :	Ada	10/03/2023
Nama dokter :	Ada	Dr. Ita maftuhah
Surat ijin :	Ada	124/SIP.DU/VIII/2017
Alamat dr. :	Ada	Puskesmas karang binangun

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ chloramphenicol tetes telinga

c. Perhitungan biaya resep

Erlamycetine tetes telinga 10.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

3 x 1 tetes telinga kanan kiri

Nama Obat/warna etiket :

e. *Product knowledge*

Nama Obat : erlamycetine

Kandungan : chloramphenicol

Dosis lazim : 1%

Kegunaan : Infeksi superfisial pada telinga luar oleh bakteri Gram Positif atau Gram negatif yang peka terhadap Chloramphenicol

ESO potensial : gatal dan rasa panas

KI : Hipersentifitas

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

PERHATIAN : Hindarkan penggunaan jangka panjang karena dapat merangsang hipersensitivitas dan superinfeksi oleh kuman yang resisten.

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskining
2. mengambil obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : mas mau ngambil obat ini ada?

TTK : (ttk sedang skrining resep) ada tapi mereknya lain kandungannya sama

P : sama ya mas?

TTK : sama bu, yang diresep ini generiknya kalau yang diapotik nama dagangnya

P : berapa mas?

TTK ; 10.000

P : yaudah 1 ya mas

TTK : baik bu (sambil mengambil obat) ini diresep diteteskan ditelinga sehari 3x 1 tetes ya bu ditelinga yang sakit saja

P : baik mas (memberikan uang) terimakasih ya

TTK : sama-sama bu

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

R/ Chlormafenicol tetes telinga no.1


S 3 dd 1

-----da erlamyctine-----

--	--	--



No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																														
3	Jenis Resep : Salinan Resep obat : non racikan Jumlah obat dalam resep : /Tidak Pengulangan resep : Neiter Tempel Resep/salin resep disini!	A. Skrinning Administrasi <table border="1" data-bbox="864 842 1731 1479"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ny mukaromah</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Simvatatin 20 mg</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>20 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Malam 1 kali</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>27/03/2023</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ny mukaromah	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Simvatatin 20 mg	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	20 mg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	-	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	30	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Malam 1 kali	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	27/03/2023
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ny mukaromah																														
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-																														
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-																														
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Simvatatin 20 mg																														
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	20 mg																														
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	-																														
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	30																														
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																														
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Malam 1 kali																														
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	27/03/2023																														



Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Rudyanto D.A, Sp.PD
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ simvatatin 20 mg no. xxx

c. Perhitungan biaya resep


Simvatatin 1 strip (10 tablet) : 2.500 x 3 : 7.500

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

Sehari 1 kali (malam sebelum tidur)



e. *Product knowledge*

Nama Obat : simvastatin Kandungan : simvastatin 20mg Dosis lazim : 20 mg Kegunaan : kolestrol ESO potensial : sakit perut, mual dan muntah KI : Penyakit hati aktif atau peningkatan transaminase serum persisten yang tidak dapat dijelaskan PERHATIAN : Kewaspadaan khusus pada pasien: Pasien dengan diabetes mellitus Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :
--	---

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : mas mau ngambil obat ini ada?

TTK : ada bu, mau diambil semua?

P : berapa ya mas kalau semua?

TTK : diresep mintanya 3 strip bu , 1 stripnya 2.500 jadi kalau 3 7,500, bagaimana?

P : ya diambil semua saja mas

TTK : baik bu, (sambil mengambikan obat) ini ya bu obat untuk kolestrolnya , ini diminum sehari 1x sebelum tidur ya bu

P : Cuma 1 kali ya mas, oke mas (memberikan uang) terimakasih ya ms


TT : baik bu , sama-sama

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

R/ simvastatin 20 no.xxx

S 0-0-1

-----det-----

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																								
4	<p>Jenis Resep : Salinan</p> <p>Resep obat : non racikan</p> <p>Jumlah obat dalam resep : Tidak</p> <p>Pengulangan resep : Neiter</p> <p>Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="862 370 1729 1190"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ny kumani</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Kenalog orabase</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Salep</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Dioleskan secukupnya</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>17/03/2023</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Dr. Rudianto. Sp. PD</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <table border="1" data-bbox="862 1310 1915 1369"> <tr> <td>R/ Kenalog in orabase no.1</td> </tr> </table> <p>c. Perhitungan biaya resep</p>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ny kumani	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Kenalog orabase	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Salep	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Dioleskan secukupnya	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	17/03/2023	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Rudianto. Sp. PD	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	-	R/ Kenalog in orabase no.1
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ny kumani																																								
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-																																								
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-																																								
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Kenalog orabase																																								
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-																																								
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Salep																																								
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1																																								
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																								
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Dioleskan secukupnya																																								
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	17/03/2023																																								
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Rudianto. Sp. PD																																								
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																								
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	-																																								
R/ Kenalog in orabase no.1																																										

Kenalog in orbase 75.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

Dioleskan 3 kali
secukupnya
(tipis-tipis)

e. *Product knowledge*

Nama Obat : kenalog in orbase

Kandungan : Triamcinolone acetonide

Dosis lazim : 1 mg

Kegunaan : Triamcinolone acetonide

ESO potensial : Supresi adrenal,
perubahan metabolisme glukosa,
katabolisme protein, aktivasi tukak
peptik.

KI : Hipersensitivitas.
Infeksi jamur atau bakteri pada mulut
atau tenggorokan. Lesi herpes yang

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

diketahui berasal dari virus atau lesi intraoral.

PERHATIAN : Hati-hati penggunaan pada pasien TB kulit, tukak lambung dan Diabetes Miletus.

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaba

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : mas mau nebus reseo ini ada ?

TTK ; ada bu, untuk sariawan?

P ; iya mas dilidah

TTK : (sambil mengambil salepnya) ini bu berbentuk salep nya nanti dioleskan di sariawannya langsung gapapa

P : kalau tertelan bagaimana mas?

		<p>TTK : aman bu kalau tertelan, sama atauran pakainya dioleskan dibagian yang sakit sehari 3 kali secukupnya saja ya</p> <p>h. Salinan resep (wajib dikerjakan)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>R/ Kenalog in orbase no.1 S 3.u.e -----det-----</p> </div>
--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep															
5	<p>Jenis Resep : Salinan</p> <p>Resep obat : non racikan</p> <p>Jumlah obat dalam resep : Tidak</p> <p>Pengulangan resep : Neiter</p> <p>Tempel Resep/salin resep disini!</p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="862 1173 1729 1476"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tn sugeng</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Relaxon</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Tn sugeng	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Relaxon	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Tn sugeng															
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-															
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-															
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Relaxon															
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-															



Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	30
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Sehari 1 kali
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	14/03/2023
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Iamatul ulya. Sp.N
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ Relaxon tablet no xxx
S 1 dd 1

c. Perhitungan biaya resep

Relaxon 1 strip (10 tablet) : 15.000 x 3 : 45.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Sehari 1 kali
sesudah makan

Nama Obat/warna etiket :

e. *Product knowledge*

Nama Obat : relaxon	Nama Obat :
Kandungan : eperisone	Kandungan :
Dosis lazim : 50 mg	Dosis lazim :
Kegunaan : kejang otot	Kegunaan :
ESO potensial : ruam, kantuk dan gemetar	ESO potensial :
KI : hipersentif dan ibu hamil	KI :
PERHATIAN : tidak boleh untuk ibu menyusui	PERHATIAN :
Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban	Cara penyimpanan :


f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : mas ambil obat ini ada?
 TTK : ada bu, mau diambil semua?

		<p>P ; 1 strip berapa mas? TTK : 15.000 bu, diresep minta 3 strip jadi 45.000 P : sesuai resep saja mas TTK : baik bu (sambil menagmbilkan obat) ini bu obatnya, dan diminum sehari 1 kali saja kalau bisa pagi hari saja P : oke mas, ini uangnya (pasien memberikan uang nya) terimakasih ya mas TTK : baik bu sama-sama</p> <p>h. Salinan resep (wajib dikerjakan)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>R/ Relaxon tab no.xxx s 1 dd 1 -----det-----</p> </div>
--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																											
6	<p>Jenis Resep : Resep asli Resep obat : non racikan Jumlah obat dalam resep : Tidak Pengulangan resep : Iter 2 kali Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>An mohammad julian</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada</td> <td>13 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Permethin</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada</td> <td>Salep</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada</td> <td>Scabimate</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>Oleskan seluruh tubuh</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	An mohammad julian	Umur pasien :	Ada	13 tahun	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Permethin	Kekuatan :	Ada	5%	Bentuk sed. :	Ada	Salep	Jumlah obat :	Ada	1	Duplikasi terapi :	Ada	Scabimate	Aturan pakai :	Ada	Oleskan seluruh tubuh
Nama Pasien :	Ada	An mohammad julian																											
Umur pasien :	Ada	13 tahun																											
Berat Badan :	Tidak Ada	-																											
Nama Obat :	Ada	Permethin																											
Kekuatan :	Ada	5%																											
Bentuk sed. :	Ada	Salep																											
Jumlah obat :	Ada	1																											
Duplikasi terapi :	Ada	Scabimate																											
Aturan pakai :	Ada	Oleskan seluruh tubuh																											

Tanggal penulisan resep :	Ada	16/01/2023
Nama dokter :	Ada	Dr ita maftuhah
Surat ijin :	Ada	124/SIP.DU/VII/2017
Alamat dr. :	Ada	Puskesmas karangbinangun

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ permetin cream 5% no.1
s.u.e

c. Perhitungan biaya resep

Scabimate cream 72.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : biru

Nama Obat/warna etiket :

Dioleskan secukupnya
(seluruh tubuh)

e. Product knowledge

Nama Obat : scabimate	Nama Obat :
Kandungan : permethin	Kandungan :
Dosis lazim : 5%	Dosis lazim :
Kegunaan : scabies	Kegunaan :
ESO potensial : rasa seperti terbakar	ESO potensial :
KI : hipersensitif	KI :
PERHATIAN : hindari terkena mata	PERHATIAN :
Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban	Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : mas mau mengambil obat ini ada?

TTK : ada bu, tapi mereknya scabimite kandungannya sama seperti resep bagaimana?

P : tapi sama ya mas

TTK : (sambil mengambilkan salepnya) ini bu salepnya terdapat kandungan permethrin disalepnya, ini untuk anaknya ya bu?

P : ini mas habis dari pondok

TTK : iya bu biasanya pakai ini sudah bisa, bagaimana?

P : berapa mas ?

TTK : 72.000 bu

P : yaudah itu saja mas

TTK : baik bu, ini aturan pakai nya dipakai setelah mandi atau badan bersih lalu dioleskan ke seluruh tubuh dan oles tipis-tipis ya bu, iya bu sama ini kan resepnya bisa diulang sampai 3x ini kan sudah diambil 1 jadi tinggal 2 ya bu

P : baik mas, ini uangnya ya (sambil memberikan uang)terimakasih ya mas

TTK : baik bu , sama-sama

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)


Iter 1x

R/ permethin cream 5% no.1

s.u.e

-----da scabimate-----

--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
7	<p>Jenis Resep : Salinan</p> <p>Resep obat : non racikan</p> <p>Jumlah obat dalam resep : Tidak</p> <p>Pengulangan resep : Neiter</p> <p>Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="864 552 1733 1370"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Ny mulyati</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Relaxon</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada</td> <td>50 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>Sehari 1 kali</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada</td> <td>04/10/2022</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada</td> <td>Dr lanatul ulya. Sp.N</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p>	Nama Pasien :	Ada	Ny mulyati	Umur pasien :	Tidak Ada	-	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Relaxon	Kekuatan :	Ada	50 mg	Bentuk sed. :	Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada	30	Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada	Sehari 1 kali	Tanggal penulisan resep :	Ada	04/10/2022	Nama dokter :	Ada	Dr lanatul ulya. Sp.N	Surat ijin :	Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Tidak Ada	-
Nama Pasien :	Ada	Ny mulyati																																							
Umur pasien :	Tidak Ada	-																																							
Berat Badan :	Tidak Ada	-																																							
Nama Obat :	Ada	Relaxon																																							
Kekuatan :	Ada	50 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada	Tablet																																							
Jumlah obat :	Ada	30																																							
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada	Sehari 1 kali																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada	04/10/2022																																							
Nama dokter :	Ada	Dr lanatul ulya. Sp.N																																							
Surat ijin :	Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Tidak Ada	-																																							

R. Relaxon tab no.xxx
s 1 dd 1

c. Perhitungan biaya resep

Relaxon 1 strip (10 tablet) : 15.000 x 3 : 45.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

Sehari 1 kali
sesudah makan

e. *Product knowledge*

Nama Obat : relaxon

Kandungan : eperisone

Dosis lazim : 50 mg

Kegunaan : kejang otot

ESO potensial : ruam, kantuk dan
gemetar

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

KI : hipersentif dan ibu hamil

PERHATIAN : tidak boleh untuk ibu menyusui

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)


1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

		<p>P : mas ambil obat ini ada? TTK : ada bu, mau diambil semua? P ; 1 strip berapa mas? TTK : 15.000 bu, diresep minta 3 strip jadi 45.000 P : sesuai resep saja mas TTK : baik bu (sambil menagmbilkan obat) ini bu obatnya, dan diminum sehari 1 kali saja kalau bisa pagi hari saja P : oke mas, ini uangnya (pasien memberikan uang nya) terimakasih ya mas TTK : baik bu sama-sama</p> <p>h. Salinan resep (wajib dikerjakan)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>R/ Relaxon tab no.xxx s 1 dd 1 -----det-----</p> </div>
--	--	---

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep		
8	Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan	A. Skrinning Administrasi		
		Nama Pasien :	Ada	Ny mulyati

Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak
 Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter
 Tempel Resep/salin resep disini!



Umur pasien :	Tidak Ada	-
Berat Badan :	Tidak Ada	-
Nama Obat :	Ada	Relaxon
Kekuatan :	Ada	50 mg
Bentuk sed. :	Ada	Tablet
Jumlah obat :	Ada	30
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada	Sehari 1 kali
Tanggal penulisan resep :	Ada	13/2/2022
Nama dokter :	Ada	Dr lanatul ulya. Sp.D
Surat ijin :	Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Tidak Ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ Relaxon tab no.xxx
 s 1 dd 1

c. Perhitungan biaya resep

Relaxon 1 strip (10 tablet) : 15.000 x 3 : 45.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Sehari 1 kali
sesudah makan

Nama Obat/warna etiket :

e. Product knowledge

Nama Obat : relaxon

Kandungan : eperisone

Dosis lazim : 50 mg

Kegunaan : kejang otot

ESO potensial : ruam, kantuk dan gemetar

KI : hipersentif dan ibu hamil

PERHATIAN : tidak boleh untuk ibu menyusui

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : mas ambil obat ini ada?

TTK : ada bu, mau diambil semua?

P ; 1 strip berapa mas?

TTK : 15.000 bu, diresep minta 3 strip jadi 45.000

P : sesuai resep saja mas

TTK : baik bu (sambil menagmbilkan obat) ini bu obatnya, dan diminum sehari 1 kali saja kalau bisa pagi hari saja

P : oke mas, ini uangnya (pasien memberikan uang nya) terimakasih ya mas


TTK : baik bu sama-sama

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

R/ Relaxon tab no.xxx

s 1 dd 1

-----det-----

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep		
9	Jenis Resep : Resep asli Resep obat : non racikan Jumlah obat dalam resep : Tidak Pengulangan resep : Neiter Tempel Resep/salin resep disini! 	A. Skrinning Administrasi		
		Nama Pasien :	Ada	An afif
		Umur pasien :	Ada	8 tahun
		Berat Badan :	Tidak Ada	-
		Nama Obat :	Ada	Forumen
		Kekuatan :	Tidak Ada	-
		Bentuk sed. :	Ada	Drop
		Jumlah obat :	Ada	1

Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada	3 kali 2 tetes
Tanggal penulisan resep :	Ada	21/11/2022
Nama dokter :	Tidak Ada	-
Surat ijin :	Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Tidak Ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ Forumen tetes telinga
S 3 dd 2 tetes

c. Perhitungan biaya resep

Forumen tetes telinga 1 fls : 35.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

3 kali 2 tetes

Nama Obat/warna etiket :

e. *Product knowledge*

Nama Obat : forumen	Nama Obat :
Kandungan : docusate 5 mg	Kandungan :
Dosis lazim : 5 mg	Dosis lazim :
Kegunaan : untuk membersihkan telinga	Kegunaan :
ESO potensial : tersengat atau nyeri	ESO potensial :
KI : inflamasi pada telinga	KI :
PERHATIAN : tidak boleh digunakan 2 hari berturut-turut	PERHATIAN :
Cara penyimpanan Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban	Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : mas ambil obat ini ada?

TTK : ada bu, untuk membersihkan kotoran telinga ya bu?

P : iya mas, berapa ya mas?

TTK : 35.000 bu

P : oke boleh mas

TTK : baik bu (sambil menagmbilkan obat) ini bu obatnya, ditetaskan ke telinga 3 kali 2 tetes ya bu

P : oke mas, ini uangnya (pasien memberikan uang nya) terimakasih ya mas

TTK : baik bu sama-sama

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)


R/ Forumen tetes telinga

S 2 dd 2 tetes

-----det-----

--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																				
10	Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!	A. Skrinning Administrasi <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tn ifatun</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>22 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Bioplaceton cream</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Salep</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Secukupnya</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>5/12/2022</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Dr. Ita maftuhah</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>124/SIP.DU/VII/2017</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Tn ifatun	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	22 tahun	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Bioplaceton cream	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Salep	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Secukupnya	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	5/12/2022	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Ita maftuhah	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	124/SIP.DU/VII/2017
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Tn ifatun																																				
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	22 tahun																																				
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-																																				
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Bioplaceton cream																																				
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-																																				
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Salep																																				
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1																																				
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																				
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Secukupnya																																				
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	5/12/2022																																				
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Ita maftuhah																																				
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	124/SIP.DU/VII/2017																																				



Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Puskesmas karangbinangun
--------------	---------------	--------------------------

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ Bioplacenton cream no.1 s.u.e

c. Perhitungan biaya resep

Bioplacenton cream : 22.0000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : biru

Nama Obat/warna etiket :

Dioleskan pada bagian yang sakit
(secukupnya)

e. Product knowledge

Nama Obat : bioplacenton cream	Nama Obat : Kandungan :
--------------------------------	----------------------------

Kandungan : placenta extract 10%
neomycin sulfate 0,5%

Dosis lazim : -

Kegunaan : luka bakar, luka infeksi

ESO potensial : kemerahan

KI : hipersensitif placenta
extract dan neomycin sulfate

PERHATIAN : jangan berikan
bioplacenton pada area mata

Cara penyimpanan : Simpan di bawah
suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat,
kering, dan terlindung dari cahaya dan
kelembaban

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : permisi mas, apa kah ada obat sesuai dengan di resep?

TTK : ada bu, untuk luka bakar ya

P : iya mas habis terkena knalpot kaki saya

TTK : (TTK mengambilkan obat) ini bu salepnya , nanti kaki yang terkena knalpot harus dibersihkan lalu dioleskan salep ini tipis-tipis ya bu

P : oke mas, berapa ya?

TTK : 22.000 Bu

P ; ini ya mas uangnya (sambil memberikan uangnya) terimakasih ya mas


TTK : sama-sama ya bu

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

R/ Bioplacenton cream no.1

s.u.e

-----det-----

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
11	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli</p> <p>Resep obat : Racikan/non racikan</p> <p>Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak</p> <p>Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter</p> <p>Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="864 371 1731 1230"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Ny disah</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada</td> <td>53 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Sucralfate syr</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada</td> <td>Syr</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>3 x cth 1 sebelum makan</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada</td> <td>07/10/2022</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada</td> <td>Dr. Ita maftuhah</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada</td> <td>124/SIP.DU/VII/2017</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada</td> <td>Puskesmas karangbinangun</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Ny disah	Umur pasien :	Ada	53 tahun	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Sucralfate syr	Kekuatan :	Tidak Ada	-	Bentuk sed. :	Ada	Syr	Jumlah obat :	Ada	1	Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada	3 x cth 1 sebelum makan	Tanggal penulisan resep :	Ada	07/10/2022	Nama dokter :	Ada	Dr. Ita maftuhah	Surat ijin :	Ada	124/SIP.DU/VII/2017	Alamat dr. :	Ada	Puskesmas karangbinangun
Nama Pasien :	Ada	Ny disah																																							
Umur pasien :	Ada	53 tahun																																							
Berat Badan :	Tidak Ada	-																																							
Nama Obat :	Ada	Sucralfate syr																																							
Kekuatan :	Tidak Ada	-																																							
Bentuk sed. :	Ada	Syr																																							
Jumlah obat :	Ada	1																																							
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada	3 x cth 1 sebelum makan																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada	07/10/2022																																							
Nama dokter :	Ada	Dr. Ita maftuhah																																							
Surat ijin :	Ada	124/SIP.DU/VII/2017																																							
Alamat dr. :	Ada	Puskesmas karangbinangun																																							

	<p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">R/ sucralfate syr no.1 s 3 dd cth 1 ac</div> <p>c. Perhitungan biaya resep</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">sucralfate syr 1 fls : 15.000</div> <p>d. ETIKET</p> <table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">Nama Obat /warna etiket : putih</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">Nama Obat/warna etiket :</td></tr><tr><td style="border: 1px solid green; padding: 10px; text-align: center;">3 x 1 cth sebelum makan</td><td style="border: 1px solid green; height: 100px;"></td></tr></table> <p>e. <i>Product knowledge</i></p> <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">Nama Obat : sucralfate Kandungan : sucralfate Dosis lazim : 500 mg Kegunaan : asam lambung ESO potensial : diare, mual dan muntah KI : reaksi alergi</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI :</td></tr></table>	Nama Obat /warna etiket : putih	Nama Obat/warna etiket :	3 x 1 cth sebelum makan		Nama Obat : sucralfate Kandungan : sucralfate Dosis lazim : 500 mg Kegunaan : asam lambung ESO potensial : diare, mual dan muntah KI : reaksi alergi	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI :
Nama Obat /warna etiket : putih	Nama Obat/warna etiket :						
3 x 1 cth sebelum makan							
Nama Obat : sucralfate Kandungan : sucralfate Dosis lazim : 500 mg Kegunaan : asam lambung ESO potensial : diare, mual dan muntah KI : reaksi alergi	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI :						

PERHATIAN : hati-hati pada wanita hamil

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)


P : mas mau nebus resep ini, ada kah?

		<p>TTK : ada bu, untuk asam lambung ya P : iya mas, berapa ya TTK : 1 fls nya 15.000 bu P : yauah mas 1 aja TTK : baik bu (ttk mengabilkan obat tersbut) ini ya bu sirupnya, nanti kalau sebelum makan sekitar 30 menit atau 1 jam diminum dulu agar lambung dilapis i oleh sirup ini P : kalau habis makan bagaimana mas? Saolnya saja barusan makan TTK : ya sama bu ditunggu 30 menit atau 1 jam baru minum obat ini P : oke mas ini ya uang ya (memberikan uang) terimakasih ya mas TTK : baik bu, sama-sama</p> <p>h. Salinan resep (wajib dikerjakan)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>R/ sucralfate syr no.1 s 3 dd 1 cth ac -----det-----</p> </div>
--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep						
12	Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak	A. Skrinning Administrasi <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama Pasien :</td> <td style="width: 20%;">Ada</td> <td style="width: 50%;">Ny mardiyah</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada</td> <td>53 tahun</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Ny mardiyah	Umur pasien :	Ada	53 tahun
Nama Pasien :	Ada	Ny mardiyah						
Umur pasien :	Ada	53 tahun						

Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter

Tempel Resep/salin resep disini!



Berat Badan :	Tidak Ada	-
Nama Obat :	Ada	Clindamycin, becom c
Kekuatan :	Ada	150 mg
Bentuk sed. :	Ada	Tablet
Jumlah obat :	Ada	10
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada	Sehari 2 x 1 sehari 1 x x
Tanggal penulisan resep :	Ada	30/08/2022
Nama dokter :	Ada	Dr maya
Surat ijin :	Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Tidak Ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ clindamycin 150 no.x
s 2 dd 1
R/ Becom c no.x
s 1 dd 1

c. Perhitungan biaya resep

Clindamycin 10.000
becom c 20.000
total 30.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket :
clindamycin /putih

Nama Obat /warna etiket :
becom c / putih

2 x 1
dihabiskan

1 x1
vitamin

e. Product knowledge

Nama Obat : clindamycin
Kandungan : clindamycin
Dosis lazim : 150 - 300
Kegunaan : infeksi
ESO potensial : diare sakit perut
KI : hipersentif

Nama Obat : becom c
Kandungan : Vitamin B1 50 mg,
Vitamin B2 25 mg, Vitamin B6 10 mg,
Vitamin B12 5 mcg, Vitamin C 500 mg,
Nicotinamide 100 mg, Asam pantotenat
18.4 mg
Dosis lazim : -

PERHATIAN : anak-anak ibu hamil dan menyusui

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

Kegunaan : multivitamin

ESO potensial : -

KI : hipersensitif vitamin c

PERHATIAN : Bila penderita mengeluh karena gangguan lambung, lebih baik dimulai dengan 1/2 kaplet sehari sesudah makan

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : mas mau mengambil reseo ini ada?

TTK : ada bu

P : itu untuk apa ya mas?

TTK : ini ada antibiotik sama multivitamin bu

P : oh baik mas berapa ya?

TTK : 30.000 Bu semuanya. Untuk antibiotik yang clindamycin ya sehari 2 kali sehari dan harus dihabiskan kalau yang multivitamin ada becom c ini diminum sehari satu kali saja bu, ibunya ada asam lambung?

P : tidak ada mas

TTK : ya kalau begitu diminum setelah makan bisa pagi atau sore

P : oke mas ini uang ya

TTK : baik bu terimakasih

P : sama-sama

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

R/ clindamycin 150 no.x

s 2 dd 1


-----det-----

R/ becom c no x

s 1 dd 1

-----det-----

--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																														
13	Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini! 	A. Skrinning Administrasi <table border="1" data-bbox="869 842 1731 1479"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Dwike junita</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada</td> <td>18 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Sucraltafe syr</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada</td> <td>Syr</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>3 x 1 sendok</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada</td> <td>12/10/2022</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Dwike junita	Umur pasien :	Ada	18 tahun	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Sucraltafe syr	Kekuatan :	Tidak Ada	-	Bentuk sed. :	Ada	Syr	Jumlah obat :	Ada	1	Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada	3 x 1 sendok	Tanggal penulisan resep :	Ada	12/10/2022
Nama Pasien :	Ada	Dwike junita																														
Umur pasien :	Ada	18 tahun																														
Berat Badan :	Tidak Ada	-																														
Nama Obat :	Ada	Sucraltafe syr																														
Kekuatan :	Tidak Ada	-																														
Bentuk sed. :	Ada	Syr																														
Jumlah obat :	Ada	1																														
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-																														
Aturan pakai :	Ada	3 x 1 sendok																														
Tanggal penulisan resep :	Ada	12/10/2022																														

Nama dokter :	Ada	Dr ita maftuhah
Surat ijin :	Ada	124/SIP.DU/VII/2017
Alamat dr. :	Ada	Puskesmas karangbinangun

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ sucralfate syr no.1

c. Perhitungan biaya resep

Sucralfate 1 fls 15.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

3 x 1 sendok
sebelum makan

e. *Product knowledge*

Nama Obat : sucralfate
Kandungan : sucralfate
Dosis lazim : 500 mg

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :

<p>Kegunaan : asam lambung</p> <p>ESO potensial : diare, mual dan muntah</p> <p>KI : reaksi alergi</p> <p>PERHATIAN : hati-hati pada wanita hamil</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>	<p>Kegunaan :</p> <p>ESO potensial :</p> <p>KI :</p> <p>PERHATIAN :</p> <p>Cara penyimpanan :</p>
--	---

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : mas mau nebus resep ini, ada kah?

TTK : ada bu, untuk asam lambung ya

P : iya mas, berapa ya

TTK : 1 fls nya 15.000 bu

P : yauah mas 1 aja

TTK : baik bu (ttk mengabilkan obat tersbut) ini ya bu sirupnya, nanti kalau sebelum makan sekitar 30 menit atau 1 jam diminum dulu agar lambung dilapis i oleh sirup ini

P : kalau habis makan bagaimana mas? Saolnya saja barusan makan

TTK : ya sama bu ditunggu 30 menit atau 1 jam baru minum obat ini

P : oke mas ini ya uang ya (memberikan uang) terimakasih ya mas

TTK : baik bu, sama-sama


h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

R/ sucralate syr no.1

S 3 dd 1 C1

-----det-----

--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
14	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli</p> <p>Resep obat : Racikan/non racikan</p> <p>Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak</p> <p>Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter</p> <p>Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="864 491 1731 1311"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Tn huda</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Piracetam</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada</td> <td>1200 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>Satu kali malam hari</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada</td> <td>14/12/2022</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada</td> <td>Dr lanatul. Sp.N</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p>	Nama Pasien :	Ada	Tn huda	Umur pasien :	Tidak Ada	-	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Piracetam	Kekuatan :	Ada	1200 mg	Bentuk sed. :	Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada	30	Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada	Satu kali malam hari	Tanggal penulisan resep :	Ada	14/12/2022	Nama dokter :	Ada	Dr lanatul. Sp.N	Surat ijin :	Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Tidak Ada	-
Nama Pasien :	Ada	Tn huda																																							
Umur pasien :	Tidak Ada	-																																							
Berat Badan :	Tidak Ada	-																																							
Nama Obat :	Ada	Piracetam																																							
Kekuatan :	Ada	1200 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada	Tablet																																							
Jumlah obat :	Ada	30																																							
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada	Satu kali malam hari																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada	14/12/2022																																							
Nama dokter :	Ada	Dr lanatul. Sp.N																																							
Surat ijin :	Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Tidak Ada	-																																							

R/ Piracetam 1200 mg no.xxx

c. Perhitungan biaya resep

Piracetam 1200 mg (10 tablet) 13.000 x 3 = 39.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

1 kali malam hari

e. *Product knowledge*

Nama Obat : piracetam

Kandungan :piracetam

Dosis lazim : 1200

Kegunaan : cedera serebvaskuler akut

ESO potensial : gugup, rasa lelah

KI : -

PERHATIAN : gangguna fungsi hati , ibu hamil

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)


1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harg

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

		<p>P : mas mau beli resep ini, ada? TTK : ada pak, ini diambil semua? P : iya pak semua buat 1 bulan TTK : baik pak, totalnya 39.000 ya dan minumnya sehari 1 kali malam hari ya pak P : iya mas, ini uangnya TTK : baik pak, terimakasih P : sama-sama</p> <p>h. Salinan resep (wajib dikerjakan)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>R/ Piracetam 1200mg no.xxx S 0-0-1 -----det-----</p> </div>
--	--	---

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep			
15	Jenis Resep : salinan Resep obat : non racikan	A. Skrinning Administrasi <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama Pasien :</td> <td style="width: 30%;">Ada</td> <td style="width: 40%;">Nn roudlotul</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Nn roudlotul
Nama Pasien :	Ada	Nn roudlotul			

Jumlah obat dalam resep : Tidak
 Pengulangan resep : Neiter
 Tempel Resep/salin resep disini!



Umur pasien :	Tidak Ada	-
Berat Badan :	Tidak Ada	-
Nama Obat :	Ada	Curcuma
Kekuatan :	Tidak Ada	-
Bentuk sed. :	Ada	Tablet
Jumlah obat :	Ada	20
Duplikasi terapi :	Ada	Curvit
Aturan pakai :	Ada	2 x 1
Tanggal penulisan resep :	Ada	02/04/2022
Nama dokter :	Ada	Dr. Nubli
Surat ijin :	Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Tidak Ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ Curcuma no.xx

c. Perhitungan biaya resep

Curvit 1 strip 21.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

2 x 1

e. Product knowledge

Nama Obat : curvit	Nama Obat :
Kandungan : Vit.B1 3 mg, Vit.B2 2 mg, Vit.B6 5 mg, Vit.B12 5 mcg, Beta-carotene 10% 400 mcg, Ca pantothenate/Dexpanthenol 3 mg, Ca gluconate 300 mg, Curcuminoid 2 mg.	Kandungan :
Dosis lazim : -	Dosis lazim :
Kegunaan : penambah nafsu makan	Kegunaan :
ESO potensial : -	ESO potensial :
KI : Hipersensifitas	KI :
PERHATIAN : Hentikan jika muncul alergi	PERHATIAN :
Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban	Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P :mas mau nebus resep ini ada?

TTK : adanya merek lain bu, khasiatnya sama dan ada multivitaminnya juga. Bagaimana?

P : untuk apa mas ini resepnya?

TTK : penambah nafsu makan bu

P : coba 1 strip bisa?

TTK : bisa bu

P : kena berapa mas?

TTK : 22.000 bu

P : ya satu saja mas

TTK : baik bu (sambil mengambilkan obatnya) ini bu obatnya dan minumnya sehari 2 kali ya sesudah makan

P : baik mas, ini uangnya (sambil memberikan uang)

TTK : baik bu, terimakasih ya

P : sama-sama mas


h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

R/ Curcuma no.xx

S. 2. 11.1



No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																								
16	Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!	A. Skrinning Administrasi <table border="1" data-bbox="862 1023 1731 1498"> <tr> <td data-bbox="862 1023 1131 1082">Nama Pasien :</td> <td data-bbox="1131 1023 1355 1082">Ada</td> <td data-bbox="1355 1023 1731 1082">Dayinta</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 1082 1131 1141">Umur pasien :</td> <td data-bbox="1131 1082 1355 1141">Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 1082 1731 1141">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 1141 1131 1200">Berat Badan :</td> <td data-bbox="1131 1141 1355 1200">Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 1141 1731 1200">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 1200 1131 1259">Nama Obat :</td> <td data-bbox="1131 1200 1355 1259">Ada</td> <td data-bbox="1355 1200 1731 1259">Amoxilliin, paracetamol</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 1259 1131 1318">Kekuatan :</td> <td data-bbox="1131 1259 1355 1318">Ada</td> <td data-bbox="1355 1259 1731 1318">500, 500</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 1318 1131 1377">Bentuk sed. :</td> <td data-bbox="1131 1318 1355 1377">Ada</td> <td data-bbox="1355 1318 1731 1377">Tablet</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 1377 1131 1436">Jumlah obat :</td> <td data-bbox="1131 1377 1355 1436">Ada</td> <td data-bbox="1355 1377 1731 1436">10</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 1436 1131 1498">Duplikasi terapi :</td> <td data-bbox="1131 1436 1355 1498">Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 1436 1731 1498">-</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Dayinta	Umur pasien :	Tidak Ada	-	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Amoxilliin, paracetamol	Kekuatan :	Ada	500, 500	Bentuk sed. :	Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada	10	Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
Nama Pasien :	Ada	Dayinta																								
Umur pasien :	Tidak Ada	-																								
Berat Badan :	Tidak Ada	-																								
Nama Obat :	Ada	Amoxilliin, paracetamol																								
Kekuatan :	Ada	500, 500																								
Bentuk sed. :	Ada	Tablet																								
Jumlah obat :	Ada	10																								
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-																								



Aturan pakai :	Ada	3x1 3x1
Tanggal penulisan resep :	Ada	19/11/2022
Nama dokter :	Ada	Dr siti mutmainah
Surat ijin :	Ada	19660104 1932002
Alamat dr. :	Ada	RSUD Dr.Soegiri

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ amoxillin no.x
R/ paracetamol no.x

c. Perhitungan biaya resep

Amoxillin 5.000
Paracetamol 3.000
Total 8.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket :
Amoxillin / putih

Nama Obat/warna etiket :
paracetamol / putih

3 X 1
sesudah makan
dihabiskan

3 x 1
sesudah makan

e. *Product knowledge*

<p>Nama Obat : Amoxillin Kandungan : amoxillin Dosis lazim : 500 mg Kegunaan : antibiotik ESO potensial : Mual, diare, muntah, perubahan warna gigi KI : Hipersensitivitas atau riwayat reaksi alergi berat PERHATIAN : Hati-hati penggunaan pada pasien dengan penurunan produksi urin, riwayat kejang, epilepsi yang diobati atau gangguan meningeal, leukemia limfatik, individu atopik, Gangguan ginjal dan hati, Anak-anak, ibu hamil dan menyusui Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>	<p>Nama Obat : Paracetamol Kandungan :Paracetamol Dosis lazim : 500 Kegunaan : demam ESO potensial : kerusakan fungsi hati. - Reaksi hipersensitifitas/ alergi KI : Hati-hati penggunaan pada pasien dengan gagal ginjal, gangguan fungsi hati, dan alergi atau mengalami hipersensitivitas terhadap paracetamol. Kategori kehamilan : Kategori B: Mungkin dapat digunakan oleh wanita hamil. Penelitian pada hewan uji tidak memperlihatkan adanya risiko terhadap janin, namun belum ada bukti penelitian langsung terhadap wanita hamil. PERHATIAN : Hati-hati penggunaan pada pasien dengan gagal ginjal, gangguan fungsi hati, dan alergi atau mengalami hipersensitivitas terhadap paracetamol. Kategori kehamilan : Kategori B: Mungkin dapat digunakan oleh wanita hamil. Penelitian pada hewan uji tidak memperlihatkan ada</p>
--	---

			<p>nya risiko terhadap janin, namun belum ada bukti penelitian langsung terhadap wanita hamil.</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p> <p>f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)</p> <div data-bbox="875 703 1899 1153" style="border: 1px solid green; padding: 10px;"><ol style="list-style-type: none">1. Resep diterima dan diskriming2. mengambilkan obat sesuai resep3. memberian informasi obat4. memberi harga</div> <p>g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>p : mas mau ambil resep ini ada? Ttk : ada bu, diambil semua bu? p : iya mas ttk : untuk demam ya bu? p : iya mas sudah 3 hari ttk : iya bu, sebentar ya saya ambilkan dulu</p>
--	--	--	---

p : iya mas
ttk : ini bu obatnya, dapat 2 obat yang ini untuk demam yang satunya untuk antibiotiknya. Untuk yang antibiotic harus dihabiskan ya untuk 3 hari
p : oke mas berapa ya?
ttk : semuanya 10,000 bu
p : ini mas uangnya
ttk : baik bu terimakasih
p : sama-sama

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

R/ amoxillin no.x
s 3 dd 1

-----det-----

R/ paracetamol no.x
s 3 dd 1

-----det-----

--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
17	<p>Jenis Resep : Resep asli</p> <p>Resep obat : non racikan</p> <p>Jumlah obat dalam resep : Tidak</p> <p>Pengulangan resep : Neiter</p> <p>Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="862 606 1736 1412"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Ny Jamilah</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada</td> <td>56 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Sodium heparin</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada</td> <td>Gel</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada</td> <td>Thrombophop gel</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>Sehari 3 kali</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada</td> <td>27/02/2022</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada</td> <td>Dr ifa maftuhah</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada</td> <td>124/SIP.DU/VII/2017</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada</td> <td>Puskesmas karangbinangun</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Ny Jamilah	Umur pasien :	Ada	56 tahun	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Sodium heparin	Kekuatan :	Tidak Ada	-	Bentuk sed. :	Ada	Gel	Jumlah obat :	Ada	1	Duplikasi terapi :	Ada	Thrombophop gel	Aturan pakai :	Ada	Sehari 3 kali	Tanggal penulisan resep :	Ada	27/02/2022	Nama dokter :	Ada	Dr ifa maftuhah	Surat ijin :	Ada	124/SIP.DU/VII/2017	Alamat dr. :	Ada	Puskesmas karangbinangun
Nama Pasien :	Ada	Ny Jamilah																																							
Umur pasien :	Ada	56 tahun																																							
Berat Badan :	Tidak Ada	-																																							
Nama Obat :	Ada	Sodium heparin																																							
Kekuatan :	Tidak Ada	-																																							
Bentuk sed. :	Ada	Gel																																							
Jumlah obat :	Ada	1																																							
Duplikasi terapi :	Ada	Thrombophop gel																																							
Aturan pakai :	Ada	Sehari 3 kali																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada	27/02/2022																																							
Nama dokter :	Ada	Dr ifa maftuhah																																							
Surat ijin :	Ada	124/SIP.DU/VII/2017																																							
Alamat dr. :	Ada	Puskesmas karangbinangun																																							

	<p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <p>R/ Thrombophop gel no 1</p> <p>c. Perhitungan biaya resep</p> <p>Thrombopop gel 74.000</p> <p>d. ETIKET</p> <p>Nama Obat /warna etiket : biru</p> <p>Nama Obat/warna etiket :</p> <p>3 kali sehari dioleskan secukupnya pada yang terluka</p> <p>e. <i>Product knowledge</i></p> <table border="1"><tr><td>Nama Obat : thombopop gel Kandungan : heparin sodium Dosis lazim :- Kegunaan : Obat ini digunakan untuk flebitis superfisial, penyempitan pembuluh vena, cedera karena olahraga dan kecelakaan.</td><td>Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI :</td></tr></table>	Nama Obat : thombopop gel Kandungan : heparin sodium Dosis lazim :- Kegunaan : Obat ini digunakan untuk flebitis superfisial, penyempitan pembuluh vena, cedera karena olahraga dan kecelakaan.	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI :
Nama Obat : thombopop gel Kandungan : heparin sodium Dosis lazim :- Kegunaan : Obat ini digunakan untuk flebitis superfisial, penyempitan pembuluh vena, cedera karena olahraga dan kecelakaan.	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI :		

ESO potensial : reaksi alergi
KI : luka terbuka
PERHATIAN : tidak boleh dioleskan pada luka yang terbuka
Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

PERHATIAN :
Cara penyimpanan :


f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

		<p>g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>p : mas mau ngambil resep ini ada ?</p> <p>ttk : adanya merek lain bu, kalau yang generic agak susah atau hampir ga ada</p> <p>p : tapi khasiatnya sama ya mas?</p> <p>ttk : sama bu, ini merek dagangnya (ttk sambal mengambil gel tersebut) seperti ini bu, kandungan nya sama untuk bengkak ya bu</p> <p>p : iya mas, ini penggunaanya bagaimana ya?</p> <p>ttk : dioles kebagian yang sakit saja bisa bu, luka nya terbuka bu?</p> <p>p : tidak mas, Cuma bengkak</p> <p>ttk : iya bu bisa pakai ini</p> <p>p : berapa mas?</p> <p>ttk : 74.000 bu</p> <p>p : yaudah ini saja mas</p> <p>ttk : baik bu, untuk aturan pakainya sehari 3x ya dioleskan secukupnya pada bagian yang sakit saja</p> <p>p : baik mas (sambal memberikan uangnya)</p> <p>ttk : baik bu, terimakasih</p> <p>p : sama-sama mass</p> <p>h. Salinan resep (wajib dikerjakan)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>R/ heparin sodium no 1 s 3 dd s.u.e -----da thrombopohop gel-----</p> </div>
--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep
----	-------	--------------------------

18
 Jenis Resep : Resep asli
 Resep obat : non racikan
 Jumlah obat dalam resep : Tidak
 Pengulangan resep : Neiter
 Tempel Resep/salin resep disini!



A. Skrinning Administrasi

Nama Pasien :	Ada	An kayohila
Umur pasien :	Ada	1 tahun
Berat Badan :	Tidak Ada	-
Nama Obat :	Ada	salicyl
Kekuatan :	Tidak Ada	-
Bentuk sed. :	Ada	Bedak
Jumlah obat :	Ada	1
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada	2 kali sehari
Tanggal penulisan resep :	Ada	18/04/2022
Nama dokter :	Ada	Dr ita maftuhah
Surat ijin :	Ada	124/SIP.DU/VII/2017
Alamat dr. :	Ada	Puskesmas karang binangun

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ salicyl bedak no 1

c. Perhitungan biaya resep

Salicyl bedak 9.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : biru

Nama Obat/warna etiket :

2 kali sehari
ditaburkan secukupnya

e. *Product knowledge*

Nama Obat : salicyl

Kandungan : salicyl

Dosis lazim : -

Kegunaan : mengurangi biang keringat

ESO potensial :-

KI :-

PERHATIAN : tidak boleh digunakan dibawah 3 tahun tanpa resep dokter

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat,

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

	kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban	
--	---	--

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambil obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

p : mas mau mengambil resep ini ada kah?

ttk : ada bu, untuk biang keringat ya bu


p : iya mas

ttk : (ttk mengambilkan bedak) ini bu bedak ya, untuk aturan pakai sehari 2 kali ditaburkan secukupnya pada bagian yang gatal

p : baik mas, berapa ya?

		<p>ttk : 9.000 bu p : ini ya mas (sambal memberikan uang) ttk : terimakasih ya bu p : sama-sama mas</p> <p>h. Salinan resep (wajib dikerjakan)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>R/ salicyl bedak no.1 S 2 dd s.u.e -----det-----</p> </div>
--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep															
19	Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Hj muntiyah</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada</td> <td>60 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Cendo asthenof</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Hj muntiyah	Umur pasien :	Ada	60 tahun	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Cendo asthenof	Kekuatan :	Tidak Ada	-
Nama Pasien :	Ada	Hj muntiyah															
Umur pasien :	Ada	60 tahun															
Berat Badan :	Tidak Ada	-															
Nama Obat :	Ada	Cendo asthenof															
Kekuatan :	Tidak Ada	-															



Bentuk sed. :	Tidak Ada	-
Jumlah obat :	Ada	1
Duplikasi terapi :	Ada	-
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	4 kali 1 tetes untuk mata kanan kiri
Tanggal penulisan resep :	Ada	08/03/2022
Nama dokter :	Ada	Dr ita maftuhah
Surat ijin :	Ada	124/SIP.DU/VII/2017
Alamat dr. :	Ada	Puskesmas dekat

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ cendo asthenof no.1

c. Perhitungan biaya resep

Cendo asthenof 25.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

4 kali 1 tetes untuk mata kanan dan kiri

e. *Product knowledge*

Nama Obat : cendo asthenof

Kandungan : oxymetazoline
hydrochlorine

Dosis lazim : 0,25%

Kegunaan : untuk meringankan mata
merah

ESO potensial : insomnia

KI : hipersensitif

PERHATIAN : hanya untuk
pemakaian luar

Cara penyimpanan : Simpan di bawah
suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat,
kering, dan terlindung dari cahaya dan
kelembaban

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

p : mas mau beli resep ini ada?

ttk : ada bu, untuk mata merah ya?

p : iya mas, kira kira berapa ya?

ttk : 25.000 bu

p : iya mas 1 ya

ttk : (ttk mengambil obat) ini aturan pakai 4 kali 1 tetes untuk mata kanan dan kiri, kalau sudah dibuka obat mat aini Cuma bisa berahan 1 bulan ya bu

p : oh baik mas, ini uangnya ya (sambal memberikan uang)

ttk : baik bu, terimakasih ya

p : sama-sama bu


h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

R/ cendo asthenof no.1

S 4 dd gtt 1 ODS

--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																	
20	Jenis Resep : Resep asli Resep obat : non racikan Jumlah obat dalam resep : Tidak Pengulangan resep : Neiter Tempel Resep/salin resep disini!	A. Skrinning Administrasi <table border="1" data-bbox="864 746 1731 1477"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>An azella aisyah pertiwi</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada</td> <td>5 bulan</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Cerini</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada</td> <td>20 ml</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada</td> <td>Drop</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>1 kali ½ ml</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada</td> <td>21/02/2022</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada</td> <td>Dr ita maftuhah</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	An azella aisyah pertiwi	Umur pasien :	Ada	5 bulan	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Cerini	Kekuatan :	Ada	20 ml	Bentuk sed. :	Ada	Drop	Jumlah obat :	Ada	1	Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada	1 kali ½ ml	Tanggal penulisan resep :	Ada	21/02/2022	Nama dokter :	Ada	Dr ita maftuhah
Nama Pasien :	Ada	An azella aisyah pertiwi																																	
Umur pasien :	Ada	5 bulan																																	
Berat Badan :	Tidak Ada	-																																	
Nama Obat :	Ada	Cerini																																	
Kekuatan :	Ada	20 ml																																	
Bentuk sed. :	Ada	Drop																																	
Jumlah obat :	Ada	1																																	
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-																																	
Aturan pakai :	Ada	1 kali ½ ml																																	
Tanggal penulisan resep :	Ada	21/02/2022																																	
Nama dokter :	Ada	Dr ita maftuhah																																	



Surat ijin :	Ada	124/SIP.DU/VII/2017
Alamat dr. :	Ada	Puskesmas karangbinangun

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ cerini drop 20ml no.1

c. Perhitungan biaya resep

Cerini drop 76.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

1 hari ½ ml
sesudah makan

Nama Obat/warna etiket :

e. Product knowledge

Nama Obat : cerini

Kandungan : cetirizine

Dosis lazim : 10 mg

Kegunaan : alergi

ESO potensial : mulut kering, diare dan muntah

KI : hipersensitif

PERHATIAN : penggunaan dibawah usai 2 tahun harus dianjurkan dokter

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

p : mas mau nebus resep ini ada? (memberikan resep)

ttk : (sambil melihat resep) ada bu, untuk baby ya?

p : iya mas untuk 5 bulan

ttk : sebentar ya bu (ttk mengambilkan obat tersebut) ini ya bu cerini dropnya

p : berapa ya mas

ttk : 76.000 bu, untuk aturan pakai sesuai resep sehari 1 kali $\frac{1}{2}$ ml ini didalam obatnya sudah ada drop untuk takarannya

p : oh baik mas, jadi sehari cukup 1 kali ya, untuk pagi atau sore ya mas?

ttk : pagi bisa sore juga bisa bu

p : baik mas, ini uangnya ya (sambil memberikan uangnya)

ttk : baik bu terimakasih ya


p : sama-sama mas

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

R/ cerini drop 20 ml no.1

s 1 dd $\frac{1}{2}$ ml drop

-----det-----

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
21	<p>Jenis Resep : Resep asli</p> <p>Resep obat : non racikan</p> <p>Jumlah obat dalam resep : Tidak</p> <p>Pengulangan resep : Neiter</p> <p>Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="862 319 1731 1214"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Ahmad father al qifan</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Bufacomp</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada</td> <td>Salep</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>Secukupnya</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada</td> <td>15/10/2021</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada</td> <td>Dr ita maftuhah</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada</td> <td>124/SIP.DU/VII/2017</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada</td> <td>Puskesmas karangbinangun</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p>	Nama Pasien :	Ada	Ahmad father al qifan	Umur pasien :	Tidak Ada	-	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Bufacomp	Kekuatan :	Tidak Ada	-	Bentuk sed. :	Ada	Salep	Jumlah obat :	Ada	1	Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada	Secukupnya	Tanggal penulisan resep :	Ada	15/10/2021	Nama dokter :	Ada	Dr ita maftuhah	Surat ijin :	Ada	124/SIP.DU/VII/2017	Alamat dr. :	Ada	Puskesmas karangbinangun
Nama Pasien :	Ada	Ahmad father al qifan																																							
Umur pasien :	Tidak Ada	-																																							
Berat Badan :	Tidak Ada	-																																							
Nama Obat :	Ada	Bufacomp																																							
Kekuatan :	Tidak Ada	-																																							
Bentuk sed. :	Ada	Salep																																							
Jumlah obat :	Ada	1																																							
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada	Secukupnya																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada	15/10/2021																																							
Nama dokter :	Ada	Dr ita maftuhah																																							
Surat ijin :	Ada	124/SIP.DU/VII/2017																																							
Alamat dr. :	Ada	Puskesmas karangbinangun																																							

R/ Bufacomb no.1

c. Perhitungan biaya resep

Bufacomb 23.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

Dioleskan secukupnya

e. *Product knowledge*

Nama Obat : bufacomb

Kandungan : triacinolon acetone

Dosis lazim : 0,1%

Kegunaan : Stomatitis aftosa, periadenitis mukosa nekrotika rekuren, ulkus aftosa herpetiformis, ulserasi traumatik, ulserasi karena obat

ESO potensial : Supresi adrenal, gangguan metabolisme glukosa,

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

katabolisme protein, aktivasi tukak peptikum

KI : Infeksi bakteri atau jamur pada mulut dan tenggorokan , lesi herpetik karena virus atau lesi intraoral

PERHATIAN : penggunaan pada pasien dengan glaukoma dan/atau katarak, hipertensi dan/atau gagal jantung, infark miokard akut, diabetes mellitus

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

p : mas mau beli obat ini ada ? (menunjukkan resep)


ttk : (melhat resep) ada bu, untuk sariawan ya

		<p>p : iya mas, berapa ya? ttk : 23.000 bu, ini diresep aturan pakainya Cuma secukupnya bu, kalau biasanya ini bisa dipakai 2-3 kali sehari dan dioleskan dibagian yang sakit dan kalau tertelan pun juga aman p : dipakai 2 kali bisa ya mas ttk : bisa bu p : baik mas ini uangnya ya (sambil memberikan uangnya) ttk : baik bu terimakasih ya p : sama-sama mas</p> <p>h. Salinan resep (wajib dikerjakan)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>R/ bufacomb no.1 s.u.e -----det-----</p> </div>
--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep		
22	Jenis Resep : Salinan/Resep asli	A. Skrinning Administrasi		
	Resep obat : Racikan/non racikan	Nama Pasien :	Ada	Hj Fatimah
	Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak	Umur pasien :	Ada	53 tahun

Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter

Tempel Resep/salin resep disini!



Berat Badan :	Tidak Ada	-
Nama Obat :	Ada	Cendo asthenof
Kekuatan :	Tidak Ada	-
Bentuk sed. :	Tidak Ada	-
Jumlah obat :	Ada	1
Duplikasi terapi :	Ada	-
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	4 kali 1 tetes untuk mata kiri
Tanggal penulisan resep :	Ada	13/04/2022
Nama dokter :	Ada	Dr ita maftuhah
Surat ijin :	Ada	124/SIP.DU/VII/2017
Alamat dr. :	Ada	Puskesmas deket

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ cendo asthenof no.1

c. Perhitungan biaya resep

Cendo asthenof 25.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

4 kali 1 tetes untuk mata kiri

Nama Obat/warna etiket :

e. Product knowledge

Nama Obat : cendo asthenof

Kandungan : oxymetazoline hydrochlorine

Dosis lazim : 0,25%

Kegunaan : untuk meringankan mata merah

ESO potensial : insomnia

KI : hipersensitif

PERHATIAN : hanya untuk pemakaian luar

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

p : mas mau beli resep ini ada?

ttk : ada bu, untuk mata merah ya?

p : iya mas, kira kira berapa ya?

ttk : 25.000 bu

p : iya mas 1 ya

ttk : (ttk mengambil obat) ini aturan pakai 4 kali 1 tetes untuk mata kiri, kalau sudah dibuka obat mat aini Cuma bisa berahan 1 bulan ya bu

p : oh baik mas, ini uangnya ya (sambal memberikan uang)


ttk : baik bu, terimakasih ya

p : sama-sama bu

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

R/ cendo asthenof no.1
 S 4 dd gtt 1 OS
 -----det-----

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																											
23	Jenis Resep : Resep asli Resep obat : non racikan Jumlah obat dalam resep : Tidak Pengulangan resep : Neiter Tempel Resep/salin resep disini!	A. Skrinning Administrasi <table border="1" data-bbox="862 933 1729 1495"> <tbody> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Ny ruqoyyha</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada</td> <td>42 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Cendo lytress</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada</td> <td>drop</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>4 kali 2 tetes mata kanan</td> </tr> </tbody> </table>	Nama Pasien :	Ada	Ny ruqoyyha	Umur pasien :	Ada	42 tahun	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Cendo lytress	Kekuatan :	Tidak Ada	-	Bentuk sed. :	Ada	drop	Jumlah obat :	Ada	1	Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada	4 kali 2 tetes mata kanan
Nama Pasien :	Ada	Ny ruqoyyha																											
Umur pasien :	Ada	42 tahun																											
Berat Badan :	Tidak Ada	-																											
Nama Obat :	Ada	Cendo lytress																											
Kekuatan :	Tidak Ada	-																											
Bentuk sed. :	Ada	drop																											
Jumlah obat :	Ada	1																											
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-																											
Aturan pakai :	Ada	4 kali 2 tetes mata kanan																											



Tanggal penulisan resep :	Ada	08/02/2022
Nama dokter :	Ada	Dr ita maftuhah
Surat ijin :	Ada	124/SIP.DU/VII/2017
Alamat dr. :	Ada	Puskesmas karangbinangun

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ cendo lytreers no.1

c. Perhitungan biaya resep

Cendo lytreers 26.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

4 kali 2 tetes
untuk mata kanan

e. *Product knowledge*

Nama Obat : cendo lytreers

Kandungan : sodium cholrine,
potassium cholrine

Dosis lazim : 4,4 mg dan 0,8 mg

Kegunaan : melumasi dan
menyejukan mata kering

ESO potensial : -

KI : hipersensitivitas

PERHATIAN : hanya untuk pemakain
luar

Cara penyimpanan : Simpan di bawah
suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat,
kering, dan terlindung dari cahaya dan
kelembaban

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

p : mas mau beli resep ini ada?

ttk : ada bu, untuk mata merah ya?

p : iya mas, kira kira berapa ya?

ttk : 26.000 bu

p : iya mas 1 ya

ttk : (ttk mengambil obat) ini aturan pakai 4 kali 2 tetes untuk mata kanan, kalau sudah dibuka obat mat aini Cuma bisa berahan 1 bulan ya bu

p : oh baik mas, ini uangnya ya (sambal memberikan uang)

ttk : baik bu, terimakasih ya

p : sama-sama bu


h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

R/ cendo lytreers no.1

s 4 dd gtt II OD

-----det-----

--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
24	<p>Jenis Resep Resep asli</p> <p>Resep obat : non racikan</p> <p>Jumlah obat dalam resep : Tidak</p> <p>Pengulangan resep : Neiter</p> <p>Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>H munir</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Nysatatin</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada</td> <td>15 ml</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada</td> <td>Drop</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada</td> <td>Cazetin</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>3 kali 1 ml</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada</td> <td>Dr. H. Moch. Mahzumi</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada</td> <td>2246/SIP.DU/413.111/VI/2022</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada</td> <td>JL. Timur pasar blawi no.4</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	H munir	Umur pasien :	Tidak Ada	-	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Nysatatin	Kekuatan :	Ada	15 ml	Bentuk sed. :	Ada	Drop	Jumlah obat :	Tidak Ada	-	Duplikasi terapi :	Ada	Cazetin	Aturan pakai :	Ada	3 kali 1 ml	Tanggal penulisan resep :	Tidak Ada	-	Nama dokter :	Ada	Dr. H. Moch. Mahzumi	Surat ijin :	Ada	2246/SIP.DU/413.111/VI/2022	Alamat dr. :	Ada	JL. Timur pasar blawi no.4
Nama Pasien :	Ada	H munir																																							
Umur pasien :	Tidak Ada	-																																							
Berat Badan :	Tidak Ada	-																																							
Nama Obat :	Ada	Nysatatin																																							
Kekuatan :	Ada	15 ml																																							
Bentuk sed. :	Ada	Drop																																							
Jumlah obat :	Tidak Ada	-																																							
Duplikasi terapi :	Ada	Cazetin																																							
Aturan pakai :	Ada	3 kali 1 ml																																							
Tanggal penulisan resep :	Tidak Ada	-																																							
Nama dokter :	Ada	Dr. H. Moch. Mahzumi																																							
Surat ijin :	Ada	2246/SIP.DU/413.111/VI/2022																																							
Alamat dr. :	Ada	JL. Timur pasar blawi no.4																																							

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ nysatatin drop

c. Perhitungan biaya resep

Cazetin 27.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket :putih

Nama Obat/warna etiket :

3 x 1 ml

e. *Product knowledge*

Nama Obat : cazetin

Kandungan : nystatin

Dosis lazim : 15 ml

Kegunaan : kandidiasis rongga mulut

ESO potensial : diare, mual dan muntah

KI : hipersensitif

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN : jangan menghentikan obat sebelum terapi selesai

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambil obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

p : mas mau ambil obat ini ada?

ttk : adanya merek lain bu, tapi kandunganya sama

p ; Namanya apa mas?

ttk : cazetin bu untuk sariawan ya? (sambil menunjukan obat tersebut) ini bus ama kandunganya Cuma beda di nama dagangnya bu

p : iya mas, berapa ya?

ttk : 26.000 bu

p : oke mas beli ini ya

ttk : baik bu, untuk aturan pakainya sehari 3 x 1 ml diteteskan langsung ke sariawanya ya bu


p :kalau terlelan bagaimana mas?

		<p>ttk : aman bu kalau tertelan p : yaudah mas, ini uangnya ya ttk : baik bu, terimakasih ya p : sama-sama</p> <p>h. Salinan resep (wajib dikerjakan)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>R/ nysatatin drop s 3 dd 1 cc -----det----- da cazetin</p> </div>
--	--	---

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep		
25	Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak	A. Skrinning Administrasi		
		Nama Pasien :	Ada	Pak arif
		Umur pasien :	Tidak Ada	-

Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter

Tempel Resep/salin resep disini!



Berat Badan :	Tidak Ada	-
Nama Obat :	Ada	Hufanoxil
Kekuatan :	Ada	500 mg
Bentuk sed. :	Ada	Tablet
Jumlah obat :	Ada	10 tablet
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	2 x 1
Tanggal penulisan resep :	Ada	-
Nama dokter :	Ada	Dr. H. Moch. Mahzumi
Surat ijin :	Ada	2246/SIP.DU/413.111/VI/2022
Alamat dr. :	Ada	Jl, timur pasar blawi no.4

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ hufanoxil tablet no.x

c. Perhitungan biaya resep

Hufanoxil tablet 5.000 per strip

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

2 x 1
dihabiskan

e. *Product knowledge*

Nama Obat : hufanoxil

Kandungan : amoxillin

Dosis lazim : 500 mg

Kegunaan : infeksi

ESO potensial : reaksi hipersensitif

KI : hipersensitif

PERHATIAN : harus memakai resep dokter

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

p : mas mau beli resep ini ada?

ttk : ada pak

p : berapa ya mas?

ttk : 1 strip 5.000 pak

p : sesuai resep saja ya mas

ttk : baik pak, untuk aturan minumnya sehari 2 kali ya pak, dan harus dihabiskan karena ini antibiotic

p : baik mas, ini uangnya ya

ttk : terimakasih pak

p : sama-sama


h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

R/ hufanoxil tablet no.x


s 2 dd 1

-----det-----

--	--	--



No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																								
26	Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter...kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!	A. Skrinning Administrasi <table border="1" data-bbox="862 997 1731 1495"> <tr> <td data-bbox="862 997 1131 1058">Nama Pasien :</td> <td data-bbox="1131 997 1355 1058">Ada</td> <td data-bbox="1355 997 1955 1058">Ny muryah</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 1058 1131 1118">Umur pasien :</td> <td data-bbox="1131 1058 1355 1118">Ada</td> <td data-bbox="1355 1058 1955 1118">52 tahun</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 1118 1131 1179">Berat Badan :</td> <td data-bbox="1131 1118 1355 1179">Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 1118 1955 1179">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 1179 1131 1240">Nama Obat :</td> <td data-bbox="1131 1179 1355 1240">Ada</td> <td data-bbox="1355 1179 1955 1240">Glucosamine</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 1240 1131 1300">Kekuatan :</td> <td data-bbox="1131 1240 1355 1300">Ada</td> <td data-bbox="1355 1240 1955 1300">500 mg</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 1300 1131 1361">Bentuk sed. :</td> <td data-bbox="1131 1300 1355 1361">Ada</td> <td data-bbox="1355 1300 1955 1361">Tablet</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 1361 1131 1422">Jumlah obat :</td> <td data-bbox="1131 1361 1355 1422">Ada</td> <td data-bbox="1355 1361 1955 1422">10</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 1422 1131 1495">Duplikasi terapi :</td> <td data-bbox="1131 1422 1355 1495">Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 1422 1955 1495">-</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Ny muryah	Umur pasien :	Ada	52 tahun	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Glucosamine	Kekuatan :	Ada	500 mg	Bentuk sed. :	Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada	10	Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
Nama Pasien :	Ada	Ny muryah																								
Umur pasien :	Ada	52 tahun																								
Berat Badan :	Tidak Ada	-																								
Nama Obat :	Ada	Glucosamine																								
Kekuatan :	Ada	500 mg																								
Bentuk sed. :	Ada	Tablet																								
Jumlah obat :	Ada	10																								
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-																								



Aturan pakai :	Ada	2 kali sehari
Tanggal penulisan resep :	Ada	25/11/2021
Nama dokter :	Ada	Dr afdlika putri ayu alif M.S
Surat ijin :	Ada	128/SIP.DU/413.III,I/2021
Alamat dr. :	Ada	Puskesmas glagah

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ glucosamine no.x

c. Perhitungan biaya resep

Glucosamine 10 tablet : 19.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

2 kali sehari
sesudah makan

e. *Product knowledge*

Nama Obat : glucosamine	Nama Obat :
Kandungan : glucosamine	Kandungan :
Dosis lazim : 500 mg	Dosis lazim :
Kegunaan : memelihara persendian	Kegunaan :
ESO potensial : -	ESO potensial :
KI : -	KI :
PERHATIAN : -	PERHATIAN :
Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban	Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)


p : mas mau beli obat ini ada?
ttk : ada pak, untuk persendian ya
p : iya mas, kata dokternya untuk pelumas
ttk : iya pak betul, sebentar saya ambilkan dulu obatnya ya
p : baik pak
(ttk mengambilkan obatnya)
ttk : ini pak obatnya, sehari diminum 2 kali ya sesudah makan
p: baik mas, berapa ya?
ttk : 19.000 pak
p : ini ya mas uangnya
ttk : baik pak terimakasih ya
p : sama-sama mas

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

R/ glucosamine no.x
s 2 dd 1
-----det-----

--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																				
27	Jenis Resep : Resep asli Resep obat : non racikan Jumlah obat dalam resep : Tidak Pengulangan resep : Neiter Tempel Resep/salin resep disini!	A. Skrinning Administrasi <table border="1" data-bbox="862 627 1731 1417"> <tr> <td data-bbox="862 627 1131 687">Nama Pasien :</td> <td data-bbox="1131 627 1355 687">Ada</td> <td data-bbox="1355 627 1731 687">tn suwoto</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 687 1131 748">Umur pasien :</td> <td data-bbox="1131 687 1355 748">Ada</td> <td data-bbox="1355 687 1731 748">55 tahun</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 748 1131 809">Berat Badan :</td> <td data-bbox="1131 748 1355 809">Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 748 1731 809">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 809 1131 869">Nama Obat :</td> <td data-bbox="1131 809 1355 869">Ada</td> <td data-bbox="1355 809 1731 869">Ventolin nebul</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 869 1131 930">Kekuatan :</td> <td data-bbox="1131 869 1355 930">Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 869 1731 930">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 930 1131 991">Bentuk sed. :</td> <td data-bbox="1131 930 1355 991">Ada</td> <td data-bbox="1355 930 1731 991">Ampul</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 991 1131 1051">Jumlah obat :</td> <td data-bbox="1131 991 1355 1051">Ada</td> <td data-bbox="1355 991 1731 1051">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 1051 1131 1112">Duplikasi terapi :</td> <td data-bbox="1131 1051 1355 1112">Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 1051 1731 1112">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 1112 1131 1173">Aturan pakai :</td> <td data-bbox="1131 1112 1355 1173">Ada</td> <td data-bbox="1355 1112 1731 1173">Sehari 1 ml</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 1173 1131 1294">Tanggal penulisan resep :</td> <td data-bbox="1131 1173 1355 1294">Ada</td> <td data-bbox="1355 1173 1731 1294">23/09/2022</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 1294 1131 1355">Nama dokter :</td> <td data-bbox="1131 1294 1355 1355">Ada</td> <td data-bbox="1355 1294 1731 1355">Dr ita maftuhah</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 1355 1131 1417">Surat ijin :</td> <td data-bbox="1131 1355 1355 1417">Ada</td> <td data-bbox="1355 1355 1731 1417">124/SIP.DU/VII/2017</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	tn suwoto	Umur pasien :	Ada	55 tahun	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Ventolin nebul	Kekuatan :	Tidak Ada	-	Bentuk sed. :	Ada	Ampul	Jumlah obat :	Ada	1	Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada	Sehari 1 ml	Tanggal penulisan resep :	Ada	23/09/2022	Nama dokter :	Ada	Dr ita maftuhah	Surat ijin :	Ada	124/SIP.DU/VII/2017
Nama Pasien :	Ada	tn suwoto																																				
Umur pasien :	Ada	55 tahun																																				
Berat Badan :	Tidak Ada	-																																				
Nama Obat :	Ada	Ventolin nebul																																				
Kekuatan :	Tidak Ada	-																																				
Bentuk sed. :	Ada	Ampul																																				
Jumlah obat :	Ada	1																																				
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-																																				
Aturan pakai :	Ada	Sehari 1 ml																																				
Tanggal penulisan resep :	Ada	23/09/2022																																				
Nama dokter :	Ada	Dr ita maftuhah																																				
Surat ijin :	Ada	124/SIP.DU/VII/2017																																				



Alamat dr. :	Ada	Puskesmas karangbinangun
--------------	-----	--------------------------

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ Ventolin nebul no.1

c. Perhitungan biaya resep

1 ampul Ventolin nebul 15.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

Sehari 1 ml

e. Product knowledge

Nama Obat : Ventolin nebul	Nama Obat :
Kandungan : salbutamol	Kandungan :

Dosis lazim : 2,5 mg

Kegunaan : gangguan asma

ESO potensial : tremor

KI : hipersensitif

PERHATIAN : hati-hati pada pasien diabetes melitus

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriminasi
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberikan informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

p :mas mau nebus resep ini ada?

ttk : ada pak

p : berapa ya mas?

ttk : 1 ampulnya 15.000 pak

p : beli sesuai resep saja mas

ttk : baik pak

p : ini uangnya ya mas

ttk : terimakasih ya pak


p : sama-sama

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

R/ Ventolin nebuls

S 1 ml

-----det-----

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
28	<p>Jenis Resep : salinan</p> <p>Resep obat : non racikan</p> <p>Jumlah obat dalam resep : Tidak</p> <p>Pengulangan resep : Neiter</p> <p>Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="862 373 1731 1193"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Nn nuriyah</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Curcuma</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada</td> <td>Curvit</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>3 x 1</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada</td> <td>19/09/2022</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada</td> <td>Dr Rudianto dwi a. Sp.PD</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div data-bbox="862 1310 1915 1370" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>R/ Curcuma no.xx</p> </div> <p>c. Perhitungan biaya resep</p>	Nama Pasien :	Ada	Nn nuriyah	Umur pasien :	Tidak Ada	-	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Curcuma	Kekuatan :	Tidak Ada	-	Bentuk sed. :	Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada	20	Duplikasi terapi :	Ada	Curvit	Aturan pakai :	Ada	3 x 1	Tanggal penulisan resep :	Ada	19/09/2022	Nama dokter :	Ada	Dr Rudianto dwi a. Sp.PD	Surat ijin :	Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Tidak Ada	-
Nama Pasien :	Ada	Nn nuriyah																																							
Umur pasien :	Tidak Ada	-																																							
Berat Badan :	Tidak Ada	-																																							
Nama Obat :	Ada	Curcuma																																							
Kekuatan :	Tidak Ada	-																																							
Bentuk sed. :	Ada	Tablet																																							
Jumlah obat :	Ada	20																																							
Duplikasi terapi :	Ada	Curvit																																							
Aturan pakai :	Ada	3 x 1																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada	19/09/2022																																							
Nama dokter :	Ada	Dr Rudianto dwi a. Sp.PD																																							
Surat ijin :	Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Tidak Ada	-																																							

Curvit 1 strip 21.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

3 x 1
sesudah makan

e. *Product knowledge*

Nama Obat : curvit

Kandungan : Vit.B1 3 mg, Vit.B2 2 mg,
Vit.B6 5 mg, Vit.B12 5 mcg, Beta-
carotene 10% 400 mcg, Ca
pantothenate/Dexpanthenol 3 mg, Ca
gluconate 300 mg, Curcuminoid 2 mg.

Dosis lazim : -

Kegunaan : penambah nafsu makan

ESO potensial : -

KI : Hipersensifitas

PERHATIAN : Hentikan jika muncul
alergi

Cara penyimpanan : Simpan di bawah
suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat,

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P :mas mau nebus resep ini ada?

TTK : adanya merek lain bu, khasiatnya sama dan ada multivitaminnya juga.

Bagaimana?

P : untuk apa mas ini resepnya?

TTK : penambah nafsu makan bu

P : coba 1 strip bisa?

TTK : bisa bu

P : kena berapa mas?

TTK : 22.000 bu

P : baik mass

TTK : baik bu (sambil mengambilkan obatnya) ini bu obatnya dan minumnya sehari 3 kali ya sesudah makan

P : baik mas, ini uangnya (sambil memberikan uang)


TTK : baik bu, terimakasih ya

P : sama-sama mas

		<p>h. Salinan resep (wajib dikerjakan)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>R/ Curcuma no.xx S 3 dd 1 -----det-----</p> </div>
--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep									
29	Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Ny umiatun</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Ny umiatun	Umur pasien :	Tidak Ada	-	Berat Badan :	Tidak Ada	-
Nama Pasien :	Ada	Ny umiatun									
Umur pasien :	Tidak Ada	-									
Berat Badan :	Tidak Ada	-									

Tempel Resep/salin resep disini!



Nama Obat :	Ada	Glimepiride
Kekuatan :	Ada	4 mg
Bentuk sed. :	Ada	Tablet
Jumlah obat :	Ada	30
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada	2 x 1
Tanggal penulisan resep :	Tidak Ada	-
Nama dokter :	Ada	Dr. Irma Suryani, SpM
Surat ijin :	Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Tidak Ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ Glimepiride 4 no.xxx

c. Perhitungan biaya resep

Glimepiride 4 mg 1 strip 8.000 = 8.000 x 3 strip = 24.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

2 x 1
Sesudah makan

e. *Product knowledge*

Nama Obat : glimepiride

Kandungan : glimepiride

Dosis lazim : 4 mg

Kegunaan : diabetes melitus

ESO potensial : nyeri lambung, muntah dan mual

KI : hipersensitifitas

PERHATIAN : tidak dianjurkan untuk ibu hamil

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

p : mas mau nebus resep ini ada?

ttk : ada bu, glimepiride 4 mg ini minta sesuai resep atau diambil 1 strip dulu?

p : 1 strip berapa mas?

ttk : 8.000 bu, kalau 3 strip 24.000

p : semua saja mas

ttk : baik bu, untuk aturan minum nya sehari 2 kali ya

p : baik mas, ini unagnya


ttk : baik bu, terimakasih ya

p : sama- sama mas

		<p>h. Salinan resep (wajib dikerjakan)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>R/ glimepiride 4 no.xxx s 2 dd 1 -----det-----</p> </div>
--	--	---

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																											
30	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter</p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Ny qusyaisi</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Relaxon</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada</td> <td>50 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>Sehari 1 kali</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Ny qusyaisi	Umur pasien :	Tidak Ada	-	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Relaxon	Kekuatan :	Ada	50 mg	Bentuk sed. :	Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada	30	Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada	Sehari 1 kali
Nama Pasien :	Ada	Ny qusyaisi																											
Umur pasien :	Tidak Ada	-																											
Berat Badan :	Tidak Ada	-																											
Nama Obat :	Ada	Relaxon																											
Kekuatan :	Ada	50 mg																											
Bentuk sed. :	Ada	Tablet																											
Jumlah obat :	Ada	30																											
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-																											
Aturan pakai :	Ada	Sehari 1 kali																											

Tempel Resep/salin resep disini!



Tanggal penulisan resep :	Ada	20/12/2022
Nama dokter :	Ada	Dr lanatul ulya. Sp.D
Surat ijin :	Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Tidak Ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ Relaxon tab no.xxx
s 1 dd 1

c. Perhitungan biaya resep

Relaxon 1 strip (10 tablet) : 15.000 x 3 : 45.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

Sehari 1 kali
sesudah makan

e. Product knowledge

Nama Obat : relaxon Nama Obat :

Kandungan : eperisone
Dosis lazim : 50 mg
Kegunaan : kejang otot
ESO potensial : ruam, kantuk dan gemetar
KI : hipersentif dan ibu hamil
PERHATIAN : tidak boleh untuk ibu menyusui
Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : mas ambil obat ini ada?

TTK : ada bu, mau diambil semua?

P ; 1 strip berapa mas?

TTK : 15.000 bu, diresep minta 3 strip jadi 45.000

P : sesuai resep saja mas

TTK : baik bu (sambil menagmbilkan obat) ini bu obatnya, dan diminum sehari 1 kali saja kalau bisa pagi hari saja

P : oke mas, ini uangnya (pasien memberikan uang nya) terimakasih ya mas

TTK : baik bu sama-sama


h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

R/ Relaxon tab no.xxx

s 1 dd 1

-----det-----

--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
31	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli</p> <p>Resep obat : Racikan/non racikan</p> <p>Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak</p> <p>Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter</p> <p>Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="862 552 1731 1370"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Ny asenan</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Relaxon</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada</td> <td>50 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>Sehari 1 kali</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada</td> <td>27/09/2022</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada</td> <td>Dr lanatul ulya. Sp.D</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p>	Nama Pasien :	Ada	Ny asenan	Umur pasien :	Tidak Ada	-	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Relaxon	Kekuatan :	Ada	50 mg	Bentuk sed. :	Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada	30	Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada	Sehari 1 kali	Tanggal penulisan resep :	Ada	27/09/2022	Nama dokter :	Ada	Dr lanatul ulya. Sp.D	Surat ijin :	Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Tidak Ada	-
Nama Pasien :	Ada	Ny asenan																																							
Umur pasien :	Tidak Ada	-																																							
Berat Badan :	Tidak Ada	-																																							
Nama Obat :	Ada	Relaxon																																							
Kekuatan :	Ada	50 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada	Tablet																																							
Jumlah obat :	Ada	30																																							
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada	Sehari 1 kali																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada	27/09/2022																																							
Nama dokter :	Ada	Dr lanatul ulya. Sp.D																																							
Surat ijin :	Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Tidak Ada	-																																							

R/ Relaxon tab no.xxx
s 1 dd 1

c. Perhitungan biaya resep

Relaxon 1 strip (10 tablet) : 15.000 x 3 : 45.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

Sehari 1 kali
sesudah makan

e. *Product knowledge*

Nama Obat : relaxon

Kandungan : eperisone

Dosis lazim : 50 mg

Kegunaan : kejang otot

ESO potensial : ruam, kantuk dan
gemetar

KI : hipersentif dan ibu hamil

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :


PERHATIAN : tidak boleh untuk ibu menyusui

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga



		<p>g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>P : mas ambil obat ini ada? TTK : ada bu, mau diambil semua? P ; 1 strip berapa mas? TTK : 15.000 bu, diresep minta 3 strip jadi 45.000 P : sesuai resep saja mas TTK : baik bu (sambil menagmbilkan obat) ini bu obatnya, dan diminum sehari 1 kali saja kalau bisa pagi hari saja P : oke mas, ini uangnya (pasien memberikan uang nya) terimakasih ya mas TTK : baik bu sama-sama</p> <p>h. Salinan resep (wajib dikerjakan)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>R/ Relaxon tab no.xxx s 1 dd 1 -----det-----</p> </div>
--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep
----	-------	--------------------------

32


Jenis Resep : Salinan/Resep asli

Resep obat : Racikan/non racikan

Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak

Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter

Tempel Resep/salin resep disini!



A. Skrinning Administrasi

Nama Pasien :	Ada	Ny sugeng
Umur pasien :	Tidak Ada	-
Berat Badan :	Tidak Ada	-
Nama Obat :	Ada	Relaxon
Kekuatan :	Ada	50 mg
Bentuk sed. :	Ada	Tablet
Jumlah obat :	Ada	30
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada	Sehari 1 kali
Tanggal penulisan resep :	Ada	19/11/2022
Nama dokter :	Ada	Dr lanatul ulya. Sp.D
Surat ijin :	Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Tidak Ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ Relaxon tab no.xxx
s 1 dd 1

c. Perhitungan biaya resep

Relaxon 1 strip (10 tablet) : 15.000 x 3 : 45.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

Sehari 1 kali
sesudah makan

e. *Product knowledge*

Nama Obat : relaxon

Kandungan : eperisone

Dosis lazim : 50 mg

Kegunaan : kejang otot

ESO potensial : ruam, kantuk dan gemetar

KI : hipersentif dan ibu hamil

PERHATIAN : tidak boleh untuk ibu menyusui

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : mas ambil obat ini ada?

TTK : ada bu, mau diambil semua?

P ; 1 strip berapa mas?


TTK : 15.000 bu, diresep minta 3 strip jadi 45.000

P : sesuai resep saja mas

TTK : baik bu (sambil menagmbilkan obat) ini bu obatnya, dan diminum sehari 1 kali saja kalau bisa pagi hari saja

		<p>P : oke mas, ini uangnya (pasien memberikan uang nya) terimakasih ya mas TTK : baik bu sama-sama</p> <p>h. Salinan resep (wajib dikerjakan)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>R/ Relaxon tab no.xxx s 1 dd 1 -----det-----</p> </div>
--	--	---

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep															
33	Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter...kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="862 1189 1736 1497"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Hj muntiyah</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada</td> <td>60 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Cendo asthenof</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Hj muntiyah	Umur pasien :	Ada	60 tahun	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Cendo asthenof	Kekuatan :	Tidak Ada	-
Nama Pasien :	Ada	Hj muntiyah															
Umur pasien :	Ada	60 tahun															
Berat Badan :	Tidak Ada	-															
Nama Obat :	Ada	Cendo asthenof															
Kekuatan :	Tidak Ada	-															



Bentuk sed. :	Tidak Ada	-
Jumlah obat :	Ada	1
Duplikasi terapi :	Ada	-
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	4 kali 1 tetes untuk mata kanan kiri
Tanggal penulisan resep :	Ada	08/03/2022
Nama dokter :	Ada	Dr ita maftuhah
Surat ijin :	Ada	124/SIP.DU/VII/2017
Alamat dr. :	Ada	Puskesmas dekat

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ cendo asthenof no.1

c. Perhitungan biaya resep

Cendo asthenof 25.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

4 kali 1 tetes untuk mata kanan dan kiri

e. *Product knowledge*

Nama Obat : cendo asthenof

Kandungan : oxymetazoline
hydrochlorine

Dosis lazim : 0,25%

Kegunaan : untuk meringankan mata
merah

ESO potensial : insomnia

KI : hipersensitif

PERHATIAN : hanya untuk
pemakaian luar

Cara penyimpanan : Simpan di bawah
suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat,
kering, dan terlindung dari cahaya dan
kelembaban

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

p : mas mau beli resep ini ada?

ttk : ada bu, untuk mata merah ya?

p : iya mas, kira kira berapa ya?

ttk : 25.000 bu

p : iya mas 1 ya

ttk : (ttk mengambil obat) ini aturan pakai 4 kali 1 tetes untuk mata kanan dan kiri, kalau sudah dibuka obat mat aini Cuma bisa bertahan 1 bulan ya bu

p : oh baik mas, ini uangnya ya (sambil memberikan uang)

ttk : baik bu, terimakasih ya

p : sama-sama bu


h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

R/ cendo asthenof no.1

S 4 dd gtt 1 ODS

--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																				
34	Jenis Resep : Salinan Resep obat : non racikan Jumlah obat dalam resep : /Tidak Pengulangan resep : Neiter Tempel Resep/salin resep disini!	A. Skrinning Administrasi <table border="1" data-bbox="862 746 1731 1501"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ny mukaromah</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Simvastatin 20 mg</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>20 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Malam 1 kali</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>27/03/2023</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Dr. Rudyanto D.A, Sp.PD</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ny mukaromah	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Simvastatin 20 mg	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	20 mg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	-	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	30	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Malam 1 kali	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	27/03/2023	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Rudyanto D.A, Sp.PD	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ny mukaromah																																				
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-																																				
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-																																				
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Simvastatin 20 mg																																				
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	20 mg																																				
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	-																																				
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	30																																				
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																				
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Malam 1 kali																																				
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	27/03/2023																																				
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Rudyanto D.A, Sp.PD																																				
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																				



Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	-
--------------	---------------	---

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ simvastatin 20 mg no. xxx

c. Perhitungan biaya resep

Simvastatin 1 strip (10 tablet) : 2.500 x 3 : 7.500

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

Sehari 1 kali (malam sebelum tidur)

--

e. *Product knowledge*

Nama Obat : simvastatin	Nama Obat :
Kandungan : simvastatin 20mg	Kandungan :
Dosis lazim : 20 mg	Dosis lazim :
Kegunaan : kolestrol	Kegunaan :
	ESO potensial :

ESO potensial : sakit perut, mual dan muntah

KI : Penyakit hati aktif atau peningkatan transaminase serum persisten yang tidak dapat dijelaskan

PERHATIAN : Kewaspadaan khusus pada pasien: Pasien dengan diabetes mellitus

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : mas mau ngambil obat ini ada?

TTK : ada bu, mau diambil semua?

P : berapa ya mas kalau semua?

TTK : diresep mintanya 3 strip bu , 1 stripnya 2.500 jadi kalau 3 7,500, bagaimana?

P : ya diambil semua saja mas

TTK : baik bu, (sambil mengambil obat) ini ya bu obat untuk kolestrolnya , ini diminum sehari 1x sebelum tidur ya bu

P : Cuma 1 kali ya mas, oke mas (memberikan uang) terimakasih ya ms


TT : baik bu , sama-sama

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

R/ simvastatin 20 no.xxx

S 0-0-1

-----det-----

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
35	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli</p> <p>Resep obat : Racikan/non racikan</p> <p>Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak</p> <p>Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter</p> <p>Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="864 316 1731 1169"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Ny disah</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada</td> <td>53 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Sucralfate syr</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada</td> <td>Syr</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>3 x cth 1 sebelum makan</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada</td> <td>07/10/2022</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada</td> <td>Dr. Ita maftuhah</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada</td> <td>124/SIP.DU/VII/2017</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada</td> <td>Puskesmas karangbinangun</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p>	Nama Pasien :	Ada	Ny disah	Umur pasien :	Ada	53 tahun	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Sucralfate syr	Kekuatan :	Tidak Ada	-	Bentuk sed. :	Ada	Syr	Jumlah obat :	Ada	1	Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada	3 x cth 1 sebelum makan	Tanggal penulisan resep :	Ada	07/10/2022	Nama dokter :	Ada	Dr. Ita maftuhah	Surat ijin :	Ada	124/SIP.DU/VII/2017	Alamat dr. :	Ada	Puskesmas karangbinangun
Nama Pasien :	Ada	Ny disah																																							
Umur pasien :	Ada	53 tahun																																							
Berat Badan :	Tidak Ada	-																																							
Nama Obat :	Ada	Sucralfate syr																																							
Kekuatan :	Tidak Ada	-																																							
Bentuk sed. :	Ada	Syr																																							
Jumlah obat :	Ada	1																																							
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada	3 x cth 1 sebelum makan																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada	07/10/2022																																							
Nama dokter :	Ada	Dr. Ita maftuhah																																							
Surat ijin :	Ada	124/SIP.DU/VII/2017																																							
Alamat dr. :	Ada	Puskesmas karangbinangun																																							

R/ sucralfate syr no.1
s 3 dd cth 1 ac

c. Perhitungan biaya resep

sucralfate syr 1 fls : 15.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

3 x 1 cth
sebelum makan

e. *Product knowledge*

Nama Obat : sucralfate

Kandungan : sucralfate

Dosis lazim : 500 mg

Kegunaan : asam lambung

ESO potensial : diare, mual dan muntah

KI : reaksi alergi

PERHATIAN : hati-hati pada wanita hamil

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban	
---	--

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : mas mau nebus resep ini, ada kah?

TTK : ada bu, untuk asam lambung ya


P : iya mas, berapa ya

TTK : 1 fls nya 15.000 bu

		<p>P : yauah mas 1 aja TTK : baik bu (ttk mengabilkan obat tersebut) ini ya bu sirupnya, nanti kalau sebelum makan sekitar 30 menit atau 1 jam diminum dulu agar lambung dilapisi oleh sirup ini P : kalau habis makan bagaimana mas? Saolnya saja barusan makan TTK : ya sama bu ditunggu 30 menit atau 1 jam baru minum obat ini P : oke mas ini ya uang ya (memberikan uang) terimakasih ya mas TTK : baik bu, sama-sama</p> <p>h. Salinan resep (wajib dikerjakan)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>R/ sucralfate syr no.1 s 3 dd 1 cth ac -----det-----</p> </div>
--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep									
36	Jenis Resep : Resep asli Resep obat : non racikan Jumlah obat dalam resep : Tidak Pengulangan resep : Neiter	A. Skrinning Administrasi <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>An azella aisyah pertiwi</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada</td> <td>5 bulan</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	An azella aisyah pertiwi	Umur pasien :	Ada	5 bulan	Berat Badan :	Tidak Ada	-
Nama Pasien :	Ada	An azella aisyah pertiwi									
Umur pasien :	Ada	5 bulan									
Berat Badan :	Tidak Ada	-									

Tempel Resep/salin resep disini!



Nama Obat :	Ada	Cerini
Kekuatan :	Ada	20 ml
Bentuk sed. :	Ada	Drop
Jumlah obat :	Ada	1
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada	1 kali ½ ml
Tanggal penulisan resep :	Ada	21/02/2022
Nama dokter :	Ada	Dr ita maftuhah
Surat ijin :	Ada	124/SIP.DU/VII/2017
Alamat dr. :	Ada	Puskesmas karangbinangun

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ cerini drop 20ml no.1

c. Perhitungan biaya resep

Cerini drop 76.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

1 hari ½ ml
sesudah makan

e. *Product knowledge*

Nama Obat : cerini

Kandungan : cetirizine

Dosis lazim : 10 mg

Kegunaan : alergi

ESO potensial : mulut kering, diare dan muntah

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

KI : hipersensitif

PERHATIAN : penggunaan dibawah usai 2 tahun harus dianjurkan dokter

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

p : mas mau nebus resep ini ada? (memberikan resep)

ttk : (sambil melihat resep) ada bu, untuk baby ya?

p : iya mas untuk 5 bulan

ttk : sebentar ya bu (ttk mengambilkan obat tersebut) ini ya bu cerini dropnya

p : berapa ya mas

ttk : 76.000 bu, untuk aturan pakai sesuai resep sehari 1 kali $\frac{1}{2}$ ml ini didalam obatnya sudah ada drop untuk takarannya


p : oh baik mas, jadi sehari cukup 1 kali ya, untuk pagi atau sore ya mas?

ttk : pagi bisa sore juga bisa bu

p : baik mas, ini uangnya ya (sambil memberikan uangnya)

		<p>ttk : baik bu terimakasih ya p : sama-sama mas</p> <p>h. Salinan resep (wajib dikerjakan)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>R/ cerini drop 20 ml no.1 s 1 dd ½ ml drop -----det-----</p> </div>
--	--	---

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep															
37	<p>Jenis Resep Resep asli</p> <p>Resep obat : non racikan</p> <p>Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi</p> <p>Pengulangan resep : Neiter</p> <p>Tempel Resep/salin resep disini! CITO</p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Muhammad masbukin</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada</td> <td>20 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Ambeven caps laxadin syr na diclofenac</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Muhammad masbukin	Umur pasien :	Ada	20 tahun	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Ambeven caps laxadin syr na diclofenac	Kekuatan :	Tidak Ada	-
Nama Pasien :	Ada	Muhammad masbukin															
Umur pasien :	Ada	20 tahun															
Berat Badan :	Tidak Ada	-															
Nama Obat :	Ada	Ambeven caps laxadin syr na diclofenac															
Kekuatan :	Tidak Ada	-															



Bentuk sed. :	Ada	Tablet sirup tablet
Jumlah obat :	Ada	Ambeven 10 tablet laxadine 1 fls na diclofenac 10 tablet
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada	Ambeven 3 x 1 laxadine secukupnya na diclofenac 2 x 1
Tanggal penulisan resep :	Ada	26/08/2021
Nama dokter :	Ada	Dr ita maftuhah
Surat ijin :	Ada	124/SIP.DU/VII/2017
Alamat dr. :	Ada	Puskesmas karangbinangun

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ ambeven no.x
s 3 dd 1
R/ laxadine syr no.1
p r n
R/ na diclofenac no.x
s 2 dd 1

c. Perhitungan biaya resep

Ambeven 18.000
laxadine 48.000
na diclofenac 4.000
total 70.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Ambeven

3 x 1
sesudah makan

Nama Obat/warna etiket :putih

Laxadine

diminum bila perlu

Nama Obat /warna etiket : putih

Natrium diclofenac

2 x 1
sesudah makan

e. *Product knowledge*

Nama Obat : ambeven

Kandungan : Graphtophyllum picatum 30%, Sophora jamponica 15%, Rubia cordifolia 15%, Coleus atropurpureus

Nama Obat : laxadine

Kandungan : Phenolphthalein 55 mg, liqd paraffin 1,200 mg, glycerin 378 mg

		<p>10%, Saguisorba officinalis 10%, Kaemferiae angustifoliae 10%, Curcuma heynaenae 10%</p> <p>Dosis lazim : -</p> <p>Kegunaan : wasir</p> <p>ESO potensial : -</p> <p>KI : -</p> <p>PERHATIAN : -</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>	<p>Dosis lazim : -</p> <p>Kegunaan : pelican jalannya kotoran</p> <p>ESO potensial : ruam kulit, mual an muntah</p> <p>KI : Ileus obstruktif, nyeri perut yang tidak diketahui penyebabnya.</p> <p>PERHATIAN : hindari jangka lama</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>
		<p>Nama Obat : natirum diklofenac</p> <p>Kandungan : natirum diklofenac</p> <p>Dosis lazim : 50 mg</p> <p>Kegunaan : analgesic</p> <p>ESO potensial : anemia, hipertensi</p> <p>KI : hipersensitif</p> <p>PERHATIAN : hindari pemakaian ibu hamil dan menyusui</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>	<p>Nama Obat :</p> <p>Kandungan :</p> <p>Dosis lazim :</p> <p>Kegunaan :</p> <p>ESO potensial :</p> <p>KI :</p> <p>PERHATIAN :</p> <p>Cara penyimpanan :</p>

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambil obat sesuai resep
3. memberikan informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

p : mas mau nebus resep ini ada?

ttk : ada mas, diambil semua?

p: iya mas

ttk : baik ditunggu sebentar ya mas

p : baik mas

(ttk mengambil obat sesuai resep)

ttk : ini mas obatnya, ada ambeven untuk wasir mas jadi aturan minumnya sehari 3 kali 1 tablet saja, kalau yang ini laxadine untuk pelancar babnya jadi aturan minum diresep secukupnya jadi sehari bisa 1-2 sendok makan dan yang terakhir ini ada natirum diklofenak untuk nyeri dan inflamasi ini diminum sehari 2 kali sesudah makan. Sampai sini ada yang ditanyakan mas?

p : sudah cukup mas, nanti masnya kasih tulisan takutnya lupa

ttk : baik mas, sudah ya

p : berapa mas?

ttk : 70.000 mas, ambeven ini 18.000 laxadine 48.000 dan na diclofenac 4.000


p : baik mas, ini uangnya ya

ttk : baik terimakasih mas

p: sama-sama

		<p>h. Salinan resep (wajib dikerjakan)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>R/ ambeven no.x s 3 dd 1 R/ laxadine no.1 p r n R/ na diclofenac s 2 dd 1 -----det-----</p> </div>
--	--	---

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																	
38	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli</p> <p>Resep obat : Racikan/non racikan</p> <p>Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak</p> <p>Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter</p> <p>Tempel Resep/salin resep disini!</p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>tn akhiyat</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada</td> <td>56 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Burnazin</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada</td> <td>Salep</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>2 kali sehari (secukupnya)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada</td> <td>19/10/2023</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada</td> <td>Dr ita maftuhah</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	tn akhiyat	Umur pasien :	Ada	56 tahun	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Burnazin	Kekuatan :	Tidak Ada	-	Bentuk sed. :	Ada	Salep	Jumlah obat :	Ada	1	Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada	2 kali sehari (secukupnya)	Tanggal penulisan resep :	Ada	19/10/2023	Nama dokter :	Ada	Dr ita maftuhah
Nama Pasien :	Ada	tn akhiyat																																	
Umur pasien :	Ada	56 tahun																																	
Berat Badan :	Tidak Ada	-																																	
Nama Obat :	Ada	Burnazin																																	
Kekuatan :	Tidak Ada	-																																	
Bentuk sed. :	Ada	Salep																																	
Jumlah obat :	Ada	1																																	
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-																																	
Aturan pakai :	Ada	2 kali sehari (secukupnya)																																	
Tanggal penulisan resep :	Ada	19/10/2023																																	
Nama dokter :	Ada	Dr ita maftuhah																																	



Surat ijin :	Ada	124/SIP.DU/VII/2017
Alamat dr. :	Ada	Puskesmas karangbinangun

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ burnazin zalf no.1

c. Perhitungan biaya resep

Burnazin 149.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : biru

2 x 1
pemakaian luar

Nama Obat/warna etiket :

e. Product knowledge

Nama Obat : burnazin	Nama Obat :
Kandungan : Hyaluronic acid 2 mg, Silver sulfadiazine 10 mg	Kandungan :

Dosis lazim : -

Kegunaan : lesi kulit, terutama yang beresiko tinggi mengalami infeksi, khususnya untuk luka akut dan kronik.

ESO potensial : -

KI : -

PERHATIAN : -

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

p : mas ada obat ini?

ttk : ada pak, untuk luka bakar ya

p : iya mas


(ttk mengambilkan obat tersebut)

ttk : ini obatny pak, sehari 2 kali ya pak, untuk pemakaian luar atau bagian yang terluka

p : oke mas, berapa mas?
ttk : 149.000 pak, ini yang bagus
p : kalau yang biasa berapa mas?
ttk : yang biasa ada yang 25.000 ada yang 30.000
p : jauh ya mas
ttk : iya pak, soalnya burnazin ini kalau dipakai terasa dingin kalau yang lain agak panas
p : yaudah mas yang ini saja, ini uangnya ya
ttk : baik pak, terimakasih ya
p : sama-sama mas

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

R/ burnazin zalf no.1
s 2 dd ue
-----det-----

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																								
39	<p>Jenis Resep Resep asli</p> <p>Resep obat : non racikan</p> <p>Jumlah obat dalam resep : Tidak</p> <p>Pengulangan resep : Neiter</p> <p>Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="862 316 1731 1173"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>tn sukain</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada</td> <td>62 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Gabapentin</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>1 x 1</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada</td> <td>07/12/2022</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada</td> <td>Dr ita maftuhah</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada</td> <td>124/SIP.DU/VII/2017</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada</td> <td>Puskesmas karangbinangun</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <table border="1" data-bbox="862 1295 1915 1359"> <tr> <td>R/ gabapentin no.x</td> </tr> </table> <p>c. Perhitungan biaya resep</p>	Nama Pasien :	Ada	tn sukain	Umur pasien :	Ada	62 tahun	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Gabapentin	Kekuatan :	Tidak Ada	-	Bentuk sed. :	Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada	10	Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada	1 x 1	Tanggal penulisan resep :	Ada	07/12/2022	Nama dokter :	Ada	Dr ita maftuhah	Surat ijin :	Ada	124/SIP.DU/VII/2017	Alamat dr. :	Ada	Puskesmas karangbinangun	R/ gabapentin no.x
Nama Pasien :	Ada	tn sukain																																								
Umur pasien :	Ada	62 tahun																																								
Berat Badan :	Tidak Ada	-																																								
Nama Obat :	Ada	Gabapentin																																								
Kekuatan :	Tidak Ada	-																																								
Bentuk sed. :	Ada	Tablet																																								
Jumlah obat :	Ada	10																																								
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-																																								
Aturan pakai :	Ada	1 x 1																																								
Tanggal penulisan resep :	Ada	07/12/2022																																								
Nama dokter :	Ada	Dr ita maftuhah																																								
Surat ijin :	Ada	124/SIP.DU/VII/2017																																								
Alamat dr. :	Ada	Puskesmas karangbinangun																																								
R/ gabapentin no.x																																										

Gabapentin 1 strip (10 tablet) = 27.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

1 x 1
sesudah makan

e. *Product knowledge*

Nama Obat : gabapentin

Kandungan : gabapentin

Dosis lazim : 100 mg – 300 mg

Kegunaan : anti kejang

ESO potensial : rasa kantuk, Lelah dan pusing

KI : hipersensitif

PERHATIAN : hindari dari anak dibawah 12 tahun

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat,

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

	kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban	
--	---	--

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

p : mas ada obat ini?

ttk : ada pak, mohon maaf ini diresep tidak tertulis dosisnya bapaknya sudah pernah pakai obat ini sebelumnya?

p : belum mas pertama kali

ttk : jadi dikasih yang dosis kecil saja ya pak, kalau nanti tidak ada perubahan njenengan ke dokternya lagi untuk dikontrol lebih lanjut

p : oke mas, berapa obatnya mas?

ttk : 27.000 pak, ini diminum sehari 1 kali ya

p : baik mas, ini uangnya ya

ttk : baik pak, terimakasih


p : sama-sama

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

R/ gabapentin no.x
s 1 dd 1
-----det-----

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep		
40	Jenis Resep : Resep asli Resep obat non racikan Jumlah obat dalam resep : Tidak Pengulangan resep Neiter	A. Skrinning Administrasi		
		Nama Pasien :	Ada	An aderal
		Umur pasien :	Ada	5 tahun
		Berat Badan :	Tidak Ada	-
		Nama Obat :	Ada	Cendo xitrol

Tempel Resep/salin resep disini!



Kekuatan :	Tidak Ada	-
Bentuk sed. :	Ada	Tetes mata
Jumlah obat :	Tidak Ada	-
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada	4 kali 2 tetes
Tanggal penulisan resep :	Ada	11/10/2022
Nama dokter :	Ada	Dr ita maftuhah
Surat ijin :	Ada	124/SIP.DU/VII/2017
Alamat dr. :	Ada	Puskesmas karangbinangun

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ cendo xitrol tetes mata

c. Perhitungan biaya resep

Cendo xitrol 32.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

4 kali 2 tetes

Nama Obat/warna etiket :

e. *Product knowledge*

Nama Obat : cendo xitrol

Kandungan : Deksametason 0.1%,
Neomisin (sulfat) 3.5 mg, Polimiksin-
B-Sulfat 6000 UI

Dosis lazim : -

Kegunaan : infeksi mata karena
bakteri

ESO potensial : peningkatan tekanan
intraokular, pembentukan katarak
subkapsular posterior

KI : peningkatan tekanan
intraokular, pembentukan katarak
subkapsular posterior

PERHATIAN : Jangan dipergunakan
30 hari setelah dibuka.

Cara penyimpanan : Simpan di bawah
suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat,

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskripping
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

p : mas mau beli ini ada? (sambil memberikan resep)

ttk : (sambil menerima reser) oh ada pak, untuk mata merah ya?

p : iya mass sudah dikasih insto ga sembuh sembuh

ttk : (ttk mengambilkn obat) ini ya pak obatnya , aturan pakai nya sehari 4 kali 2 tetes ya pak ke mata yang sakit. Kalau sudah dibukak bisa bertahan 1 bulan kalau sudah lewat dibuang ya pak

p : baik mas, berapa ya?


ttk : 32.000 pak

p : ini ya uang nya mas

ttk : baik pak, terimakasih


p : sama-sama

		<p>h. Salinan resep (wajib dikerjakan)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>R/ cendo xitrol tetes mata s 4 gtt 2 -----det-----</p> </div>
--	--	---



No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																					
41	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter...kali/Neiter</p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Ny marifah</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Glucosamine relaxon</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada</td> <td>Glucosamine 500 mg relaxon</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>Glucosamine 30 relaxon 30</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Ny marifah	Umur pasien :	Tidak Ada	-	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Glucosamine relaxon	Kekuatan :	Ada	Glucosamine 500 mg relaxon	Bentuk sed. :	Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada	Glucosamine 30 relaxon 30
Nama Pasien :	Ada	Ny marifah																					
Umur pasien :	Tidak Ada	-																					
Berat Badan :	Tidak Ada	-																					
Nama Obat :	Ada	Glucosamine relaxon																					
Kekuatan :	Ada	Glucosamine 500 mg relaxon																					
Bentuk sed. :	Ada	Tablet																					
Jumlah obat :	Ada	Glucosamine 30 relaxon 30																					

Tempel Resep/salin resep disini!



Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada	Glucosamine 1 x 1 relaxon 1 x 1
Tanggal penulisan resep :	Ada	20/12/2022
Nama dokter :	Ada	Dr lanatul ulya
Surat ijin :	Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Tidak Ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ glucosamine no.xxx
R/ relaxon no.xxx

c. Perhitungan biaya resep

Glucosamine : 17.000 x 3 = 51.000
relaxon : 15.000 per strip x 3 = 45.000
total : 96.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Glucosamine

1 x 1
sesudah makan

Nama Obat/warna etiket : putih

Relaxon

1 x 1
sesudah makan

e. *Product knowledge*

Nama Obat : glucosamine	Nama Obat : relaxon
Kandungan : glucosamine	Kandungan : eperison
Dosis lazim :500 mg	Dosis lazim : 50 mg
Kegunaan : suplemen persendiaan	Kegunaan : kaku otot
ESO potensial : -	ESO potensial : mual dan muntah
KI : -	KI : hipersensitif
PERHATIAN : -	PERHATIAN : kantuk
Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban	Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

p : mas mau nebus obat ini ada ?

ttk : ada bu, mau diambil semua?

p : kalau semua berapa mas?

ttk : relaxon 1 strip 15.000 x 3 strip 45.000 kalau glucosamine 17.000 x 3 strip 51.000 jadi totalnya 96.000 bu

p : buat 1 bulan bisa mas?

ttk : bisa bu, ini diresepnya sehari 1 kali jadi untuk sabu bulan

p : yaudan mas semua saja, ini uangnyna ya

ttk : baik bu terimakasih

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

R/ glucosamine no.xxx

s 1 dd 1


R/ relaxon no.xxx

s 1 dd 1

-----det-----

--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																	
42	Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!	A. Skrinning Administrasi <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>tn umar</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Cavicur glucosamine</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada</td> <td>Cavicur glucosamine 500 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>Cavicur 30 tablet glucosamine 30 tablet</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>Cavicur 1 x1 glucosamine 1x1</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada</td> <td>04/10/2022</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada</td> <td>Dr lanatul ulya, Sp.N</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	tn umar	Umur pasien :	Tidak Ada	-	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Cavicur glucosamine	Kekuatan :	Ada	Cavicur glucosamine 500 mg	Bentuk sed. :	Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada	Cavicur 30 tablet glucosamine 30 tablet	Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada	Cavicur 1 x1 glucosamine 1x1	Tanggal penulisan resep :	Ada	04/10/2022	Nama dokter :	Ada	Dr lanatul ulya, Sp.N
Nama Pasien :	Ada	tn umar																																	
Umur pasien :	Tidak Ada	-																																	
Berat Badan :	Tidak Ada	-																																	
Nama Obat :	Ada	Cavicur glucosamine																																	
Kekuatan :	Ada	Cavicur glucosamine 500 mg																																	
Bentuk sed. :	Ada	Tablet																																	
Jumlah obat :	Ada	Cavicur 30 tablet glucosamine 30 tablet																																	
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-																																	
Aturan pakai :	Ada	Cavicur 1 x1 glucosamine 1x1																																	
Tanggal penulisan resep :	Ada	04/10/2022																																	
Nama dokter :	Ada	Dr lanatul ulya, Sp.N																																	



Surat ijin	:	Tidak Ada	-
Alamat dr.	:	Tidak Ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ cavicur no.xxx
 R/ glucosamine no.xxx

c. Perhitungan biaya resep

Cavicur 1 strip : 21.000 x 3 = 63.000
 glucosamine 1 strip 17.000 x 3 = 51.000
 totalnya : 114.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Cavicur
 1 x 1
 sesudah makan

Nama Obat/warna etiket : putih

Glucosamine
 1 x 1
 sesudah makan

e. Product knowledge

Nama Obat : cavicur	Nama Obat : glucosamine
Kandungan : curcuma	Kandungan : glucosamine
Dosis lazim : -	Dosis lazim :500 mg
Kegunaan : penambah nafsu makan	Kegunaan : suplemen persendiaan
ESO potensial : -	ESO potensial : -
KI : -	KI : -
PERHATIAN : -	PERHATIAN : -
Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban	Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

p : mas sambil resep ini

ttk : diambil semua pak?

p : iya mas, berapa?

ttk : cavicur 1 stirp 21.000 x 3 63.000 kalau yang glucosamine 1 strip 17.000 x 3 51 jadi totalnya 114.000 pak

p : iya mas gapapa

ttk : untuk aturan minumnya sehari 1 kali ya pak baik cavicur atau glucosaminenya

p : oke mas, ini uangnya ya

ttk : baik pak, terimakasih

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)


R/ cavicur no.xxx

s 1 dd 1

R/ glucosamine no.xxx

s 1 dd 1

-----det-----

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
43	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli</p> <p>Resep obat : Racikan/non racikan</p> <p>Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak</p> <p>Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter</p> <p>Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="862 317 1731 1174"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Ny kammah</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Gemfibrozil</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada</td> <td>300 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>1 x 1</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada</td> <td>28/09/2022</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada</td> <td>Dr Abraham</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div data-bbox="862 1295 1915 1359" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>R/ gemfibrozil 300 mg no.xxx</p> </div> <p>c. Perhitungan biaya resep</p>	Nama Pasien :	Ada	Ny kammah	Umur pasien :	Tidak Ada	-	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Gemfibrozil	Kekuatan :	Ada	300 mg	Bentuk sed. :	Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada	30	Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada	1 x 1	Tanggal penulisan resep :	Ada	28/09/2022	Nama dokter :	Ada	Dr Abraham	Surat ijin :	Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Tidak Ada	-
Nama Pasien :	Ada	Ny kammah																																							
Umur pasien :	Tidak Ada	-																																							
Berat Badan :	Tidak Ada	-																																							
Nama Obat :	Ada	Gemfibrozil																																							
Kekuatan :	Ada	300 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada	Tablet																																							
Jumlah obat :	Ada	30																																							
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada	1 x 1																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada	28/09/2022																																							
Nama dokter :	Ada	Dr Abraham																																							
Surat ijin :	Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Tidak Ada	-																																							

Gemfibrozil 10.000 x 3 = 30.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

1 x 1
sesudah makan

e. *Product knowledge*

Nama Obat : gemfibrozil

Kandungan : gemfibrozil

Dosis lazim : 300 mg

Kegunaan : Pengobatan hiperkolesterolemia, mencegah resiko timbulnya penyakit jantung koroner dengan menurunkan LDL dan menaikkan hdl, pengobatan hipertrigliseridemia

ESO potensial : Nyeri abdomen, apendisitis akut, dispepsia, pusing, gangguan penglihatan, depresi, libido berkurang

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

KI : hipersensitif, batu empedu, bayi baru lahir, anak-anak, wanita hamil, menyusui

PERHATIAN : Penderita dengan gangguan fungsi hati dan ginjal yang berat, penyakit kandung empedu dan penderita yang hipersensitif terhadap gemfibrozil Kategori Kehamilan : C

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)


p : mass beli obat ini

ttk : obatnya diambil semua pak?

p : berapaan mas?

		<p>ttk : 1 stripnya 10.000 diresep mintanya 3 strio jadi 30.000, bulat satu bulan p : ya gapapa mas buat satu bulan sekalian ttk : baik pak p : ini unagnya mas ttk : terimakasih pak p : sama-sama</p> <p>h. Salinan resep (wajib dikerjakan)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>R/ gemfibrozil 300 mg no.xxx s 1 dd 1 -----det-----</p> </div>
--	--	---

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep												
44	Jenis Resep : Resep asli Resep obat : non racikan Jumlah obat dalam resep : Tidak Pengulangan resep : Neiter Tempel Resep/salin resep disini!	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>tn Ridwan</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada</td> <td>30 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Erlamycetine</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	tn Ridwan	Umur pasien :	Ada	30 tahun	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Erlamycetine
Nama Pasien :	Ada	tn Ridwan												
Umur pasien :	Ada	30 tahun												
Berat Badan :	Tidak Ada	-												
Nama Obat :	Ada	Erlamycetine												



Kekuatan :	Tidak Ada	-
Bentuk sed. :	Ada	Drop
Jumlah obat :	Ada	1
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada	2 x 2 tetes untuk teliga yang sakit
Tanggal penulisan resep :	Ada	16/12/2022
Nama dokter :	Ada	Dr afdlika putri ayu alif M.S
Surat ijin :	Ada	128/SIP/DU/413.III/I/2021
Alamat dr. :	Ada	Puskesmas glagah

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ tetes teliga erlamycetine no.i

c. Perhitungan biaya resep

Erlamycetine 10.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : biru

Nama Obat/warna etiket :

e. *Product knowledge*

Nama Obat : erlamycetine

Kandungan : chloramphenicol

Dosis lazim : -

Kegunaan : Infeksi superfisial pada telinga luar oleh bakteri

ESO potensial : Iritasi lokal seperti gatal, rasa panas, dermatitis vesikuler dan mukulopapular

KI : Hipersensitifitas

PERHATIAN : Hindarkan penggunaan jangka panjang karena dapat merangsang hipersensitivitas dan superinfeksi oleh kuman yang resisten.

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskruining
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

p : mas mau beli obat ini ada? (sambil memberikan resep)

ttk : (menerima resep dari pasien) ada pak

p : berapa mas?

ttk : 10.000 pak

p : satu ya mas, ini uangnya

ttk : baik pak, ini obatnya ditetaskan pada telinga 2 x 2 tetes ya pak

p : baik mas, terimakasih

ttk : sama-sama pak


h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

R/ tetes telinga no.1
s 2 dd gtt 2

-----det-----

--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																														
45	Jenis Resep : Resep asli Resep obat : non racikan Jumlah obat dalam resep : Tidak Pengulangan resep : Neiter Tempel Resep/salin resep disini!	A. Skrinning Administrasi <table border="1" data-bbox="862 810 1731 1474"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Nn elissa norma w</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada</td> <td>30 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Bioplacenton</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada</td> <td>Cream</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>4 x 2 oles (pemakaian luar)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada</td> <td>01/02/2022</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Nn elissa norma w	Umur pasien :	Ada	30 tahun	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Bioplacenton	Kekuatan :	Tidak Ada	-	Bentuk sed. :	Ada	Cream	Jumlah obat :	Ada	1	Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada	4 x 2 oles (pemakaian luar)	Tanggal penulisan resep :	Ada	01/02/2022
Nama Pasien :	Ada	Nn elissa norma w																														
Umur pasien :	Ada	30 tahun																														
Berat Badan :	Tidak Ada	-																														
Nama Obat :	Ada	Bioplacenton																														
Kekuatan :	Tidak Ada	-																														
Bentuk sed. :	Ada	Cream																														
Jumlah obat :	Ada	1																														
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-																														
Aturan pakai :	Ada	4 x 2 oles (pemakaian luar)																														
Tanggal penulisan resep :	Ada	01/02/2022																														



Nama dokter :	Ada	Dr reza
Surat ijin :	Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Ada	Puskesmas dekat

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ bioplacenton cr tube no.1

c. Perhitungan biaya resep

Bioplacenton 22.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : biru

4 x 2 oles
pemakaian luar

Nama Obat/warna etiket :

e. Product knowledge


Nama Obat : bioplacenton cream	Nama Obat :
Kandungan : placenta extract 10% neomycin sulfat 0,5%	Kandungan :
	Dosis lazim :

		<p>Dosis lazim :-</p> <p>Kegunaan : luka bakar, luka infeksi</p> <p>ESO potensial : kemerahan</p> <p>KI : hipersensitif placenta extract dan neomycin sulfate</p> <p>PERHATIAN : jangan berikan bioplacenton pada area mata</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>	<p>Kegunaan :</p> <p>ESO potensial :</p> <p>KI :</p> <p>PERHATIAN :</p> <p>Cara penyimpanan :</p>
		<p>f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Resep diterima dan diskriming 2. mengambilkan obat sesuai resep 3. memberian informasi obat 4. memberi harga </div> <p>g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>P : permisi mas, apa kah ada obat sesuai dengan di resep?</p> <p>TTK : ada bu, untuk luka bakar ya</p> <p>P : iya mas habis terkena knalpot kaki saya</p> <p>TTK : (TTK mengambilkan obat) ini bu salepnya , nanti kaki yang terkena knalpot harus dibersihkan lalu dioleskan salep ini tipis-tipis ya bu</p> <p>P : oke mas, berapa ya?</p> <p>TTK : 22.000 Bu</p>	

P ; ini ya mas uangnya (sambil memberikan uangnya) terimakasih ya mas
TTK : sama-sama ya bu

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)


R/ bioplacenton cr tube no.1
s 4 dd 2 gtt u.e



--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
46	Jenis Resep : Salinan Resep obat : non racikan Jumlah obat dalam resep : Tidak Pengulangan resep : Neiter	<p data-bbox="909 448 1256 480">A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="864 504 1733 1361"> <tr> <td data-bbox="864 504 1131 564">Nama Pasien :</td> <td data-bbox="1131 504 1355 564">Ada</td> <td data-bbox="1355 504 1733 564">tn daud</td> </tr> <tr> <td data-bbox="864 564 1131 625">Umur pasien :</td> <td data-bbox="1131 564 1355 625">Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 564 1733 625">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="864 625 1131 686">Berat Badan :</td> <td data-bbox="1131 625 1355 686">Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 625 1733 686">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="864 686 1131 746">Nama Obat :</td> <td data-bbox="1131 686 1355 746">Ada</td> <td data-bbox="1355 686 1733 746">Teosal</td> </tr> <tr> <td data-bbox="864 746 1131 807">Kekuatan :</td> <td data-bbox="1131 746 1355 807">Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 746 1733 807">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="864 807 1131 868">Bentuk sed. :</td> <td data-bbox="1131 807 1355 868">Ada</td> <td data-bbox="1355 807 1733 868">Tablet</td> </tr> <tr> <td data-bbox="864 868 1131 928">Jumlah obat :</td> <td data-bbox="1131 868 1355 928">Ada</td> <td data-bbox="1355 868 1733 928">30</td> </tr> <tr> <td data-bbox="864 928 1131 989">Duplikasi terapi :</td> <td data-bbox="1131 928 1355 989">Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 928 1733 989">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="864 989 1131 1050">Aturan pakai :</td> <td data-bbox="1131 989 1355 1050">Ada</td> <td data-bbox="1355 989 1733 1050">1 x 1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="864 1050 1131 1168">Tanggal penulisan resep :</td> <td data-bbox="1131 1050 1355 1168">Ada</td> <td data-bbox="1355 1050 1733 1168">10/02/2022</td> </tr> <tr> <td data-bbox="864 1168 1131 1228">Nama dokter :</td> <td data-bbox="1131 1168 1355 1228">Ada</td> <td data-bbox="1355 1168 1733 1228">Dr anik pumawati. Sp.P</td> </tr> <tr> <td data-bbox="864 1228 1131 1289">Surat ijin :</td> <td data-bbox="1131 1228 1355 1289">Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 1228 1733 1289">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="864 1289 1131 1350">Alamat dr. :</td> <td data-bbox="1131 1289 1355 1350">Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 1289 1733 1350">-</td> </tr> </table> <p data-bbox="909 1426 1469 1458">B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p>	Nama Pasien :	Ada	tn daud	Umur pasien :	Tidak Ada	-	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Teosal	Kekuatan :	Tidak Ada	-	Bentuk sed. :	Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada	30	Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada	1 x 1	Tanggal penulisan resep :	Ada	10/02/2022	Nama dokter :	Ada	Dr anik pumawati. Sp.P	Surat ijin :	Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Tidak Ada	-
Nama Pasien :	Ada	tn daud																																							
Umur pasien :	Tidak Ada	-																																							
Berat Badan :	Tidak Ada	-																																							
Nama Obat :	Ada	Teosal																																							
Kekuatan :	Tidak Ada	-																																							
Bentuk sed. :	Ada	Tablet																																							
Jumlah obat :	Ada	30																																							
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada	1 x 1																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada	10/02/2022																																							
Nama dokter :	Ada	Dr anik pumawati. Sp.P																																							
Surat ijin :	Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Tidak Ada	-																																							

Tempel Resep/salin resep disini!



R/ teosal tab no.xxx

c. Perhitungan biaya resep

Teosal 1 strip : $2.500 \times 3 = 7.500$

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

1 x 1
sesudah makan

e. *Product knowledge*

Nama Obat : teosal

Nama Obat :

Kandungan : Salbutamol sulfat 1,2 mg setara dengan Salbutamol 1 mg Theophylline 130 mg

Kandungan :

Dosis lazim :

Dosis lazim : -

Kegunaan :

Kegunaan : Sebagai bronkodilator pada penderita asma bronkial dan bronkitis kronis

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

ESO potensial : sakit kepala, mual dan muntah

Cara penyimpanan :

		<p>KI : hipersensitif</p> <p>PERHATIAN : hati-hati penggunaan pada penderita serangan jantung</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>	
--	--	--	--

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)


1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambil obat sesuai resep
3. memberikan informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

		<p>p : mass mau beli obat ini ttk : diambil semua pak? p : iya mas, berapa ya? ttk : 1 stripnya 2.500 pak kalau 3 strip 7.500 p : 3 strip saja mas, ini uangnya ya ttk : baik pak, untuk aturan minumnya sehari 1 kali ya pak p : oke mas, terimakasih ttk : sama-sama pak</p> <p>h. Salinan resep (wajib dikerjakan)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>R/ teosal tablet no.xxx s 1 dd 1 -----det-----</p> </div>
--	--	---

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep					
47	Jenis Resep : Salinan Resep obat : non racikan	A. Skrinning Administrasi <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Nama Pasien :</td> <td style="width: 33%;">Ada</td> <td style="width: 33%;">Ny siti ulfa</td> </tr> </table>			Nama Pasien :	Ada	Ny siti ulfa
Nama Pasien :	Ada	Ny siti ulfa					

Jumlah obat dalam resep : Tidak
 Pengulangan resep : Neiter
 Tempel Resep/salin resep disini!



Umur pasien :	Tidak Ada	-
Berat Badan :	Tidak Ada	-
Nama Obat :	Ada	Relaxon
Kekuatan :	Ada	50 mg
Bentuk sed. :	Ada	Tablet
Jumlah obat :	Ada	30
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada	Sehari 1 kali
Tanggal penulisan resep :	Ada	22/02/2023
Nama dokter :	Ada	Dr lanatul ulya. Sp.D
Surat ijin :	Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Tidak Ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ Relaxon tab no.xxx
 s 1 dd 1

c. Perhitungan biaya resep

Relaxon 1 strip (10 tablet) : 15.000 x 3 : 45.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Sehari 1 kali
sesudah makan

Nama Obat/warna etiket :

e. Product knowledge

Nama Obat : relaxon

Kandungan : eperisone

Dosis lazim : 50 mg

Kegunaan : kejang otot

ESO potensial : ruam, kantuk dan gemetar

KI : hipersentif dan ibu hamil

PERHATIAN : tidak boleh untuk ibu menyusui

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :


KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep



g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : mas ambil obat ini ada?

TTK : ada bu, mau diambil semua?

P ; 1 strip berapa mas?

TTK : 15.000 bu, diresep minta 3 strip jadi 45.000


P : sesuai resep saja mas

TTK : baik bu (sambil menagmbilkan obat) ini bu obatnya, dan diminum sehari 1 kali saja kalau bisa pagi hari saja


P : oke mas, ini uangnya (pasien memberikan uang nya) terimakasih ya mas

TTK : baik bu sama-sama

		<p>h. Salinan resep (wajib dikerjakan)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>R/ Relaxon tab no.xxx s 1 dd 1 -----det-----</p> </div>
--	--	---



No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep															
48	<p>Jenis Resep : Resep asli</p> <p>Resep obat : non racikan</p> <p>Jumlah obat dalam resep : Tidak</p> <p>Pengulangan resep : Neiter</p> <p>Tempel Resep/salin resep disini!</p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Ny sulanah</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Relaxon piracetam</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada</td> <td>Relaxon piracetam 1200 mg</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Ny sulanah	Umur pasien :	Tidak Ada	-	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Relaxon piracetam	Kekuatan :	Ada	Relaxon piracetam 1200 mg
Nama Pasien :	Ada	Ny sulanah															
Umur pasien :	Tidak Ada	-															
Berat Badan :	Tidak Ada	-															
Nama Obat :	Ada	Relaxon piracetam															
Kekuatan :	Ada	Relaxon piracetam 1200 mg															



Bentuk sed. :	Ada	Tablet
Jumlah obat :	Ada	30
Duplikasi terapi :	Ada	-
Aturan pakai :	Ada	Relaxon (1 x 1) piracetam (1 x 1)
Tanggal penulisan resep :	Ada	16/02/2022
Nama dokter :	Ada	Dr lanatul ulya, Sp. N
Surat ijin :	Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Tidak Ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ relaxon tab no.xxx

R/ piracetam 1200 mg nno.xxx

c. Perhitungan biaya resep

Relaxon 1 strip (10 tablet) : 15.000 x 3 : 45.000

Piracetam 1200 mg (10 tablet) 13.000 x 3 = 39.000

total : 84.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Relaxon
1 x 1
sesudah makan

Nama Obat/warna etiket : putih

Piracetam 1200mg
1 x 1
sesudah makan

e. *Product knowledge*

Nama Obat : relaxon
Kandungan : eperisone
Dosis lazim : 50 mg
Kegunaan : kejang otot
ESO potensial : ruam, kantuk dan gemetar
KI : hipersentif dan ibu hamil
PERHATIAN : tidak boleh untuk ibu menyusui
Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat,

Nama Obat : piracetam
Kandungan :piracetam
Dosis lazim : 1200
Kegunaan : cedera serebvaskuler akut
ESO potensial : gugup, rasa lelah
KI : -
PERHATIAN : gangguna fungsi hati , ibu hamil
Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

p : mas mau beli resep ini ada? Kalau ada diambil semua ya

ttk : ada pak, baik moohon ditunggu

p : berapa mas semua?

ttk : 84.000 pak dapat realxon 3 strip sama piracetamnya 3 strip

p : oke mas, ini uangnya ya

ttk : baik pak, untuk aturan minumnya sehari satu kali ya

p : oke mas

ttk : terimakasih pak

p : sama-sama

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

R/ relaxon tablet no.xxx


s 1 dd 1

R/ piracetam 1200 mg no xxx

--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																														
49	Jenis Resep : Resep asli Resep obat : non racikan Jumlah obat dalam resep : Tidak Pengulangan resep : Neiter	A. Skrinning Administrasi <table border="1" data-bbox="862 810 1731 1474"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Sukartini</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Minosep gargle</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada</td> <td>Flas</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>Dikumur</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada</td> <td>26/03/2023</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Sukartini	Umur pasien :	Tidak Ada	-	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Minosep gargle	Kekuatan :	Tidak Ada	-	Bentuk sed. :	Ada	Flas	Jumlah obat :	Ada	1	Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada	Dikumur	Tanggal penulisan resep :	Ada	26/03/2023
Nama Pasien :	Ada	Sukartini																														
Umur pasien :	Tidak Ada	-																														
Berat Badan :	Tidak Ada	-																														
Nama Obat :	Ada	Minosep gargle																														
Kekuatan :	Tidak Ada	-																														
Bentuk sed. :	Ada	Flas																														
Jumlah obat :	Ada	1																														
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-																														
Aturan pakai :	Ada	Dikumur																														
Tanggal penulisan resep :	Ada	26/03/2023																														

Tempel Resep/salin resep disini!



Nama dokter :	Ada	Dr maedy chirstiyani bawo
Surat ijin :	Ada	503.446/543/B/IP.DU/435.7.17.20
Alamat dr. :	Tidak Ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ minosep garg 1

c. Perhitungan biaya resep

Minosep 42.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : biru

Nama Obat/warna etiket :

Dikumur jangan ditelan

e. Product knowledge

<p>Nama Obat : minosep</p> <p>Kandungan : Chlorhexidine gluconate 0.2%</p> <p>Dosis lazim : 0,2 %</p> <p>Kegunaan : Perlindungan terhadap kuman, meringankan sariawan dan membantu memberi rasa segar pada mulut</p> <p>ESO potensial : Mulut kering, rasa tidak enak pada mulut</p> <p>KI : Hipersensitif terhadap kompenen obat</p> <p>PERHATIAN : Hanya untuk dikumur</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>	<p>Nama Obat :</p> <p>Kandungan :</p> <p>Dosis lazim :</p> <p>Kegunaan :</p> <p>ESO potensial :</p> <p>KI :</p> <p>PERHATIAN :</p> <p>Cara penyimpanan :</p>
---	--

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

p : mas mau beli obat ini ada? (sambil memberikakn resep)

ttk : (sambil menerima resep) ada bu, untuk sariawan ya?

P : iya mas, berapa ya

Ttk : 42.000 bu, ini dipakai untuk berkumur saja ya

P : oke mas, ini uangnya ya

Ttk : baik bu terimakasih

P : sama-sama


h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

R/ minosep gargle 1

s.u.e

-----det-----

--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
50	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli</p> <p>Resep obat : Racikan/non racikan</p> <p>Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak</p> <p>Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter</p> <p>Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="862 443 1731 1455"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>tn habibal rozy</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Neurofenac zitanid</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada</td> <td>Neurofenac 50 mg zitanid 2 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>Neurofenac (1 x 1) zitanid (1 x 1)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada</td> <td>19/03/2023</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada</td> <td>Dr yakubus wanusukhy</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada</td> <td>503.446/4033/B/IP.DU.43 6.1.16/2022</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada</td> <td>-</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	tn habibal rozy	Umur pasien :	Tidak Ada	-	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Neurofenac zitanid	Kekuatan :	Ada	Neurofenac 50 mg zitanid 2 mg	Bentuk sed. :	Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada	10	Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada	Neurofenac (1 x 1) zitanid (1 x 1)	Tanggal penulisan resep :	Ada	19/03/2023	Nama dokter :	Ada	Dr yakubus wanusukhy	Surat ijin :	Ada	503.446/4033/B/IP.DU.43 6.1.16/2022	Alamat dr. :	Ada	-
Nama Pasien :	Ada	tn habibal rozy																																							
Umur pasien :	Tidak Ada	-																																							
Berat Badan :	Tidak Ada	-																																							
Nama Obat :	Ada	Neurofenac zitanid																																							
Kekuatan :	Ada	Neurofenac 50 mg zitanid 2 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada	Tablet																																							
Jumlah obat :	Ada	10																																							
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada	Neurofenac (1 x 1) zitanid (1 x 1)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada	19/03/2023																																							
Nama dokter :	Ada	Dr yakubus wanusukhy																																							
Surat ijin :	Ada	503.446/4033/B/IP.DU.43 6.1.16/2022																																							
Alamat dr. :	Ada	-																																							

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ nurofenac plus no.x
R/ Zitannid no.x

c. Perhitungan biaya resep

Neurofenac : 81.000
zitanid : 54.000
total ; 135.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nuerofenac plus
3 x 1
sesudah makan

Nama Obat/warna etiket : putih

Zitanid
3 x 1
sesudah maka

e. *Product knowledge*

Nama Obat : neurofenac plus

Kandungan : Sodium Diclofenac 50 mg, Thiamine Nitrate (Vit B1) 50 mg, Pyridoxine Hydrochloride (Vit B6), Cyanocobalamin (Vit B12).

Dosis lazim : -

Kegunaan : Meredakan nyeri sedang sampai dengan berat yang berhubungan dengan neuritis dan atau neuralgia.

ESO potensial : Nyeri perut, mual, muntah, diare, dispepsia, kembung, anoreksia, retensi air; pusing, kebingungan, sakit kepala, kelelahan

KI : Hipersensitivitas. Polisitemia vera, stadium dini penyakit Leber, tukak gastroduodenum/peptik

PERHATIAN : indari penggunaanya pada kehamilan trimester tiga

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

Nama Obat : zitanid

Kandungan : Tizanidine HCl 2 mg

Dosis lazim : -

Kegunaan : Meredakan nyeri spasme/kram otot yang berhubungan dengan gangguan statik dan fungsional tulang belakang (sindroma Servikal dan Lumbar)

ESO potensial : Hepatotoksisitas, reaksi hipersensitivitas, hipotensi, sedasi, halusinasi.

KI : Penggunaan bersamaan dengan penghambat CYP1A2 yang kuat (misalnya fluvoxamine, ciprofloxacin). Gangguan hati.

PERHATIAN : Pasien dengan gangguan kejiwaan, gangguan CV, penyakit arteri koroner. Gangguan ginjal. Lanjut usia. Kehamilan dan laktasi. Hindari pengurangan dan penghentian dosis secara tiba-tiba.

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

p : mas mau nebus resep ini, ada?


ttk : ada pak, diambil semua?

		<p>p : kalau semua berapa mas? ttk : yang neurofenacnya 85.000 yang zitanid 51.000 jadi totalnya 135.000 pak p : ya gapapa mas tadi kata dokternya juga mahal obatnya ttk : baik pak (ttk menyiapkan obatnya), ini sehari diminum 3 x pak p : oke mas, ini uangnya ya ttk ; baik pak terimakasih p : sama-sama</p> <p>h. Salinan resep (wajib dikerjakan)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>R/ neurofenac plus no.x s 3 dd 1 R/ zitanid no.x s 3 dd 1 -----det----</p> </div>
--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep										
51	Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak	A. Skrinning Administrasi <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td data-bbox="846 1353 1128 1417">Nama Pasien :</td> <td data-bbox="1128 1353 1355 1417">Ada</td> <td colspan="2" data-bbox="1355 1353 1960 1417">Ny hariati</td> </tr> <tr> <td data-bbox="846 1417 1128 1481">Umur pasien :</td> <td data-bbox="1128 1417 1355 1481">Ada</td> <td colspan="2" data-bbox="1355 1417 1960 1481">51 tahun</td> </tr> </table>			Nama Pasien :	Ada	Ny hariati		Umur pasien :	Ada	51 tahun	
Nama Pasien :	Ada	Ny hariati										
Umur pasien :	Ada	51 tahun										

Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter

Tempel Resep/salin resep disini!



Berat Badan :	Tidak Ada	-
Nama Obat :	Ada	Metronidazole
Kekuatan :	Ada	500 mg
Bentuk sed. :	Ada	Tablet
Jumlah obat :	Ada	15
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada	3 x 1
Tanggal penulisan resep :	Ada	24/03/2023
Nama dokter :	Ada	Dr dita ayu kartikasari
Surat ijin :	Ada	503.446/4141/B/IP.DU/13 67.16/2022
Alamat dr. :	Tidak Ada	

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ metronidazole no.xv

c. Perhitungan biaya resep

Metronidazole 1 tablet = 500 x 15 = 7.500

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

3 x 1 Sesudah makan

--

e. *Product knowledge*

Nama Obat : metronidazole

Kandungan : metronidazole

Dosis lazim : 500 mg

Kegunaan : Pengobatan uretritis dan vaginitis karena Trichomonas vaginalis, amoebiasis intestinal dan hepar,

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

prevention of anaerobic infection after surgery, giardiasis because Giardia lamblia infection

Adverse effect : nausea, dry mouth, vomiting

Contraindication : Hypersensitivity

CAUTION : be careful in patients with or a history of seizures

Storage : Store below 30 degrees Celsius, closed container, dry, and protected from light and humidity

Contraindication :
CAUTION :
Storage :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)


- 1. Resep diterima dan diskriminasi
- 2. mengambil obat sesuai resep
- 3. memberikan informasi obat
- 4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

p : mas mau beli obat ini, ada?
ttk : ada bu, diambil semua?

		<p>p : kalau semua berapa mas? ttk : ini 1 tablet 500 bu kalau 15 7.500 bu p : yaudah mas semua saja ttk : baik bu, mohon ditunngu (ttk menyiapkan obat tersebut) ttk : ini ya bu obatnya sehari diminum 3 x 1 jadi untuk 5 hari ya p : baik mas, ini uangnya ttk : baik bu, terimakasih p : sama--sama</p> <p>h. Salinan resep (wajib dikerjakan)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>R/ metronidazole 500 mg no.xv s 3 dd 1 -----det-----</p> </div>
--	--	---

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																					
52	Jenis Resep : Resep asli Resep obat : non racikan Jumlah obat dalam resep : Tidak Pengulangan resep : Neiter Tempel Resep/salin resep disini!	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Tn Muhammad fadly</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Metformin</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada</td> <td>500 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>90</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Tn Muhammad fadly	Umur pasien :	Tidak Ada	-	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Metformin	Kekuatan :	Ada	500 mg	Bentuk sed. :	Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada	90
Nama Pasien :	Ada	Tn Muhammad fadly																					
Umur pasien :	Tidak Ada	-																					
Berat Badan :	Tidak Ada	-																					
Nama Obat :	Ada	Metformin																					
Kekuatan :	Ada	500 mg																					
Bentuk sed. :	Ada	Tablet																					
Jumlah obat :	Ada	90																					



Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada	3 x 1
Tanggal penulisan resep :	Ada	21/03/2023
Nama dokter :	Ada	Dr qonita latifatun N.F
Surat ijin :	Ada	503.446/4178/I/IP.DU/436 .7.2/2019
Alamat dr. :	Tidak Ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ metformin no.xc

c. Perhitungan biaya resep

Metformin 1 strip : $3.000 \times 9 = 27.000$

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

3 x 1
sesudah makan

e. *Product knowledge*

Nama Obat : metformin

Kandungan : metformin

Dosis lazim : 500 – 850 mg

Kegunaan : Terapi awal untuk diabetes dewasa dengan keadaan kelebihan berat badan serta kadar gula darah

ESO potensial : mual dan muntah

KI : Obat ini tidak boleh diberikan kepada pasien dengan kondisi: Penyakit ginjal dengan kadar kreatinin serum lebih dari 1.5 mg/dL (pria) dan lebih dari 1.4 mg/dL (wanita)

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

PERHATIAN : Obat ini dapat mengganggu absorpsi Vitamin B12

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

p : mas beli obat ini ya

ttk : diambil semua pak?

p : kalau semua berapa mas?

ttk : kalau 1 strip 3.000 yang diresep minta 9 strip jadi 27.000 pak

p : boleh mas semua saja ya


ttk : baik pak, ini sehari 3 x 1 ya jadi untuk 1 bulan dan harus rutin ya pak dan dijaga pola makan sama fikirannya

p : baik mas, ini uangnya ya

		<p>ttk : baik pak, terimakasih p : sama-sama mas</p> <p>h. Salinan resep (wajib dikerjakan)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-top: 10px;"> R/ Metformin no.xc s 3 dd 1 -----det----- </div>
--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																											
53	Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Nn tita</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>27 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Lansoprazole, farsifen</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Lansoprazole, farsifen 400 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Lansoprazole 2 x 1 Farsifen 3 x 1</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Nn tita	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	27 tahun	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Lansoprazole, farsifen	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Lansoprazole, farsifen 400 mg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	tablet	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	10	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Lansoprazole 2 x 1 Farsifen 3 x 1
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Nn tita																											
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	27 tahun																											
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-																											
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Lansoprazole, farsifen																											
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Lansoprazole, farsifen 400 mg																											
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	tablet																											
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	10																											
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																											
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Lansoprazole 2 x 1 Farsifen 3 x 1																											

Tempel Resep/salin resep disini!



Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	-
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Ika
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Puskesmas mantup

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ lansoprazole no.x
R/ Farsifen 400 no.x

c. Perhitungan biaya resep

Lansoprazole 5.000
Farsifen 5.000
Total 10.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket : putih

2 x 1
Sebelum makan

3 x 1
Sesudah makan

e. *Product knowledge*

<p>Nama Obat : Lansoprazole</p> <p>Kandungan : Lansoprazole 30mg</p> <p>Dosis lazim : Dewasa: 30 mg 1 kali sehari,</p> <p>Kegunaan : Pengobatan tukak duodenum dan tukak lambung ringan,</p> <p>ESO potensial : Hipomagnesemia, fraktur terkait osteoporosis, polip kelenjar fundus,</p> <p>KI : pasien yang sedang mengkonsumsi rilpivirine dan atazanavir.</p> <p>PERHATIAN : Pasien dengan keganasan lambung</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>	<p>Nama Obat : farsifen</p> <p>Kandungan : ibuprofen</p> <p>Dosis lazim : 400 mg</p> <p>Kegunaan : nyeri</p> <p>ESO potensial : Pusing, sakit kepala, dispepsia, diare, mual, muntah</p> <p>KI : Pusing, sakit kepala, dispepsia, diare, mual, muntah</p> <p>PERHATIAN : Obat Wajib Apotek, Obat ini dapat dibeli dan diserahkan apoteker tanpa resep dengan maksimum 1 Strip</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>
--	--

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskruining
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : permisi mas, apa kah ada obat sesuai dengan di resep?

TTK : ada bu, untuk nyeri lambung ya

P : iya mas

TTK : (TTK mengambilkan obat) ini bu obatnya , nanti yang lansoprazole diminum sehari 2 kali 30 menit sebelum makan kalau yang farsifen untuk nyeri diminum sehari 3 kali dan diminum bila nyeri saja

P : oke mas, berapa ya?

TTK : 10.000 Bu

P ; ini ya mas uangnya (sambil memberikan uangnya) terimakasih ya mas

TTK : sama-sama ya bu

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)


R/ lansoprazole no.x

S 2 dd 1

R/ farsifen 400 no.x

S 3 dd 1

_____det_____

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
54	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli</p> <p>Resep obat : Racikan/non racikan</p> <p>Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak</p> <p>Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter</p> <p>Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>tn mahru</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>22 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Biomega, demacolin</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Biomega 2 x 1 Demacolin 2 x 1</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Dr. Ika</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Puskesmas mantup</td> </tr> </tbody> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	tn mahru	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	22 tahun	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Biomega, demacolin	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	10	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Biomega 2 x 1 Demacolin 2 x 1	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	-	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Ika	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Puskesmas mantup
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	tn mahru																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	22 tahun																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Biomega, demacolin																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	10																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Biomega 2 x 1 Demacolin 2 x 1																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Ika																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Puskesmas mantup																																							

		<p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>R/ biomega no.x</p> <p>R/ demacolin no.x</p> </div> <p>c. Perhitungan biaya resep</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Biomega : 8.000</p> <p>Demacolin : 5.000</p> <p>Total : 13.000</p> </div> <p>d. ETIKET</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <p>Nama Obat /warna etiket : putih</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; text-align: center; margin: 5px auto; width: 80%;"> <p>2 x 1</p> <p>Sesudah makan</p> </div> </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <p>Nama Obat/warna etiket : putih</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; text-align: center; margin: 5px auto; width: 80%;"> <p>2 x 1</p> <p>Sesudah makan</p> </div> </td> </tr> </table> <p>e. Product knowledge</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border: 1px solid black; padding: 5px; vertical-align: top;"> <p>Nama Obat : biomega</p> <p>Kandungan : Methampyrone 500 mg, vitamin B1 50 mg, vitamin B6 100 mg, vitamin B12 100 mcg</p> <p>Dosis lazim : -</p> </td> <td style="width: 50%; border: 1px solid black; padding: 5px; vertical-align: top;"> <p>Nama obat : demacolin</p> <p>Kandungan : Paracetamol 500 mg, Pseudoefedrin HCL 7.5 mg, Klorfeniramin maleat 2 mg.</p> <p>Dosis lazim : Dewasa : 1 tablet 3 kali per hari</p> </td> </tr> </table>	<p>Nama Obat /warna etiket : putih</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; text-align: center; margin: 5px auto; width: 80%;"> <p>2 x 1</p> <p>Sesudah makan</p> </div>	<p>Nama Obat/warna etiket : putih</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; text-align: center; margin: 5px auto; width: 80%;"> <p>2 x 1</p> <p>Sesudah makan</p> </div>	<p>Nama Obat : biomega</p> <p>Kandungan : Methampyrone 500 mg, vitamin B1 50 mg, vitamin B6 100 mg, vitamin B12 100 mcg</p> <p>Dosis lazim : -</p>	<p>Nama obat : demacolin</p> <p>Kandungan : Paracetamol 500 mg, Pseudoefedrin HCL 7.5 mg, Klorfeniramin maleat 2 mg.</p> <p>Dosis lazim : Dewasa : 1 tablet 3 kali per hari</p>
<p>Nama Obat /warna etiket : putih</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; text-align: center; margin: 5px auto; width: 80%;"> <p>2 x 1</p> <p>Sesudah makan</p> </div>	<p>Nama Obat/warna etiket : putih</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; text-align: center; margin: 5px auto; width: 80%;"> <p>2 x 1</p> <p>Sesudah makan</p> </div>					
<p>Nama Obat : biomega</p> <p>Kandungan : Methampyrone 500 mg, vitamin B1 50 mg, vitamin B6 100 mg, vitamin B12 100 mcg</p> <p>Dosis lazim : -</p>	<p>Nama obat : demacolin</p> <p>Kandungan : Paracetamol 500 mg, Pseudoefedrin HCL 7.5 mg, Klorfeniramin maleat 2 mg.</p> <p>Dosis lazim : Dewasa : 1 tablet 3 kali per hari</p>					

Kegunaan : Meringankan nyeri berat akibat neuritis dan neuralgia

ESO potensial : Reaksi hipersensitif

KI : Kehamilan dan menyusui

PERHATIAN : Jangan digunakan dalam jangka panjang, Hati-hati pada penderita yang pernah mengalami gangguan pembentukan darah/kelainan darah

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

Kegunaan : untuk meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat dan bersin-bersin.

ESO potensial : mengantuk, gangguan pencernaan, insomnia, gelisah, eksitasi, tremor

KI : riwayat gangguan fungsi hati yang berat. Pasien yang peka terhadap obat simpatomimetik lain, penderita tekanan darah tinggi berat

PERHATIAN : Hati-hati penggunaan pada penderita tekanan darah tinggi

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskruining
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)


P : permisi mas, apa kah ada obat sesuai dengan di resep?

TTK : ada bu, untuk batuk ya

P : iya mas, sama badan saya kurang fit

		<p>TTK : (TTK mengambilkan obat) ini bu obatnya , nanti yang demacolin ini untuk batu sama pilek bu sehari diminum 2 kali kalau yang biomega untuk capek capek atau vitamin nya untuk aturan minumnya juga sama 2 kali sehari sesudah makan P : oke mas, berapa ya? TTK : 13.000 Bu P ; ini ya mas uangnya (sambil memberikan uangnya) terimakasih ya mas TTK : sama-sama ya bu</p> <p>h. Salinan resep (wajib dikerjakan)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>R/ biomega no.x S 2 dd 1</p> <p>R/ demacolin no.x S 2 dd 1</p> <p>_____det_____</p> </div>									
No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep									
55	Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter	A. Skrinning Administrasi <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama Pasien :</td> <td style="width: 20%;">Ada/Tidak Ada</td> <td style="width: 50%;">tn Samidi</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>67 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	tn Samidi	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	67 tahun	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	tn Samidi									
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	67 tahun									
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-									

Tempel Resep/salin resep disini!



Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Brainact
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	10
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	1 x 1
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	-
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Ika
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Puskesmas mantup

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ brainact no.x

c. Perhitungan biaya resep

Brainact 115.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

1 x 1

Sesudah makan

		<p>e. Product knowledge</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="862 430 1406 1401"> <p>Nama Obat : brainact Kandungan : citicoline Dosis lazim : 500 mg Kegunaan : Mempercepat rehabilitasi ekstremitas atas/tangan pada pasien Hemiplegia paska Apoplexi, Paralisis ringan pada ekstremitas bawah/kaki yang terjadi dalam waktu 1 tahun dan mendapatkan terapi oral standard, mengatasi penurunan fungsi kognitif pada usia lanjut ESO potensial : Sakit perut, mual, kemerahan pada kulit, pusing KI : - PERHATIAN : hindari dari anak-anak, ibu menyusui dan ibu hamil Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p> </td> <td data-bbox="1406 430 1951 1401"> <p>Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan</p> </td> </tr> </table>	<p>Nama Obat : brainact Kandungan : citicoline Dosis lazim : 500 mg Kegunaan : Mempercepat rehabilitasi ekstremitas atas/tangan pada pasien Hemiplegia paska Apoplexi, Paralisis ringan pada ekstremitas bawah/kaki yang terjadi dalam waktu 1 tahun dan mendapatkan terapi oral standard, mengatasi penurunan fungsi kognitif pada usia lanjut ESO potensial : Sakit perut, mual, kemerahan pada kulit, pusing KI : - PERHATIAN : hindari dari anak-anak, ibu menyusui dan ibu hamil Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>	<p>Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan</p>
<p>Nama Obat : brainact Kandungan : citicoline Dosis lazim : 500 mg Kegunaan : Mempercepat rehabilitasi ekstremitas atas/tangan pada pasien Hemiplegia paska Apoplexi, Paralisis ringan pada ekstremitas bawah/kaki yang terjadi dalam waktu 1 tahun dan mendapatkan terapi oral standard, mengatasi penurunan fungsi kognitif pada usia lanjut ESO potensial : Sakit perut, mual, kemerahan pada kulit, pusing KI : - PERHATIAN : hindari dari anak-anak, ibu menyusui dan ibu hamil Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>	<p>Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan</p>			

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : permisi mas, apa kah ada obat sesuai dengan di resep?

TTK : ada bu, untuk saraf ya

P : iya mas

TTK : (TTK mengambilkan obat) ini bu obatnya , nanti diminum sehari 1 kali sesudah makan

P : oke mas, berapa ya?

TTK : 115.000 Bu

P ; ini ya mas uangnya (sambil memberikan uangnya) terimakasih ya mas

TTK : sama-sama ya bu


h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

R/ Brainact no.x

S 1 dd 1

		<p>R/ Brainact no.x</p> <p>S 1 dd 1</p>																												
No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																												
56	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli</p> <p>Resep obat : Racikan/non racikan</p> <p>Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak</p> <p>Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter</p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="862 959 1731 1495"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>tn hadak</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>45 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Relaxon, comvit c</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Relaxon 2 x 1</td> </tr> </table>		Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	tn hadak	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	45 tahun	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Relaxon, comvit c	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Relaxon 2 x 1
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	tn hadak																												
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	45 tahun																												
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-																												
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Relaxon, comvit c																												
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-																												
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet																												
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1																												
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																												
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Relaxon 2 x 1																												

Tempel Resep/salin resep disini!



		Comvit c 1 x 1
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	-
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Ika
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Puskesmas mantup

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ relaxon no.x
R/ comvit c no.x

c. Perhitungan biaya resep

Relaxon 15.000
Comvit c 7.000
Total : 22.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket : putih

2 x 1
Sesudah makan

1 x 1
Sesudah makan

		<p>e. Product knowledge</p> <p>Nama Obat : relaxon Kandungan : eperisone Dosis lazim : 50 mg Kegunaan : kejang otot ESO potensial : ruam, kantuk dan gemetar KI : hipersentif dan ibu hamil PERHATIAN : tidak boleh untuk ibu menyusui Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>	<p>Nama Obat : comvit c Kandungan : Vitamin B1 HCl 10 mg, Vitamin B2 5 mg, Vitamin B6 HCl 5 mg, Vitamin B12 5 mikrogram, Nicotinamide 20 mg, Calcium Pantothenate 10 mg, Vitamin C 500 mg Dosis lazim : - Kegunaan : Membantu memenuhi kebutuhan vitamin B kompleks dan vitamin C ESO potensial : - KI : Hipersensitif PERHATIAN : Bila penderita mengeluh karena gangguan lambung, lebih baik dimulai dengan 1/2 kaplet sehari sesudah makan Cara penyimpanan : : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>
--	--	---	--

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : permisi mas, apa kah ada obat sesuai dengan di resep?

TTK : ada bu, nyeri ya

P : iya mas sama badan saya agak lemas

TTK : (TTK mengambilkan obat) ini bu obatnya , nanti yang relaxon untuk nyeri sehari diminum 2 kali sesudah makan kalau yang comvit untuk badan lemas kalau ibu punya asam lambung sebaiknya diminum sesudah makan sehari $\frac{1}{2}$ atau 1 tablet

P : oke mas, berapa ya?

TTK : 22.000 Bu

P ; ini ya mas uangnya (sambil memberikan uangnya) terimakasih ya mas

TTK : sama-sama ya bu

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

R/ relaxon no. x


S 2 dd 1

R/ comvit c no.x

S 1 dd 1

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
57	Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter	A. Skrinning Administrasi <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>tn suharno</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>36 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Alvita, demacolin</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Alvita 2 x 1 Demacoli 2 x 1</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Dr. Ika</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Puskesmas mantup</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	tn suharno	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	36 tahun	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Alvita, demacolin	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	10	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Alvita 2 x 1 Demacoli 2 x 1	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	-	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Ika	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Puskesmas mantup
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	tn suharno																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	36 tahun																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Alvita, demacolin																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	10																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Alvita 2 x 1 Demacoli 2 x 1																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Ika																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Puskesmas mantup																																							

Tempel Resep/salin resep disini!



B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ alvita tab no.x

R/ demacolin no x

c. Perhitungan biaya resep

Alvita 5.000

Demacolin 5.000

Total 10.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

2 x 1

Sesudah makan

Nama Obat/warna etiket : putih

2 x 1

Sesudah makan

e. Product knowledge

Nama Obat : alvita

Nama obat : demacolin

		<p>Kandungan : metamizole, Thiamini hcl, Pyridoxini hcl, Cyanocobalaminum</p> <p>Dosis lazim : -</p> <p>Kegunaan : Untuk meringankan rasa sakit yang berat yang disebabkan oleh neuritis dan neuralgia</p> <p>ESO potensial : -</p> <p>KI : -</p> <p>PERHATIAN : -</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>	<p>Kandungan : Paracetamol 500 mg, Pseudoefedrin HCL 7.5 mg, Klorfeniramin maleat 2 mg.</p> <p>Dosis lazim : Dewasa : 1 tablet 3 kali per hari</p> <p>Kegunaan : untuk meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat dan bersin-bersin.</p> <p>ESO potensial : mengantuk, gangguan pencernaan, insomnia, gelisah, eksitasi, tremor</p> <p>KI : riwayat gangguan fungsi hati yang berat. Pasien yang peka terhadap obat simpatomimetik lain, penderita tekanan darah tinggi berat</p> <p>PERHATIAN : Hati-hati penggunaan pada penderita tekanan darah tinggi</p> <p>Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>
		<p>f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)</p>	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Resep diterima dan diskriming 2. mengambilkan obat sesuai resep 3. memberian informasi obat 4. memberi harga 	

		<p>g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>P : permisi mas, apa kah ada obat sesuai dengan di resep? TTK : ada bu, batuk pilek ya P : iya mas sama badan saya kurang enak lemes gitu TTK : (TTK mengambilkan obat) ini bu obatnya , ini demacolin untuk batuk sama pileknya diminum sehari 2 kali sesudah makan kalau yang alvita ini untuk capek-capeknya sehari diminum 2 kali sesudah makan jug P : oke mas, berapa ya? TTK : 10.000 Bu P ; ini ya mas uangnya (sambil memberikan uangnya) terimakasih ya mas TTK : sama-sama ya bu</p> <p>h. Salinan resep (wajib dikerjakan)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>R/ alvita tab no.x</p> <p>S 2 dd 1</p> <p>R/ demacolin no x</p> <p>S 2 dd 1</p> <p>_____det_____</p> </div>
No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep

58


Jenis Resep : Salinan/Resep asli

Resep obat : Racikan/non racikan

Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak

Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter

Tempel Resep/salin resep disini!



A. Skrinning Administrasi

Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	tn yatno
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	68 tahun
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Amlodipine
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	10 mg
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	10
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	1 x 1
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	-
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Ika
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Puskesmas mantup

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ amlodipine no.x

c. Perhitungan biaya resep


Amlodipine 1 strip 3.000

d. ETIKET

		<p>Nama Obat /warna etiket : putih</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; text-align: center;"> <p>1 x 1 sesudah makan</p> </div>	<p>Nama Obat/warna etiket :</p> <div style="border: 1px solid green; height: 100px;"></div>
		<p>e. Product knowledge</p>	
		<p>Nama Obat : amlodipine Kandungan : amlodipine Dosis lazim : 10 mg Kegunaan : hipertensi ESO potensial : jantung berdebar kencang KI : hipersensitif PERHATIAN : hindari untuk ibu hamil dan menyusui Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>	<p>Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan</p>
		<p>f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)</p>	
		<div style="border: 1px solid green; padding: 10px;"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Resep diterima dan diskriming 2. mengambilkan obat sesuai resep 3. memberian informasi obat </div>	

		<p>g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>P : permisi mas, apa kah ada obat sesuai dengan di resep? TTK : ada bu, untuk hipertensi ya P : iya mas TTK : (TTK mengambilkan obat) ini bu obatnya , nanti diminum sehari 1 kali saja ya P : oke mas, berapa ya? TTK : 3.000 Bu P ; ini ya mas uangnya (sambil memberikan uangnya) terimakasih ya mas TTK : sama-sama ya bu</p> <p>h. Salinan resep (wajib dikerjakan)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>R/ amlodipine 10 mg no.x</p> <p>S 1 dd 1</p> <p>_____det_____</p> </div>												
No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep												
59	Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter	A. Skrinning Administrasi <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama Pasien :</td> <td style="width: 20%;">Ada/Tidak Ada</td> <td style="width: 50%;">tn mapandjie Setiadi</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>25 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Forumen</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	tn mapandjie Setiadi	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	25 tahun	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Forumen
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	tn mapandjie Setiadi												
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	25 tahun												
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-												
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Forumen												

Tempel Resep/salin resep disini!



Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Drop
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3 x 2 tetes teliga kanan
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	24/04/2023
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Bulan ghafirah
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	503.446/3668/I/IP.DU
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Puskesmas sememi

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ forumen tetes telinga no.i

c. Perhitungan biaya resep

Forumen tetes teliga 35.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : biru


Nama Obat/warna etiket :

3 x 2 tetes teliga kanan

		<p>e. Product knowledge</p> <table border="1"><tr><td data-bbox="862 312 1406 932">Nama Obat : forumen Kandungan : docusate 5 mg Dosis lazim : 5 mg Kegunaan : untuk membersihkan telinga ESO potensial : tersengat atau nyeri KI : inflamasi pada telinga PERHATIAN : tidak boleh digunakan 2 hari berturut-turut Cara penyimpanan Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</td><td data-bbox="1406 312 1951 932">Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan</td></tr></table> <p>f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)</p> <table border="1"><tr><td data-bbox="875 1002 1899 1394"><ol style="list-style-type: none">1. Resep diterima dan diskriming2. mengambilkan obat sesuai resep3. memberian informasi obat4. memberi harga</td></tr></table> <p>g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p>	Nama Obat : forumen Kandungan : docusate 5 mg Dosis lazim : 5 mg Kegunaan : untuk membersihkan telinga ESO potensial : tersengat atau nyeri KI : inflamasi pada telinga PERHATIAN : tidak boleh digunakan 2 hari berturut-turut Cara penyimpanan Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan	<ol style="list-style-type: none">1. Resep diterima dan diskriming2. mengambilkan obat sesuai resep3. memberian informasi obat4. memberi harga
Nama Obat : forumen Kandungan : docusate 5 mg Dosis lazim : 5 mg Kegunaan : untuk membersihkan telinga ESO potensial : tersengat atau nyeri KI : inflamasi pada telinga PERHATIAN : tidak boleh digunakan 2 hari berturut-turut Cara penyimpanan Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan				
<ol style="list-style-type: none">1. Resep diterima dan diskriming2. mengambilkan obat sesuai resep3. memberian informasi obat4. memberi harga					

		<p>P : permisi mas, apa kah ada obat sesuai dengan di resep? TTK : ada bu, untuk megeluarkan kotoran diteliga ya P : iya mas TTK : (TTK mengambilkan obat) ini bu obatnya , nanti cara pakainya diteteskan 3 kali sehari 2 tetes untuk teligah kanan saja ya bu P : oke mas, berapa ya? TTK : 35.000 Bu P ; ini ya mas uangnya (sambil memberikan uangnnya) terimakasih ya mas TTK : sama-sama ya bu</p> <p>h. Salinan resep (wajib dikerjakan)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>R/ forumen tetes teliga no.i</p> <p>S 3 dd 2 gtt OD</p> <p>_____det_____</p> </div>																											
No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																											
60	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli</p> <p>Resep obat : Racikan/non racikan</p> <p>Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak</p> <p>Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter</p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="862 965 1731 1497"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Nabila</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Scabimite</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Salep</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Secukupnya</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Nabila	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Scabimite	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Salep	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	3	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Secukupnya
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Nabila																											
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-																											
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-																											
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Scabimite																											
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-																											
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Salep																											
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	3																											
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																											
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Secukupnya																											

Tempel Resep/salin resep disini!



Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	24/03/2023
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Swany juliahidayat
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	503.446/2229/I/IP.DU
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	RAYA BUKIT PALMA

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ scabimite no.iii

c. Perhitungan biaya resep

Scabimite 72.000 x 3 = 216.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : biru

Nama Obat/warna etiket :

Dioleskan seluruh badan
Pemakaian luar

e. Product knowledge

Nama Obat : scabimate	Nama Obat :
Kandungan : permethin	Kandungan :

Dosis lazim : 5%
 Kegunaan : scabies
 ESO potensial : rasa seperti terbakar
 KI : hipersensitif
 PERHATIAN : hindari terkena mata
 Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : permisi mas, apa kah ada obat sesuai dengan di resep?

TTK : ada bu, untuk scabies ya

P : iya mas habis dari pondok anak saya


TTK : (TTK mengambilkan obat) ini bu salepnya , nanti kalau mau pakai salepnya diusahakan mandi atau dalam keadaan bersih ya bu, lalu dioleskan merata untuk seluruh tubuh

P : oke mas, berapa ya?

TTK : 216.000 Bu

P ; ini ya mas uangnya (sambil memberikan uangnya) terimakasih ya mas

TTK : sama-sama ya bu

		<p>h. Salinan resep (wajib dikerjakan)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>R/ scabimite salep no.iii S . u . e -----det-----</p> </div>																																							
No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
61	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli</p> <p>Resep obat : Racikan/non racikan</p> <p>Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak</p> <p>Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter</p> <p>Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="862 550 1736 1404"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Kasiran</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada</td> <td>50th</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Omeprazole</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak Ada</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>2x1, sebelum makan</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada</td> <td>Dr. Rikko</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Tidak Ada</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada</td> <td>Jl. Raya Mantup No.55</td> </tr> </table> <p>b. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p>	Nama Pasien :	Ada	Kasiran	Umur pasien :	Ada	50th	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Omeprazole	Kekuatan :	Ada	-	Bentuk sed. :	Tidak Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada	10	Duplikasi terapi :	Tidak Ada		Aturan pakai :	Ada	2x1, sebelum makan	Tanggal penulisan resep :	Ada		Nama dokter :	Ada	Dr. Rikko	Surat ijin :	Tidak Ada		Alamat dr. :	Ada	Jl. Raya Mantup No.55
Nama Pasien :	Ada	Kasiran																																							
Umur pasien :	Ada	50th																																							
Berat Badan :	Tidak Ada	-																																							
Nama Obat :	Ada	Omeprazole																																							
Kekuatan :	Ada	-																																							
Bentuk sed. :	Tidak Ada	Tablet																																							
Jumlah obat :	Ada	10																																							
Duplikasi terapi :	Tidak Ada																																								
Aturan pakai :	Ada	2x1, sebelum makan																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada																																								
Nama dokter :	Ada	Dr. Rikko																																							
Surat ijin :	Tidak Ada																																								
Alamat dr. :	Ada	Jl. Raya Mantup No.55																																							

R/ Omeprazole 10 tab

c. Perhitungan biaya resep

R/ Omeprazole 10 tab = 4.500

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

2 x 1

30 menit sebelum makan

e. Product knowledge

Nama Obat : Omeprazole

Kandungan : Omeprazole 20mg

Dosis lazim : Dewasa: 20 mg 1 kali sehari hingga 8 minggu

Kegunaan : Pengobatan jangka pendek untuk tukak lambung dan tukak duodenum

ESO potensial : Hipomagnasemia, lupus eritematosus kulit

KI : hipersensitivitas

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan

PERHATIAN : Perhatian khusus pada Pasien dengan penurunan simpanan tubuh atau faktor risiko penurunan penyerapan vitamin B12; risiko osteoporosis

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambil obat sesuai resep
3. memberikan informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : permisi mas, apa kah ada obat sesuai dengan di resep?

TTK : ada bu, untuk nyeri lambung ya

P : iya mas kayak telat makan gitu


TTK : (TTK mengambil obat) ini bu obatnya , nanti aturan 2 kali sehari minum nya diminum 30 menit sebelum makan dan diusahakan perutnya diisi makan ya soalnya nanti kalau telat makan akan bertambah parah sakitnya

P : oke mas, berapa ya?

TTK : 4.500 Bu

P ; ini ya mas uangnya (sambil memberikan uangnya) terimakasih ya mas

TTK : sama-sama ya bu



h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

R/ omeprazole no.x

S 2 dd 1

-----det-----

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep
62	Jenis Resep : Salinan/Resep asli	A. Skrinning Administrasi

Resep obat : Racikan/non racikan
 Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak
 Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter
 Tempel Resep/salin resep disini!



Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ny kasmiaji
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	54 tahun
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Natrium diklofenak
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	50 mg
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	10
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	2 x 1
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	27/04/2023
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr anang
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Klinik pratama

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ natrium diclofenac no. x

c. Perhitungan biaya resep

Natrium diclofenac 4.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket :putih


Nama Obat/warna etiket :

2 x 1

		<p>e. Product knowledge</p> <table border="1"><tr><td data-bbox="862 545 1406 1198"><p>Nama Obat : natirum diklofenac Kandungan : natirum diklofenac Dosis lazim : 50 mg Kegunaan : analgesic ESO potensial : anemia, hipertensi KI : hipersensitif PERHATIAN : hindari pemakaian ibu hamil dan menyusui Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p></td><td data-bbox="1406 545 1951 1198"><p>Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan</p></td></tr></table> <p>f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)</p> <table border="1"><tr><td data-bbox="875 1270 1899 1525"><ol style="list-style-type: none">1. Resep diterima dan diskriming2. mengambilkan obat sesuai resep3. memberian informasi obat4. memberi harga</td></tr></table>	<p>Nama Obat : natirum diklofenac Kandungan : natirum diklofenac Dosis lazim : 50 mg Kegunaan : analgesic ESO potensial : anemia, hipertensi KI : hipersensitif PERHATIAN : hindari pemakaian ibu hamil dan menyusui Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>	<p>Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Resep diterima dan diskriming2. mengambilkan obat sesuai resep3. memberian informasi obat4. memberi harga
<p>Nama Obat : natirum diklofenac Kandungan : natirum diklofenac Dosis lazim : 50 mg Kegunaan : analgesic ESO potensial : anemia, hipertensi KI : hipersensitif PERHATIAN : hindari pemakaian ibu hamil dan menyusui Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>	<p>Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan</p>				
<ol style="list-style-type: none">1. Resep diterima dan diskriming2. mengambilkan obat sesuai resep3. memberian informasi obat4. memberi harga					

		<p>g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)</p> <p>P : permisi mas, apa kah ada obat sesuai dengan di resep? TTK : ada bu, untuk nyeri dewasa ya P : iya mas TTK : (TTK mengambilkan obat) ini bu obatnya , sehari diminum 3 kali sesudah makan ya bu P : oke mas, berapa ya? TTK : 4.000 Bu P ; ini ya mas uangnya (sambil memberikan uangnya) terimakasih ya mas TTK : sama-sama ya bu</p> <p>h. Salinan resep (wajib dikerjakan)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>R/ natirum diklofenak no.x</p> <p>S 2 dd 1</p> <p>-----det-----</p> </div>
--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep															
63	Jenis Resep : Resep asli Resep obat : non racikan Jumlah obat dalam resep : Tidak Pengulangan resep : Neiter Tempel Resep/salin resep disini!	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>An kayohila</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada</td> <td>1 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>salicyl</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	An kayohila	Umur pasien :	Ada	1 tahun	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	salicyl	Kekuatan :	Tidak Ada	-
Nama Pasien :	Ada	An kayohila															
Umur pasien :	Ada	1 tahun															
Berat Badan :	Tidak Ada	-															
Nama Obat :	Ada	salicyl															
Kekuatan :	Tidak Ada	-															



Bentuk sed. :	Ada	Bedak
Jumlah obat :	Ada	1
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada	2 kali sehari
Tanggal penulisan resep :	Ada	18/04/2022
Nama dokter :	Ada	Dr ita maftuhah
Surat ijin :	Ada	124/SIP.DU/VII/2017
Alamat dr. :	Ada	Puskesmas karang binangun

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ salicyl bedak no 1

c. Perhitungan biaya resep

Salicyl bedak 9.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : biru

Nama Obat/warna etiket :

2 kali sehari
ditaburkan secukupnya

e. *Product knowledge*

Nama Obat : salicyl

Kandungan : salicyl

Dosis lazim : -

Kegunaan : mengurangi biang keringat

ESO potensial :-

KI : -

PERHATIAN : tidak boleh digunakan dibawah 3 tahun tanpa resep dokter

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

p : mas mau mengambil resep ini ada kah?

ttk : ada bu, untuk biang keringat ya bu

p : iya mas

ttk : (ttk mengambilkan bedak) ini bu bedak ya, untuk aturan pakai sehari 2 kali ditaburkan secukupnya pada bagian yang gatal

p : baik mas, berapa ya?

ttk : 9.000 bu

p : ini ya mas (sambal memberikan uang)

ttk : terimakasih ya bu

p : sama-sama mas

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)


R/ salicyl bedak no.1

S 2 dd s.u.e

dot

--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																				
64	Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!	A. Skrinning Administrasi <table border="1" data-bbox="862 683 1731 1439"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tn ifatun</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>22 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Bioplaceton cream</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Salep</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Secukupnya</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>5/12/2022</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Dr. Ita maftuhah</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>124/SIP.DU/VII/2017</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Tn ifatun	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	22 tahun	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Bioplaceton cream	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Salep	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Secukupnya	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	5/12/2022	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Ita maftuhah	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	124/SIP.DU/VII/2017
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Tn ifatun																																				
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	22 tahun																																				
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-																																				
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Bioplaceton cream																																				
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-																																				
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Salep																																				
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1																																				
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																				
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Secukupnya																																				
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	5/12/2022																																				
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Ita maftuhah																																				
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	124/SIP.DU/VII/2017																																				



Pro : Jauhar Jalal
 Alamat : Kesapang

Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Puskesmas karangbinangun
--------------	---------------	--------------------------

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ Bioplacenton cream no.1 s.u.e

c. Perhitungan biaya resep

Bioplacenton cream : 22.0000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : biru

Nama Obat/warna etiket :

Diolskan pada bagian yang sakit
(secukupnya)

e. Product knowledge

Nama Obat : bioplacenton cream	Nama Obat : Kandungan :
--------------------------------	----------------------------

Kandungan : placenta extract 10%
neomycin sulfate 0,5%

Dosis lazim : -

Kegunaan : luka bakar, luka infeksi

ESO potensial : kemerahan

KI : hipersensitif placenta
extract dan neomycin sulfate

PERHATIAN : jangan berikan
bioplacenton pada area mata

Cara penyimpanan : Simpan di bawah
suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat,
kering, dan terlindung dari cahaya dan
kelembaban

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskruining
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : permisi mas, apa kah ada obat sesuai dengan di resep?

TTK : ada bu, untuk luka bakar ya

P : iya mas habis terkena knalpot kaki saya

TTK : (TTK mengambilkan obat) ini bu salepnya , nanti kaki yang terkena knalpot harus dibersihkan lalu dioleskan salep ini tipis-tipis ya bu

P : oke mas, berapa ya?

TTK : 22.000 Bu

P ; ini ya mas uangnya (sambil memberikan uangnya) terimakasih ya mas


TTK : sama-sama ya bu

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

R/ Bioplacenton cream no.1

s.u.e

-----det-----

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																								
65	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli</p> <p>Resep obat : Racikan/non racikan</p> <p>Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak</p> <p>Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter</p> <p>Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="862 373 1731 1230"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Kemal</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Spasminal</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>3 x 1</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>03/03/2023</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Dr yukubus</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>3u3/148/4038/b/ip.du/43 6.7</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>benowo</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <table border="1" data-bbox="862 1350 1917 1410"> <tr> <td>R/ spasminal no.x</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Kemal	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Spasminal	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	10	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3 x 1	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	03/03/2023	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr yukubus	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	3u3/148/4038/b/ip.du/43 6.7	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	benowo	R/ spasminal no.x
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Kemal																																								
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-																																								
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-																																								
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Spasminal																																								
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-																																								
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet																																								
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	10																																								
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																								
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3 x 1																																								
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	03/03/2023																																								
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr yukubus																																								
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	3u3/148/4038/b/ip.du/43 6.7																																								
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	benowo																																								
R/ spasminal no.x																																										

c. Perhitungan biaya resep

Spasminal 1 strip 15.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

3 x 1

Sesudah makan

e. *Product knowledge*

Nama Obat : spasminal

Nama Obat :

Kandungan : hyoscine-N dan paracetamol

Kandungan :

Dosis lazim : -

Dosis lazim :

Kegunaan : nyeri perut

Kegunaan :

ESO potensial : reaksi pada kulit, misalnya kemerahan. Agranulositosis.

ESO potensial :

Gangguan saluran pencernaan

KI :

KI : Pasien yang memiliki gangguan fungsi hati. Penderita kolik yang sedang dalam keadaan hamil ataupun menyusui.

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

PERHATIAN : Tidak untuk mengobati sakit otot pada gejala-gejala flu, rematik, lumbago, sakit punggung, bursitis, sindroma bahu lengan.

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : permisi mas, apa kah ada obat sesuai dengan di resep?


TTK : ada bu, untuk nyeri perut ya

P : iya mas kayak dismore ternyata tidak saya

		<p>TTK : (TTK mengambilkan obat) aturan pakainya 3 x 1 ya bu sesudah makan P : oke mas, berapa ya? TTK : 15.000 Bu P ; ini ya mas uangnya (sambil memberikan uangnya) terimakasih ya mas TTK : sama-sama ya bu</p> <p>h. Salinan resep (wajib dikerjakan)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>R/ spasmlal no.x</p> <p>S 3 dd 1</p> <p>_____det_____</p> </div>
--	--	---

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep		
66	Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter	A. Skrinning Administrasi		
		Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Tn agus
		Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	55 tahun
		Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-

Tempel Resep/salin resep disini!



Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Atorvastatin
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	20 mg
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	10
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	1 x 1
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	03/03/2023
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jalan raya kupang

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ atorvastatin 20 mg no.x

c. Perhitungan biaya resep

30.000 1 strip

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

1 x 1

Sesudah makan

Malam hari

e. Product knowledge

Nama Obat : atorvastatin 20 mg	Nama Obat :
Kandungan : atorvastatin	Kandungan :
Dosis lazim : 10- 20 mg	Dosis lazim :
Kegunaan : kolestrol	Kegunaan :
ESO potensial : konstipasi, perut kembung, dispepsia, nyeri abdomen, sakit kepala, mual, mialgia, lemas.	ESO potensial :
KI : Hipersentivitas, Kategori kehamilan	KI :
PERHATIAN : Pasien dengan gangguan fungsi hati	PERHATIAN :
Cara penyimpanan : disuhu ruang, kering dan sejuk	Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : permisi mas, apa kah ada obat sesuai dengan di resep?

TTK : ada bu, untuk kolestrol ya

P : iya mas

TTK : (TTK mengambilkan obat) ini bu obatnya, sehari diminum 1 kali dan sebelum tidur

P : oke mas, berapa ya?


TTK : 30.000 Bu

P ; ini ya mas uangnya (sambil memberikan uangnya) terimakasih ya mas

TTK : sama-sama ya bu


h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

		<p>R/ atorvastatin 20 mg</p> <p>S 1 dd 1</p> <p>_____det_____</p>
--	--	---



No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																											
67	Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ny denok</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>31 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Cetirizine</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1 x 1</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ny denok	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	31 tahun	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Cetirizine	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	5	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	1 x 1
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ny denok																											
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	31 tahun																											
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-																											
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Cetirizine																											
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-																											
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet																											
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	5																											
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																											
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	1 x 1																											

Tempel Resep/salin resep disini!



Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	02/03/2023
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr dita ayu kartikasari
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	303.446/4141/b/2022
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	benowo

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ cetirizine no. v

c. Perhitungan biaya resep

1 strip 3.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

1 x 1
Sesudah makan

e. Product knowledge

Nama Obat : cetirizine	Nama Obat :
Kandungan : cetirizine	Kandungan :

Dosis lazim : 10 mg
Kegunaan : alergi
ESO potensial : mulut kering, diare dan muntah
KI : hipersensitif
PERHATIAN : penggunaan dibawah usai 2 tahun harus dianjurkan dokter
Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskruining
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : permisi mas, apa kah ada obat sesuai dengan di resep?

TTK : ada bu, untuk gatal ya

P : iya mas

TTK : (TTK mengambilkan obat) ini bu obatnya , nanti cara minumnya sehari sekali saja ya bu sesudah makan

P : oke mas, berapa ya?

TTK : 3.000 Bu

P ; ini ya mas uangnya (sambil memberikan uangnya) terimakasih ya mas

TTK : sama-sama ya bu

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

R/ cetirizine no.v


S 1 dd 1

_____ det _____

--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
68	Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter	A. Skrinning Administrasi <table border="1" data-bbox="862 555 1731 1414"> <tr> <td data-bbox="862 555 1131 616">Nama Pasien :</td> <td data-bbox="1131 555 1355 616">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 555 1731 616">tn totok</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 616 1131 676">Umur pasien :</td> <td data-bbox="1131 616 1355 676">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 616 1731 676">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 676 1131 737">Berat Badan :</td> <td data-bbox="1131 676 1355 737">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 676 1731 737">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 737 1131 798">Nama Obat :</td> <td data-bbox="1131 737 1355 798">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 737 1731 798">Cinogenta cream</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 798 1131 858">Kekuatan :</td> <td data-bbox="1131 798 1355 858">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 798 1731 858">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 858 1131 919">Bentuk sed. :</td> <td data-bbox="1131 858 1355 919">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 858 1731 919">Cream</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 919 1131 979">Jumlah obat :</td> <td data-bbox="1131 919 1355 979">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 919 1731 979">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 979 1131 1040">Duplikasi terapi :</td> <td data-bbox="1131 979 1355 1040">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 979 1731 1040">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 1040 1131 1136">Aturan pakai :</td> <td data-bbox="1131 1040 1355 1136">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 1040 1731 1136">Dioleskan tipis tipis, sehari 2 kali</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 1136 1131 1232">Tanggal penulisan resep :</td> <td data-bbox="1131 1136 1355 1232">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 1136 1731 1232">21/02/2023</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 1232 1131 1292">Nama dokter :</td> <td data-bbox="1131 1232 1355 1292">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 1232 1731 1292">Dr yukubus wanusukho</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 1292 1131 1353">Surat ijin :</td> <td data-bbox="1131 1292 1355 1353">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 1292 1731 1353">503.446/4033/b/ip.du.436</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 1353 1131 1414">Alamat dr. :</td> <td data-bbox="1131 1353 1355 1414">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 1353 1731 1414">Klinik phc benowo</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	tn totok	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Cinogenta cream	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Cream	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Dioleskan tipis tipis, sehari 2 kali	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	21/02/2023	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr yukubus wanusukho	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	503.446/4033/b/ip.du.436	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Klinik phc benowo
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	tn totok																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Cinogenta cream																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Cream																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Dioleskan tipis tipis, sehari 2 kali																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	21/02/2023																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr yukubus wanusukho																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	503.446/4033/b/ip.du.436																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Klinik phc benowo																																							

Tempel Resep/salin resep disini!



B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ cinogenta cream no.1

c. Perhitungan biaya resep

Cinogenta 48.500

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : biru

Nama Obat/warna etiket :

2 x 1

Dioleskan tipis-tipis

e. Product knowledge

Nama Obat : cinogenta

Nama Obat :

Kandungan : Gentamisin sulfat 1.67 mg Fluosinolon asetonid 0.25 mg

Kandungan :

Dosis lazim : -

Dosis lazim :

Kegunaan : Inflamasi dan gatal pada dermatosis yang dapat ditangani dengan kortikosteroid, akibat infeksi kuman seperti dermatitis atopik, dermatitis

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

seboroik, neurodermatitis lokalisata, pruritus anogential.

ESO potensial : Sensasi panas terbakar dan gatal, kulit kering

KI : Sensasi panas terbakar dan gatal, kulit kering

PERHATIAN : Hanya untuk penggunaan luar. - Hati-hati pemakaian pada wanita hamil dan menyusui.

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : permisi mas, apa kah ada obat sesuai dengan di resep?

TTK : ada bu, untuk gatal ada lukanya ya

P : iya mas

TTK : (TTK mengambilkan obat) ini bu salepnya , nanti kaki yang terkena gatal harus dibersihkan lalu dioleskan salep ini tipis-tipis ya bu dan sehari 2 kali

P : oke mas, berapa ya?

TTK : 48.500 Bu

P ; ini ya mas uangnya (sambil memberikan uangnya) terimakasih ya mas


TTK : sama-sama ya bu

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

R/ cinogenta cream no.1

s.u.e oleskan 2 x sehari tipis-tipis

_____det_____

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																								
69	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli</p> <p>Resep obat : Racikan/non racikan</p> <p>Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak</p> <p>Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter</p> <p>Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="862 316 1731 1169"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>tn dwi Hartono</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Laxadine</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Sirup</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1 x 1ml</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>02/03/2023</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Dr Nathan newell S</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>503.446/47/b/ip.du/430/2022</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Benowo</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <table border="1" data-bbox="862 1289 1915 1348"> <tr> <td>R. laxadine no.1</td> </tr> </table> <p>c. Perhitungan biaya resep</p>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	tn dwi Hartono	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Laxadine	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Sirup	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	1 x 1ml	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	02/03/2023	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr Nathan newell S	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	503.446/47/b/ip.du/430/2022	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Benowo	R. laxadine no.1
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	tn dwi Hartono																																								
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-																																								
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-																																								
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Laxadine																																								
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-																																								
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Sirup																																								
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1																																								
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																								
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	1 x 1ml																																								
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	02/03/2023																																								
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr Nathan newell S																																								
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	503.446/47/b/ip.du/430/2022																																								
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Benowo																																								
R. laxadine no.1																																										

Laxadine 48.000

b. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

1 x 1 ml

e. Product knowledge

Nama Obat : laxadine

Kandungan : Phenolphthalein 55 mg,
liqd paraffin 1,200 mg, glycerin 378 mg

Dosis lazim : -

Kegunaan : pelican jalannya kotoran

ESO potensial : ruam kulit, mual an
muntah

KI : Ileus obstruktif, nyeri
perut yang tidak diketahui
penyebabnya.

PERHATIAN : hindari jangka lama

Cara penyimpanan : Simpan di bawah
suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat,

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : permisi mas, apa kah ada obat sesuai dengan di resep?

TTK : ada bu, untuk sembelit ya


P : iya mas

TTK : (TTK mengambilkan obat) ini bu sirupnya , nanti diminum sehari 1 kali saja 1ml

		<p>ya bu P : oke mas, berapa ya? TTK : 48.000 Bu P ; ini ya mas uangnya (sambil memberikan uangnya) terimakasih ya mas TTK : sama-sama ya bu</p> <p>h. Salinan resep (wajib dikerjakan)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>R/ laxadine no. 1 S 1 dd 1 10 cc _____det_____</p> </div>
--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep									
70	Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter	A. Skrinning Administrasi <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama Pasien :</td> <td style="width: 20%;">Ada/Tidak Ada</td> <td style="width: 50%;">Sdr bima anugrah</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>14 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Sdr bima anugrah	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	14 tahun	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Sdr bima anugrah									
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	14 tahun									
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-									

Tempel Resep/salin resep disini!



Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Natrium diclofenac
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	50 mg
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	10
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3 x 1
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	02/03/2023
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Drg Rosalina tri W
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ natrium diclofenac no.x

c. Perhitungan biaya resep

Natrium diclofenac 1 strip 4.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

3 x 1

Sesudah makan

e. Product knowledge

Nama Obat : natirum diklofenac	Nama Obat :
Kandungan : natirum diklofenac	Kandungan :
Dosis lazim : 50 mg	Dosis lazim :
Kegunaan : analgesic	Kegunaan :
ESO potensial : anemia, hipertensi	ESO potensial :
KI : hipersensitif	KI :
PERHATIAN : hindari pemakaian ibu hamil dan menyusui	PERHATIAN :
Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban	Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : permisi mas, apa kah ada obat sesuai dengan di resep?

TTK : ada bu, untuk nyeri anak ya

P : iya mas

TTK : (TTK mengambilkan obat) ini bu obatnya , sehari diminum 3 kali sesudah makan ya bu

P : oke mas, berapa ya?


TTK : 4.000 Bu

P ; ini ya mas uangnya (sambil memberikan uangnya) terimakasih ya mas

TTK : sama-sama ya bu

		<p>h. Salinan resep (wajib dikerjakan)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>R/ natrium diclofenac no.x</p> <p>S 3 dd 1</p> <p>-----det-----</p> </div>
--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																											
71	<p>Jenis Resep : Resep asli</p> <p>Resep obat : non racikan</p> <p>Jumlah obat dalam resep : Tidak</p> <p>Pengulangan resep : netter</p> <p>Tempel Resep/salin resep disini!</p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>An alzhea cansol</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada</td> <td>2 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada</td> <td>12 kg</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Permethin</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada</td> <td>Salep</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada</td> <td>Scabimate</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>Oleskan seluruh tubuh</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	An alzhea cansol	Umur pasien :	Ada	2 tahun	Berat Badan :	Ada	12 kg	Nama Obat :	Ada	Permethin	Kekuatan :	Ada	5%	Bentuk sed. :	Ada	Salep	Jumlah obat :	Ada	2	Duplikasi terapi :	Ada	Scabimate	Aturan pakai :	Ada	Oleskan seluruh tubuh
Nama Pasien :	Ada	An alzhea cansol																											
Umur pasien :	Ada	2 tahun																											
Berat Badan :	Ada	12 kg																											
Nama Obat :	Ada	Permethin																											
Kekuatan :	Ada	5%																											
Bentuk sed. :	Ada	Salep																											
Jumlah obat :	Ada	2																											
Duplikasi terapi :	Ada	Scabimate																											
Aturan pakai :	Ada	Oleskan seluruh tubuh																											



Tanggal penulisan resep :	Ada	03/03/2023
Nama dokter :	Ada	Dr Gregorius N.B.P
Surat ijin :	Ada	503.446/3699/BAP/2022
Alamat dr. :	Ada	Puskesmas sememi

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ permethin cream 5% no.ii
s.u.e

c. Perhitungan biaya resep

Scabimate cream 72.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : biru

Nama Obat/warna etiket :

Dioleskan secukupnya
(seluruh tubuh)

e. Product knowledge

Nama Obat : scabimate	Nama Obat :
Kandungan : permethin	Kandungan :

Dosis lazim : 5%
 Kegunaan : scabies
 ESO potensial : rasa seperti terbakar
 KI : hipersensitif
 PERHATIAN : hindari terkena mata
 Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambil obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : mas mau mengambil obat ini ada?
 TTK : ada bu, tapi mereknya scabimite kandungannya sama seperti resep bagaimana?
 P : tapi sama ya mas
 TTK : (sambil mengambilkan salepnya) ini bu salepnya terdapat kandungan permethrin disalepnya, ini untuk anaknya ya bu?
 P : ini mas
 TTK : iya bu biasanya pakai ini sudah bisa, bagaimana?

P : berapa mas ?

TTK : 144.000 bu

P : yaudah itu saja mas

TTK : baik bu, ini aturan pakai nya dipakai setelah mandi atau badan bersih lalu dioleskan ke seluruh tubuh dan oles tipis-tipis ya bu

P : baik mas, ini uangnya ya (sambil memberikan uang)terimakasih ya mas

TTK : baik bu , sama-sama

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

R/ permethin cream 5% no.ii


s.u.e

-----da scabimate-----

--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																								
72	Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter	<p data-bbox="909 440 1245 472">A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="864 493 1731 1315"> <tr> <td data-bbox="864 493 1128 555">Nama Pasien :</td> <td data-bbox="1128 493 1352 555">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1352 493 1731 555">Frenael</td> </tr> <tr> <td data-bbox="864 555 1128 617">Umur pasien :</td> <td data-bbox="1128 555 1352 617">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1352 555 1731 617">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="864 617 1128 679">Berat Badan :</td> <td data-bbox="1128 617 1352 679">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1352 617 1731 679">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="864 679 1128 742">Nama Obat :</td> <td data-bbox="1128 679 1352 742">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1352 679 1731 742">Sporetik syr</td> </tr> <tr> <td data-bbox="864 742 1128 804">Kekuatan :</td> <td data-bbox="1128 742 1352 804">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1352 742 1731 804">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="864 804 1128 866">Bentuk sed. :</td> <td data-bbox="1128 804 1352 866">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1352 804 1731 866">Sirup</td> </tr> <tr> <td data-bbox="864 866 1128 928">Jumlah obat :</td> <td data-bbox="1128 866 1352 928">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1352 866 1731 928">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="864 928 1128 991">Duplikasi terapi :</td> <td data-bbox="1128 928 1352 991">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1352 928 1731 991">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="864 991 1128 1053">Aturan pakai :</td> <td data-bbox="1128 991 1352 1053">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1352 991 1731 1053">2 x 1 sendokk the</td> </tr> <tr> <td data-bbox="864 1053 1128 1131">Tanggal penulisan resep :</td> <td data-bbox="1128 1053 1352 1131">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1352 1053 1731 1131">05/03/2023</td> </tr> <tr> <td data-bbox="864 1131 1128 1193">Nama dokter :</td> <td data-bbox="1128 1131 1352 1193">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1352 1131 1731 1193">Dr achmad yunus</td> </tr> <tr> <td data-bbox="864 1193 1128 1256">Surat ijin :</td> <td data-bbox="1128 1193 1352 1256">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1352 1193 1731 1256">503.446</td> </tr> <tr> <td data-bbox="864 1256 1128 1318">Alamat dr. :</td> <td data-bbox="1128 1256 1352 1318">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1352 1256 1731 1318">Pondok benowo indah</td> </tr> </table> <p data-bbox="909 1377 1458 1409">B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <table border="1" data-bbox="864 1433 1915 1490"> <tr> <td data-bbox="864 1433 1915 1490">R/ sporetik syr no.1</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Frenael	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Sporetik syr	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Sirup	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	2 x 1 sendokk the	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	05/03/2023	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr achmad yunus	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	503.446	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Pondok benowo indah	R/ sporetik syr no.1
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Frenael																																								
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-																																								
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-																																								
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Sporetik syr																																								
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-																																								
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Sirup																																								
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1																																								
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																								
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	2 x 1 sendokk the																																								
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	05/03/2023																																								
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr achmad yunus																																								
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	503.446																																								
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Pondok benowo indah																																								
R/ sporetik syr no.1																																										

Tempel Resep/salin resep disini!



c. Perhitungan biaya resep

Sporetik syr 120.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

2 x 1 sendok the
 Sesudah makan
 dihabiskan

e. Product knowledge

Nama Obat : sporetik

Kandungan : cefixime trihydrate

Dosis lazim : 5 ml

Kegunaan : Infeksi saluran kemih tanpa komplikasi, otitis media, (radang rongga gendang telinga), faringitis dan tonsilitis, bronkhitis akut dan kronis serta eksaserbasi (kumatnya penyakit atau gejala penyakit secara mendadak) akut

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

ESO potensial : Diare, sakit perut, dispepsia, perut kembung, mual, muntah

KI : Diare, sakit perut, dispepsia, perut kembung, mual, muntah

PERHATIAN : Hati-hati terhadap pasien dengan riwayat anemia hemolitik terkait sefalosporin, penyakit gastrointestinal, hipersensitivitas terhadap penisilin dan antibiotik beta-laktam lainnya. Gangguan ginjal. Anak-anak. Kehamilan dan menyusui.

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban


f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

		<p>P : permisi mas, apa kah ada obat sesuai dengan di resep? TTK : ada bu, untuk infeksi ya P : iya mas TTK : (TTK mengambilkan obat) ini bu sirupnya , nanti sehari diminum 2 x 1 sendok the ya bu apabila sudah agak mendingan sirupnya tetap dihabiskan ya P : oke mas, berapa ya? TTK : 120.000 Bu P ; ini ya mas uangnya (sambil memberikan uangnya) terimakasih ya mas TTK : sama-sama ya bu</p> <p>h. Salinan resep (wajib dikerjakan)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>R/ sporeti syr no. 1 S 2 dd 1 cth _____ det _____</p> </div>			
No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep			
73	Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan	A. Skrinning Administrasi <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama Pasien :</td> <td style="width: 30%;">Ada/Tidak Ada</td> <td style="width: 40%;">tn zuliyadi</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	tn zuliyadi
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	tn zuliyadi			

Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak
 Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter
 Tempel Resep/salin resep disini!



Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Nephrolith
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	20
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	2 x 1
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	20/02/2023
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr rustiaji
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	503.446/2569/b.ip.ds.436.7.15/2022
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Banyu urip kidul V

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ nephrolit no.xx

c. Perhitungan biaya resep

Nephrolit 1 strip 3.000 x 2 = 6.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

2 x 1

Sesudah makan

Nama Obat/warna etiket :

e. Product knowledge

Nama Obat : nepholit

Kandungan : Ekstrak folium orthosiphon stamineus 18 mg, ekstrak folium srtobilanthus crispus 6 mg, ekstrak folium sonchus arvensis 24 mg, eksrtrak folium phyllanthus niruri 2,4 mg, plantago mayor folium extract 100 mg

Dosis lazim : -

Kegunaan : Membantu meluruhkan batu urin di saluran kemih serta membantu melancarkan buang air kecil

ESO potensial : -

KI : hipersensitif

PERHATIAN : Bila tidak ada perbaikan gejala segera hubungi dokter. Penggunaan disertai minum air putih minimal 2 liter/ hari. Hindari penggunaan secara terus menerus.

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : permisi mas, apa kah ada obat sesuai dengan di resep?

TTK : ada bu, untuk melancarkan kencing ya

P : iya mas


TTK : (TTK mengambilkan obat) ini bu obatnya , nanti diminum sehari 2 kali ya bu sesudah makan

P : oke mas, berapa ya?

TTK : 6.000 Bu

		<p>P ; ini ya mas uangnya (sambil memberikan uangnya) terimakasih ya mas TTK : sama-sama ya bu</p> <p>h. Salinan resep (wajib dikerjakan)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>R/ nephrolit no.xx</p> <p>S 2 dd 1</p> <p>_____det_____</p> </div>															
No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep															
74	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli</p> <p>Resep obat : Racikan/non racikan</p> <p>Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak</p> <p>Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter</p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama Pasien :</td> <td style="width: 20%;">Ada/Tidak Ada</td> <td style="width: 50%;">Ny sri rejeki</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>45 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Domperidone</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ny sri rejeki	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	45 tahun	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Domperidone	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ny sri rejeki															
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	45 tahun															
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-															
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Domperidone															
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-															

Tempel Resep/salin resep disini!



Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	10
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Sebelum makan 3 x 1
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	02/02/2023
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr dita ayu kartikasari
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	503.446.41141/b/1p.du/2022
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Phc benowo

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ domperidone no.x

c. Perhitungan biaya resep

Domperidone 1 strip 4.000

c. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

3 x 1

		<p>e. Product knowledge</p> <table border="1"><tr><td data-bbox="862 544 1406 1204"><p>Nama Obat : domperidone Kandungan : domperidone Dosis lazim : 10 mg Kegunaan : mual dan muntah ESO potensial : sakit kepala, ruam KI : hipersensitifitas PERHATIAN : hindari kepada pasien dengan Riwayat darah tinggi, kolestrol dan DM Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p></td><td data-bbox="1406 544 1951 1204"><p>Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :</p></td></tr></table> <p>f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)</p> <table border="1"><tr><td data-bbox="862 1273 1899 1497"><ol style="list-style-type: none">1. Resep diterima dan diskriming2. mengambilkan obat sesuai resep3. memberian informasi obat4. memberi harga</td></tr></table>	<p>Nama Obat : domperidone Kandungan : domperidone Dosis lazim : 10 mg Kegunaan : mual dan muntah ESO potensial : sakit kepala, ruam KI : hipersensitifitas PERHATIAN : hindari kepada pasien dengan Riwayat darah tinggi, kolestrol dan DM Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>	<p>Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Resep diterima dan diskriming2. mengambilkan obat sesuai resep3. memberian informasi obat4. memberi harga
<p>Nama Obat : domperidone Kandungan : domperidone Dosis lazim : 10 mg Kegunaan : mual dan muntah ESO potensial : sakit kepala, ruam KI : hipersensitifitas PERHATIAN : hindari kepada pasien dengan Riwayat darah tinggi, kolestrol dan DM Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>	<p>Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :</p>				
<ol style="list-style-type: none">1. Resep diterima dan diskriming2. mengambilkan obat sesuai resep3. memberian informasi obat4. memberi harga					

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : permisi mas, apa kah ada obat sesuai dengan di resep?

TTK : ada bu, untuk mual ya

P : iya mas

TTK : (TTK mengambilkan obat) ini bu obatnya , nanti diminum 3 x 1 30 menit – 1jam sebelum makan ya bu

P : oke mas, berapa ya?

TTK : 4.000 Bu

P ; ini ya mas uangnya (sambil memberikan uangnya) terimakasih ya mas

TTK : sama-sama ya bu

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)


R/ domperidone no.x

S 3 dd 1 ac

--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																	
75	Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter	A. Skrinning Administrasi <table border="1" data-bbox="862 786 1731 1481"> <tr> <td data-bbox="862 786 1131 847">Nama Pasien :</td> <td data-bbox="1131 786 1355 847">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 786 1731 847">Ny amiatus</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 847 1131 908">Umur pasien :</td> <td data-bbox="1131 847 1355 908">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 847 1731 908">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 908 1131 968">Berat Badan :</td> <td data-bbox="1131 908 1355 968">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 908 1731 968">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 968 1131 1029">Nama Obat :</td> <td data-bbox="1131 968 1355 1029">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 968 1731 1029">Vometa</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 1029 1131 1090">Kekuatan :</td> <td data-bbox="1131 1029 1355 1090">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 1029 1731 1090">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 1090 1131 1150">Bentuk sed. :</td> <td data-bbox="1131 1090 1355 1150">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 1090 1731 1150">Tablet</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 1150 1131 1211">Jumlah obat :</td> <td data-bbox="1131 1150 1355 1211">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 1150 1731 1211">10</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 1211 1131 1272">Duplikasi terapi :</td> <td data-bbox="1131 1211 1355 1272">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 1211 1731 1272">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 1272 1131 1332">Aturan pakai :</td> <td data-bbox="1131 1272 1355 1332">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 1272 1731 1332">1 x 1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 1332 1131 1393"></td> <td data-bbox="1131 1332 1355 1393"></td> <td data-bbox="1355 1332 1731 1393">30 menit sebelum makan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 1393 1131 1481">Tanggal penulisan resep :</td> <td data-bbox="1131 1393 1355 1481">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 1393 1731 1481">21/02/2023</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ny amiatus	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Vometa	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	10	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	1 x 1			30 menit sebelum makan	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	21/02/2023
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ny amiatus																																	
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-																																	
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-																																	
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Vometa																																	
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-																																	
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet																																	
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	10																																	
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																	
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	1 x 1																																	
		30 menit sebelum makan																																	
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	21/02/2023																																	

Tempel Resep/salin resep disini!



Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr yakubus wanusukhy
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	503.446.4033/b/ipbu/2022
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ihc benowo

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ vometa ft no.x

c. Perhitungan biaya resep

Vometa ft 1 strip 47.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

1 x 1
30 menit sebelum makan

e. Product knowledge

Nama Obat : vometa ft	Nama Obat :
-----------------------	-------------

Kandungan : domperidone
 Kegunaan : mual dan muntah
 ESO potensial : sakit kepala, ruam
 KI : hipersensitifitas
 PERHATIAN : hindari kepada pasien dengan Riwayat darah tinggi, kolestrol dan DM
 Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskruining
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : permisi mas, apa kah ada obat sesuai dengan di resep?

TTK : ada bu, untuk mual ya

P : iya mas

TTK : (TTK mengambilkan obat) ini bu obatnya , nanti diminum 1 x 1 30 menit sebelum makan ya bu

P : oke mas, berapa ya?

TTK : 47.000 Bu

P ; ini ya mas uangnya (sambil memberikan uangnya) terimakasih ya mas

TTK : sama-sama ya bu


h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

R/ vometa ft no.x

S 1 dd 1 ac 30 menit

_____det_____

--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
76	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli</p> <p>Resep obat : Racikan/non racikan</p> <p>Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak</p> <p>Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter</p> <p>Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>an muthi</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>2,1 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Domperidone</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>v</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Sebelum makan 3 x 1/2</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>07/03/2023</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Dr muntayah</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>503.446.41141/b/1p.du/2022</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Pakal timur</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	an muthi	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	2,1 tahun	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Domperidone	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	v	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Sebelum makan 3 x 1/2	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	07/03/2023	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr muntayah	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	503.446.41141/b/1p.du/2022	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Pakal timur
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	an muthi																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	2,1 tahun																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Domperidone																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	v																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Sebelum makan 3 x 1/2																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	07/03/2023																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr muntayah																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	503.446.41141/b/1p.du/2022																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Pakal timur																																							

		<p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>R/ domperidone no. v</p> </div> <p>c. Perhitungan biaya resep</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Domperidone 1 strip 4.000 minta $\frac{1}{2}$ = 2.000</p> </div> <p>d. ETIKET</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <p>Nama Obat /warna etiket : putih</p> </td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <p>Nama Obat/warna etiket :</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid green; padding: 10px; text-align: center;"> <p>3 x 1/2</p> <p>30 menit – 1 jam</p> <p>Sebelum makan</p> </td> <td style="border: 1px solid green; padding: 10px;"></td> </tr> </table> <p>e. Product knowledge</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-right: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Nama Obat : domperidone</p> <p>Kandungan : domperidone</p> <p>Dosis lazim : 10 mg</p> <p>Kegunaan : mual dan muntah</p> <p>ESO potensial : sakit kepala, ruam</p> <p>KI : hipersensitifitas</p> </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p>Nama Obat :</p> <p>Kandungan :</p> <p>Dosis lazim :</p> <p>Kegunaan :</p> <p>ESO potensial :</p> <p>KI :</p> </td> </tr> </table>	<p>Nama Obat /warna etiket : putih</p>	<p>Nama Obat/warna etiket :</p>	<p>3 x 1/2</p> <p>30 menit – 1 jam</p> <p>Sebelum makan</p>		<p>Nama Obat : domperidone</p> <p>Kandungan : domperidone</p> <p>Dosis lazim : 10 mg</p> <p>Kegunaan : mual dan muntah</p> <p>ESO potensial : sakit kepala, ruam</p> <p>KI : hipersensitifitas</p>	<p>Nama Obat :</p> <p>Kandungan :</p> <p>Dosis lazim :</p> <p>Kegunaan :</p> <p>ESO potensial :</p> <p>KI :</p>
<p>Nama Obat /warna etiket : putih</p>	<p>Nama Obat/warna etiket :</p>							
<p>3 x 1/2</p> <p>30 menit – 1 jam</p> <p>Sebelum makan</p>								
<p>Nama Obat : domperidone</p> <p>Kandungan : domperidone</p> <p>Dosis lazim : 10 mg</p> <p>Kegunaan : mual dan muntah</p> <p>ESO potensial : sakit kepala, ruam</p> <p>KI : hipersensitifitas</p>	<p>Nama Obat :</p> <p>Kandungan :</p> <p>Dosis lazim :</p> <p>Kegunaan :</p> <p>ESO potensial :</p> <p>KI :</p>							

PERHATIAN : hindari kepada pasien dengan Riwayat darah tinggi, kolestrol dan DM

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : permisi mas, apa kah ada obat sesuai dengan di resep?


TTK : ada bu, untuk mual ya

		<p>P : iya mas TTK : (TTK mengambilkan obat) ini bu obatnya , nanti diminum 3 x 1 30 menit – 1jam sebelum makan ya bu P : oke mas, berapa ya? TTK : diresep minta separu jadi 2.000 Bu P ; ini ya mas uangnya (sambil memberikan uangnya) terimakasih ya mas TTK : sama-sama ya bu</p> <p>h. Salinan resep (wajib dikerjakan)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>R/ domperidone no.x S 3 dd 1 ac _____ det _____</p> </div>
--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep		
77	Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak	A. Skrinning Administrasi		
		Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Nazizi
		Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-

Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter

Tempel Resep/salin resep disini!



Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Cefixime
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	100 mg
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	10
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	2 x 1 Dihabiskan
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	06/03/2023
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr Shinta besly cumlaude
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	503.446/2027/ii/du/2021
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Puskesmas made surabay

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi


R/ cefixime 100 mg no.x

c. Perhitungan biaya resep

Cefixime 1 strip 12.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih



Nama Obat/warna etiket :



e. *Product knowledge*

Nama Obat : cefixime

Kandungan : cefixime trihydrate

Dosis lazim : 10 mg

Kegunaan : Infeksi saluran kemih tanpa komplikasi, otitis media, (radang rongga gendang telinga), faringitis dan tonsilitis, bronkhitis akut dan kronis serta eksaserbasi (kumatnya penyakit atau gejala penyakit secara mendadak) akut

ESO potensial : Diare, sakit perut, dispepsia, perut kembung, mual, muntah

KI : Diare, sakit perut, dispepsia, perut kembung, mual, muntah

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

PERHATIAN : Hati-hati terhadap pasien dengan riwayat anemia hemolitik terkait sefalosporin, penyakit gastrointestinal, hipersensitivitas terhadap penisilin dan antibiotik beta-laktam lainnya. Gangguan ginjal. Anak-anak. Kehamilan dan menyusui.

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskruining
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : permisi mas, apa kah ada obat sesuai dengan di resep?

TTK : ada bu, untuk infeksi ya

P : iya mas

TTK : (TTK mengambilkan obat) ini bu obatnyanya , nanti dimimun 2 x 1 ya bu dan harus dihabiskan

P : oke mas, berapa ya?

TTK : 14.000 Bu

P ; ini ya mas uangnya (sambil memberikan uangnya) terimakasih ya mas


TTK : sama-sama ya bu

		<p>h. Salinan resep (wajib dikerjakan)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>R/ cefixime 100mg no.x</p> <p>S 2 dd 1</p> <p>-----det-----</p> </div>
--	--	--



No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																					
78	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli</p> <p>Resep obat : Racikan/non racikan</p> <p>Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak</p> <p>Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter</p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ny titi knur Laila</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>39 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tiamphenicol</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>500 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>20</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ny titi knur Laila	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	39 tahun	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Tiamphenicol	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	500 mg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	20
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ny titi knur Laila																					
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	39 tahun																					
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-																					
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Tiamphenicol																					
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	500 mg																					
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet																					
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	20																					

Tempel Resep/salin resep disini!



Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3 x 1
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	05/03/2023
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr verry
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl menur

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ thiamphenicol no.xx

c. Perhitungan biaya resep

Tiamphenicol 1 strip 10.000 x 2 = 20.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

3 x 1
dihabiskan

e. Product knowledge

		<p>Nama Obat : thiampenicol Kandungan : thiampenicol Dosis lazim : 500 mg Kegunaan : Mengobati infeksi yang disebabkan Salmonella, H influenzae terutama infeksi meningeal, riketsia, bakteri gram negatif, penyebab bakteremia, dan meningitis ESO potensial : Hipersensitivitas, gangguan GI, stomatitis, glositis, ensefalopati, depresi mental dan sakit kepala KI : Hipersensitivitas, depresi sumsum tulang atau diskrasia darah yang sudah ada sebelumnya, imunisasi aktif. Kehamilan dan laktasi. PERHATIAN : Gangguan fungsi ginjal. Selama pengobatan dianjurkan untuk banyak minum Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>	<p>Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :</p>
		<p>f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Resep diterima dan diskriming 2. mengambilkan obat sesuai resep 3. memberian informasi obat 4. memberi harga 	

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : permisi mas, apa kah ada obat sesuai dengan di resep?

TTK : ada bu, untuk mau diambil semua?

P : iya mas TTK : (TTK mengambilkan obat) ini bu obatnya , nanti diminum 3 x sehari dan harus dihabiskan

P : oke mas, berapa ya?

TTK : 20.000 Bu

P ; ini ya mas uangnya (sambil memberikan uangnya) terimakasih ya mas

TTK : sama-sama ya bu

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

R/ thiampenicol 500 mg no.xx


S 3 dd 1

_____det_____

--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep		
79	Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter	A. Skrinning Administrasi		
		Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ny arafah
		Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	46 tahun
		Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-
		Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Sanprima forte
		Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-
		Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet
		Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	10
		Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-
		Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	2 x 1
		Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	05/03/2023
		Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr ferrie kristianto
		Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	503.446/0945/1/ip.du/20
		Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jalan gleneasgkes

Tempel Resep/salin resep disini!



B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ sanprima forte tablet no.x

c. Perhitungan biaya resep

Sanprima 1 strip 25.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

2 x 1

Sesudah makan

e. Product knowledge

Nama Obat : sanprima forte

Nama Obat :

Kandungan : Sulfamethoxazole 800 mg, Trimethoprim 160 mg

Kandungan :

Dosis lazim : -

Dosis lazim :

Kegunaan : Infeksi saluran nafas, GI, saluran kemih kelamin, kulit dan septikemia (keracunan darh oleh bakteri patogenik atau zat-zat yang dihasilkan oleh bakteri tersebut)

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

ESO potensial : Gangguan pencernaan misalnya mual, muntah dan diare.,

KI : Gangguan fungsi hati dan ginjal yang berat, hipersensitif terhadap sulfonamid. Diskrasia darah. Hamil dan laktasi, bayi < 2 bulan. Profiria

PERHATIAN : Penderita dengan defisiensi asam folat. Penderita dengan status gizi buruk. Penderita defisiensi enzim G6PD. Manula dan Penderita gangguan fungsi ginjal.

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskruining
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : permisi mas, apa kah ada obat sesuai dengan di resep?

TTK : ada bu, mau diambil semua?

P : iya mas

TTK : (TTK mengambilkan obat) ini bu obatnyanya , nanti minumnya sehari 2 kali ya bu

P : oke mas, berapa ya?

TTK : 25.000 Bu

P ; ini ya mas uangnya (sambil memberikan uangnya) terimakasih ya mas


TTK : sama-sama ya bu

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

R/ sanprima forte tablet no.x

S 2 dd 1

_____det ____

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																									
80	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli</p> <p>Resep obat : Racikan/non racikan</p> <p>Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak</p> <p>Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter</p> <p>Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="862 316 1731 1134"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ny yusnita</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>46 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Sanprima forte</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>2 x 1</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>05/03/2023</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Dr ferrie kristianto</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>503.446/0945/1/ip.du/20</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jalan gleneasgkes</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <table border="1" data-bbox="862 1251 1917 1313"> <tr> <td>R/ sanprima forte tablet no.x</td> </tr> </table> <p>c. Perhitungan biaya resep</p> <table border="1" data-bbox="862 1430 1917 1487"> <tr> <td>Sanprima 1 strip 25.000</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ny yusnita	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	46 tahun	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Sanprima forte	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	10	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	2 x 1	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	05/03/2023	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr ferrie kristianto	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	503.446/0945/1/ip.du/20	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jalan gleneasgkes	R/ sanprima forte tablet no.x	Sanprima 1 strip 25.000
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ny yusnita																																									
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	46 tahun																																									
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-																																									
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Sanprima forte																																									
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-																																									
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet																																									
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	10																																									
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																									
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	2 x 1																																									
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	05/03/2023																																									
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr ferrie kristianto																																									
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	503.446/0945/1/ip.du/20																																									
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jalan gleneasgkes																																									
R/ sanprima forte tablet no.x																																											
Sanprima 1 strip 25.000																																											

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

2 x 1

Sesudah makan

Nama Obat/warna etiket :

e. *Product knowledge*

Nama Obat : sanprima forte

Kandungan : Sulfamethoxazole 800 mg, Trimethoprim 160 mg

Dosis lazim : -

Kegunaan : Infeksi saluran nafas, GI, saluran kemih kelamin, kulit dan septikemia (keracunan darah oleh bakteri patogenik atau zat-zat yang dihasilkan oleh bakteri tersebut)

ESO potensial : Gangguan pencernaan misalnya mual, muntah dan diare.,

KI : Gangguan fungsi hati dan ginjal yang berat, hipersensitif terhadap sulfonamid. Diskrasia darah. Hamil dan laktasi, bayi < 2 bulan. Profiria

PERHATIAN : Penderita dengan defisiensi asam folat. Penderita dengan

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

status gizi buruk. Penderita defisiensi enzim G6PD. Manula dan Penderita gangguan fungsi ginjal.

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskruining
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : permisi mas, apa kah ada obat sesuai dengan di resep?

TTK : ada bu, mau diambil semua?

P : iya mas


TTK : (TTK mengambilkan obat) ini bu obatnyanya , nanti minumnya sehari 2 kali ya bu

P : oke mas, berapa ya?

TTK : 25.000 Bu

		<p>P ; ini ya mas uangnya (sambil memberikan uangnya) terimakasih ya mas TTK : sama-sama ya bu</p> <p>h. Salinan resep (wajib dikerjakan)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>R/ sanprima forte tablet no.x</p> <p>S 2 dd 1</p> <p>_____det_____</p> </div>
--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep												
81	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli</p> <p>Resep obat : Racikan/non racikan</p> <p>Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak</p> <p>Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter</p> <p>Tempel Resep/salin resep disini!</p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Ny muchayanah</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Amlodipine</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Ny muchayanah	Umur pasien :	Tidak Ada	-	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Amlodipine
Nama Pasien :	Ada	Ny muchayanah												
Umur pasien :	Tidak Ada	-												
Berat Badan :	Tidak Ada	-												
Nama Obat :	Ada	Amlodipine												



Kekuatan :	Ada	10 mg
Bentuk sed. :	Ada	Tablet
Jumlah obat :	Ada	10
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada	1 x 1
Tanggal penulisan resep :	Ada	07/03/2023
Nama dokter :	Ada	Dr Nathan newell
Surat ijin :	Tidak Ada	503.447/4244/1/ip.du/2022
Alamat dr. :	Tidak Ada	Ihc benowo

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ Amlodipine 10 mg no.X

c. Perhitungan biaya resep

1 strip amlodipine 3.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

1 x 1
sesudah makan

e. *Product knowledge*

Nama Obat : amlodipine

Kandungan : amlodipine

Dosis lazim : 10 mg

Kegunaan : hipertensi

ESO potensial : jantung berdebar
kencang

KI : hipersensitif

PERHATIAN : hindari untuk ibu
hamil dan menyusui

Cara penyimpanan : Simpan di bawah
suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat,
kering, dan terlindung dari cahaya dan
kelembaban

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

p : mas mau ambil resep ini ada?

ttk : amlodipine 10 mg?

p : 1 strip berapa mas?

ttk : 3.000 bu

p : yaudah diambil semua saja mas

ttk : baik bu


p : ini ya mas uangnya

ttk : baik, terimakasih bu

p : sama-sama bu

		<p>h. Salinan resep (wajib dikerjakan)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>R/ amlodipine 10mg no.60 s 2 dd 1 -----det-----</p> </div>
--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																											
82	<p>Jenis Resep : Resep asli Resep obat : non racikan Jumlah obat dalam resep : Tidak Pengulangan resep : netter Tempel Resep/salin resep disini!</p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>An bagus</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Permethin</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada</td> <td>Salep</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada</td> <td>Scabimate</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>Oleskan seluruh tubuh</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	An bagus	Umur pasien :	Ada	-	Berat Badan :	Ada	-	Nama Obat :	Ada	Permethin	Kekuatan :	Ada	5%	Bentuk sed. :	Ada	Salep	Jumlah obat :	Ada	1	Duplikasi terapi :	Ada	Scabimate	Aturan pakai :	Ada	Oleskan seluruh tubuh
Nama Pasien :	Ada	An bagus																											
Umur pasien :	Ada	-																											
Berat Badan :	Ada	-																											
Nama Obat :	Ada	Permethin																											
Kekuatan :	Ada	5%																											
Bentuk sed. :	Ada	Salep																											
Jumlah obat :	Ada	1																											
Duplikasi terapi :	Ada	Scabimate																											
Aturan pakai :	Ada	Oleskan seluruh tubuh																											



Tanggal penulisan resep :	Ada	07/03/2023
Nama dokter :	Ada	Dr Nathan newell S
Surat ijin :	Ada	503.446/4744/BAP/2022
Alamat dr. :	Ada	IHC Benowo

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ permetin cream 5% no.i
s.u.e

c. Perhitungan biaya resep

Scabimate cream 72.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : biru

Nama Obat/warna etiket :

Dioleskan secukupnya
(seluruh tubuh)

e. Product knowledge

Nama Obat : scabimate	Nama Obat :
Kandungan : permethin	Kandungan :

Dosis lazim : 5%
Kegunaan : scabies
ESO potensial : rasa seperti terbakar
KI : hipersensitif
PERHATIAN : hindari terkena mata
Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : mas mau mengambil obat ini ada?
TTK : ada bu, tapi mereknya scabimite kandungannya sama seperti resep bagaimana?
P : tapi sama ya mas
TTK : (sambil mengambilkan salepnya) ini bu salepnya terdapat kandungan permethrin disalepnya, ini untuk anaknya ya bu?
P : ini mas
TTK : iya bu biasanya pakai ini sudah bisa, bagaimana?
P : berapa mas ?
TTK : 72.000 bu
P : yaudah itu saja mas
TTK : baik bu, ini aturan pakai nya dipakai setelah mandi atau badan bersih lalu dioleskan ke seluruh tubuh dan oles tipis-tipis ya bu
P : baik mas, ini uangnya ya (sambil memberikan uang)terimakasih ya mas
TTK : baik bu , sama-sama


h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

R/ permethin cream 5% no.i

s.u.e

-----da scabimate-----

--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
83	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli</p> <p>Resep obat : Racikan/non racikan</p> <p>Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak</p> <p>Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter</p> <p>Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="862 491 1731 1315"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Tn M Abdul Roziq</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Eperison</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada</td> <td>50 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>3 x 1</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada</td> <td>08/02/2023</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada</td> <td>Dr yakubus W</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada</td> <td>503.146/4033/b/ip.du/20</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada</td> <td>IHC Benowo</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p>	Nama Pasien :	Ada	Tn M Abdul Roziq	Umur pasien :	Tidak Ada	-	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Eperison	Kekuatan :	Ada	50 mg	Bentuk sed. :	Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada	10	Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada	3 x 1	Tanggal penulisan resep :	Ada	08/02/2023	Nama dokter :	Ada	Dr yakubus W	Surat ijin :	Ada	503.146/4033/b/ip.du/20	Alamat dr. :	Ada	IHC Benowo
Nama Pasien :	Ada	Tn M Abdul Roziq																																							
Umur pasien :	Tidak Ada	-																																							
Berat Badan :	Tidak Ada	-																																							
Nama Obat :	Ada	Eperison																																							
Kekuatan :	Ada	50 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada	Tablet																																							
Jumlah obat :	Ada	10																																							
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada	3 x 1																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada	08/02/2023																																							
Nama dokter :	Ada	Dr yakubus W																																							
Surat ijin :	Ada	503.146/4033/b/ip.du/20																																							
Alamat dr. :	Ada	IHC Benowo																																							

R/ eperison tab no.x
s 3 dd 1

c. Perhitungan biaya resep

eperison 1 strip (10 tablet) : 12.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

3 x 1
sesudah makan

Nama Obat/warna etiket :

e. *Product knowledge*

Nama Obat : eperison
Kandungan : eperisone
Dosis lazim : 50 mg
Kegunaan : kejang otot
ESO potensial : ruam, kantuk dan gemetar
KI : hipersentif dan ibu hamil

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :

PERHATIAN : tidak boleh untuk ibu menyusui

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : mas ambil obat ini ada?

TTK : ada bu

P ; 1 strip berapa mas?

TTK : 12.000 bu

P : sesuai resep saja mas

TTK : baik bu (sambil menagmbilkan obat) ini bu obatnya, dan diminum sehari 3 kali sesudah makan ya

P : oke mas, ini uangnya (pasien memberikan uang nya) terimakasih ya mas


TTK : baik bu sama-sama

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

R/ eperison tab no. x


s 3 dd 1

-----det-----

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																									
84	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli</p> <p>Resep obat : Racikan/non racikan</p> <p>Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak</p> <p>Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter</p> <p>Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="862 316 1731 1134"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Baby ny dyah</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>San b plex</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Sirup</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1 x 0,3 ml</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>06/03/2023</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Dr vitri</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>RSI DARUS SYIFA</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <table border="1" data-bbox="862 1251 1917 1313"> <tr> <td>R/ san b plex syr no. i</td> </tr> </table> <p>c. Perhitungan biaya resep</p> <table border="1" data-bbox="862 1430 1917 1492"> <tr> <td>San b plex syr 23.000</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Baby ny dyah	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	San b plex	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Sirup	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	1 x 0,3 ml	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	06/03/2023	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr vitri	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	RSI DARUS SYIFA	R/ san b plex syr no. i	San b plex syr 23.000
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Baby ny dyah																																									
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-																																									
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-																																									
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	San b plex																																									
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-																																									
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Sirup																																									
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1																																									
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																									
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	1 x 0,3 ml																																									
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	06/03/2023																																									
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr vitri																																									
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																									
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	RSI DARUS SYIFA																																									
R/ san b plex syr no. i																																											
San b plex syr 23.000																																											

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih



Nama Obat/warna etiket :



e. Product knowledge

Nama Obat : san b plex

Kandungan : Per 0.6 mL : Vit.A 5000 IU, vit.D 400 IU, vit.B1 1 mg, vit.B2 1.2 mg, vit.B6 1 mg, Nicotinamide 10 mg, Dexpanthenol 5 mg, vit.C 50 mg

Dosis lazim : -

Kegunaan : Suplemen nutrisi untuk bayi & anak, merangsang nafsu makan

ESO potensial : -

KI : Hipersensitif

PERHATIAN : -

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : permisi mas, apa kah ada obat sesuai dengan di resep?

TTK : ada bu, untuk nafsu makan anak ya bu?

P : iya mas

TTK : (TTK mengambilkan obat) ini bu sirupnya , nanti diminum sehari 1 kali saja 0,3 ml didalam nya ada pipetnya nanti ditakar sampai garis nya


P : oke mas, berapa ya?

TTK : 25.000 Bu

		<p>P ; ini ya mas uangnya (sambil memberikan uangnya) terimakasih ya mas TTK : sama-sama ya bu</p> <p>h. Salinan resep (wajib dikerjakan)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>R/ san b plex syr no.1</p> <p>S 1 dd 0,3 ml</p> <p>_____det_____</p> </div>
--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep															
85	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli</p> <p>Resep obat : Racikan/non racikan</p> <p>Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak</p> <p>Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter</p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>an kurnia</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Silex</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	an kurnia	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Silex	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	an kurnia															
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-															
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-															
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Silex															
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-															

Tempel Resep/salin resep disini!



Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Sirup
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3 x 1 sendok the
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	23/08/2023
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	-

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ Silex no I

c. Perhitungan biaya resep

Silex sirup 80.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

3 x 1 sendok the
Sesudah makan

Nama Obat/warna etiket :

e. *Product knowledge*

Nama Obat : silex	Nama Obat :
Kandungan : Per 5 mL: Ekstrak Thymi Herba Siccum 41.67 mg, Ekstrak Primulae Radix Siccum 10 mg, Ekstrak Althaea Folium Siccum 58.33 mg, Ekstrak Droserae Herba Siccum 25 mg, Ekstrak Serphylli Herba Siccum 35 mg	Kandungan :
Dosis lazim : -	Dosis lazim :
Kegunaan : Membantu meredakan batuk berdahak, melegakan tenggorokan dan pilek	Kegunaan :
ESO potensial : -	ESO potensial :
KI : hipersensitifitas	KI :
PERHATIAN : -	PERHATIAN :
Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban	Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : permisi mas, apa kah ada obat sesuai dengan di resep?

TTK : ada bu, untuk batu pilex ya

P : iya mas

TTK : (TTK mengambilkan obat) ini bu sirupnya , nanti diminum sehari 3 kali ya bu 1 sendok teh

P : oke mas, berapa ya?

TTK : 80.000 Bu

P ; ini ya mas uangnya (sambil memberikan uangnya) terimakasih ya mas

TTK : sama-sama ya bu

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

R/ silex no.i

S 3 dd 1 cth

--	--	--



86


Jenis Resep : Salinan/Resep asli

Resep obat : Racikan/non racikan

Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak

Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter

Tempel Resep/salin resep disini!



A. Skrinning Administrasi

Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	an vito
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	12 tahun
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Cefixime
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	100 mg
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	10
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	2 x 1
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	12/11/2022
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr kevin R.P
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	503.446/II/IP.DU/2021
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	EMERALD MANSION

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ Cefixime no . X

c. Perhitungan biaya resep

CEFIXIME 12.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Putih

2 x 1
Dihabiskan
Sesudah makan

Nama Obat/warna etiket :

e. *Product knowledge*

Nama Obat : cefixime

Kandungan : cefixime trihydrate

Dosis lazim : 10 mg

Kegunaan : Infeksi saluran kemih tanpa komplikasi, otitis media, (radang rongga gendang telinga), faringitis dan tonsilitis, bronkhitis akut dan kronis serta eksaserbasi (kumatnya penyakit atau gejala penyakit secara mendadak) akut

ESO potensial : Diare, sakit perut, dispepsia, perut kembung, mual, muntah

KI : Diare, sakit perut, dispepsia, perut kembung, mual, muntah

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

PERHATIAN : Hati-hati terhadap pasien dengan riwayat anemia hemolitik terkait sefalosporin, penyakit gastrointestinal, hipersensitivitas terhadap penisilin dan antibiotik beta-laktam lainnya. Gangguan ginjal. Anak-anak. Kehamilan dan menyusui.

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : permisi mas, apa kah ada obat sesuai dengan di resep?

TTK : ada bu, untuk infeksi ya bu?

P : iya mas

TTK : (TTK mengambilkan obat) ini bu obatnya , nanti diminum sehari 2 kali ya dan harus dihabiskan

P : oke mas, berapa ya?

TTK : 12.000 Bu


P ; ini ya mas uangnya (sambil memberikan uangnya) terimakasih ya mas
TTK : sama-sama ya bu


h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

R/ cefixime 100 mg tablet no.x

S 2 dd 1

-----det-----



No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
87	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli</p> <p>Resep obat : Racikan/non racikan</p> <p>Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak</p> <p>Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter</p> <p>Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="862 316 1731 1134"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ny ningwatuti</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Acyclovir</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>200 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>4 x 1</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>17/11/2022</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Dr syamsuridho W</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>503/446/4293/1/IP.DU</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Puskesmas lontar</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div data-bbox="862 1369 1915 1428" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>R/ acyclovir 200 mg tablet no.xx</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ny ningwatuti	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Acyclovir	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	200 mg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	20	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	4 x 1	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	17/11/2022	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr syamsuridho W	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	503/446/4293/1/IP.DU	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Puskesmas lontar
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ny ningwatuti																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Acyclovir																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	200 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	20																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	4 x 1																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	17/11/2022																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr syamsuridho W																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	503/446/4293/1/IP.DU																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Puskesmas lontar																																							

c. Perhitungan biaya resep

1 strip acyclovir 200 mg 5.000 x 2 = 10.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

4 x 1
Sesudah makan

Nama Obat/warna etiket :

e. *Product knowledge*

Nama Obat : acylovir

Kandungan : acylovir

Dosis lazim : 200-400 mg

Kegunaan : Pengobatan infeksi herpes

ESO potensial : Mual, muntah, diare, sakit perut.

KI : hipersensitif

PERHATIAN : . Hati-hati penggunaan pada pasien immunocompromised, pasien yang menerima dosis tinggi

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat,

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : permisi mas, apa kah ada obat sesuai dengan di resep?

TTK : ada bu, untuk herpes ya

P : iya mas

TTK : (TTK mengambilkan obat) ini bu obatnya , nanti diminum sehari 4 kali ya sesudah makan

P : oke mas, berapa ya?

TTK : 10.000 Bu


P ; ini ya mas uangnya (sambil memberikan uangnya) terimakasih ya mas

TTK : sama-sama ya bu

		<p>h. Salinan resep (wajib dikerjakan)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>R/ acyclovir 200 mg tablet no.xx</p> <p>S 4 dd 1</p> <p>_____ det _____</p> </div>
--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																					
88	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli</p> <p>Resep obat : Racikan/non racikan</p> <p>Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak</p> <p>Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter</p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Nn yunita W</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>24 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Metronidazole</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>10</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Nn yunita W	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	24 tahun	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Metronidazole	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	10
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Nn yunita W																					
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	24 tahun																					
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-																					
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Metronidazole																					
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	-																					
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet																					
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	10																					

Tempel Resep/salin resep disini!



Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3 x 1
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	15/11/2022
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Drg anita fitria
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	503.446/4087/I/IP.DU
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Puskesmas lontar

B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ metronidazole no. x

c. Perhitungan biaya resep

1 strip metronidazole 5.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

3 x 1

Sesudah makan

e. Product knowledge

		<p>Nama Obat : metronidazole Kandungan : metronidazole Dosis lazim : 500 mg Kegunaan : Pengobatan uretritis dan vaginitis karena <i>Trichomonas vaginalis</i>, amoebiasis intestinal dan hepar, pencegahan infeksi anaerob pasca operasi, giardiasis karena <i>Giardia lamblia</i>siis ESO potensial : Mual, mulut kering, muntah, sembelit, sakit perut, diare. KI : Hipersensitivitas PERHATIAN : Hati-hati pada pasien dengan atau riwayat gangguan kejang Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>	<p>Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :</p>
		<p>f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Resep diterima dan diskriming 2. mengambilkan obat sesuai resep 3. memberian informasi obat 4. memberi harga </div>	

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : permisi mas, apa kah ada obat sesuai dengan di resep?

TTK : ada bu, untuk daerah kewanitaan ya

P : iya mas

TTK : (TTK mengambilkan obat) ini bu obatnyanya , nanti diminum sehari 3 kali sudah makan ya bu

P : oke mas, berapa ya?

TTK : 5.000 Bu

P ; ini ya mas uangnya (sambil memberikan uangnya) terimakasih ya mas

TTK : sama-sama ya bu

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

R/ metronidazole no.x


S 3 dd 1

_____det_____

--	--	--

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
89	Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter	A. Skrinning Administrasi <table border="1" data-bbox="862 671 1729 1489"> <tr> <td data-bbox="862 671 1131 730">Nama Pasien :</td> <td data-bbox="1131 671 1355 730">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 671 1729 730">Nur fadilah</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 730 1131 790">Umur pasien :</td> <td data-bbox="1131 730 1355 790">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 730 1729 790">41 tahun</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 790 1131 849">Berat Badan :</td> <td data-bbox="1131 790 1355 849">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 790 1729 849">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 849 1131 908">Nama Obat :</td> <td data-bbox="1131 849 1355 908">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 849 1729 908">Folavit</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 908 1131 967">Kekuatan :</td> <td data-bbox="1131 908 1355 967">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 908 1729 967">400 mcg</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 967 1131 1026">Bentuk sed. :</td> <td data-bbox="1131 967 1355 1026">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 967 1729 1026">Tablet</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 1026 1131 1085">Jumlah obat :</td> <td data-bbox="1131 1026 1355 1085">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 1026 1729 1085">30</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 1085 1131 1144">Duplikasi terapi :</td> <td data-bbox="1131 1085 1355 1144">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 1085 1729 1144">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 1144 1131 1203">Aturan pakai :</td> <td data-bbox="1131 1144 1355 1203">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 1144 1729 1203">1 x 1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 1203 1131 1310">Tanggal penulisan resep :</td> <td data-bbox="1131 1203 1355 1310">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 1203 1729 1310">20/07/2022</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 1310 1131 1369">Nama dokter :</td> <td data-bbox="1131 1310 1355 1369">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 1310 1729 1369">Dr Frida anana</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 1369 1131 1428">Surat ijin :</td> <td data-bbox="1131 1369 1355 1428">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 1369 1729 1428">503/446/2803/I/IP.DU/17</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 1428 1131 1489">Alamat dr. :</td> <td data-bbox="1131 1428 1355 1489">Ada/Tidak Ada</td> <td data-bbox="1355 1428 1729 1489">Puksesmas lontar</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Nur fadilah	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	41 tahun	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Folavit	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	400 mcg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	30	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	1 x 1	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	20/07/2022	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr Frida anana	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	503/446/2803/I/IP.DU/17	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Puksesmas lontar
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Nur fadilah																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	41 tahun																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Folavit																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	400 mcg																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	30																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	1 x 1																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	20/07/2022																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr Frida anana																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	503/446/2803/I/IP.DU/17																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Puksesmas lontar																																							

Tempel Resep/salin resep disini!



B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi

R/ folavit 400 mcg no.xxx

c. Perhitungan biaya resep

1 strip folavit 400 mcg : 15.000 x 3 = 45.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

1 x 1
Sesudah makan

e. Product knowledge

Nama Obat : folavit 400 mcg

Nama Obat :

Kandungan : asam folat

Kandungan :

Dosis lazim : 400 – 1.000 mcg

Dosis lazim :

Kegunaan : Pertumbuhan janin, memelihara kesehatan, defisiensi Asam Folat, suplemen untuk masa Kehamilan dan menyusui, meningkatnya kebutuhan Asam Folat.

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

ESO potensial : -

KI : Terapi jangka panjang pada defisiensi kobalamin yang tidak diobati.

PERHATIAN : Tidak untuk sebagai obat tunggal pada terapi anemia pernisiiosa dan defisiensi vit B12.

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskruining
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

P : permisi mas, apa kah ada obat sesuai dengan di resep?

TTK : ada bu, untuk progam hamil kah bu

P : iya mas

TTK : (TTK mengambilkan obat) ini bu obatnya , nanti diminum sehari 1 kali ya kalau bisa dipaskan jadwal minumnya setiap hari dan ini untuk 1 bulan dan harus rutin ya bu

P : oke mas, berapa ya?

TTK : 45.000 Bu

P ; ini ya mas uangnya (sambil memberikan uangnya) terimakasih ya mas


TTK : sama-sama ya bu

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

R/ folavit 400 mcg no.xxx

S 1 dd 1

_____det_____

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																								
90	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli</p> <p>Resep obat : Racikan/non racikan</p> <p>Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak</p> <p>Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter</p> <p>Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="862 319 1731 1174"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada</td> <td>Tn suratman</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada</td> <td>Amlodipine</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada</td> <td>10 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada</td> <td>2x 1</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada</td> <td>28/09/2022</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada</td> <td>Dr Abraham. Sp.jp</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <table border="1" data-bbox="862 1422 1915 1479"> <tr> <td>R/ Amlodipine 10 mg no.LX</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada	Tn suratman	Umur pasien :	Tidak Ada	-	Berat Badan :	Tidak Ada	-	Nama Obat :	Ada	Amlodipine	Kekuatan :	Ada	10 mg	Bentuk sed. :	Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada	60	Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada	2x 1	Tanggal penulisan resep :	Ada	28/09/2022	Nama dokter :	Ada	Dr Abraham. Sp.jp	Surat ijin :	Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Tidak Ada	-	R/ Amlodipine 10 mg no.LX
Nama Pasien :	Ada	Tn suratman																																								
Umur pasien :	Tidak Ada	-																																								
Berat Badan :	Tidak Ada	-																																								
Nama Obat :	Ada	Amlodipine																																								
Kekuatan :	Ada	10 mg																																								
Bentuk sed. :	Ada	Tablet																																								
Jumlah obat :	Ada	60																																								
Duplikasi terapi :	Tidak Ada	-																																								
Aturan pakai :	Ada	2x 1																																								
Tanggal penulisan resep :	Ada	28/09/2022																																								
Nama dokter :	Ada	Dr Abraham. Sp.jp																																								
Surat ijin :	Tidak Ada	-																																								
Alamat dr. :	Tidak Ada	-																																								
R/ Amlodipine 10 mg no.LX																																										

c. Perhitungan biaya resep

1 strip amlodipine 3.000
 3.000 x 6 strip = 18.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : putih

Nama Obat/warna etiket :

2 x 1
 sesudah makan

e. *Product knowledge*

Nama Obat : amlodipine

Kandungan : amlodipine

Dosis lazim : 10 mg

Kegunaan : hipertensi

ESO potensial : jantung berdebar
 kencang

KI : hipersensitif

PERHATIAN : hindari untuk ibu
 hamil dan menyusui

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESO potensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

Cara penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban	
---	--

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Resep diterima dan diskriming
2. mengambilkan obat sesuai resep
3. memberian informasi obat
4. memberi harga

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

p : mas mau ambil resep ini ada?

ttk : amlodipine 10 mg, ada bu minta berapa?

p : diresep minta berapa mas?

ttk : minta 60 tablet bua tau 6 strip, ini diminum sehari 2 kal jadi untuk 1 bulan

p : 1 strip berpa mas?

ttk : 3.000 bu

p : yaudah diambil semua saja mas


ttk : baik bu, totalnya 18.000 ya
p : ini ya mas uangnya
ttk : baik, terimakasih bu
p : sama-sama bu

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)

R/ amlodipine 10mg no.60
s 2 dd 1

-----det-----

Gresik, 12 April 2023
Dosen Pembimbing,


Apt. Siti Nur Asiyah, M.Farm., Klin
NIDN : 0711088504

Lamongan, 15 April 2023
Pembimbing Lapangan (Apotek L FANS)


Apt. Arief Abuyanti Rahman, S.Farm
SIPA : 1055/SIPA/413.IB/V/2021



B. PRODUCT KNOWLEDGE BERDASARKAN KELAS TERAPI

(1) ANALGETIK- ANTIPIRETIK- ANTIINFLAMASI


Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Analgetik- Antipiretik- Antiinflamasi	acetaminophen, metampiron, ibuprofen, diklofenak, asam mefenamat, piroxicam, indometasin, fenilbutazon,	Pamol	Penderita gangguan fungsi hati berat dan hipersensitif.	Meredakan sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot, menurunkan demam dan nyeri paska vaksinasi.	Dewasa: 1 - 2 kaplet, 3 sampai 4 kali per hari. Penggunaan maximum 8 kaplet per hari. Anak (6 - 12 tahun): 1/2 - 1 kaplet, 3 sampai 4	Dosis yang besar dan pemakaian jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati. Reaksi alergi. Mual, muntah, diare, diaforesis, wajah pucat dan nyeri perut.	30°C

	<p>aspirin, meloksikam, celecoxib, parecoxib</p>	<p>Santagesik</p>	<p>Anak-anak usia 3 bulan ke bawah atau anak dengan berat badan 5 kg ke bawah. Pasien yang mengalami kekurangan porfiria. Pasien yang memiliki tekanan darah di bawah batar normal (hipotensi). Wanita hamil dan ibu menyusui</p>	<p>Nyeri akut atau kronik berat seperti sakit kepala, sakit gigi, tumor, nyeri pasca operasi & nyeri pasca cedera; nyeri berat yang berhubungan dengan spasme otot polos (akut atau kronik) misalnya spasme otot atau kolik yang mempengaruhi GIT, pasase bilier, ginjal, atau saluran kemih bagian bawah</p>	<p>kali per hari. Penggunaan maximum 4 kaplet per hari.</p> <p>1 tablet sebagai dosis tunggal. Maks: 4 x 1 tablet</p>	<p>Reaksi anafilaksis/anafilaktoid, dispnea, urtikaria, angioedema berat atau bronkospasme; aritmia kordis, hipotensi & syok sirkulasi</p>	<p>Simpan di tempat yang kering dan sejuk, terhindar dari panas matahari langsung</p>
		<p>Bufect</p>	<p>alergi, operasi bypass jantung, pasien ginjal, hati, asma, urtikaria, tukak pada lambung atau usus, demam berdarah.</p>	<p>untuk nyeri ringan sampai dengan sedang seperti nyeri pasca operasi, nyeri pada penyakit reumatik, nyeri otot, dan untuk meredakan demam.</p>	<p>Dewasa & Anak 8-12 tahun 1 tablet, 3-7 tahun ½ tablet, 1-2 tahun ¼ tablet. Diberikan 3-4 kali perhari</p>	<p>Mual, muntah, diare, konstipasi, nyeri abdomen atau rasa terbakar pada perut bagian atas, ruam kulit, bronkospasme, trombositopenia, limfopenia, gangguan penglihatan</p>	<p>Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari</p>

		Samcofenac	Hipersensitif terhadap natrium diklofenak, Menderita asma, urtikaria, alergi pada pemberian aspirin atau NSAID lain, Penderita tukak lambung	pengobatan akut dan kronis, seperti gejala rheumatoid arthritis , osteoarthritis, dan ankylosing spondylitis	3-4 kali sehari 50 mg	Nyeri atau kram perut, Sakit kepala, Retensi cairan Diare, Konstipasi, Flatulen, Tukak lambung , Pusing	pada suhu ruang, di tempat yang kering, dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan dari jangkauan anak-anak
		Ponstelax	tukak peptik, gangguan hati, ginjal	Meredakan nyeri ringan hingga sedang pada sakit kepala, sakit gigi, nyeri haid primer, nyeri reumatik, nyeri otot, dan nyeri paska operasi	Dewasa dosis Awal 500 mg, dilanjutkan 250 mg tiap 6 jam, bila perlu. diberikan sesudah makan	gangguan dan perdarahan GI, tukak peptik, sakit kepala, mengantuk, pusing, gugup, gangguan penglihatan, ruam kulit, diskrasia darah, nefropati	Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
		Faxiden	hipersensitivitas, tukak GI	obat yang digunakan untuk membantu mengurangi rasa sakit, pembengkakan,	Pemakaian FAXIDEN harus dikonsultasikan dengan dokter anda. Berikan sesudah makan	sakit perut, mual, pusing, mengantuk, atau sakit kepala mungkin terjadi. Jika salah satu dari efek-efek ini menetap atau memburuk,	Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari

				dan kekakuan sendi.		Konsultasikan dengan dokter anda.	
		Novason	Perdarahan GI, penyakit ulkus, hamil	Mengobati inflamasi dan nyeri dari berbagai jenis artritis seperti rheumatoid arthritis dan ankylosing spondylitis.	Dosis 3.d.d. 1 caps p.c Aturan Pakai Setelah makan	Sensasi panas seperti terbakar pada lambung. Tukak lambung. Kram. Mual. Kembang. Gangguan hati.	Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari
		Cardio aspirin	Obat ini tidak boleh diberikan kepada pasien dengan kondisi: Hipersensitif terhadap aspirin dan obat antiinflamasi non steroid (AINS) lainnya. Asma, rhinitis, dan polip hidung. Memiliki riwayat atau sedang mengalami tukak lambung. Pendarahan subkutan, homofilia, atau	Mencegah proses agregasi trombosit pada pasien infark miokard dan pasien angina tidak stabil, serta mencegah serangan serebral iskemik sesaat.	80-160 mg/hari. Untuk infark miokard : sampai dengan 300 mg/hari. Untuk transient ischaemic attack (TIA) atau stroke ringan : sampai dengan 1000 mg/hari	Pemakaian obat umumnya memiliki efek samping tertentu dan sesuai dengan masing-masing individu. Jika terjadi efek samping yang berlebih dan berbahaya, harap konsultasikan kepada tenaga medis. Efek samping yang mungkin terjadi dalam penggunaan obat adalah: Iritasi dan pendarahan saluran pencernaan (gastrointestinal), mual, muntah, tukak	Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari

		Flasicox	<p>trombositopenia. Menerima terapi antikoagulan, atau AINS, atau Methotrexate. Gangguan hati atau ginjal yang berat. Anak-anak di bawah usia 16 tahun dan sedang dalam proses pemulihan dari infeksi virus</p> <p>Hipersensitif, riwayat asma dan urtikaria</p>	<p>Terapi simptomatik jangka pendek untuk eksaserbasi akut dari OA (Osteoarthritis). Terapi simptomatik jangka panjang untuk AR (Arthritis Reumatoid).</p>	<p>Dosis anjuran maksimal : 15 mg perhari. Eksaserbasi OA (Osteoarthritis) : 1 kali sehari 7.5 mg, bila diperlukan dosis dapat ditingkatkan samapi dengan 1 kali sehari 15 mg. AR (Arthritis Reumatoid) : 1 kali sehari 15 mg, dapat dikurangi sampai dengan 7.5 mg perhari,</p>	<p>lambung, dispnea, reaksi kulit, trombositopenia.</p> <p>mual, muntah, gangguan pencernaan, sakit kepala, sulit tidur</p>	<p>Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari</p>
--	--	----------	--	--	--	---	--

			<p>Hipersensitivitas terhadap celecoxib dan NSAID lain, aspirin atau sulfonamid.</p> <p>Ulserasi peptik aktif atau perdarahan gastrointestinal, penyakit inflamasi usus, penyakit jantung iskemik, penyakit serebrovaskular, atau penyakit arteri perifer.</p> <p>Gangguan ginjal berat dan hati.</p> <p>Kehamilan (trimester 3) dan menyusui.</p>	 <p>Meredakan tanda dan gejala OA, RA & Ankilosing Spondilitis pada orang dewasa</p>	<p>tergantungan respon klinis. Pasien dengan resiko tinggi : Awal 1 kali sehari 7.5 mg. Pasien dengan Gagal Ginjal : 1 kali sehari, dosis tidak boleh lebih dari 7.5 mg.</p> <p>Dewasa Osteoarthritis (OA) & Spondilitis ankilosa : 200 mg, 1 kali sehari 1 kapsul atau 100 mg, 2 kali sehari 1 kapsul. Max.400 mg per hari. Rheumatoid arthritis (RA) : 100-200 mg 2 kali sehari. Max.400 mg per hari. Maksimal penggunaan 7 hari</p>	<p>Retensi cairan, edema, hipertensi, nekrosis papiler ginjal (penggunaan jangka panjang), Anemia, Angina pektoris, Mual, sakit perut, diare, dispepsia, perut kembung, muntah, disfagia, GERD, sindrom iritasi usus besar</p>	<p>Simpan ditempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

		Dynastat	<p>Pasien yang memiliki riwayat sensitif/ alergi pada obat yang mengandung Sulfonamid.</p> <p>Pasien yang memiliki riwayat asma/ kesulitan dalam bernafas.</p> <p>Gangguan penyakit hati berat.</p> <p>Riwayat penyakit pada usus besar.</p> <p>Gagal jantung.</p>	<p>meringankan rasa sakit/ nyeri dan meringankan peradangan/ pembengkakan pasca operasi pada orang dewasa</p>	<p>Dosis awal penggunaan: di berikan dosis 1 vial 40 mg di suntikan melalui pembuluh vena (pemubuluh darah).</p> <p>Dosis selanjutnya: di berikan dosis 20-40mg sebanyak 2-4 kali sehari.</p> <p>Dosis penggunaan pada lansia: di berikan ½ dosis lazim, maksimal dosis 40mg/ hari.</p>	<p>Dapat menyebabkan hipertensi.</p> <p>Tekanan darah redah.</p> <p>Nyeri punggung.</p> <p>Berkurangnya fungsi pencernaan.</p> <p>Kembung.</p> <p>Gangguan susah tidur.</p> <p>Sesak nafas.</p>	<p>Simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius dan terlindung dari cahaya.</p> <p>Jangan didinginkan atau dibekukan</p> <p>larutan yang telah dilarutkan.</p> <p>Setelah serbuk injeksi dilarutkan, Dynastat harus segera digunakan.</p>
--	--	----------	--	---	---	---	---

(2) ANTIMIKROBA**(2.a) ANTIBIOTIK**

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Penisilin	Ampicillin, amoksisilin, ticarcillin	Binotal	Hipersensitif terhadap penisilin	Infeksi sal nafas, ISK, infeksi GI; otitis media bakterial	Dewasa : 1.5 - 3 g/hari, dapat ditingkatkan sampai dengan 6 g atau lebih, tergantung indikasi, Berikan sebelum makan	Ruam kulit, pruritus, urtikaria, demam, angioedema, eritema multiformis, dermatitis eksfoliatif; muntah, diare, kram	Simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius dan terlindung dari cahaya
		Yusimox	Hipersensitivitas atau riwayat reaksi alergi berat (misalnya anafilaksis, sindrom Stevens-Johnson) terhadap amoksisilin atau -laktam lainnya (misalnya penisilin, sefalosporin, karbapenem, monobaktam). Mononukleosis menular (dicurigai	Penyakit infeksi kulit dan jaringan lunak, infeksi saluran pernafasan, infeksi saluran genitourinari, dan gonore yang disebabkan organisme Gram positif & Gram Negatif yang peka terhadap Amoxicillin	Dewasa dan Anak 20 mg/kgBB/hr : 250-500 mg. Anak dengan BB <20 kg : 20-40 mg/kgBB dalam 2 dosis terbagi tiap 8 jam. Infeksi berat Dosis ganda. GO akut 2-3 g dosis tunggal. Aturan Pakai	Kejang (dosis tinggi), reaksi Jarisch-Herxheimer (dalam pengobatan penyakit Lyme), kristaluria (dosis parenteral tinggi), waktu protrombin memanjang. Gangguan sistem darah dan limfatik: Jarang, trombositopenia, leukopenia. Gangguan gastrointestinal:	Simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius dan terlindung dari cahaya

			atau dikonfirmasi).		Sesudah makan	Mual, diare, muntah, perubahan warna gigi (coklat, kuning, abu-abu) terutama pada anak-anak.	
Cephalosporin	cefadroxil, cefixime, cefotaxime	Cefat	Hipersensitif terhadap cefadroxil	Mengatasi infeksi saluran pernafasan, saluran kemih dan kelamin serta infeksi kulit dan jaringan lunak	Infeksi kulit dan struktur kulit, Infeksi saluran kemih Dewasa: Dosis biasa: 1 hari: Dosis yang dianjurkan: <40 kg: 30 mg/kg setiap hari sebagai dosis tunggal atau dalam 2 dosis terbagi selama minimal 10 hari. Maks: 100 mg/kg setiap hari. >40 kg: Sama seperti dosis dewasa.	Diare, mual, muntah, dispepsia, sakit perut, glositis. Gangguan umum dan kondisi tempat pemberian: Jarang, demam. Gangguan sistem kekebalan: Jarang, reaksi seperti penyakit serum, edema angioneurotik.	Simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius dan terlindung dari cahaya
		Sporetix	Hipersensitif terhadap sefalosporin, penisilin, atau antibiotik beta-laktam apa pun.	Infeksi saluran kemih tanpa komplikasi, otitis media, (radang rongga gendang telinga), faringitis dan tonsilitis,	Aturan Pakai Sesudah makan Dewasa: 200-400 mg per hari diberikan sebagai dosis tunggal atau	Diare, sakit perut, dispepsia, perut kembung, mual, muntah	Simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius dan terlindung dari cahaya

		Lapixime	<p>Hindari penggunaan Lapixime pada pasien yang memiliki indikasi: Hipersensitif (reaksi alergi) terhadap sefalosforin.</p>	<p>bronkhitis akut dan kronis serta eksaserbasi (kematnya penyakit atau gejala penyakit secara mendadak) akut</p> <p>mengobati septikemia (infeksi dalam darah), infeksi saluran nafas bagian bawah, infeksi tulang dan sendi, peritonitis (infeksi pada selaput yang melapisi rongga perut), serta osteomielitis (infeksi pada tulang), infeksi saluran kencing,</p>	<p>dalam 2 dosis terbagi selama 7 hari</p> <p>Aturan Pakai</p> <p>Dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Dapat diberikan bersama makanan untuk mengurangi rasa tidak nyaman pada saluran pencernaan.</p> <p>Dewasa dan anak usia > 12 tahun. diberikan 2 kali sehari</p>	<p>Vaginitis (radang vagina). Pusing. Gangguan GI (mual, muntah dan diare).</p>	<p>Simpan pada suhu antara 15-30 derajat Celcius.</p>
--	--	----------	---	---	--	---	---

				radang selaput otak (meningitis).			
Chloramphenicol	kloramfenikol, thiamfenicol	Colsancetine	Hipersensitif Anemia	Demam tifoid & paratifoid, infeksi berat yang disebabkan oleh Salmonella sp, H influenza, riketsia, Limfogranuloma-psikatosi, kuman gram negatif penyebab meningitis	Dewasa, anak dan bayi > 2 minggu : sehari 50 mg/kgBB dalam 3-4 dosis. Bayi < 2 minggu & bayi prematur : 25 mg/kgBB/hari dibagi 4 dosis.	Depresi sum-sum tulang, anemia aplastik, sindroma gray pada bayi, ruam kulit, urtikaria, gangguan pencernaan, enterokolitis	Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung
		Biothicol	Disfungsi ginjal dan hati berat. Hipersensitif	Infeksi yang disebabkan oleh Salmonella, H. influenzae (terutama meningokokus)	Dewasa : 3 - 4 Aturan Pakai Sebelum makan kali sehari 500 mg,	Diskrasia darah, anafilaktik, urtikaria, gangguan GI, sindrom Gray	Simpan pada suhu antara 15-30 derajat Celcius.
Macrolides dan Lincosamide	eritromisin, azitromisin, klaritromisin, klindamisin	Erysanbe	Hipersensitif	Infeksi saluran pernapasan, kulit & jaringan lunak, pneumonia, gonore, infeksi lain yang disebabkan oleh mikroorganisme yang rentan.	Dewasa > 20 kg : 1 - 2 4 kali sehari. Anak < 20 kg : 30 - 50 mg/kg BB/hari. Diberikan dalam dosis terbagi tiap 6 jam Aturan Pakai Berikan sebelum makan	Gangguan GI, reaksi alergi, superinfeksi, ototoksitas, kolitis pseudomembran	Simpan pada suhu antara 15-30 derajat Celcius

		ZITHROMAX	Hipersensitivitas terhadap antibiotik makrolida. Riwayat disfungsi hati/ikterus kolestatik setelah penggunaan antibiotik sebelumnya.	Infeksi-infeksi yang disebabkan oleh organisme yang peka, infeksi saluran nafas atas (tonsillitis, pharingitis), infeksi saluran nafas bawah (bronchitis, pneumonia), infeksi kulit & jaringan lunak.	Hari ke 1 : 500 mg sebagai dosis tunggal Hari ke 2-5 : 250 mg 1 x sehari. Anak 10 mg/kg BB per hari sebagai dosis tunggal selama 3 hari. Aturan Pakai Sesudah makan	Mual, rasa tidak nyaman di perut, muntah, kembung, diare, gangguan pendengaran, nefritis interstisial, gangguan ginjal akut, fungsi hati abnormal, pusing/vertigo, kejang, sakit kepala, somnolen, pemanjangan interval QT	Simpan pada suhu antara 15-30 derajat Celcius
Aminoglikosida	neomisin, gentamisin	Cinolon N	Hipersensitifitas terhadap Fluocinolone Acetonide dan/atau Neomycin Sulfate pada kulit	Dermatitis yang disertai infeksi	Oleskan 2-4 kali sehari. Aturan Pakai Oleskan tipis-tipis Cinolon Krim pada bagian yang diperlukan.	Iritasi, rasa terbakar, gatal, kekeringan kulit	Simpan pada suhu antara 15-30 derajat Celcius
		Genoint salep kulit	hipersensitivitas.	Untuk pengobatan infeksi topikal baik infeksi kulit primer maupun sekunder yang disebabkan oleh	3-4 kali sehari. Aturan Pakai Oleskan pada kulit yang sakit.	Dapat mengakibatkan iritasi ringan (eritema dan pruritis).	Simpan pada suhu antara 15-30 derajat Celcius

				bakteri yang peka terhadap Gentamicin			
Quinolones	ciprofloxacin, levofloxacin	Floxigra	Hipersensitif terhadap siprofloksasin atau kuinolon lain. Anak < 18 tahun. Hamil dan laktasi	Untuk mengobati Infeksi yang disebabkan oleh kuman patogen yang peka terhadap ciprofloxacin, seperti: Infeksi saluran kemih, Infeksi saluran nafas, infeksi kulit dan jaringan lunak, infeksi tulang dan sendi, infeksi saluran cerna, osteomielitis akut, infeksi intra-abdomen dengan komplikasi.	2 kali sehari dan harus dihabiskan	Mual, diare, muntah, gangguan pencernaan, nyeri perut, kembung, anoreksia, pusing, sakit kepala, insomnia, agitasi, gemetar, ruam kulit, pruritus, reaksi anafilaktik, ptekiea, sindrom Steven-Jhonson, nefritis interstisial, hepatitis, takikardi, wajah merah dan panas.	Simpan pada suhu antara 15-30 derajat Celcius
		Baquinor Fotre	Penderita yang hipersensitif terhadap Siprofloksasin	Infeksi saluran kemih, Infeksi saluran nafas, kulit dan jaringan	2 kali sehari dan harus dihabiskan	Mual, diare, muntah, gangguan pencernaan, dispepsia, nyeri	Simpan pada suhu antara 15-30 derajat Celcius

			atau antibiotik derivat kuinolon lainnya. Wanita hamil dan menyusui. Anak-anak di bawah usia 12 tahun.	lunak, tulang dan sendi, infeksi saluran cerna, osteomielitis akut, infeksi sal nafas bawah, kulit dan jaringan lunak, tulang dan sendi, infeksi intra-abdomen dengan komplikasi		abdomen, kembung, anoreksia, disfagia. Pusing, sakit kepala, rasa letih, insomnia, agitasi, tremor.	
Tetrasiklin	Tetrasiklin, doksisisiklin, minosiklin	Super Tetre	Hipersensitif, gangguan ginjal berat, Hamil, dan anak < 12 tahun.	Infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme gram positif dan gram negatif yang sensitif terhadap Tetracyclin	Dosis umum: 250 mg tiap 6 jam. Pada infeksi berat dapat ditingkatkan sampai 500 mg tiap 6-8 jam. Sifilis primer, sekunder dan laten: 500 mg tiap 6-8 jam selama 15 hari. Uretritis non gonokokus: 500 mg tiap 6 jam selama 7-14 hari (21 hari bila pengobatan pertama gagal atau bila kambuh).	Mual, muntah, diare, eritema (hentikan pengobatan), sakit kepala dan gangguan penglihatan dapat merupakan petunjuk peningkatan tekanan intrakranial, hepatotoksisitas, pankreatitis dan kolitis. Dapat menyebabkan dental karies atau perubahan warna pada gigi.	Simpan pada suhu antara 15-30 derajat Celcius
					Aturan Pakai		

		Interdoxin	Hipersensitif terhadap doksisisiklin dan turunan tetrasiklin lainnya. Diketahui atau diduga aklorhidria (tab berlapis film). Anak <8 tahun (kecuali antraks). Kehamilan dan menyusui.	Sipilis, Infeksi yang rentan atau berat, Epididimo-orkitis, Serangan akut malaria falciparum resisten klorokuin, demam atau tifus, Uretritis nongonokokus, Penyakit menular seksual, Gonore tanpa komplikasi, Profilaksis scrub tifus, Pengobatan dan profilaksis pasca pajanan antraks inhalasi, Leptospirosis, Diare, Pencegahan malaria, periodontitis, dan jerawat.	Diberikan sebelum atau sesudah makan. Jangan diminum dengan susu atau antasida. dua kali sehari dan dihabiskan Aturan Pakai Sesudah makan	Stomatitis, mual, muntah, diare, dispepsia, sakit perut, pankreatitis	Simpan pada suhu antara 15-30 derajat Celcius
Sulfa	sulfametoksazol-trimetoprim	Sanprima Forte	Gangguan fungsi hati dan ginjal yang berat, hipersensitif	Infeksi saluran nafas, GI, saluran kemih kelamin, kulit dan	Dewasa & anak > 12 tahun: 2 kali per hari, 1 Tablet. Dosis	Gangguan pencernaan misalnya mual, muntah dan diare. Sindroma	Simpan pada suhu antara 15-30 derajat Celcius

			terhadap sulfonamid. Diskrasia darah. Hamil dan laktasi, bayi < 2 bulan. Profiria	septikemia (keracunan darh oleh bakteri patogenik atau zat-zat yang dihasilkan oleh bakteri tersebut)	maksimal : 3 kali per hari 1 Tablet. Aturan Pakai Sebaiknya diberikan bersama makanan.	Steven-Johnson dan Lyell,	
--	--	--	--	---	---	---------------------------	--



(2.b) ANTIJAMUR

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Polyenes	amphotericin B, Nistatin	Kandistatin	Hipersensitivitas.	Terapi kandidiasis pada rongga mulut, kerongkongan & saluran cerna.	Bayi: Dosis yang direkomendasikan 1 - 2 ml 4 kali sehari. Pada bayi prematur, bayi bobot lahir rendah dosis. Dapat diberikan 1 ml 4 kali sehari. Anak-anak dan Dewasa dosis: 1	diare, gangguan pencernaan, mual, dan muntah. Kemerahan termasuk urticaria dilaporkan jarang terjadi sindrom Stevens-Johnson.	Simpan pada suhu antara 15-30 derajat Celcius

					<p>- 6 ml 4 kali sehari.</p> <p>Aturan Pakai Sebelum atau sesudah makan, kocok/kumur dan ditahan di dalam mulut selama mungkin sebelum ditelan</p>		
Imidazole	ketoconazol, mikonazol, klotrimazol	Solinfec	Hipersensitivitas. Gangguan hati akut atau kronis. Hamil (dengan sindrom Cushing) dan menyusui (oral)	Mukosa sistemik, kandidiasis mukokutan resisten yang kronis, mukosa saluran cerna resisten serius, kandidiasis vaginal resisten yang kronis, infeksi dermatofita pada kulit atau kuku tangan (tidak pada kuku kaki), profilaksis mikosa pada pasien immunosupresan, kandidiasis mukokutan kronis yang tidak responsif terhadap nistatin dan obat-	<p>Infeksi jamur sistemik: Dewasa : 200 mg 1 x sehari.</p> <p>Aturan Pakai Sesudah makan</p>	Asthenia, malaise, hot flush; topikal: rambut berminyak/kering, reaksi di tempat aplikasi (misalnya iritasi, sensasi terbakar, eritema, pembengkakan)	Simpan pada suhu antara 15-30 derajat Celcius

		Kalpanax Krim	Penderita yang alergi terhadap Mikonazol atau bahan lainnya dalam krim Kalpanax Krim	obat lain, infeksi mikosis sistemik (kandidiasis, paraksidiodomikosis, cocci dioidomycosis, hiptoplasmosis). mengatasi jamur di kulit seperti panu, kadas, kurap, kutu air hingga ruam popok.	Oleskan 2 atau 3 kali sehari Aturan Pakai oleskan pada kulit setiap selesai mandi dan sebelum tidur malam.	reaksi alergi, reaksi hipersensitivitas.	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban
		Neo Ultrasiline	hipersensitif	Untuk pengobatan topikal dari candidiasis, Pityriasis versicolor, Tinea pedis, Tinea cruris dan tinea corporis.	2-3 kali sehari Aturan Pakai Topikal, cuci bersih pada bagian kulit sebelum dioleskan krim.	rasa panas, eritema, edema, gatal, rasa terbakar, pedih, urtikaria, iritasi	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban
Triazole	flukonazol, Itraconazole	Difucan	Hipersensitif	Kriptokokosis dan kandidemia, kandidiasis	Kriptokokosis dan kandidemia: 400 mg hari 1 di	Mual, nyeri lambung, diare, flatulens	Simpan di bawah suhu 30 derajat C,

		Itzol	Hamil, hipersensitif	<p>orofaringeal, kandda vagina, pencegahan kandidiasis, dermatomikosis, atopik oral kandidiasis berhubungan dengan gigi, infeksi kandida mukosa lainnya</p> <p>Kandidosis Vulvovaginal, Pitiriasis Versikolor, Dermatomikosis, Keratinisasi berat, kandidosis Oral, Keratitis jamur, Aspergilosis, Kandidosis, kriptokokosis Non-meningeal, Meningitis kriptokokal, Histoplasmosis, Sporotrikosis, Parakoksidioidom ikosis, Bla</p>	<p>ikuti sehari 1 x 200-400 mg, Aturan Pakai Sebelum/sesuda h makan</p> <p>Kandidosis Vulvovaginal : 2 x sehari 2 kapsul selama 1 hari Aturan Pakai Segera sesudah makan utama</p>	<p>Gangguan gastrointestinal, sakit kepala</p>	<p>wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p> <p>Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>
Lainnya	Griseofulvin	Gricin	-	<p>Infeksi jamur (ring-worm) pada kulit, rambut dan kuku yang</p>	<p>Dewasa: 4 kali sehari 125 mg Aturan Pakai</p>	<p>Sakit kepala, mual, diare, batuk, demam, nyeri otot sendi</p>	<p>Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup</p>

				disebabkan oleh Microsporum, Epidermophyton dan Trichophyton.	Bersama makan		rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban
--	--	--	--	---	---------------	--	--

(2.c) ANTIVIRUS

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat HIV-AIDS	NRTI (zidovudine, abacavir), NNRTI (efavirenz, nevirapine), PI (saquinavir, indinavir)	Zidovudine	Neutropenia atau anemia berat; neonatus dengan hiperbilirubinemia yang memerlukan terapi selain fototerapi atau dengan peningkatan transaminase	Terapi infeksi HIV, profilaksis transmisi HIV dari ibu ke janin selama kehamilan dan kelahiran, serta profilaksis infeksi HIV pada neonatus.	Dewasa dan anak-anak dengan BB di atas 30 kg: 250 mg atau 300 mg, diminum dua kali sehari dalam kombinasi dengan agen antiretroviral lainnya. diminum dua kali sehari	sulit tidur, mual ringan, sembelit, nyeri sendi, sakit kepala, dan perubahan lemak di tubuh terutama pada bagian lengan, kaki, wajah, leher, dan dada.	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban
Herpes virus	Acyclovir	Acifar Cream	Hipersensitif terhadap asiklovir	Infeksi Herpes Simplex pada Kulit dan selaput lendir/membran mukosa, termasuk Herpes Genitalis dan Herpes Labialis tahap awal dan	Oleskan 5 x sehari setiap 4 jam tanpa pengobatan malam hari. Lama terapi 5 hari, dapat dilanjutkan hingga 10 hari.	Rasa panas, perih, eritema, pengeringan kulit ringan, pengelupasan kulit	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

				rekuren/kekambuhan	Aturan Pakai Dioleskan pada area infeksi/yang sakit.		
Hepatitis B dan C	interferon, lamivudine	lamivudine	Hipersensitivitas	Pengobatan Hepatitis dan HIV	Dewasa: 100 mg, sekali sehari. Khusus pasien yang menderita hepatitis B bersamaan dengan HIV, diberikan dosis 150 mg, 2 kali sehari; atau 300 mg, 1 kali sehari.	Sakit kepala, mual, diare	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban
Influenza A dan B virus	amantadine, rimantadine, oseltamivir	Oseltamivir	Hipersensitif terhadap oseltamivir	untuk mengatasi infeksi virus influenza tipe A (misalnya flu burung) atau B.	Influenza A dan B Profilaksis: Dewasa, 1 kali per hari selama 10 Hari. Influenza A dan B Treatment: Dewasa, 2 kali per hari selama 5 hari Aturan Pakai Sesudah makan	Sakit perut, sakit kepala, diare, mual dan muntah, sulit tidur	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

(2.d) ANTIPROTOZOA


Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antiamoeba	Metronidazole	Grafazol	Hamil trimester pertama, Hipersensitif	Trikomoniasis sal kemih kelamin, amubiasis intra intestinal, amubiasis ekstra intestinal, giardiasis, infeksi Vincent. Pengobatan & pencegahan infeksi anaerob	Trikomoniasis, Dws: 1 tab 3 x/hr Aturan Pakai Setelah makan	Rasa tidak nyaman pada salura pencernaan, anoreksia (kehilangan nafsu makan), sakit kepala, ataksia (gangguan koordinasi gerakan), vertigo, pusing, leukopenia	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban
Antimalaria	primaquine, artemisinin, doksisisiklin	Interdoxin	Hipersensitif terhadap doksisisiklin dan turunan tetrasiklin lainnya. Diketahui atau diduga aklorhidria (tab berlapis film). Anak <8 tahun (kecuali antraks). Kehamilan dan menyusui.	Sipilis, Infeksi yang rentan atau berat, Epididimo-orkitis, Serangan akut malaria falciparum resisten klorokuin, demam atau tifus, Uretritis nongonokokus, Penyakit menular seksual, Gonore tanpa komplikasi, Profilaksis scrub tifus, Pengobatan dan profilaksis pasca pajanan antraks inhalasi, Leptospirosis,	dua kali sehari dan dihabiskan Aturan Pakai Setelah makan	Stomatitis, mual, muntah, diare, dispepsia, sakit perut, pankreatitis	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

				Diare, Pencegahan malaria, periodontitis, dan jerawat.			
--	--	--	--	--	--	--	--

(2.e) ANTELMINTIK

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antelmintik	albendazole, mebendazole, pirantel pamoat, dietilkarbamazine (DEC), piperazine	Albendazole kf Vermox	- Obat ini tidak untuk diberikan untuk ibu hamil, anak usia di bawah 5 tahun, serta individu yang mengalami hipersensitivitas atau alergi terhadap komponen obat ini.	Infeksi tunggal atau campuran dari cacing untuk infeksi cacing kremi, cacing gelang, cacing tambang, cacing cambuk, atau infeksi cacing campuran tersebut.	sehari 1 kaplet atau 10 ml diberikan selama 3 hari berturut-turut. Dewasa: 1 tablet kunyah, diberikan sekali sehari. Anak di atas 5 tahun: sama dengan dosis dewasa. Aturan Pakai Obat ini dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan	- nyeri perut, diare, sakit kepala, demam, gatal-gatal, dan ruam kulit.	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

		Combamtrin syr	Penderita hipersensitif	untuk mengatasi infeksi cacing kremi (enterobius vermicularis), cacing gelang (ascaris lumbricoides), cacing tambang (ancylostoma duodenale), cacing tambang (necator americanus), cacing trichostrongylus colubriformis dan trichostrongylus orientalis.	Anak usia 2-6 tahun: 5-10 ml, diberikan sekali. Anak usia 6-12 tahun: 10-15 ml, diberikan sekali. Di atas usia 12 tahun: 15-20 ml, diberikan sekali. Aturan Pakai Dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan	Anoreksia (Nafsu makan hilang), mual, muntah, diare, sakit kepala, pusing, rasa mengantuk, merah-merah pada kulit, keringat dingin, pruritus, urtikaria.	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban
--	--	-------------------	----------------------------	---	--	--	--



(2.f) OBAT TB

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat TB	Rifampisin, etambutol,	Rimfamtibi	Ikterus, hipersensitif	Tuberkulosis, Lepra	Dewasa : Dengan BB < 50	Gangguan gastrointestinal,	Simpan di bawah suhu 30

	isoniazid, pirazinamid	Santibi	Etambutol : neuritis optik. Isonicotine (radang saraf mata) hydrazine : penyakit hati	Tuberkulosis Paru	<p>kg : 450 mg/hari. 600 mg/hari. Diberikan dosis tunggal selama 4 minggu pertama. 5 bulan berikutnya, 600 mg 2 kali seminggu. Anak : 10 - 20 mg/kg BB/hari dosis tunggal. Dikombinasi dengan isonicotine hydrazine atau etambutol</p> <p>Aturan Pakai Sebelum makan</p> <p>pengobatan awal: BB<50kg 3 tablet dosis tunggal, BB>50kg 4 tablet dosis tunggal. pengobatan ulang: BB<50kg 4 tablet dosis tunggal, BB>50kg 5-</p>	fungsi hati abnormal, reaksi demam seperti gejala flu	derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban
						gatal kemerahan, mual, muntah, gangguan penglihatan, kesemutan dan rasa terbakar.	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

		Inoxin	Gangguan fungsi hati dan ginjal pada pasien yang menggunakan obat hepatotoksik lainnya, kejang, DM, alkoholik kronik, hamil, laktasi.	TBC paru	6tablet dosis tunggal. Aturan Pakai Berikan sesudah makan Berikan saat perut kosong 1 jam sebelum atau 2 jam sesudah makan Aturan Pakai 1 tablet 1 kali sehari	Gangguan gastrointestinal, neuropati perifer, neuritis optikus, kejang, psikosis, gangguan hati, kelainan darah, reaksi kulit, hiperglikemi, asidosis, pelagra.	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban
		Santazet	-	Terapi Tuberkulosis dikombinasikan dengan obat2 anti TB lainnya	Dewasa: 20-35 mg/kgBB/hari. Maksimal 3 g, dibagi dalam 3-4 dosis. Anak: 20 mg/kgBB/hari, dibagi dalam 3-4 dosis. Aturan Pakai Berikan bersama dengan makanan	Mata atau kulit berwarna kuningm artralgia, anoreksia, mual, muntahm disuria, malaise, demam.	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

--	--	--	--	--	--	--	--

(3) ANTIHISTAMIN DAN ANTIALERGI

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Generasi I	chlorpheniramine, diphenhyramine	Alleron	Hipersensitif	Alergi seperti urtikaria, dermatitis, rinitis, hay fever	Dewasa : 3 kali sehari 1 kaplet Anak-anak : 3 kali sehari 1/2 kaplet Aturan Pakai Sesudah makan	Mengantuk dan pusing yang ringan	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban
		Sominila	-	Digunakan untuk meredakan reaksi alergi pada tubuh, seperti mata merah, iritasi, gatal, berair, dan bersin-bersin, serta dapat digunakan untuk mengatasi mabuk perjalanan dan penyakit parkinson.	Dewasa: 1-2 tablet,	Penglihatan kabur, Gelisah, Kejang, Euforia, Rasa kantuk	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

<p>Generasi II</p>	<p>Ketotifen, loratadine, cetirizine</p>	<p>Profilas</p>	<p>-</p>	<p>Profilaksis jangka panjang pada Asma Bronkhial, terapi Rinitis Alergi dan Konjungtivitis</p>	<p>Dewasa : 1-2 tab 2kali/hari. Anak 0,125 ml/kgBB 2 kali/hari.</p> <p>Aturan Pakai Dapat diberikan bersama atau tanpa makanan</p>	<p>Mengantuk, Pusing, Mulut kering</p>	<p>Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>
		<p>Winatin</p>	<p>Hipersensitif terhadap Loratadine.</p>	<p>untuk meredakan gejala alergi seperti hay fever, urtikaria.</p>	<p>Dewasa dan anak usia lebih dari 12 tahun : 10 mg sekali sehari atau 5 mg dua kali sehari. Anak usia 2-12 tahun : BB kurang dari 30 kg: 5 mg sekali sehari. BB lebih dari 30: 10 mg, sekali sehari.</p> <p>Aturan Pakai Dapat diberikan bersama atau tanpa makanan.</p>	<p>Pusing. Gangguan kulit dan jaringan subkutan: Ruam, alopecia.</p>	<p>Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>
		<p>Incidal</p>		<p>Rinitis menahun, rinitis alergi</p>	<p>Dewasa & anak umur >12 tahun:</p>	<p>Sakit perut, mulut kering, mual, diare,</p>	<p>Simpan di bawah suhu 30</p>

			Hipersensitif, Gangguan ginjal berat.	seasonal, konjungtivitis, pruritus, urtikaria idiopati kronis.	10 mg sekali sehari. Anak umur 2-6 tahun: 2,5 mg dua kali sehari. Anak umur 6-12 tahun: 5 mg dua kali sehari. Aturan Pakai Sebelum atau sesudah makan	muntah. Gangguan umum	derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban
Generasi III	Desloratadin	Aerius	Hipersensitif	Meredakan Alergi Rinitis Nasal & non-Nasal (termasuk alergi Rinitis intermiten/seasonal & persisten/terus-menerus), meredakan gejala Pruritus, mengurangi jumlah & luasnya area Hives pada pasien dengan Urtikaria khronik idiopatik	Dewasa : 1 x sehari 1 tablet, Anak usia 6-11 tahun 1 x sehari 1/2 tablet, anak usia 6-11 bulan 1 mg/hari, anak usia 1-2,5 tahun 1,25 mg/hari. Aturan Pakai Diminum sebelum atau sesudah makan	sedasi dan retardasi psikomotor, sakit kepala dan efek antimuskarinik	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

(4) SITOSTATISTIKA

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Sitostatika	siklofosamid, doksorubisin, 5-fluorourasil, carboplatin, metroteksat	Cyclophosphamide	Pasien dengan riwayat hipersensitivitas terhadap obat siklofosamid	Digunakan dalam pengobatan sindrom nefrotik.	Kondisi: Kanker Dewasa: Dosisnya 40–50mg/kgBB yang dibagi pemberiannya selama 2–5 haridan akan diulangsetelah 2-5 minggu pengobatan.	Mual, muntah,diare, sakit perut,kulit dan kuku bewarna merah menjadi lebih gelap, rambut rontok	Mual, muntah, diare, sakit perut,kulit dan kuku bewarna merah menjadi lebih gelap, rambut rontok

(5) OBAT SISTEM SARAF

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat hipnotik sedatif/antiansietas	benzodiazepin (alprazolam, diazepam, lorazepam, nitrazepam), barbiturat (fenobarbital), lainnya (buspiron)	Diazepam	riwayat hipersensitivitas dan pasien pediatri usia <6 bulan.	Mengatasi gangguan kecemasan, meredakan kejang, kaku otot, atau sebagai obat penenang sebelum operasi.	Dewasa: 5–15mg, dikonsumsi menjelang tidur. Lansia: 2,5–7,5mg, dikonsumsi menjelang tidur.	Kantuk, pusing, lelah, penglihatan buram, gangguan keseimbangan, tubuh gemetar, bingung	Simpan dalam wadah tertutup diruangan dengan suhu Yang sejuk. Jangan menyimpannya di tempat yang lembap atau terkena paparan sinar matahari

							secara langsung
Obat analgetic sentral	fentanil, petidin, morfin, nalokson.	Fentanyl	hipersensitivitas yang diketahui terhadap fentanil atau komponen lain dari formulasi.	nyeri tiba-tiba padap pasien yang sudah dalam terapi opioid untuk nyeri kanker kronik; nyeri kronik yang sukarditangani; indikasi lain	Dewasa dan anak usia >2 tahun: 25–100 mcg/jam, diberikan setiap 72 jam	Rasa panas, gatal, perih, bengkak, kesemutan, perubahan warna kulit, muntah, berkeringat.	Simpan dalam wadah tertutup diruangan dengan suhu Yang sejuk. Jangan menyimpannya di tempat yang lembap atau terkena paparan sinar matahari secara langsung
Obat antidepresan	amitriptilin, imipramin, fluoksetin, setralin	Amitriptilin	Infark miokard yang baru, aritmia, penyakit hati berat	Depresi, nocturnal enuresis pada anak	Dosis anjuran untuk depresi : 75 – 150 mg per hari	Mulut kering, sedasi, pandangan kabur, konstipasi, mual, aritmia, berkeringat, tremor, ruam, gangguan perilaku, (terutama pada anak), bingung (terutama pada lansia)	Simpan dalam wadah tertutup diruangan dengan suhu Yang sejuk. Jangan menyimpannya di tempat yang lembap atau terkena paparan sinar matahari secara langsung
Obat anestesi lokal	bupivakain, lidokain	Bupivacaine	Blok paraservikal obstetri dan anestesi regional IV, hipersensitivitas terhadap anestesi lokal tipe amida	Anestesi blok saraf perifer, blok epidural (pada pembedahan, persalinan)	-	Hipotensi, bradikardi, sakit kepala pasca spinal, gangguan kardiovaskular, depresi pernafasan	Simpan dalam wadah tertutup diruangan dengan suhu Yang sejuk. Jangan menyimpannya di tempat yang lembap atau

							terkena paparan sinar matahari secara langsung
Obat sistem saraf otonom (antikolinergik, kolinergik)	prostigmin, pilokarpin, atropin, pirenzepin, ipratropium, skopolamin, triheksifenidil	Arkine	Retensi urin, glaukoma, obstruksi saluran cerna	parkinson	2 mg, diberikan 2 – 3 kali sehari. Rentang dosis 10-20 mg per hari tergantung respon pasien	Mulut kering, gangguan saluran cerna, pusing, penglihatan kabur	Simpan dalam wadah tertutup diruangan dengan suhu Yang sejuk. Jangan menyimpannya di tempat yang lembap atau terkena paparan sinar matahari secara langsung
Obat sistem saraf otonom (adrenergik, antiadrenergik)	klonidin, fenilefrin, noradrenalin, adrenalin, fenoterol, terbutalin, salbutamol, propanolol, atenolol, prazosin	noradrenalin,	Aritmia, hipovolemia	Hipotensi atau syok dengan laju jantung cepat	Tekanan darah sistolik <70 mmHg disertai tanda dan gejala syok : - 0,5 – 30 mcg/ menit intravena	Peningkatan tekanan darah yang cepat, pusing hebat, dan muntah muntah	Simpan dalam wadah tertutup diruangan dengan suhu Yang sejuk. Jangan menyimpannya di tempat yang lembap atau terkena paparan sinar matahari secara langsung

(6) OBAT KARDIOVASKULAR

(6.a) Obat antihipertensi

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
----------	-----------	-------------------------	----------------	----------	----------------------	--------------	-------------

<p>Diuretik</p>	<p>furosemid, HCT, spironolakton, amilorid</p>	<p>Uresix</p>	<p>Hipersensitif terhadap Furosemide dan Sulfonamide. Anuria atau gagal ginjal. Memiliki penyakit Addison. Mengalami Hipovolema atau dehidrasi. Keadaan prekomatosa yang berhubungan dengan sirosis hati.</p>	<p>Edema akibat gangguan jantung, hati, dan ginjal, serta hipertensi</p>	<p>Dewasa: 40-80 mg per hari sebagai terapi tunggal atau dikombinasikan dengan antihipertensi lain.</p> <p>Aturan Pakai Sebelum atau sesudah makan. Dapat diberikan bersama makanan untuk mengurangi rasa tidak nyaman pada gastrointestinal.</p>	<p>Haus, hiperurisemia, hipokalemia, hiponatremia, sakit kepala, mengantuk, kram otot, hipotensi, mulut kering, haus, lemah, lesu, gelisah</p>	<p>Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>
		<p>Carpiaton</p>	<p>Hamil, insufisiensi ginjal akut, anuria, hiperkalemia, hiponatremia, laktasi, penyakit addison, ulkus peptik. Katagori kehamilan: Katagori C : Mungkin</p>	<p>Hiperaldosteronisme primer, kondisi-kondisi edema (Gagal Jantung Kongestif, sirosis hati yang disertai edema atau asites, sindroma Nefrotik), hipertensi esensial..</p>	<p>400 mg/hari, 3-4 minggu untuk tes panjang. Untuk tes pendek : 400 mg/hari selama 4 hari.</p> <p>Aturan Pakai Diberikan sesudah makan.</p>	<p>Kram, mengantuk, ginekomastia, ruam kulit, sakit kepala, letargi, gangguan mental, ataksia, impotensi, irreguleritas menstruasi, diare, makupapular atau erupsi kulit eritematosa, erupsi</p>	<p>Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>

		Lorinid Mite	<p>berisiko. Obat digunakan dengan hati-hati apabila besarnya manfaat yang diperoleh melebihi besarnya risiko terhadap janin. Penelitian pada hewan uji</p> <p>Sensitif terhadap tiazid, sulfonamid, amilorid. Hiperkalemia, terapi dengan diuretik hemat K lain dan suplemen K, anuria, gagal ginjal akut, anak.</p>	<p>Hipertensi esensial, Edema akibat CHF/Gagal Jantung Kongestif, Sirosis Hepatik disertai Asites.</p>	<p>1 tablet perhari</p> <p>Aturan Pakai Sesudah makan</p>	<p>kulit, urtikaria, demam karena obat. . Jarang : agranulositosis, perdarahan pasca menopause.</p> <p>haus, pusing, hiperurisemia, hipotensi postural, ruam kulit, pruritus, lemah, kram otot, perubahan psikiatrik atau visual ringan,. Jarang : kolestatik jaundice, pankreat</p>	<p>Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>
CCB	Amlodipine, nifedipin, verapamil, Nicardipine	Zevask 5 mg	Hipersensitif	<p>Diindikasikan untuk pengobatan lini pertama hipertensi dan dapat digunakan sebagai agen tunggal untuk mengontrol tekanan darah pada sebagian besar pasien.</p>	<p>Dewasa: Hipertensi dan angina: Dosis awal 1 x sehari 5 mg, dapat ditingkatkan hingga dosis max.10 mg</p> <p>Aturan Pakai Dapat dikonsumsi sebelum atau</p>	<p>Sakit kepala, pusing, mengantuk, debaran jantung, sakit perut, mual, edema, kelelahan. Pasien (6-17 thn): Vasodilatasi, epistaksis, kelemahan.</p>	<p>Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>

					<p>sesudah makan.</p> <p>Untuk hipertensi : 10 - 40 mg, 2x sehari atau 20-90 mg sekali sehari. Untuk angina pectoris : 10-40 mg, 2x sehari atau 30-90 mg sekali sehari. Atau sesuai dengan petunjuk dokter.</p> <p>Aturan Pakai Diperlukan tenggang waktu minimal 2 jam diantara dua dosis pemberian. Tablet salut selaput biasanya diminum sebelum.</p>	<p>Mual, muntah, sakit kepala, hipotensi, rasa panas, hiperplasia gingiva, nyeri otot, edema dan gangguan fungsi hati.</p>	<p>Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>
		Zendalat	<p>Penderita yang hipersensitif terhadap Nifedipin. Wanita hamil dan menyusui. Penderita hipotensi dan syok kardiogenik.</p>	<p>Pengobatan dan profilaksis insufisiensi koroner kronik, angina pectoris serta pada keadaan setelah infark jantung, dan sebagai obat pelengkap untuk hipertensi.</p>			

		Isoptin	<p>hipotensi atau syok kardiogenik, gangguan konduksi (av block tingkat 2 dan 3, Hindari pemberian bersamaan dengan jus grapefruit, pada penderita lemah jantung, hipotensi berat, dan wanita hamil</p>	<p>pengobatan angina pectoris dan pencegahan aritmia</p>	<p>dewasa: 240-480 mg per hari dalam 3-4 dosis bagi</p> <p>Aturan Pakai sesudah makan</p>	<p>susah buang air besar, pusing, sakit kepala, hipotensi dan pedal edema, pada pemberian bersama obat-obat beta bloker, kadang-kadang dapat terjadi hipotensi berat, denyut jantung lambat, congestive heart failure dan gangguan konduksi av</p>	<p>Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>
		Nifedin	<p>Hipersensitif</p>	<p>Untuk angina pectoris stabil, variant dan tidak stabil, infark jantung, hipertensi atau fenomena Raynaud</p>	<p>Untuk angina pectoris stabil, variant dan tidak stabil, infark jantung : awal 1 tablet 3 kali/hari, dapat ditingkatkan menjadi 9-12 tablet/hari pada angina. Untuk hipertensi atau</p>	<p>Sakit kepala, kemerahan pada wajah, pusing, edema perifer, kram otot, hipotensi, hepatitis, ruam, sindrom nefrotik, psikosis akut, hiperplasia gingival.</p>	<p>Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>

					<p>fenomena Raynaud : dapat ditingkatkan sampai 2 tablet 3 kali/hari.</p> <p>Aturan Pakai Berikan setelah makan</p>		
ARB	Losartan, valsartan, candesartan, irbesartan, telmisartan	Santesar	Hipersensitivitas	Hipertensi	<p>Dosis dewasa : 50 mg 1 x sehari, bisa ditingkatkan sampai 100 mg / hari</p> <p>Aturan Pakai di berikan bersama atau tanpa makanan</p>	Pusing, efek ortostatik	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban
		Diovan 80	Hipersensitivitas, kehamilan, gangguan hati berat, sirosis, gangguan empedu	Hipertensi, gagal jantung, dan pasca infark miokard.	<p>Hipertensi : 1 kali sehari 80 mg,</p> <p>Aturan Pakai</p>	Sakit kepala, pusing, infeksi virus & saluran pernapasan atas, batuk, diare, kelelahan, rinitis, sinusitis, sakit	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari

		Canderin 8	Pasien dengan gangguan hati yang berat dengan atau tanpa ketoasidosis. Wanita hamil dan menyusui.	Hipertensi - Pengobatan pada pasien dengan gagal jantung dan gangguan fungsi sistolik ventrikel kiri ketika obat penghambat ACE tidak ditoleransi	Dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Pasien hipertensi : Dosis awal 8 mg per hari Aturan Pakai Dikonsumsi sebelum atau sesudah makan.	punggung & perut, mual, faringitis, artralgia. Infeksi saluran pernafasan bagian atas, nyeri punggung, dan pusing.	cahaya dan kelembaban Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban
		Irvask 75	Hamil dan laktasi.	Hipertensi esensial, untuk menurunkan mikro dan makro albuminurea pada pasien hipertensi dengan diabetik nefropati yang disebabkan oleh non insulin dependent diabetic mellitus (niddm)	Dosis awal 75 mg. Dosis pemeliharaan 150 mg x sehari, dapat ditingkatkan sampai 300 mg perhari. Aturan Pakai Sebelum / sesudah makan	Sakit kepala, pusing, takikardia, hipotensi, batuk, mual/mutah, diare, heartburn, disfungsi seksual, lelah, nyeri dada, nyeri otot, ruam kulit, hiperkalemia, hepatitis, kelainan pada telinga (tinnitus)	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban
		Micardis 40	Hamil, laktasi, gangguan fungsi	Hipertensi Esensial		Gangguan Gi, artralgia, berkeringat	Simpan di bawah suhu 30

			hati dan ginjal yang berat, sirosis hati, obstruksi saluran empedu, intoleransi fruktosa herediter.		Dewasa : 1 x sehari 1 tablet, maximum : 1 x sehari 2 tablet Aturan Pakai Sebelum atau sesudah makan	banyak, gangguan penglihatan, vertigo, infeksi saluran napas atas, cemas, eksema, kram atau nyeritungkai, tendinitis, gejala influenza, nyeri dada dan punggung, milgia, ISK.	derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban
ACEI	Kaptopril, lisinopril, ramipril	Farmoten 25	Angioedema yang berhubungan dengan pengobatan ACE inhibitor sebelumnya; Edema angioneurotic herediter atau idiopatik; enggunaan bersamaan dengan aliskiren pada pasien diabetes; Kehamilan	Hipertensi ringan sampai berat, gagal jantung	Untuk hipertensi : awal 12.5-25 mg 2-3 kali/hari. Dosis dapat ditingkatkan menjadi 50 mg 2-3 kali/hari, Aturan Pakai Saat perut kosong : 1 jam sebelum atau 2 jam sesudah makan	Hipotensi ortostatik, takikardia, kardiomiopati hipertropik, sakit Ruam, pruritus, muka kemerahan, batuk kering, kehilangan persepsi pengecap, proteinuria, batuk	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban
		Interpril	Riwayat angioedema yang berhubungan dengan pemberian	Hipertensi esensial dan renovaskular. Sebagai terapi tambahan terhadap	Hipertensi dosis awal: 2,5 mg per hari. Aturan Pakai	Pusing, sakit kepala, diare, lelah, batuk, mual, ruam kulit, edema	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat,

		Hyperil 5	<p>ACE inhibitor. Angioedema idiopatik hereditas, hamil, laktasi.</p> <p>Riwayat angioedema, hipersensitif</p>	<p>digitalis dan atau diuretik untuk gagal jantung kongestif</p> <p>Hipertensi, gagal jantung kongesti dengan miokardial infark akut</p>	<p>Sebelum/sesudah makan</p> <p>hipertensi : awal tanpa diuretik 2.5 mg 1 kali/hari</p> <p>Aturan Pakai Sebelum atau sesudah makan.</p>	<p>angioneurotik, hiperkalemia</p> <p>Gangguan ginjal, edema angioneurotik, reaksi anafilaktoid, gangguan KV, gangguan hematologi, batuk tidak produktif, gangguan GI, gangguan kulit, gangguan neurologik dan psikiatrik.</p>	<p>kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p> <p>Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>
Beta blocker	Atenolol, propanolol, bisoprolol	Farnormin	<p>Gagal jantung, sinus bradikardia, blok jantung derajat 2 dan 3, syok kardiogenik, asma bronkial.</p>	<p>Hipertensi (dewasa) & Angina Pectoris</p>	<p>HTN/Hipertensi (dewasa) : 1 tablet perhari, bila diperlukan dosis dapat ditingkatkan hingga 2 tablet perhari setelah 2 minggu.</p> <p>Angina Pectoris : 2 tablet perhari.</p> <p>Aturan Pakai</p>	<p>Bradikardia, ekstremitas dingin, hipotensi postural. Sakit kepala, vertigo, lelah, lemah, sedasi, depresi. Gangguan GI. Bronkospasme.</p>	<p>Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>

					Sebelum atau sesudah makan		
		Farmadral	Sinus bradikardia, syok kardiogenik, blok jantung derajat 2 atau 3, penyakit jantung.	Hipertensi, Angina Pectoris, Kecemasan, Takikardia, Disritmia jantung, Cardiomiopati obstruktif hipertrofik & Tremor esensial, terapi tambahan pada Tirotoksikosis & Feokromositoma, pencegahan paska Infark Miokard akut, Migren & Angina Pectoris	Dewasa & anak > 12 tahun - Angina Pectoris : 3-4 x sehari 2 tablet, Aturan Pakai Sebaiknya diberikan pada saat perut kosong.	Gangguan GI, kelemahan otot, lelah. Jarang; bradikardia, parestesia, trombositopenia, purpura, ruam kulit.	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban
		Maintate	Obat ini tidak boleh diberikan kepada pasien dengan kondisi: - Hipersensitif terhadap Bisoprolol. - Gagal jantung	Hipertensi dan angina pektoris, gagal jantung kronik stabil sedang sampai berat dengan penurunan fungsi ventrikular sistolik sebagai tambahan	Hipertensi dan angina: 5 mg - 10 mg sekali sehari. Aturan Pakai Dapat diberikan	Kram abdomen, diare, pusing, sakit kepala, mual, denyut jantung lambat, tekanan darah rendah, keadaan mati rasa, kesemutan, ekstremitas dingin,	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

			akut atau selama episode dekomposisi gagal jantung yang memerlukan terapi intravena inotropik.	terhadap ACE inhibitor, atau Diuretik, atau Glikosida jantung.	sebelum atau sesudah makan	nyeri tenggorokan, dan sesak napas atau mengi, kelelahan.	
Alfa blocker	Prazosin, hidralazin	Terazosin	Pasien yang diketahui hipersensitivitas terhadap zat aktif, untuk quinazolines lainnya (misalnya prazosin, doxazosin	Pengobatan hipertensi ringan sampai sedang. Pengobatan simptomatik obstruksi urin yang disebabkan oleh benign prostatic hyperplasia (BPH).	Dosis tunggal terendah 1 mg sebelum tidur untuk semua pasien, yang tidak boleh dilampaui. Dosis selanjutnya, pengobatan hipertensi ringan sampai sedang: Aturan Pakai Pada mau waktu tidur.	Pusing, kepala terasa ringan, kelelahan, mual, mengantuk, penglihatan kabur, sakit kepala, atau hidung tersumbat	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban
Sentral	Metildopa, klonidin	Dopamet 250	Hipersensitif, sirosis hati atau riwayat penyakit hati, hepatitis akut.	Hipertensi essensial termasuk Hipertensi Maligna, Hipertensi pada tahap awal Kehamilan, Hipertensi nefrogenik	Diawali 0.5-1 tablet perhari, ditingkatkan secara bertahap dengan 0.5-1 tablet setiap 3 hari Aturan Pakai	Ruam kulit, mulut kering, sakit kepala, lesu, hidung tersumbat, gangguan saluran cerna, pusing, peningkatan berat badan, edema, impotensi.	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

		Calapres 75	hipersensitif terhadap komponen obat	pengobatan hipertensi baik tunggal maupun kombinasi dengan obat hipertensi yang lain	Sebelum atau sesudah makan Sehari 1 kali Aturan Pakai sesudah makan	mulut kering dan sedasi, mual, muntah, pusing, impoten, penurunan libido	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban
--	--	-------------	--------------------------------------	--	--	--	--

(6.b) OBAT ANTIANGINA

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat antiangina	Isosorbide dinitrate, nitrogliserin	Farsorbid	Glaukoma, anemia, hiperteroid, peningkatan TIK, infark miokardum.	Terapi dan profilaksis angina pektoris	Dewasa : 4 x sehari 1 tablet atau untuk profilaksis : 1 tablet menjelang tidur malam. Aturan Pakai Diberikan pada saat perut kosong 1/2 jam sebelum makan	Hipotensi ortostatik, wajah atau leher panas dan kemerahan, sakit kepala, gangguan pencernaan, denyut nadi cepat, ruam kulit (jarang).	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban
		Nitrokaf retard 2.5	Hindari sildenafil. Glaukoma, syok kardiogenik,	Pencegahan dan terapi jangka	2-3 x sehari 1 kapsul, kasus	Sakit kepala, hipotensi ortostatik,	Simpan di bawah suhu 30

			anemia berat, trauma kepala, peningkatan TIK, pendarahan otak, insipiens, kegagalan sirkulasi akut, hipotensi.	panjang Angina Pectoris	berat : 2-3 x sehari 2 kapsul Aturan Pakai Sebelum atau sesudah makan	takikardi, kolaps yang disertai dengan aritmia bradikardi, mengantuk. Jarang : kolaps, kemerahan pada kulit.	derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban
--	--	--	--	-------------------------	--	--	--

(6.c) OBAT GAGAL JANTUNG KONGESTIF

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat gagal jantung kongestif	Digoksin	Fargoxin	Gangguan SSP dan GI. Jarang : bingung, disorientasi, afasia, gangguan denyut jantung, konduksi, ritme, alergi kulit, ginekomastia.	Gagal Jantung Kongestif, Takikardia Supraventrikuler Paroksismal	Dewasa : 4-6 tablet , dilanjutkan dengan 1 tablet pada interval yang cukup sampai kompensasi dicapai. Anak : 25 mcg/kg BB, ditingkatkan pada interval tertentu sampai kompensasi tercapai. Aturan Pakai Sebelum atau sesudah makan.	Blok AV komplit dan derajat 2, henti sinus, sinus bradikardi yang berlebihan, takikardi ventrikular dan fibrilasi ventrikular	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

(6.d) ANTIPLATELET

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antiplatelet	Asetosal, klopido ^g rel	Ascardia	Hipersensitivitas terhadap aspirin atau NSAID lainnya.	Pengobatan dan pencegahan angina pektoris dan Infark Miokard	Dosis yang dianjurkan: 80-160 mg/hari. Untuk infark miokard : sampai dengan 300 mg/hari. Untuk TIA : sampai dengan 1000 mg/hari. Aturan Pakai Diberikan setelah makan. Telan utuh, jangan dikunyah, dipotong, atau dihancurkan.	Gangguan pernapasan, toraks dan mediastinum: Asma, bronkospasme, dispnea, rinitis. Gangguan kulit dan jaringan subkutan: Ruam,	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban
		Vaclo 75	Obat ini tidak boleh diberikan kepada pasien dengan kondisi: Hipersensitif terhadap Clopidogrel. Perdarahan	Mengurangi kejadian aterosklerosis (infark miokard, stroke dan kematian vaskular) pada pasien dengan aterosklerosis yang	Sehari 1 kali 1 tablet (75 mg). Tidak ada penyesuaian dosis yang diperlukan untuk pasien lanjut usia atau	Sakit kepala, pusing, ruam, insomnia, gangguan gastrointestinal (seperti: sembelit, muntah).	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

			<p>Hipersensitif terhadap, Ibu hamil, menyusui atau usia produktif yang tidak menggunakan alat kontrasepsi yang adekuat</p>	<p>Sebagai terapi tambahan di samping diet, untuk menurunkan kolesterol total, kolesterol LDL, apolipoprotein-B, dan kadar trigliserida pada pasien dengan hiperkolesterolemia primer, hiperlipidemia kombinasi (campuran), serta hiperkolesterolemia familial heterozigot dan homozigot, bila diet dan penatalaksanaan non-farmakologik lainnya kurang berhasil.</p>	<p>Dosis awal yang biasa diberikan adalah 10 mg 1 kali sehari.</p> <p>Aturan Pakai Dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan.</p>	<p>Insomnia, sakit kepala, mual, diare, sakit perut, dispepsia, sembelit, perut kembung, mialgia, artralgia, asthenia, hipoglikemia, hiperglikemia, anoreksia, neuropati perifer, parestesia, tinitus, pankreatitis, muntah, hepatitis, ikterus kolestatik, alopecia, pruritus, ruam, miopati urtikaria, miositis, kram otot, impotensi, edema angioneurotik, malaise, angina.</p>	<p>Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>
		Fibesco 300	<p>Wanita hamil dan menyusui. Penderita dengan hipersensitivitas terhadap fenofibrate. Gangguan fungsi</p>	<p>Hiperkolesterolemi a (tipe IIA), hiperlipidemia kombinasi (tipe IIB dan III), hipertrigliserida endogen (tipe IV)</p>	<p>Dewasa: 300 mg per hari, dapat ditingkatkan menjadi 400 mg per hari. Pemeliharaan:</p>	<p>Gangguan pencernaan, reaksi alergi kulit, nyeri otot dengan peningkatan CPK (creatine phosphokinase),</p>	<p>Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari</p>

			hati yang berat. Gangguan fungsi ginjal. Penyakit kandung empedu. Anak-anak.	yang tidak memberikan respon dengan cukup terhadap diet dan tindakan lain yang sesuai.	200 mg per hari Aturan Pakai Dikonsumsi bersama makanan.	peningkatan sedang transaminase serum, perubahan hematologis (pemeriksaan sel darah), alopecia (kebotakan), dan astenia seksual (turunnya performa dalam aktivitas seksual, mudah lelah).	cahaya dan kelembaban
		Hypofil 300	Gangguan fungsi hati dan ginjal berat. Penyakit kandungan empedu.	Hiperkolesterolemia, hipertrigliseridemia, dan dislipidemia campuran.	2 x sehari 2 kapsul Aturan Pakai Saat perut kosong, 0.5 jam sebelum makan	Nyeri perut, diare, kembung, mual.	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban
		Ezetro;	Hipersensitif	Menurunkan kolesterol total, LDL, apolipoprotein b dan trigliserid dan meningkatkan HDL pada pasien hiperkolesterol primer.	1x sehari 1 tablet Aturan Pakai Dikonsumsi dengan atau tanpa makanan dan konsumsi dengan waktu yang sama	Sakit kepala, nyeri perut, diare. Kombinasi dengan statin: Sakit kepala, lemas, nyeri perut, sembelit, diare, kembung, mual. Bila dikombinasi dengan fenofibrate: Nyeri perut	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

(6.f) OBAT ANTIARITMIA

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat antiaritmia	Amiodaron	Tiaryt 200	Disfungsi sinus node berat, blok AV derajat 2 dan 3, sinkop. Disfungsi tiroid. Hamil dan laktasi. Sensitif terhadap iodida	Mengobati & mencegah Aritmia Ventrikel & Supraventrikel yang membahayakan jiwa, Fibrilasi Atrium paroxismal, Atrial flutter, Takikardia Atrial ektopik	Diawali 4-8 tablet perhari selama 1-3 minggu. Aturan Pakai bersama atau tanpa makanan.	Fotosensitisasi dan pigmentasi, hipotiroid, mikrodeposit kornea, toksisitas pulmonal dan neurotoksik.	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

7. OBAT SALURAN CERNA**(7.a) Obat gastritis dan tukak lambung**

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antasida	Al(OH) ₃ , Mg(OH) ₂ , natrium bikarbonat	Almacon	Dehidrasi, Penggunaan obat pencahar berbasis minyak mineral, Penyakit ginjal, Reaksi alergi, hipersensitivitas	Perut rasa kembung, nyeri lambung, epigastrium, antasida pada gastritis, hiatus hernia dan peptik	1-2 tablet Aturan Pakai 1 jam sesudah makan dan sebelum tidur	Konstipasi, diare, mual, muntah	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari

				eosifagitis, ulkus deudenum dan ulkus lambung			cahaya dan kelembaban
H2 Bloker	Simetidin, ranitidin, famotidin	Sanmetidin	Hipersensitivitas	Sakit maag, ulkus/tukak usus halus, sindroma Zollinger Ellison, Hiperasiditas lambung, Esofagitis, menghambat sekresi asam lambung pada anak ²	Dewasa, 3x sehari 1 tablet Aturan Pakai Diminum saat makan	Diare ringan, lelah, pusing dan gatal	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban
		Gasela	-	pengobatan jangka pendek pada tukak usus dua belas jari aktif	150 mg (1 tab) 2 kali sehari atau 300 mg (2 tab) sebelum tidur Aturan Pakai sebelum makan	Mengantuk	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban
		Famocid 20	hipersensiti terhadap famotidin	Ulkus duodenum. Kondisi hipersekresi patologis seperti,	Ulkus duodenum Terapi akut 40 mg 1 x/hr sblm	Kadang-kadang demam, edema orbita karena reaksi hipersensitif,	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat,

				sindrom Zollinger-Ellison, adenoma endokrin.	tidur atau 20 mg 2 x/hr Aturan Pakai Diberikan sebelum atau sesudah makan	palpitasi, diare, sesak, perdarahan atau memar, astenia, sakit kepala, konstipasi, trombositopenia, artralgia	kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban
PPI	Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol	Pumpitor 20	Omeprazole dikontraindikasikan untuk pasien yang diketahui hipersensitivitas terhadap obat ini atau bahan lain yang terdapat dalam formulasi. Penggunaan dengan nelfinavir.	Pengobatan jangka pendek untuk tukak lambung dan tukak duodenum, tukak lambung dan duodenum yang terkait dengan AINS, lesi lambung dan duodenum, regimen eradikasi H. pylori pada tukak peptik, refluks esofagitis, Sindrom Zollinger Ellison.	Dewasa: 20 mg 1 kali sehari Aturan Pakai Sebelum makan	Sakit punggung. Gangguan sistem saraf: Sakit kepala, pusing, mengantuk, parestesia, vertigo	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban
		Doprizol	Hipersensitivitas terhadap lansoprazole	pengobatan tukak lambung	Dewasa: Pengobatan: 30 mg 1 kali sehari, selama 4-8 minggu Aturan Pakai sebelum makan	Konstipasi, diare	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

		Pantozol	Hipersensitivitas terhadap pantoprazole atau salah satu kandungannya atau substitusi benzimidazole lainnya.	Untuk meredakan gejala gastroesophageal reflux disease (GERD) atau nonerosive reflux disease (NERD). Untuk penanganan jangka panjang reflux esophagitis sedang dan berat.	Dewasa sehari 1 kali Aturan Pakai Tablet tidak boleh dikunyah atau dihancurkan dan harus ditelan utuh dengan air putih, 1 jam sebelum makan	nyeri perut bagian atas, diare, kontipasi, kembung, mual/muntah, mulut kering	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban
Pelindung mukosa	Sukralfat	Episan suspensi	Hipofosfatemia, Reaksi alergi, disfungsi ginjal yang parah	Terapi jangka pendek tukak duodenum (hingga 8 minggu).	2 sendok takar (10 mL) 4 kali perhari. Aturan Pakai Diberikan saat lambung kosong (1 jam sebelum makan dan sebelum tidur)	Konstipasi & mulut kering; diare, mual, muntah, rasa tidak nyaman pada lambung, kembung, pruritus, ruam kulit, mengantuk, vertigo, nyeri punggung, & sakit kepala.	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban
Antiflatulen	Dimetilpolisiloksan	Disflatyl	Hipersensitif, Aritmia, Hipokalsemia, Hipomagnesia, CHF, Jantung Iskemik	Meredakan kembung dan rasa tidak nyaman diperut karena gas yang berlebihan.	3 x sehari 2 tablet dikunyah sesudah makan dan sebelum	sendawa	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari

					tidur sesuai kebutuhan Aturan Pakai Diberikan sesudah makan. Dikunyah sampai halus.		cahaya dan kelembaban
Analog prostaglandin	Misoprostol	Cytotec	Hamil dan laktasi	Mencegah tukak lambung	100-200 mg 4 kali/ hari	Diare, pendarahan per vagina	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

(7.b) Obat antidiare

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antimotilitas	Loperamid	Lopamid	Hipersensitivitas; kolitis akut & kondisi dimana	Diare akut non spesifik & diare kronik	Dewasa : awal 2 tablet kemudian 1	Insufisiensi hati & ginjal	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah

			<p>konstipasi hrs dihindari; demam tinggi atau terdapat darah dlm feses. Hamil & laktasi. Anak <12 thn.</p>		<p>tablet setiap habis defekasi. Maksimal : 8 tablet/hari. Anak >8 tahun : Awal : 1 tablet kemudian sesuai kebutuhan. Maksimal : 4-6 tablet/hari.</p> <p>Aturan Pakai Sebelum atau sesudah makan</p>		<p>tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>
<p>Adsorben</p>	<p>Kaolin pektin, attapulgit</p>	<p>New Diatabs</p>	<p>Hipersensitif terhadap activated attapulgit.</p>	<p>Obat ini dapat digunakan untuk pengobatan simptomatik pada diare non-spesifik, yaitu diare yang tidak diketahui penyebabnya dengan jelas.</p>	<p>2 tablet setiap setelah buang air besar, maksimum penggunaan 12 tablet dalam waktu 24 jam. Anak-anak (6-12 tahun) : 1 tablet setiap setelah buang air besar, maksimum penggunaan 6 tablet dalam waktu 24 jam.</p> <p>Aturan Pakai</p>	<p>Konstipasi, biasanya ringan dan bersifat sementara.</p>	<p>Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>

					Sebelum atau sesudah makan		
Antisekresi	Bismut subsalisilat	Scantoma	Alergi terhadap salisilat	Diare non-spesifik	<p>Dewasa : 2 tablet. Anak 6-12 tahun : 1 tablet. Anak 3-6 tahun : 1/2 tablet. (untuk Dewasa) selama perjalanan : 2 tablet 4kali/hari, selama 3 minggu.</p> <p>Aturan Pakai Diberikan sebelum atau sesudah makan.</p>	Tinja berwarna hitam	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

(7.c) Obat laksatif

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Laksatif osmotik garam	Mg sulfat	Infusan MgSO4	ibu hamil dan menyusui	Mengobati hipomagnesemia, mencegah dan mengatasi kejang pada eklamsia	4 gram selam 5-10 menit	<p>Sakit perut atau diare</p> <p>Wajah merah dan terasa hangat (<i>flushing</i>)</p> <p>Keringat berlebih</p>	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

						Tekanan darah turun	
Laksatif osmotik alkohol/gula tdk dicerna	Gliserin, laktulosa	Guaiifenesin	Hipersensitif, diabetes, penyakit liver, fenilketouria, hamil dan menyusui.	Meringankan batuk produktif (sebagai ekspektoran)	2-4 tablet tiap 4 jam. Maksimal: 24 tablet sehari. Aturan Pakai Sebelum/sesudah makan	mual, muntah, diare dan nyeri perut bagian bawah, pusing, berkunang-kunang, sakit kepala, neprolithiasis, hipouricemia, dan ruam pada kulit	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban
Laksatif stimulan	Turunan difenilmetan (bisakodil, fenoltalein), antrakuinon	Dulcolax tablet	Obat ini tidak digunakan pada pasien ileus, obstruksi usus, yang baru mengalami pembedahan di bagian perut seperti usus buntu, penyakit radang usus akut, dan nyeri perut parah yang berhubungan dengan mual muntah. Obat ini juga dikontraindikasikan pada dehidrasi yang parah dan pasien yang diketahui hipersensitif	Untuk mengatasi masalah sembelit/susah BAB/konstipasi. Untuk persiapan prosedur terapi diagnostic, terapi sebelum dan sesudah operasi dan dalam kondisi untuk mempercepat defekasi.	1-2 tablet per hari. Anak 6-10 tahun : 1 tablet sekali sehari Aturan Pakai Tablet dianjurkan untuk diminum pada malam hari (waktu kerja obat 6-12 jam) untuk mendapatkan buang air besar keesokan harinya.	Kram dan nyeri perut, reaksi alergi, angioedema dan reaksi anafilaktoid..	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

			terhadap Bisacodyl..				
--	--	--	----------------------	--	--	--	--

(7.d) Antiemetik

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antiemetik	Dimenhidrinat, ondansetron, metoklorpramide,	Omedrinat	Hipersensitif terhadap kandungan Omedrinat dimenhydrinate	Mencegah dan meredakan mabuk perjalanan & mengobati vertigo, mual atau muntah sehubungan dengan terapi elektrolyok, anestesi & operasi, gangguan Labirin, sakit akibat radiasi & sindroma paska fenestrasi	1 tablet minimal 30 menit sebelum bepergian.	Muntah, diare, mual, sakit kepala dan mengantuk	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban
		Narfoz	Hipersensitivitas. Sindrom QT panjang bawaan. Penggunaan bersamaan dengan apomorphine.	Penatalaksanaan mual dan muntah karena kemoterapi dan radioterapi, mual dan muntah paska operasi.	Awal 8 mg per oral 1-2 jam sebelum anestesi, dilanjutkan dengan 8 mg setelah 8-12 jam. Aturan Pakai Obat ini bisa dikonsumsi	Signifikan: Nyeri dada, bradikardia, hipotensi, aritmia, hipoksia, peningkatan sementara enzim hati. Jarang terjadi: kebutaan sementara, gejala ekstrapiramidal (misalnya reaksi distonik, krisis okulogirik,	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

		Norvom	bu hamil, lansia dan anak. penderita dengan hipersensitif terhadap prokaina dan prokainamida. penderita dengan gangguan fungsi ginjal. jangan diberikan bersama obat golongan fenotiasin.	mengatasi mual dan muntah pasca operasi, menghilangkan rasa panas akibat refluks esofagitis	dengan atau tanpa makanan 3 kali sehari 1 kaplet Aturan Pakai Diminum sebelum makan	diskinesia), kejang, nekrolisis epidermal toksik, sindrom serotonin diare, mengantuk, sembelit, gejala ekstrapiramidal, gelisah, lelah, mulut kering, agitasi (rasa resah dan gelisah yang berlebihan), urtikaria (reaksi alergi seperti gatal dan biduran).	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban
--	--	--------	---	---	---	---	--

(8) OBAT SALURAN NAPAS

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat Batuk	codein, dekstromethorphan, gliseril guaikolat, amonium klorida, bromheksin, ambroksol, asetilsistein	Codikaf	Pasien dengan keadaan koma, pasien yang mengkonsumsi alkohol, perut kembung, gagal hati	untuk mengatasi batuk kering (antitusif) dan mengatasi nyeri (analgetik). Obat ini termasuk dalam golongan narkotika.	Dewasa 15-30 mg sebanyak 3-4 kali/hari	Mual, muntah, kesulitan buang air besar, mulut kering dan sakit kepala	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

		Granstuif	Hipersensitivitas, gangguan fungsi hati, asma akut, dan laktasi.	Untuk mengobati batuk yang disertai alergi. Obat ini dapat menyebabkan kantuk, sebaiknya tidak mengendarai kendaraan bermotor atau menjalankan mesin ketika mengkonsumsi obat ini.	Dewasa dan Anak > 12 th : 3 kali sehari 1 - 2 kaplet. Anak 6-12 tahun : 3 kali sehari 0.5 - 1 kaplet. Atau menurut petunjuk dokter Aturan Pakai Diberikan setelah makan.	Mulut terasa kering, mengantuk, pusing, mual, konstipasi.	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban
		Bromifar	Tukak lambung. Hamil trimester pertama.	Untuk batuk yang memerlukan pengenceran dahak.	Dewasa dan anak > 10 tahun : 1 kaplet 3 kali sehari. Anak 5-10 tahun : 1/2 kaplet 3 kali sehari. Anak 2-5 tahun : 1/4 kaplet 2 kali sehari Aturan Pakai Dikonsumsi bersamaan dengan makanan	Mual, diare, gangguan pencernaan, perasaan penuh di perut, sakit kepala, vertigo, berkeringat banyak, ruam kulit, peningkatan transaminase	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

		Epexol	<p>Mual, muntah, diare, dispepsia, mulut atau tenggorokan kering, sakit perut, mulas, hipoestesia oral atau faring, dysgeusia. Berpotensi Fatal: Jarang, reaksi anafilaksis (misalnya syok anafilaksis, angioedema, ruam, urtikaria, pruritus).</p>	<p>Sebagai sekretolitik pada gangguan saluran nafas akut dan kronis khususnya pada eksaserbasi bronkitis kronis dan bronkitis asmatik dan asma bronkial.</p>	<p>Dewasa dan anak >12 tahun: 30 mg, 2-3 kali sehari. Dapat ditingkatkan hingga 60 mg. Max. 120 mg per hari. Aturan Pakai Diminum sesudah makan</p>	<p>Mual, muntah, diare, dispepsia, mulut atau tenggorokan kering, sakit perut, mulas, hipoestesia oral atau faring, dysgeusia. Berpotensi Fatal: Jarang, reaksi anafilaksis (misalnya syok anafilaksis, angioedema, ruam, urtikaria, pruritus)..</p>	<p>Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>
		Fluimucil 200 tablet	<p>Hipersensitif terhadap Acetylcysteine atau zat tambahan obat ini Anak-anak dibawah 2 tahun</p>	<p>Hipersensitif terhadap Acetylcysteine atau zat tambahan obat ini Anak-anak dibawah 2 tahun</p>	<p>Dewasa dan anak diatas 14 tahun : 1 Kapsul 2-3 kali sehari Aturan Pakai diatas 14 tahun : 1 kapsul 2-3 kali</p>	<p>Reaksi alergi, sakit kepala, telinga berdengung, peningkatan denyut jantung, muntah, diare, radang mulut, sakit perut, iritasi kulit, ruam, pembengkakan akibat akumulasi cairan disekitar mulut dan mata, gatal, demam dan</p>	<p>Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>

						penurunan tekanan darah Jarang (kemungkinan 1 dari 1.000 orang)	
Obat asma	terbutaline, salbutamol, budesonid, ipratropium bromida, teofilin, aminofilin	Nairet 25	Tremor, kram tonik, palpitasi. pusing, berkeringat, mual dan muntah,	Untuk mengobati bronkospasme akut.	Dewasa : 2-3 kali sehari 1-2 tablet, Aturan Pakai Berikan bersama makan.	Tremor, kram tonik, palpitasi. pusing, berkeringat, mual dan muntah,	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban
		Grafalin 4	Hipersensitif	Bronkodilator pada asma bronkial, bronkitis kronik dan emfisema.	Dewasa dan anak > 12 tahun : 2-4 mg. Anak 6-12 tahun : 2 mg. Anak 3-6 tahun : 1-2 mg. Aturan Pakai 1 jam sebelum sesudah makan.	Mual, pusing, palpitasi, tremor, tegang, sakit kepala, vasodilatasi perifer.	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban
		Teosal	Hipertiroidisme. Tirotoksikasi. Penderita tukak lambung. Penderita yang hipersensitif terhadap salah	Sebagai bronkodilator pada penderita asma bronkial dan bronkitis kronis.	Aturan Pakai Sesudah makan	rasa mual, muntah	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

		Erphafillin	satu komponen obat. -	Asma bronkial dan gangguan kekejangan bronki lainnya	Dewasa: awal 225-450mg, dapat ditingkatkan jika perlu. anak >3th: 12mg/kg sehari dapat meningkat menjadi 24mg/kg sehari dalam 2 dosis terbagi setelah 1 minggu. Aturan Pakai 1 jam sebelum atau 2 jam setelah makan.	Mual, muntah, sakit perut, diare, sakit kepala, insomnia, pusing, cemas, gelisah, tremor, palpitasi (detak jantung tidak normal).	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban
--	--	-------------	------------------------------	--	--	---	--

(9) VITAMIN, MINERAL, ENZIM

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Vitamin	Vitamin A, D, E, K, B1 (thiamin), B6 (piridoksin), asam folat, B12, C	Becom Zet	Hipersensitif	Suplementasi vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin E dan zinc.	1 x sehari 1 kaplet, atau sesuai petunjuk dokter. Aturan Pakai	Gangguan gastrointestinal	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari

		Folavit 400	Terapi jangka panjang pada defisiensi kobalamin yang tidak diobati.	Pertumbuhan janin, memelihara kesehatan, defisiensi Asam Folat, suplemen untuk masa Kehamilan dan menyusui, meningkatnya kebutuhan Asam Folat.	Sebelum atau sesudah makan, dapat bersama makanan untuk mengurangi ketidaknyamanan pada saluran cerna. Untuk ibu hamil dan menyusui : 2 tablet per hari. Aturan Pakai Sebelum atau sesudah makan	-	cahaya dan kelembaban Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban
Mineral	Ca, P, K, Mg, Na, Cl, Fe, Zn, Mn, Cu, I2	Licokalk plus	gangguan fungsi ginjal atau riwayat batu saluran kemih. pasien yang mendapat terapi glikosida jantung	untuk membantu mencegah defisiensi Ca. Membantu pertumbuhan tulang dan gigi. Suplemen Ca pada masa hamil dan menyusui.	dewasa: 3 kali sehari 1-2 kaplet. anak: 3 kali sehari 1 kaplet.	anoreksia (gangguan makan hingga alami penurunan berat badan), nyeri otot dan sendi, mual, muntah, haus, poliuria (produksi urin berlebih), aritmia (gangguan	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

						detak jantung atau irama jantung).	
--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--

(10) OBAT SISTEM ENDOKRIN

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat Diabetes melitus	Sulfonilurea (glibenclamide, glimepiride), metformin, pioglitazone, acarbose, insulin	Latibet	Diabetes mellitus juvenil, prekoma dan koma diabetes, gangguan fungsi ginjal parah, gangguan fungsi hati, gangguan fungsi tiroid atau adrenal, hipersensitif, wanita hamil, pengobatan harus dihentikan 2 minggu sebelum melahirkan. Diabetes mellitus dengan komplikasi, diabetes ketoasidosis.	Diabetes mellitus tipe 2 yang tidak responsif dengan diet saja.	15 mg per hari. Aturan Pakai Diberikan saat makan pagi atau makan pertama.	Mual, muntah, diare, sembelit dan nyeri pada ulu hati, sakit kepala, demam, kenaikan berat badan	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban
		Glikos	Anak-anak, lanjut usia, ibu hamil dan menyusui	Sebagai obat tunggal atau kombinasi dengan sulfonilurea untuk terapi pasien	2-3 x sehari 1 tablet, maximum 6 tablet perhari	gangguan gastrointestinal, pusing, sakit kepala, infeksi saluran napas atas, gangguan daya	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan

				<p>dengan NIDDM (Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus) dan kelebihan berat badan dimana kadar gula darah tidak dapat dikendalikan dengan diet saja. Terapi tambahan pada Insulin Dependent Diabetes Mellitus yang sulit terkontrol.</p>	<p>Aturan Pakai Bersamaan dengan makan</p>	<p>pengecapan, asidosis laktat</p>	<p>terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>
		Deculin	<p>Pasien yang hipersensitif terhadap pioglitazone atau salah satu bahan yang terdapat dalam formula obat. - Gagal jantung atau pada pasien yang mempunyai riwayat gagal jantung (NYHA I sampai IV). - Gangguan hati</p>	<p>Sebagai terapi kombinasi dengan sulfonilurea atau metformin pada pasien Diabetes Melitus Tipe 2 yang tidak terkontrol dengan monoterapi sulfonilurea dan metformin.</p>	<p>Untuk dewasa : Kombinasi dengan metformin atau sulfonilurea dapat dimulai dengan dosis pioglitazone 15-30 mg sekali sehari.</p> <p>Aturan Pakai Dikonsumsi sebelum atau sesudah makan.</p>	<p>anemia, meningkatnya berat badan, sakit kepala, gangguan penglihatan, artalgia, hematuria</p>	<p>Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>


		Glucobay	Pasien yang hipersensitif terhadap acarbose dan/atau komponen dalam obat. - Pasien dengan gangguan intestinal kronis yang berhubungan dengan penyerapan dan gangguan pencernaan secara nyata.	Terapi untuk pasien Diabetes Melitus yang tidak dapat diatur hanya dengan diet.	Dosis awal: 3 kali sehari 50 mg. Dosis selanjutnya: 3 kali sehari 100-200 mg.. Aturan Pakai Dikonsumsi bersama satu suapan pertama makanan atau ditelan utuh dengan sedikit air segera sebelum makan.	Flatulence, diare, nyeri abdominal, nausea.	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban
Obat hipertiroid dan hipotiroid	Propiltiourasil, levotiroksin.	Propylthiouracil	Wamil trimester III	Antitiroid / hipertiroidism	Dosis awal: 100 ? 150 mg secara oral setiap 8 jam, jarang terjadi 200 ? 300 mg oral setiap 8 jam Perawatan : 100 ? 150 mg/hari dalam dosis yang dibagi rata setiap 8-12 jam. Aturan Pakai	Purpura, rash, nyeri, kaku sendi	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

					Sebelum atau sesudah makan		
Kortikosteroid	hidrokortison, betametason, prednison, metilprednisolon	Nestacort 2.5% cream	jangan menggunakan obat ini untuk pasien yang memiliki riwayat hipersensitif pada obat golongan kortikosteroid. Nestacort, sebaiknya tidak diberikan pada pasien yang menderita infeksi jamur sistemik, penderita TBC aktif, herpes zoster, herpes simplex, dan infeksi virus lain.	Nestacort bisa digunakan secara topikal untuk mengobati penyakit eksim, dermatitis kontak, dan penyakit kulit lain yang peka terhadap kortikosteroid.	cream dioleskan pada area kulit terinfeksi 2 x sehari. Aturan Pakai Oleskan tipis pada tempat yang sakit	sensasi kulit seperti terbakar, rasa gatal, iritasi, kulit kering, folikulitis, jerawat, hipopigmentasi, dermatitis perioral, dermatitis kontak alergi, infeksi sekunder, dan miliaria.	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban
		Benoson	hipersensitif, Herpes simplex, vaccina, varicella, chickenpox, tuberkulosis kulit, Rosacea, akne vulgaris dan prioral dermatitis, prienal dan gatal pada alat kelamin,	Meringankan inflamasi dari sarmatosis yang responsif terhadap kortikosteroid	Oleskan pada tempat kelainan 2-3 kali sehari Aturan Pakai oleskan pada tempat yang sakit	alergi, hipersensitif, efek samping lokal, rasa terbakar, gatal, iritasi, kulit kering, folikulitis, hipertrikiosis, erupsi menyerupai akne, hipopigmentasi, dermatitis prioral, dermatitis kontak alergik,	Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban

		Eltazon	<p>erupsi napkin dan infeksi virus</p> <p>infeksi sistemik (kecuali kalau diberikan pengobatan microbial spesifik), hindari pemberian vaksin virus hidup pada pemberian dosis immunosupresif (respon serum antibodi berkurang).</p>	<p>Terapi tambahan pada rematoid artitis, asma bronkhial dengan inflamasi akut, lupus eritematosus, penyakit kulit dan mata karena alergi dan inflamasi, penyakit-penyakit limfa neoplastis, sindroma adrenogenital dan bursitis.</p>	<p>1-6 tablet sehari, tergantung parahnya kondisi. Kurangi dosis secara bertahap sampai dosis perawatan terendah. Dosis Perawatan: 4 tablet sehari dibagi dalam 4 dosis, sesudah makan dan sebelum tidur</p> <p>Aturan Pakai setelah sarapan pagi</p>	<p>Retensi cairan dan natrium, kehilangan kalium, alkalosis hipokalemia, kegagalan kongesti jantung. - Kelelahan otot, miopati steroid, hilangnya massa otot, osteoporosis</p>	<p>Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>
		Rhemafar	<p>Infeksi jamur sistemik kecuali terapi antiinfeksi spesifik digunakan; Admin IM pada</p>	<p>Obat ini diindikasikan untuk keadaan alergi dan mengurangi peradangan atau supresi inflamasi.</p>	<p>Dewasa : 4 - 8 mg/hari dosis ditingkatkan menjadi 16</p> <p>Aturan Pakai Dikonsumsi sesudah makan</p>	<p>Penekanan adrenal, reaksi anafilaktoid, immunosupresi, miopati akut, sarkoma Kaposi, gangguan kejiwaan (misalnya depresi,</p>	<p>Simpan di bawah suhu 30 derajat C, wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari</p>

			<p>penyakit hati berat, perdarahan vagina yang tidak terdiagnosa, riwayat ikterik, pruritus, herpes gestasionis.</p>		<p>Bila Anda memberikan ASI secara eksklusif, Pil KB Laktasi dapat dikonsumsi 6 minggu setelah melahirkan. Untuk efektivitas penuh, pil dapat diminum pada hari pertama haid dan setiap hari seterusnya pada jam yang sama</p>	<p>lembek. Pada umumnya efek samping ini akan berangsur hilang setelah beberapa kali penggunaan..</p>	<p>kering, dan terlindung dari cahaya dan kelembaban</p>
--	--	--	--	--	--	---	--

Gresik, 12 April 2023
Dosen Pembimbing,



Apt. Siti Nur Asiyah. M.Farm., Klin
NIDN : 0711088504

Lamongan, 15 April 2023
Pembimbing Lapangan (Apotek L FANS)






Apt. Arief Alvyyan Rahman. S.Farm
SIPA : 1055/SIPA/413.III/V/2021








C. PRODUCT KNOWLEDGE ALAT KESEHATAN (diketik)




(1) ALKES PERAWATAN

No	Alkes perawatan	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Bandage gauze (kasa hidrofil)		<p>kain kasa panjang yang berfungsi untuk membalut luka.</p>	<p>Sebelum di pakai dibersihkan dengan cairan NACL terlebih dahulu lukanya setelah itu baru di tutup menggunakan kasa hidrofil yang sudah di beri plester atau hypavix</p>
2.	Elastic bandage		<p>Membantu membebat area persendian yang mengalami cedera, seperti keseleo, terkilir, patah tulang, persendian terlepas, dan sebagainya</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pegang salah satu ujung perban elastis pada bola kaki Anda, dengan ujung perban membentang melewati bagian luar kaki. Biarkan ekor perban tetap tergulung agar lebih mudah diatur - Gunakan satu tangan untuk memegang ujung perban pada bola kaki Anda. Kemudian, bawa perban ke atas kaki, dari luar ke dalam, dan kemudian di bawah kaki untuk bungkus kedua. - Setelah membungkus bagian atas kaki Anda, bawa perban ke atas, di sekitar bagian dalam pergelangan kaki, di belakang pergelangan kaki ke sisi lain, dan kembali melewati punggung kaki dan di bawah kaki. Perban elastis harus ditunen di atas pergelangan kaki dan kaki Anda sehingga tumit Anda terbuka.

				- Anda bisa menggunakan tali velcro atau garpu logam kecil untuk mengamankan ujung perban. Usahakan pembungkusnya tanpa ada benjolan atau tonjolan dan harus nyaman dipakai.
3.	Kapas pembalut		Digunakan untuk mengaplikasikan obat atau menyerap jumlah kecil cairan tubuh dari permukaan tubuh pasien.	Ambil <i>kapas</i> secukupnya; <i>Gunakan</i> untuk membersihkan atau melapisi luka atau membersihkan kulit bayi dan orang dewasa
4.	Kasa berisi obat (sufra tulle, daryant tulle, bacti grass, actisorb, paronet)		memiliki aktivitas antibakteri dan merupakan pembalut yang baik untuk digunakan dalam berbagai luka infeksi	Gunakan pada bagian yang dibutuhkan.
5.	Kasa dressing		untuk menutupi Luka bakar, luka trauma (terpukul, terbentur, terkilir, tertusuk, dll), keadaan infeksi kulit sekunder, ulkus (borok) & khitan/sunat.	Potong kain kasa sesuai ukuran yang dibutuhkan & lekatkan pada luka.

<p>6.</p>	<p>Kasa steril</p>		<p>untuk operasi besar/kecil, khitan, penutup luka, dan bebat pusar bayi.</p>	<p>Sebelum di pakai dibersihkan dengan cairan NACL terlebih dahulu lukanya setelah itu baru di tutup menggunakan kasa hidrofil yang sudah di beri plester atau hypavix</p>
<p>7.</p>	<p>Pembalut gips (gypsona)</p>		<p>perangkat dalam dunia medis yang digunakan untuk melindungi dan menopang tulang atau sendi yang sedang mengalami cedera seperti patah</p>	<p>memasang <i>stockinette</i> terlebih dahulu, yaitu perban yang ringan dan melar. Pemasangan dilakukan pada bagian tubuh yang mengalami patah tulang.</p> <p>Setelah itu, lapisan gips yang merupakan bantalan dari kapas atau bahan lembut lainnya akan dipasang. Bagian ini berperan untuk melapisi bagian tubuh serta melindungi kulit. Bantalan lembut ini juga akan memberikan tekanan yang elastis untuk membantu proses penyembuhan tulang. Setelah bagian dalam terpasang rapi, dokter akan mulai memasang bagian luar atau pelindung.</p>



8.	Pembalut leher/cervical collar		<p>Penyangga leher ini dipasang, apa bila terjadi trauma akibat kecelakaan, baik jatuh dari ketinggian, atau cedera saat olah raga, atau jatuh karena tabrakan kendaraan.</p>	<p>Bagian belakang Cervical collar diletakkan ke leher belakang hingga sedikit melewati leher. Kedua sisi Cervical collar direkatkan satu sama lain.</p>
9.	Plester Elastik (handyplas, band aid, elastikon)	 <p>† Se Kain Elastis Toples 1 Pcs</p>	<p>plester penutup luka untuk mencegah infeksi pada luka selama proses penyembuhan. Produk ini dibuat dari bahan elastis yang akan mengikuti tiap lekukan kulit sehingga menutup luka dari kotoran dan bakteri, kedap air, steril, dan tidak melekat pada luka.</p>	<p>Rekatkan bersamaan dengan kasa untuk menutupi bagian yang luka</p>
10.	Plester kertas (leukopor, dermilite)		<p>Leukopor adalah plester untuk menutup luka yang memiliki daya rekat tinggi dan tembus udara sehingga</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gunting atau sobek plester sesuai ukuran yang dibutuhkan. 2. Pastikan area yang diaplikasikan bersih, tidak basah atau terkena minyak. 3. Aplikasikan Leukoplast pada area yang diinginkan dan rekatkan ke kulit atau alat




			meminimalisir terjadinya iritasi pada kulit.	dengan hati-hati. 4. Pastikan ujung-ujung plester sudah merekat dengan baik.
11.	Plester plastik (leukofix, transfor)		Plester perekat untuk merekatkan verban penutup luka	Rekatkan bersamaan dengan kasa untuk menutupi bagian yang luka
12.	Plester plastik waterprof (setonplast, blenderm)		Plester perekat untuk merekatkan verban penutup luka	Rekatkan bersamaan dengan kasa untuk menutupi bagian yang luka
13.	Plester rayon (microfore, dermisel)		Plester perekat untuk merekatkan verban penutup luka	Rekatkan bersamaan dengan kasa untuk menutupi bagian yang luka



14.	Plester sutera (leukosilk)		Plester perekat untuk merekatkan verban penutup luka	Rekatkan bersamaan dengan kasa untuk menutupi bagian yang luka
15.	Plester ZnO (leukoplas)		perekat penutup luka, perekat tube, catheter, dan cannulae.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gunting atau sobek Leukoplast sesuai ukuran yang dibutuhkan. 2. Pastikan area yang diaplikasikan bersih, tidak basah atau terkena minyak. 3. Aplikasikan Leukoplast pada area yang diinginkan dan rekatkan ke kulit atau alat dengan hati-hati. 4. Pastikan ujung-ujung plester sudah merekat dengan baik.


(2) PERAWATAN PASIEN



No	Perawatan pasien	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Bedpan		penampung fases yang terbuat dari plastik yang kuat dengan kualitas yang baik	Letakan bedpan yang nyaman, pasien dibantu untuk berdiri/ diangkat atau posisinya diatas bedpan, jika sudah buang fases lalu dicuci

<p>2.</p>	<p>Breast pump</p>		<p>alat pemompa yang dapat membantu mengeluarkan ASI sehingga bayi Anda dapat tetap minum ASI.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siapkan breast pump manual, lalu pasang masing-masing alat sesuai tempatnya 2. Masukkan corong pompa di posisi yang tepat dengan puting dan payudara sampai dirasa sudah nyaman 3. Posisikan salah satu tangan memegang pompa dan tangan lainnya menopang payudara 4. Gerakkan tuas pompa secara perlahan dengan hitungan seperti isapan bayi saat menyusui. 5. Ulangi gerakan tangan saat memompa sampai jumlah ASI dirasa sudah cukup atau payudara telah kosong. 6. Cuci bersih tangan dan semua peralatan setelah selesai digunakan.
<p>3.</p>	<p>Colostomy bag</p>		<p>menampung feses pada pasien setelah menjalani operasi colon</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Cuci tangan secara menyeluruh memakai sabun dan air. 2 Keluarkan kantong dengan lembut. 3. Periksa kulit. 4. Bersihkan stoma. 5. Gunakan pelindung kulit, semacam bedak stoma.Persiapkan kantong baru.

				Letakkan wafer pada stoma.
4.	Ihsjap/eskap		Kompres dikepala apabila demam, untuk kompres dingin (sedera)	Isi eskap dengan esbatu yang sudah hancur $\frac{3}{4}$ volume, kompres pada areayang diinginkan, jika sudah selesai gantung eskap dengan popisi tutup dibawah untuk dikeringkan.
5.	Kruk		Kruk merupakan tongkat/alat bantu berjalan untuk orang yang memiliki keterbatasan fisik karena cacat atau cedera, biasanya digunakan secara berpasangan untuk mengatur keseimbangan tubuh saat berjalan	Sesuaikan ukuran tongkat kruk, bangun dari duduk menggunkan tongkat kruk, berjalan dengan tongkat penyangga
6.	Pus basin/emesis basin		Fungsinya digunakan untuk tempat menimbun kapas bekas pakai, nanah, muntahan dll	wadah yang melengkung sehingga sesuai erat permukaan yang itu diterapkan, digunakan untuk menerima nanah atau lainnya dari luka selama pembersihan, dan / atau upaya penanganan



<p>7.</p>	<p>Spalk</p>		<p>untuk menahan atau menjaga agar bagian tulang yang patah tidak bergerak</p>	<p>Pasang 2 bidai dari : Ketiak sampai sedikit melewati mata kaki. Lipat paha sampai sedikit melewati mata kaki. Beri bantalan kapas atau kain antara bidai dengan tungkai yang patah. Bila perlu ikat kedua kaki di atas lutut dengan pembalut untuk mengurangi pergerakan. Bawa korban ke rumah sakit.</p>
<p>8.</p>	<p>Tapelhoed/nipple shield</p>		<p>Memiliki bentuk menyerupai puting dan berwarna bening, <i>nipple shield</i> salah satunya banyak dipakai para bunda dengan bayi prematur. Ya, bayi prematur sering kali mengalami kesulitan pada proses perlekatan</p>	<p>Pertama-tama, bilas nipple shield yang telah digunakan dengan air dingin. Setelah selesai dengan bilasan pertama, cuci nipple shield menggunakan air sabun panas. Hilangkan semua residu susu yang tersisa pada nipple shield dan bilas dengan air hingga bersih. Keringkan nipple shield di udara terbuka atau keringkan dengan handuk kertas bersih. Perhatikan jangan sampai penyambung puting ini kotor ketika dikeringkan Simpan nipple shield dalam wadah kering yang bersih dan memiliki penutup. Cuci bersih wadah</p>



			<p>penyimpanan nipple shield setiap hari.</p> <p>Penyambung puting ini harus disimpan di tempat yang bersih dan aman untuk digunakan kembali lain waktu.</p>
9.	Tongkat pyramide/elbow		<p>Tongkat siku atau tongkat elbow merupakan alat bantu jalan yang berfungsi untuk menompang tubuh waktu berdiri ataupun jalan. Tongkat ini sangat ringan sehingga nyaman untuk digunakan. Terbuat dari bahan aluminium sehingga ringan untuk digunakan serta tongkat yang bisa diatur tinggi rendahnya sesuai kebutuhan.</p> <p>Untuk memulai berjalan, posisikan tongkat di depan Anda dan melangkah dengan kaki yang cedera. Lanjutkan dengan kaki yang sehat. Saat naik, pegang tongkat di sisi yang berlawanan dengan sisi kaki yang cedera. Pegang pegangan tangga, mulailah melangkah dengan kaki yang sehat, lanjutkan dengan kaki yang sakit.</p>





10.	Urinal		Penampung urine khusus pria	Posisikan alat kelamin ke dalam wadah, gunakan untuk menampung urin
11.	Walker		alat bantu jalan yang memiliki dua gagang sebagai tempat pegangan serta empat kaki sebagai penumpu.	<p>Posisikan walker sekitar satu langkah di depan Anda. Pegang bagian atas walker dengan kedua tangan dan langkahkan kaki yang cedera ke bagian tengah walker, jangan terlalu jauh ke depan.</p> <p>Tekan pegangan walker saat Anda melangkahkan kaki yang sehat hingga sejajar dengan kaki yang cedera/sakit.</p>
12.	Warm waterzak		alat kompres yang diisi air panas yang dapat digunakan untuk menghangatkan bagian tubuh	masukkan air panas ke dalam warm water zak, dan tempelkan pada bagian tubuh yang sakit



13.	Windring/air cushion		<p>Alat ini digunakan sebagai alas duduk penderita ambeien/ wasir dan penderita cedera punggung agar lebih nyaman saat duduk.</p>	<p>menaruh windring diatas tempat duduk sebagai alas duduk.</p>
-----	----------------------	--	---	---


(3) ALKES TINDAKAN MEDIS


No	Alkes tindakan medis	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Ballon/folley cathether		<p>untuk pengambilan urine dalam sistem tertutup, bebas dari udara dan polusi sekitarnya. Folley catheter ini biasanya digunakan oleh wanita dan laki-laki.</p>	<p>Dengan memasukkan alat kedalam alat genital laki-laki maupun wanita.</p>
2.	Condom cathether		<p>Alat drainase urine eksternal yang mudah untuk digunakan dan aman untuk mengalirkan urine pada klien pria. Kondom kateter ini lunak, berupa selaput</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekatkan alat-alat ke tempat tidur pasien 2. Tutup jendela dan pintu/pasang sampiran 3. Cuci tangan 4. Pasang selimut ekstra 5. Pasang pengalas di bawah bokong pasien



			<p>karet yang lembut yang disarungkan ke penis, dan cocok untuk klien inkontinensia atau koma yang masih mempunyai kemampuan mengosongkan kandung kemih spontan dan komplit. Kateter ini tersedia dalam jenis indwelling (foley) karena drainase dipertahankan dengan sedikit risiko terhadap infeksi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 6. Lepaskan pakaian bawah pasien 7. Atur posisi dorsal recumbent (M Shape) 8. Pakai sarung tangan 9. Bersihkan penis dengan sabun dan air lalu keringkan dengan handuk 10. Bersihkan penis 11. Pasang kondom kateter dan ikatan perekat/plesternya yang ada pada kondom ke bagian pangkal penis 12. Hubungkan ujung kondom kateter dengan kantong urine 13. Atur posisi pasien 14. Angkat pengalas 15. Ganti selimut ekstra dengan selimut pasien 16. Rapikan alat-alat dan kembalikan ke tempatnya 17. Cuci tangan 18. Buka sampiran/pintu/jendela 19. Observasi keadaan pasien 20. Catat tindakan yang dilakukan dan hasil tindakan
3.	Disposable syringe		<p>Digunakan untuk memasukkan cairan obat ke dalam tubuh.</p>	<p>pasangkan jarum dengan barrel Syringe putar searah jarum jam tarik tutup jarum Syringe siap digunakan</p>



<p>4.</p>	<p>Endotracheal</p>		<p>prosedur medis di mana tabung ditempatkan ke tenggorokan (trakea) melalui mulut atau hidung. Dalam kebanyakan situasi darurat, itu ditempatkan melalui mulut.</p>	<p>Memberikan obat bius Memasukan tabung endotracheal ke batang tengorokan menghubungkan tabung endotracheal dengan ventilator</p>
<p>5.</p>	<p>Enema syringe</p>		<p>Untuk membersihkan lubang dubur sehingga saluran pengeluaran kotoran Anda lebih bersih.</p>	<p>Cuci tangan dan pakai sarung tangan dengan tepat untuk mencegah infeksi. Oleskan cairan pelumas pada ujung selang enema atau rectal tube. Masukkan secara perlahan selang enema atau rectal tube ke dalam lubang anus dengan melebarkan pantat, sehingga selang enema dapat masuk secara sempurna dan rasa nyeri minimal.</p>
<p>6.</p>	<p>Feeding syringe</p>		<p>untuk memasukkan makanan pada pasien</p>	<p>Isi feeding syringe dengan makanan yang sudah si haluskan. Lalu masukan ke dalam mulut pasien perlahan</p>
<p>7.</p>	<p>Feeding tube</p>		<p>untuk mengatasi masalah pemberian nutrisi pada pasien yang mengalami</p>	<p>Dimasukkan ke dalam mulut atau hidung, turun ke tenggorokan, lalu menuju ke kerongkongan, dan ujungnya diletakkan di perut (tabung G) atau tengah usus kecil</p>

			kesulitan menelan ataupun menolak untuk makan	(tabung J).
8.	Gliserin syringe		untuk memasukkan cairan gliserin ke dalam poros usus, jadi merangsang peristaltic usus sehingga pasien dapat buang air besar dan juga digunakan untuk persiapan operasi.	Letakkan bedpan dibawah anus, lalu masukkan gliserin ke anus secara perlahan dengan tangan kiri mengangkan anus dan tangan kanan memasukkan gliserin ke dalam anus.
9.	Gloves/handschoen		memiliki fungsi untuk melindungi tangan	Langkah langkah menggunakan handscoon <ol style="list-style-type: none"> 1. Melepas semua benda yang menempel pada pergelangan tangan 2. Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun lalu dikeringkan 3. Pastikan kuku jari tidak ada yang panjang saat menggunakan sarung tangan, agar sarung tangan tidak robek 4. Usahakan tidak menyentuh bagian dalam saat mengenakan sarung tangan 5. Usahakan mengenakan sarung tangan pada tangan kanan terlebih dahulu, lalu dilanjutkan memakai pada tangan kiri 6. Lakukan pemakaian dengan hati-hati, jangan sampai bagian dalam sarung tangan tersentuh benda atau alat lain.




<p>10.</p>	<p>Infusion set dewasa</p>		<p>Untuk memberikan cairan infus ke dalam tubuh pasien melalui intravena untuk memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit serta sebagai tindakan pengobatan dan pemberian makanan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mencuci tangan 2.Memberitahu tindakan yang akan dilakukan 3.Mengisi selang infus 4.Membuka plastic infus set dengan benar 5.Tetap melindungi ujung selang steril 6.Menggantungkan infus set dengan cairan infus dengan posisi cairan infus mengarah keatas 7.Menggantung cairan infus di standar cairan infus 8.Mengisi cairan infus set dengan cara menekan (tapi jangan sampai terendam) 9.Mengisi selang infus dengan cairan yang benar 10.Menutup ujung selang dan tutup dengan mempertahankan kesterilan 11.Cek adanya udara dalam selang 12.Pakai sarung tangan bila perlu 13.Memilih posisi yang tepat untuk memasang infus 14.Meletakkan perlak dan pengalas 15.Memilih vena yang tepat dan benar 16.Memasang tourniquet 17.Deninfeksi vena dengan alcohol dari atas kebawah dengan sekali hapus 18.Buka abocath apakah ada kerusakan atau tidak 19.Menusukan abocath pada vena yang telah dipilih 20.Memperhatikan adanya darah dalam kompartemen darah dalam abocath
------------	----------------------------	--	--	---


				<p>21. Tourniquet di cabut 22. Menyambungkan dengan ujung selang yang telah terlebih dahulu dikeluarkan cairannya sedikit, dan sambil dibiarkan menetes sedikit 23. Memberikan plester pada ujung abocath tapi tidak menyentuh area penusukan untuk fiksasi 24. Membalut dengan kassa betadinsteril dan menutupnya dengan kassa steril kering 25. Memberi plester dengan benar dan mempertahankan keamanan abocath agar tidak tercabut 26. Mengatur cairan tetesan infus sesuai kebutuhan pasien 27. Alat-alat di bereskan dan perhatikan bagaimana respon pasien 28. Perawat kembali cuci tangan 29. Catat tindakan yang dilakukan</p>
11.	Infusion set pediatrik		<p>Set infus adalah peralatan medis untuk memberikan cairan infus ke dalam tubuh untuk memenuhi kebutuhan cairan pada pasien.</p>	<p>Usap tangan pasien anak/ bayi dengan menggunakan alkohol swab, lalu cari intravena nya untuk dipasang selang infus</p>



<p>12.</p>	<p>Insulin syringe</p>		<p>Suntik insulin digunakan untuk mengontrol gula darah pada penderita diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Cara kerja insulin buatan ini hampir sama dengan hormon insulin dalam tubuh, yaitu mengendalikan gula darah dengan mengolahnya menjadi energi. Insulin juga dapat mencegah organ hati memproduksi gula berlebihan.</p>	<p>Cubit kulit yang akan disuntik , bersihkan menggunakan tisu alkohol, masukkan jarum suntik dengan posisi 90°, kemudian dorong pompa suntik hingga semua dosis insulin masuk ke dalam tubuh, lalu saat selesai tarik jarum suntik sebelum melepas cubitan.</p>
<p>13.</p>	<p>Intra vena catheter</p>		<p>kateter intra vena ini berlaku sebagai vena tambahan (perpanjangan vena) untuk pengobatan IV / Intra Vena jangka panjang atau lebih dari 48 jam.</p>	<p>Menusukkan IV catheter ke vena menggunakan jarum yang menghadap ke jantung. Memastikan jarum IV telah benar-benar masuk ke vena. Menyambungkan jarum IV yang telah ditusuk ke selang infus. Menutup area insersi menggunakan kassa kering yang steril kemudian diberikan plester.</p>


<p>14.</p>	<p>Masker oksigen</p>		<p>untuk pemberian terapi oksigenasi bagi pasien yang mengalami kekurangan kadar oksigen dalam darah maupun adanya indikasi dan kondisi medis tertentu. Penggunaan masker oksigen ini dapat mengatur seberapa banyak pasien mendapatkan terapi oksigen murni berdasarkan jenis jenis masker yang di gunakan</p>	<p>Pastikan sudah terpasang selang ke sumber oksigen, pastikan kantong reservoir mengembang, dan pastikan terdapat katup satu arah berfungsi baik, ubah aliran O₂ menjadi 10-15 L/menit dan letakkan masker oksigen pada wadah pasien menutupi hidung dan mulut</p>
<p>15.</p>	<p>Masker nebulizer anak-anak</p>		<p>Digunakan untuk mengubah obat cair menjadi uap agar lebih mudah dihirup oleh paru-paru.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cuci tangan Anda sebelum memulai perawatan. 2. Pastikan peralatan nebulizer bersih dan steril. 3. Masukkan obat ke dalam tabung nebulizer. Pastikan ia sudah dalam bentuk cair dan cocok untuk jenis nebulizer Anda. 4. Pasangkan selang penyalur obat terpasang dengan baik di kedua ujungnya; satu di tabung obat dan satunya lagi di ujung alat hirup.




				<ol style="list-style-type: none"> 5. Dudukkan anak tegak di pangkuan Anda agar ia bisa menarik napas lebih dalam sehingga obat dapat terhirup ke seluruh bagian paru-parunya. 6. Pasangkan masker ke wajah anak dan pastikan menutupi hidung dan mulutnya. 7. Nyalakan mesin nebulizer. 8. Selama obat tersalurkan lewat selang, pastikan Anda tetap memegang masker di wajah anak agar tidak ada uap obat yang keluar. 9. Selesaikan terapi ketika uap sudah semakin sedikit dan obat cair dalam tabungnya juga sudah habis. 10. Lepaskan masker dari wajah anak. 11. Bersihkan dan sterilkan nebulizer setiap habis pakai.
16.	Masker nebulizer dewasa		<p>Digunakan untuk mengubah obat cair menjadi uap agar lebih mudah dihirup oleh paru-paru.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masukkan obat ke wadah atau cangkir obat pada nebulizer. Saat memasukkan obat, pastikan dosis yang diberikan sesuai anjuran atau resep dokter. 2. Sambungkan masker ke cangkir nebulizer. 3. Pasang selang penyambung ke kompresor dan cangkir nebulizer. 4. Saat alat sudah siap, nyalakan mesin kompresor. Jika berfungsi normal, alat akan mengeluarkan kabut atau uap yang berisi obat.



17.	Metal cathether		<p>digunakan untuk mengatasi distensi kandung kemih dan pengumpulan spesimen urin</p>	<p>Alat ini biasanya untuk mengeluarkan kencing, dengan memasukkan metal cateter ke dalam kelamin lalu tarik ujung bulat metal cateter agar bisa mengeluarkan kencing</p>
18.	Mucus extractor		<p>alat kesehatan bayi yang digunakan untuk menghisap lendir yang ada pada jalur / aliran pernafasan pada bayi.</p>	<p>memasukan selang yang tidak ada tonjolannya kedalam hidung atau mulut, kemudian ditarik sambil dihisap, Digunakan pula untuk hisap lendir bayi waktu baru lahir.</p>
19.	Nasal gastric tube		<p>untuk menyuplai makanan dan minuman pada pasien yang tidak memungkinkan untuk menelan, akibat kondisi medis tertentu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien akan diminta untuk duduk tegak. • Dokter akan melakukan pemeriksaan pada rongga hidung untuk memastikan tidak ada kelainan sebelum memasang selang makan. • Dokter spesialis anestesi akan memberikan obat bius lokal. Obat ini akan menyebabkan mati rasa pada area hidung dan kerongkongan untuk sementara, namun pasien tetap sadar. • Dokter kemudian mengoleskan jel pada selang NGT. Selain untuk mempermudah masuknya selang saat didorong dari hidung menuju



				<p>lambung, jel ini dapat mengurangi nyeri pada hidung dan kerongkongan pasien.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketika selang NGT didorong melewati lubang hidung menuju lambung, pasien akan diminta membantu masuknya selang dengan melakukan gerakan menelan. • Setelah selang sampai di lambung, dokter akan melakukan rontgen dada untuk memastikan posisi selang sudah tepat.
20.	Nebulizer set		<p>alat untuk mengubah obat dalam bentuk cairan menjadi uap yang dihirup. Pengobatan yang memanfaatkan alat ini biasanya diberikan kepada penderita gangguan pernapasan, seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), saat mengalami sesak napas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Awali dengan cuci tangan. 2. Tambahkan obat ke dalam cangkirnya, sesuai dengan resep dokter. 3. Pasang semua bagian sesuai dengan instruksi. 4. Nyalakan nebulizer, bisa dengan mencolok listrik terlebih dahulu atau lainnya. 5. Saat digunakan, pegang corong dan cangkir obat, agar diuap seluruhnya.



<p>21.</p>	<p>Needle</p>		<p>untuk memindahkan sejumlah cairan sebagai alat untuk menembus kulit agar obat dalam sediaan cair dapat dimasukkan ke dalam pembuluh darah atau jaringan kulit tersebut.</p>	<p>Buka bungkus jarum suntik. Masukkan ke dalam spuit, dan siap digunakan</p>
<p>22.</p>	<p>Nelaton cathether</p>		<p>tabung/pipa/selang (<i>tube</i>) fleksibel yang digunakan untuk drainase urine jangka pendek. Tidak seperti <i>Foley catheter</i>, <i>Nelaton catheter</i> tidak mempunyai balon pada ujungnya dan dengan demikian tidak dapat tinggal tetap tanpa bantuan. <i>Nelaton catheter</i> dapat dimasukkan ke dalam kandung kemih melalui uretra atau Mitrofanoff.</p>	<p>Selang kateter diberi pelumas untuk memudahkan ketika dimasukkan ke dalam sel uretra, dimasukkan hingga mencapai kandung kemih, setelah itu pasien sudah bisa kencing menggunakan selang kateter</p>

			Lubrikasi dan anestesi lokal sifatnya opsional/pilihan.	
23.	Oxygen nasal canula		<p>memberikan oksigen langsung ke hidung melalui dua cabang kecil untuk mendukung pernafasan yang terganggu.</p>	<p><u>Cuci tangan</u></p> <p>Posisikan pasien untuk duduk atau setengah duduk bila memungkinkan</p> <p>Hubungkan selang kanul ke sumber oksigen</p> <p>Nyalakan aliran oksigen sesuai dosis yang dibutuhkan pasien, pastikan ada aliran oksigen yang keluar melalui ujung kanul dengan meletakkan tangan pemeriksa di depan prong</p> <p>Posisikan <i>prong</i> dari kanul hidung agar melengkung ke bawah, kemudian insersi <i>prong</i> ke dalam rongga hidung (Lihat gambar di bawah)</p> <p>Posisikan kedua sisi selang di atas dan belakang telinga</p> <p>Fiksasi nasal kanul pada bagian bawah dagu pasien dengan mengencangkan klip agar tidak mudah terlepas</p>



<p>24.</p>	<p>Rectal tube</p>		<p>alat medis yang dimasukkan melalui dubur / anus (rektum) dan dipakai pada usus besar. Alat ini membantu mengeluarkan udara dari usus sehingga dapat mengurangi ketegangan perut, membantu mengeluarkan faeces cair</p>	<p>Pasang alas bokong, memasang plastik diujung rectal tube dan ikat dengan karet, olesi dengan pelumas, buka anus dengan tangan kiri, masukkan rectal tube perlahan, memfiksasi rectal tube dengan menhilang</p>
<p>25.</p>	<p>Spinal needle</p>		<p>untuk penyuntikan cairan anestesi.</p>	<p>Masukkan spinal needle ke dalam spuit lalu masukkan obat/cairan, suntikan kedalam tubuh</p>
<p>26.</p>	<p>Stomach tube</p>		<p>Untuk nutrisi/ pemberian cairan makanan melalui mulut atau hidung.</p>	<p>Masukkan selang ke dalam tubuh, dengan melapisi pelumas dulu, pasang selang dengan stomach tube digunakan untuk membilas isi perut.</p>





<p>27.</p>	<p>Suction cathether</p>		<p><i>Suction catheter</i> adalah selang/pipa panjang dan fleksibel yang dilekatkan satu ujungnya pada pipa nafas (<i>endotracheal</i> atau <i>tracheostomy tube</i>). Sedangkan ujung satunya lagi terhubung dengan <i>collection container (suction canister)</i> dan sebuah perangkat yang membangkitkan <i>suction</i>.</p>	<p>Hidupkan mesin suction, sambungkan cateter dengan tube suction, masukkan suction cateter ke dalam tubetrakea tutup lubang cateter dengan ibu jari, gulung kateter diantara ibu jari dan telunjuk agar bisa mengeluarkan lendir.</p>
<p>28.</p>	<p>Suction connecting</p>		<p>sebagai konektor antara dua tabung yang terdapat pada mesin suction</p>	<p>Selang pernghubung yang dihubungkan dengan suction chateter</p>





<p>29.</p>	<p>Tranfusi set</p>		<p>untuk memasukan darah melalui pembuluh darah vena. Pemberian transfusi darah biasanya digunakan untuk memenuhi volume sirkulasi darah, memperbaiki kadar hemoglobin dan protein serum. Sesuai dengan standar ISO 1135-4.</p>	<p>Pasang selang ke tangan pasien, sebelumnya diusap dengan alkohol swab, cari intervena pasien lalu pasang tranfusi set.</p>
<p>30.</p>	<p>Tuberculin syringe</p>		<p>sebuah alat yang digunakan oleh profesional medis untuk mentransfer cairan kedalam atau keluar tubuh. Jarum suntik terbuat dari jarum yang tengahnya berlubang yang menempel pada tabung dan sebuah plunger. Saat pegangan plunger di tarik, cairan akan terhisap ke dalam tabung.</p>	<p>Masukkan cairan napza ke alat suntik , pastikan gelembung udara di alat suntik tidak ada. Suntikan dengan tegakan lurus dan dorong pelan stik di tabung ke dalam</p>



31.	Urine bag		<p>untuk menampung urine yang dihubungkan dengan Balloon Cathether/ Foley Cathether untuk mengeluarkan/ pengambilan urine pada sistem tertutup</p>	<p>Dengan menyambungkan urin bag dengan kateter</p>
32.	Wing needle		<p>Wing needle merupakan jarum suntik yang disertai dengan sayap di kedua sisinya. Jarum ini digunakan untuk memudahkan obat yang dimasukkan melalui akses intravena atau pembuluh darah. Salah satu obat yang dapat dimasukkan yaitu infus vitamin sehingga dapat masuk lebih cepat ke dalam tubuh</p>	<p>Tentukan vena pasien, masukkan cairan kedalam spuit, pasang wing needle, tusuk bagian yang akan diambil darahnya.</p>



(4) ALAT-ALAT BEDAH



No	Alat-alat bedah	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Arterie klem/artery forceps		<p>untuk meng-klem/ menjepit jaringan tubuh maupun pembuluh darah untuk menghentikan pendarahan dalam operasi serta fungsi-fungsi lainnya.</p>	<p>Pegang arteri klem dengan jari lalu capit benda yang akan dipakai</p>
2.	Bandage scissors		<p>gunting berujung sudut dengan ujung yang tumpul. Gunting ini memiliki kepala kecil/tonjolan pada ujungnya yang bermanfaat untuk memudahkan dalam memotong verban, plester, kasa kapas dan bahan lainnya yang biasa digunakan dalam proses operasi, pembedahan atau tindakan medis lainnya</p>	<p>Siapkan perban dan bandage scissors lalu gunting perban dengan bandage scissors sesuai kebutuhan</p>



<p>3.</p>	<p>Benang jahit catgut chromic</p>		<p>bedah umum, dan pembedahan yang mendekati jaringan lunak ataupun ligasi.</p>	<p>Penggunaannya pada bagian dermis dan subkutan untuk nantinya diabsorpsi tubuh melalui degradasi enzimatik ataupun hidrolisis.</p>
<p>4.</p>	<p>Benang jahit catgut plain</p>		<p>jahitan bedah Murni yang secara alami terdegradasi oleh enzim proteolitik tubuh sendiri dg cepat.</p>	<p>Masukkan benang jahit ke jarum bedahl, bius pasien dulu sebelum melakukan</p>
<p>5.</p>	<p>Benang jahit silk</p>		<p>penjahitan luka akibat tindakan bedah minor, luka terbuka akibat kecelakaan dan sebagainya.</p>	<p>Masukkan benang jahit ke jarum bedahl, bius pasien dulu sebelum melakukan</p>
<p>6.</p>	<p>Bisturi</p>		<p>untuk menyayat berbagai organ atau bagian tubuh manusia. Mata pisau disesuaikan dengan bagian tubuh yang akan disayat.</p>	<p>Sama seperti memegang pisau pada umumnya, mata pisau diarahkan ke bawah (pada objek) atau dengan posisi mata pisau dimiringkan ke arah objek.</p>



7.	Forceps/pinset anatomis		<p>untuk menjepit kasa sewaktu menekan luka, menjepit jaringan yang tipis dan lunak.</p>	<p>Tekan pada bagian tengah (bagian yang berisi-garis) dengan menggunakan jari</p>
8.	Forceps/pinset cilia		<p>untuk menjepit/ mencabut rambut</p>	<p>Pasien akan dianstesi dulu , lalu pasang kateter urine untuk mengosongkan kandung kemih. Dokter akan membuat sayatan dijalan lahir untuk mempermudah proses mengeluarkan bayi dengan forceps</p>
9.	Forceps/pinset sirugis		<p>adalah untuk menjepit jaringan pada waktu diseksi dan penjahitan luka, memberi tanda pada kulit sebelum memulai insisi.</p>	<p>Tekan pada bagian tengah (bagian yang bergerigi/bergaris-garis) dengan menggunakan tiga jari ; ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah (sama halnya seperti memegang sumpit)</p>
10	Forceps/pinset splinter	 <p>ONEMED Pinset Splinter 12cm</p>	<p>untuk mengadaptasi tepi-tepi luka (mencegah overlapping).</p>	<p>Tekan pada bagian tengah (bagian yang bergerigi/bergaris-garis) dengan menggunakan tiga jari ; ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah (sama halnya seperti memegang sumpit)</p>
11	Gunting bedah mayo		<p>Gunting operasi Mayo 14 cm adalah salah satu instrument</p>	<p>Selama pembedahan bila ada jaringan atau balutan yang tidak sesuai maka bisa dipotong dengan gunting bedah mayo</p>


			<p>yang digunakan dalam instrument bedah (khitan , operasi besar dan kecil, bersihkan luka dll) / obgyn yang digunakan untuk untuk memotong jaringan (otot, fascia, dll) dan menggunting balutan</p>	
12	Gunting bedah metzenbaum		<p>Gunting operasi Metzenbaum 17.5 cm adalah salah satu instrument berupa Gunting yang digunakan dalam instrument bedah (khitan , bersihkan luka dll) / obgyn yang digunakan untuk untuk menggunting benang, menggunting jaringan dan menggunting balutan</p>	<p>Pegang gunting dengan tangan kanan , lalu gunting perban atau bagian tubuh yang akan dilakukan pembedahan</p>

<p>13 .</p>	<p>Gunting bedah runcing</p>		<p>untuk hemostatis jaringan tipis dan lunak. Klem arteri bermanfaat untuk menghentikan pendarahan pembuluh darah kecil dan menggenggam jaringan lainnya dengan tepat.</p>	<p>Memegang gunting dengan ibu jari dan jari telunjuk untuk memotong organ tubuh</p>
<p>14 .</p>	<p>Gunting tali pusar</p>		<p>Gunting tali pusat adalah salah satu instrument dalam bidang obgyn atau kebidanan yang digunakan untuk memotong tali pusat bayi baru lahir. Gunting ini berbentuk gunting yang melengkung yang memudahkan para dokter atau bidan untuk memotong tali pusat bayi baru lahir.</p>	<p>Genggam alat dengan tangan kanan lalu potong tali pusar pada bayi yang baru lahir</p>




<p>15</p>	<p>Hecting set</p>		<p>satu set instrumen yang digunakan untuk menjahit atau merawat luka. Hecting set juga sering disebut set alat rawat luka. Hecting set ini terdiri dari alat / instrumen rawat luka yang lebih lengkap, sehingga sangat praktis dan ekonomis.</p>	<p>Membantu saat benang jahit keluar dan masuk ke dalam kulit</p>
<p>16</p>	<p>Jarum jahit</p>		<p>Jarum jahit sangat berguna dalam tindakan medis / operasi. Fungsi utama jarum adalah untuk menutupi goresan, sayatan, atau luka supaya tidak infeksi dan semakin parah. Jarum jahit yang kami jual ini terdapat 2 jenis kulit dan otot, untuk jenis otot jarum jahit yang digunakan berbentuk</p>	<p>Anestesi dulu, pembersihan luka, jahit luka dengan jarum jahit yang sesuai yang akan digunakan</p>

			<p>berpenampang bulat (round nald).</p>	
<p>17</p>	<p>Klem mosquito</p>		<p>Mosquito Artery Forceps adalah perangkat khusus yang digunakan ahli bedah untuk menjepit pembuluh darah, terutama arteri kecil, selama berbagai skenario pembedahan. Instrumen ini juga berguna untuk menangkap bahan sekali pakai, tisu, dan jahitan.</p>	<p>Jepit jaringan dengan memegang klem dengan tangan kanan (dominan)</p>
<p>18</p>	<p>Klem tali pusat/umbilical cord clem</p>		<p>menjepit tali pusat yang baru dipotong dari plasenta atau ari-ari agar tidak terjadi pendarahan di pusar pada bayi yang baru lahir.</p>	<p>Jepit tali pusar dengan klemtasi pusar pada bayi yang baru lahir</p>

<p>19</p>	<p>Needle hoolders</p>		<p>Needle Holder / Nald voeder YAMACO 14 cm adalah instrumen yang digunakan untuk menjepit atau memegang needle hecting (jarum jahit) pada penjahitan luka saat melakukan operasi maupun tindakan medis lainnya. Tindakan medis tersebut antara lain khitan, penjahitan luka akibat kecelakaan, robekan jalan lahir dan sebagainya. Nedle holder ini dapat digunakan untuk memegang jarum otot maupun jarum kulit.</p>	<p>Sama halnya seperti memegang klem atau gunting.</p>
<p>20</p>	<p>Peritoneum forceps</p>		<p>Magill forceps adalah alat yang digunakan untuk memasang intubasi atau alat bantu saluran nafas atau</p>	<p>Genggam peritoneum dengan tangan kanan, jepit jaringan dengan peritoneum</p>


			mengambil benda asing dari saluran napas bagian atas korban/pasien	
21	Skalpel		Sebagai Alat Operasi. Skalpel merupakan silet untuk mengiris jaringan yang terdiri dari batang skalpel dan pisau skalpel (blade). Skalpel berbentuk menyerupai mata pisau kecil dan berfungsi menginsisi kulit dan memotong jaringan secara tajam.	Tentukan lokasi tubuh /bagian yang akan dilakukan pembedahan bedak bagian atau dengan skalpel



(5) Disinfektan

No	Disinfektan	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Alkohol 70%		sebagai antiseptik (membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme), untuk membersihkan luka dan pembersih alat-alat medis.	Basuh luka dengan alkohol 70% dengan hati-hati
2.	Alkohol swab		untuk membersihkan luka dan pembersih alat-alat medis.	-siapkan alat yang akan dibersihkan sebelum digunakan, lap dengan alkohol swab -Sebelum disuntik biasanya kulit dilap dengan alkohol swab agar bersih dari kuman
3.	H2O2 3%		digunakan sebagai komposisi berbagai produk pembersih rumah tangga, cat, atau produk kecantikan, termasuk produk bleaching rambut.	Bersihkan luka dengan alkohol lalu obati luka dengan hidrogen peroksida dengan kapas

4.	Povidone iodine		antiseptik yang mampu merusak sel kuman agar mati dan dapat mencegah terjadinya infeksi pada luka, agar tidak menimbulkan gangguan berbahaya.	Bersihkan luka dengan alkohol lalu obati luka dengan hidrogen peroksida dengan kapas
5.	Rivanol		cairan desinfektan yang digunakan untuk membersihkan luka.	Bersihkan luka dengan alkohol lalu obati luka dengan hidrogen peroksida dengan kapas

(6) APD

No	APD	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Apron		pelindung tubuh untuk melapisi luar gaun yang digunakan oleh petugas kesehatan dari penetrasi cairan infeksius pasien	Sebelum memasuki laboratorium /tempat yang berbahaya kimia, pakai apron terlebih dahulu untuk melindungi diri



<p>2.</p>	<p>Masker</p>		<p>mencegah membran mukosa petugas kesehatan kontak dengan percikan darah atau cairan pasien</p>	<p>Dengan cara melekatkan di kedua telinga atau mengikatnya kebelakang</p>
<p>3.</p>	<p>Masker N95 disposable</p>		<p>sebagai perlindungan pernafasan bagi pemakainya, misalnya untuk mencegah paparan partikel-partikel biologis udara, termasuk bakteri dan virus (mikroorganisme), partikel yang dihasilkan oleh elektrokauter, operasi laser, dan instrumen medis bertenaga lainnya.</p>	<p>Pegang bagian luar masker dan letakkan di bawah dagu, dengan bagian nosepiece/logam berada di bagian hidung. Selanjutnya, tarik karet atas ke bagian kepala atas dan karet bagian bawah ditarik ke arah belakang kepala. Sesuaikan nosepiece sesuai bentuk hidung Anda dengan cara menekan bagian logam.</p>



4.	Non woven/surgical cap		<p>Topi/ cap/ tutup kepala bahan non woven dengan bentuk sudah siap pakai (=nurse cap). Menutup dan melindungi rambut dan mencegah jatuhnya keringat</p>	<p>Sebelum memasuki laboratorium /tempat yang berbahan kimia, pakai apron terlebih dahulu untuk melindungi diri</p>
5.	Sarung tangan		<p>Agar selama melakukan medis tetap steril</p>	<p>Siapkan gloves, pasang di kedua tangan</p>
6.	Shoe cover		<p>Melindungi kaki dari paparan virus</p>	<p>Pastikan telah memakai sepatu/sandal yang bersih, pakaikan shoe cover dengan benar</p>


7.	Kaca mata google		Melindungi mata dari kotoran, debu maupun bakteri	Sebelum melakukan tindakan operasi pasang kaca mata google di mata dengan posisi nyaman
----	------------------	--	---	---



(7) ALKES UNTUK DIAGNOSA


No	Alkes untuk diagnosa	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Anaroid spygmomanometer		Tensimeter atau Sphygmomanometer adalah alat ukur yang dibuat untuk mengukur tekanan darah	Siapkan spygmomanometer, pasang manset, tempatkan stetoskop, pompa manset,periksa tekanan darah sistolik dan diastolik, baca hasil tekanan darah
2.	Electrical sphygmomanometer		Tensimeter atau Sphygmomanometer adalah alat ukur yang dibuat untuk mengukur tekanan darah	Gunakan manset pada lengan atas pastikan ujung selang berada di tengah lengan, kencangkan manset, saat pengukuran duduk tegak dan kaki menapak dilantai




<p>3.</p>	<p>Mercurial sphygmomanometer</p>		<p>Tensimeter atau Sphygmomanometer adalah alat ukur yang dibuat untuk mengukur tekanan darah</p>	<p>Lengan pasien diminta untuk lurus lalu pasang manset di lengan ,pompa sampai selesai</p>
<p>4.</p>	<p>Chart vision Snellen</p>		<p>memeriksa fungsi visual ketajaman mata,</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Orang yang diperiksa berada pada posisi 6 meter atau 20 kaki dari kartu snellen, karena pada jarak ini mata akan melihat benda dalam keadaan istirahat atau tanpa akomodasi; 2. Kartu snellen diletakkan sejajar dengan mata orang yang diperiksa; 3. Pastikan ruang tempat pemeriksaan cukup cahaya (tidak gelap dan tidak silau); 4. Orang yang diperiksa tidak buta huruf (tau membaca huruf), jika yang bersangkutan buta huruf makan dapat menggunakan Echart atau menggunakan Cincin Landolt. 5. Orang yang diperiksa harus berumur > 5 Tahun. 6. Tidak melakukan pemeriksaan sendiri, artinya harus ada paling tidak 2 orang yaitu orang yang diperiksa dan pemeriksa yang bertugas mengarahkan orang yang diperiksa.



				7. Pemeriksa berdiri di samping kartu snellen.
5.	Ear speculum		<p>Pemeriksaan dalam telinga pasien b. Pemeriksaan pupil pada mata pasien c. Pemeriksaan mulut pasien Page 9 Otoscope / Ear Spekulum Alat yang digunakan untuk memeriksa atau melihat bagian dalam telinga hingga telinga tengah</p>	<p>Spekulum di fixasi dengan ibu jari dan jari telunjuk, daun telinga dijepit dg menggunakan jari tengah & jari manis tangan kiri, sebaliknya dilakukan apabila ingin memeriksa telinga kiri</p>
6.	Ear thermometer		<p>mengukur suhu tubuh seseorang melalui telinga</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tarik bagian atas daun telinga ke arah atas dan belakang. • Masukkan ujung termometer ke dalam saluran telinga secara perlahan, dan arahkan menuju gendang telinga. Sensor harus mengarah ke saluran telinga, bukan ke dinding telinga. • Setelah termometer berada di posisinya, hidupkan dan tunggu muncul tanda yang mengindikasikan pemindaian selesai.

				<ul style="list-style-type: none"> Lepaskan termometer dari telinga dan baca suhunya.
7.	Gelang pasien		<p>Sebagai alat untuk memastikan kebenaran identitas diri pasien untuk mencegah kesalahan dalam pelayanan kepada pasien.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Siapkan gelang identitas pasien sesuai jenis kelamin (biru untuk pasien laki-laki, merah muda untuk pasien perempuan). Tempelkan label pasien pada gelang identitas. Ucapkan salam, perkenalkan diri dan jelaskan maksud dan tujuan pemasangan gelang identitas kepada pasien, gelang identitas pada pergelangan tangan kiri pasien bila memang memungkinkan. Atau pada sisi lain sesuai dengan kondisi masing-masing pasien, sesuai dengan Panduan. Informasikan kepada pasien dan atau keluarga bahwa gelang identitas ini harus selalu dipakai hingga pasien diperbolehkan pulang. “ Ibu/Bapak, gelang identitas ini harus selalu dipakai selama masih dalam masa perawatan di rawat inap RS Baptis Batu. “ Ucapkan terimakasih dan sampaikan “Semoga lekas sembuh”

<p>8.</p>	<p>Head lamp</p>		<p>Head lamp atau lampu senter kepala adalah alat bantu penerangan yang digunakan di kepala yang berfungsi sebagai lampu periksa pasien. Alat ini biasanya digunakan di bagian THT, IGD, ruang bedah (OK) dan poliklinik umum. Head lamp ini memiliki intensitas cahaya yang lebih terang daripada bohlam biasa</p>	<p>Memasang di kepala sebelum memulai tindakan</p>
<p>9.</p>	<p>Hemometer</p>		<p>alat yang digunakan untuk mengukur kadar hemoglobin seseorang.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertama-tama dengan menggunakan desinfektan berupa kapas alkohol 70% ujung jari pasien dibersihkan untuk menghindari kontaminan dari mikroorganisme. 2. Setelah itu menusuk salah satu ujung jari dengan menggunakan lancet atau autoklik. 3. Langkah selanjutnya adalah mengusap darah pertama yang keluar pada ujung jari dengan menggunakan tisu.




				<ol style="list-style-type: none"> 4. Kemudian tetes darah berikutnya dihisap dengan menggunakan pipet sahli sampai batas 20 mikroliter. 5. Selanjutnya darah dimasukkan kedalam tabung sahli yang sebelumnya telah diisi dengan HCL 0,1 N sampai tanda 2. Pada proses ini pipet dibilas dengan jalan menghisap dan mengeluarkan HCL dari dalam pipet sebanyak tiga kali. 6. Kemudian menghomogenkan darah dengan HCL menggunakan tangkai pengaduk. 7. Selanjutnya menambahkan tetes demi tetes aquades kedalam tabung sahli sampai warna yang ditampilkan serupa dengan standar sahli. 8. Langkah terakhir adalah membaca hemoglobin dengan membaca tinggi permukaan cairan pada tabung pengukur atau miniskus kemudian dibandingkan dengan standar pembanding.
10	Ishihara's test for colour blindness		Untuk tes buta warna	pasien akan diminta untuk menutup salah satu mata dan melihat gambar yang ada pada kertas tes



<p>11</p>	<p>Laringeal mirror</p>		<p>Laryngeal mirror digunakan untuk dapat melihat dan memeriksa keadaan di dalam tenggorokan, apakah ada kelainan atau tidak.</p>	<p>Cermin dimasukkan ke belakang rongga mulut dengan permukaan cermin menghadap keatas</p>
<p>12</p>	<p>Nasal speculum</p>		<p>untuk memeriksa area rongga hidung pasien.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masukkan jari telunjuk Anda ke dalam lekukan spekulum dan dukung di atas dengan ibu jari. 2. Jari tengah dan jari manis digunakan untuk memanipulasi ujung spekulum. 3. Anda akan bertujuan untuk melihat celah di antara kedua jari ini. 4. Tekan garpu spekulum bersama-sama untuk memungkinkan mereka ditempatkan di dalam lubang hidung dan kemudian kurangi pegangan Anda pada spekulum untuk melebarkan garpu sampai tampilan rongga hidung yang optimal tercapai.
<p>13</p>	<p>Pen needle</p>		<p>jarum suntik untuk penggunaan pena insulin yang digunakan untuk mengendalikan</p>	<p>Lepas penutup insulin pen, kemudian pasang jarum insulin pen di bagian ujungnya.</p>




			kadar gula dalam darah pada penderita Diabetes	
14	Percussion hammer		kepala karet padat berbentuk segitiga yang digunakan untuk memunculkan refleks patela dan refleks miotatik	Pegang pada gagang pegangan oleh dokter, kemudian ayunkan alat ke arah bagian tubuh yang sakit/berkelainan
15	Pulse meter		Untuk memantau tingkat oksigen dalam darah pasien.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cuci tangan hingga bersih sebelum dan sesudah menggunakan oximeter 2. Pastikan kuku dalam kondisi tidak menggunakan cat, kuku palsu, bersih, dan tidak panjang 3. Nyalakan mesin kemudian masukan jari tangan baik itu jari tengah, jari telunjuk, atau ibu jari. Lalu masukan pada oximeter dan tunggu hingga mengeluarkan pengukuran saturasi oksigen hasil pada layar. 4. Setelah tes selesai, lepaskan klip 5. Jangan lupa bersihkan alat dengan alkohol untuk mencegah penyebaran kuman

<p>16 .</p>	<p>Rectum speculum</p>		<p>untuk memeriksa dubur</p>	<p>Cuci tangan, masukkan bagian anoskopke dalam anus, sisipan itu melebarkan anus hingga diameter tabung</p>
<p>17 .</p>	<p>Reflex hamer</p>		<p>untuk memeriksa kemampuan reflesi dari bagian-bagian tertentu tubuh kita, biasanya lutut kita.</p>	<p>dengan cara dipegang pada bagian gagang pegangan oleh dokter yang bersangkutan. Kemudian palu tersebutakan di ayunkan mengarah ke bagian dari tendon yang disinyalir memiliki kelainan.</p>
<p>18 .</p>	<p>Spirometer</p>		<p>alat untuk mengukur aliran udara yang masuk dan keluar dari paru-paru dan dicatat dalam grafik volume perwaktu.</p>	<p>Perasat pertama menilai jumlah udara yang dapat dihirup dan dihembus paru. Melalui corong mulut, orang yang diperiksa diinstruksikan menghirup napas dalam semaksimal mungkin, lalu mengeluarkannya hingga habis. Perasat kedua menilai aliran udara paru.</p>


<p>19</p>	<p>Stethoscope binaural</p>		<p>pemeriksaan kesehatan yang berfungsi untuk mendengar suara internal tubuh, baik suara jantung, paru / pernafasan, suara arteri dan suara pada sistem pencernaan manusia dan hewan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pastikan alat pendengar menghadap ke depan. Jika Anda memakainya menghadap ke belakang, Anda tidak akan bisa mendengar bunyi apa pun.^[5] <input type="checkbox"/> Pastikan alat pendengar memiliki bantalan yang ukurannya pas dan dapat “mengunci” dengan baik di telinga Anda untuk menghindari suara-suara dari lingkungan sekitar. Jika ukurannya tidak pas, biasanya bantalan tersebut dapat dilepas. Kunjungi toko penyedia alat medis untuk membeli bantalan baru.^[6] <input type="checkbox"/> Pada beberapa jenis stetoskop, Anda juga dapat memiringkan atau menekuk gagang alat pendengar ke depan untuk membuatnya pas di telinga
<p>20</p>	<p>Stethoscope monoaural</p>		<p>pemeriksaan kesehatan yang berfungsi untuk mendengar suara internal tubuh, baik suara jantung, paru / pernafasan, suara arteri dan suara pada sistem pencernaan manusia dan hewan</p>	<p>Tempelkan bulat besar diperut ibu lalu gunakan untuk mendengar detak jantung bayi dengan bulatan kecil</p>

<p>21 .</p>	<p>Stopwatch</p>		<p>suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan yang memiliki ketelitian sampai tingkat detik</p>	<p>Stopwatch sesuai yang diinginkan, lalu letakan stopwatch di tempat aman</p>
<p>22 .</p>	<p>Termometer digital</p>		<p>digunakan untuk mengukur suhu tubuh digital melalui mulut, ketiak, atau rektal dengan layar LCD untuk menampilkan hasil pengukuran yang menawarkan akurasi, keamanan dan kecepatan dalam pengukuran temperatur.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nyalakan termometer dengan menekan atau menggeser tombol ON. 2. Masukkan termometer secara perlahan dan hati-hati ke dalam mulut, lipatan ketiak atau liang telinga anak. Untuk pengukuran melalui anus, pastikan sudah memberi cukup pelumas. 3. Biarkan selama 3 sampai 5 menit atau tunggu sampai ada bunyi yang menunjukkan pengukuran suhu sudah selesai dilakukan. 4. Setelah itu, ambil termometer dan baca hasil yang tertera pada layar.
<p>23 .</p>	<p>Termometer oral</p>		<p>berfungsi untuk mengukur suhu melalui organ mulut yang biasa disebut termometer</p>	<p>selipkannya ke ketiak atau mulut. Setelah beberapa saat, butiran air raksa akan bergerak mengisi ruang kosong dalam tabung dan berhenti pada angka yang menunjukkan suhu tubuh.</p>

			<p>manual oral. Termometer ini menggunakan air raksa sebagai media pengukurnya.</p>	
24	Termometer rektal		<p>alat pengukur suhu tubuh digital, yang digunakan dengan memasukkannya ke dalam anus.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Awali dengan Mencuci Tangan 2. Siapkan Termometer 3. Posisikan Tubuh dalam Keadaan Nyaman 4. Masukkan Termometer ke Anus 5. Cabut Termometer dari Anus 6. Catat Hasilnya dan Bersihkan Termometer
25	Timer lab		<p>Pengukur waktu manual, biasa digunakan untuk uji laboratorium, pemakaian dengan memutar jarum jam ke waktu yang ditentukan, setelah waktu habis, timer akan berbunyi</p>	<p>Searah jarum jam hingga ke-angka 55Kemudian diputar balik ke arah waktu sesuai yang diinginkan</p>

<p>26</p>	<p>Tongue depressor</p>		<p>untuk menekan lidah, agar dapat melihat lebih jelas keadaan di dalam tenggorokan, apakah ada kelainan- kelainan, misalnya ada peradangan seperti pharyngitis, amandel, dll</p>	<p>Penggunaan Alat ini dengan cara menekan lidah pasien sehingga keadaan di dalam tenggorokan bisa terlihat dengan jelas.</p>
<p>27</p>	<p>Tourniquet</p>		<p>berfungsi untuk mengontrol aliran darah pada vena atau arteri dengan cara menekan dan melepas dalam rentang waktu tertentu.</p>	<p>tourniquet dipasang pada 3-4 inci di atas tempat tusukan. Jika terlalu dekat dari tempat tusukan, vena dapat kolaps ketika darah terisap ke dalam tabung dan jika terlalu jauh dari tempat tusukan pengambilan darah tidak akan efektif.</p>
<p>28</p>	<p>Vaginal speculum</p>		<p>sebagai alat bantu pembuka vulva dengan tujuan untuk memudahkan pemeriksaan atau tindakan medis.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegang Spekulum Vagina pada bagian Gagangnya, 2. Buka Kunci Baut Spekulum, 3. Masukkan kedalam Vagina, dimana Spekulum masih dalam keadaan tertutup dan dalam keadaan miring. 4. Setelah masuk putar spekulum, 5. Kemudian buka speculum (bagian cocor bebek),

Gresik, 12 April 2023
Dosen Pembimbing,


Apt. Siti Nur Asiyah. M.Farm., Klin
NIDN : 0711088504

Lamongan, 15 April 2023
Pembimbing Lapangan (Apotek L FANS)


Apt. Arief Alayyan Rahman. S.Farm
SIPA : 1055/SIPA/413.III/V/2021



D. SWAMEDIKASI (Diketik)

Buatlah studi kasus setiap harinya dengan katagori obat yang berbeda dan wajib menyelesaikan 20 jenis Obat yang tertera dalam tabel

No	Nama obat	Kategori	Teks percakapan dalam pelayanan	Patient assesment	Pemilihan Obat dan alasannya	Pelayanan informasi obat
1.	Analgetik dan antipiretik	paracetamol ; ibuprofen	TTK : Selamat datang ada yang bisa kami bantu kak? P :gina kak, badan saya agak demam TTK: sudah berapa lama ya kak? P : kurang lebih 2 hari kak TTK : ada alergi obat dan sudah minum apa saja kak? P : saya tidak punya alergi obat kak dan selama 2 hari belum minum obat sama sekali. Cuma saya minumkan teh hangat saja TTK : Baik kak, mohon ditunggu sebentar ya. (TTK mengambil obat pamol) TTK : ini kak ada obat pamol bisa untuk menunukan demam dan aturan pakai 3 x 1 tablet ya kak P : apa bisa untuk pusing ya kak?	W : untuk dewasa 17 tahun W : demam H : kurang lebih 2 hari A : minum teh hangat M : Belum minum obat sama sekali	Obat yang terpilih Pamol tablet Alasannya karena mengandung paracetamol yang menurunkan demam	Indikasi : Meredakan sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot, menurunkan demam dan nyeri paska vaksinasi. Cara penggunaan: 3 x 1 Kapan berhenti: setelah demam turun Kapan harus ke dokter : apabila 3 – 4 har tidak ada perubahan atau demam tambah tinggi ESO yang sering : Mual, muntah,

			<p>TTK : Bisa kak P : yaudah ini aja kak, berapa ya? TTK : 10,000 Kak, mungkin ada tambahn lainnya? P : sementara ini dulu saja kak, terimakasih (sambil memberikan uang)</p>			<p>diare, diaforesis, wajah pucat dan nyeri perut. Cara menyimpan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C</p>
2.	Batuk	<p>gliseril guaiakolat (guafenisin), bromheksin, diphenhidramin, asetilsistein, noskapin</p>	<p>TTK : Selamat datang ada yang bisa kami bantu Pak? P : beli obat batuk kak TTK : untuk batuknya berdahak atau kering ya Pak? P : kayak ada riyaknya kak TTK : batuk berdahak ya Pak, mau sirup atau yang tablet? P : tablet aja kak TTK : baik pak, mohon ditunggu ya (TTK mengambilkan obat roverton) TTK : ini pak ada roverton untuk batuk berdahaknya P : sehari berapa kali ya kak? TTK :sehari 3 x pak dan diminum sesudah makan P : berapa kak? TTK : 4.000 pak</p>	<p>W : Untuk Dewasa 20 tahun W : batu berdahak H : Baru tadi malam A : minum teh dikasih jeruk nipis M : belum minum obat</p>	<p>Obat yang terpilih Roverton Alasannya bisa meredakan batuk berdahak awal</p>	<p>Indikasi : Sebagai sekretolitik pada gangguan saluran nafas akut dan kronis khususnya pada eksaserbasi bronkitis kronis dan bronkitis asmatik dan asma bronkial. Cara penggunaan: diminum 3 x 1 har Kapan berhenti: ketika batuk sudah sembuh Kapan harus ke</p>

			<p>P : ini ya kak uangnya (sambil memberikan uangnya) TTK : pas ya pak, terimakasih P : sama-sama</p>			<p>dokter : jika batuk lebih dari 7 hari ESO yang sering : Reaksi alergi, gangguan gastrointestinal ringan Cara menyimpan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C</p>
3.	Obat Flu	<p>Sediaan kombinasi parasetamol, dekstrometorfan, gliseril guaiakolat (guafenisin), CTM, dan efedrin/pseudoefedrin/fenilpropanolamin</p>	<p>TTK : Selamat datang ada yang bisa kami bantu bu? P : obat untuk batuk pilek sama demam apa ya kak? TTK : untuk dewasa atau anak bu? P : untuk anak kak TTK : usia berapa bu? P : sekitar 7 tahunan TTK : dikasih sirup ya bu P : iya kak TTK : mohon ditunggu dulu ya bu (TTK mengambilkan obat tersebut)</p>	<p>W : untuk anak 7 tahun W : batuk, pilek dan demam H : kurang lebih 3 hari A : pakai kecap dan jeruk M : belum minum obat</p>	<p>Obat yang terpilih Hufagrip Kuning Alasannya sirup yang bisa meredakan batuk pilek dan demam sehingga anak tidak banyak mengkons</p>	<p>Indikasi : Untuk meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin disertai batuk berdahak. Cara penggunaan: 3 kali sehari 2 sendok takar (@10 ml).</p>

			<p>TTK : ini bu ada hufagrip kuning bisa untuk batuk pilek dan demamnya dan sehari 3 x 2 sendok takar ya bu</p> <p>P : sesudah makan ya kak?</p> <p>TTK :iya bu</p> <p>P : ya udah kak, berapa ya?</p> <p>TTK : ini aja ya bu, mungkin ada tambahan lainnya?</p> <p>P : sementara ini dulu kak</p> <p>TTK : totalnya 25,000 bu, oh ya untuk penyimpanan jangan ditaruh kulkas ya ditaruh dilemari asal tidak terkena sinar matahari secara langsung</p> <p>P : ya mas (sambil memberikan uangnya) Terimakasih ya mas</p> <p>TTK : sama-sama Bu</p>		<p>umsi obat</p>	<p>Kapan berhenti: ketika sakit sudah sembuh</p> <p>Kapan harus ke dokter : jika lebih dari 7 hari</p> <p>ESO yang sering : mengantuk</p> <p>Cara menyimpan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C</p>
4.	Obat Maag	<p>Antasida, antagonis H2 (ranitidine, famotidine)</p>	<p>TTK : Selamat datang ada yang bisa kami bantu kak?</p> <p>P : beli obat maag kak</p> <p>TTK : sudah minum obat apa saja kak?</p> <p>P : Cuma promag kak, biasanya dikasih promag sudah mendingan sama tak kasih teh hangat juga</p> <p>TTK : nyerinya sampai ke ulu hati ya kak?</p>	<p>W : dewasa 23 tahun</p> <p>W : sakit perut hingga ulu hati</p> <p>H : 3 hari</p> <p>A : teh hangat</p> <p>M : promag</p>	<p>Obat yang terpilih omeprazole</p> <p>Alasannya karena nyeri perut hingga ke ulu hati</p>	<p>Indikasi : Pengobatan jangka pendek untuk tukak lambung dan tukak duodenum, tukak lambung dan duodenum yang terkait</p>

			<p>P : iya kak TTK : sering telat makan ya kak? P : iya kak, takut telat kerja TTK : baik kak, mohon ditunggu dulu ya (TTK mengambilkan obat tersebut) TTK : dikasih omeprazole ya kak P : sama kaya promag ya kak? TTK : beda kak lebih bagus ini daripada promag, atiran pakainya sehari 3x 1 30 menit sebelum makan ya P : ini saja sudah makan bagaimana ya kak? TTK : kalau gitu nunggu 2 jam lalu diminum 1 tablet ya kak P : ohh baik kak, berapa ini? TTK : 5.000 Kak, mungkin ada tambahan lainnya lagi ? P : semetara ini dulu saja kak (sambil memberikan uang) TTK : baik kak, terimakasih ya P : sama-sama kak</p>		<p>dengan AINS, lesi lambung dan duodenum, regimen eradikasi H. pylori pada tukak peptik, refluks esofagitis, Sindrom Zollinger Ellison. Cara penggunaan: sehari 3 x 1 diminum 30 menit sebelum makan Kapan berhenti: setelah maag tidak kambuh lagi Kapan harus ke dokter : apabila maag tidak kunjung sembuh setelah obat habis</p>
--	--	--	---	--	--

						<p>ESO yang sering : mual, muntah dan nyeri perut</p> <p>Cara menyimpan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C</p>
5.	Kecacingan	<p>Pirantel pamoat, piperazin, mebendazol</p>	<p>TTK : Selamat datang ada yang bisa kami bantu kak?</p> <p>P : kak mau beli obat cacing</p> <p>TTK : obat cacing atau extra cacing ya bu</p> <p>P : obat cacing kak, makannya banyak tapi ga gemuk-gemuk</p> <p>TTK : untuk usia berapa ya bu?</p> <p>P : 8 tahun kak</p> <p>TTK : dikasih combantrin siru saja ya bu</p> <p>P : aturan pakainya bagaimana ya kak?</p> <p>TTK : (sambil mengambilkan sirup tersebut) ini diberikan 6 bulan sekali dan diminum langsung 1 fls bu</p> <p>P : oke kak, berapa?</p> <p>TTK : 15,000 bu, mungkin ada tambahan lainnya ?</p> <p>P : sementara ini saja kak</p>	<p>W : untuk anak usai 8 tahun</p> <p>W : cacingan</p> <p>H : -</p> <p>A : belum dikasi apa-apa</p> <p>M : belum dikasi apa-apa</p>	<p>Obat yang terpilih combantrin</p> <p>Alasannya mengandung zat aktif Pirantel Pamoat yang bekerja dengan melumpuhkan cacing dan mengeluarkannya dari dalam tubuh melalui</p>	<p>Indikasi : untuk mengatasi infeksi cacing kremi (enterobius vermicularis), cacing gelang (ascaris lumbricoides), cacing tambang (ancylostoma duodenale), cacing tambang (necator americanus), cacing trichostrongylus colubriformis dan trichostrongylus</p>

			<p>(sambil memberikan uangnya) TTK : baik bu terimakasih ya P : sama-sama kak</p>		<p>tinja, biasanya tanpa memerlukan pencahar.</p>	<p>orientalis. Cara penggunaan: 1 fls 1 kali minum selama 6 bulan sekla Kapan berhenti: - Kapan harus ke dokter : - ESO yang sering : mual, muntah, diare, sakit kepala, pusing, rasa mengantuk, merah-merah pada kulit Cara menyimpan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C</p>
6.	Diare	<p>Attal pugit, kaolin pectin, oralit, Norit</p>	<p>TTK : Selamat datang ada yang bisa kami bantu kak? P : beli obat untuk diare kak TTK : sudah berapa hari kak? P : kurang lebih sudah 4 hari kak</p>	<p>W : untuk dewasa W : diare H : 4 hari A : kayu putih</p>	<p>Obat yang terpilih Lopamid Tabet Alasannya karena</p>	<p>Indikasi : Diare akut non spesifik & diare kronik Cara penggunaan: awal 2 tablet</p>

		<p>TTK : sudah dikasih apa saja kak?</p> <p>P : keamrin cuma entrostop kak, sama tak kasih kayu putih saja</p> <p>TTK : dikasih lopamid saja ya kak</p> <p>P : bagus mana sama entrostop kak?</p> <p>TTK : lebih bagus lopamid kak</p> <p>P : yaudah lopamid saja kak</p> <p>TTK : baik kak, mohon ditunggu dulu ya (TTK mengambilkan obat tersebut)</p> <p>TTK : ini kak obatnya, habis ini diminum 1-2 tablet ya lalu sehabis bab diminum 1 tablet dan maksimal 8 tablet sehari y kak</p> <p>P : oh jadi habis ini diminum 1-2 tablet ya kak lalu habis bab diminum 1 tablet dan maksimal 8 tablet sehari</p> <p>TTK : ya betul kak</p> <p>P : yaudah kak ini saja sama kasih minyak kayu putih cap lang yang tanggung sekalian ya</p> <p>TTK : baik kak, totalnya 35,000 kak</p>	<p>M : entrostop</p>	<p>kandungan dari lopamid dapat mengobati diare akut</p>	<p>kemudian 1 tablet setiap habis defekasi. Maksimal : 8 tablet/hari. Kapan berhenti: setelah diare sembuh Kapan harus ke dokter : apabila diare semakin parah ESO yang sering : demam tinggi dan keluar darah waktu bab Cara menyimpan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C</p>
--	--	---	----------------------	--	---

			<p>P : ok kak (sambil memberikan uang) TTK : kembali 15.000 ya kak. Terimakasih ya P : sama-sama kak</p>			
7.	Laksatif	Bisakodil, laktulosa, Na lauril sulfat.	<p>TTK : Selamat datang ada yang bisa kami bantu kak? P : mau beli obat susah bab kak TTK : sudah berapa hari ya kak? P : dari kemarin malam kak TTK : sudah diminumkan apa saja kak? P : belum dikasih apa-apa kak cuma dikasih kayu putih TTK : mau tablet atau yang dimasukan lewat dubur kak? P : tablet saja kak TTK : bisa pakai dulcolax kak, cara pakainya 2-4 tablet diminum pada malam hari atau sebelum tidur karena obat akan bereaksi 6-12 jam jadi kalau minum malam hari besok pagi semoga bisa lancar bab nya P : oh jadi mau ditidur diminum dulu ya kak TTK : iya kak P : yaudah itu saja kak, berapa</p>	<p>W : dewasa 22 tahun W : tidak bisa bab H : kurang lebih kemarin malam A : dikasih minyak kayu putih M : belum dikasih apa-apa</p>	<p>Obat yang terpilih dulcolax Alasannya bisa membantu merangsang pergerakan pada usus besar dan membantu keluarnya feses</p>	<p>Indikasi : mengatasi masalah sembelit/ susah BAB/ konstipasi. Untuk persiapan prosedur diagnostic sebelum operasi Cara penggunaan: mengatasi masalah sembelit/ susah BAB/ konstipasi. Untuk persiapan prosedur diagnostic sebelum operasi Kapan berhenti:</p>

			<p>totalnya? TTK: totalnya 25.000 Kak P : ini ya kak uang nya (sambil memberikan uang) TTK : baik kak, terimakasih ya P : sama-sama</p>			<p>setelah bab lancar Kapan harus ke dokter : apabila obat sudah habis tidak ada reaksi ESO yang sering : Ketidaknyamanan perut & diare. Reaksi anafilaksis, angioedema, hipersensitivitas. Dehidrasi. Pusing, sinkop. Kram perut, sakit perut, mual, muntah Cara menyimpan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C</p>
8.	Biang keringat, pruritus, antihistamin	Salisil talk dan sediaan yang mengandung	<p>TTK : Selamat datang ada yang bisa kami bantu pak? P : mau beli obat gatal kak? TTK : untuk bapaknya sendiri? P : bukak kak untuk anak saya</p>	<p>W : anak 7 tahun W : gatal H : baru</p>	Obat yang terpilih caladine bedak	<p>Indikasi : Biang keringat, sebagai bedak taburkan setelah mandi,</p>

	topikal	g kalamini; difenhidramin 2%, prometazin HCl 2%.	<p>TTK :usai berapa ya pak? P : sekitar7 tahun TTK : gatal kemerah-merahan? P : iya kak, habis main kemarin langsung gatal katanya TTK ; pakai caladine bedak saja ya pak P : coba lihat dulu kak (TTK mengambilkan bedak tersebut) TTK : ini pak, bedaknya bisa untuk gatal-gatalnya P : cara pakainya bagaimana ya kak? TTK : ditaburkan pada kulit yang gatal saja pak dan digunakan setelah mandi saja bisa P : oke kak itu saja TTK : baik pak, totalnya 20.000 ya P : oke kak ini uangnya (sambil memberikan uang) TTK : terimakasih ya pak P : sama-sama kak</p>	<p>kemarin A : belum dikasih apa-apa M : belum dikasih apa-apa</p>	<p>Alasannya untuk mengatasi rasa gatal yang timbul akibat biang keringan serta memberikan sensasi sejuk di kulit sehingga tidak mengganggu aktifitas setiap hari.</p>	<p>anti alergi, antiseptik, penyejuk kulit Cara penggunaan: Taburkan setelah habis mandi atau bila berkeringat. Kapan berhenti: ketika sudah tidak gatal Kapan harus ke dokter : apabila gatal bertambah banyak ESO yang sering : - Cara menyimpan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C</p>
9.	Jerawat	Obat yang mengandung sulfur; resorsinol; asam salisilat;	<p>TTK : Selamat datang ada yang bisa kami bantu pak? P : mau beli obat untuk iritasi kulit kak? TTK ; sudah berapa hari pak? P : sudah 3 hari mungkin mas</p>	<p>W : untuk dewasa W : iritasi ulit H : 3 hari A : belum dikasih apa-</p>	<p>Obat yang terpilih salep 2-4 Alasannya Salep ini digunakan</p>	<p>Indikasi : Skabies, iritasi pada kulit Cara penggunaan: Oleskan</p>

		benzoil peroksida; triclosan, minosiklin 1%.	<p>TTK ; sudah dikasih apa saja pak kemarin?</p> <p>P : belum dikasih apa-apa mas</p> <p>TTK ; pakai salepnya saja ya pak</p> <p>P : boleh mas</p> <p>TTK : (sambil mengambilkan salep 2-4) ini pak salepnya, habis ini bapak kasih dikaki yang terluka sebelum itu dicuci dulu ya pak kakinya</p> <p>P : oke mas, berapa ya?</p> <p>TTK : 5.000 pak</p> <p>P : ambil 2 mas (sambil memberikan uang)</p> <p>TTK : baik pak, terimakasih</p> <p>P : sama-sama</p>	<p>apa</p> <p>M : belum</p> <p>mintum apa-apa</p>	<p>untuk mengatasi psoriasis, kutil, mata ikan dan kapalan..</p>	<p>secukupnya pada bagian kulit yang sakit</p> <p>Kapan berhenti: ketika sudah mendingan</p> <p>Kapan harus ke dokter : ketika luka bertambah parah</p> <p>ESO yang sering : rasa terbakar pada kulit, kulit kemerahan dan pengelupasan kulit</p> <p>Cara menyimpan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C</p>
10	Kadas/kurap, antifungi	Obat yang mengandung klotrimazol 1%, mikonasol nitrat 2%, ketoconazol	<p>TTK : Selamat datang ada yang bisa kami bantu pak?</p> <p>P : mau beli obat untuk kutu air ada mas?</p> <p>TTK : sudah berapa hari pak?</p> <p>P : kurang lebih 3 hari mas</p> <p>TTK : sudah dikasih obat apa pak sebelumnya?</p>	<p>W : dewasa</p> <p>25 tahun</p> <p>W : kutu air</p> <p>H : 2 hari</p> <p>A : direndam air garam</p> <p>M : belum</p>	<p>Obat yang terpilih</p> <p>Canesten cream</p> <p>Alasannya menurun</p>	<p>Indikasi : Mengatasi jamur pada kulit, panu, kadas/kurap, kutu air, dan ruam popok.</p> <p>Cara</p>

		e nitrat	<p>P : belum minum obat apa-aoa mas Cuma tak rendam di air garam</p> <p>TTK : dikasih salepnya saja ya pak, biar cepat sembuh</p> <p>P : ya gapapa mas</p> <p>TTK : (sambil membawakan salep) ini pak ada salep canesten bisa untuk kutu airnya</p> <p>P : ini oleskan kapan saja ya mas?</p> <p>TTK : dioleskan secukupnya saja pak, sebelum dioleskan saya berharap bapak mencuci kakinya dulu dan dikeringkan dengan handuk lalu dioleskan pada bagian yang terluka ya pak</p> <p>P : baik mas, berapa ya selapnya?</p> <p>TTK : 29,000 Pak</p> <p>P : (sambil memberikan uang) ini ya mas uang nya</p> <p>TTK : terimakasih ya pak</p> <p>P : sama-sama mas</p>	dikasih apa-apa	biosintesis ergosterol	<p>penggunaan: leskan krim Canesten ke bagian kulit yang terinfeksi jamur sebanyak 2-3 kali sehari.</p> <p>Kapan berhenti: setelah luka sembuh</p> <p>Kapan harus ke dokter : apabila luka tambah parah</p> <p>ESO yang sering : Kulit terasa tidak nyaman / nyeri, Muncul kemerahan, Kulit mengelupas, Kulit terasa seperti terbakar</p> <p>Cara menyimpan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C</p>
--	--	----------	---	-----------------	------------------------	---

<p>11</p>	<p>Ketombe</p>	<p><i>Shampoo</i> yang mengandung Selenium sulfid, Zinc pyrithione.</p>	<p>TTK : Selamat datang ada yang bisa kami bantu kak? P : kak ada obat/sampo untuk menghilangkan ketombe? TTK : sudah berapa hari ya kak? P : kurang lebih 1 minggu kak TTK : sebelumnya dikasih apa saja? P: Cuma sampo anti ketombe biasa sih kak TTK : (sambil membawakan selsun) oh kalau gitu pakai selsun saja kak, soalnya kebanyakan yang cocok pakai selsun P : berapa ini kak? TTK : ini yang besar 42.000 dan yang kecil 27,000 kak P : yanag kecil dul saja ya kak TTK : baik kak, untuk pemakaiannya seminggu 2 kali saja ya kak P : (sambil memberikan uang) baik kak, terimakasih ya TTK : sama-sama kak</p>	<p>W : Dewasa 18 tahun W : ketombe H : 7 hari A : dikasih sampo anti ketombe M : belum dikasih apa-apa</p>	<p>Obat yang terpilih selsun yellow double impact Alasannya Menghilangkan ketombe tingkat sedang sampai dengan berat dan sekaligus menghilangkan gatal-gatal karena ketombe dikulit kepala</p>	<p>Indikasi : Menghilangkan ketombe tingkat sedang sampai dengan berat dan sekaligus menghilangkan gatal-gatal karena ketombe dikulit kepala Cara penggunaan: Keramaskan Selsun pada rambut dan kulit kepala dengan merata, biarkan 2-3 menit untuk mendapatkan hasil maksimal. Gunakan 2 kali seminggu secara teratur sampai ketombe hilang. Kapan berhenti: setelah ketombe hilang Kapan harus ke</p>
-----------	----------------	---	---	---	---	---

						<p>dokter : apabila ketombe masih banyak</p> <p>ESO yang sering</p> <p>: -</p> <p>Cara menyimpan :</p> <p>Simpan di bawah suhu 30 derajat C</p>
12	Kutil	<p>obat yang mengandung asam salisilat 2 g, asam laktat 0,5 g.</p>	<p>TTK : Selamat datang ada yang bisa kami bantu bu?</p> <p>P : mau beli obat untuk kutil kak?</p> <p>TTK ; sudah berapa hari bu?</p> <p>P : sudah 2 hari mas</p> <p>TTK ; sudah dikasih apa saja bu kemarin?</p> <p>P : belum dikasih apa-apa mas</p> <p>TTK ; pakai salepnya saja ya bu</p> <p>P : boleh mas</p> <p>TTK : (sambil mengambilkan kutilos) ini bu salepnya, habis ini bapak kasih dikaki yang terluka sebelum itu dicuci dulu ya pak kakinya</p> <p>P : oke mas, berapa ya?</p> <p>TTK : 15,000 bu</p>	<p>W : dewasa 30 tahun</p> <p>W : kutil</p> <p>H : 2 hari</p> <p>A : belum dikasih apa-apa</p> <p>M : belum dikasih apa-apa</p>	<p>Obat yang terpilih</p> <p>Kutilos</p> <p>Alasannya untuk mengatasi kulit yang mengeras, kapalan, kutil dan mata ikan.</p>	<p>Indikasi :</p> <p>penebalan kulit pada jari jari kaki (mata ikan), kalus (kapalan), kulit yang mengeras dan kutil</p> <p>Cara penggunaan:</p> <p>Oleskan KUTILOS 10 ML pada bagian yang membutuhkan setelah dibersihkan.</p> <p>Kapan berhenti:</p>

			<p>P : oke mas 1 ya (sambil memberikan uang) TK : baik bu, terimakasih P : sama-sama</p>			<p>setelah luka sembuh Kapan harus ke dokter : apabila dikasih obat bertambah parah ESO yang sering : iritasi Cara menyimpan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C</p>
13	Luka bakar	<p>Obat yang mengandung perak sulfadiazin; oleum iecoris aselli (minyak ikan,"<i>levertr</i>aan").</p>	<p>TTK : Selamat datang ada yang bisa kami bantu kak? P : kak ada obat untuk kaki kena knalpot? TTK : adanya salep kak P : ya gapapa TTK : sudah berapa hari kak terkena klanpot tersebut? P : semalam kak TTK : dikasih bioplanceton saja ya, sebelumnya luka nya dikasih apa kak? P : Cuma dikasih air saja kak TTK : oke oke mohon ditunggu sebnetar ya</p>	<p>W : untuk dewasa 25 tahun W : kaki terkena knalpot H : sudah semalam A : dikasih air M : belum dikasih apa-apa</p>	<p>Obat yang terpilih biopalceton Alasannya Ekstrak plasenta bekerja dengan memicu pembentukan jaringan baru dan untuk wound</p>	<p>Indikasi : Luka bakar, luka dengan infeksi, serta luka kronik dan jenis luka yang lain. Cara penggunaan: Oleskan 4-6 x sehari atau sesuai kebutuhan pada area luka. Aturan Pakai Dioleskan pada kulit yang sakit/ lepuh/ terbakar setelah kulit</p>

			<p>(TTK mengambilkan obat tersebut)</p> <p>TTK : ini kak obatnya, aturan pakainya dioleskan ke luka yang terkena knalpot saja ya kak</p> <p>P : baik kak, berapa ya</p> <p>TTK : 32.000 Kak, ada tambahan lainnya ?</p> <p>P : ini dulu saja kak (sambil memberikan uang)</p> <p>TTK : Baik kak, terimakasih ya</p> <p>P : sama-sama kak</p>		<p>healing, sedangkan neomycin bekerja dengan mencegah atau mengatasi infeksi bakteri Gram negatif pada area luka.</p>	<p>dibersihkan dan dikeringkan.</p> <p>Kapan berhenti: setelah luka kering</p> <p>Kapan harus ke dokter : jika luka tidak ada peubahan</p> <p>ESO yang sering : Reaksi kulit seperti kemerahan dan urtikaria.</p> <p>Cara menyimpan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C</p>
14	Luka iris	Povidon iodine	<p>TTK : Selamat datang ada yang bisa kami bantu bu?</p> <p>P : mau beli obat untuk luka habis teriris pisau kak</p> <p>TTK : barusan ya bu?</p> <p>P : iya kak</p> <p>TTK : pakai betadine solution saja ya bu</p> <p>P : boleh mas</p>	<p>W : untuk dewasa</p> <p>W : luka teiris</p> <p>H : barusan</p> <p>A : -</p> <p>M : -</p>	<p>Obat yang terpilih betadine solution</p> <p>Alasannya merupakan antiseptik pada luka untuk</p>	<p>Indikasi : Cairan antiseptik pada luka untuk membunuh kuman penyebab infeksi</p> <p>Cara penggunaan: Oles atau kompres pada</p>

			<p>TTK : ini nanti diberikan ke lukanya langsung juga bisa bu atau dikompres pakai kapas juga bisa</p> <p>P : kalau gitu beli kapasnya juga ya mas, jadi habis berapa semua?</p> <p>TTK : 20,000 bu</p> <p>P : ini ya mas (sambil memberikan uangnya)</p> <p>TTK : baik terimakasih ya bu</p> <p>P : sama-sama</p>		<p>membunuh kuman penyebab infeksi</p>	<p>bagian yang luka</p> <p>Kapan berhenti: setelah luka kering</p> <p>Kapan harus ke dokter : jika terjadi radang ESO yang sering : iritasi</p> <p>Cara menyimpan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C</p>
15	Alergi	<p>Klorfeniram in maleat, prometazine, diphenhydramine, deksklorfeniramin maleat, loratadine, cetirizine.</p>	<p>TTK : Selamat datang ada yang bisa kami bantu pak?</p> <p>P : kak mau beli obat untuk gatal</p> <p>TTK : obat gatal alergi atau jamur ya pak?</p> <p>P : (pasien menunjukan area gatalnya) seperti ini kak</p> <p>TTK : oh itu gatal alergi ya pak, soalnya diarea gatal tersebut berbecak merah kalau jamur biasanya bercak putih. Sebelumnya makan apa ya pak sebelum terjadinya gatal tersebut?</p>	<p>W : dewasa 30 tahun</p> <p>W : gatal alergi udang</p> <p>H : 2 hari</p> <p>A : belum dikasih apa-apa</p> <p>M : belum dikasih apa-apa</p>	<p>Obat yang terpilih</p> <p>incidal</p> <p>Alasannya</p> <p>Obat ini diindikasikan untuk mengobati rinitis menahun, rinitis alergi seasonal, konjungtivitis,</p>	<p>Indikasi : Rinitis menahun, rinitis alergi seasonal, konjungtivitis, pruritus, urtikaria idiopati kronis.</p> <p>Cara penggunaan: 1 - 2 tablet sehari</p> <p>Kapan berhenti: ketika alergi sudah reda</p> <p>Kapan harus ke dokter : ketika</p>

			<p>P : sekitar 2 hari saya makan udang kak</p> <p>TTK : oh jadi bapaknya memiliki alergi udang, dikasih obat ini saja ya pak (ttk mengambilkan obat incidal) ini pak obatnya</p> <p>P : ini sudah bagus ya kak?</p> <p>TTK : ini sudah bagus pak dan diminum sehari 1-2 hari ya</p> <p>P : berapa kak 1 stripnya?</p> <p>TTK : 55.000 pak</p> <p>P : boleh bijian kak?</p> <p>TTK : boleh pak, mungkin coba 4 biji untuk 2 hari, bagaimana pak</p> <p>P : baik kak ambil 4 saja. Jadi 22.00 ya (sambil memberikan uangnya</p> <p>TTK : baik pak terimakasih ya</p> <p>P : sama-sama kak</p>		<p>pruritus, urtikaria idiopati kronis.</p>	<p>alergi tidak berubah</p> <p>ESO yang sering : Sakit perut, mulut kering, mual, diare, muntah.</p> <p>Cara menyimpan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C</p>
16	Vitamin dan mineral	Vit C, Vit A, Vit B1, Vit B6, Vit B12, Vitamin D, Asam folat, Mn, Zn, Fe, dll	<p>TTK : Selamat datang ada yang bisa kami bantu kak?</p> <p>P : mau cari vitamin kak</p> <p>TTK : vitamin untuk nafsu makan atau untuk menambah kekebalan tubuh ya kak?</p> <p>P : untuk menambah kekebalan</p>	<p>W : dewasa 20 tahun</p> <p>W : menambah imun tubuh</p> <p>H : -</p> <p>A : -</p>	<p>Obat yang terpilih Becom zet</p> <p>Alasannya suplemen yang mengandung</p>	<p>Indikasi : Suplementasi vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin E dan zinc.</p>

		<p>tubuh kak, biasanya pakai apa ya?</p> <p>TTK : (ttk sambil mengambilkan beberapa obat seperti enervon c dan becom zet) ini pak untuk vitaminnya yang ini (becom zet) sudah lengkap dan ada zinc nya untuk memperkuat kekebalan tubuh kalau yang ini (enervon c) tidak ada zincnya</p> <p>P : yang enervon c dan becom zet berapa kak?</p> <p>TTK : enervon c isi 30 43.500 kalau becom zet 31.000 per strip</p> <p>P : jadi bagus becom zet ya kak untuk kekebalan tubuh</p> <p>TTK : iya pak bagus becom zet karena ada zinc dan vitamin c nya agak lebih tinggi, kakaknya ada riwayat asam lambung?</p> <p>P : ada kak. Bagaimana ya kak?</p> <p>TTK : kalau gitu diminum habis makan saja kak</p> <p>P : oke kak coba becom zet dulu ya, tadi 31.000 ya (sambil memberikan uang)</p>	<p>M : -</p>	<p>ng kombinasi antara multivitamin, mineral, dan zinc yang berfungsi sebagai Suplementasi vitamin b kompleks, vitamin C, vitamin E dan zinc.</p>	<p>Cara penggunaan: sehari 1 tablet Kapan berhenti: - Kapan harus ke dokter : - ESO yang sering : Gangguan gastrointestinal</p> <p>Cara menyimpan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C</p>
--	--	--	--------------	---	---

			<p>TTK : oh baik kak, ini diminum sehari 1 kali saja ya</p> <p>P : oh baik kak, terimakasih ya</p> <p>TTK : sama-sama kak</p>			
17	Antiseptik dan disinfektan	Alkohol 70%, povidone iodine 10%, klorheksidin, setrimida 0,5%, serbuk PK.	<p>TTK : Selamat datang ada yang bisa kami bantu kak?</p> <p>P : mas mau cari obat untuk membersihkan luka</p> <p>TTK : luka nya barusan atau sudah lama kak?</p> <p>P : barusan kak</p> <p>TTK : pakai alkohol saja ya supaya cepat kering</p> <p>P : baik kak, sama untuk mengerinkan luka juga ada kah?</p> <p>TTK : mau yang tabur atau salep kak?</p> <p>P : yang untuk luka basah kak yang mana ya?</p> <p>TTK : serbuk saja kak nanti tinggal ditaburkan dilukanya</p> <p>P : ya yang tabur saja kak</p> <p>TTK : jadi alkohol sama serbuk untuk mengerinkan luka ya kak, untuk serbuknya mau yang bagus atau yang biasa?</p> <p>P : ada yang sachet ya kak?</p>	<p>W : dewasa 19 tahun</p> <p>W : untuk membersihkan luka dan untuk mengerinkan luka</p> <p>H : barusan</p> <p>A : dicuci pakai air</p> <p>M : belum dikasih obat apa-apa</p>	<p>Obat yang terpilih alkohol 70 %</p> <p>Alasannya merupakan cairan yang digunakan sebagai antiseptik (membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme), untuk membersihkan luka dan pembersih</p>	<p>Indikasi : Sebagai antiseptik, membersihkan luka, dan membersihkan alat-alat medis.</p> <p>Cara penggunaan : Dituang pada kassa steril atau kapas, lalu diusapkan pada luka atau alat medis.</p> <p>Kapan berhenti: ketika luka sudah membaik</p> <p>Kapan harus ke dokter : apabila luka semakin parah</p> <p>ESO yang sering : -</p>

			<p>TTK : ada kak minta berapa? P : alkohnya yang kecil 1 sama bubuk taburnya kasih 3 TTK ; baik kak, totalnya 17,000 kak P : baik kak (sambil memberikan uang) TTK : terimakasih kak P : sama-sama</p>		alat-alat medis.	<p>Cara menyimpan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C</p>
18 .	Antiinflama si topikal	<p>sediaan topikal yang mengandung flusinolon asetonida; hidrokortison asetat 1%; desoksimeson 2,5 mg.</p>	<p>TTK : Selamat datang ada yang bisa kami bantu kak? P : mau beli obat gatal kak TTK : gatalnya jamur atau alergi ya kak? P : ga tau kak kayak kemerahan (sambil pasien menunjukan gatalnya) TTK : sudah berapa hari kak? P : 1-2 harian kak TTK : itu bisa karena bakteri yang meradang kak jadi dikasih desoksimeson saja ya (sambil mengambil salep tersebut) salep ini bisa untuk mengatasi peradagannya sama gatalnya P : atauran pakainya bagaimana kak? TTK : dioleskan 1-2x sehari kak pada bagian yang sakit saja, kalau bisa habis mandi</p>	<p>W : dewasa 25 tahun W : gatal H : 1-2 hari A : belum dikasih apa-apa M : belum dikasih apa-apa</p>	<p>Obat yang terpilih desoksimeson Alasannya untuk mengobati berbagai tipe eksim, dermatitis, dan psoriasis yang peka terhadap kortikosteroid</p>	<p>Indikasi : Macam-macam tipe eksema, dermatitis dan psoriasis (daerah berambut) Cara penggunaan : 1-2 x sehari Aturan Pakai dioleskan pada arekulit yang sakit/radang/gatal Kapan berhenti: ketika luka sudah membaik Kapan harus ke dokter : ketika luka semakin parah</p>

			<p>atau dicuci pakai air dulu biar bersih P : baik kak, berapa salepnya TTK : 8000 kak P : yaudah coba 1 dulu ya (sambil memberikan uang) TTK : baik kak terimakasih ya P : sama-sama kak</p>			<p>ESO yang sering : iritasi kulit seperti gatal dan rasa panas Cara menyimpan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C</p>
19	Obat topikal penghilang rasa sakit	<p>sediaan yang mengandung mentol, campor, metil salisilat, oleum mentae; kayu puti; lotion lidokain HCl 3%, natrium diklofenak 1% gel.</p>	<p>TTK : Selamat datang ada yang bisa kami bantu pak? P : mau beli obat untuk nyeri mas, tapi yang oles saja ada? TTK : sudah berapa hari pak nyerinya? P : sekitar 2 hari mas TTK : bapaknya sudah dikasih obat apa sebelumnya? P : Cuma paracetamol mas TTK : ada pak kalau gitu dikasih ini saja, (TTK sambil membawakan beberapa merek) kayak counterpain, voltadex cream dan hot in cream P : yang untuk meredakan nyeri ada kah mas? TTK : yang kuat voltadex cream pak itu ada kandungan</p>	<p>W : dewasa W : nyeri H : 2 hari A : dikasih kompres hangat M : sudah dikasih paracetamol</p>	<p>Obat yang terpilih Voltadex gel Alasannya mengandung zat aktif Diclofenac, obat yang termasuk golongan Non Steroidal Anti-Inflamatory Drug (NSAID). Obat ini digunakan</p>	<p>Indikasi : Membantu meredakan nyeri otot dan persendian seperti yang disebabkan oleh sprain, strain dan memar. Membantu meredakan rematik dan lainnya Cara penggunaan: Dioleskan 3-4 kali sehari pada bagian-bagian yang sakit sambil digosok secara perlahan-lahan</p>

			<p>untuk meredakan nyeri jadi sudah bagus P : berapa mas? TTK : 29.000 pak P : cara pakainya bagaimana mas? TTK : dioleskan secukupnya saja pak dan dibagian yang sakit saja pak P : oh gitu mas, ini saja kalau begitu (sambil memberikan uang) TTK : baik pak, terimakasih ya P : sama-sama mas</p>		<p>untuk pengobatan topikal pada peradangan akibat trauma tendon, ligamen, otot dan sendi. Obat ini juga digunakan untuk mengobati reumatisme jaringan lunak dan penyakit reumatik.</p>	<p>Aturan Pakai Dioleskan pada bagian yang sakit Kapan berhenti: setelah nyeri sudah reda Kapan harus ke dokter : apabila nyeri bertambah parah ESO yang sering : Dermatitis kontak alergi atau non alergik. Ruam kulit, reaksi hipersensitivitas dan fotosensitivitas Cara menyimpan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C</p>
20	Terapi komplementer / obat	Jamu, OHT, Fitofarmaka	<p>TTK : Selamat datang ada yang bisa kami bantu Bu? P : kak ada obat penambah imun tubuh?</p>	<p>W : untuk anak usia 6 tahun W :</p>	<p>Obat yang terpilih stimuno Alasannya</p>	<p>Indikasi : Membantu merangsang tubuh</p>


	<p>tradisional</p>		<p>TTK : ada bu, untuk anak atau dewasa ya? P : untuk ana mas TTK : usia berapa ya bu? P : usia 6 tahun kak TTK : dikasih sirup stimuno anak saja ya bu P : iya kak gapapa TTK : mau rasa apa bu original atau anggur? P : anggur saja kak TTK : yang besar atau yang kecil bu? P : yang kecil saja TTK : baik bu (sambil mengambilkan sirup tersebut) ini bu sirupnya, untuk pemakain sehari 1 kali saja ya sesudah makan P : pagi atau sore ya kak? TTK : bisa pagi atau sore bu, atau lebih baik pagi saja setelah sarapan P : oh baik kak, berapa totalnya? TTK : 24.000 bu P : ini kak uangnya (sambil memberi uang) terimakasih ya kak TTK : sama-sama bu</p>	<p>penambah daya tahan tubuh H : - A : belum dikasih apa-apa M : belum dikasih apa-apa</p>	<p>bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh</p>	<p>memproduksi lebih banyak antibodi dan mengaktifkan sistem kesehatan tubuh agar daya tahan tubuh bekerja optimal Cara penggunaan: 1-3 kali sehari 1 sendok takar (5 ml). Kapan berhenti: ketika anak sudah merasa sehat dan memulai aktifitas Kapan harus ke dokter : ketika anak tidak ada peubahan setelah obat habis ESO yang sering : Pemakaian obat umumnya</p>
--	--------------------	--	---	---	--	---

						<p>memiliki efek samping tertentu dan sesuai dengan masing-masing individu. Jika terjadi efek samping yang berlebih dan berbahaya, harap konsultasikan kepada tenaga medis.</p> <p>Cara menyimpan : Simpan di bawah suhu 30 derajat C</p>
--	--	--	--	--	--	--



TUGAS KHUSUS PKL D3 FARMASI UMG_TSAQIF JAUHAR JALAL_201105033_APOTEK L FANS

Gresik, 12 April 2023
Dosen Pembimbing,


Apt. Siti Nur Asiyah, M.Farm., Klin
NIDN : 0711088504

Lamongan, 15 April 2023
Pembimbing Lapangan (Apotek L FANS)


Apt. Arief Akbar Rahman, S.Farm
SIPA : 1055/SIPA/413-III/V/2021

